

FRANCISCI
VALLESII
COVARRVBIANI

PHILIP. II. HISPANIARVM REGIS

ARCHIATRI ET A CVBICVLO MEDICI

COMMENTARIA,

IN SEPTEM LIBROS HIPPOCRAT

DE MORBIS POPVLARIBVS,

NVNC PRIMVM IN GALLIIS EXCVSA,

*multoque quam antea emendatiora, textu Hippocratis ad Grecum exemplar
recognito, & innumeris erroribus repurgato, nonnullisque additis Scholiis,*

Operâ & studio S. GAUDEI Aurelij Doct. Med, Monspelienfis, & in
collegio Medicorum Aurelianensium Aggregati.

CVM INDICE RERVM ET VERBORVM LOCVPLETISSIMO.



AVRELIÆ

'Apud C LAVDIVM ET IACOBVM BORDE
In Claustro Sanctæ Crucis.

M. DC. LIV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

VALLI

CONVARI

PHOTOGRAPH

RECHARTER

COMMITTEE

IN THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE



ILLVTRISSIMO VIRO D
DOMINO FRANCISCO
DE BEAVHARNOIS
CHRISTIANISSIMI REGIS
IN SACRATI CONSILII
CONCESSV CONSILIARIO,

Nec non in Aurelianensi curiâ Præsidi, totiusque
prouinciæ Generali Præfecto, Iudici semper
integerrimo, D. de la Grilliere &c.

Obsequia cum votis offert S. GAVDEVS Doct. Med.



*H*umanis pectoribus (VIR ILLVSTRIS-
SIME) Vel minima generosa indolis strictura micantibus in-
situm est, & penitus radicatum, ut studia laborés-
que suos ad publicam dirigant utilitatem, & Spar-
tam quam nacti sunt adornare conentur. His im-
pulsus stimulis, nonnullum medica arti quam profiteor incrementum
accessurum, auidisque doctorum medicorum desiderijs satisfacturum
putavi, si Francisci Vallesij commentaria in libros Epidemiarum,
eâque tersiora & paulò auctiora Gallici iuris facerem, atque hos
Medicina sacros latices, in Hispania quidem scaturientes, nostras

nunc in Gallias derivarem. Quid enim ad eius maiestatem magis comparatum excogitari potest quam ex varia tempestatum constitutione, morborum qui deinceps grassaturi sunt naturam habere perspectam? Quid ad medicam praxim dirigendam utilius, quam eam in exemplis docere, & uniuersalia Theoremata particulari morborum curationi feliciter applicare? Tanta est huius methodi necessitas, ut satis admirari non possim, raros admodum fuisse in hoc feracissimo mentium defecatarum saeculo, qui in ea excollenda Hippocratem sequerentur ducem, & in ipsius libris enarrandis desudarent. Multi quidem unum aut alterum librum explicarunt, quasdam historias explanarunt & velut ~~disputantes~~ quoddam emiserunt. Solus Vallesius vir doctissimus, suo etiam tempore Clarissimus hanc perfregit glaciem, primus hos calles attriuit satebrosos, omnesque libros iustis illustrauit commentarijs. Verum illius vices non dolere non potui, qui Typographorum infelices manus hactenus expertus est, ab ijsque adeo infuscatus, ut multum ipsi de nativo decesserit splendore. Quapropter illum crassiori squalentem sicut detergere, pristinoque nitore restituere conatus sum; priusquam delicatioribus Gallorum oculis subiceretur. Hunc qualemcunque laborem (VIR ILLUSTRIS-SIME) has studiorum primitias nomini tuo consecrare ausus sum; debui procul dubio ex veteris clientela nexu, hanc grati animi significationem tua erga me beneficia exposculant, nec veritus sum, ne manus dignitati tue impar offerre, aut ex ere alieno debitum soluere viderer, dummodo (cum pretiosiora pro tempore non suppetere) Studium erga te meum & constantem in tui obsequio perseuerantiam testarer. Verum mea sunt quodam modo molimina, quae hic primus, atque emendatiora profero, nec quicquam quod ad artes & scientias pertineat, a te alienum credo, quem noui feruentissimum earum cultorem, doctrinamque fouere stipatam virtutum omnium caterva, quae te cumulatissime asserunt in munus & honorem parentis. Spondet igitur innata tibi humanitas, & pronus in literas fauor, leuidentem istud mea erga te obseruantia te benigna fronte excepturum, imò & properante animo cunctantium votorum verecundiam praeventurum. Vale.

P R Æ F A T I O

TOTIVS OPERIS.



X Operibus Hippocratis quædam præcepta continent, velut libri aphorismorum, & prædictionum, & de ratione victus, & quidam alij: quædã solum observationes, velut hi libri, quorum enarrationem modò aggredimur: nulla enim præcepta continent, sed narrationem solum eorum, quæ Hipp. fieri circa multos ægrotos observavit, itaque author hic ager historicum non præceptorem. Nimirum cum ars medica ex philosophia & experimentis nascatur, perfectissimè videtur mihi hanc artem tradidisse, seorsum scribens de natura rerum omnium, præcipuè verò hominis: & de morbis, seorsum suas observationes, atque deinceps enucleatissimas sententias. Scripsit .i. & artis præcepta & principia ex quibus ea nata sunt, verum quia præcepta non capi debent, ex his quæ cuidam homini aut paucis quibusdam, sed multis eveniunt, consentaneum fuit tempestatum insalubrium, in quibus fuerunt morbi communes multis hominibus, præcipuè meminisse, unde etiam acceperunt nomen libri *insalubrium* siue de morbis populariter vagantibus. Nam tempestatibus salubribus accidere solent morbi rari, nulla enim adeò salubris est tempestas, ut nullos ægrotos habeat, sed quæ non est morboſa, habet raros; in insalubribus accidunt multi. Morborum quidam vocantur ab Hippocrate communes, quidam sparsim grassantes: communes sunt, quum omnes, aut plerique, ijque omnis naturæ & sexus, eodem morbi genere capiuntur: sparsi quum varij homines variis morbis ægrotant: At qui sunt communes, aut regionis vrbisve naturam sequuntur, vocanturque ab Hippocrate Endemij, à nobis patrij aut vernaculi: aut sequuntur aliam causam, & vocantur Epidemij, siue populares. De morbis vernaculis, in libello de aëre locis & aquis, videtur mihi satis scripsisse, de sparsis in libris de morbis; in hoc opere de his omnibus agit, ut in ipsius operis decursu patebit, præcipuè verò de Epidemijs, quos nasci ex causa communi in libris de natura humana, & de statu dicit Hipp. sparsos verò, non ex causa communi, sed ex cuiusque victu, in quo nihil potest esse omnibus regionis aut vrbis incolis commune præter aërem, non enim cibus, aut potus, aut somnus, aut vigilia, aut motus corporis, aut passionibus animi, aut otium, aut Venus, quia nulla re tali vruntur omnes pariter, sed est suus cuique mos. Aëte verò utcumque affecto omnes vruntur eodem. Atque ita cum aër putris est morborum causa, epidemiales fiunt nunc magis nunc minùs mortiferi, ut deterior aut minùs mala putredo irrepsit in aërem. Victus facit tempestates insalubres, morbis tantum vagantibus sparsim; atqui hoc genus insalubrium tempestatum dicit solet accidere per caritatem annonæ, coactis hominibus pravo victu vri. Accidit quidem in his quoque tempestatibus, genus aliquod morbi commune esse præ alijs, quoniam evenit multos eodem modo errare in victu. Nullum verò esse morbi genus omnino commune hinc perspicies, quòd diuites & qui etiam in caritate annonæ cibis abundant, non adeò capiuntur talibus morbis. Quòd si malum post caritatem annonæ adeò serpat, ut arripiat mulros omnis naturæ, putandum est morbos

P R Æ F A T I O.

sparsos in populares iam migrasse, quod quidem fit, vel inquinamenti multorum ægrotantium aërem iam inficientibus, vel intemperie aeris, quæ fruges sustulit, morbos afferente. Popularis tamen & communis morbus non antea est, quàm sit causa in aëre. Nam siue frumentum putruerit, siue aquæ fontis venenatæ sint, non est causa necessaria, & omnibus communis. Quidam enim eam evitabunt, aquam integram aut frumenta impurida asportantes sibi, aërem verò nullus in oppido agens deuitare potest. Quare aër morbos patit omnibus communes, fortunis, naturis, ætatibus, sexibus. Quamquam neque hic opus sit, ut omnes æquè lædat. Nam occurrunt tempestates epidemiales quibus maximè senes, aliæ quibus maximè pueri, aliæ quibus iuuenes maximè læduntur. Nimirum quamquam omnes tempestates, quibus morbi epidemiales fiunt, aëris affectionem coniunctam habeant, non tamen omnes eandem, sed variæ tempestates varias pariunt affectiones. Quæ quidem variæ sunt, nunc differentia effabili, ut si in hac tempestate est aër iusto siccior, in illa iusto humidior: nunc ineffabili, velut in varijs pestilentia generibus accidere solet, inde enim nascuntur pestilentia genera longè diuersa, nunc cum bubonibus, nunc cum vlceribus, nunc cum maculis: ex maligna quidè aëris putredine omnia producuntur, sed vario putrescendi modo, eoque indicibili. Illæ igitur variæ aeris affectiones, siue effabiles sint, siue ineffabiles, si magnæ sint, omnibus hominibus sunt noxiæ (nulla enim natura gaudet extrema aliqua infectione aeris) tamen non omnibus pariter, sed habent cum quibusdam naturis, ætatibus, aut sexibus sympathiam, hæc etiam effabilem aut ineffabilem. Et quoniam longè maior differentia est diuersorum animalium, quàm diuersarum ætatum hominis, hæc ineffabiles differentia faciunt, ut quædam pestes, hæc animalium genera inficiant, aut non inficiant, ut docet ipsemet Hippo. libello de flatibus. Dixi si magnæ sint affectiones, non ob putrescentias (putredo. n. aeris, siue magna sit siue parua, omnibus hominibus plus aut minus est noxia) sed ob intemperies, hæc enim si non sint magnæ, non pariunt morbos communes, sed illis hominibus proprios, cum quibus ea intemperies habet sympathiam. Velut siccato aere mulieres & humidi viri salubriter degunt, biliosi ægrotant, atque ita constat non omnes morbos qui ab aere procedunt esse communes, omnes autem communes esse ab aere. At qui quoniam ab aere nascuntur, cum insalubrem tempestatem narrat Hipp. totus in eo est, ut describat quo pacto fuerit affectus aer à ventis & pluuijs. His enim maxime afficitur, velut mox in ipso operis initio videre est. Ego concedente Deo, eam commentariorum rationem obseruabo, ut explicata narratione singulorum causas addam, tu interim memoria retine omnia quæ in hac præfatione à me dicta sunt.

FRANCISCI VALLESII
COVARREVBIANI.
IN SCHOLA COMPLVTENSI
PROFESSORIS PRIMARIJ,
ET PHILIPPI II. HISPANIARVM
REGIS ARCHIATRI.
COMMENTARIA,

In libros Hippocratis de morbis populariter vagantibus.

LIBER PRIMVS.

Sectio Prima, siue constitutio
temporis Prima.

IN *Thesa* Autumni tempore circa
Æquinoctium & sub pleiadas plu-
uiæ acciderunt multa, continua,
& molles, ut flante Austro esse so-
lent. Hyems Austrina fuit & raras habuit
ventos Aquilonares, qui magnam siccitatem
inducebant, ac in vniuersum Hyems veri
similis fuit. Ver autem Austrinum & fri-
gidum fuit, & paruas habuit pluuias.
Æstas magna ex parte nebulosa fuit & sine
pluuji: Etesia parum, tenuiter, & dispersim
spirauerunt.

CVM sint duo Æquinoctia, verum & autum-
nale, hic ex adiunctis satis constat autumnale
intelligere Hipp. cum dicas, autumnum tempore,
& circa Æquinoctium. Quod dicit & sub pleiadas,
haud dubie perinde est ac si diceret, usque ad oc-
casum (intellige verò Hippocr. ac proinde etiam
nos de cosmico ortu aut occasu signetur loqui)
pleiadum. Nam per pleiades indicatur sydas
quoddam locatum in tuto, quod oritur circa li-
nem Apulis, & occidit circa initium Nouembris.

A Nō potuit tamen tempestas illa multarum aquarum
continenter cadentium durare ab Æquino-
ctio autumnni usque ad ortum pleiadum, nam
hyems (quæ hoc tempore continetur) sine aquis
fuit. Ergo intelligit accidisse pluuias multas, con-
tinentes, & molles à principio Autumnni usque ad
occasum pleiadum. Id tempus est ferè duorum
mensium, Septembris, & Octobris. Hoc tempo-
re accidisse dicit pluuias multas. Intelligit verò
non confertas ac copiosas (tales enim vocare so-
let largas) sed numero multas, hoc est, sæpe ca-
dentes. Pluuias verò continētes, hoc est, non sæ-
pè intercasas, sed longiusculas. Dicit etiam mol-
les, & ut explicet quas vocat molles, addit, ut flante
Austro esse solent. Nimirum flante austro solēt
cadere pluuiæ quædam blandæ, sine frigore atq;
vilo rerum rigore, sed placidæ & sine impetu vi-
himenti aut strepitu, tales sunt molles pluuiæ.
Itaque duobus illis mensibus hoc modo pluebat.
Sed cur cum duos hos menses descripsisset, addi-
dit statim, hyems austrina: An intermisit mensera
vnum: videtur enim, siquidem autumnus, hyems,
ver, & æstas ternos habent menses, & quatuor his
temporibus æqualibus duodecim mensium an-
nus constat: prætermisit ergo Hipp. mensem No-
uembris, si hyems non incipit ante solstitium hye-
male, quod sit mensis Decembris exactus aliquot
diebus. Sed non prætermisit. Non enim Hipp. di-
uidit quatuor anni tempora ut Astrologi, qui tæ-
tionem habent Solstitiorum & Æquinoctiorum:

neq; ut grammatici, qui numerant menses: sed ut medicum decet, rationem habens mutationum, quæ in æris temperie contingunt, nimirum nobis tempus quod intelligitur frigidum & humidum esse solet, est hyems: quod calidum & siccum, æstas: quod temperatum, ver: quod inæqualiter calidum & frigidum atque siccum, Autumnus. Qui vis verò videat has differentias temperiei non respondere partitioni astronomice, aut grammaticæ. Nam mense Nouembris non minus friget ær quam mense Februarii, immo verò fortasse aliquantulum plius: neq; minus calet mense Maii quam Augusti, neque ergo per mensem Maii durat vernalis mediocritas, neque per Nouembrem autumnalis. Quare merito Hipp. adiungit mensem Nouembris hyemi: æstati verò Maium, facitq; ver & autumnum, mensem binorum: hyemem & æstatem, quaternorum. Incipit enim apud Hipp. autumnus ab exortu arcturi, finitur occasu pleiadum. Hinc incipit hyems, quæ durat vsq; ad æquinoctium vernum. Hinc incipiens durat ver vsque ad ortum Pleiadum. Hinc incipit æstas, cuius prima pars est vsque ad ortum Canis, qui Compluri fit 19. Iulij: secunda pars est ab hoc ortu vsq; ad ortum Arcturi. Hanc partitionem scripsit idem Hipp. lib. 3. de dieta dicens. Annus certe in quatuor partes diuidunt, quas omnes ferè nouerunt, hyemem, ver, æstatem, & autumnum. Et hyemem quidem, à pleiadum occasu vsque ad æquinoctium vernum: ver autem ab æquinoctio vsque ad pleiadum exortum: æstatem verò à pleiadum ortu vsque ad ortum arcturi: Autumnum ab arcturi ortu vsque ad pleiadum occasum. Eandem partitionem sequutus est Plinius, qui libro 18. c. 29. ita scripsit, ortus vergiliarum æstatem inchoat, & occasus hyemem. Ab ortu Caniculæ flant venti, qui vocantur Etesie, qui ut Arist. 2. meteororum c. 5. dicit, sunt aquilonares, flantes interdiu, cessantes noctu, quia generantur illis diebus exusta terrâ, & geminato calore Solis & Caniculæ. Cessant ergo noctu cessant vltione. Famigat verò illis diebus Septentrionalis plaga, quia illa retinet tunc quoque humorem, qui ad generandum fumum est satis. Etesie igitur hi venti sunt, & his diebus flant. Quamquam Plinius & plerique Astronomi à Prodromis vocatis diebus (sunt hi octo ante Canem) incipere dicunt. Mihi viderut hic Hipp. non aliter ac Aristot. intelligere nomine Etesiarum ventos flantes post Caniculæ ortum, quandoquidem magnam æstatis partem descripserat, antequam Etesiarum mentionem faceret. Sed redeo ad hyemem. Hyems, inquit, austrina fuit & ratos habuit ventos Aquilonares, qui magnam siccitatem inducebant. Et in vniuersum hyems veri similis fuit. Sed si austrina fuerit hyems, quo pacto flauerunt venti Aquilonares? aut quo pacto fuerunt æqui? aut si hi fuerunt, quo pacto fuit hyems tota veri similis? Certè non simul fuit hyems Austrina, & Aquilonaria: necque enim potuit sed diuersis temporibus. Narrat veto Hippocrates, rem velut est acta, prima hyemis pars eaque maxima fuit Austrina, extremo mense hyemis, Februario scilicet, flare coeperunt Aquilonem, non hi quidem magni, sed quia tota hyeme non pluerat, potuerunt facillè squalorem facere. Atqui si quis interroget, qualis fuerit extrema hyems, & Aquilonarem

A dicemus: si verò nullius partis mentione facta, quis iubeat respondere, qualis fuerit hyems, respondebimus, quod & Hipp. in vniuersum hyems hoc est tota simul hyems veri similis fuit; Scilicet eo anno hand fuerunt magna frigora. Ver dicit fuisse Austrinum & frigidum, additque, & pluias habuit paruas, rarum est Austrinum esse & frigidum. Quia flante hoc vento: solent remittere frigora, rarum quoque parum plere. Nam in tota Europa (est vero Thais in Europa) flante Austro solent esse frequentes pluiæ. Cæterum et si rarum sit, sic tamè accidit æstas magna ex parte fuit plena nubibus, tamen non concredebant in pluias. Etesie flauerunt parum & tenuiter, paucis scilicet diebus, & non vehementer. Flabant *Autumnus*. hoc est nunc hæc, nunc illæ. Vnde intelligo Hippocratem describere modò tempestatem, quæ fuit non in vrbe Thaso vocata, sed in tota insula, quæ etiam ita appellatur. Constitutio itaque huius anni hæc fuit, morbi verò qui sequuntur.

Cum autem vniuersa hac constitutio ad Austrina vergeret, sed cum siccitatibus, ante ver quidem, quod prior constitutio subcontraria & Borealis fuerit, paucis acciderunt febres ardentes, eaque omnino blanda & mitis, & paucis fluxus sanguinis à naribus accidit, neque ex his moriebantur. Multis autem circa autem tumores in alteram partem vergentes contingebant, & in vtramque plurimis sine febre erecti ambulantes, quibusdam etiam parum incallescant, sed omnibus sine noxa extincti sunt, neque cuiquam ad supurationem perueniunt, velut qui ex aliis causis ortum ducunt. Illi autem erant naturæ laxi, magni, diffusi, inflammationis & doloris expertes omnibus sine vlla significatione euascebant. Accidebant autem hæc adolescentibus, iuuenibus, atate florentibus. & horum plurimis qui in palastrâ & gymnasiis exercebantur, mulieribus verò paucis contingebant. Multis tussis sicca accidebant, quibus nihil expectorabatur, nec multo post voces raucescebant. Quibusdam autem post aliquod tempus inflammationes cum dolore in aliterum testiculum vergebant, quibusdam etiam in vtrumque. Quibusdam febres aderant, quibusdam non. Plurimis hac molesta fuerunt, in cæteris verò quæ ad Medicum opificium spectant, sine morbo debebant.

Cum inceperet æris temperiem à principio autumnum describere, morbos tamen à principio veris incipit, eius scilicet veris, quod primum post illum autumnum secutum est. Atque cum descriptione temporis vsque ad æstatis finem perduxerit, morborum narrationem vsque ad sequentem perducit hyemem. Merito quidem: nam verisimile est, neque mox tum imperie æris incipere graues ob eam morbos (sed tanto tempore post, quantum ad permittenda corpora sit satis) neque mox ac tem-

peries aeris cessat, morbos ex ea natos extinguī, sed tantū plus durare quāto opus est ut coepta corrigan- tur. Cū ergo (inquit) vniuersa hæc constitutio ad Austrina vergeret, sed cum siccita- tibus, id est, cū toto hoc anno flaret auster, & non plueret. Dicitur verū vtrumque toto anno ac- cidisse, quia vtrumque vix quadam anni particula defuit: nimirum autumnī duobus mensibus solum pluit, & vnicō mense hyemis flauit Boreas. Atqui ob huius particulæ hyemis siccitatem, dicit apparen- te iam vere quibusdam, haud multis acci- disse febres ardentes. Sunt hæc biliosæ febres in genere tertianarum non intermittentiū, has dicit fuisse blandas & mites, hoc est, non mali moris, neque inopinatum quicquam medico afflicentes. Paucis accidisse fluxiones sanguinis, quamquam multis per id febrium genus soleat fluere de naribus, sanguine in superna ob calorem raptō: denique fuisse salutes: neque ex his hominibus interijisse. Aliis procedente vere circa alteram aut circa vtramque autem facta dicit *em- pta*, tales enim sūt tumores laxi, magni, diffusi, in- flammationis & doloris expertes multos vero non decubuisse ob hæc ædemata, sed erectos obambu- lasse; quosdam verō parum febricitasse: omnibus dicit extinctos tumores esse sine alia noxa: neque enim suppurasse, ut tumores qui ex aliis causis he- risolent (inflammationes scilicet quæ ex sanguine generantur, aut ædemata quæ ex alia crassiori pi- ruita, aut etiam nonnunquam scirchi, qui ex me- lancholico sanguine) sed euasisse insensibili res- olutione. Hæc ait accidisse vitis & agentibus æta- tes calidas, & exercitatis, mulieribus verō paucis, aut frigidas ætates agentibus, aut degeneribus in otio. Aliis etiam multis hoc ipso tempore dicit ac- cidisse rufes siccas, quas vocet tufes siccas expli- cans, addit quibus nihil expectorabatur, & non multo postquam tussi corripiebantur, voces illis raucedebat. quibusdam verō horum ipsorum etiā post quoddam tempus, postquam tussi labora- fent, accidebant inflammationes cum dolore (ve- re scilicet inflammationes) in alterum aut vtrum- que testiculum, quibusdam cum febre, quibusdam sine illa. Plurimis quidem (inquit) hæc inflamma- tiones laboriosæ erant dum durabant. Nimirum dolebant vehementer, in cæteris verō *ætiæ*, hoc est non indigebant manu chirurgica, quia sol- uebantur sine vitione aut sectione, deniq; omnino sine ferro & igne. Hæc dicit æta toto vere Causas horum omnium mox dicemus. Tumoris testicu- lorum ex rufis causam esse in sympathia vocalium cum genitalibus, sectione 1. lib. 2. dicit ipse met.

A Nequam autem æstas inciperet, & per æ- statem & per hyemē, multi eorum qui iam à longo tempore aliquantulum corrumpébantur, tabidi decubuerunt, quinetiam multis ambigū se habentibus tabes tunc confirmata est. Nonnullis autē primū inceptis, quibus natu- ra in tabem vergebat, moriebatur autem ex his multi, imò plurimi, neq; scio an quis ex decum- bentibus vel modico tempore superfuert. Cele- rius autem moriebantur quā in ista transigi so- lent, Alia enim & diuturniora & cuncta febr-

A bus coniuncta facile tolerabant, nec moriebā- tur, de quibus postea scribetur. Solus enim & maximus morborum qui tunc grassati sunt, multos peremit tabes. Horum autem plurimis tales erant affectus, febres horridæ, continuæ, acutæ, omnino quidem non intermittentes, fi- guram autem semitertiana obtinebant, vno quidem die leniores, altero autem insuper in- gravescentes, & semper acutius incrementum capientes. Sudores autem continui, sed non per- totum corpus, multæ extremorum refrigeratio, quæ vix recalescebant, alui turbata biliosa, pauca, sincera, tenuia, mordacitæ deieciabant, & frequenter assurgebant. Vrina autem erant tenues, & cruda, & decolores, & pauca aut crassitudinem habentes & paruum subsiden- tiam, nec probè consistentes, sed cruda quadam & intempestina subsidentia. Tussiebant au- tem exigua, densa, concocta parum ac vix excreantes. Quibus verō violentissima contin- gebant, his ne vel parua concoctio adfuit, sed perpetuè cruda exuebant. Plurimis verō he- rum fauces ab initio & vsque ad finem rubra- rum inflammatione dolebant. fluxiones pa- rua, tenues, acres accidebant; celeriter consu- mebantur, & malè se habebant, omnium ci- borum fastidio vsque ad finem tenebantur, nec sivebant, & prope mortem multi delirabant. In tabificis ergo affectibus hæc contigerunt.

D Si modò morbos totius ætatis & autumnī & hyemis sermone complectitur, quō pacto paulò post facit transgressionem ad morbos autumnī, quasi de solis morbis ætatis dixerit: sin minus cur- dit modo, antequam æstas inciperet, & per æ- statem, & per hyemem? certè nunc dicere incipit de morbis, qui in fine veris inceperunt, & vsque ad vltimam ætatis partem durauerunt; sed quia ut procedente sermone patere poterit, fuerunt illo anno duplices tabes, & extinctis his qui in prima ætate sunt facti tabidi, subcreuerunt al- iæ tabes minus lethales, quorum multe per hye- mem totam produciuntur. De tabidis incipiens dicere, dixit per æstatem, & ad hyemem multi ta- bidi sunt facti. Atqui, quia alij morbi præter tabes subcreuerunt sedecente iam ætate, finito sermo- ne de prima determinaque tabe, ad morbos vlti- mæ ætatis & autumnī & hyemis transgressus est. Ergo inquit multos eorum qui nondum decu- buerant, sed superiori tempore corrupti erant; hoc est in thoracibus corruptionem cœperant contrahere, ex distillatione (hi erant tussiculosi) tunc cum tabe decubuisse: atque his qui ambigū habebant, hoc est, quorum tabes latebat adhuc (nam semper tussicula illa diutius durante quæ- dam tabis suspitio est, si simul videantur præter rationem extenuati) tunc primū apparuit ma- nifestè. Quibusdam etiam dicit inceptis primū, hoc est prius, cum scilicet aliis cepit rufus ince- pisse quibusdam spernam tabem, bus scilicet quo- rum natura vergebat ad tabem. Tales vocantur

hominibus quibus thorax est angustus, & spatalz e-
minentes alarum modo, & caput fluxionibus op-
portunum. Ex his facile constat, non esse proban-
dam Gal. sententiam qui putat, verba) hanc quibus-
dam primum incipit, his natura vergebat ad ta-
bem (inter posita esse errore librarij, nec genuina
Hippocratis. Non enim dicitur (vt ille intelligit).
eos quibus natura vergebat ad tabem nunc pri-
mum cepisse tabescere, ante nunquam laesos, sed
vt ego explicui, cepisse primum tabescere, cum
alij rursi solium corripenterur. Citasse etiam Ga-
lenum hanc verba falso in commentariis Aphorif.
corripisseque alio loco indicauit. Sed redeo ad
Hipp. Ex plicans quam periculosa fuerit hac tabes
dicit, moriebantur citius quam solent hac transi-
gi. Hoc est, citius etiam moriebantur quam ex ta-
be mori solent homines. Nimirum ex tabe paucis-
sima euadunt, sed tamen egrotant longiusculè an-
tequam moriantur. Cum enim tabes non succe-
dit morbo acuto, sed à principio fit, vel ex carar-
rho, solet durare que breuissima est, annum in-
tegram. Nam aliam dicit implere Hippo. lib. de in-
ternis affectionibus, que tres annos durat, aliam
quæ etiam nouem. Verum hac res species tabis
sunt, quæ non sunt ex morbo acuto: quæ ex mor-
bo acuto fit, vt ex peripneumonia, pleuritide, aut
inflammatione visceris cuiusvis, quum longissimè,
interimere solet intra quatuor menses. Hæc verò quæ
hac tempestate acciderunt, etiam citius intereme-
runt. Nam inclinante vere cæperant, & plerique
ante æstatem mediam mortui sunt. Quod tempus vix
duorum mensium est. Itaq; dicit, ex multis morbis
qui tunc fiebant, solam tabem multos homines
interemisse, hosq; citius solito. Nam alios (inquit)
morbos & diuturniores, & cum febribus coniu-
ctos, de quibus scribetur statim, melius ferebant,
& euadebant. Sed dubitare coninget hoc loco,
cur dicat Hippoc. morbos, de quibus mox scribe-
tur, fuisse diuturniores, & cum febribus coniu-
ctos, quasi tabes breuior sit quam febres, quarum
longissimæ vix per alteram anni partem protrahæ
sunt: atque quasi tabes hæc sine febre fuerit, quæ
non tantum habuit hediticam, vt aliqui solet, sed
etiam semitertianas, vt mox dicit. Verum intelligi
debet, non simpliciter illos morbos longiores fuisse
tabe, quæ vt paulo ante diximus annum integrum
durare solet quum est breuissima, sed durasse illos
morbos diutius, quam tabes quæ hac tempestate,
grassata est, quia tabidi interierunt citius. Illos
morbos etiam dicit fuisse coniunctos cum febre-
bus, quia multisimè erant febres morbi, aut ex
febris fiebant; tabes verò non ex febre fit sed
eam potius facit, aut cum ea complicata est,
velut hæc tabes cum semitertiana. Erant (inquit)
plurimis horum tales affectus, febres horridæ,
continuae, acutæ, omnino non intermittentes. Ob-
tinebant autem figuram semitertianæ, vna quidem
die leuior, altera autem insuper ingrauescentes.
Mentio quidem huiusmodi sunt febres semitertia-
næ, quia cum ex quotidiana, & tertiana compo-
sitæ sint, altera die habent duas exacerbationes. Gal.
ex hoc loco colligit, non dictam fuisse ab antiquis
semitertianam quamcumque ex quotidiana & ter-
tiana compositam, sed eam solam quæ continua, &
acuta, & horrida sit, eam verò ex quotidiana con-
tinua, & intermittente tertiana constare. Ego ve-

ro nihil moror, si quis velit dicere, quatuor esse
semitertianarum species, continuas tres, quum scilicet
continua est vtraque aut altera; vnam inter-
mittentem, quum vtraque est intermittens. Hip-
pocrates enim non intendit definire quæ sint se-
mitertianæ febres, neque hic erat locus, sed refert
quales semitertianæ illa tempestate cum tabe con-
iunctæ fuerint. Ego nihil minus volo, quam extor-
quere ab authoribus plusquam illi dicere voluit.
Reliqua in tota narratione sunt parum obscura. In
vris vocat subdientiam intemperatiam, eam quæ
fit antequam coctus sit succus, velut in picuiti-
sis morbis accidere solet. Solet enim fieri ex succo
crudo, morbo etiam incipiente, quiddam bonæ
subdientie simile, quod aded simile esse solet,
adeoque incautus medicis imponere, vt apposuit
Hippoc. consideret, non solum an candida & læ-
uis sit, sed etiam an tempestiua. Hoc enim signo
appertissimè distinguitur cruda à bona subdientia.
Cum enim ex aliorum omnium signorum con-
cursu constet morbum in principio esse, constat
non esse subdientiam bene concoctam. Sputa
dicit fuisse cocta parum, crassa, & densa. Ego in-
telligo dici cocta parum, non quod cocta verè
sint, ne tantillum, sed quod coctis hæcenus simi-
lia, quod crassa. Verum eam crassitiem vitione
non coctione comparatam esse satis constat, liqui-
dè sputa sunt illa rotunda, de quibus in prognosti-
co scriptum est, & quæ Hippoc. ipse 6. epid. dicit
delirium prænunciare. Fauces vix partes oris in-
ter gulam & laryngem, erant multis illorum, vt
ex descriptione patet, inflammatione Erysipelato-
de affectæ.

Ad æstatem verò & Autumnum febres mul-
tae, continuæ, non vehementes acciderunt,
diu autem egrotantes detinuerunt, qui in cæte-
ris molestè sese non habebant. Alii plurimis
admodum placidè conturbati sunt, nec quic-
quam effatu dignum læserunt. Primum plurimis
quidem probè colorata & pura, sed tennes erant,
& tandem circa iudicationem concocta. Non
valde iussiebant, nec molestè extussiebant, nec
cibos fastidiebant, qui etiam offerre omnino li-
cebat. In summa quidem subagrotabant tabi-
di non tabido modo, in febribus horrorem in-
contentibus parum sudabant. Quidam alias
paroxysmis erraticè corripiebantur, nec febres
omnino desinebant, sed in tertiana modum
exacerbabantur. Hi autem quibus breuissimi
erant morbi circa vigesimam diem indicaban-
tur, plurimi circa quadagesimam, multi
autem circa octogesimam. Quibusdam autem
non hoc modo, sed erraticè & sine iudicatione
desierant. Horum autem plurimis febres quæ
non per multum tempus desierant, rursus re-
uersebantur, ex recidiu verò in isdem peri-
odis indicabantur, multis autem eorum aded
producebantur, vt sub hñemem agrotarent. Ex
omnibus autem qui in hac constitutione sub-

dicere in Thaso, quasi de nota provincia ad notos suos & conterraneos diceret; velut ego modo factis putarem dictum Compluti, si quid huiusmodi narrare vellem. Est verò Thasus versus meridiem, Thraciæ vicinæ, maritima, ac proinde temperata, paulò fortasse calidior. De anni temporibus ita scriptum est in aphorismis. Vere sunt infantes, & melancholici, & morbi comitiales, sanguinis fluxiones, & anginae, & grauedines, & raucedines, & lepræ, & tussis, & impetigines, & vitiliginis & pustulae ulceroſe plurimæ, & tubercula, & articulares morbi. Aestate autem aliqui eorum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, vomitiones, alui profuſiua, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines, & sudamina accidunt. Autumno verò multi æſtivi morbi, & febres quartanæ, & erraticæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & vrinæ stillicidia, leuitates, & difficultates intestinorum, coarctationes, anginae, & asthma, ilei, morbi comitiales, furores, & melancholici. Hyeme autem pleuritides, pulmonis inflammationes, lethargi, grauedines, raucedines, tussis, dolores pectoris, laterum, lumborum, & capitis, vertigines, & apoplexie. De pſtuis, & siccitatibus eodem lib. scriptum est. Ex anni constitutionibus in summa siccitates imbricis sunt salubiores, & minùs letales. Morbi per æſtivos imbres magna ex parte fiunt, febres longæ, alui deiectiones, putredines, epilepsie, apoplexie, & anginae: per siccitates autem tabes, lippitudines, articularum dolores, stillicidia vrinæ, & dysenterie. De flatibus libellus quidam nomine Hipp. circumfertur, quem ad hanc doctrinam perlegere non erit inutile. Sed & in aphorismis optimè est scriptum de morbis quos status parit. Austri, inquit, auditum hebetant, caliginem inducunt, caput grauant, pigros & languidos reddunt, cum illi præualuerint, huiusmodi in morbis patiuntur: si autem borealis tempeſtas fuerit, tussis, faucium morbi, ventres duri, difficultates vrinæ, horrores, dolores laterum, & pectoris, cum hæc præualuerint, huiusmodi in morbis expectare oportet. Hæc sunt quæ singulis causis per se succedere nata sunt. Vt hæc componuntur variè, ita variè morborum complicationes accidunt. Cum annus est tæpeſtiuus, hoc est, cum suo quidque tempore sit, nulli morbi populares & cõmunes sunt, sed sparsi, ique non multi neque graues, & sunt in eorum genere, qui cuique temporis sunt familiæres. Sed quum est intempeſtiuus, vt euariar à tempeſtiuo, ita à salubri, atque si in idem genus intemperiei roms annus euariar, communes & illi intemperiei analogi sũt, velut si totus Austrius, aut totus Borealis, totus pluuiosus, aut sine pluuiis: si verò inqualiter euariet à tempeſtiuo, variè etiam afficiuntur corpora. Velut in hac tempeſtate, cum plerique laborent ob Austrum parotidibus, & tussis, & deinde tabe, nonnulli ob Aquilonem febribus ardentibus laborauerunt, quia magna ex parte annus fuit Austrius, tamen quedam etiam pars anni fuit Borealis. Rursum hic animaduertendum est, cum res variè dispoſitæ ab eadem causa efficiantur afficiuntur, si causa quæ facit est vebemens, omnes eodem modo affici, si est debilis, afficiuntur variè, vt quævis earum pari nata est. Quia quod sit semper, refert naturæ causæ efficientis & ma-

teriz, illius verò magis quod magis præualeat. Cum ergo æris corruptio magna est, omnes ferè homines, vtcumque sint variè parati, ad idem morbi genus trahit: cum exigua, facit quidem eos ægrotare, morbi verò nō ad eò retinent vnam speciem, sed cuiusque hominis victum aut apparatus referunt, plus aut minùs, vt maior aut minor causa est. Hinc fit vt morbi communes semper incipiant à sparsis, & in sparsos finiantur. Nimirum causa omnis magna incipit à parua, & parua rursus fit, quum finitur. Verum neque hi sparsi qui communes antecedunt, ad eò varij sunt, ac alij sparsi solent, sed habent semper aliquid commune: neque communes sunt ad eò iidem, vt non habeant quendam symptomata diuersa. Quia vtrique fiunt ab eadem causa, & vtrique in variè affectis hominibus. Rursum cuiusque temporis morbi non tam ob præsentem æris constitutionem fiunt, quàm ob antecedentis temporis: quia non statim ac ær à tempeſtiuà mediocritate euariar, corpora ægrotant, sed quum per aliquas moras malè affecta sunt. Neque verò æris quævis temperies extrema, sequenti tempore morbos affert, sed quæ à sequenti non emendatur. Nam aliter semper effet tempus insalubre. Quia hyeme semper est magnum frigus, & æstate magnus calor, sed corrigunt sese mutuis vicissitudinibus. Cum ergo sequens tempus non corrigi intemperiem antecedentis, semper fiunt morbi referentes intemperiem vtriusque, antecedentis verò magis. His semel intellectis, facillè intelligemus causas eorum, quæ præſenti tempeſtate contingunt, & quæcumque aliâ contingere possunt. Toto autumno & tota hyeme nulli insignes morbi acciderunt, corporibus nondum manifestè affectis. Apparente iam vere febres ardentes factæ sunt ob antecedentem tempeſtatem, quæ flauerunt Aquilonares venti, qui siccitatem & squalorem inferentes succos biliosos mouerunt. At dicet, exigua certè causa fuit breuis tempeſtas Borealis post longam Australem. Atqui proinde paucis, ique biliosis factæ sunt, neque malignæ, neque magnæ, sed boti status, & per quas sanguis non fluebat de naribus, vt solet per febres huiusmodi, quia non erat tanta vehementia caloris, qui sanguinem funderet per superiora. Sed neque biliosis factæ hoc tempore hac occasione essent febres ardentes, si hyems fuisset qualis consuevit frigida & pluuiosa, vt congestam alioqui bilem cohibere posset; tamen quia æstate congesta fuerat in biliosis multa bilis, vt solet, & cum hyems non extingueret, sed retinebatur in corporibus, mediocri illa hyemis temperie tantisper cohibita, quod tempeſtas vel modicè in fociorem mutaretur, biliosis ergo hæc euenerunt. Hoc ipso tempore pituitosis acciderunt œdemata post aures & tussis: sanguineis, inflammationes in testiculis, sed omnia hæc fuerunt leuia, nimirum nondum causa erat magna, proinde neque magna, neque valde communia mala faciebat, sed varia in variis corporibus. œdemata verò erant laxa & flatuosa, quia hyems neque multam, neque crassam pituitam fecerat, & capita multis flatibus Austriis repleuerat, proinde fiebant minimè apta supurationi, vt alia œdemata, sed resolutioni insensibili. Sed quæcumque varia sparsaque erant hæc mala, habebant quiddam quo communia

causam iam referabant. Causa enim quæ maxime affecit illo anno fuit Austus, proinde membra illa male affecta sunt, quæ maxime flatibus implentur semper, caput scilicet & thorax & genitalia. Caput enim & thorax in respiratione semper implentur aëre, genitalia sunt fistulosa & spirituosæ, inflammanturque facile. Quoniam ergo flatibus erant admixta quæ tunc temporis abundabant extremitatibus, in hæc membra decubuerunt. Facit verò Austus maiores repletiones spirituosas quam Aquilo, quia crassus est, & non permeat violentius per corpora, sed immotatur. Itaque illa tempestate pituita fuit neque multa neque crassa, sed quia hyems calida fuit & Austrina, fuit falsa. Tenuis ergo & falsa distillare cepit in pulmonem; tamen quia tenuis erat, non effuscebatur: nam crassitie quadam indigent ea quæ sunt tussi excreanda. Cum hæc fierent, & tempestas Austrina adhuc duraret, certè duratione ingrauescebat causa, ac proinde etiam morbi, visque adeo ut inciperent iam æstas, & quia austus durabat (quo flante omnia solent putrescere) & calor æstatis accedebat, & corpora iam incipiebant corrumpi, fluxione illabente in pulmonem, multis eorum qui tussiculosi fuerant, tunc pulmone aperte putrescente, tabes confirmata est; quæ quidem paratis ad tabem prius etiam fuerat confirmata: atqui etiam tunc saltem Austrini flatu cessassent, magne fuissent tabes: at: verò quæ potuissent iustum ac consuetum tempus expectare: cum durauit tota æstate copiosa caligo, & multus Austus: proinde adeo lethales fuerunt, ut omnes ferè tollerent, adeoque citissime, ut antequam ætas inclinaret interierint: fuisse verò adeo perniciosas tabes, ex his quæ coniungebantur, accedebantque illis, facile intelliges.

Sectio secunda, siue constitutio temporis. II.

IN Thaso ante Autumnum hyemes intempestiva, sed repente cum Borealibus & Austrinis multis humida proruperunt. Talia autem accidebant usque ad Pleiadum occasum & sub Pleiadas: hyems autem Borealis, aqua multa, vehementes, magna, nives, quibus ut plurimum serenitates admiscebantur. Hæc quidem omnia accidebant, frigora autem non admodum intempestiva. Iam verò post brumale Solstitium, & quum Zephyrus flare incipit, postrema bruma frigora fuerunt magna, Aquilones multi, nives & pluuia continenter multa, & calum procellosum & nubilosum. Hæc autem perseverauerunt, nec usque ad Equinoctium remisserunt. Ver autem frigidum, Boreale, pluviosum, nubilosum, æstas non admodum æstusans fuit. Etesia continenter spirauerunt; mox autem circa Arcturum flante Borea pluuia rursus multa acciderunt.

A Multa sunt in superiori sectione dicta, ad omnia quæ toto hoc opere continetur necessaria, quæ semel dicta esse ad expeditam facilemque eorum quæ sequuntur enarrationem, multum refert. Quæ proinde memoria semper tenere oportet. Talia sunt quæ de quatuor temporibus anni, & de eorum nominibus dicta sunt, scriptumque est non esse medicis quatuor anni partes æquales, sed autumnum incipere ab ortu Arcturi, finiri occasu Pleiadum, hincque incipere hyemem, durareque usque ad Equinoctium vernalium, ver ab hoc Equinoctio usque ad ortum vergiliarum, ab harum ortu æstatem esse usque ad autumnum: ac hyemem & æstatem longiores anni partes esse, & in alias diuidi: Talia itaque & quæ de morborum vulgarium speciebus, communibus inquam & sparsis, & de morbis enique temporibus familiaribus dicta sunt, scriptumque est communes à sparsis solere incipere & in sparsos finiri, & in tempestate tris precipue consideranda venire, ac frigida sit vel calida; an pluat aut non; an venti perflant vel non: hæc quæ cum eo quod temporibus solet esse tempestivum conferenda esse, ut constet an tempestiva sint, an intempestiva: Et ex notitia morborum qui ex quacunque causa per se fieri nati sunt, facile constare posse, quales exoriri debeant ex quacunque constitutione, quæ quouis anno contigerit. Hæc inquam semel nobis dicta sint. Nomen hyemis (eodem ratio est veris & æstatis & autumnus) nunc dicitur de tempore quo frigus solet vigere, hoc est. ut diximus à Pleiadis ad Equinoctium: nunc de tempore frigido, quodennque contingat esse hyemi simile: in initio huius dictionis nomen illud *ἡμερῶν* significat frigora magna: Vbi dicitur, *ἡμερῶν ἡ σίμω*, & rursus *ἡμερῶν ἡ σίμω*, significatur statum illud certum tempus hyemis. Frigora verò illa autumnum non acciderunt tempestiva, quia multò antequam consuetum est, sed repente, quia mox post æstivum calorem superioris anni. Ea frigora dicit fuisse humida, hoc est cum pluvius, Boreæ & Austro flante, alternatè scilicet. Ea durarunt usque ad occasum Pleiadum & sub Pleiadas, hoc est ipsi diebus Pleiadum, velut in aphorismo dixit, *ἡμερῶν ἡ σίμω* hoc est in diebus caniculae. Constat verò illud & *ἡμερῶν ἡ σίμω* esse declaratum: nam quid aliud est dictum, durarunt ab initio autumnus usque ad occasum Pleiadum, quam sub Pleiadas? Non enim posse illud, sub, idem significare, ac si diceretur, post Pleiadas, ut forte quispiam posset suspicari, sequentia verba declarant, nam addit, hyems autem borealis, quasi narratio ad occasum Pleiadum solum pervenerit. Hyeme dicit fuisse Boream, pluvias multas, largas & magnas, multas scilicet numero, largas, id est, copiosas & assatim ac largis imbribus cadentes, magnas verò tempore longas, scilicet non trium duarumve horarum. Has dicit fuisse non pluvias solum, sed admixtis niuib. Plerumque dicit admixtis serenitatibus. Quod qua ratione fieri possit per pluvias multas largas & magnas, fortasse dubitabit aliquis. Sed hic nihil aliud significatur, quam inter pluviam tempus consuevisse esse serenam, non nubilosam. Velut post brumale Solis conversionem, quæ à solstitio sit, fuisse mox dicit. Frigora dicit prima hyeme non fuisse admodum intempestiva. Ni-

infirmum et si frigora essent magna, non erant tamen à naturæ repositis aliena. Videtur ergo prima hyems à sua temperie, humiditate magis & ventis quàm frigore recessisse, autumnus verò frigoremagis. Vbi dicit post brumale conuersionem & quàm Zephyrus flare incipit, legunt quidam, incipit, intelligentes nimirum Zephyrum perfrasse illa tempestate: quod constat repugnare ipsi, quæ mox sequuntur, hyemis postremæ frigora magna, Aquilones multi, & nives. Nimirum illud, *ante hyemem* non significat hyemem maiorem tempore. Nam cum sit tempus constitutum vsque ad Æquinoctium, non potest esse maior minorve, sed significat hyemem ultimam fuisse magnam hyemem, hoc est valde frigidam. Tamen si Zephyrus flauerit, verisimile est frigora remississe. Placida enim tempora esse solent flante hoc vento. Est verò hic qui flat ab occidentē. Deinde si hic flare ab eo tempore cœpisset, non fuisset multi Aquilones eo tempore: sed revera Hippoc. non dicit flare cœpisse Zephyrū: sed quasi describens quod tempus diceret, dixit post hyemalem conuersionem, & addidit tunc quā Zephyrus flare incipere solet. Nimirum ut narrat Plinius, Zephyrus nominatus ver inchoat, aperitque terras. Scimus tamen ver inchoari, & terras aperiri, incipereque herbas proferte vltima hyemis parte. Nimirum hyems habet partes tres, prima est tempus mittendi semina, ab occasu Pleiadum vsq; ad Solstitium: secunda est tempus, quod vocatur Solstitium, sunt duo menses mediæ hyemis, December & Ianuarius: vltima est tempus inferendi vocatum à Græcis, mensis scilicet Februarii, & initium Martij vsq; ad Æquinoctium. Hoc tēpore inchoat ver, aperitque terte, inferuntur arborēs, flat Zephyrus. Hipp. ergo nunc, quasi diceret tota reliqua hyeme post Solstitium, non tantum tempore sub solstitio, sed vltima etiam parte hyemis, dixit, post Solstitiū, & tunc quum Zephyrus flare incipit, vltimæ hyemis frigora fuisse magna. Nimirum hinc nomine vltimæ hyemis intelligit duas vltimas partes. Quod ut rursum explicaret, addidit, hæc perseverauerunt, nec remiserunt vsque ad Æquinoctiū. Pluvias hæc vltima hyeme dicit fuisse non minùs quam primā multas continenter. Videbimur autē non posse fieri, vt essent multæ, & continenter fierent. Nam *hæc* hoc est, continenter Græcis auctoribus significare solet, quod citra intermissionem sit. Si verò pluviae non intermittebant, non multæ, sed vna aut saltem pauca erant. Verum significatur fuisse multas pluvias toto illo tempore, non citra intermissionem pluiendi, sed citra intermissionem repetendi: velut solemus dicere laborasse hominem febre tertiana totum mensem continenter. Ver quoque dicit factum simile vltimæ hyemis: statem primam minùs videntem quàm solet, secundā estate cōtinenter spiravisse Etesias, quod ad attemperandum calorem non parum faciebat, atque adeo vltimis iam diebus æstatis prope Arcturum, superuenisse Aquilonē cum multis pluvijs, Etesias enim esse status quoddam Boreales diximus antea, hoc est Boreæ proximos, non ipsū boream. Sed de Etesias antea dictum est satis.

Cum autē totus annus esset humidus & frigidus & Borealis, per hyemem quidem salubriter sese habuerunt ut plurimum. Ante ver autem multū imò plarig; morbis tentabantur. Inciperunt ergo primū ophthalmia cum fluxione, & dolore, humida, cruda, leme parva, & multis difficulter erumpentes, quæ plurimis reuertebantur, & tardius ad Autumnam desierunt. Iam autem per Æstatem & Autumnam grassabantur dysenteria, & senesmi, & lienteria, & diarrhæa biliosa ex tenuibus, multis, crudis, & mordacibus, quibusdam etiam aqueose contingebant: multis etiam circumfluxiones adueniebant cum dolore biliosa, aquosa, ramentosa, purulenta, urinae stillicidium inducentes, non ex renum affectu, sed quod isti alia aliorum vicem supplerent. Vomitus aderant biliosi, pituitosi, & ciborum crudorum reiectiones, sudores omnibus, undique multa redundabat humiditas. Multis autem hæc contingebant qui febris expertes ambulabant, multis etiam febricitantibus, de quibus scribitur: in quibus autem omnia quæ descripta sunt apparebant cum dolore, tabidi euadebant ad Autumnam iam & sub hyemem. Febres continuæ aderant & pauci eorum ardentes, diurna, nocturna, semitertiane, exquisitæ, quartana, erraticæ. Singula autem descriptarum febrium multis contingebant, ardē: verò & paucissimi oborta sunt, atque hi ex agrotantibus minimè laborarant: neque enim sanguis à naribus erupit, nisi paucis admodum & paucis, neque delirauerunt, aliæque omnia tolerabilia erant. Indicabantur autem eorum plurimis febris ardens bene constituto admodum ordine cum intermittentibus in septem diebus. Neque mortuum esse quemquam noni ex febre ardente, neque phreniticam factum esse. Tertianæ verò plures erant & magis laboriosa quàm febres ardentes, & bene composito ordine in his omnibus à prima accessione quatuor habebant periodos, in septem verò perfectæ indicabantur, neque horum cuiquā reuertebantur. Quartanæ autem multis ab initio ex ordine quartanæ inciperunt, quibusdam verò non paucis ex alijs febribus & morbis secessus in quartanas facti sunt, longæ autem prout hæc solent, quinetiam longiores accidebant. Quotidianæ verò & nocturnæ & errantes multa multis & longo tempore perseverarunt, tum erectis, tum decumbentibus, horum plurimos sub Pleiadis & vsque ad hyemem febres comitabantur.

Mensis quidem per autumnum & hyemem salubriter degerunt, quia nondum intemperies

affecerat adeo corpora, ut morbis corriperebantur. Non enim putandum est, statim ac tempestas aliqua incipit intempestiva, morbos multos accideri, sed in posteriore aliquam tempestatem incipere, maxime quum tempestas alicui contrariæ succedit. Tunc enim multo tardius in contrariam affectionem corpora transferuntur. Velut in hac narratione dicitur autumnus frigidus & humidus successisse æstati, quam certum est siccam & calidam fuisse. Cùm enim annus intempestivus esse cepit ab autumno, superior æstas fuit qualis esse solet. Igitur bona pars autumnus & hyemis emendandis corporibus insumpsa est, manifestè autem læta non fuerunt usque ad finem hyemis, ab eo tempore toto reliquo anno ægrotaverunt. Atque morbi quidem nulla anni parte videntur fuisse omnino cõmunes, sed sparsi, tamen quia ex communi causa, putà ætris intemperie nati sunt, semper habuerunt quiddam commune: atque, quia unica illa causa quædam faciebat per se, quædam ex accidenti, adimplebat vires multarum causarum. Quo factum est, ut illo saltem anno omnino sparsi morbi in communem aliquem non migraverint. Laborabat omni fluxionum genere, in oculos quidem, alij in intestina, in urinae vias alij, aut in ventriculam: alij sudabant, redundante multo succo in omnibus, neque quidem eodem succo in omnibus, sed vario in variis, quoniam hominum congerente multum eius qui naturaliter in se congeritur. Quia frigus ætris retinuit naturale effluum in quocumque. Quare frigus replet frigidus frigidis succis per se, & calidos calidis per accidens. Humiditas ætris replet quidem per se a quibus succis, tamen ex accidenti biliosos etiam succos facit redundare in ijs qui aliqui sunt biliosi, diluta & effusa bile, ut scilicet aquæ potu solent biliosiores reddi. Igitur cùm illo anno multus variusque succus in hominibus abundaret, merito factum est, ut remittente nonnihil frigore (remisit enim nonnihil, etsi ver quoque frigidum fuerit) & humiditate nimium iam perscuerante, succus regurgitauerit effusus, his in hanc, illis in illam, ut cuique erat debilis hæc aut illa particula. Semper enim in redundancia succorum, partes debiles excipiunt excrementa. Quamquam peculiaris quadam & propria ratione, illo anno oculi, & venter supernus, & infernus, & vesica laboraverunt. Omnes enim has partes promptè lædi à Borea & frigore, idem auctor tertio aphorismo docuit. Frigore ergo simul lædente has membranas, & cohibente effluum naturale, & Borea mordente oculos, factum est ut in hos morbos homines disponentur. Neque tamen omnes in omnes, sed in quem cuiusque magis natura inclinabat, quemque ætris temperies nata erat facere. Factæ itaque sunt multæ ophthalmiæ, id est membranarum oculi & palpebrarum inflammationes, non quidem aridæ, ut siccis, & tunc boralibus temporibus solent, sed cum fluxione humidæ, quia multæ pluvie fuerunt: cum dolore, ob fluxionis copiam, & acrem aliquam aut salis qualitatem, quam Borea pepererat, præterquam quod ipse per se oculos mordebat. Erant etiam cruda: hoc est soluta difficilis, coqui enim motum apud Hippoc. idem est quod solui. Ergo cocta difficilis aut crudi sunt qui nulla ratione

A soluuntur faciliè, velut hæc ophthalmiæ, quæ non cedebant resolutioni, quia cohibebat frigus cunctum densans, hanc ipsam ob causam lemè erant parvæ, vix erumpentes. Quam ipsam ob causam multis cùm viderentur soluta, revertebantur (hoc enim soluta difficilibus plerumque accidit) & desierunt tardius, ad autumnum scilicet sequentem. Atque ophthalmiæ vere factæ sunt, quia eo tempore solent phlegmones fieri, reliquæ autem fluxiones, quæ cum evacuationibus manifestis fiebant, æstate iam & autumno, dysenteria, teneismi, lienteria, & diarrhæa. Verisimile est multis cepisse diarrhæas, ab illis dysenterias & teneismos processisse, exulceratis intestinis: ab exulcerationibus autem levitates. Nam in temporibus siccis, à principio solent incipere dysenteria à siccitate fecum, tamen in humidis profusiva antecedit. Ita iis quibus ad vesicam & reliquas urinae vias succi decubuerunt, imprimis acciderunt *mel' p'na* cum dolore biliosæ, aquosæ, purulentæ, deinde ramentosæ, & stranguæ. Hæc verò dicit Hippoc. non fuisse *vesicam*, hoc est, non accidisse per propriam passionem renum, vel aliorum instrumentorum urinae, sed *mel' p'na* aut *mel' p'na*, hoc est facta esse per permutationem alioquî malorum, aut pro alijs malis quæ evenissent, nisi corpora per hæc membra fuissent expurgata. Vomitus etiam fuerunt varij, ob variam succorum speciem. Multis neque ea quæ ingesta erant retinebantur usque ad concoctionem, virtute retentice ob humidam intemperie debilitatâ (nihil enim est quod adeo virtutem eam debilitet) multis etiam acciderunt sudores, denique omnibus vndeque multa humiditas. Mirabatur quispiam, quomodo factum fuerit, ut tempore adeo frigido & cute densatâ fluxerint multi sudores. Ceterum res ita evenit non immerito, quia copiosa humiditas intus coarctabatur, neque per insensibilem evacuationem effluebat, hanc enim frigus impediēbat obturans poros minutulos, sudor verò per masculculos fiebat, quos obturare non poterat. Hæc autem omnia accidebant nonnullis sine febre, quibus scilicet succi abundabant, sed non putrescebant: nonnullis cum febre, quibus putrescebant, de quibus mox scribetur seorsum. Vbi dicit Hippoc. *ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῆς ἐκείνης χειμῶνος, καὶ τῶν ἐκείνης καὶ τῶν ἐκείνης* Gal. censet verba illa *ἐκείνης χειμῶνος* & *ἐκείνης καὶ τῶν ἐκείνης* cum antecedentibus, & cum sequentibus coniungi, ut intelligatur, autumno quosdam esse factos tabidos, & eodem tempore quosdam febres contrinuos esse factos: tamen mihi non est dubium cum solis antecedentibus debere iungi, significatiue, eos quibus vomitus aut diarrhæa aut sudores cum magnis doloribus acciderunt, æstate, & incipiente autumno, autumno iam & sub hyemem tabidos esse factos: non quidem exulcerato pulmone (neque enim oportebat) sed corporibus extenuatis & arefactis præ dolore & evacuatione. Vti hinc constat, tabis nomen dici non de ea solùm quæ exulcerato pulmone fit, sed de quacunque. Non tamen potest Hippo. hic dicere, autumno iam & sub hyemem cepisse febres, quas recensere iam hinc incipit, cùm statim dicat, longissimas earum durasse usque ad pleiadas. Quo-

modo ergo inceperint hoc ipso tempore: Narrare ergo incipit febres quibus illo anno homines laborauerunt, non quidem sequenti tempore, sed eo ipso, quo quidam sine febribus habebant dicta prius mala, quidam habebant cum febribus. Febres veluti cacochymiae eandem ob rationem erant variae multiplicesque, & aliae continuae, aliae intermittentes: atque utraque, aliae ex bile, aliae ex pituita, aliae ex melancholicis succis, aliae ex multis simul; cuiusmodi multae errantiae, & semitertianae. Ardentium febrium duplex genus esse Hippoc. ipse aliis locis docet, ex quo quidam ex bile, aliud ex salsa pituita. Porro utriusque genus est in febribus continuis. Est autem febris ardentissima. Accidit quidem haec nonnullis, quia bilis abundans cohibito effluuiis: hoc autem genus febrium praeter aliis fuit in paucissimis: non enim nisi in summe biliosis, neque in his quidem erant in suo genere exquisitae: quia causa ipsa efficiens, nempe aëris iocemperies, erat huic morbo contraria, frigida cum esset & humida. Quamquam ergo per accidens faceret, tamen quia per se resistebat, non poterat exquisitè ardentes generare. Neque quidem poterat, si diutius temperies durasset, non omnia ferè corpora hominum in frigidos & humidos affectus permutare: atque adeo mirum, si sequente anno non fuerint tales morbi multi. Proprium enim est eis, quae ex accidenti quippiam faciunt, recidere tandem in id quod est perse. Causa ergo haec merito non valuit ardentes exquisitasque facere, tamen tertianas exquisitas valuit, quia etiam haec eiusdem generis sunt cum ardentibus, tamen ex maiori causa sunt ardentes. Itaque causa merito fecit plures tertianas, & magis exquisitas, & magis laboriosas in suo genere quam ardentes. Non enim profecto satis fuit ardentibus quam tertianis laborare, sed erant haec exquisitae & breues, laboriosae verò ut soleo, haud enim scio an febribus alia laboriosior quam tertiana sit, quae tamen potior est, quia breuior & intermittens & rarior. Per diurnas & nocturnas intelligit Hippocrates quotidianas. Cum dicit semitertianae, exquisitae, quartanae, nomine exquisitarum tertianas intelligit. Neque verò solum dicit ardentes non fuisse vehementes, tertianas verò fuisse exquisitas, sed etiam docet illud ex signis, quae ardentibus non accidebant, & ex tertianarum constitutione. Differens debere ardente laborantibus, dicit minimè ex agitantibus hi laborabant: neque enim sanguis his fluctabat nisi paucus admodum, & paucis, neque delirabant: alia autem omnia erant tolerabilia. Intelligit autem per alia omnia, ea quae sunt signa pathognomonica ardentis febris, sitis, & ariditatem, & ardorem: nimirum cuiusque morbi magnitudo cognoscitur ex magnitudine propriorum symptomatum, & quibusdam superveniens, quae scilicet morbo magis iam facto supervenire solent, velut in febre ardente, quum est magis, ardor, ariditas, & sitis, magna sunt & vix tolerabilia: superveniunt autem fluxus sanguinis de naribus, & deliria. Cum ergo haec non adessent, & propria accidentia essent mediocria, constat ardentem haud multum crevisse, porro tertianas exquisitas fuisse ex eadem constitutione constare. Nam tales ut in aphorismo dicitur, septem pe-

riodis iudicantur. Crescebant verò usque ad summum vigorem intra quartum paroxysmum, indicabantur integrè intra septimum: Ardentes verò neque intra quatuordecim qui acutorum solet esse finis, neque perfectè indicabantur, sed decimoseptimo die cum intermittentibus commutabantur (hoc enim significat dicens, *ἐξ ἡνίκαν ἔσθ' ἡν ἡσυχία*) neque mirum, tempus enim frigidum ineptum est ad perfectas solutiones, & alioqui morbi biliosi non exquisiti semper sunt difficili iudicii. Quod dicit *ἐν ἡμέρῃ* nihil aliud est quam multis eodem modo evenire. Videlicet in multis eodem modo eveniebat, ut febris ardens in intermittentem abiret, in multis etiam tertianae septimo periodo desinebant perfectè, neque revertebantur. Hoc enim est perfectè iudicari integrè & tuto iudicari, ut morbus finiatur omnino, & non redeat. Quartanae febres plerisque fiunt post alios morbos, aliis febribus primò factis erraticis, deinde quartanis, ut in prognostico dicitur. Multis tamen fieri etiam solent à principio, nunquam errantes à propria figura. Utrumque multis accidisse hac tempestate dicit: longas autem dicit fuisse ut solent, & adhuc longiores, quia ut dictum est ætate iam & autumno fiebant, quae modo narrantur: autumnales vero quartanas esse longas in apborismo dicitur. Accedebat porro totius anni frigida constitutio. Addit *ἀπορροιαὶ καὶ ἡ νύκτις*, febres nocturnas vocat, quae singulis noctibus fiunt, ut sunt quotidianarum species. *καὶ μακρὰν* (inquit) multis, nimirum variis excrementis abundabant homines, & multis etiam, ac proinde multo tempore perseverabant tum erectis, tum etiam decumbentibus. Explicans deinde quamdiu duraverint dicit, plurimis sub pleiadas & usque ad byemem, hoc est toto autumno, & usque ad bonam partem hyemis productae sunt, constat vero hunc autunnum & hanc hyemem non fuisse ea tempora, à quibus narratio incepit, quae dixerat fuisse frigida & humida, sed sequentis anni.

Convulsiones autem multos corripiebant, maximè vero pueros ab initio, & febri-
E citabant, & febribus superveniebant convulsiones. Haec quidem plurimis diuturna erant, innoxia tamen, nisi his qui ex alijs omnibus perniciosè sese habebant.

Convulsiones has verisimile est ex repletionem fuisse, & factas esse redundantibus praeter humiditatem temporis succis, & nervis frigore laesis. Neque enim quae in febribus fiunt statim cessant sunt ex inanitione fieri, sed quae post febres admodum ardentes, hominibus iam marcescentibus, hae vero non erant tales. Sed succis pituitosis, quos temperies anni congesterat, à febrili calore liquidatis & fufis, convulsiones ex repletionem oriebantur. Nihilominus has quoque in febribus fieri deterius erat, quam si in convulsionibus febres fierent, ut in apborismo idem est auctor. Nam febris convulsioni succedens ipsam solvet, convulsio vero non potest solvere febrem. Et praeterea

grane est conuulsionem in febre ipsa fieri posse à qua si facta prius esset solueretur. Tamen neque boc erat lethale, nisi in quibus alia etiam erant lethalia. Diximus enim in commentatione prognostici, multum conferre in cuiuscunque signis explorandis, si consideremus, an reliqua annuant aut rennunt. Vix enim vllum addepernitiosum est, ex quo non aliquis conuulserit, vixque vllum adde salutare cum quo non aliquis interierit. Et omnino nullum adde malum, vt sit signum mortis satis firmum, neque adde bonum, vt salutis, si alia omnia renuunt. Nihilominus quodcumque signum appareat, quod valde malum sit, et si ex alijs videatur homo esse salubriter affectus, malum magnum timeri debet (non enim sine causa sit) quod in conualuturo quid aliud sit, quam morbi diuturnitas, & difficilis indicatio? Merito ergo erant hæc diuturna, & innoxia ijs qui ex alijs signis videbantur non esse lethaliter affecti.

Febres autem erant omnino continuæ, nihilque intermittebant, sed exacerbabantur omnes in modum tertianarum, vnâ die remittentes alterâ ingrauescebant, vehementissima omnium quæ tunc contingebant, & longissima & maximos dolores inferentes, à leuibus initijs in solum perpetuò incrementis & diebus decretorijs exacerbabantur & in peius procedebant. Vbi parum remississent, celeriter rursus ex remissione violentius ingrauescebant, atque diebus decretorijs vt plurimum in deterius ruebant: rigores autem omnibus sine ordine & erraticè contingebant, paucissimi quidem & minimi in his erant, sed in alijs febribus maioribus, vt & sudores multi in his autem paucissimi, nihilque subleuantes, sed contra noxam afferentes. In his multa aderat extremorum refrigeratio, quæ vix recalescebant. Neque dormiebant quid omnino, præcipuè hi, & rursus comatosi. Alii quidem in omnibus turbata erant & male affecta, in his verò multò pessimè.

Cum hæcenus omnes febrium differentias, quæ illo anno fuerunt, velut in quendam cūmulū congerisset, nunc seorsum describit febres quasdam, quæ tunc fuerunt grauissimæ. Hæc vero fuerunt semitertianæ. Nam omnino non intermittentes, & vno die ingrauescentes, non nisi ardentes vel semitertianæ esse poterant. Ardentes vero antè dixi fuisse minimè graues. Quas ergo modo dixi grauissimas fuisse, semitertianæ fuerunt. Ex meritis quidem semitertianæ fuerunt vehementissimæ, & longissimæ, cum ab eodem auctore dicatur alibi tales esse solere. Quædam eorum accidebant quæ hedicuntur, pertinet ad propriam figuram morbi, quædam ad periculum & magnitudinem, quædam ad verumque. Ad propriam figuram illa, ἡ δὲ νόσος, παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ, & illud, ἡμῶν

ἡ δὲ νόσος, παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ, & illud, εἶτα δὲ πάλιν παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ. Ad periculum illa, παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ, & illud, εἶτα δὲ πάλιν παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ. Ad verumque illa, παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ, & illud, εἶτα δὲ πάλιν παρακινεῖται διὰ τὴν ἀνταρθεσίαν τοῦ πυρετοῦ, καὶ τοῦ κρυφοῦ πυρετοῦ. Nam ea est figura semitertianarum earum quas solas Gal. semitertianas vocari vult, vt nihil intermittant, sed continuæ sint, & ingrauescant in modum tertianarum, vno die remittentes, quo scilicet die vnica exacerbatio est solius quotidianæ febris: alio ingrauescentes, quo scilicet est exacerbatio duplex, quotidiana & tertiana. Quare frequenter videntur remitti, & citò (sequenti enim die) rursus ex remissione ingrauescant violentius, quam die superiori, accedente duplici accessione, & violentius quam nudius tertius, quum morbus tendit in summum vigorem. Accidunt illis rigores sine ordine mixti, hoc est, non vno quodam ordine quotidiano, aut tertiano, sed videntur sine ordine omnino fieri ob complicationem duarum febrium, acciditque hodiè vnus, cras duo, vt nullus videatur esse ordo, Quinetiam præter hos, incidunt intempestuè quibusdam horis sine ordine rigores, ob varium motum quem facit succorum contraria natura. Rigores autem his non sunt magni, quales qui propriè rigores appellati solent, sed minimi, quales qui horrores vocantur. Rigores ergo veri his paucissimi, sed qui erant, minimi erant, horrores nempe in alijs autem febribus maiores rigores erant, puti in exquisitis tertianis. Hæc ergo solam figuram semitertianarum significant: illa verò figuram simul & grauitatem, longissimas, & maximos dolores inferentes. Nam familiare est semitertianis esse vehementes, & cum maximis doloribus, acutas, simulque longas. Vt ipse Hipp. hoc ipso lib. dicit his verbis: In febre quam semitertianam vocant, tum morbi eueniunt acuti, tum præter cæteras hæc est lethalis, & qui tabe, & alijs longis morbis ægrotant, in hac maximè affliguntur. Verum quamquam hoc familiare sit semitertianis, non tamen æquè omnibus, sed maximis, quales eo tempore grauatæ sunt. Familiare etiā est semitertianis incipere leuiter, vt non statim prodāt suā acutiem: deinde vehementiores se per hunc, quam fore in principio videbatur, tū quando vehementiores per se sunt, citò hoc habent magis, vt vehementiores fiant. Refrigeratio etiam multa vix recalescens quæ his incrat, familiaris est semitertianis: quia multos habent rigores, ex his autem ob multam picuitiam non facile recalescunt, Hi autem recalescebant vix, quia semitertianæ erant graues. Neque quidem hic dicit illam refrigerationem extremorum, quæ lypyriam febrem aut extremam calidi extinctionem significat (ex hac enim non recalescunt) sed eam quæ per horrores longos & multos eueniebat. Vbi nos legimus, neque dormiebant quidem omnino, præcipuè hi, in quibusdam codi-

23 cibus est, *ἡ δὲ ἀγρυπνία πρὸς αὐτὴν μάλιστα ἔχει*, id est, neque vigilabant omnino: præcipue hi: tamen legendum esse *ἔχει ὑπὸ πρὸς αὐτὴν*, id est, non dormiebant omnino, verba mox sequentia palam faciunt. Addit enim & rursus comarosi, hoc quoque signum figuram morbi & magnitudinem indicat. Nimirum semitertiana vno die solet afferre periculum commotâ bile, alio soporem commotâ pituitâ: quin & in ipsius tertientia initio & inqasione nimis somnus sit, effumante cum bile pituita, & soluto horrore succedit periculum. Tamen tunc hæc contraria maxime fiunt, quum vtriusque succi magna signa sunt, & proinde magna semitertiana. Illa significant solum febrium periculum, exacerbantur diebus decretorijs, & in peius procedebant. Nam diebus decretorijs ingrauescere malum signum est. Illis enim diebus mouetur humor, & congregitur cum facultate morbus, illis ergo videri facultatem obui periculosum: maxime cum in morbis salutaribus magnam vim solet facultas comparare, & adiuvati cæli aspectu, qui facultati solet esse faustus. Quibus ergo diebus solet facultas vincere, si debilitatis insignia accidentia percipiuntur, pessimum est: vt merito illud, quasi insignie quoddam periculi signum, bis dixerit Hippoc. repetens his verbis. In decretorijs plerumque diebus in deterius ruebant. Illud etiam est periculi signum, sudores qui in omnibus febribus illo anno erant multo, in illis fuisse minimos quantitate, itaque fuisse in his multos sed exiguos, nihil conferentes, sed contrâ ludentes. Nam euacuationes omnes tentant, cuiusmodi crebre & exigue, debilitatem facultatis indicant, decretoria autem omnia quæ nihil conferant, ac multo magis quæ lædunt, aut mortem aut difficilem indicationem significare ipsemet dicit. Illud quoque haud exiguum periculum indicabat, alius, quæ illo anno ruerant & malè affectæ, illis fuisse multo pessimè. Sunt enim valde pessimæ alui, quum excretiones fiunt, quales in aphorismo & prognostico dicuntur esse nigre, liuidæ, cruentæ, biliosæ, siccæ, fetidæ, pingues, & variæque. Erant igitur illæ febres semitertianæ, magnæ, & periculosæ.

Vrina autem horum plurimis aut tenuis erant, & cruda, & decolores, & post aliquod tempus parum concolta indicatoriæ: aut crassitie non habebant, verum perturbata nihil consistebant neque subsidebant, neque conquebantur: aut pauca quedam, & praua, & cruda subsidebant, pessima autem omnes erant.

Neque hæc vrinæ differentie pertinebant ad speciem morbi, sed magnitudinem & periculum indicabant. Pessimæ enim vrinarum differentie hæc omnes. Erant quibuldam crude, tenues, & decolores (hæc sunt aquosæ, siue albæ & perspicuæ alijs locis appellatæ) quæ quidem ex tanta cruditate procedunt, vt neque præsentis, neque future concoctionis signum quodpiam præ se ferant, & illæ quidem non solum tales apparebant in initio febrium, sed post tempus quoque, id est, procedente tempore, parum comparabant concoctionis signa decretoriæ, hoc est, parum recipiebant eas

A imitationes, quas solet, vix recipere, morbo eunte in indicationem. Aliis erant vrinæ crassitudinem veram non habentes (vera crassities est, quæ concoctione comparatur) quæ tamen videbantur crassæ, quia perturbatæ erant, & nihil consistebant, neque subsidebant. Intellige hic quoque post tempus, hoc est, cum à principio apparent perturbatæ, tales multo tempore persistebant, neque procedente tempore consistebant, siue conquecebant ab illa perturbatione: neque subsidebant, hoc est, neque separabatur in illis quidquam quod subsideret, neque conquebantur.

B Quod quidem multos & coctus difficiles succos significabat, quia nunquam subsidebat in illis quidquam, aut subsidebant pauca & mala. Pauca quidem subsidere cum tenuitate cruditate significat, cum crassitie nimis cruditiem etiam & obstructionem. Ita enim fieri quum grumosa & pauca minguntur docuit Gal. Male subsidentie multæ sunt, quæcumque scilicet nigre aut liuidæ, aut grauiter fortentes, quæ quidem ob malam puritatem aut vitionem fiunt. Vbi nos legimus *ἡ γὰρ νεκρὸς μὴ ἔχει*, in aliquibus codicibus legitur *ἡ γὰρ ἀπὸ ἡ γὰρ*, id est, crassitudinem quidem habentes vrinæ, quibus verbis idem sensus fit. Nimirum dicit, crassitudinem quidem habentes non veram, sed per perturbationem. Non enim esse veram crassitiem eam quæ turbatione fit, alijs locis diximus.

T Vix quidem comitabantur febres. Non habeo autem quod scribam, an leuionem aut utilitatem tussis tunc attulerit.

D Hoc accidens fuit in illis febribus affidens, non proprium morbi, neque superueniens in magno periculo, sed vt solent alia signa, quæ vocantur affidentia. Sed quoniam non obfuit manifestè, constat rursus quod nuper diximus, tabes illo anno factas esse non ob pulmonum vlcera, sed aliæ marce & entibus corporibus.

E Diuturna ergo erant & molesta, & omnino sine ordine, & erraticæ, & sine indicatione plurima horum fieri perseuerabant, tum iis qui omnino lethaliter se habebant, & iis qui minimè. Si enim quibusdam eorum parum intermisset, rursus cito reuertebantur. Quibusdam autem indicabantur circa octogesimum diem, sed eorum paucis, quibus celerrimè mouebatur morbus, horumque nonnullis reuertebantur, vt multi illorum adhuc per hyemem agrotarent. Plerisque autem sine indicatione desinebant. Hæc autem tum iis qui superstites manserunt, tum iis qui minimè, ex aquo acciderunt.

Omnia dicta accidentia perseuerabant fieri diuturna, molesta, & sine ordine, & sine indicatione, id est sine solutione. Quod est, erant longæ, molesta, erraticæ, & vix vnquam finiebantur. Quod ob multitudinem, contumaciâ, & varietatem succorum

rum, fiebat. Fiebat autem id & in iis, qui omnino le-
thaliter habebant, & in iis qui non. Habere autem
lethaliter aut non, siquidem hæc communia erant
vtriusque, ex aliis accidentibus omnibus agnoscen-
dam erat. Quibus multorum & contumacium &
multiplicium focorum notæ sunt, si ex aliis signis
videantur esse salubriter affecti, liberantur, & su-
persuades sunt, non tamen citò neque cum bona in-
dicatione, sed post multum tempus, & cum paula-
tina solutione, aut per multas recidivas: si non sint
salubriter affecti, tamen facultas non sit admodum
debilis, moriuntur lentè & post longum tempus:
si facultas admodum debilis sit, moriuntur bre-
ui. Illo anno, vtriusque & salubriter & lethaliter af-
fectis, fuerunt foci multi, varij & contumaces: vi-
res verd, quæ longo tempore morbū fetre possent,
Proinde qui supersuades manserunt, per multas re-
cidivas euaserunt, & qui mortui sunt, multo tem-
pore prius exortauerunt. Quibusdam tamen, qui-
bus scilicet hæc mihi nunc innotant, iudicati sunt, qui ee
lerimè octoginta diebus: & horum etiam, qui oc-
toginta diebus iudicabantur, quibusdam reuerte-
bantur, ita vt multi illorum per hyemem egrota-
rent. Ex hoc loco rursus sit manifestum, quod
antea diximus, febres, quæ descriptæ sunt, non inco-
pisse autumno & sub hyemem, sed æstatis parte vl-
tima. Quandoquidem durare potuerunt quibus-
dam octoginta dies, antequam hyems fieret.

Cum autem multa quedam fieret iudicatio-
nis difficultas, & varia ex morbis, & maxi-
mum signum & pessimum in fine superuenie-
bat plurimis, fastidire cibos omnes, præcipuè
autem hos quibus & alia omnia lethaliter ha-
bebant. Sitiētes non admodum intempestivè
erāt in his febribus: cum ferens autem longa
tempora, & dolores multi, & praua colligatio-
tio, in his abscessus fiebant, aut maiores quàm
ut ferre possēt, aut minores quàm ut prodesse,
sed celeriter recurrerent, & in peius conver-
tent. Erant autem, quæ his fiebant dysenteria,
& teneismi, lenteria, & profluvia, quibus-
dam autem & hydrops, cum his & sine his.
Quodcumque autem horum violenter fiebat,
celeriter corrumpebat, aut rursus nihil pro-
derat. Exanthemata parua, & non pro digni-
tate excretionis morborum, & citò rursus e-
uanescentia: aut post aures edemata, quæ non
soluebantur, & nihil significabant, quibusdam
in articulos, præcipuè autem secundum coxam
Pauca decretorie desinentia, & citò rursus
inualescentia, in habitum qui à principio.

¶ Acris, siue iudicationis difficultas multa &
varia contingit, quia omnes difficulter iudicabatur,
non tamen in eodem modo: sed quidam per multas
recidivas: quidam per solutiones paulatinas: qui-
dam per abscessus, æqui abscessus erant varij. Nam
quidam per decubitus humorum in vias euacua-
tionum, vt quibus dysenterie, lenterie, profluvia
& teneismi: quidam per mutationes in alios mor-
bos [hæc enim etiam vocare Hippocrates solet ab-

cessus] vt quibus hydropes, qui nonnullis accide-
runt cum his, hoc est, cum fluxionibus & ventre,
nonnunquam sine his: quidam erant abscessus in
quasdam partes, vt quibus tumores [omnes enim
tumores vocat Hippocrates edemata] post aures
& ad articulos, & ad coxam & exanthemata. Illis
itaque omnibus, qui ita laborabāt, dicit fuisse mul-
tam & variam acrisiam: iis autem qui lethaliter
erant affecti fuisse signum superueniens maximè pes-
simum, inappetentiam omnium ciborum. Neque
profecto immeritò erat hoc grauissimum, nam si-
gnum malignæ cacochymie erat, & præterea ma-
la causa: quia per morbos longos cibum non esope-
re, perniciōsum est. Dicit tamen non admodum si-
ciculosos fuisse. Siquidem omnino nihil sitissent
cum tanta febre, malum esset signum, verum non
negat fuisse, sed admodum intempestivè. Illud au-
tem multa humiditas illius anni fecit. Porò dicit,
cum fierent longa tempora, & dolores multi, &
multa colligatio. Nimirum antea dixerat, Qui-
bus fluxiones illæ multæ per ventrē, & vrinæ vias
cum dolore fiebant, colligationem & tabem acci-
disse, idque quibusdam sine febre, quibusdam cum fe-
bre. Hæc ergo dicit modo, per illas febres quibus-
dam euenisse. In his, dicit, fiebant abscessus, intelli-
git verò hic abscessus nomine, omnes permutatio-
nes, aut decubitus succorum, siue cum euacuatio-
nibus, siue sine illis, vt cōstat ex enumeratione eo-
rum, quæ acciderunt, dysenterie scilicet, teneismi,
lenterie, profluvia, hydropes, parotides, exanthe-
mata, tumores ad artienlos, ad coxam præcipuè.
Verum inquit, abscessus plerisque illo anno fuisse
maiores quàm vt ferri possent, vel minores quàm
vt prodescent. Nimirum in nimia succorum redun-
dantia hoc petioli semper est, vt aut nimia eua-
cuatio fiat, cum quæ virtus exoluatur, aut imperfecta.
Et quæ ad expurgationem corporis nō sit satis.
Vt vel hac sola causa, si secundū artem fieri potest,
curandum sit, vt cum multa subest in corpore co-
pia, minuarur. Hydrops post alios morbos sit, aut
hepate debilitato ipsa intemperie, aut morbi mate-
ria irruente in hypochondria, & abscedente in re-
gionem ventris. Exanthemata illa parua, quæ ac-
ciderunt, verisimile est fuisse, quæ variolas & mor-
billos vocamus. Quanquā enim nomine exanthe-
matum Græcis omnes maculæ, aut pustulæ aut pa-
pule in cure significantur, sed hæc malignè putre-
scentibus succis fieri solent, in pueris præcipuè,
quos ex his exanthematis illo anno mortuos fuisse
dicit mox. Verisimile est ergo pueros, qui semiter-
tianas laborauerant: in quibus pituita præualuerat,
variolis in quibus bilis, morbilis laborasse. Ea au-
tem, pessimum est, pigrè & parū exire, & rursus
euanescere. Tumores post aures dicit factos, qui
non soluebantur, quia ex crassis succis erant, & ni-
hil significabant, hoc est, ex quibus neque melius,
neque deterius habebant, velut ex rursi dixerat,
abscessus in articulos solere fieri, quia laxæ partes
sunt, & in coxam præcipuè, vt in articulum maxi-
mum, dictum in aphorismis est. Pauca quibusdam
definebant ruberula decretorie, hoc est, soloe-
bantur, tamen citò rursus (ita vt sit in iis, quæ sunt
difficilis iudicationis) inualescentia, redibant in ha-
bitum priorem.

Moriebantur autem ex omnibus quidem,

plurimi autem ex his pueri iam ablactati, & maiores & octennes & decenes, usque ad pubertatem. Fiebant autem his hac, non sine prius scriptis. Priora autem multis sine his. Solum autem vitile & maximum signorum, quæ facta sunt, & multos liberavit constitutos in maximis periculis, quibus in stranguriam converterebatur, & in hoc abscessus fiebant. Accidit autem & plurimis stranguria, etatibus his maximè. Fiebat autem & multis aliorum non decumbentibus, & in morbis, celeris autem & magna quædam mutatio omnium his fiebat. Ventres enim esse se se contingere humidus, malo more citò sistebatur. Cibusque omnes iucundè capiebant: febresque mites post hæc. Stranguria autem his diuturna & laboriosa erat. Urina autem his erant multa, crassa, varia & rubra, & mixta pure, cum dolore. Superstes autem fuerunt omnes hi, neque quemquam horum mortuum novi.

¶ Ex abscessibus omnibus moriebantur multi, plurimi autem pueri. Ex exanthematis enim his multos pueros verisimile est, mortuos esse, quia habebant pueri cum illa morbi specie analogiam [familiaria enim sunt illa exanthemata pueris] & cum anni constitutione, quæ erat humida vit & puerilis ætas, usque ad pubertatem. Multi ergo pueri exanthemata illa habuerunt. Quæ cum illo anno lethalia fuerint, quia erant pauca, & citò evanescentia, multi pueri ex illis mortui sunt. Præterea cum causa eadem esset omnibus, puta aeris tempesties, pueros magis ægrotare fecerit, quàm aliarum ætatum homines, paucique aliorum eo morbo correpti sunt, paucissimi verò æqualiter: fiebant autem, inquit, his hæc non sine prius scriptis: id est exanthemata fiebant pueris, non sine fluxionibus per ventrem, & dysenteria. Priora autem, hoc est, illæ fluxiones, multis, sine exanthematis. Certè nihil est magis obseruatum, neque magis rationi consonum, quàm variolis lethalius accedere malignas deiectiones, & dysenterias, reconditis scilicet malignis excrementis in visceribus, & excurrentibus, per intestina, quæ debent in cutem emergere. Quod fit, ut & anxietates magnas ita affecti sentiant, & deliquia animi ob malignam succorum qualitatem. Quare exulcerant intestina, faciuntque dysenterias lethales, quales ex bile atra solent fieri. Verùm cum omnes, quos dixi semitertianis exercuerant, graviter affecti essent, solum illud fuit vitile, & maximum signum, eorum quæ facta sunt, & quod multos liberavit, in stranguriam malum verti. Hoc enim tempore fiebat stranguria, ut antè etiam dixerat, non per passionem propriam instrumentorum urinae, sed toto corpore per eas vias sua excrementa emittente. Accidit ergo tunc multos hac ratione liberari, per purgatis corporibus per urinam. Quare erat vitilis ex excretio, quibus accidebat, & maximum signum sanitatis. Atque adeo non eo tempore solum ita contigit, sed sæpius aliàs febricitantes solent hac evacuatione inuiri magnopere, ut vix sciam, an aliqua evacuatio sit ad eradicandum mala venarum tam idonea. Neque id immerito: quia renes de ipsissima vena, omnium ma-

xima, quæ ex hepate oritur, fugiunt. Accidit autem stranguria illa salutaris multis, maximè autem his ætatibus, de quibus nuper dixerat, pueris scilicet. Nam verisimile est contingisse quod semper solet, ut pueri ex gravissimis malis, & periculosis, crebrius euaderent, quàm alij homines. Res est miraculo similis, è quantis desperationibus soleant pueri euadere. Quod fit, quia habent vires naturales, quibus vincuntur morbi, robustissimas nempe commutatricem & expultricem. Nulla autem alia ratio pellendi morbum est, quàm commutando, aut pellendo materiam. Ergo hoc quoque anno plures pueri conualuerunt, cumque omnes fore, qui liberati sunt, scilicet urinae sint liberati, constat plures pueros scilicet urinae habuisse. Nam etiam plures eorum, qui ex exanthematis mortui fuerint, fuerint pueri, tamen fieri potuit, ut ex febribus sine exanthematis plurimi pueri cum scilicet liberati sint. Fiebat (addit) & multis aliorum, & non decumbentibus, & in morbis. Hoc nihil est aliud, quàm quod antè à disetate, & nunc obiter repetit: puta stranguriam accidisse multis cum febre, & multis sine febre. Quod quia causa contingerit, supra quoque dictum est, sed quia causa vitilis fuerit adeo scilicet urinae illo anno partim à me est dictum nuper, partim ex iis quæ Hippocrates narrat, intelligitur. Omnium enim dicit fieri consuevisse per illos morbos celerem & magnam mutationem. Nam si venter incipiebat fluere, malo modo citò sistebatur. Malo modo dicit, quasi intempestivè, & antequam corpus expurgatum satis esset. Quare fiebat ut cibos tunc iucundè caperent, & febres mitiores fierent, tamen se uerterent, & ut dictum est, celeris & magnamutatione, rursus fieret in priorem habitum. Stranguria autem erat diuturna & laboriosa. Atqui quia diuturna, erat bona causa: expurgabat enim plene corpus, quia laboriosa, erat bonum signum, euacuari enim prava significabat. Igitur quod diuturna erat & laboriosa, multum idque malum, euacuabatur. Quare merito plusquam alia quæpiam euacuatio, constat. Urina autem erant his, quia multum expurgabantur, multa crassa & varia & rubra, & pure mixta. Multa quidem urina singulo mictu esse non poterat per stranguriam, verùm poterat esse non omnino pauca, & mictu crebro fiebat, ut multa urina emitteretur. Crasse autem erant & variz urinae, quia varii & crassi succi expurgabantur: rubra, quia multum sanguinis crudi eminebatur: pure mixta, quia ex vlcere, quod corrosione ipsa faciebat urina, aliquid puris corrodabatur, exibatque cum exiguo quodam pure. Quod ut significaret, dixit Hippocrates *μειζονα* id est, pure mixta. Omnes ergo, quibus hoc urinae profusum accidit, superstites manserunt: quia per purgati sunt.

In his autem qui sine periculo erant, concolitiones excrementorum omnes omnino tempestivas, aut bonas & decretorios abscessus confiderare oportet.

¶ Hæcenus semper egit Hippocrates historicum narrans solidum quæ illis annis acta sunt. Nunc obiter disserit ad præcepta, agitque, per quasdam huius operis particulas præceptorem (quamquam profectus

perfecto hoc non admodum pertinet ad instituti) A
tamen accipere occasiones ex his quæ narravit ægro-
tis consigisse, scribit quædam sententias, partim per-
tinentes ad prognosticam, partim ad curatiuam. Illa
verba, *intra si exierint*, in quibusdam codici-
bus leguntur adiecta superioribus, mihi verò mul-
tò aptius videntur, cum sequentibus congruere. Ni-
mirum, inquit, quæcumque sine periculo sunt, ut
quæficat, considerate debes concoctiones unde-
quaque prodeuntium, & abscessus. Nam quæ sine
periculo sunt hæc habent, omnium excremento- B
rum undequaque prodeuntium, velut diætionū,
& vrinx, & spuri (omnia enim considerari per fe-
bres debent, & nihil negligi) concoctiones bonas,
id est, bonæ concoctionis signa, vera, non ficta, ne-
que fallacia, & tempestiuas, hoc est, suo tempore ap-
parentes, & secundum temporis rationem perseue-
rantes, non inæquales, aut in tempestiue euanescent-
es. Habent præterea abscessus decretorios bonos.
Vocat abscessus decretorios, euacuationes omnes,
aut permutaciones, aut decubitus succorum in
quasdam partes. Habent ergo quæ sine periculo
sunt mala, euacuationes, aut abscessus bonos. Eu-
acuationes bonæ sunt, quæ per regionem con-
uenientem, & quæ morbo sunt accommodatæ, &
quæ cum consentanea & tolerantia aguntur. Absces-
sus boni, qui in ignobiles, & humiles, & externas
partes sunt, porius quam qui in contrarias. Cum
ergo in morbo concoctionis signa tempestiue ap-
parent, & secundum rationem perseverant, & muta-
tiones tempestiuas in melius recipiant secundum
morbi constitutionem, & si quæ euacuationes, aut
qui abscessus sunt, ut oportet sunt, sine periculo
homo est.

*Concoctiones celeritatem indicationis, &
securitatem salubrem significant.*

Quando citius apparent concoctionis signa, tan-
tò breuiorem futurum esse morbum agnoscimus, E
quod in Aphor. etiam docuit Hippocr. dicens, &
ex his quæ mox apparent, velut in pleuriticis spu-
tum, si mox appareat post principium, contrahit, si
autem postea appareat, producit: & vrinx, diæ-
tiones, & sudores. Causam illo loco reddidimus.
Securitatem etiam salubrem indicant. Est verò du-
plex securitas salutatis. Dicimus enim secutum esse
morbum, promittentes fore ut sanus euadat ho-
mo. Dicimus etiam sanientem quam comparabit,
fore securam, dicentes non habitatum hominem
reciduum. Vtramque securitatem significant signa
e concoctionis, salutem ceterè, usque adeo ut Galenus
dicat cum signis concoctionis non posse hominem
mori, nisi quidpiam, in victu, aut curatione peccet-
tur, aut nouus morbus succrescat (atque ego quo-
que ita censeo, si perfectæ concoctionis signa sint)
securitatem quoque secundam significant, cum
sunt bonæ, & tempestiue. Nam cum apparent non
multò post morbi initium signa concoctionis, &
nunquam amplius euanescent, sed mutantur in mel-
lius semper secundum rationem, per dies contem-
platione dignos, maxima spes est fore indicationem
optimam & tutam, & sine reciduiis, perfectam.

*Cruda autem & incocta, & in malos absces-
sus conuersa, aut acrisias, aut labores, aut diu-
turnitatem, aut mortem, aut eorundem reci-
diuas. Quod autem horum magis erit, ex aliis
considerandum.*

Cruda maius quiddam significant, quàm nomen
incocta. Cruda enim sunt, quæ omnino talia sunt, &
cocta nullatenus, incocta verò vocat, quæ segniter
coquantur, etsi non nihil incipient. Crudas vrinas
significabat paulo ante, dicens, crudæ vrinx, te-
nues & decolores: incoctas autem, a ddens, & post
tempus parum concoctas. Contraria ergo sunt duo
hæc, cruda, & incocta, illis duobus, concoctiones
bonæ, & tempestiue. Iam verò, mali abscessus con-
trarii sunt his, quos vocabat decretorios: malæ sci-
licet euacuationes, quia non sunt per convenientes
regiones, aut non sunt morbo accommodatæ, ac
proinde aut statim virtutem deliciunt, aut rursus
nihil profunt, ut illis ægrotis, ea tempestate quam
describit, accidisse dixit: vel abscessus in quasdam
partes noxi, quia in internas, aut nobiles: aut ma-
iores quam ut ferri possint, aut minores quam ut
profint. Igitur si concoctiones bonæ & tempesti-
uæ, & decretorii abscessus, significant celeritatem
indicationis, & securitatem salubrem: cruda & in- D
cocta, & mali abscessus, significabunt omnino con-
traria. Contraria autem sunt iudici celeritati, diu-
turnitas: & iudicio, actisia, hoc est in indicatio, quam
declaratum est à me antea, esse difficile iudicium,
aut solutionem sine iudicio. In difficultate iudicii
sunt dolores. Securitati salubri contraria sunt mors,
& recidua: siquidem dictum antea est, duplicem
securitatem illo nomine significari. Ergo hæc cum hæc
aderunt, aut morietur, aut cum difficili indica-
tione vel actisia, vix tandem euadet. Vtrum
horum futurum sit, ex aliis considerandum. Quod
& in prognostico ipse Hippocrates fusiùs docuit.
Nimirum si hæc adint, & salubriter affectus homo
sit, euadet longo tempore, sin lethalter, morietur.
Esse salubriter aut lethalter affectum, cognosces,
consideratis aliis omnibus signis salutis aut mortis,
in quibus ea quæ constantiam aut langorem vitalis
facultatis indicant, tenent primas.

*Præterita discito, præsentia cognosce,
predicito futura. Hæc meditato.*

Ad medicam pertinere arte prognostica uti,
circa præsentia, præterita, & futura in initio pro-
gnostici libri dixit. Rectè autem dicit modò, ut hæc
magnopere commendat, hæc meditato. Non quid-
dem quod hæc meditari solum debeat medicus, non
etiam exercete, sed quod nulla ratio discendi quid-
piam, præstantior sit meditatione. Non enim ea
quæ legimus solum, aut audimus, sed quæ mul-
tum & diu meditamur optimè callimus. Quare quæ
magni momenti in artis operibus futura esse so-
mos, non vtrumque legere, sed meditari etiam
debemus.

Exercere in hoc circa morbos, ut proſis, aut non noccas.

Non est leue quoddam hic præcipitur, sed magnum prudentiæ præceptum. Cum curamus, multa occurrunt dubia, & ambigua, id quod assidue altercationis medicorum, nunc de morbi essentia, nunc de causa, nunc de occasione utendi aliquo auxilio, aperte indicant. Non enim solum alterari contingit imperitos & protervos, sed doctos etiam & probos non raro. Atqui nos ipsi nobiscum nondumquam altercamur, videntes quædam signa, quæ in hanc, quædam quæ in illam sententiam trahit, ut res quidem sit dubitatione plena. Tunc temporis quid agendum sit Hippo. docet. Agendum quidem erit iuxta coniecturam, quæ videtur probabilior, non ita tamen ut si coniectura nos fefellerit, salutem hominis referimus, multum lædentes, sed cautè incipientes à leui aliquo auxilio, ut si res ita tentata minus bene videatur cedere, liceat consilium mutare, ut inultum non lædamus. Denique ita operari, ut proſis, aut si non pro fueris, non noccas tamen, aut, quàm minimum fieri possit, noccas.

Ars ex tribus constat. Morbo, ægroti, medico ministro artis. Aduersari morbo ægrotum cum medico oportet.

Cum tria hæc sint in omni curatione, morbus, ægrotus, & medicus, qui est minister artis, quia exequitur quæ iubet ars: ægrotus & medicus debent conspirare aduersus morbum. Quia vñ alio loco dicitur, non solum oportet medicum præstare se proptum ad faciendum quæ expedit, sed & ægrotum. Fiet hoc ægroti iuvante medico, & medico ægrotum contrarium fieri possit ægroti conspirante cum morbo contra medicum, aut medico cum morbo contra ægrotum: ægrotus iuvat medicum, cum ei pareat, ut oportet; contra, cum non pareat, sed contraria prorsum facit illis quæ iubet medicus, conspirat cum morbo contra medicum. Medicus iuvat ægrotum, cum bene vitur sua arte, contraria præstans morbo, & naturæ similia: si verò male arte vitur, præstans morbo similia, aut naturæ contraria, conspirat cum morbo contra ipsum ægrotum.

Dolores circa caput, & cervicem, & granitai, cum febribus, & sine febribus accidunt. Phreneticis quidem convulsiones portendunt & viridum vomitum, & quidam horum celeriter moriuntur.

Nunc redit ad abscessus. Cum enim dixisset paulo antea, considerandos abscessus bonos aut malos, nunc quorundam abscessuum, qui quidam passionis generi solent succedere, mentionem facit: velut quædam abscessuum bonorum & malorum exempla proferens. Proinde duos bonos abscessus refert imprimis, dein de duos alios malos. Volens autem dicere, quæ solent succedere dolori grauius capitis, & cervicis, dicit, velut propositione quadam viens, cum dolorem solere cum febre, aut sine febre fieri: cum verò qui per turbos acutos fit, in quibus sequentes abscessus fiunt. constat cum febre esse. In hoc

A genere sunt phrenetici: nam tametsi cum iam delirant non solent gravitatem capitis sentire, tamen à dolore granitate (repleto nimirum capite) phrenetici incipiunt. His quoque solent superuenire,ambo lethargia, contusio & vomitus viridis, convulsos solere phreneticos mori, & omnia ferè signa, quæ in illis lethalia sunt, convulsionem imminuentem significare, facile intelligit, qui prognosticum Hippo. legerit, & nostra in illud commentaria. Bilis viridis vomitus, & pessimum signum in eis est, & causa. Signum quidem, quia maxima pessima bilis redundancia significatur, cum adeo visa per os regurgitet: causa autem, quia laborante ore ventriculi, multum læditur per censum caput. Quod cum aliquo adeo laboraret, non potest non iam læsionem, sine magno, citiusque periculo sustinere. Convulsuntur ergo plerumque ex hoc malo, ut ex helioboro nunquam parum mori solent. Mentis ergo celeriter moriuntur. Nannulius quidem repente in ipso vomitu, nonnulli vno aut duobus diebus.

In febribus ardentibus & aliis, quibus collis dolor, & temporum granitas, & caligo in oculis, vel hypocondrij contentio sine dolore fit, his sanguis e naribus fluit. Quæ autem gravitatem totius capitis sentiunt cum morsu ventriculi & fastidio, ij vomunt pituitosa & biliosa, quibus in casibus maxima ex parte pueris convulsiones contingunt, mulieribus autem, & hæc & dolores ex utero. Senioribus autem, & quibus iam calidum vincitur, aut paraplexia, aut mania, aut privationes oculorum.

In prognostico eadem ferè scripta sunt, quæ hic, de fluxu sanguinis, & de vomitu. De vomitu quidem his verbis. Si quis per febre non exitalem, dixerit caput dolere, aut tenebrarum quiddam ob oculis versari, aut si oris ventriculi dolor in eo extiterit, biliosa vomitio aderit, sin frigus quoque prehenderit, & inferiores hypocondriorum partes frigidi fuerint, adhuc citius vomitio aderit. Si quid verò bibat, ceterique sub hoc tempus, per quam cito deunmet. De sanguinis fluxu dicit hæc. Quibus per talem febre dolere caput & pro tenebris ob oculos effusus hebetudines subeunt oculorum, ac splendor obvertitur, & pro oris ventriculi dolore, circa hypocondria, aut sinistra parte aut dextra, aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, ne, sanguinem de naribus in his fluere pro vomitione expectandum est. Magis verò & hic, in adolescentibus sanguinis fluxum expectari oportet. Agentibus verò trigessimum annum, aut etiam adultioribus, minus, sed vomitione in talibus expectari oportet. Ex his locis constat, hic cum dicitur, in febribus ardentibus & aliis intelligi debere non exitalibus, quia in exitalibus, mors potius succedere illis signis, quam fluxus sanguinis, aut vomitus: & ubi dicitur, neque cum dolore, intelligi debere, neque cum inflammatione. Nimirum non quivis dolor tollit imminenti fluxionis sangui-

nis signum, sed ille solum qui cum ardore, significare possit, contentionem hypochondrii à phlegmone fieri. Signis etiam vomitus addi debent, quæ hic omiſſa, & in prognostico scripta sunt. Verum ex his non semper fit vomitus, etiam omnia adſint, sed quibusdam aliis mali abſceſſus, ut pueris cum hæc adſint, solent conuulſiones accidere irruentibus spæcis qui commodi sunt, & non euacuantur, in nervos. Nimirum pueris familiarem esse conuulſionem antea etiam dictum est, & in aphorismis, & prognostico. Mulieribus verò hæc eadem accidit, & dolores uteri. Quia patienti ori ventriculi citissime consentit uterus, ob viciniam arbitror, & congenerem substantiam, & communem continuitatem per venas, & arterias. & quia utraque pars accipit nervos ex sexto pari eorum quæ oriuntur à capite. Nihil sine magis est experimento compertum, quàm laborante utero, statim pati ventriculum, & nauseare, ac euerſi, & cum ventriculus doluit, nisi exiguus admodum dolor sit, uterum etiam paulo post dolere. Ut non inutiliter neque sine ratione, soleant mulieres quæcumque parte circa totum ventrem dolere, utero statim prospicere. Solent enim plerumque, aut primaria, aut secundaria passione, laborare. Seniores verò qui repletionem habent capitis, quia calidum iam in eis vincitur, non possunt expellere fluxum sanguinis neque vomitu, tentant autem expellere eorum natura, facitque, ut abſcedat in alteram ex utero partem, & patiuntur paraplaxiam, aut trudit in oculos, & cæcitatem contrahunt: aut sanguis crassus & ater in eorum cerebro detentus, perturbat mentem, facitque maniam. Intelligi autem debet hic nomen manix, de quantis infania sine febre, dici. Senibus enim verisimilissimum est melancholias, quam furor fieri.

TEMPESTAS III.

IN Thaso paulo ante arcturum, & in arcturo, imbres multi, magni flante borea. Circa æquinoctium autem, & vsque ad pleiadas, pluuia austrina, parua, pauca. Hyems borealis, squalores, frigidi venti, magnæ nives. Circa æquinoctium autem frigora maxima, verborale, squalores, pluuia, pauca, frigida. Circa conuerſionem autem æſtivalis Solis, pluuie pauca, magna frigora, vsque ad canem, post canem autem vsque ad arcturum æſtas calida, æſtus magni, non paulatim crescentes, sed perpetui & vehementes. Pluuia non accidit, et æſte spirant, circa arcturum autem pluuia austrina, vsque ad æquinoctium vernum.

In multis codicibus hæc tempeſtas non est separata à proxima, sed coniuncta quasi sit illius pars: tertia verò incipit ab illis verbis, morbos dignoscimus. Mihi tamen melius videtur hoc loco separare tertiam tempeſtatem à secunda, & reliqua totius huius primi libri, ad hanc tertiam referre. Quia unicam tempeſtatem continet totus liber ex hoc loco, eamque longè diuerſam à duabus prioribus. Hæc

A tempeſtate non solum narratur quid integro æſte contigerit, velut in duabus superioribus, sed etiam etiam parte sequentis anni. Nimirum narratio incipit inde prius etiam, ab ortu arcturi, & præducitur vsque ad arcturum sequentis anni, & præterea vsque ad sequentis ver, ut tota narratio continet annum, & alteram anni partem. Nam primo arcturo acciderunt pluuie flante borea; & prima hyems fuit borealis, & cum squaloribus, sequenti autem arcturo & sequenti hyeme, acciderunt pluuie pluuie austrinae. Primus narrationis annus magna ex parte fuit frigidus & siccus, atque quanquam inæqualitatem magnam quædam partes attulerunt (si miramini in prima parte autumnum acciderunt multæ pluuia, & magna, & in tota ferè æſte ingens æſtas) tamen totus annus appellationem frigidæ & siccæ, ob id, quod magna ex parte fuit, accipere potest. Sequenti anni pars contraria omnino fuit, calida enim & humida, quia habuit pluuia austrinas. Age ergo omnes narrationis partes percurramus. In duas partes diuidit autumnum, primam intelligit, cum dicit paulo ante arcturum, & in arcturo (ea autem est vltima dies Augusti, aut prima Septembris, vsque ad dimidium ferè) secundam partem autumnum intelligit, dicens, circa æquinoctium autem, & vsque ad pleiadas (occasum scilicet pleiadum) est id tempus à dimidiato Septembri vsque ad primos dies Nouembri. Contra omniū accidit in his duabus autumnus partibus, ac frequenter solet: nam in prima flauit boreas, tamen pluit sæpè & multum: in secunda flauit auſter, & pluit sæpè & parum. Hyems tota fuit borealis, atque si qui alii venti flauerunt, illi omnes fuerunt frigidi. Merito ergo habuit squalores. Boreas enim cum non multum pluit, squalores facit. Atqui quanquam ea hyeme nives magnæ fuerunt, non fuerunt tam multæ, quin magna ex parte fuerint squalores. Addit, circa æquinoctium autem frigora maxima: Vbi considerandum, in duas illam partes diuidere non e ver, primam & secundam; & nunc ver vocare, non ut ante vsque ad ortum pleiadum. sed vsque ad solstitium æſtiale, quod est ferè in medio mensis Iunii. Nam cum dixisset, ver boreale, squalores, pluuie pauca, frigida, addit, Circa conuerſionem autem æſtivalis, quasi ver sit vsque ad hanc conuerſionem. Dicit accidisse à conuerſione Solis, siue à solstitio vsque ad canis ortum, pauca pluuia, & magna frigora. Ego verò non intelligo fuisse frigora magna, ut per hyemem (neque enim opinabile est) sed intempeſticia, id est maiora multo quàm eo tempore solent. Æſtatem diuidit hic Hippo. in duas partes, primam ante canem, secundam post canem. Canis verò est duplex, ut in commentariis aphorismorum diximus subtilis, maior est, quem vulgò vocant caniculam (Græcis dicitur Sirius:) minor est, qui ante canem nobis, Græcis procyon vocatur. Syds hoc est in Leone, oriturque cum Sole, mense Iuli, canis quidem circa medium, procyon, siue antecanis, decem ferè dies ante canem, utæque potest appellari canis. Nunc non explicat vsque ad cuius canis ortum dicat, fuisse pauca pluuia, & magna frigora, haud multum refert. Sed cum antinomie nomen canis de Sirio dicatur, ad huius vsque ortum putet quis illum dicere. Post canem vsque ad arcturum, æſtatem calidam, & vſiones magnas fuisse dicere,

non ex adiectione, id est non paulatim ingruentes, & per partes facta adiectione, sed repente: & fuerunt continentes, id est, citra intermissionem, & fortes. Pluvia non accidit (quæ causâ maioris ardoris oritur) erefse spirantur, sed cum non attemperarent, constat fuisse status quosdam calidissimos. Reliqua dicit fuisse pluvias austinas, usque ad sequentis anni ver.

In hac constitutione per hyemem quidem ceperunt paraplexia, & multis accidebant, & quidam illorum moriebantur celeriter. Etenim hic morbus valde popularis erat. Cetera autem transigebant sine morbo.

Magna ex parte annus hic fuit frigidus & siccus, tamen fuit mare varius, proinde luge diuersos morbos attulit: per hyemem primam, paraplexias: sequenti vere & æstate febres ardentes. Paraplexias quidem fecit multus humor, qui collectus per autumnum pluvias est in capitis hominum, & sequenti borea, & frigore densatus, ac velut concretus. Verisimile est autem hoc ipso tempore, quo multi paraplexici fiebant, aliis congeneres morbos accidisse, his qui plus læsi sunt apoplexias, iis qui minus corizas & vertigines. Paraplexia autem raro soluitur perfecte, & tunc, sed duos habet exitus, bonum quidem, cum in partis cuiusdam, ut brachii, aut cruris paralytum finitur. malum, cum in apoplexiam, quod multis euenit illa tempestate, qui repente moriebantur. Nimirum erat magna ægotandi causa, ac proinde, & ægotatio. Cæceta, inquit, transigebant sine morbo. Hoc est, tota illa hyeme non fuit aliud morbi genus, præter paraplexias scilicet & congeneres illos morbos.

Ante usque autem incaperunt febres ardentes, atque ab æquinoctio ad æstatem usque perdurauerunt, quicunque autem vere, & æstate inuenit, statim ægotare ceperunt, plurimi seruati sunt, & pauci quidem interierunt, autumno autem iam, & cum pluisset; lethales erant, & plures interierunt.

Febres illæ ardentes fieri poterint, & ex pituita salsa, & ex bile. Nam hyems, quia frigida, congeri fecerit pituitam in pituitosis, quia sicca, salisam: & in biliosis fecerit bilem congeri, cohibito effluui per frigus: & per siccitatem, fecerit eam esse acrem. Veniente ergo calore, bilis cohibita putresceret, & pituita quæ cum frigore obstructions & destillationes faciebat, cum calore faceret putridas febres: eas dicit ab æquinoctio ad æstatem usque perdurasse. Non tamen intelligit cœpisse vere, & æstate incunere extinctas esse, sed per totum ver, & totam æstatem durasse: non quidem eas ipsas febres, quæ inueniunt vere ortæ sunt, esse productas usque ad autumnum (non enim tam longæ erant: cum quibus longissima erant, quadraginta diebus iudicari, mox dicar) sed hoc genus febrium grassatum esse per totum ver, & æstatem. Qui vere & æstate inueniunt se bricitarum, minus lethales afficiunt etiam, sed plurimi læsabantur, pauci moriebantur. Nimirum illud morbi genus quum incipiebat, non erat adeo grane,

ac postea effectum est: autumno autem iam & cum pluisset, lethales erant febres. Nam tales etiam esse solent in autumno, & tunc ob austrium statum, & multam pluviam, maligna putredo fiebat: æstatis ultimam partem præterit, tamen verisimile est in ea fuisse febres magis lethales prioribus, & minus potestioribus. Quia causæ earum febrium iam intendebantur, cum duratione, cum etiam nono, magnoque eius partis æstu, & humor pluvius cum austriuo tempore, nondum venerat.

Fuerunt autem febribus ardentibus hæc affectiones. Quibus bene & largiter sanguis ex naribus fucebat, & ob hanc causam maxime seruati sunt, & nullum scio bene si sanguis fluxisset, in hac constitutione mortuum esse. Nam Philisco, Epamezoni, & Sileno, quarto & quinto die parum de naribus destillauit, & mortui sunt.

Febres ardentes semper ferè solent asserere fluxum sanguinis de naribus, sanguine sursum lato præ calore, & admista bile: & ea euacuatio in illis maxime prodest, quia ipsius venas & arterias per se vacuas putrescente succo, & eo, qui paratus est putrescere, & feruorem extinguit. Merito ergo seruabantur quibus sanguis fluxisset bene, decretorie scilicet, & tempestiue. Largitur, id est, pro multitudine ratione. Stillas sanguinis de naribus, partim vituperauit ante, partim postea in hoc ipso opere vituperabit non semel. Narrabantur etiam historici Philisci & Sileni.

Plurimi ergo ægotantium circa crism rigebant, & maxime quibus sanguis non fluxisset, superlegebant autem iidem, & sudabant.

Plurisque eorum qui liberati sunt fluxit sanguis, neque tamen omnibus, sed quidam alias iudicationum species habuerunt, velut quidam, rigores quibus successit sudor. Cuius speciei iudicationis in Apborismo etiam meminit, dicens, à febre ardente rigore superueniente solutio: dicit autem nunc, non esse iudicatos, quibus ita contingit vno rigore, sed riguisse iterum atque iterum usque dum ea uadant, in tanta enim succorum copia, & corporum densitate quam anni frigus fecerat, non potuit fieri aliter.

Quibusdam morbus regis sexto die accidit. Sed hoc aut per urinam purgatio, aut alius turbata inuabat, aut magnum profluvium sanguinis. Ut Heracleide accidit, qui iuxta Aristoclidem decumbebat. Atque huic & ex naribus fluxit sanguis, & venter turbatus est, & per vesicam est purgatus. Indicatus autem est sexto die, non ut Phana goreon seruus, cui cum nihil horum euenisset, mortuus est.

Multis dicit accidisse morbum regium sexto die, qui deinde purgatione per urinam, aut turbata alio, profluvio ventris, inuati sunt, aut omnibus hæc euacuationibus factis, quod accidit Heracleidæ. Illi enim qui morbum regium habuerant, nullam autem de-

Incipiens illarum evacuationum, mortui sunt, vclut Phanagoreon. Per febres ex bile factum esse regim morbum, haud est mirum, ceterum factio regio morbo deflexo, servatos esse, alicui videtur magis mirandum, eundem Hippoc. in Apborismo damnavit ante le primum diem factum regim morbum. Sed mirari desinet, qui quae de hac questione lib. 10. cont. ante sunt scripta, legerit. Vbi monstravimus Hippocratem non dixisse illud esse lethale, nodum admodum lethale, sed malum, ita tamen malum, ut possint multi cum eo signo liberari. Quod quidem Hippocratem & intellexisse, & vidisse, hic locus facit palam, quem constat, neque Aneroem, neque Plinium legisse. Ambo enim Hippocratem carpius, quasi dixisset, nullum cum eo signo liberari posse.

Profluvia autem sanguinis plurimis, maxime autem adolescentibus, & etate vigentibus, & moriebantur plurimi horum, quibus sanguis non fluxisset. Senioribus autem in morbis, aut ventres turbati, aut dysenteria, ut Bioni, qui prope Silenum decumbebat. Populariter autem grassabantur dysenteria per etatem: & quibusdam egrotantium, quibus profluvia etiam sanguinis facta sunt, in dysenterias finita sunt. Ut Eratonis puer & Magnus, magno fluxu sanguinis facto in affectionem dysentericam inciderunt.

Profluvia sanguinis merito calidis etatibus acciderunt, quia his per se est familiaris ea evacuatio, cum autem his qui robusti sunt natura, sit fluxus sanguinis, senibus qui sunt debiles, pro fluxu sanguinis sit morbus regius, aut diarrhoea, aut dysenteria. Cum autem accidebat iuvenibus & adolescentibus tamen esse debiles, ut non possent sanguinem effundere, constat gravius affectos eos esse quam senes, longior enim a sua natura aberat ea debilitas. Proinde moriebantur plurimi horum, quibus sanguis non fluxisset. Neque mirum est per etatem vulgatam esse dysenteriam, neque quibusdam, quamquam fluxisset sanguis, accidisse, nihilominus redundante omnes per partes bile.

Multus ergo hic succus, & maxime abundabat. Quandoquidem & quibus circa crifim non fluxit sanguis, tamen tubercula secundum arteras excitata evanuerunt. Hac autem cum evanissent, secundum ilium sinistram gravitas, & summam coxam. Doloribus autem per crifim factis, & urinis tenuibus exentibus, caperunt sanguinem exiguum effundere. Circa vigesimum quartum fiebat in fluxum sanguinis abscessus Antiphonti Critobuli. Qui ubi sedatus est, indicatus est perfecte circa quadragesimum.

Multum fuisse hunc succum, sanguinem scilicet biliosum, probat, quia quibus sanguis circa iudicium non fluxit copiose, multos deinde habuerit abscessus, & multas evacuationes, & tandem ultra fines omnes acutorum progressi, sine acutorum ex decedentia, qui est quadragesimus dies, atigerunt.

A Mulieres autem egrotaverunt multae, pauciores autem quam viri, & mortuae sunt pauciores. Difficile autem partum habuerunt plurimae, & post partum egrotaverunt, & mortuae sunt haec praecipue, ut Telebuli filia mortua est sexto à partu. Pluribus itaque in febribus mulieribus apparuerunt, quibusdam autem ex naribus sanguis fluxit, & virginibus multis tunc primum accidit. Nonnullis autem cum haemorrhagia etiam & mulieribus apparuerunt, ut Datharidis filia virgini apparuit primum, & ex naribus largi sanguis profluxit. Et nullam scio mortuam earum quibus horum aliquid bene evenit. Quibus autem accidit, uterogentibus egrotare, Omnes quas ego novi, fatus corruerunt.

C Dicit egrotasse pauciores mulieres vitis, & pauciores mortuas esse. Verisimile est illud accidisse ob mensuram illam evacuationem eis adeo, constantem, quae à multis morbis, & magnis periculis liberare solet. Fluxit copiose sanguis hac tempestate, mulieribus etiam, utque adeo, ut quibusdam menstruae evacuationes fluere, quibusdam quae virginibus febre correptis, tunc fluere primum, cum nunquam antea fluxissent, quibusdam simul hae, & de naribus, sanguis fluxit. Et nullam cui horum aliquid bene, id est pro multitudinis ratione, evenit, dicit Hipp. scire se, esse mortuam: nimirum erat evacuatio satis congruens morbi speciei, & magnitudinis. Vterogentes dicit hac tempestate periclitatas esse. Eas enim quae pepererunt, egrotasse post partum, & mortuas esse, eas autem quae egrotaverunt antequam parerent, edorpagisse seceris. Quod quidem cum aeris alteratione, & iis quae in sententis scripta sunt, satis est consequentium.

D Nam frigiditas temporis faciebat exiguum expurgationem per partum, quare & partum difficilem, & post hoc, morbus ille, qui tunc etiam epidemialis, qui cum alioqui esset acutissimus, partus labori insperantes lethalis evadere. Veram autem hanc & boreale facere ad abortum, tertio libro aphorism. dixit ipsemet Hipp. quod verò Telebuli filiam sexto à partu die mortuam dicit, a parte infirmam, quod in prognostico docuit, in muliere quae peperit, computationem diernam decretorum incipere debere à partu, & non ab ipsa febre, quare nunc illud verum sit, libro decimo controuersarum à me dictum est, in quo caput proprium habet ea disputatio.

E Urina autem plurimis, boni coloris quidem, tennes autem, & sedimento exiguum habentes cum deiectionibus tenuibus & biliosis. Multa autem iam indicatis in dysenterias desinit morbus, ut Xenophani, & Critiae. Urina autem aquosa, multa, pura, tennes post crifim fuerunt cum multo sedimento, & aliis bene indicatis. Idemini quibus acciderit: Bioni qui decumbebat iuxta Silenum: Critiae, qui iuxta Xenophanem: Artonis puero, Mestistrati mulieri. Post hac autem dysenterici facti sunt hi omnes,

quod quidem urinas reddiderunt aquosas, A febres ardentes; tamen & phrenetici tunc temporis plurimi fiebant, & moriebantur horum plurimi. Fiebant autem & estate pauci.

Dicitur quales urinae apparent in plurimis illa tempestate per morbos, boni coloris, inquit, & tennes. Has crudum morbum significare in prognostico scripsit, maxime cum sedimenta haberent, exigua, apparetque cum deiectionibus tenuibus & biliosis. Verum hæc narrat, ut quæ morbo ente in indicationem apparet. Multis autem aliis dicit indicatis iam, hoc est, cum febres ardentes tempus suæ indicationis excessissent, morbum esse in dysenterias finitum, ut Xenophani & Critæ. Quia scilicet reliquæ excrementorum biliosorum decumbentes in intestina, ea tadebant. Quibusdam etiam accidit post crism, id est post summum vigorem, alia ratio evacuationis, multa urina aquosa, pura, rennis. Talem autem solere iurare, Aphor. 69. partitæ 4. dictum est, multo sedimento existente, & aliis bene indicatis, hoc est, postquam multum boni sedimenti aparuerat, id quod summum vigorem fuisse indicauerat, & aliis bene indicatis, hoc est, secundum rationem factis aliis mutationibus per dies deceterioris, & contempnabiles. Hoc, inquit, accidisse Bioni, Critæ, Aretonis puero, Macetrati mulieri. Hos vero dicit tandem factos esse dysentericos, atque ut huius dysentericæ causam significet, dicit, quod urinas reddiderunt aquosas considerandum. Stenim biliosas reddidissent, esset expurgata bilis, cum autem aquosas reddiderint, retenta est, quæ deinde in intestina incidens, ea exulceravit.

Circa Arcturum autem multis indicium accidit undecimo die, & his non secundum rationem accidentis recidivæ, venerebantur. Erant autem etiam comatosi hoc tempore, plures autem pueri, atque hi moriebantur omnium minime.

Non narrat quæ eo autumno, à quo tota narratio incipit, euenierunt, sed quæ autumno sequentis anni, qui in tota narratione fuit secundus. Multos dicit indicatos esse undecimo die, atque his factas recidivas. Mirum autem quod viderit dicere, eas recidivas præter rationem fieri, cum nihil sit frequentius in Ananimo, illo præcipue, qui tanx interperiei succedens, ipse quoque insignem quandam interperiem afferebat. Verum quod Hippo. dicit, hoc est. Recidivas tam multas illa tempestate accidisse, ut illis etiam morbis, qui videbantur esse per se sedè iudicati, tunc, præter expectationem medicorum, recidivæ fierent. Itaque perinde est, ac si diceret, morbis etiam illis, qui soli esse videbantur, ut secundum rationem nullæ recidivæ viderentur eueniræ, recidivæ fiebant. Multi hoc tempore fiebant comatosi, ob humiditatem, arbitror, astitinam, atque hæc ipsa causa, maxime eo morbo sunt correpti, & ob calorem, & naturalium virium robur, maxime liberabantur fluxione sanguinis, arbitror, quia adolescentes, quibus sanguis non fluere, maxime mortuos esse illo anno, paulo ante dixit. Paucorum autem natura naturæ adolescentium vicina est, ut ætas ætati.

Circa æquinotium autem, & usque ad Vergiliæ, & sub hyemem, producebantur etiam

Ergo cum febres ardentes inciperent, significabant quibus lethalia impenderent. Statim enim incipientibus, febris acuta, parum rigebant, insomnes, anxii, sitibundi, fastidiosi, paulum exudantes circa frontem, & claviculas, sed nullas per totum. Multum delirabant, timores, tristitia, extrema subfrigida, pedes extremi, præcipue autem manus. Accessiones in diebus paribus, plurimis autem quarto die dolores maximi, & sudores plurimum subfrigidi, & extrema non iam recalcantia, sed livida, subfrigida, neque sitiebant. Adhuc his urina nigra, tennes, pauci, & alui fiebant, neque fluxebat sanguis ex naribus ulli eorum quibus hac accidebant, sed paucos stillavit, neque ad recidivam ulli horum res venit, sed sexto die mortui sunt cum sudoribus.

Refert quæ signa apparuerint iis qui per febres ardentes mortui sunt, ea vero sunt, quæ in prognostico lethalia esse dicit. Quædam vero eorum quæ refert, etiam assidentia, aut mox apparentia, cuiusmodi, febrem statim fuisse acutam, parum riguisse, insomnes, & anxios fuisse, & sitibundos, fastidiosos, parum sudantes circa frontem, & claviculas, multum delirasse, timidos, tristes fuisse, pedes & manus præcipue frigis habuisse, & accessiones fuisse diebus paribus, quædam autem erant superæuentia, quæque hominibus prope mortem iam constitutis eueniebant, à quarto die usque ad sextum, quo mortui sunt, cuiusmodi, quarto die dolores habuisse maximos, & sudores plurimum durasse subfrigidis, & extrema non iam recalcantia, sed livida, cum frigore, & sine siti esse factos, cum prius sitissent, & urinas fuisse nigras, tennes, & paucas, & suppressum esse alium, neque fluxisse, sed stillasse sanguinem. Atque hæc omnia lethalia esse, & quæ etiam de causa, in nostris commentariis in prognostico Hippocratis scripsimus, præter pauca quædam, quæ necesse est, ut hoc loco dicantur. Parum riguisse incipientibus febribus, non proinde malum esse dicit, quia multum riguisse melius foret, sed quia omnino riguisse per febrem ad dærem, cuius figuræ rigor non congruit, & ante tempus quo posset rigor esse iudicarius, nihil aliud poterat indicare, quam mali-

gram succorum qualitatem. Accessiones diebus paribus accidere per febres ardentes, & biliosas, deterius multo est, quàm in paribus. Nam cum tales febres habeant tertio quoque die accessiones, diebus paribus habent, cum secundo, quarto, sexto, & octavo, exacerbationes; primo autem, tertio, quinto, & septimo, remissiones habent. Sed quo pacto remissio esse possit die primo, cum nondum creuerit? videtur enim omnis febris intermissio, aut remissio, ex intensione fieri: certe in his non ita, sed primo die febris acuta incipit, & tamen semper crecit usque ad finem secundi diei, ita ut in secundum diem acerbissima totius periodi pars incidat. Fitque ita, ut primo die remissio febris fuerit, non quod iam remiserit, sed quod nondum creuerit, eodem modo sunt sequentes periodi, ut ex primo & secundo, ita ex tertio & quarto, & ex quinto & sexto, hoc verò constat multo gravior esse, quàm diebus imparibus accessiones esse, quòd scilicet gravior est, in crementum longam esse, quàm inclinationem. Accedit alia ratio ex dicturn decretorum vi. Cum enim magna ex parte impares sint magis iudicatorii: iudicatoris autem diebus facultates naturales multum iuuentur ab astris, sit, ut qui habent accessiones paribus diebus, minus adiuti, deterius ferant. Ut autem diebus paribus deterius habere malum est, ita quarto die gravissimum. Quia hic idem est par, & decretorius. Gravissimum autem esse diebus decretoriis habere deterius, dictum est superiori Tempore. Non sicut, cum febris ardens venisset ad summum, dictum etiam auctores, esse gravissimum: Corruptionem enim facultatis, aut delirium significat. Vrina nigra posse esse rebus, quidam negant, nos in contrarium affirmavimus, & probavimus. Hippocrates his egrorum fuisse ejusmodi narrat. Stillitidia, cum deberet fluere sanguis, aut omnino retineri, milles Hippo. viruperat. Mirum verò, quòd dicat, non habuisse homines recidivas, qui sexto die mortui sunt. Quo enim pacto haberent mortui? Verum Hippocrates innuit homines qui ita affecti essent, si omnino euassent, fuisse recidivas habituros. Nam cum tam gravibus symptomatis, si adeo facultas resisteret, tamen non potuissent nisi cum difficili iudicio, & cum recidivis liberari. Ergo quasi diceret nullus liberatus est, sed omnes perierunt: dicit nulli horum res venit ad recidivam, sed sexto die mortui sunt cum sudoribus. Sexto quidem die, quia hic dies pessimus est, & morbus erat acutissimus, quique si per impares moveretur, attigisset septimum, sed quia movebatur per pares, attigit sextum solè. Cum sudoribus, quia id morienti genus familiare esset, quibus innatum calidum languebat, & euolat.

Phreneticis autem acciderunt etiam, quae antea scripta sunt omnia, indicantur autem hi magna ex parte undecimo, quidam autem & vigesimo. Quibus autem statim non à principio phrenitis incipit, circa tertium aut quartum diem. Sed mediocriter habentibus in primo tempore circa septimum, in acutiem morbus enasit.

Quidam illa tempestate facti sunt phrenetici à principio egritationis, quidam aliquando febrici

Arantes, postea phrenetici enasunt. Verum perarum est, usque adeo ut non meminerim modo aliquando viderim, à primo febris die, ac multo minus, à primo insultu phreneticum fieri. Proinde Hipp. illud à principio innadere phrenitum, explicuit, dicens, circa tertium vel quartum diem. Atque hoc loco Hippo. ita virtus nomine phrenitum, ut à principio fieri dicat, quod intra primos quatuor dies. Quod ergo hic dicit, hoc est. Phreneticos habuisse omnia quae antea dicta sunt, hoc est, mortuos esse plurimos, & eos habuisse lethalia signa, quorum nuper facta mentio est. Ceterum non tam cito interiisse, quam eos qui ardente febre tenebantur; eos enim sexto die mori dixit, hos undecimo, ac nonnullos etiam vigesimo esse iudicatos: cepisse autem phrenitides quibusdam à principio intra primos febricitandi dies, aliis verò septimo die, cum antea mediocriter viderentur habere; eò quod sine delirio, & laeis essent accidentibus.

Multi itaque morbi fuerunt, ex laborantibus autem moriebantur maxime pueri, adolescentes, vigentes aetate, glabri, subalbidi, rectis capillis, nigris capillis, & nigris oculis, qui in otio & socordia vixerant. Aliam habentes vocem, & qui gracilem, & qui asperam. Balbi, iracundi, & mulieres plurima huius generis peribant.

Multos morbos dicit fuisse, multos scilicet & varios. Refert autem quales mortui sint maxime. Ut autem morbi fuerunt vari, ita ex illis variae naturae homines mortui sunt, non quidem ex omnibus omnes qui referuntur, sed hinc his, aliis aliis. Velut ex aliis pueri, adolescentes, vigentes aetate: ex aliis glabri, subalbidi; rectis capillis, & reliqui. Hi enim omnes frigidi sunt, illi calidi. Calidi ergo ex febribus ardentibus, & phrenitide frigidi ex paralexia & aliis frigidis morbis moriebantur. Nam aetates quas memorat, calidas esse, in confesso est apud omnes: reliquos qui in hac narratione continentur, esse frigidos, dictum; monstratumque est à Gal. lib. artis medicinalis, & à me in commentariis. Glabros dico, subalbidos, rectos habentes capillos, & nigros oculos, & balbos, & mulieres, degentesque in otio, & socordia. Sed quod nigros capillos, & habentes altam vocem, & gracilem, & asperam, & iracundos; inter frigidos commemorat, oportet considerare: Nam nigros capillos caloris esse signum lib. citato docuit Gal. estque ab omnibus receptum. Alta autem vox (quidam etiam legunt magnam) robur videtur significare in instrumentis vocis, quare & calorem. Iam verò iracundia multo magis videtur nasci ex calore: cum irascitur sanguis sit. Ceterum quòd ad nigros capillos attinet, censo, quod alio etiam loco meminisse me dixisse, non esse ab Hippo. scriptum *μυατρίψας*, id est, nigros capillos; sed *μυατρίψας*, id est, magnos habentes capillos; & *ἀσπερὰ* autem, id est, altam vocem habentes, dicuntur, qui habent, qualem eunuhi, & mulieres, & pueri, hoc tamen angustae vitae, ac proinde frigoris est, *ὕπερθε* autem, id est, gracilem vocem habentes; dicuntur; qui habent debilem, quod debilitatis instrumentorum signum est. Aspera autem vox asperitatem arteriae sequitur: hinc

anxia in excrementosis, ac frigidis non raro fit, *A*ptem est, id est, iracundi, dicuntur, non qui animosi sunt, sed qui leui de causa, atque sæpe, irascuntur, quod frigidum esse, mulieres indicant. Causa autem est in calidi innati debilitate, quod facit, & quavis causa molestiam subit. Verum hoc quoque, loco citato artis medicæ dictum est fufius.

In hac verò constitutione: ex quatuor pra- **B**
cipue signis seruabantur. Quibusdam enim
ex naribus sanguis fluebat, aut per vesicam
multa urina, & multum sedimentum & bo-
num habens procedebat: aut perturbata aluo
biliosa tempestiue exercebant, aut dysenterici
seebant. Multis autem contigit non ex viro sa-
pra scriptorum signorum iudicari, sed pluri-
mis per omnia excurrere, & videri habere **C**
grauius. Seruabantur autem omnes, quibus
hæc contigerunt. Fæminis autem & virgini-
bis contigebant etiam omnia antea scripta
signa. Quibus autem aut horum aliquid bene
sebat, aut muliebria largiter apparebant, per
hæc seruabantur, & indicabantur. Et nullam
non mortuam eam quibus horum aliquid
bene sebat. Phylonis enim filia ex naribus
largiter fluxit sanguis, cum autem septimum
iam attigisset diem, canauit intempestiuus;
mortua est.

Ipsas euacuationes vocat signa deceptoria. Erant autem simul signa & causæ. Nam & faciebant, & futuram significabant sanitatem. Erant autem quatuor, quæ dicit, sanguinis est nativus fluxio, & vrinx per vesicam, & biliosorum (biliosa vocat omnes putredinem præ se ferentes succos) fluxio per turbatam aluam, quæ quidem dysenteriam multas afferebat, & mæstrua fluxio, quæ muliebria vocat. Cum dicit purgatos esse multos vrina multa, multum & bonum sedimentum habente, non intelligit sedimentum illud, album, læue, & æquale, quod maximè probari potest. Illud enim non solet ad expurgationem esse satis, sed quod post hoc venit, multum, etiam in manula residet, & crassum, aut vatriam fit. Tale enim fieri solet, cum homo purgatur per vesicam, etiam salubriter. Bonum autem hoc loco est, quod est, quale euacuari oportet: velut in aliis euacuationibus deceptoris. Vt si purgatio sit febris, & post concoctionis signa multum succi crudi mingatur, aut si sit melancholica, & mingatur multum nigram post concoctionis signa. Hoc enim etiam est necessarium: nam hoc est tempestiuum esse euacuationem: scilicet, quæ ante concoctionis signa, intempestiue, quæ post illa, tempestiue euacuatur. Vtrumque autem necessarium esse, apte dicit ipse Hippo. addens, aut per turbatam aluam, biliosa, tempestiue. Nimirum biliosa id est qualis oportet euacuari, tempestiue, post signa concoctionis. Verum, inquit, accidisse multis, quod sæpe solet. Nimirum non indicabantur bene, cum primum hæc eueniebant, sed quamquam eueniebant omnia simul, aut eorum quædam, videbantur incipere ha-

bere grauius, nihilominus multo deerior conditio erat eorum, quibus nihil tale eueniebat; hæ enim moriebantur: illi autem etiam perdifficilem indicationem habebant multi, libebantur tandem omnes, & nullus mortuus est eorum, quibus horum aliquid bene fiebat, nisi magnopere in victum peccaret. Velut Phylonis filia, quæ etiam fluxum largum sanguinis habuit, tamen mortua est, quia septimo die, canauit laute, intempestiuus inquit, quia canauit quo die maxime debuit abstinere.

Quibus in febribus acutis, maximè autem
ardentibus, spontaneæ lachrymæ erumpunt, his
ex naribus fluxum sanguinis expectare opor-
tet, nisi alia lethaliter habeant. Quandoqui-
dem male habentibus non fluxum sanguinis,
sed mortem significant.

Quamquam narrare tantum ea, quæ circa ægros obleruabar Hippo, hoc libro ceperit, tamen nonnunquam occasione arcepta ab historia, per digressionem quædam ad artem pertinentia docet, velut antea non semel fecit, atque modo facit. Lachrymas spontaneas dicit significare imminens fluxum sanguinis de naribus: non tamen vrinæ, sed adhibitis quibusdam distinctionibus: nimirum non in quibusvis febribus, sed in acutis, atque inter has maximè in ardentibus, quia in his maximè solet fieri hoc genus indicationis: sed neque in his semper, sed cum ex aliis signis videtur homo esse salubriter affectus. Nam si non ita affectus sit, possint esse signum mortis. Quod quidem ab Hippo. ipso in prognostico cap. 2. dictum est, & à me eo loco explicatum.

Quibus febre indicatorie desinente, tu-
tores circa aures in febribus erumpentes
neque sedantur, neque suppurantur, hos **E**
diarrhæa biliosa, aut dysenteria, aut cras-
sarum vrinarum subsidentia soluit. Quale
quid Hermippo Clazomeno contigit.

Velut in Aphorismo dictum est, si diuturnitate superueniente diarrhæa solere solui. ita modo dicit, tumores quosdam qui ex febribus relinqui solent, neque resoluti, neque suppurati, solere solui diarrhæa, aut vrina copiosa. Est autem eadem ratio soluendi sanctorum & ea tubercula, & solutionis quæ superueniente diarrhæa, aut vrinx profusio fit. Vtrumque enim fit facultate succos in partem contrariam, & in vias euacuationis detrudente. Huius Hermippi Clazomeni morbus narrabitur paulo infra. Hic enim est ægrotus decim usque illorum quatuordecim, quorum historiam narratur in huius primi libri calce.

Quod ad indicationes, ex quibus dignosci-
mus, aut similia, aut dissimilia. Velut duo fra-
tres, qui habitabāt propè theatrum simul eadem **G**
hora cæperunt ægrotare, erāt Epigenis fratres.
Horū natu maiori iudiciū fuit die sexto, iunio-
ri autē, septimo. Rediit amobus simul lædè ho-
ra. Intermissi dies quinque. Ex recidua autē
iudiciū fuit utriq; simul omnino, decimo septi-
mo. Iudiciū autē erat plurimis quinto die. In-
termisisti septē dies, à recidinis autē iudiciū erat

quinto. Quibus autem erat iudicium septimo, intermisit septem, a recidina autem indicabatur tribus. Quibusdam autem erat iudicium septimo, habentes autem intermissionem tres, indicabatur septem. Quibusdam autem defixit sexto, & intermissiones habentes sex, arripuit eos tres. Quibusdam autem defixit primo, arripuit & indicatus est vnica, Vt Enagorzi De pharsidis. Quibusdam autem iudicium erat sexto die, deficiebat septem, a recidina autem indicabatur quatuor diebus, vt filia Aglaide. Plurimi ergo egrotantiū in hac constitutione hoc modo egrotabant, & nullum non eorum qui superauerunt, cui non contingerint recidiv secundum rationē advenientes. Et servabatur omnes quos ego noni, quibus recidina hac forma facta sunt. Neq; egrotantiū hoc modo cuiquam scio recidivum accidisse rursus. Mortui autem sunt egroti multi sexto die vt Epaminondas, Silenus, & Philisens Antagorei.

Nunc redit ad narrationem. Narratq; quibus diebus contigerit illa tempestate plerq; indicari. Dicit ipsa tempora, & modos iudicationum. Hinc enim vocat quę circa indicationes, ex quibus, diagnoscimus, partim fuisse similia in multis partim dissimilia plurimos enim liberatos esse omnino a morbis decimo septimo die, eosq; omnes eum vna recidiva, variē tamen id in illis factum esse, quibusdam his, quibusdam illis diebus, facta intermissione, & recidiva. Sunt in hac dictione quędam adeo difficilia in ipso verborum contextu, vt Galenus sensum solum explicans, dictionem corruptam esse censet, & culpam reiciat in libentarios. Mihi tamen videntur apte satis omnia explicari posse. Velut (inquit) duo fratres Epigenes, quorum natu maiori iudicium fuit die sexto, iuniori autem septimo, & amobus rediit simul eandem hora, & intermissio fuit dierum quinq; [cui scilicet minima] nam non potuit esse amobus eadem, sed iuniori fuit quinque, natu maiori fuerit sex dictum, nam iudicium fuit perfectum amobus decimo septimo, a primo scilicet die totius morbi. Quę recidiva quęq; dies amobus duravit. Aliis hoc idem alia ratione evenit; indicabantur imperfecte quinto, erant in intermissione septem dies, rursus renebantur recidiva quinq; indicabanturq; perfecte decimo septimo die. Aliis aliter etiam prima febris durabat septem, intermissio totidem, recidiva tres: fiebantque ex his omnibus decem & septem. Aliis erant primum iudicium septimo, durabat intermissio tres, recidiva septem, vt hic quoq; ex his septem, tribus additis, fierent decem & septem. Quibusdam (inquit) defixit sexto, & intermissiones habentes sex, arripuit tres, verum hoc minus videtur distis congruere. Nam ex his sex & tribus fuit tantum quindecim, sed hic Hippocratem dixisse, non quide[m] *εξ οκτώ τριών* id est tertio iudicati sunt, vt in aliis narratione, sed *ἐκ δέκα τε τριών* id est arripuit, aut male affecti tres, innuens scilicet, se non dicere, habuisse eos homines recidivam quę tres dies duravit, sed quę tribus diebus ar-

ripuerit, hoc est habuerit tres accessiones. Constat autem in tres tertianas accessiones, quales in acutis sunt, quinq; dies infundi, quinq; vero duodecim additis, faciunt decem & septem. Difficilis aliquanto est quod mox addit. Quibusdam (inquit) defixit primo, arripuit & indicatus est vna. Sed si quis attente consideret, ipsa rei difficultas aperit loci legitimum sensum. Nam primo die quo pacto defixerit febris, ardens, aut si primo die defuit, & vnam intermisit, rursusq; nō alio soluta est, quid aliud fuit quā tertianę, duos tantum paroxysmos fuisse? Sed quid hoc ad acutos morbos? Imo verò quid ad morbos mentione dignos? Ergo cum primo dicit & vnam, aliud quiddam intelligit, quānt diem. Quid illud sit considerandum. Certē in disputatione hac de diebus decretoriis, nunc numerāns dies, velut hoc loco in enarratis iā historiis, nūc septimanę, velut ibi dicit. *τρίτης ἡ ὀκτώτης* id est, alterius septimanę. Nunc impetus, velut in prognostico vbi dicitur *ἡ μὲν οὖν πρῶτη ἡμέρα αἰτίας θύει τὴν αὐτῇ, ἡ δεύτερη τὴν αὐτῇ, ἡ τρίτη μὲν πρὸς τῇ αὐτῇ, ἡ τέταρτη τὴν αὐτῇ* id est, primus igitur impetus eorū ita finit, secundus autē in hebdomadam perducitur. Est itaq; impetus vnus, quaternarius vnus, vna septimana septē dies, dies vnus, viginti quatuor horę. Neq; scio an sit aliud cui numerorū signa, in hac disputatione dari possint. Ergo quod mihi videretur posse dicere, hoc est, quibusdā febris defuit primo impetu, hoc est quarto die, arripuit rursū eos vna septimana exacta, vnde cum inquam die, a quo rursus vna septimana exacta, morbus perfecte indicatus est, decimo septimo. Alij indicabantur imperfecte sexto, transiebant dies septem sine febre, febricitabant rursus alios quatuor dies, indicabanturq; perfecte decimo septimo. In tota hac ditione illud est observandum Hippocratem vnicam dierum computationem facere a principio totius morbi vsq; ad finem recidivę, ac nō potius duas, quasi duo sint morbi. Atqui hanc esse legitimam rationem computandi, in controuersis a nobis demonstrarum est. Plurimos itaq; in hac cōsili ratione dicit hoc modo egrotasse, hoc est habuisse febres huius constitutionis, & nullum nouisse fecorum qui liberati sunt, cui non contingerint recidivę secundum rationem factę. Vocat secundum rationem factas recidivas, eas quę intra bostermi nos, his numeris, aut aliis similibus fiebant. Dico autem aliis similibus, velut Herophon, cuius postea in singularibus historiis mentionem faciet, novem dies febricitavit, quinq; intermisit, rursus febricitavit tres: et si qui alij fuerint, qui alii numeris febricitantes, & intermissionē habentes, decimo septimo indicati sunt. Ergo omnes qui decimo septimo iudicati sunt bene & tōd indicator dicit: neq; enim habuisse alias recidivas. His itaque qui liberati sunt ita evenisse, mortuos autem esse multos sexto die. Neq; mirum, si quidem hic dies semper vituperatur. Hę autē febres, vt antea dictum est, paribus diebus fiebāt grauiores. Philisici Antagorei historiam statim scribit seorsum Hippocrati in historiis singulares. Silenus hic non est ille, cuius paulō post mentio fit inrer egrotos quatuordecim. Ille enim obiit die vnde decimo, hic sexto, ambo autem hi sunt illimet, quorum non ita pridem, in hac ipsa sectione facta est mentio, quibus quarto & quinto sanguis stillavit.

Quibus autē fiebant parotides vigesimo indicabatur soluta sunt omnibus, quibus nō suppurabant, sed ad vesicam conuertebantur, Cratistionacta iuxta Heraclū, & pictoris ancilla suppurauit. Obiit Scymni pictoris ancilla suppurans. Quibusdam autem iudicium fuit septimo, intermisit nouē, repetiit, iudiciū fuit à recidina. Fuit iudicium septimo Phanocrito, qui decumbebat iuxta Gnatonem pictorem.

¶ Refert nunc alios, qui aliter iudicati sunt, eos quibus parotides fuerunt, dicit magna ex parte iudicatos esse vigesimo. Refert autem & speciem iudicationis. Quibusdam enim suppurasse, & eorum quosdam mortuos esse, velut Cratistionactæ & pictoris ancillæ suppuratio fuit. Obiit autem ancilla maiori abcessu quam ut ferri posset, & lethaliter computrescentibus quibusdā particulis (hoc enim innuit reperisse illud verbum, suppurauit) quibusdam non suppurasse dicit, hisque hene solutas esse parotidas, facta conuersione extremitatum ad vesicam. Nimirum ut soler surditas alui profluvio cessare. Cessarent verò & parotides alui profluvio & surditas profluvio vrine, ut nuper timē dictum est. Mox dicit quibusdam fuisse recidinas, ut nuper relatis, aliter tamen, hoc est, aliis diebus, habuisse enim iudicium prius septimo, intermisisse nono: quod ex ipsa pōtati qua antea etiam sæpe vsus est intelligimus non aliud esse, quam intermisisse novem dies. Repetisse ergo, & à recidina iudiciū perfectum habuisse, non in omnibus eisdem diebus, sed variis, Phanocrito quidem qui decumbebat iuxta Gnatonem septimo die à recidina.

Hyeme sub solstitium hyemale, & vsque ad æquinoctium, durabant quidem & causi & phrenitides, & moriebantur multi. Iudicia qui dē variarunt, & iudiciū fuit plurimis quinto die ab initio, quatuor intermisit, redijt, ex recidina autem indicabatur quinto, omnino autē quatuordecimo. Indicabatur autem & pueris hoc modo plurimis atque ætate maioribus. Erāt quibus iudicium erat undecimo, reuertebatur quatuordecimo, indicabatur perfectē decimo octauo. Si qui autem rigeant decimo octauo, his iudicium erat quadragesimo. Rigeant autē plurimi circa iudicium quod ab initio, quidam verò rigeant & circa iudiciū à principio & in recidinis simul cum iudicio. Rigeant autem paucissimi vere, æstate plures, autumno plures adhuc, hyeme autem longē plurimi. Haemorrhagia autem cessabat.

¶ Adhuc perstat Hippocr. explicare illud, quæ circa indicationes ex quibus dignoscimus similia, aut dissimilia. Narrat enim multorum indicationes, easque varias, & à dictis ante diversas. Hyeme inquit, & sub solstitium hyemale (secundam hyemem huius totius constitutionis intelligit) durabant causi, & phrenitides. Scilicet incoeperant ve-

re superiori, durabant tēdō vsq; ad æquinoctium sequentis veris, & moriebantur multi. Dictum enim etiā antea est, ab autumno coepisse mori multo plures. Variarunt autem iudicia: plurimis enim à principio fuit iudicium imperfectū quinto, quarto post hoc iudicium redibat febris: indicabantur rursum perfectē à recidina quinto, omnino autem & à principio morbi quatuordecimo. Et hæc quidem erat optima brevissimaque iudicatio earum quæ illo tempore contigerunt. Proinde iudicium huiusmodi cōtingebat pueris & ætate maioribus, adolecentibus scilicet & iuuenibus. Quibusdam erat iudicium primum vudecimo, redibat febris quatuordecimo, & indicabatur perfectē decimo octauo. Decimus octauus quidem non est insignis inter indicarios, tamen quibus dies potest nonnullos iudicare perfectē. Atqui, si quid valet numerus à die recidina (videtur autem valere hoc quoque nonnihil) erat quintus. Quidam horum hoc die, qui à principio erat decimus octauus, rigeant, neque indicabantur perfectē. Atqui eum hoc die, qui fere est terminus acutorum simpliciter non possent eos natura perurgare, decidebant morbi ex acutis. Quare quadragesimum attingebat, qui talium est finis. Hunc autem motum, quem rigorem vocamus, dicit accidisse multis circa iudicium à principio, hoc est circa imperfectū illud iudicium quod ante recidina fiebat, quibusdam & circa hoc iudicium, & in recidina, circa iudicium vltimum.

Neque mirum, multas enim ardentes febres rigore solui, in apborismo dictum est. Rigeant autem, inquit, paucissimi vere, ætate plures, autumno plures adhuc, hyeme autem longe plurimi, hæmorrhagiæ autem desicchant. Ergo vere quo erant paucissimi rigores, erant plurimæ hæmorrhagiæ, nimirum à vere in æstatem & autumnū discedente sanguine, bile per hyemen retenta, & aliis euacuationibus præ ætatis frigore suppressis.

¶ Quoad verò affectiones ex quibus morbos dignoscimus, discemus ex communi omnium naturā & cuiusque propria, ex morbo, ex egroto, ex iis quæ offeruntur, ex offerēte. Facilius enim & difficilius ex his, ex tota constitutione & secundum eas partes, & cuiusque regionis, ex consuetudine, ex vltu, & vitæ genere, & cuiusque ætate, sermonibus, moribus, taciturnitate, imaginationibus, sensibus, perurgiliis, insomniis quibus & quando, emulsionibus, pruritibus, lacrymis, ex paroxysmis, deiectionibus, vrinis, sputis, vomitibus. Et quæ ex quibus, in quæ, successiones morborū, & abcessus in mortem, & in utilitatem. Sudor, rigor, frigus, insis, sterilitas, singultus, spiritus, ructus, flatus siles, strepites, hæmorrhagiæ, hæmorrhoides, & his

causis & quæ cum his accidunt considerandum. ¶ Nunc per digressionem docet Hippocr. signa omnia quibus uti solemus in morbis ad dignoscendum. Summa capita, breui quadam distinctione comprehendens, eorum quæ diffusè aliis in locis scripta sunt. Sunt autem multa in morbis quæ dignotione indigent. Nimirum qui sunt morbus, & quæ

quam periculosos, & quæ sit morbi constitutio. Quædam signorum, quæ nunc commemorat, vnum horum, quædam duo, aut omnia significare possunt. Velut hæc prima: Ex communi enim omnium natura, & cuiusque propria, ex morbo, ex ægroto, & ex illis quæ offeruntur, & ex offerente, cognoscere possumus facilius an difficilior affectus sit homo, hoc est, quam grauius ægroter. Nimirum affectiones omnes, per quas videtur homo longe abesse ab eo, quod est secundum naturam, cum communem omnibus hominibus, tum vel maxime sibi propriam, graues sunt: per quas longe non abest, sunt leues. Atqui hoc idem est, quod in initio libri *ætiæ* *inferior* dixi, similia ne sint, an dissimilia. Si possemus singulorum naturas nosse, haud multum laboraremus in discernenda communi, sed quia non possumus, communem nobis proponimus, quam intuentes, de signorum magnitudine censemus. Memini autem me alibi docuisse modum, quo possumus ex multis communibus proximè accedere ad noticiam naturæ singularis, cuiusque hominis, etiam ignotis iam verò ex ipso morbo dignoscitur petiuli magnitudo. Sunt enim quidam per se graues, quidam leues. Phrenitis enim, pleuritis, aut peripneumonia, & febris ardens, vel ipso nomine nos perturbant, tertiana autem, & quartana, ac multo magis coriza, aut diarria febris, statim continentur. Sed & ægrotus, & quæ offeratur, & qui offert medicos, significare non parum possunt. Si quis enim videt robustum hominem, & laborum, doloremque patientissimū, iacet, aut magno pete angitur, ne lethalis morbus sit: si vero in delicata muliere hæc eadem videt, haud multum curat. Quinimò terretur magis, si hæc subito nunc in morbis tacitam, & plus solito quietam considerat, tam potest ipse ægrotus indicare. Quod si ad ægrotum iam aliquot post accessum, & interrogantes agnoscimus, nulla remedia esse adhibita, statim coningit opinari, morbum quidem per se non esse adeo grauem, sed per negligentiam fieri, ut daret, atque adeo leuissimum esse putamus: si etiam sine remedii mediocriter fortiter. Si vel multa adhibita sunt, & homo videtur parum aut nihil inuictus, siquidem medicum petitisimum esse putamus, imputamus id morbi magnitudini, seu imperitiorum agnoscimus, imputamus fortasse medico. Quæ tanto magis timemus homini, quanto plura acta esse videmus: tanto minus, quanto pauciora (hocque est ex oblati discernere) & tanto timemus plus, quanto nobilior est medicus, tanto minus, quanto ignobilior. Quod quidem est dignoscere, ex offerente. Ex his ergo agnoscimus, facilius an difficilior homo laboret. Ex his quæ mox sequuntur, & hoc, & constitutionem, speciemque morbi, nam ex tota constitutione aëris, hoc est, ex modo quo aër affectus sit, siue eam affectionem afferat anni tempestas, siue pars corporis. Velut, si in Libia, aut Delo sumus, siue cuiusque regionis temperies, & in quacunque regione, oppidi: quæ vel ex regione nascantur, vel ex ipso oppidi situ, siue locatum est in humilis, siue in alto loco, siue spectat meridiem, siue septentrionem, siue orientem, siue occidentem Solem. Sed quo pacto hæc speciem morbi significant? Quia eius morbi suspicio statim subit non immerito, quia ea constitutione grassatur, vel illi anni tempore, aut regione, aut omnino urbi familiaris est. Sed & consuetudini hominis, vidui, & vitæ generi,

A & ætati, sunt quidam morbi familiares. Si quis enim iuualet consuevit crebro, multumque, aut vociferari, aut inordinare, & intempestiue mœneri, si etiam talido victu vixit, & quod ad vitæ genus attinet, est faber ferrarius, aut cursor, & ætates calidiores agit, profecto biliosis febribus facile corripitur, statimque timetur in huiusmodi homine id genus febris. Contra, si placidissimus, mansuetusque homo, frigido victu vixit, & piscatoriam artem exercens, & qui calidiores iam ætates excesserit, febre corripitur, ex frigidioribus succis eam pendere statim suspicamus. Speciem ergo morbi ita agnoscimus. Constitutionem verò, eodem fere modo. Quia si eadem specie morbi, calidioribus temporibus, & locis, & victui, & vitæ generi, & ætati, breuiores: frigidioribus, longiores sunt. Sed & periculum maius aut minus ex his agnoscimus, agnita prius morbi specie, considerantelque an is sit congruens, an non. Nam ut in Aphorismo dicitur, in morbis minus periclitantur, quorum natura, ætati, aut regioni, congruit morbus, quam quibus affinis non est. Ex his etiam quæ sequuntur significationes sunt, ex sermonibus, ex corporum moribus, ex taciturnitate. Nimirum ex sermone. Quo in genere est loquacitas, aut taciturnitas, atque in loquacitate modi. In his considerantes, quod secundum naturam inest, & quod præter naturam, non minimum argumentum capimus magnitudinis ipsius affectionis. Velut si qui taciturnus est natura, modò multa loquatur: aut contra, qui verbosus, modo semper silcat, utrumque est infans genus, & gravis mali nota. Si verbò loquax loquatur, aut taceat taciturnus, nihil mali est. Sed quod ad motes attinet, explicemus. Si quid de Deo semper, & rebus ad pietatem pertinentibus loqui consueuerat, repente nunc ad lenonum verba translatum sit, aut philosophas nunc repensè totus in armis, aut remercatoria, sit, aut leno de vita monastica, & miles de dialecticis loquatur, mente commoti esse ii omnes videantur. Si quidem nullus loquitur suo modo. Imaginationes partim ipsis sermonibus agnoscuntur, partim aliis signis. Velut qui vociferabatur, pellis in cubiculo ribicinis, imaginationem sermone prodebat: nutibus prodit, qui muscas frustra venatur, aut festucas colligit. Atqui imaginationes vanæ, ac falsæ, cum superueniunt, mortem, cum à principio adsunt, phrenitidem indicant. Somnum & vigiliam indicare in morbis posse, multis in locis ab Hippocrate est dictum, generatimque in Aphor. Somnus & vigilia utraque si modum excedunt, malam. Sed addit, in somnis quibus & quando. De præfagitione ex insomniis seorsum est scriptum ab Hippocrate, Aristotele, & Galeno. Hic breuissimè perstringit, quæ sunt in illis consideranda. Considerandum, inquit, est, quæ sint, & quando. In primis illud, quæ sint, species & partitionem insomniorum continet, quando autem, tempus quo sint. Insomniorum enim quædam sunt diuina, quædam naturalia. Diuina sunt, quæ inspiratione aliqua demonis fiunt: demonis autem, boni aut mali. Quæ sunt sine inspiratione, sunt naturalia. Possunt autem utraque significationem certam continere, aut esse vana. Nam nonnunquam à bono demone per insomnia rerum quarundam vñum admonemur. Ut accidit Danieli, & Iosepho: illudimur autem sæpe à malis demonibus, per insomnia representantibus

vana quædam. In naturalibus eodem modo, quædam ex quibusdam corporis affectionibus, aut passionibus, quæ ab externis causis accipit, nascuntur, quædam casu quodam, & causa inopinabili. Non aliter, ac expergefactus nonnunquam, insperatè per mentem obseruantur: atqui, velut inter colloquia solet quorundam nunquam expectata mentio incidere, ut ipsi collocutores mirari soleant: insomnia ergo, quæ non sunt vana, certas significationes habent. An autem vana sint, intelliget, considerans, quæ sint, & quando. Si enim ad res tutæ pertineant, aurinutiles. Ceterum est, non esse à bono demone, sed vel à malo, vel naturali quapiam causa. Neque verò si ad res honestas, aut etiam ad diuinum cultum pertineant, statim à bono demone esse putandum est. Possunt enim esse etiam à malo, vel naturalia. Considerandum ergo omni ratione, an subtilia boni specie possit malum aliquod, aut deceptio subesse: neque, etsi non videatur subesse posse, statim à bono demone esse, confide, sed cautè sustine, vsque dum quid velis, Deus manifestè declaret. Ita verò te compara, ut cures numen exoratum, ne te tua culpa falli permittat. Si tunc quidem non repentat, naturalia esse putata. Ad quæ, in considerationem adhibe, quando fiant. Si interdiu talia quædam locutus, noctu illud somniet, vanum somnium est, nihil significat. Nam accidit in his, quod in aliis signorum generibus. Nimirum si ex manifesta causa nascuntur, nullam habent significationem. Neque si post multos cibos, aut multam ebrietatem somnium accidat, significare quiddam putandum est, quiddam somniatur. Sed si sobrio iam homine, & cocto magna ex parte cibo, somnium accidit, non exigam præstat significationem, quorundam corporis affectionum, & morbi exitus: an inquam morte, an salute finiendus sit. Sunt horum multa exempla apud Hippocratem, & Galenum citatis libris, quæ non retere hoc loco persequi. Addit euulsionibus, pruritis, & lachrymis. Euulsionem autem sunt, velut palpebræ, labii, aut nasi eversio, & genitalium, & testium reuulsio. Pruritus autem sunt, vel totius corporis, vel partis cuiuspiam, ut in naribus fieri solet. Lachrymæ sunt, vel voluntariæ, vel spontaneæ. Hæc autem quid possint significare, in prognostico ab ipso Hippocrate scriptum est. Quæ nunc addit, consideremus. Ex paroxysmis, dicit. Ad hoc genus signi pertinet illa sententia. Febres quæcumque non intermittentes tertio die vehemensiores sunt, periculose: & quædam quas mori, de febrium figuris, hoc ipso sermone scribit. De deiectionibus, urinis spiritibus, & vomitibus, propria capita scripta sunt in prognostico. Et quæ (inquirit) ex quibus, in quæ successiones morborum. Quid dicat, quæ ex quibus successiones morborum, non est obliuiscimur. Est enim considerandum in permutationibus morborum, qui morbi ex quibus habent. Sed quod dicit, in quæ, aliquando est obliuiscimur. Videmus enim dicere, quæ in quæ, id est, qui morbi in quos morbos: Sed si hoc dicit, quid aliud si dicere, quæ in quæ, quàm quæ ex quibus? Verum aliud est, illud in quæ. Quod ut explicemus. Addit, & abscessus in mortem & vilitatem.

Nimirum ut antea explicauimus, abscessus vocat Hippocrates omnem morbum in morbona mutationem, ex verò nonnunquam fit cum magno malo hominis, & lethaler, velut pleuritis in peripneumoniam, peripneumonia montatur in tabem: nonnunquam fit cum vilitate, cum scilicet, sequens morbus liberat à priori, velut de quantanis febribus, mox dicit. Atqui de his abscessibus bonis & malis, antea in hoc ipso opere differuimus. Ergo, inquit, considerandum quæ affectiones ex quibus affectionibus fiant, in quæ, hoc est, in mortem aut vilitatem. Addit, sudor, rigor, frigus, rursus, sternutamenta, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes. Sudorem cum dictis euulsionibus coniungere posset, habet enim etiam hic, velut illic, in prognostico proprium caput. De significatione quam præstat posset rigore per febres acutas (præterquam quod quorundam intermittentiū febrium specie quendam indicat) scripta sunt sparsim multa: velut, illud, in febre perpetua si sexto die rigores fiant, lethale. Et illud, ei qui à febre ardente tenetur, rigore superueniente, solutio. Cum dicit frigus, intelligere potest illam refrigerationem, quæ inuadentibus quibusdam affectionibus fiant, aut omnino frigus, utcumque incidat. Vtroque enim modo significat speciem febris, aut periculi magnitudinem. Est enim frigus circa extrema in intermittentibus pirustosis, & in perpetuis lypthis pathognomonium, in aliis acutis, mortis signum. Velut in prognostico, & Aphorismis, non semel scriptum est. Atque adeo in historiis huius libri cui nunc incumbimus, crebra mentio fit, sudoris, rigoris, & frigoris. Quin & rursus potest significationem præbere, nunc passionis, ut in plenitudine, nunc periculi, ut securitatis. Sternutamentum perinde, & singultus, & spiratio. Nam in prognostico inter bona signa testatur Hippocrates bene spirare, & facile exhalare, inter mala verò spirationem magnam esse, & crebram, & difficile exhalare. De respiratione seorsum in eodem libro multo plura, multarum dispoñit specierum dicens causas, & generatim magnam vim habere facilem spirationem in omni morbo acuto. De sternutamentis quoque in eo libro ita scripsit. Sternutamenta per morbos circa pulmonem, præiæ & subsequi malum est, sed ex aliis morbis exiosis sternutamenta vtilia sunt. Singultus multus, pessimamque significationem, in Aphorismis docuit. Ab ileo, inquit, vomitus, vel singultus, desipientia, vel consulsio, malum. Rursum, in hepatis inflammatione singultus, malum: & à vomitu singultus, & oculorum rubor, malum. Addit, ructus, flatus silentes, & strepentes. Ad prognosticam ex ructu, pertinet illa sententia. Ex longis leuitatibus intestinorum, si ructus acidus fiat, qui anrex non erat, bonum. Sed & illa. Acidum eructans, plenitudine non admodum capiuntur. De flatus, qui cum crepit, aut sine crepitu exeruntur (hos enim vocat silentes, & strepentes, in prognostico, ita differuit). Si flatus sine crepitu exeruntur, optimus est. Maior verò est, cum erumpit cum crepitu, quàm cum reconditur ac reuoluitur. Quid si ita exeruntur, indicat hominem dolorem tenere, aut delirare, nisi spontè flatus emiserit. Ex hæmorrhagiis utinam, præcipue

autem ex hæmorrhoidibus, multa docet Hippocrates præferre. Velut in georhetico. Sanguinis ad digerendum latus eruptiones, malæ. Et rursum. Post sanguinis eruptionem diæctiones nigre malæ. Et rursum. Ex hæmorrhagia rigores muli. Et multa alia ad hoc signigenus pertinentia libro illo. Et de hæmorrhoidibus illud in Aphorismis. Ab ætæ bile, & phreneticis hæmorrhoides superuenientes, bonum. In quibusdam codicibus inter, verbaila, strepentes, & hæmorrhagie, interiectum est *propter id est*, bilios: tamen suppositum esse puto significat, status strepentes biliosos, hoc est, qui ipso sonitus modo significant, multam bilem fluitantem in intestino contineri. Vnde hoc sonitus *propter id est*. Ex his, & quæcumque ex his accidunt, considerandum. Hoc est, considerationes prognosticæ capi debent ex his, & ex omnibus, quæ ex eis sequuntur. Quæ verba nolum sine consideratione præteriri. Continent enim partem quandam prædictionis vtilissimam. Ea verò est, ex his quæ ex quocunque signo nascuntur. Multa enim sunt signa, quæ nunc mala, nunc bona sunt, aut nunc lethalia, nunc non adeo, propterea, aut illa ex eis nascuntur. Nimirum ad prælagi similitudinem, semper sunt adiungenda alia signa, & in multis expectandum est, quid superveniat. Velut in hæmorrhagiis, de quibus nunc dicebamus, si post multum sanguinis fluxum, singultus, aut convulsio sit, malum. Si verò sine his, sit febris solitaria, nihil fluxu sanguinis melius est. Sed & in aliis signis considerandum, quæ ex quibus fiant. Velut in singultu, sterilitas superveniens, liberat. Et à longo alui profluio, vomitus spontaneus superveniens, solvit; & à vomitu singultus, & calorum robur, malum. Et à fadoie horror, non bonum. Et ita in aliis omnibus signis fit, ut quædam ex quibusdam deteriora, aut meliora sint. Nimirum ea quæ antecedunt, aut sequuntur, signorum quorumcumque causam declarant. Sed quia hæc multis aliis in locis pertractantur, hæc de eis habemus.

Febres quædam sunt continuæ, quædam interdictæ tenent, nocte intermittunt, aut nocte tenent, diæ intermittunt sunt; semitertiana, & quartana, quintana, septimana, & nonna.

Cum digredi ex præceptis Hippocrates ad disputationes quasdam ad totam artem necessarias, atque generatim de signis omnibus dixerit, nunc de febribus generatim dicere incipit. Quia illi morbi, maxime, qui cum febribus sunt, populares esse solent. Incipit ergo à partitione febris, quam quidem accipit à propria earum figura. De febrium differentia seorsum scripsit Gal. multa, in quem etiam librum iam ego edidi commentaria, atque adeo ego libellum quendam seorsum semper de febribus, præter multa quæ in controuersis, & aliis locis. Proinde nunc facta erit Hippocratis verba explicare. Nisi suppleatur quædam, non possit partitio hæc non videri parum dialectica. Ceterum in Hippocratis enarratione, merito petimus permitti nobis suppleri quædam, quæ tacuit ille, ut semper esset breuiologus. Possimus quidem censere hanc partitionem febrium omnium esse, quamquam possumus etiam censere ad

solas eas, quæ ex succis sunt pertinere. Sed pertinent ad omnes. Nam duo genera, hæc quæ, inquam & diæ in continentibus sunt. Ego hæc est partitio. Febres quædam continuæ sunt, velut hæc quæ, diæ, & quædam putridarum: quædam intermittentes. Intermittentium, quædam quotidianæ, quædam tertianæ, quædam quartanæ, quædam quintanæ, quædam septimanæ, quædam nonnæ. Quotidianarum, quædam nocturnæ, quædam diurnæ. Tertianarum, quædam simplices tertianæ, quædam semitertianæ sunt. Sed cur nocturnæ aut diurnæ quotidianas solum intelligit, cum tertianis etiam, & quartanis, accidere possit, ut nocte teneant, aut diæ? porro cur semitertianarum mentionem facit inter differentias simplices, cum sint compositæ? aut si ad compositas quoque voluit partitionem ducere, cur non meminit quartanæ cum tertiana, aut quotidiana? videtur enim aut deficere multa in partitione, aut reddere quædam. Sunt multa, qui non satis capientes methodum Hippocratis, censent illum fuisse dialecticè signatum. Ego verò confesso habuisse illum dialecticam quandam, vulgari viliorem. Nimirum non persequatur omnia usque ad minima, sed nullam vtilem partitionis rationem omittens, in singulis tantum scribebat, velut exempla, quædam, quorum mentio maxime ad vtilitatem artis videbatur esse necessaria: ut reliqua supplerentur, vtilissimorum autem haberetur ratio maxima. Velut modo oportet nos ita persequi partitionem. Febres quædam sunt continuæ, quædam intermittentes; hæc quotidianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, septimanæ, aut nonnæ. Rursum hæc omnes nocte aut die invadentes, porro ex his simplicibus, compositæ scilicet possunt multis modis. Febrè semitertianæ; & alie multæ. Tamen nulla compositarum, tant insignem differentiam, & mentione dignam habet, quam semitertiana. Quia, ut mox dicetur, in semitertiana vocatur, morbi accidit acuti, & aliarum omnium hæc est maxime lethalis. Atque, inter diu teneant noctu, in nullis adeo refert, atque in his, quæ quotidie affligunt. Quia hæc aut omni diæ, aut omni nocte laborem inferant. Hæc est methodus Hippocratis quam alibi etiam aperuimus.

Sunt autem acutissimi & maximi, & gravissimi morbi, & maxime lethales in continuæ febre.

Satis erat dicere acutissimi, nec opus addere maximi, & gravissimi. Nam quæcumque illud nomen acutissimi, per se solum celeritatem, & brevitatem morus significet: tamen medici, ut acutum morbum vocent, non sunt contenti hac acutè, sed magnitudinem præterea morbi, & periculum adesse volunt. Hippocrates tamen modo singulis nominibus propriè utens, expræstet omnia, quæ morbis acutis adesse debent. Nimirum debent esse acuti, id est breves, & magni in essentia propria, & graves. Atque ut explicaret rem magis, addidit, & maxime lethales; hi autem sunt, qui gravissimi. Hos dicit fieri in febre continuâ, hoc est, cum continuâ febre semper, siue in ipsa febre continuâ habeat essentiam morbus, ut febris ardens, & semitertiana; siue febris sit morbi accidens, ut in pleuritide, & phrenitide, & aliis inflammationibus internis. Non intelligo autem hæc dicere Hippo-

eratem, quodd nunquam sine febre acutus morbus fieri possit (nam syncope, catus, & apoplexia acutissimi, maximi, & maximè lethales sunt, tamen sine febribus plerumque fiunt) sed quodd plerumque cum febre fiat, tuncque cum continua. Nam quæ intermitit, quia periculo vacat, simpliciter acuta esse non potest, sed tantum constitutione, vt tertiana exquisita.

Securissima autem omnium quartana, & facilissima, & longissima. Hæc enim non tantum ipsa per se ipsam, talis est, sed ab aliis morbis magnis liberat.

Securissimam dicit omnium. Cum tertianis, & quotidianis, quæ sunt febres crebrè occurrentes, collationem fieri intellego. Nam septimana, & nonna, videtur securior. Facillimam dicit curatam, quæquam vulgus hominum incurabilem dicit. Verum non est breui curabilis. Sed facilissima, & longissima. Quod est, intra suam constitutionem, quæ quidem longissima est omnium crebrè occurrentium (nam nonna longior etiam est) facillimè curari. Nam victu liberati, & ratissimis curationibus, & vsu longo quarundam rerum, haud multum medicamentosarum. Quod si dicas, hoc non esse curari quartanam, perinde est, ac si dicas, non curari febrem ardentem, quæ non tam breui, quàm angina finitur. Nimirum vt non est omnibus eadem constitutio, ita neque æquè longa ratio curationis. Atque longè aliud est, breuem esse curationem, aut facilem. Nam vt angina est difficilissima, & brevissima curatione, ita quartana facilissima & longissima.

In semitertiana vocata accidis acutos morbos fieri, & est reliquarum hæc maximè lethalis. At qui tabe & aliis morbis longis agrotant, in hac maximè affliguntur.

Non parum comprobant, ea quæ modò affirmat de semitertiana febre illa, quæ prima tempestatè huius libri, accidisse dicta sunt. Nimirum multi agrotauerunt semitertianis lethaliibus, quorum plerique tabe laborabāt. Atqui quod dicit est, semitertiana esse acutum morbum: neque hoc quidem dubium est, cum sit altera ex parte continua febris. & præter eam, habear aliam intermittentem. Dicit etiam esse, maximè lethalem: quod fit, quia nulla febris acuta est, quæ tam crebrè, & tam continenter, variis symptomatis feculata affligatur. Et tabidi, atque quædam longis morbis laborantes in acutam febrem ex longa incidunt, in hanc maximè incidunt. Quia per debilitatem facultatum congerunt cruda, & per hecticum calorem, aut longam febrem, congerunt bilem. Atqui, ob diuersitatem agrotationis contingit varia membra variè laborare. Ex duplici autem hoc succo, in variis membris redundante, contingit hæmorrhæo corripi. Porro quoniam hæc habet semitertiana febris, diximus scorsim illius factam mentionem hoc in loco, in febrium partitione.

Nocturna non valde lethalis, longa tamen diurna longior: quibusdam autem in tabem vergit.

Omniem quotidianam longam esse dicit: siquidem nocturnam longam, & diurnam longiorem. Porro diurnam dicit longiorem nocturna, & magis lethalem, adeò vt quibusdam in tabem inclinet. Hæc tabis nomine significatur extenuatio magna, quæcumque causa fiat, non ea solùm, quæ ex fœdido siccere pulmonis nascitur. Duplex causa est, quæ diurnam deterior est. Primum quia magis secundum rationem est, febres fieri maiores noctu, cum corpora densiora, & minor dissipatio, & maior confluxio extenuentur ad interna, quàm diu, cum sunt his contraria; affectionibus autem omnibus, accidit esse grauioribus, tempore, secundum quod non congrunt, quàm eo secundum quod congrunt. Deinde, quia minus opportuna est curationi diurna, quàm nocturna: quæ tempus diurnum occupat paroxysmus, nocturnum solum superest cibus, & medicamentis. Quare nullum quieti & somno. Et autantur ægroti multum à comuni hominum consuetudine, laborandi & capiendi cibos inter diu. Accedit (quod est maximi momentum) febres diurnas minus venire ad infebritationem quam nocturnas, quia earum inclinatio incidit in vespèram, quæ hora morbi omnes exacerbantur, vt lib. 4. dicit his verbis. Quale est ad vespèram exacerbari, tale in omni morbo.

Septimana longa, non lethalis, nonna longior adhuc, non lethalis. Tertiana exquisita, celeris indicationis, non lethalis. Quintana verò omnium pessima, etenim ante tabem, & diu tabidis superueniens interimit.

Quartana, & quæ longiora intervalla habent, longissimæ sunt, tertianæ brevissimæ. Quæ causa quintana sit omnium febrium intermittentium pessima, & ante tabem (extenuationem) hinc quoque intelligit. & tabidis iam superueniens interimit, non dicit Galen. fortasse, quia talem febrem non viderat, sed neque ego adhuc vidi vquam manifestè. Vidi certe quam dubitavi, quintanam, an quartanam taderem appellarem. Tentabo nihilominus dicere causam, quam esse suspicor probabilissimam, longo tempore inuestigatam. Hippo. non dicit simpliciter, quintanas esse pessimas, sed eas quæ tabescentibus, aut iam iam in tabem casuris, contingunt. Non sunt autem, arbitror, tales, quæ à principio hominem, sanum antea, inuadunt, sed vbi quis quartana prius, aut longissima tertiana debilitatus est, & minorem iam materiam copiam plenè non valet pellere, in quintanam incidit, atque eadem causa, quæ cum esset iudicande quintana corripitur, tabescit ob habitudinem scilicet fluctuantem debilitatem. Sextanæ verò, aut septimanæ, aut etiam rariore febres, affligunt iam, vt vitia potius naturalia, quàm vt morbi, atque adeo quibus laborant, videntur esse homines alioquin sani, gaudentes in febre, vt curatione consueta.

Sunt autem rari, & constitutiones, & paroxysmi singularum hærum febrium, æquè continuarum & intermittentium. Est enim continua, quæ statim ubi incipit, floret, & viget maximè, & in grauius tendit: circa indicium autem, & simul cum in-

57
dicio, extenuatur. Quibusdam autem incipit mollius, & summissus; accrescit autem, & exacerbat in dies: circa crism autem, & simul cum crisi, abunde emicat. Quibusdam autem incipiens mitius, accrescit & exacerbat, & quādiutius aucta, rursus remittit circa iudicium, & usque ad iudicium.

Persequitur rursus febrium partitionem secundum figuras. Retulit enim hactenus differentias intermittentium. Nunc referre incipit differentias continuarum. Dicit ergo modos constitutiones, & paroxysmos, id est, modos constitutionum, & paroxysmorum accidere cuique harum febrium, quæ scilicet continuæ & intermittentes. Intermittentium enim fere dicti sunt modi. Continuarum autem, quædam est, quæ statim ac incipit, viget ac floret maxime, & in grauius tendit, hoc est in summum periculo hominem constituit: circa iudicium autem, & simul cum iudicio, hoc est morbo iam cuncto in summum vigorem, & usque ad totam declinationem, extenuatur. Huiusmodi sunt continentes, quæ vocantur. Galeno decrecentes. Quædam est, quæ mollius incipit, crescit autem & exacerbat in dies, & circa iudicium tempus, ac per totum iudicium abunde elacet, & usque dum videtur repente tolli. Huiusmodi sunt continenter crescentes. Sunt autem alia continentes inter has media, neque crescentes, neque decrecentes, sed semper æquales, quæ ex prioribus intelligi Hippocrates voluit. Alia est febris, quæ incipiens mitius, crescit & exacerbat, & aucta quādiutius, scilicet per totum tempus incrementi, & usque ad summum vigorem, rursus subsistit citius iudicium, hoc est, statim ab incepta iudicatione, & usque ad iudicium perfectum, hoc est, usque dum integrè, atque omnino soluitur. Huiusmodi sunt omnes febres continuæ, præter continentes: nam hæ omnes habent principium, & incrementum, & vigorem summum, & declinationem. Quæ ratione fiant febres continenter crescentes, decrecentes, & sui semper similes, in meo commentariolo de febribus, dictum mihi est. Sed continget hoc loco dubitare, quæ ratione fieri possit, ut febris quædam circa iudicium, & simul cum iudicio extinguitur, siquidem iudicium in morbi vigore sit, cum verò consistunt morbi, omnia quæ præter naturam sunt, morbus scilicet ipse, & symptomata sunt vehementiora. Summa autem ratio est hæc. Duo sunt in interna causa febres, quæ febrem ipsam faciunt, fouent, & augere possunt. ipse materię ardor, siue putredine, siue vitione, siue quodam feruore fiat, & quantitas. Atqui elaborationem materię necesse est crescere, ac per exemplum febreia usque ad summum vigorem, tamen quantitatem non esse necesse. Minui enim potest succus morbo adhuc crescente, vel arte, vel misso sanguine, aut magna alia facta euacuatione, vel natura, velut per insensibilem euacuationem, vel per paulatim factas euacuationes spontaneas. Ergo, materia ipsa quæ intra corpus manet, semper magis ac magis, præter naturam accrescit, atque calorem pariat, quantum in ipsa agitur, auget, sit tamen nonnullum, ut decrecente copia, videatur hæc alteratio minui. Neque tamen proinde putandum est, non

esse morbum in incremento. Crescit enim reuera ardor, in ardente materia, & in illis animantis particulis, quas contingit.

Accidit autem hæc fieri in omni febre, & in omni morbo.

Nihil est aliud quod dicit quàm hæc quæ dicta sunt, ut accidit fieri in febribus, ita accidere, fieri, & in omni morbo, qui sine febre sit. Sed quæ sunt dicta: febrium quædam, esse intermittentes, quædam perpetuas, atque harum quædam continuas tantum, quædam continentes etiam. Hoc ergo idem accidere dicit, omnibus aliis morbis intelligi autem debet omnibus pendentibus ex quibusdam succis, cuiusmodi sunt omnes fluxiones, & omnes tumores præter naturam. Est autem hoc verissimum: in podagra enim, & cheiragra, hæmictaria, & ventriculi, ac intestini, sc, ut semel dicam, quibuscumque aliis doloribus, ex perituris quosdam affligi semper, sine intermissione, quosdamque harum, semper eodem modo, quosdam remittente sensim, quosdam augescere dolore: quosdam quidem circa intermissione, tamen cum quibusdam exacerbationibus, per vicissitudines recurrentibus: quosdam etiam cum intermissione ex quibusdam intervallis, dolere, omni dolore non raro carentes. Atqui hæc, intervalla nonnullam certam, nonnullam inerta esse videmus. Ophthalmis etiam, & erysipelis quatuorundam partium ad videmus sæpe accidere. Quia etiam mihi conuigit videre pleuritidem, verissimam quidem, & omnia pathogonomica signa habentem, intermittentem tamen, ita, ut homo alteris diebus pleuritide, alteris nullo morbo teneri videretur. Hoc ergo est considerandum dignissimum in omni morbo. Similes enim in omnibus accidunt modi, & constitutiones, & similibus ex causis, atque in febribus. Nimirum ophthalmia quotidie affligens, pituitosa, alteris diebus, biliosa laberi debet.

Opportet autem prædictum ex horum consideratione offerre.

Ex constitutione & figura morbi, magnas indicationes nasci, offerendum est, discretis aliis locis ab Hippocrate ipso dictum est, præcipue prima paratiula Aphorismorum.

Multa etiam alia opportuna signa sunt his cognata, de quibus quædam iam scripta sunt, quædam scribentur, quæ animi reputant, expendere & considerare debet, quid horum æntum & lethale, aut ex quo superesse possint, & cui prorogetur morbus, aut non. Et quando, & quantus, & cuiusnam offerendus sit cibus.

Multa alia signa sunt præter hæc, præter figuras, scilicet, & constitutiones febrium, quæ non aliter quàm hæc, significant euentum morbi, & ad cibum: exhibendum, indicationem præstant. Quod autem ad euentum morbi attinet, hæc oportet præsentire, an moriturus, an superstiturus homo sit: atque verumque, an breuius, an possit longam agrotationem. Hæc autem omnia

discernere signis, Hippocrates in prognostico docuit. Atque summa ratio est, coniectari ex signis, ut habent virtus & morbus: nam quæ cum debili virtute magnam morbum indicant, breui futuram mortem, quæ cum robusta facultate, exiguum morbum, cetero futuram sanitatem, quæ cum robusta facultate magnam, aut cum debili exiguum morbum significat, tardius futuram sanitatem, aut mortem, prout alteri videbitur altero magis polere, virtutis robur, aut morbi exiguitas: vel contra magnitudo morbi, aut debilitas virtutis. In cibi oblatione considerandum, cui sit dandus, & cui non, quibusdam enim per totum morbum non est dandus, & quando, & quantum. Considerandum etiam est, quale sit dandum. Nam illud, omnis victus humilis, frigidus conuenit, ad qualitatem cibo rumperit. Ceterum quia constitutio & figura febris ad qualitatem nihil indicat, sed tantum ad consultationem an dandum, an non, & quantum & quando, hic non fecit mentionem qualis, sed tantum quanti, quando, & cui.

Quæ in diebus paribus exacerbantur, in imparibus indicantur, quorum autem paroxysmi in imparibus sunt, indicantur in imparibus.

Quia paroxysmus similis motus est ei, per quem iudicatio fit; nimirum uterque sit natura expellente diem, & si ob vim causæ alienius superne in diem paroxysmi iudicium casurum esset, rapitur à proxima accessione. Quo fit, ut qui mouetur per impares, in imparibus iudicetur, & qui per pares paribus. Neque verò solum hæc causa sit, ut in diem accessionis iudicium plerumque incidat, sed etiam, ut ceteris paribus, tunc melius fiat, cum in eandem diem incidit. Quia incidens in eandem diem ambobus morbus, perfectius agitur expurgatio. Ne tamen intelligas, moueri per impares, eos qui tertio quoque die habent accessiones, per pares autem, qui quarto quoque, aut singulis, nam omnes fere acutimouentur, tertio quoque. Tamen in, si prima accessio finitur prima die morbi, mouentur per impares, quia secunda cedit tertio: si producit usque ad secundum, mouentur per pares, quia secunda cedit quarto. Quo fit, ut tanto deterius sit morbi acrius morbus per pares, quanto deterius est, quamcumque exacerbationem esse longiorum.

Est autem primus decretorius, circuituum per pares indicantium, quartus, sextus, octauus, decimus, decimus quartus, vigesimus octauus, trigessimus, quadragessimus octauus, sexagesimus, octogessimus, centesimus: circuituum verò in imparibus indicantium, primus, tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, & trigessimus primus.

Plus aut minus dies omnes sunt decretorii. Indicant autem plerumque, pares pares, & impar impar, ut dictum est. Proinde fecit modo sortum enumerationem parium, & imparium, non numerans omnes, sed multos in utroque genere. Sunt verò in utroque genere quidam ob causam aliquam supernam, siue motum aliquem celi, vim decreto-

riam habentes, quidam ob infernam causam, ob paroxysmum dico, qui in eos dies incidit. Velut inter pares, quartus, & decimus quartus, & vigesimus: inter impares, septimus, & undecimus, & decimus septimus, supernam causam habent infernam verò, inter pares, sextus, octauus, & decimus octauus, inter impares, tertius, & decimus tertius, & decimus nonus. Hæc autem, ut ita habere intelligas, oportet legeris, quæ de diebus decretoriis à nobis scriptæ aliis locis sunt, maxime autem in enarratione prognostici. In Græcis codicibus legitur γὰρ δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ ἀγέλλεται ἡ ἀρχὴ τῆς νόσου. 7. 1. Argui si ita legitur, aperte significatur, primum decretorium in imparibus, tamen hoc fallum est. Nam primus & secundus non sunt decretorii, cum nullus morborum, quorum concoctionem, & iudicationem expectamus finiri vno die aut duobus possit. Quamquam profecto mori contingit eadem die, ut ex angina, aut secunda, ut soror Cui. tamen decretorii vni sunt, oportet, ut habere possint utramque mutationem. Legendum ergo ibi, ἡ νόσος, ut sit sensus, primus dies impar est, tertius. Non numerantur decimus quintum inter impares, quia raro indicat, eam ob superbie causæ vim, solum 14. prætipere iudicationem. Atque ita haud scio an occurrant indicati ea die, nisi Hiero. 1. lib. tempestate. 2. & mulier Burdigoræ. 4. lib.

Videndum autem quod si quid aliter indicetur extra præscriptos dies, futuras recidivas significare, & posse lethale fieri.

Hoc est, quod confert dies decretorius indicationis, ut scilicet plerumque bona sit, & sine recidiva: nam vis dies indicat naturam. Quare quæ aliter, hoc est, præter dies decretorios, indicatur, aut febriliter, aut non sine recidiva indicatur. Sed quæquam hæc sit dierum decretorius vis, & si sit, non proinde viderat Hippocrates debuisse dicere, si aliter indicetur extra præscriptos dies, hoc est, nisi iudicentur aliquo præscriptorum dierum, futuras recidivas, aut mortem. Nam multi dies præscripti, non sunt indicatorii. Non est ergo quoddam in præscriptis bene, extra eos male res agatur: sed in quibusdam illorum bene, in quibusdam male. Nam dictum est in Aphorismo, febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidivare. Tamen multi modo præscripti sunt pares, & rursus, sudores febricitanti si inasperperit boni, tertius, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & quatuordecimo, & decimo septimo, & vigesimo septimo, & trigesimo quarto: Hi enim sudores indicant morbos. Quæ verò non ita sunt, labores significant, & morbi longitadinem, & recidivam. Ergo qui sexto, aut octavo, aut decimo fiunt, non liberabunt à recidiva. Maxime cum febris torrens sit per se vituperata, & ab Hippocr. & ab aliis fere omnibus, qui de diebus decretoriis, scripserunt. Ceterum quoniam hæc omnia videntur esse contraria, si bene perpenditur, quid quoque loco Hippocrates velit, non continet certam repugnantiam. Nam quod in Aphorismo quartælectionis dicit, nihil est aliud, quàm nisi febris diebus indicatoriis solatur, futuram recidivam, dicit verò nisi diebus imparibus, quia, ut alio loco explicamus, maior vis iudicandi est im-

paribus quam paribus diebus. Cum verò de sudore
disputamus, enumerat dies decretorios, enumerat
certè alia ratione, quam hic. Illic enim eas quæ sim-
pliciter, ac per se, & ob causam aliquam supernam
decretorii sunt, enumerat: hic non ita. sed eos, qui
ad quosdam morbos sunt decretorii. Horum verò
multi, ut dictum est, quanquam ad quosdam mor-
bos sint, simpliciter non sunt decretorii. Sed si mor-
bi qui moventur per pares, melius indicantur pari-
bus: qui per imparos imparibus, aut præferantur
imparibus paribus? aut quid sit illud, simpliciter esse
decretorios illos, hos non? Certè, ut dictum est, qui
moventur per pares, non tantum indicantur pari-
bus crebrius, quam qui moventur per impares (sed
etiam indicantur melius. Nam virginem Larissæ di-
citur tertio huius operis libro, liberatam sexto, ca-
ruisse recidua, quia habebat labores diebus pari-
bus. Ceterum hi ipsi morbi, non indicantur tutius
dictis paribus, quam si imparibus indicarentur.
Non enim minus tunc, seprimo quam sexto virgo
Larissæ indicata esset. Nam dies impares, qui sim-
pliciter sunt boni, omnibus sunt boni, quamquam
his qui per impares moventur, meliores, quia in eos-
dem dies incidunt ambae causæ, superna & inferna
velut peres: sunt insinas mali, his qui moventur per
pares ob alteram causam, etiam si sint per se igno-
bles. Quidam enim etiam, sunt pares, & optime indi-
cantes, velut 14. & 20. qui quidem his qui moventur
per pares, erant multo meliores, concurrenti-
bus dictis causis.

*Oportet autem mentem advertere, atque
scire, in his temporibus indicationes futuras,
in salutem aut mortem: aut mutationes in meli-
us; aut deterius tendere.*

Quatuor indicationum species fieri possunt. So-
lent autem omnibus diebus decretorios fieri, vel in sa-
lutem, vel in mortem facta mutatione (argui hæc
sunt indicationes in egræ, alia optima, vel pessima)
vel in melius aut deterius, facta mutatione repe-
tina, ut quam dies unus affert. Nam paulatim factæ
mutationes, neque indicationes dicuntur (nisi cum
hæc sepe vitur Hippo. eo nomine pro omni solu-
tione) neque quibusdam diebus decretorios sunt.

*Eratice autem febres, & quartana, & quin-
tana, & septimana, & nonana, quibus circuli-
tibus indicentur, considerandum.*

Cirratice, quartana, quintana, septimana,
& nonana, dicunt considerandum, quibus circuli-
tibus indicentur? An non aliam quoque oportet
constitutiones considerare? certè. Sed quia arbit-
rator hærum constitutiones, non sunt tam certæ,
quam tertianarum & quotidianarum, proinde mo-
pet non omittendum: sed considerandum. Tertia-
na enim certam constitutionem scripsit Hippo. di-
cens, exquisitam septem periodis, cum tardissime,
inducit. Quotidianæ etiam constitutionem certam
scripsit, talis, dicentes indicari duobus ferè men-
sibus. Tamen quartana, quintana, septimana, aut
nonana, nullibi dicit certam. Sed illud vniū dicit,
longissimas omnes, & aliis aliis longiores. Nimirum
quanto morbus est longior tanto minus certam ha-

bet constitutionem. Eratice multo magis habent
constitutionem incertam, ob diuersam naturam.
Hæc ergo causa, difficile est scire, quorū circuli-
tibus hæc indicentur. Accedit alia ratio, qua non potuit
inter autores adeo constare, quæ sit constitutio ha-
rum, quæ tertianæ, & quotidianæ, quæ non po-
tuit tanta esse obsecratio, quæ sunt rariore morbi.
Nam præter quartanam, quæ aliquando frequen-
tior est, adeo rara sunt, ut quintanam, & quæ per
longiora intervalia sunt Galeis, nunquam viderit.
Sed si non sunt harum febrium constitutiones cer-
te, quæ ratione considerandum, quibus circuli-
tibus indicentur? Certè consideratis mutationibus, quæ
secundum concordiam in excrementis fiunt,
quamquam in variis ætrotis, variæ admodum con-
stitutiones contingant. In quovis homine non mul-
tum errabimus à vera constitutionis præensione.

QUATVORDECIM ÆGROTI, primi Epid.

Ægrotus I.

PHIISCVM, qui prope mu-
rum decumbebat, primo die febris
acuta inuasit; sudans per noctem
laboriosè, secundo omnia exacer-
bata sunt. Vespere verò post clysterem bene ha-
buit, noctem quietè transiit. Tercio mane, &
usque ad meridiem videbatur esse sine febre.
Ad vespertinam verò febris acuta inuasit cum
sudore & siti, exaruit lingua, Minxit nigrum.
Nex laboriosus. Non dormiuit. Omnia deli-
rauit. Quarto omnia exacerbata sunt; Pri-
mam nigram reddidit; noctem habuit minus
molestam & urinas melioris coloris. Quinto
circa meridiem, parum de naribus stillante
E sycerum. Urina autem varia, habentes pen-
dencia quadam, rotunda, similia semini spar-
sa. Non sudans. Apposito autem balneo, ex-
gua & stansiosa exierunt. Noctem laboriosè
transiit. Somni exigui, verba cum delirio.
Omnia extrema frigida, non amplius recu-
tescentia. Minxit autem nigra, dormiuit parum.
Sub diei obmutuit; sudans frigidum. Extre-
ma fluida: ad meridiem obiit sexto die. Hinc
autem spiritus ad finem usque velut recor-
danti, tarus & magnus. Splen intumuit tu-
more rotundo. Sudores frigidi usque ad finem,
Paroxysmi paribus diebus.

Non contentus Hippoc. generatim docere, quæ
illa tempestate acta sunt, singulares quosdam histo-
rias scribit, maioris exercitatiois gratia. Philiscus
hic, vniū coram apertè est, de quibus paulo ante ita
scripsit. Ergo cum febres ardentes inciperent, si-
gificabant, quibus lethalia impenderent: & reli-
qua, omnia enim quæ illic dicit, multos per febres
ardentes euenisse, hic dicit accidisse Philisco, qui ve-

ex ipsa narratione palam fit, laboravit febre ardente, pernicioſa, & acutiſſima, & quæ per dies pares movebatur (eſt hic ille Philoſophus Antagoræi filius, cuius nuper meminimus, die ſexto mortuum dicentem) quia ergo ardens ex hile erat, alterius diebus fiebat præſens, & quia per pares movebatur, ſecundo, quarto, & ſexto magis: primo autem, & tertio, & quinto, lenior videbatur. Quia lethalis morbus morte finitus eſt ſexto die, quia acutiſſimus, & per pares movebatur. Nam ſi moreretur, per impares, attigſſet ſeptimum, qui acutiſſimorum finis eſt. Sed percurramus omnia verba. Primo die fuit febris acuta, ita enim dicebatur antea, iis quibus lethalia impenderent, ſtatim incipientibus febris acuta. Sudavit in noctem, hoc eſt per totam noctem primi diei, laborioſe. Sudor ſane omnino malus, & pravam affectionem ſignificans. Nam interpeſtius, cum primo die, & tam longe à tempore indicationis fieret, & ſine tolerabilia laborioſe enim dicitur) & ſine conſeſcit. cum dicat, ſecundo omnia exacerbata ſunt. Eſſe autem omnia ſecundo die exacerbata, & vesperti poſt clyſterem bene habuiſſe, & tertio vſque ad meridiem videri factum ſine febre eſſe, nihil eſt aliud, quàm eſſe febrem remanentem continuam, & diebus paribus habere exacerbationes. Diximus enim prius eas febres moveri per pares, quarum periodi ſingulis ſummos vigores habent paribus diebus, antecedentibus autem imparibus incrementa longa, & in fine ipſorum parium, & initio imparium ſubſequentium, decrementa breviora. Dico autem impares antecedentes, vt primus antecedit ſecundum: ſubſequentes, vt tertius ſecundo ſuccedit. Primus ergo circuitus Philoſophi acutiſſimam partem ſecundo die habuit ad meridiem, cœpit inclinare vesperti (quare Hippocrates clyſtere vt iuſſit, vt in inclinationibus fit) diu autem que ac inclinationi vſque ad meridiem diu tenuit: quæ hora verifimile eſt febrem, primo die inceperit, quamquam Hippocrates horæ non meminerit: à meridie tertii diei cœpit febris acuta cum ſudore, vt à principio. Fuit homo ſticuloſus, lingua acceſſebat. Nimirum preſebant iam cum febre ardente propria illius ſymptoma. Habuit etiam hæc febris in primo circuitu totum principium vniuerſale. Quo proinde verifimile eſt, vniuerſam prædictam ſigna habuiſſe, in ſecundo, incrementum. Proindeque inceperit vſque habere ſigna contraria concoctioni, ſicque nigra. Nox tertii diei fuit laborioſa, velut primi, & aliquanto plus, quia creſcebat iam malum. Quare non dormiuit, & deliravit omnino aperteque, hæc enim imminuentis delirii notas habuerat, magis quàm aperte delirauerat. Quarto ſunt omnia exacerbata. Dixit enim paulo ante, de ſignis quibus hæc tempeſtas moriebantur, eddiſſens, quarto die dolores maxime: vſque nigram tunc quoque reddebant, noctem tamen diei quædam habuit minus moleſtam, & primas quinti diei vſque meliorem coloris, & mox ſtillas sanguinis de naribus. Quæ mutatio, quem non eorum, qui non ſunt admodum periti, deciperet, putarent, ſeptimo die futurum bonum iudicium, ſiquidem quartæ mutationem excitementorum in melius fecerat? Cæterum medicus prudens, & non inexperitus, conſiderans totius morbi figuram, haud multum fideret quæ illius noctis (reſpondebat enim quæ ſecundi diei) neque quidem, conſiderans reliqua omnia, quæ actuaſſet affectum hominem in-

dicabant, fideret meliori vſque coloris, ſecundatus illius ſententiæ. Non oportet multum fidere bonis, quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim horum duræ non ſolent. Expectaret ergo medicus mutationem, quam mox meridiem diei quinti caput afferre. Stillaſſet parum de naribus ſyncerum, ſtillas huiusmodi vituperat milles Hippocrates, & in prorrhethico ſtillas quarto die factas, quales hæ fuerant. Nam ante meridiem quinti. Dies autem incipiebant à meridie: ſed quod merum dicit ſtillaſſe, intelligit Galenus nigrum, quia rubrum, qualem morum ſanguinem eſſe oportet, non potat ſignificare gravem affectionem. Ego verò intelligo Hippoc. dicere, quæ dicit. Stillaſſet autem ſanguinem puriſſimum, niſi melius erat tunc temporis, immò verò fortiaſſe etiam deterius. Quia præterquam quod euacuatio erat quantitate & tempore mala, non euacuabantur qualia oportebat, ſed qualia non oportebat. Vſque variæ ſunt factæ, colore, & ſubſtantia, vt variæ iam excrementa ſignificarentur: quædam ſimilia ſemini, ex ſecis crudis & rotunda, ex vterque calore: pendencia & ſparſa, ex ſtatu ſericiæ pectus. Non ſudavit eodie, vt primo & quinto fecerat, ſed appoſito balneo, exigua & ſtuoſa exierunt. Nimirum illo die, non tam biliſa, quàm cruda, & ſtuoſa viſa ſunt. Accidit etiam in omnibus febre illa tempeſtas ægrotantibus, duplicia excrementa moueri. Noctem quinti diei habuit grauiffimam, reſpondentem ſcilicet nocti primi, & tertii, & grauiores, vt pote homine iam debiliore, & morbo factio maiori. Quare ſomni exigui, verba cum delirio. Hoc eſt, per totam noctem loquebatur multa, & delirabat quod quidem eſt, multum delirare. Omnia extrema frigida (hoc eſt caput, manus, ac pedes) non recaleſcebant iam ob debilitatem naturalis coloris. Apparete iam diluculo, mixta nigra, & dormiuit parum, ſub diem obmutuit. Quod quidem propè mortem iam conſtitutus accidere coſuevit, etiam morbus non ſit eorum aliquis, qui ad neruos aut muſculos pertinent: ſed illud fieri ſuſpicor, per extremum lapſum eius facultatis, quæ thoracem mouet, & per magnam conturbationem hominis, vt ſolent quidam, ex tepentino timore, aphoni fieri. Die ſexto ad meridiem obſiit, quia ea facta ſemper omnibus diebus paribus grauiffima, atque diſcillima hora. Huic dicitur fuiſſe ſemper ad finem vſque ſpiritus magnam, & rarum, velut recordanti, hoc eſt, velut ſolet eſſe ei, qui velut obliuſ ratas facit, & velut recordatus, magnas reſpirationes. Nimirum hæc delirauit toto morbo, ſi quando enim videbatur ſuſcipere, tamen tunc quoque erat velut antonirus, ſui obliuſ. Quod quidem etiam genus quoddam delirii eſt, & illam ſpiram facere poſſet. Nam ſi quis febre carens, cogitans tamen æqueus aliquid: tunc ac vix reſpirat, velut ſoler mihi legenti accidere, cur non febricitans ſine manifeſto delirio, ob obliuſionem non nunquam accidat? Splen (inquit) intumuit tumore rotundo. Quod autem eſt aliud, quàm magna febre, quæ deſinitur extremis vtrebus viſcera, tumorem rotundum ſplenem habere, quàm phlegmonem? atqui, quando quidem ſigura tumoris manu agnoſcebat, magnus phlegmonem fuiſſe, aliquando ſuperpoſite partes prohibuiſſent. Itaque Philoſophus non tantum habebat febrem ardentem, ſed phlegmonem etiam in hypocondrio ſiniſtro. Neque proinde febris erat accidens, (erant enim in

excrementis multa patidæ febris signa) sed laborabat duplici morbo, febre, & phlegmone. Neque quidem fuit hæc lipiria. Fuisse enim extremorum frigus non superueniens, sed pathognomonicus. Sed erat hæc febris maligna, in genere earum quæ vocantur à veteribus elodes (sundabat enim assidue magno cum periculo) & typhodes, succendebantur enim viscera. Verum considerari hoc loco velim (quod verissimum esse puto) petrarum esse febres huiusmodi acutissimas, & perniciosissimas fieri, sine interna aliqua affectione. Quare nunquam omit-tenda cura hypochondriacorum, & thoracis, capitis, & vtriusque, & renum & vesicæ, ut omni ratione imue-sigamus, quæ hanc partem insigniter laboret, & ei, quod fieri possit, subueniamus.

Ægrotus II.

Silenum qui apud Platonem prope Euclidem habitabat, ex laboribus, & potationibus, & exercitationibus intempestiuis, febris corripuit. Caput autem lumborum dolore & capitis gravitate laborare cum cernis distinctione. Ex aluo autem primo die biliosa sincera, spumosa, abunde colorata, & multa effluebant. Urina nigra, nigram hypostasim habentes. Siticulosus, lingua arida, nocte nihil dormiuit. Secundo febris acuta, deiectiones plures, tenuiores, spumosa, urina nigra. N octavo difficulter iulsi, parum delirauit. Tertio omnia exacerbata sunt, hypochondrii contentio, ex utroque protensa vsque ad umbilicum, submollis. Deiectiones tenues, subnigra, urina turbata, nigra. Nocte nihil dormiuit: sermões multi, risus, non poterat se continere. Quarto cum eisdem. Quinto deiectiones mæce, biliosa, leues, valde pingues, urina tenues, pellucida, paucæ, mente consistit. Sexto circa caput parum sudauit. Extrema frigida, livida, magna iactatio. Ex ventre nihil exibat. Urina suppressa sunt. Febris acuta. Septimo die sine voce. Extrema non amplius recaluerunt. Mixxit nihil. Octavo sudor frigidus emanauit è toto corpore. Exanthemata cum sudore rubra, rotunda, parua, velut vari permenebant, nec faciebant abscessum. Ex aluo irritatione parua stercorea tenuia, velut cruda multa, recidebantur cum dolore. Ad ingebat cum dolore, mordacia, sincera, paucæ, recalescebat. Somniles non, comatosi, obmutuit. Urina tenues, perspicua. Nono cum iussu. Decimo potum non capiebat. Comatosus, somni autem tenues erant, & ventre similia prodibant. Mingeat confertim, crassum, subsidens. Sedimentum farina simile, album. Extrema rursum frigida. Undecimo obiit. A principio huius vsque ad finem spiritus magnus & rarus, hypochondrii palpi-

Atatio perpetua, circiter vigesimum ætatis annum agebat.

Hic Silenus, laborauit, quantum intelligo, febre ardente habente exacerbationes diebus imparibus. Quanquam id obscurè, ob morbi magnitudinem nunquam parum assigens. Habuit cum febre magnum erysipelas in toto hypochondrio, à septo transuerso vsque ad umbilicum, per utrumque latus. Cæpit autem apparere non primo morbi die, sed à tertio. Hoc enim est, quod dicit. Hypochondrii contentio ex utroque latere vsque ad umbilicum, submollis, hoc est, sine duri tumore, quem possemus manu inuenire. Erat enim potius ardor cum fluxione, quam tumor, faciebat autem tensionem erysipelas, partium fluxione, partium siccatione, quam vis locis faciebat bilis. Ardorem illic maximum, videntemque fuisse, palpitatio perpetua hypochondrii indicabat. Vocat enim, ut multis aliis in locis, palpitacionem, non quam Galenus moritacionem ab incluso flatu, sed pulsam, de qua in prognostico dicit: Si pulsus in hypochondriis appareat, perurbationem, aut furorem significat. Erat ergo pulsus arterie incumbens spiro apparet, ob ingens eius loci ingens. Delirium verò, & tentio, significabant serpere etiam erysipelas in septum transuersum. Hæc erat essentia huius morbi, quo multi hoc anno Complugi laborauerunt. Neque mirum, fuisse enim apud nos, huc vsque, huius sexagesimi primi anni constitutio, et quam nuper descripsit Hippocrates simillima: fuitque proinde duplex fuerit idea in morbis, pituitæ, & bilis. Ergo in ætatis initio cæperunt biliosa irruere in quasdam partes, eam autem in supremis suo more reperire, depressa à peritosis, hypochondriis hæserunt. Habebant omnes hoc morbo laborantes hæc omnia, quæ Silenus, & præter hæc, vomitum etiam, tenente (arbitror) erysipelas etiam ventriculum. Sed percurramus omnia quæ acciderunt Sileno. Febre corripitum dicit, exercitationibus omnis, & intempestiuis, & potationibus. Narrat occasiones, sine causis manifestas febricitandi, non inuoluit. Multum enim præstat huiusmodi causarum cognitio, ad effectus cognitionem. Nam certe erant hæc causæ facere crudum sanguinem, & biliosum redundantiam, simul cum obstructionibus: Labor quidem bilem auxerit, præcipue in tam calida tempestate, potationes, cruditates, intempestui morus, obstructions, cum per totum corpus, tam vel maxime in hypochondrio. Merito ergo caput febricitare cum dolore lumborum, capitis gravitate, & colligatione, multis excrementis per partes effusis. Ex aluo primo die, biliosa, sincera, & spumosa, copiose multa, effluebant: Euacuatio tempore & qualitate pessima. Nam in prognostico scriptum est: Si admodum flaua, aut spumantis deliraret, hæc omnia mala sunt. Urina verò fuerunt longe pessima, nigra etiam, & nigram habentes subsidentiam. Siticulosus (inquit) erat & lingua arida, Nimirum hæc sunt febres ardoris signa. Nocte nihil dormiuit. Incipiebat, scilicet, cerebrum affligi à bile, qua assidens crescebat. Secundo die fuit perurgium cum delirio, & deiectiones plures etiam quædam primo die, similes tamen, ut & urina. Tertio omnia exacerbata sunt. Quia præterquam quod effluebat iam morbus, per imparos monebatur. Cæpitque

iam hypochondri erysipelas apparere, & deiectiones, atque vrinæ, fiebant deteriores. Deiectiones enim pro biliosis & spumosis, renuës, & sobriæ; vrinæ, pro nigris tenoibus, turbare niger. Dico autem has esse deteriores, quia multo maiorem nigrorum succorum copiam istæ indicabant. Nocte nihil dormiuit. Multa loquebatur, quod insanæ est. Ridebat, ut non se posset continere. Si hic risus per demensam fiebat, profecto secuta videbatur esse hæc dementia; si quidem cum risu fiebat, quare cum tam longe abesset homo à secuta affectione, sospicor non tam fuisse risum ex motu animi natum, quam impotentiam quamdam continendi sepium transuersum, ob calorem partium ad eam regionem pertinentium, aut ob motum consilium ipsius sepi. De qua risus speciei libi se pntrooerariarum. cap. 9. differuimus. Hoc symptoma est, quod ut significet Hippocrates dicit, risus, non se posset continere. Atqui hoc quoque symptoma insciebatur ex calore circa hypochondrium, & sepium. Cui loco proinde admonenda erant tunc temporis frigida epithemata. Quatuor die transiit cum his eisdem. Quinto deiectiones meræ, biliosæ, laues, valde pingues. Leuitas & pinguedo magna, colligationem magnam significabant, atque adeo declarabant, spumosa, quæ primo die apparere ceperant, vi caloris esse facta, ut solet in feruentibus ollis. Vrinæ latus diei fuerunt tenues, & pellucidæ, & paucæ. Quod ex turbatis nigris qua ratione fieri potuit, nisi rapta bile in superiores partes? mirum autem quod cum his vrinibus cepit mente constare, cum solat his apparentibus, quod non est, fieri; & quod est, augeri, delirium. Quid enim aliud sibi vult Hippocrates, dicens, vrinæ albe, perspicuæ, malæ, maxime si in delirantibus appareant? Sed tamen qua ratione fieri in Sileno comitem audi: cum bilis, atque adeo, maligna omnia excrementa, per debilitatem facultatis, & malo in deterius eunt, fursum raperentur, tamen ab inflammatis hypochondriis, in mediâ via interciperantur. Proinde apparere ceperunt vrinæ perspicuæ, & homo nihilominus mente constitit. Tamen aucto magnopere malo, quod obsidebat hypochondria, omnia lethalia signa ab ea die aucta magno per se sunt, & mortuus esset homo celerrimè, nisi quædam exanthemata varis similia (vocant variolas) oborta, liberate omnino non valentia, motum retardassent. Nam die sexto sudavit parum citæ caput. Quod genus sudoris, magnopere in prognostico vituperatur: extrema fuerunt frigida, & quod est malè grauius, etiam liuida. Fuit magna inæquatio. Ex ventre nihil exibat: & vrinæ paucæ sunt: & febris acuta. Atqui ex his symptomatis cõiecto varis similia exanthemata hæc sexta die orta esse. Nam referens, quæ octauo die conrigerunt, dicit, exanthemata permanebant. Hoc autem verbum appetit significat non esse facta tunc primum, sed a huiusmodi ante dies. His aorem nascentibus, nihil inagis sentitur, quam anxietas quædam maxima, & inæquatio. Atqui suppremi euacuationes consuevit solent, cum natura in partem aliam reuertitur non uiam motum. Febris autem, cum hæc externi incipiunt, mirum in modum crescit. Septimo die obmurmurat, & extrema non amplius recedunt. & nihil minuit. Atqui si memimus eorum, quæ Philisco acciderunt, entum est, quod hoc die septimo obo sit extinctus, tamen verisimile est durasse hominem usque ad vni-

decimam, quia cum robusta facultate egrotare cepit, & quia maxima pars biliosorum excrementorum, quæ malignam habebant qualitatem, ad eum abcessit, quo factum est, ut reliquo morbo symptomata, prout motum magis quam bilis, significauerint. Nimirum octauo sudavit frigidum per totum corpus; quod quidem comamoris cum bile pntroisus, factum puto: velut & somnos comatosos, vrinas, nunc tenues & perspicuas, tunc habentes multum sedimentum farinaceum. Dicit, simile farinæ, album, quia est aliud farinaceum rubrum, quod & orobinum dicitur. Verum non omnino conquiescit post septimum diem bilis, alioquin fortasse liberatus esset homo: sed ipsa exanthemata per se secebant signa vtriusque faciei, bilis quiddam, quia rubra & pituitæ, quia rotunda, & velut vari: pituitæ autem conrumacis, quia non faciebant abcessum: & bilis non propè euntis, sed recurrentis, signum præbebat irritatio illa, & excretio cum dolore stercois tenuis obcraditatem, & mixtus pyocerus cum mordacitate. Cum his productus est morbus usque ad vndecimum, quo obiit. Hunc dicit habuisse à principio ad finem, spiritum magnum & rarum. Dictum autem est à me antea, esse hoc mentis alienatæ, & si sine manifesto delirio fieri possit. Pulsus magis in hypochondrio, intercodium illius loci significat. Vituperatum autem est id signum magno per se ab Hippocrate in prognostico.

Ægrotus III.

Herophontem corripuit febris acuta, à vterque paucæ, qualia per tensesum solent, inter initia egerebantur. Post hæc autem senilia deiecit, biliosa, copiosa. Somni non aderant. Vrinæ nigre, tenues. Quinto die mane surditas. Exacerbabantur omnia, lien intumescebat. Hypochondri contentio. Ex aluo paucæ nigre exibat. Desipui. Sexto delirauit: sub noctem sudor, refrigeratio, delirium permanebat. Septimo circumfrigebat suiens, desipiebat. Ad noctem rediit in mentem, dormiuit. Octavo febricitabat, lien subsidebat. Intelligebat omnia. Doluit ad huiusmodi, primumque tumor ortus est secundum rectitudinem lienis: deinde dolores in ambas tibias deciderunt. Noctem facile tulit. Vrinæ melioris coloris, subsidentiam habebant exiguam. Nono sudauit, indicatus est. Intermissi. Quinto repetiit. Statim autem splen intumuit. Febris acuta. Surditas sursum. Post recidivam autem tertio splen subsedit. Surditas minor. Crura dolabant. Non octu sudauit. Indicatus circa decimum septimum: neque delirauit in recidiva.

Herophon hic, vnos quidam eorum est, quos nuper dixerat, ex febre ardente, decimo septimo die cum recidivâ indicatos fuisse secundum rationem; & liberatos. Mocebat hæc febris per imparet, Talibus enim diebus exacerbatur, & iudicata est,

cum imperfecte, tum etiam perfecte. Habetur vique ad novum diem signa quæ timore magis afferebant, quàm spem. Nam cum evacuationibus tentatis in primis (vt solent per tenebrum) deinde fluxibus, tamen renquibus; biliosis, & intempesiuis, & cum perisplio, vrinæ erat nigra & tennes: quæ mortales esse solent. Tamen quia nonus dies attulit signa concoctionis manifeste (vrinas enim melioris coloris cum exigua subsidentia) merito factum est, vt homo euaderet, atque adeo secundum constitutionem legitimam. Eius sit enim decimo septimo, ad quem à nono, tantum tempus est, quantum ad novum à primo. Sed quia alia ex parte difficillimi morbi erant signa, alia ex parte salubriter affecti hominis, contigit, vt difficili iudicio, & non sine tædium, ac cum multis abfcessibus, homo euaderet. Abfcessus autè decurrerunt, vt oportuit, quibus homo liberaretur. Nam à supernis ad inferna semper, & à nobilioribus ad ignobiliora semper perinatio precedebat. Nam imprimis fuit furditas. A furditate tumor lienis, ab hoc dolor inguinis sinistri (que rectitudo ad purgationem lienis multum fecit, & cursum quem coeperat natura tenere aperte iudicavit) deinde dolores in ambas tibias. Atqui non in alteram solum. Nam ambo crura, & ambo manus, obignobilitatem sunt vtriusque lateris viscerum emunctoria; quanquàm non æquè vtrorumque. Cõstat autem illam huius tumorem in Herophonte, us fuisse phlegmonem. Alioqui si ex phlegmone eius visceris fuisset tantus tumor, non tam facile subsidisset, & recurrit. Sed succus per lienem, cursum cepit, & fecit abfcessum, atque adeo cum hoc factu sit, minus iam est mirandum, esse vrinæ nigra tandem duraverint, servatum esse hominem. Nam crassi melancholicique succi verisimile est fuisse multum, cuius redundantia, sine maligna corruptione potest tales vrinas parere. Neque sciam in omnibus ægrotis, quorum in epidemisi mentio fit, aut aliis, ab Hippocrate sit, qui cum habuerit vrinam nigram, superfuert, quin causam nigritiei præstiterit species succi. Mirumque quod Herophonti durus tumor in liene non super fuert ex crassa succi parte, cum tenuis dissipata sit, cum sudore noni, tum etiam eo, quem hic indicavit aduenisse decimo septimo, qui omnino febrem subtulit.

Ægrotus IV.

IN Thaso Philini uxorem qua filiam pepererat, & secundum naturam purgatione facta, & cum alia leniter transigisset, exaltis quatuordecim diebus à partu, febris ardens corripuit eum rigore. Dolebat autem cor in initio, & dextrum hypochondrium. Dolores muliebrii. Purgatio cessavit. Apposito autem balneo hæc leniora sunt facta. Capitis autem & colli, & lumborum dolores permanebant. Somni non aderant. Extrema frigida, stituclosa. Venter viri videbatur. Pauca deiecit. Vrina tennes & decoloris, in initis. Sexto die ad noctem deliravit multa, & rursum ad mentem rediit. Septimo stituclosa. Deiectiones biliosa, colorata. Offanoriginit. Febris acuta: convulsiones

A cum dolore. Multa delirabat. Surgebat. Apposito balneo multa deiecit cum fluxu bilis. Somni non aderant. Nono convulsiones. Decimo non nihil sapuit. Undecimo dormiuit: omnium recordata est: cito autem rursum deliravit: mixxit autem cum convulsionibus confectum multum, & raro (nisi admonita) crassum, album, quale sit in vrinis subsidentibus, cum perturbantur. Repositum per multum tempus, non subsidebat. Color & crassities qualis sit in iumentis: Talia mingeat, quæ ego vidi. Decimo quarto die palpitaciones occuparunt per totum corpus. Verba multa. Paululum mente constitit: cito autem rursum deliravit. Decimo septimo obmutuit, vigeſimo obiit.

C Non dubium est vxori Philini supereminisse causam aliquam manifestam febricitandi. Alioqui, cum per quatuordecim dies secundam naturam processisset expurgatio, non febricitasset. Partus enim naturalis, bonusque fuit, si quis alius: nã sine symptomatis, quæ non ferrentur scilicet, dicit titè esse expurgatam. Merito ergo cõputat dies decretorios à febre, quanquam in prognostico à partu fieri debere affirmat. Verum explicamus in contron. Illud intelligi, cum videtur partus causam febricitandi præstisse. Quam autem à principio partus nõ fuerit malus, tamen cum in medio partu (totum tempus naturalis expurgationis partum voo) febre correpta fuerit, non potuit non habere, quæ per malos partus febricitantes habere solent. Ab eo enim die partus bene procedere dicit. Habetur ergo in vtero erysipelas, id quod dolores muliebrii, & visio in ventre, significabant. Hæc autè facta sunt, quia purgatio cessavit. Recurrente autè sanguine in hepar, doluit dextrum hypochondrium, quod quia doluit, febris erat ardentissima, & mulier stituclosa, consentaneu est phlegmonè habuisse: fuisseque in mulieres duas affectiones internas, phlegmonè in hepate, & in vtero erysipelas. Atqui illorum symptomatum, quædam affectionem vteri, quædam hepatis, quædam vtriusque partis indicabant. Rigor enim, & cordis, hoc est, oris ventriculi doloris quæ febricitant à partu, similes sunt, ob consensum ventriculi, & nervorum cum vtero. Capitis, & colli, & lumborum dolores, retentis, aut male erumpentibus menstruis purgationibus, sunt. Siis, vehementia febris, & phlegmonis, sequebatur. Frigus extremorum, magnitudinem phlegmonis, & naturalis caloris extinctionem. Perunguam & delirium, lesionem magnam cerebri. Quoniam verò morbus non erat vera phlegmonis, neque delirium fuit perpetuum, sed quibusdam diebus incidens. Convulsiones autem, quæ nono die coeperunt multum iam progredi, cerebri lesionem, & nervorum omnium, declarauerunt. Maxime cum octavo antecessit rigor ille intempesiuis (quia neque cocto morbo, neque in die decretorio) qui malignam materiam quæstare, & nervos tentari, ostendit. Habere se hanc mulierem gravissime, illa erant maxima signa, quæ lethalia apparebant, velut deliria magna, & convulsiones perseverare, ac crescere inde, ac si quando viderentur recessisse, statim recurrere: & ab evacuationibus spontaneis, & ab evacuationibus auxiliis,

D Non dubium est vxori Philini supereminisse causam aliquam manifestam febricitandi. Alioqui, cum per quatuordecim dies secundam naturam processisset expurgatio, non febricitasset. Partus enim naturalis, bonusque fuit, si quis alius: nã sine symptomatis, quæ non ferrentur scilicet, dicit titè esse expurgatam. Merito ergo cõputat dies decretorios à febre, quanquam in prognostico à partu fieri debere affirmat. Verum explicamus in contron. Illud intelligi, cum videtur partus causam febricitandi præstisse. Quam autem à principio partus nõ fuerit malus, tamen cum in medio partu (totum tempus naturalis expurgationis partum voo) febre correpta fuerit, non potuit non habere, quæ per malos partus febricitantes habere solent. Ab eo enim die partus bene procedere dicit. Habetur ergo in vtero erysipelas, id quod dolores muliebrii, & visio in ventre, significabant. Hæc autè facta sunt, quia purgatio cessavit. Recurrente autè sanguine in hepar, doluit dextrum hypochondrium, quod quia doluit, febris erat ardentissima, & mulier stituclosa, consentaneu est phlegmonè habuisse: fuisseque in mulieres duas affectiones internas, phlegmonè in hepate, & in vtero erysipelas. Atqui illorum symptomatum, quædam affectionem vteri, quædam hepatis, quædam vtriusque partis indicabant. Rigor enim, & cordis, hoc est, oris ventriculi doloris quæ febricitant à partu, similes sunt, ob consensum ventriculi, & nervorum cum vtero. Capitis, & colli, & lumborum dolores, retentis, aut male erumpentibus menstruis purgationibus, sunt. Siis, vehementia febris, & phlegmonis, sequebatur. Frigus extremorum, magnitudinem phlegmonis, & naturalis caloris extinctionem. Perunguam & delirium, lesionem magnam cerebri. Quoniam verò morbus non erat vera phlegmonis, neque delirium fuit perpetuum, sed quibusdam diebus incidens. Convulsiones autem, quæ nono die coeperunt multum iam progredi, cerebri lesionem, & nervorum omnium, declarauerunt. Maxime cum octavo antecessit rigor ille intempesiuis (quia neque cocto morbo, neque in die decretorio) qui malignam materiam quæstare, & nervos tentari, ostendit. Habere se hanc mulierem gravissime, illa erant maxima signa, quæ lethalia apparebant, velut deliria magna, & convulsiones perseverare, ac crescere inde, ac si quando viderentur recessisse, statim recurrere: & ab evacuationibus spontaneis, & ab evacuationibus auxiliis,

E Non dubium est vxori Philini supereminisse causam aliquam manifestam febricitandi. Alioqui, cum per quatuordecim dies secundam naturam processisset expurgatio, non febricitasset. Partus enim naturalis, bonusque fuit, si quis alius: nã sine symptomatis, quæ non ferrentur scilicet, dicit titè esse expurgatam. Merito ergo cõputat dies decretorios à febre, quanquam in prognostico à partu fieri debere affirmat. Verum explicamus in contron. Illud intelligi, cum videtur partus causam febricitandi præstisse. Quam autem à principio partus nõ fuerit malus, tamen cum in medio partu (totum tempus naturalis expurgationis partum voo) febre correpta fuerit, non potuit non habere, quæ per malos partus febricitantes habere solent. Ab eo enim die partus bene procedere dicit. Habetur ergo in vtero erysipelas, id quod dolores muliebrii, & visio in ventre, significabant. Hæc autè facta sunt, quia purgatio cessavit. Recurrente autè sanguine in hepar, doluit dextrum hypochondrium, quod quia doluit, febris erat ardentissima, & mulier stituclosa, consentaneu est phlegmonè habuisse: fuisseque in mulieres duas affectiones internas, phlegmonè in hepate, & in vtero erysipelas. Atqui illorum symptomatum, quædam affectionem vteri, quædam hepatis, quædam vtriusque partis indicabant. Rigor enim, & cordis, hoc est, oris ventriculi doloris quæ febricitant à partu, similes sunt, ob consensum ventriculi, & nervorum cum vtero. Capitis, & colli, & lumborum dolores, retentis, aut male erumpentibus menstruis purgationibus, sunt. Siis, vehementia febris, & phlegmonis, sequebatur. Frigus extremorum, magnitudinem phlegmonis, & naturalis caloris extinctionem. Perunguam & delirium, lesionem magnam cerebri. Quoniam verò morbus non erat vera phlegmonis, neque delirium fuit perpetuum, sed quibusdam diebus incidens. Convulsiones autem, quæ nono die coeperunt multum iam progredi, cerebri lesionem, & nervorum omnium, declarauerunt. Maxime cum octavo antecessit rigor ille intempesiuis (quia neque cocto morbo, neque in die decretorio) qui malignam materiam quæstare, & nervos tentari, ostendit. Habere se hanc mulierem gravissime, illa erant maxima signa, quæ lethalia apparebant, velut deliria magna, & convulsiones perseverare, ac crescere inde, ac si quando viderentur recessisse, statim recurrere: & ab evacuationibus spontaneis, & ab evacuationibus auxiliis,

F Non dubium est vxori Philini supereminisse causam aliquam manifestam febricitandi. Alioqui, cum per quatuordecim dies secundam naturam processisset expurgatio, non febricitasset. Partus enim naturalis, bonusque fuit, si quis alius: nã sine symptomatis, quæ non ferrentur scilicet, dicit titè esse expurgatam. Merito ergo cõputat dies decretorios à febre, quanquam in prognostico à partu fieri debere affirmat. Verum explicamus in contron. Illud intelligi, cum videtur partus causam febricitandi præstisse. Quam autem à principio partus nõ fuerit malus, tamen cum in medio partu (totum tempus naturalis expurgationis partum voo) febre correpta fuerit, non potuit non habere, quæ per malos partus febricitantes habere solent. Ab eo enim die partus bene procedere dicit. Habetur ergo in vtero erysipelas, id quod dolores muliebrii, & visio in ventre, significabant. Hæc autè facta sunt, quia purgatio cessavit. Recurrente autè sanguine in hepar, doluit dextrum hypochondrium, quod quia doluit, febris erat ardentissima, & mulier stituclosa, consentaneu est phlegmonè habuisse: fuisseque in mulieres duas affectiones internas, phlegmonè in hepate, & in vtero erysipelas. Atqui illorum symptomatum, quædam affectionem vteri, quædam hepatis, quædam vtriusque partis indicabant. Rigor enim, & cordis, hoc est, oris ventriculi doloris quæ febricitant à partu, similes sunt, ob consensum ventriculi, & nervorum cum vtero. Capitis, & colli, & lumborum dolores, retentis, aut male erumpentibus menstruis purgationibus, sunt. Siis, vehementia febris, & phlegmonis, sequebatur. Frigus extremorum, magnitudinem phlegmonis, & naturalis caloris extinctionem. Perunguam & delirium, lesionem magnam cerebri. Quoniam verò morbus non erat vera phlegmonis, neque delirium fuit perpetuum, sed quibusdam diebus incidens. Convulsiones autem, quæ nono die coeperunt multum iam progredi, cerebri lesionem, & nervorum omnium, declarauerunt. Maxime cum octavo antecessit rigor ille intempesiuis (quia neque cocto morbo, neque in die decretorio) qui malignam materiam quæstare, & nervos tentari, ostendit. Habere se hanc mulierem gravissime, illa erant maxima signa, quæ lethalia apparebant, velut deliria magna, & convulsiones perseverare, ac crescere inde, ac si quando viderentur recessisse, statim recurrere: & ab evacuationibus spontaneis, & ab evacuationibus auxiliis,

G Non dubium est vxori Philini supereminisse causam aliquam manifestam febricitandi. Alioqui, cum per quatuordecim dies secundam naturam processisset expurgatio, non febricitasset. Partus enim naturalis, bonusque fuit, si quis alius: nã sine symptomatis, quæ non ferrentur scilicet, dicit titè esse expurgatam. Merito ergo cõputat dies decretorios à febre, quanquam in prognostico à partu fieri debere affirmat. Verum explicamus in contron. Illud intelligi, cum videtur partus causam febricitandi præstisse. Quam autem à principio partus nõ fuerit malus, tamen cum in medio partu (totum tempus naturalis expurgationis partum voo) febre correpta fuerit, non potuit non habere, quæ per malos partus febricitantes habere solent. Ab eo enim die partus bene procedere dicit. Habetur ergo in vtero erysipelas, id quod dolores muliebrii, & visio in ventre, significabant. Hæc autè facta sunt, quia purgatio cessavit. Recurrente autè sanguine in hepar, doluit dextrum hypochondrium, quod quia doluit, febris erat ardentissima, & mulier stituclosa, consentaneu est phlegmonè habuisse: fuisseque in mulieres duas affectiones internas, phlegmonè in hepate, & in vtero erysipelas. Atqui illorum symptomatum, quædam affectionem vteri, quædam hepatis, quædam vtriusque partis indicabant. Rigor enim, & cordis, hoc est, oris ventriculi doloris quæ febricitant à partu, similes sunt, ob consensum ventriculi, & nervorum cum vtero. Capitis, & colli, & lumborum dolores, retentis, aut male erumpentibus menstruis purgationibus, sunt. Siis, vehementia febris, & phlegmonis, sequebatur. Frigus extremorum, magnitudinem phlegmonis, & naturalis caloris extinctionem. Perunguam & delirium, lesionem magnam cerebri. Quoniam verò morbus non erat vera phlegmonis, neque delirium fuit perpetuum, sed quibusdam diebus incidens. Convulsiones autem, quæ nono die coeperunt multum iam progredi, cerebri lesionem, & nervorum omnium, declarauerunt. Maxime cum octavo antecessit rigor ille intempesiuis (quia neque cocto morbo, neque in die decretorio) qui malignam materiam quæstare, & nervos tentari, ostendit. Habere se hanc mulierem gravissime, illa erant maxima signa, quæ lethalia apparebant, velut deliria magna, & convulsiones perseverare, ac crescere inde, ac si quando viderentur recessisse, statim recurrere: & ab evacuationibus spontaneis, & ab evacuationibus auxiliis,

quibus inter initia iuuaticeperat, à procedente iam morbo nihil iuuari. Nam in primis diebus appposito balano (balanum enim intelligit, ubi dicit, appposito autem hac leuiora sunt facta) iuuari visa est. Octauo tamen die, cum appposito rursum balano multa biliosa deiecerit, adeo non est iuuata, cum ea nocte non dormiuerit, & nona conuulsa rursum sit. Fuerant autem septimo etiam deiectiones biliosæ coloratæ. Quod undecimo euenit, minxisse scilicet cū conuulsionibus, multum; raro nisi admodum, nihil est aliud, quam eo die habuisse duo hæc symptomata, conuulsiones, & mictum, tarum, & copiosum, & tunc solum cum admoneretur. Hoc verò erat, conuulsio, & delirium. Nam quia mens ægrotabat, non sentiebat velicæ dolorem & pondus, ac proinde non timebat nisi admonita, tunc verò multum, quia per intervallum longum, multum congestum erat. Conuulsiones autem cum tanta mentis alienatione, vide quam male affectum esse cerebrum significarent. Species autem vrinæ, capitis etiam laborem monstrabat. Nam in Aphorismo dictum est, vrinas perturbatas, quales in iumentis esse solent, dolorem capitis, præsentem aut imminentem significat. Oporet autem ob vires dierum detentiorum, considerare, per quaternarios accepisse morbi mutationes insignes, decimoquarto enim, & decimo septimo: atqui, quia quod de cimo septimo euenit, grauissimum fuit (obmutescencia enim, quæ nisi cum ob paralytism sit lingue, vicinis iam mori solet accidere) non potuit ultra vigesimum viuere. Hunc enim diem decimus septimus indicat, vrinæ controuersis dictum est. Vbi illud etiam generatim iudicauimus, intra vigesimum, omnes quaternarios, esse eorum, qui proximi sequuntur indices. Excrementa in hac muliere habuerunt, quod & in plerisque ægrotis huius tempestatis, bilis & pituitæ significationem, deiectiones enim, bilis: vrina pituitæ.

Ægrotus V.

Epicratis uxorem, quæ decumbebat prope Archegetem, vicinam iam partui, rigor fortis apprehendit. Non incaluit, ut ferebant, & sequenti die, eadem ad fuerant. Tertio autem die, peperit filiam, & alia omnia processerunt secundum rationem. Secundo die post partum, apprehendit eam febris acuta, cordis dolor, muliebrium locorum. In somnis erat; subdito quidem pressio hac facta sunt leuiora. Capitis autem & colli, & lumborum dolor innasit. A ventre autem pauca, biliosa, tenuia reddidit; sincera, vrinæ tennes, subnigra. Sexto autem postquam eam febris arripuit, sub noctem delirauit. Septimo omnia exacerbata sunt, sine somno delirauit, siticulosa: deiectiones omnes biliosa, subrubra. Octauo riguit; dormiuit copiosius. Nono cū isdem fuit. Decimo crura cum labore dolebant, cordis rursum dolor innasit cum capitis grauitate, non delirauit, dormiuit magis, ventres resistit. Undecimo sudauit.

Anit. Minxit vrinas melioris coloris, subsidentiam habentes copiosam, melius se habuit. Decimo quarto riguit, febris acuta. Quindecimo vomuit biliosa, flana, suberebra, sudauit, sine febre fuit, per noctem autem febris acuta, vrina crassitiem habentes, subsidentia albâ. Decimo sexto exacerbationem nocte habuit, & cum difficili tolerantia, non dormiuit, delirauit. Decimo octauo siticulosa: lingua exaruit, non dormiuit: delirauit multum, dolebat ei crura. Ad diem autem vigesimum, manè parum riguit, comatosa, quiesca dormiuit; vomuit biliosa, pauca, & nigra: Sub noctem surda facta est. Circa vigesimum primam autem lateris sinistri granitas undique cum dolore infestauit, parum iussit, vrina autem crassitiem habentes, turbida, subrubra, reposita non subsidebant: Cetera autem leuius habebat, non sine febre. Statim à principio in larynge dolorem, & raborem habuit, & gurgulionem renuissam, fluxio acris, mordax, salsa, usque ad finem perseuerauit. Circa vigesimum septimum sine febre fuit. Vrina habuit sedimentum, Latus nonnihil dolebat. Circa trigesimum quartum, febris eam corripuit, Venter biliosis turbatus est. Quadragesimo vomuit pauca biliosa. Indicata est perfectæ & à febre liberata octogesimo.

Cum diceret vxorem Epicratis duobus diebus ante partum correptam esse rigore, ex quo non febricitauerit postea, addidit, ut ferebant: quæ verba dubitantis esse putat Galen. qui scripserat alibi, mala porro super mala eueniunt, ut post rigorem febris: insimans, scilicet, non posse rigorem fieri, cui febris non succederet. Ego verò non arbitror, Hippoc. affirmasse id omnino nunquam fieri posse, sed non nisi tardè, & quibuscumque ex causis. Inter quas præcipua est erudorum succorum redundancia cadidisse verò illud, ut ferebant, veritatis causa, quod non viderit: sed audierit à familiaribus mulieri. Verisimile est enim, non esse accessum medicum vique ad diem secundum post partum, quo febre est correpta: Quamquam morbus non tantum à die quo est enita, initium habuit motus, ac proinde etiam computationis: sed & à die quo riguit. Nam ab eo die cepit iam parere, cum symptomatis partus grauioribus, & minimè naturalibus. Indicatum autem est à me in controuersis illud à die quo peperit, esse à die quo cepit parere. Ergo dies quo primo febricitare cepit, erat iam quintus totius morbi. Non enim febricitauit sequenti die post partum, sed post diem parum secundo. Quare indicatus putetur octogesimo quarto, quia à febre octogesimo. Atqui, quia insinuer non esse eundem sextum à febre, & totius morbi, dixit, sexto postquam febris eam corripuit sub nocte delirauit. Si enim legitima computatio esset à febre, ut in alijs, non semper in his diceret à febre, sed taceret. Apertissime hæc quoque habuit signa affectionis vteri, & multipradinis excrementi multiplicas, pituitosi scilicet, & biliosi: quare & falsi, quia

Habuit enim dolores mulierum, & oris ventriculi, quod antiqui vocabant cor, quæ pars cum vtero itatim consentit. Habuit etiam dolores capitis, collæ, & lumborum. Quod partium earundem passio attestatur, & multitudine indicat. Iam vero horrores quibus febres non supercenerunt, & coma, quod vigesimo die factum est, crudos succos: perurgilium, delirium, & biliosæ delectiones, bilem indicabant, & dolor & rubor gurgulionis, qui fuit à principio per totum morbum erat bilis & falsæ pituitæ progenies. Vomitus niger, & urina crassa, & turbida, subrubra, & grauiusculi sinistri lateris cum dolore, significabant crassum & melancholicum sanguinem. Nam dolor hic grauius, ad lienem præcipue pertinet, excrementis sibi familiaribus refertum. Vique ad vndecimum diem exigua erat salutis significatio nam signa passionis erant magna. In excrementis erant, partim cruditas, partim contraria concoctionis signa. In genere signorum salutis, aut mortis, nullum video fuisse omnino bonum: & fuerunt multa valde mala. Itaque affectio videbatur lethalis sed quia, ut consentaneum est, facultas fortis fuit, & symptomata fortasse ob laborem patius fuerunt, quam pro morbi magnitudine, maiora, & urina, quam pro corruptione succorum, deteriores, ob admissionem melancholici excrementi, euasit mulier sed cum difficili iudicatione, & morbo producto vsque ad constitutionem longiorum. Vndecimo habere cepit signa concoctionis in urina, obsecratam (tantum enim melioris coloris) fuerant autem subnigra, quare haud multum erat, esse melioris coloris. Subsidentiam habebant copiosum, qualis ex crudis succis fieri solet, nihilominus hæc fuit mutatio in melius. Decimo quarto fuerunt iam in urina signa manifestæ concoctionis. Urina enim (inquit) crassa cum subsidentia alba. Multo autem plus est habere crassitiam substantiæ, quam colorem meliorem. Nam cum Hippoc. dicit crassas, non addens perturbationes, coctas intelligit. Merito ergo iuxta legem constitutionis legitur, iudicata esse febris vigesimo septimo: sed, ob dictam causam, iudicium non fuit perfectum. Imò quia symptomata quædam durauerunt, ut lateris dolor, repetit exacta alia septimana, trigesimo quarto, quo etiam delectiones biliosas habuit, & quadragesimo vomuit. Nihilominus febris est producta ad octogesimum. Non mirum, si quicquam vigesimo septimo primo die pleuritidem superuenisse suspicaretur. Habebat enim febrem perpetuam, & accidit lateris dolor cum rufi. Tamen non esse veram pleuritidem, planè intelligeret ex doloris specie. Grauius enim erat, non pungens. Atque quia ad totum latus pertinebat, non tantum ad thoracis partem, manifestum fiebat, aut ad hypochondrium cui omnia alligata sunt, pertinere, aut per totum latus causam esse effusam.

Egrôtus VI.

Cleonastidem, qui supra Heracleum decubebat, febris ardens corripuit incerta periodo. A principio non dolor capitis, & sinistri lateris adfuit, & membrorum labores

Aquales ex lassitudine accidunt. Febriles exacerbationes subinde & sine ordine inuadebant. Sudores quidem nunc aderant, nunc minime. Maxima ex parte incidebant paroxysmi in dies decretorios præcipue. Circa vigesimum quartum autem doluerunt ei extrema manus vomuit flava, biliosa, satis multa, paulo post virulenta, quibus omnibus subleuatus est. Circa trigessimam diem cepit sanguis fluere ex utraque nare, & hæc erraticè & paulatim vsque ad iudicium. Non abhorruit autem à cibo, neque sitiit per totum tempus, neque somno caruit. Urina tenuis non sine colore. Quadragesimo autem minxit subrubra sedimentum multum subrubrum habentia. Subleuatus est. Post hæc autem variatur urina: nunc quidem sedimentum habebat, nunc non. Sexagesimo urinis sedimentum multum, & album, & laue adfuit. Remissa sunt omnia. Febris intermisit. Urina autem rursus tenuis, sed boni coloris. Septuagesimo sine febre fuit. Intermisit dies decem. Octogesimo rignit. Febris cum arripuit acuta, sudauit multum. Urina habuit sedimentum tubrum, laue. Perfectè iudicatus est.

Hæc febris fuit erratica continua vsque ad sexagesimum, quo facta est intermittens. Erratica autem continua est, quæ exacerbationes habet erratico modo. Habuit autem ut paroxysmos, ita euacuationes erraticas, sudorem scilicet, & fluxiones sanguinis. Dolor sinistri lateris non erat pleuritis, quædam enim alia symptomata adfuerunt, sed ex adiunctis coniecto ad ventriculi os cruditatibus refertum, est dolorem pertinuisse, sepius enim id latus ob ventriculum dolet. Nimirum collocatum est eo loco eius os. Atqui ex huius passionis statim dolet caput, ob malos fumos, quos recipit: quin & totum corpus dolet, ut quod est defatigatum, & lassatum labore, debilitatis scilicet partibus omnibus. Atqui quod 24. factum est, hoc quoque indicat. Leuati enim sunt omnes dolores vomitu bilioforum, & virulentorum. Quæ quidem partium fuerunt biliosa, quæ ob debilitatem partis confluxerunt, partim malè corruptus chylus. Neque mirum non ante vigesimum quartum esse euacuata, quæ in ventriculo putruerant. Scimus enim post multos plures dies solet, quædam in ventre coacta, expelli. Atqui non abhoruisse à cibo, neque sitiisse, neque caruisse somno, multus & crudus succos faciebat, & frigidus. Neque verò quoniam biliosa euomuit à cavo ventris, non habuit intra tunicas pituitosa. Dolor manuum extremarum, abscessus quidam fuerit, quales solent esse per febres longas, maxime per quas assidue à principio, & variæ euacuationes sunt. Velut in hoc. Id enim multitudinis signum est. Accidit autem maxime abscessus ad articulos per febres laboriosas, cuiusmodi esse hæc, illa totius corporis lassitudo declarauit. Chetysia ergo censetur tentatum esse Cleonastidem: 24. habuit urinas tenues boni coloris, quales crudo morbo fieri alijs dixit, vsque ad 40. circa quem cepit habere conco-

Febres laboriosas, cuiusmodi esse hæc, illa totius corporis lassitudo declarauit. Chetysia ergo censetur tentatum esse Cleonastidem: 24. habuit urinas tenues boni coloris, quales crudo morbo fieri alijs dixit, vsque ad 40. circa quem cepit habere conco-

Metonis manifestæ notas. Subtuba enim mixxit, A cum multo sedimento subrubro. Quare usque ad octagesimum est productus morbus. Vt hoc quoque in exemplum legitimæ constitutionis morborum. Quoniam enim ante octagesimum habuit nonnullas indicationes imperfectas, perfectas tamen non habuit antea. A sexagesimo cepit fieri intermittere. A septuagesimo incrimisit usque ad 80. quo die cum rigore, & sudore indicatus est perfectè. Videretur autem medicis. 80. die superuenisse tertiana intermittens: facto enim rigori superuenit febris, febris sudor, & integra solutio: quæ ipsissima tertianæ figura esse videtur, tamen non ita erat. Sed facultas expultrix mouere incipiens, fecit rigorem. Quia autem hæc non fuit adeo fortis, ut statim rigenti sudor superueniret, hægentibus excrementis per aliquot horas, arsit, usque dum nouo facultatis impetu facto, sudauit, & indicatus est.

Ægrotus VII.

Erasinum, qui prope Boote torrentem habitabat, febris ardens post canam corripuit, noctem perturbatè transiegit, diem primum quietum, noctem molestam habuit. Secundo omnia exacerbata sunt sub noctem, delirauit. Tertium laboriosè transiegit, delirauit multum. Quartus fuit molestissimus. Nocte autem nihil dormiuit. Insomnia aderant & cogitationes. Deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, difficilis tolerantia. Quinto mane recreatus est, intelligebat omnia. Multum autem ante meridiem furit. Continere se non poterat. Extrema erant frigida sublinida. Urina cruda. Mortuus est sub Solis occasum. Hinc febres usque ad finem cum sudore erant. Hypochondria sublimia. Contentio cum dolore. Urina autem nigra habentes suspensiones rotundas, nec subsidebant, ex ventre autem reddebant sterces. Sitiebat usque ad finem, non tamen vehementer. Convulsiones multe cum sudore circa mortem usque ad finem.

Hic Erasinus habuit secundum utrumque hypochondrium phlegmonem magnam, & multam copulentibus cerebro & nervis, tentabatur delirio & convulsione, adeo ut tandem convulsus mortuus sit. Atqui quamquam ob acutiem morbi, in dies capientis maximum incrementum, videbatur sequens dies semper fieri deterior, hesternis: tamen per patres dies moueri, ex molestia maxima, quam attulit quartus dies, & ex signis, quæ attulit sextus, iudicatum est. Habuit semper urinas nigras, quas crudas vocat, quia non erant coctæ. Non enim tantum crudæ erant, sed contraria etiam concoctionis signa. Quod non admodum sitiebat, nihilo erat melius, præter rationem enim erat. Fuit verò hic Erasinus singulare exemplum, illorum, de quibus dixerat antea, plurimos hæc tempestate sexto die mortuos, his tertiæ signis.

Ægrotus VIII.

Metonem febris vehemens corripuit cum lumborum gravitate & dolore. Secundo cum multum aquæ biberet, aluus benè egressit. Tertiò, capitis gravitas: deiectiones tennes, biliosa, subrubra. Quarto omnia exacerbata sunt. Fluxit à dextra nare sanguis, paulatim, bis. Noctem laboriosè transiegit. Deiectiones quales tertio die, urinas subnigras habebat, in quibus pendebat subnigra sparsa. Non subsidebant. Quinto copiosè sanguis fluxit sincerus ex nare sinistra. Sudauit, indicatus est. A iudicio insomnis erat, delirabat: urina tennes subnigra. Capitis perfusione usus est: dormiuit, mente constitit, morbus non repetiit, sed fluxit sanguis sæpe post iudicium.

Hæc Metonis febris ex nullo fuoco mihi videtur pendisse minus, quàm ex pituita. Nam pituita nulla habuit signa, sanguinis nonnulla. Siquidem habuit diebus, tertio & quarto, subrubras deiectiones. Flauæ bilis habuit multa, nam biliosas, & tennes deiectiones: melancholicæ autem habuit, plurima. Nam eius delirium, & petuigillum, quod post febrem solutum habuit, constat causam fuisse melancholicam. Nam sine febre non fuerit phrenitis. Sed consumpta per deiectionem & sudorem, cum bile, tunc parte melancholicæ putrescente, relicta est multa feces, quæ illorum symptomatum, ut solet, causam præstitit: Hæc ergo, quæ soluta febre subsequuta sunt, apertè declarant ex nigra bile, magna ex parte, febrem pendisse. Quare consentaneum est, urinas quoque, factas esse subnigras, ob nigrum succum. Quare non est admodum præter rationem, cum urina nigra liberatum esse hominem. Fuit enim ea urina, in hoc, non mortis, sed passionis signum. Hoc idem euenit mulieri motose in Thalo, cuius in tertio libro mentio fit. Nimirum eum urina nigra, à melancholica passione liberata est. Verum quamquam nigra bilis præcipue erat causa, affectus locus hepatis erat magis quam lien. Alioquin fluxio de nare dextera non adeo iuuisset. Est dignum hæc consideratione quod dicit, secundo die etiam multum aquæ biberet, aluus benè egressit: nam quasi reddens causam id dixit. Nimirum aluus benè egressit, quia aquam multam ille bibit. Quod quidem potuit fieri casu, aut medici consilio. Sed utrumque, non dubito iuuisset. Nam deonerando aluum, soluit lumborum grauem dolorem. Ego quidem sæpe hac parte grauiter dolente, cum ob redundantiam in intestinis dolorem ortum coniecto, do bibendam multam aquam cum multo saccharo, aut admixto oxymelle, & aut sola hac, aut immisso clystere, inuoluit deiectionem. Fecit autem arbitror ita Hippocrates in Metone, dixitque, ut nos imitaremur. Vult illud, capitis perfusione usus est. Non enim profecto ipse sua sponte

77

visus est, sed Hippocrates iussit: neque in illa occasione excogitari melius auxilium poterit. Quia bellum, ut humida causa, melancholica Intemperiei per se occurrebat, & conciliabatur somnum (quo in melancholicis nihil est utilius) & laxando vias, fluxum sanguinis de naribus, à quo adeo iuuantur omnes sunt, mouebat. Mito certo eo fluxu, adeo iuuantur esse, ut cum signa concoctionis non antecesserint, tamen quia sepe fluxit sanguis post iudicium, sine recidua transiecit.

Aegrotus IX.

Criton in Thaso, erecto & ambulanti pedes pollex vehementer dolere capit. Decubuit eodem die, horrensens, fastidiosus, parum incalescens. Nocte delirauit. Secundo tumor per totum pedem, & usque ad salam subrubescit, & cum contentione. Pustula nigra. Febris acuta: insanit, à ventre autem mirabiliosa, copiosa, effluxerunt. Mortuus est à principio secundo die.

Acutissimus exacte, ac perniciosissimus fuit hic morbus, quo mortuus Criton est secundo die, ex quo febre acuta tertiæ cepit; tertio autem, ex quo dolore digiti pedis correptus est. Nihil mirum, si hic homo podagra se tentari primo illo die suspicatus est. Nam ambulanti adhuc recto, dolor pedis accidit fortis. Tamen illud malum non esse mite, neque fieri, ut ipse, ob virtutis robur detrudens ad articulos, quæ redundant in intus partibus, sed ob venenatam quandam succorum qualitatem, suspicionem statim præbere cepit, horridum, & fastidiosum fieri hominem. Maxime autem suspicionem auxit, delirium primæ noctis. Cum illo die, non esset homo occupatus, nisi exigua febre, parum scilicet subcalescens. Quod nomen significat, ex assiduis eius diei horribus, vix posse calidum inartum, ad corporis habitum redire; accedens autem fastidium, ad intima confluere, aut in intus hætere malignus succos. Summe verò iam aperta fuit veneni significatio, cum facto maiore pedis tumore, pustula nigra cum contentione, hoc est, ampullæ quædam bullis distensis similes, erupere. Nam scimus exanthemata nigra per febres acutas erumpere, tam esse lethalia, ut vix quemquam cum iis seruari contingat. Certe anno 57. quo perniciosum quoddam genus febrium cum exanthematis grassatum est, cum rubris multi seruebantur, cum nigris, vix scilicet, videor mihi meminisse, seruari. Quopinus autem expectaret medicus Critonem abscessu cum pustulis facto iuari posse, febris acuta, & insanis fecerit. Namque illis erumpentibus facta sunt omnia grauiora, pro subleuatione febris acutæ pro delirio, mara, sine furor: & pro fastidio, copiose deiectiones, meræ, biliosæ, quæ cum adeo lethali affectu hominem iuuare non possent, vires prorsus deiecerunt. Cum ergo perniciofa signa adeo properarent, factum est, ut perierit homo intra triduum. Hic certe homo à multis putatus sit venenum accepisse, tamen scimus solere multos venenum intra se se, ex præiudicio generare, & se penè mori, non aliter ac qui acciperit.

A

Aegrotus X.

Clazomenium, qui decumbebat iuxta pulicem Phrinichida, febris vehemens corripuit. À principio dolebant illi caput, & collum, & lumbi: Statim surditas accidit, somno carebat. Febris acuta corripuit eum. Hypochondrium attollebatur cum tumore sed contentione exigua. Lingua arida. Quarto per noctem delirauit. Quinto cum dolore omnia sunt exacerbata. Circa undecimum autem nonnihil remissa sunt. Ex ventre autem ab initio, & usque ad decimum quartum multa tenuia, æquis coloris reddebant. Quod ad deiectiones attinet, cum bona tolerantia transiebat. Deinde venter resistit. Urina usque ad finem tenues quidem, boni autem coloris, & multam habebant suspensionem, dispersam. Non subsidebant. Decimo sexto minxit paulo crassius, quod habebat exigua subsidientiam. Subleuatus nonnihil est, melius sibi conspexit. Decimo septimo rursus tenues fluxerunt. Secundum vitæque autem tumor cum dolore ortus est, somno carebat. Delirabat. Crura illi dolebant. Vigesimo sine febre, iudicatus est. Non sudauit. Omnia intelligebat. Circa autem vigesimum septimum, circa dextra fortis dolor ortus est, qui cito sedatus est. Qui autem ad aures tumores neque subsidebant, neque suppurabant, dolebant tamen. Trigesimo primo, ex diarrhæa multa aquosa prodierunt cum excrementis dysentericis. Urinae crassæ minxit, subsederunt qui circa aures tumores. Quadagesimo autem doluit dexter oculus. Videbat obtusus: rediit ad statum.

B

C

D

E

F

G

Hic Clazomenius est ille Herminippus, cuius pridem facta mentio est, ubi dicebatur. Quæ circa aures in febribus erumpunt cum dolore, quibusdam deficiente iudicatorie febre, neque sedantur, neque suppurant. Hæ diarrhææ biliosæ, aut dysentericæ, aut crassarum urinarum subsidientia soluit. Ut Herminippo Clazomenio: De hoc etiam, & qui eodem modo laborant illa tempestate, dixit anax, quibus fiebant parotides, vigesimo iudicabantur. Soluit sunt omnibus, quibus non suppurabant, sed ad velleam conuertebantur. Laborant hic febre ardente cum inflammatione in hypochondrio. Hæbent autem à principio signa magnè periculi, & magna cacochymia. Nam dolores capitis, collis, & lumborum, usque cum materia redundancia febescitare incipiunt, solent accidere: evacuationis præterea symptomatice, maxima febris à principio, & delirium. Tamen signa erudunt, producta longius sunt, quam pro tanta febre sentit. Constante ergo vitæ factum est, ut sanaretur, & vires essent, & homo salubriter affectus, tamen febris prodigiosa usque ad quadagesimum: qui finis est decidendum

ex acutis. Atqui cum signa concoctionis non ceperat apparere ante decimum septimum, merito luxta legem constitutionis legitimæ, ultra trigessimum productum est malum. Rarum autem est, huiusmodi morbos, qui ex acutis fiunt, non habere intermissiones, & recidivas, & multos, variosque abscessus. Habuit hic primam indicationem in vigesimo, ut alii, qui illa tempestate per febres, habebant parotidas. Usque adeo, cum morbus aliis epidemicis grassatur, refert, quam multum, confiditase omnia, quæ ægrotantibus contingunt. Talia enim, in iis, qui similiter ægrotat incipiunt, oportet expedare. Ferè enim eodem morbo, cum eisdem signis laborantes, eisdem diebus iudicantur. Nimirum est communis causa omnium horum, quo sit, ut curatio etiam similis congruat. Atqui iuxta hæc observatio adeo, ut multo melius solcant medici, cum multum iam processit tempestas, curationem suscipere morbi postulat, quam cum incipit. Ut propter medicos, melior conditio sit eorum, qui progressa iam tempestate ægrotant, quam qui ob ipsos morbos, sit deterior, nisi plurimum iam tempestas inclinet. Omnes abscessus, quos Clazomenius habuit, frequenter solent per morbos occurrere. Maxime autem occurrunt nobis hoc anno sexagesimo primo, qui, ut quem Hippocrates describit modò, fuit difficilissimus.

Ægrotus XI.

D Romeade uxorem, quæ filiam pepererat, & aliis omnibus secundum rationem procedentibus, secundo die rigor accepit. Febbris acuta. Caput antequam primo dolere, circa hypochondrium, cum fastidio, horrore & inquietia corporis, inastatione. Sequentibus diebus non dormiuit. Spiritus magnus, & parvus. Subito renulsus & reuulsus. Secundo ab eo quo riguit, ex alio bene processerunt sterqta. Vrina crasse, alba turbida, quales sunt ex subsidentibus quam reposita per multum tempus perturbantur: non subsidebant. Nocturno non dormiuit. Tertio circa meridiem cum rigore febris acuta corripuit. Vrina similes: hypochondrii dolor. Fastidiosa. Nocturno diu fastidit. Non dormiuit. Sudor accidit per totum corpus frigidus, cito autem recesit. Quarta circa hypochondrium non nihil subleuata, & capitis alioque grauius cum dolore. Leui sopore detenta est. Patientis è naribus sananis stillauit. Lingua arida, frigidissima erat, vrina sanas, & frigida, per noctem dormiuit. Quinto sitibunda, fastidiosa, & vrina similes, ab alio nihil detrahit. Circa meridiem multum delirauit, & rursus cito parum rediit ad mentem. Surrexit, mox sopore correpta est, refrigeratio exigua, nocte dormiuit, delirauit. Sexto mane riguit, cito autem recesit, toto corpore sudauit, extrema frigidabant, delirauit, spiritus magnus & parvus. Paulo post conuulsiones à capite ceperunt, subito mortua est.

A Cur Hippo. narrat vxorem Dromeade peperisse filiam? an quia filiam peperisse, multo deterius est, & ex filia, quam ex sibi patre, sapius, & grauius ægrotatur. Nam & Epicratis vxorem, narrauit prius, filiam peperisse. Nimirum si omnes quæ pepererunt, & non sunt multum expurgatæ, paratæ sunt grauius ægrotare, ob multitudinem excrementorum quæ nouem mensibus congesseerunt, multo magis quæ pepererunt filias. Quia enim magis excrementosa sunt, plerumque filias contingunt. Hæc verò cum filiam peperisset, lethalius febricitauit, adeo ut mortua sit septimo à partu, sexto ab acuta febre. Totus autem affectus huius, fuit ex purgatione in tempestiue suppreffa. Multa excrementa maligna & varia, partim pituitosa, partim reuerterunt, alioquin sita impetis hypochondrium, & ventriculi os, deinde caput, in quo ubi semel firmata sunt, cum conuulsione mortua est malier. Laborauit verò caput ob ascendentes vapores, per consensum, antequam firmatum in eo impud malum est. Sed mirum est, quod dicit, aliis omnibus (secundum rationem procedentibus). Si enim omnia facta sunt, narrata sunt partus. Quotiduo ergo potuit primo die febricitare febre acuta? sed illud mihi aliud est, quam quod illo die agenda fuerant, secundum rationem fuisse facta, hoc est, mox post partum emissas fuisse conuulsas. Rigor non erat signum morbi, sed malicie excrementorum, & passionis ætudoferum partium.

D Quamquam non mirum si quispiam considerans, tertio die ab hoc quo primū riguit, rigere tutum, & ex rigore factam esse suam febre acutam, hoc est, acutissimam febre tenentem magnam partem esse febrilem tertiam, & ob constantiam suam continens, totum morbum esse febrilem. Ceterum quamquam quod primū diebus non habebat, statim distinctionem suam huiusmodi corripit, quod quæ fuisse post rigorem dicit, tamen sequens figura aperte prædit, non esse hunc morbum. Nullus enim rigor quinto factus est, sed sextus. Itaque rigor huius non morbum docet, sed fuit malitiam indicabat. Successu febris acuta, hoc est, ardens, ut per paroxysmos soler, patere sentibus quæ erant agitata. Deinde his decimibennibus in hypochondria, ceperunt dolere. Fastidiosa fuit laborante ore ventriculi: horrore correpta, ob malignam qualitatem succorum in membris omnes molestant, & hac quodque causa, inquit. Hoc verò id est, quod esse modo quodam indicat, male habentem. Peragunt, & spiritus magnus, & parvus, compingentis ceteri, & incipientis denique. Hypochondrium doluit imprimis, statim factum est velut suspensum à sepro, & superciliis paribus, quod facies per illud cunctis in caput sit. Quæstionem rapient in caput, portenderunt vrinæ, quæ secundo die appaeruerunt, crasse fecerunt, albæ, & turbide, quales fieri solent, quæ multo tempore repositæ perturbantur. Fiant autem ex iis, quæ antequam perturbarentur, subsidentibus. Hærenum sunt, quæ alibi vocat, velut lumen totum, ubi dicitur, vrinæ quales rememororum dolorem capitis significare, quæ hæc, aut adeo, tales enim vrinæ dicit fuisse deteriores. Quod etiam die fuisse dicit hypochondrii dolorem cum fastidio, & nocte difficili tolerantiâ, & perungulum. Ego quidem video mihi intelligere corripit, nisi, iam hypochondrium dextram vix sensitum (id enim non distinguit) nec fortasse vrinæ quæ

phlegmonosam affectum, ex confusa scilicet, qui in eam partem à principio fieri cœperat. Quod, si daretur per totum corpus, non erat malum: malum autem, quod frigidum: quamquam leuius, quia cito recaluit. Frigidi sudoris duplicem eo die fuisse causam puto, admissionem pituitæ cum bile, & debilitatem innati calidi malæ se iam diffundentis. Quarto die, pessima mutatio facta est. Id quod omnibus, qui illa tempestate sexto die mortui sunt, cōsignisse, antea dixit. Nam quid aliud fuit, circa hypochondrium, nonnihil subleuatam esse: capitis autem dolorem grauem, & soporem accidisse, & pauca à naribus exisse, quæ iam translatam esse magnam materiem partem, ab hypochondrio in caput: dolor quidem hanc permutationem indicabat, grauitas autem & sopor crassam, & pituitosam fuisse materiam magna ex parte. Atque adeo pituita in caput impleta, bilis hæret magis in ventriculo. Quare facta est lingua insigniter arida, & mulier siticulosa. Vrinæ quoque ex crassis & turbidis, factæ paucæ, & tenues, indicabant raptum materię in caput. Sed oleosas quoque fuisse dicit. Galenus in enarratione historię Parisiensi libro dicit, oleosas vrinas non dici, quæ oleum continent: sed quæ substantiam modo & colore similes oleo sint. Cæterum hoc loco constat oleosas non ita dici: essent enim crassæ: at verò dicit, vrinæ tenues, oleosæ. Non ergo substantię modo similes oleo: sed velut oleo plenæ intelligit. Quæ quidem colligationis soboles sunt. Sed quid mirum, tam acutam febrem fuisse etiam colligantem? itaque quid quid, in historia Parisiensi nomen significet, huius mulieris vrinæ oleum continebant innatans. Quinto die omnia fuerunt similia, & præter hæc alia: Quinque est suppressa, expultrice facultate iam cessante. Atque hoc tempore omnia fuerunt iam repente cōuolssa. Accidit enim in hoc moriendi generi, ita mori, vt paulo ante, iis qui ad sunt, non videntur morituri.

Aegrotus XII.

Homo quidam incalescens largius comant & potauit, nocte vomuit omnia, febris acuta corripuit cum Hypochondrij dexteri dolore: Phlegmone submollis ex externa parte. Noctem difficulter tulit. Vrinæ autem initio rubræ, crassitie habentes. Reposita non subsidebant. Lingua arida. Non valde siticulosa. Quarto febris acuta corripuit cum omnium membrorum dolore. Quinto vinum xii lavi, oleosum, multum. Febris acuta persenerant. Sexto vespere multum delirauit. Neque nocte dormiuit. Septimo omnia exacerbatæ sunt. Vrinæ miles. Verba multa proferebat nec se continere poterat. Ab alio autem cum irritatione exierunt humida, turbata, cum lumbricis, nox similiter laboriosa. Mane autem post rigorem febris corripuit acuta. Sudauit multum, sine febre ferri visus est. Non multum dormiuit. Ex somno refrigeratio accidit & spatio. Vespere multum delirauit. Paulo post autem vomuit

A nigra, pauca, biliosa, nono refrigeratio. Delirauit multum non dormiuit. Decimo ei, crura doluerunt, omnia exacerbatæ sunt. Delirauit. Undecimo mortuus est.

Nullum est erratum tam exiguum, quod non possit magnopere ledere, cum, qui ad mortuum paratus iam sit. Tantum morientium habet occasio, vt non ita prædem in historia Philonis filie emaduerimus. Hic cum iam febricitare inciperet, fortasse id non agnosceret, aut ranti mali initium esse non timens, cantant lauræ, atque adeo, vt est verisimile, potauit largius. Læsus malum est, & continere non potuit cibum, sed vomuit omnia, & nocte plurimum creuit febris, & phlegmonem contraxit in hypochondrio dextro, in partibus internis. Hoc enim est, quod dicit, submollis, ex externa parte. Hoc est, fuit inflammatio, quæ in externa parte penitus sentiebatur. Erat itaque in interna eius hypochondri. Quam prouide ad hepar pertinuisse constat. Habuit profundè dolorem, & ardorem eo loco, febrem ardentem, linguam aridam, exsiccantem quoque vltimam referebant. Vrinæ imprimis rubræ, crassæ, ex feruente sanguine, deinde habere cœperunt multum oleosum, læue, hoc est, multam pinguedinem. Hinc difficilis tolerantia. Hinc perurgilia, delirique: cum his non erat admodum siticulosa. Nihil tamen id erat melius, delirium enim, aut cœrupti sensus: Quod septimo die exierunt ab alio cum irritatione humida turbata, inflammationis etiam fuit soboles. Biliosa enim & ysta erant, cum irriterant. Lumbricos autem genitos cum his esse, mirum est, necari enim solent à bile, generationem autem accipere ex crudis cum quadam concoctione, adeo vt morbi salutaribus suntibus in indicationem, experiri soleant, vt in prognostico dicitur ab eodem Hippocrate. hic verò expediens non fuit, quia morbus non habet indicationem. Quare cōiecto hinc non solum ex phlegmone, sed etiam ex satietate in ventre febricitante. Coquendis ergo crudis in ventre genitos esse lumbricos, & ab exsiccata bile necatos, & expulsos esse. A septimo die habere cepit signa mortis, & superuenientium genere, velut ex somno frigus, quod suffocatio caloris naturalis facit. Patiuntur verò ita dormientes, qui in eo stato constituti sunt, de quibus in Aphorismis dixit, ubi somnus laborem facit, mortale. Tale etiam fuit signum, delirium magnum. Loquebatur autem pessimum fuit vomere paucæ, & nigra. Hæc enim vomitus postmodum morituris accideret solent. Dolor crurum quibusdam fieri solet, cum in ea abscessus sit, tam in extremo autem iam constitutis, non ita, sed ob summum facultatis langorem, sentiente iam facultate ex ipsis membris pondus. Quod undecimo die mortuus est obseruari debet, & ob huius diei vim, & quod septimus, qui eius est index, insignem attulerat mutationem.

Aegrotus XIII.

Mulierem quæ decumbebat in lecto, mensi fuerat quidam febris vrinæ

mens inuast, statim autem caperunt dolere lū-
bi. Tercio die doluit collum & caput secundum
claviculam & dextram manum. Circa autem
lingua priuata est voce. Dextra manus lan-
guis cum conuulsione apoplectico modo. Delirauit
omnino. Noctem difficulter tulit. Non
dormiuit. Venter turbatus est, biliosis paucis,
sinceris. Quarto lingua priuata est voce. Con-
uulsio eorundem. Dolor omnium membrorum
permanebat, circa hypochondrium tumor ade-
rat cum dolore. Non dormiuit. Delirauit om-
nino. Venter turbatus. Urinae tennes, non boni
coloris. Quinto febris acuta corripuit cum hy-
pochondrij dolore. Delirauit omnino. Deie-
ctiones biliosae. Per noctem sudauit, & febre
liberata est. Sexto mente constitit. Omnia sub-
leuata sunt. Circa claviculam autem sinistram
dolor permanebat. Stigilata. Urinae tennes.
Non dormiuit. Septimo tremor accidit, leui
sopore & delirio detenta est parua. Dolores se-
cundum claviculam & brachium sinistram per-
manebant. Alia autem subleuata sunt. Omnia
intelligebat. Tribus ante in diebus eam reliquis
febris. Undecimo rediit. Ex rigore suborta fa-
bris eam corripuit vehemens. Decimo quar-
to autem vomuit biliosa, flaua, copio-
sa. Sudauit. Sine febre. Iudicata est non sine
dolore ex eisdem passionibus.

Omniem actuum modum in vtero gerentibus
esse letissem, in Aphorismo dixit Hippocr. Verum
si quod tempus non est admodum periculosum in
huiusmodi, est à quarto mense vsque ad septimum.
Quis maxime curationem admittere potest. Ita-
que, quamquam graue fuerit, hanc mulierem ge-
rentem vtero, acuto morbo teneri, quia tamen vi-
cina iam erat quarto mense, liberari potuit. Miran-
dum autem magis, eam sine signis concoctionis, li-
beratam esse perfecte: quoniam cum difficili iu-
dicio. Non enim ad iudiciale diem sine recidua
venit. Febricitauit haec quoque ex biliosis, & pitui-
tis ascendentibus sursum versus, pituita vero repe-
tente in caput, & neruos. Dolores ergo habuit im-
primis lumborum, deinde colli, & capitis, & clavi-
culae, & brachii & regione claviculae, positi multis
irrauentibus, & in caput, & in collum, & in eam par-
tem, quae ex euerice, nerui brachium mouentes, nas-
centur. Cum autem nectos tenere pituita inieper-
et, circa malum processit, & lingua resoluta est, &
voce priuata, quarto scilicet die. Sed quid est quod
dicit. Tercio manum dextram languisse, cum con-
uulsione, apoplectico modo. Si apoplectico modo,
certe resoluta est, si autem resoluta, non videtur esse
conuulsione languisse. Nam resolutio, longe differt
à conuulsione. Verum quod contigit, hoc est, quod
etiam contigit quarto die linguae. Pars resoluta est,
tamen ante quam resoluta omnino caderet, motus
habuit conuulsuos, ut scilicet fieri solet, succo in-
grediente neruos, & facillare repugnante, ut mem-
brum in figura contineat. Sed & cerebri latio in-
gessit apparuit nocte tertii diei. Delirauit enim omni-

no, & vigilauit, & noctem difficulter tulit. Hinc dif-
ficultati noctis successit turbatio ventris, excremen-
tis paucis, biliosis, sinceris. Quae euacuatio mala
fuit, & quia intempestiva & exigua, & quia sinceri
excrementi. Vbi dicit, secundum claviculam dextrae
manus, & rursum, dextra manus languis, coniecto
vitiatum esse coctem Gæcum & Lænum, legen-
dumque fuisse, pro dextra sinistra, & pro dextra si-
nistra. Nam paulo post, hos ipsos dolores, & labo-
res narrans, dicit circa claviculam aurem sinistram
dolor permanebat. Et rursum, dolores secundum
claviculam & brachium sinistram permanebant. Hoc
autem verbum permanebat, aperte significat de
eisdem doloribus eum dicere, qui à principio expe-
rent, non de nouis. Succedentibus itaque similibus
signis semper malis, cum signis autem concoctionis
manifeste, septimo soluta est febris. Non tamen ita,
ut quisquam expectare posset, non redituram. Ma-
nebant enim multi dolores. Undecimo facta in de-
tenuis mutatione, decimo quarto liberata est: prae-
ter expectationem profecto, si quis aliis tota hac
tempestate. Nam quantumuis viderentur constare
vires, tamen futuras recidivas admodum erat con-
fidentium.

Egrotus XIV.

M Elida quae decubuit iuxta templum Iu-
nonis, capite caput, & collum & pectus ve-
hementer dolere. Statim autem febris acuta
corripuit eam. Menstruus sanguis paucus ap-
paruit, dolores omnium horum continui erant.
Sexto sopor occupauit cum suffidio, horrore, &
malarum rubore, parum delirauit. Septimo su-
dauit. Febris intermisit. Permanebant dolo-
res. Reuersa est. Somni pauci. Urinae usque ad
finem boni quidem coloris sed tennes. Deiectiones
tennes, biliosae, mordaces, valde paucae, ni-
grae, fetidae erupuerunt. In urinis subsidentia
E albae sunt. Sudauit. Iudicata est perfecte undecimo.

Haud dubie mulier haec ob suppressionem men-
struorum laborauit peripneumonia. Nam aliquan-
to ante febrem, capitis, colli, & pectoris dolorem
habebat fortem. Si qui autem pars ante febrem do-
luit, in ea solet morbus firmari. Verisimile ergo erat,
hunc morbum firmatum iri in capite, aut parte ali-
qua thoracis. Tantum refert ad morbi exactam co-
gnitionem, percipiam, ut habere homo, an quem
manifeste febricitare coepit. Atqui propterea phre-
nitidis non sunt in hac consecuta signa (non enim
delirium perpetuum) sed paraphrenitidis per con-
sensum cum alia parte, sextoque. Laborare verò pul-
monem inflammatione, omnia quae subscentia sunt
iudicauerunt, febris acuta, rubor maxillarum, coma,
& delirium. Hoc enim consensio cerebri generis,
familiaris peripneumoniae est. Hippocrates non-
quam solet pulsum inuenisse habuerit, verò haec
molles. Fastidiosa fuit, ob viciniam otis ventriculi
cum pulmone, & obfurationi, & intemperiem. Do-
lor quidem pectoris, ob pulmonis affectum non so-

let esse fortis, sed sardus quidam. Cæterum hic fortis fuit, antequam in ipsum pulmonem fluxio est recepta, dolentibus aliis partibus, quæ illum circumstant, per quas fluxio fiebat. Malo autem procedente, verisimile est, hunc dolorem commutatum esse cum alio tardiori. Hæc inflammatio ob partis calorem, & viciniam cum corde, acutissima esse solet. Ita huic contigit, finita est intra septem dies, nam & febris est extincta. Sed quia permanebant dolores, capitis scilicet, colli, & pectoris, quod non esse infumptam totam fluxionem indicabat, redit inflammatio, ac cum ea febris, quamquam in recidiva malum fuit multo magis biliosum, in prima febre multo magis pituitosum. Indicant id symptomata. Habuit enim patcos somnos, deiectiones tennes,

A biliosas, mordaces, nigras, fetidas, & exiguas. Quæ quidem, & ob qualitatem, & quia exigua, mala erant, tamen quia urinx usque ad finem apparuerunt, rennes, boni coloris, quæ partim cruda, partim cocta sunt, in fine cum subdientia alba leni, indicata est perfectè cum sudore, vnde decimo. Oportet hic animaduvertere non esse per inflammationes quarundam partium, negligendam urinarum inspectionem, in hac ægrotâ maxime, in qua excrementa indicabant, febre non esse tantum accedens, sed putridam etiam in venis. Non minus considerare oportet, vim septimi, & vndecimi, esseque sudorem accommodatam indicationis speciem in peripneumonia.

B



LIBER SECVNDVS

SECTIO PRIMA.

ARBVNCYLI in Cranone æstui grassabantur. Pluebas per æstus æstati & continenter, acciditque id præcipue ab Austro. Nascetur quidem sub cute sanies, quæ intus conclusa, calefcebatur & puritum excitabat. Deinde bulla quales in ambustis erumpabant, ægrique sub cute vri videbantur.

Febres omnes cum bubonibus malæ sunt præter diarias, vt in Aphorismo ab eodem dictum est, tamè non omnes æquæ malæ, sed quædam decretoriis fuci notas habent: Hinc fit, vt in iis febribus, quæ præcipue pestilentes sunt, carbunculi quidam, aut carbunculus proximè inflammationes, in aliquo adenosarum partium mox appareant: quibus non raro succedit, gangrena, & mors. Raro autem incipit pestis mox à carbunculis, sed antecedere solent febres mali moris, intermentes plurimos, fortasse sine vitio aliquo cutis imprimis, deinde cum maculis moribus calicum similibus, aut vibicibus, aut bullis similibus iis, quæ fiunt in combustis: tandem consummata peste, apparent carbunculi, innascentibus simul aliis maculis per totam cutem: nam magna significatio est malignitatis materię intempestiua expulsiō. Quare mox apparent in malignis, quæ Greci vocant phlyctenas, aut exanthemata, aut phymata. Sunt verò hæc bullæ, aut macule, aut tumores: & accedunt his sæpe malignæ vomitiones, aut profusio alui, sudores copiosi, inrempessive hæc omnia, & sine conferentia, & tolerantia. Accedunt præterea symptomata alia malignitatis, vt deliria, & synopes, & pulsus diuersi, & febriles. Ita factum est in Cranone, Cuiusmodi Thesalis, quam pestis pessimi afflixit. Fuerunt carbunculi, non quidem omnes abscessus, qui eo anno in cute apparuerunt, sed qui æstui. Verisimile est autem à principio veris, quod ab æquinoctio incipit, febres malignas solas, aut cum

C alis abscessibus fuisse, incunte autem æstate circa ortum vergiliarum cepisse apparere carbunculos. Ita enim fieri solet, & ita factum esse hoc anno Cæsaraugustæ scimus. Atqui profectò merito. Nulla enim incipiunt à maximis. Merito ergo alii morbi pestilentes, cum aliis minus malignis abscessibus facti fuerunt in initio: factio iam maximo æris calore, cum carbunculis. Non enim tantum qui hos habent, sunt pestilentes, etsi hi maxime ita vocentur, sed quicumque populares, & adeo permiosis, vt plurimos interimit: Accidit verò his omnibus vt sint contagiosi. Carbunculi autem, vt docet Galenus lib. de tumoribus præter naturam, fiunt ex sanguine usque ad naturam aeris bilis feruente. Communes morbi, vt in initio primi libri indicatum est, necessarii habent causam in æris infectione. Quia sola ea est omnibus hominibus communis causa. Contagiosi autem non possunt esse, nisi ob putredinem, neque admodum mortiferi, nisi ob malignam.

E Pestes ergo semper habent causam in maligna putredine aeris. Putredinis verò causæ, quod ad temperamentum attinet, sunt calor, & humiditas, altera vt faciens, altera vt patiens. Mento ergo Hippocrates dicit, cum hoc loco, tam multis aliis, pestilentem æris constitutionem esse calidam, & humidam: velut & Galenus pluries quæ vt referri possit. Insuper ergo causam, quæ illo anno tam maligna pestis tenuit Cranonem, dicit, pluebas per æstus æstati & continenter, acciditque id præcipue ab Austro. Hæc nota est descriptio maxime calidæ, & humidæ constitutionis. Calidiores enim, aut frigidiores, humidiores, aut sicciores annum anno facit, non accessus aut recessus Solis (hic enim æqualis semper est) sed pluuie multæ, aut pauca, & ventorum species præcipue. Vt quidem hæc sint, aut non sint, sine plus aut minus, consentaneum est varios astrorum aspectus facere, quorum secundum singulos annos mira est differentia, cum hæc inferna à supernis illis lationibus gubernentur. Nam si omnia haberent se eodem modo in superioribus illis corporibus, eum non eodem modo erant hic haberent,

G

se aut fierent: Ceterum hæc ipsa afferunt hanc, aut illam temperiem pluvias aut status affecendo; aut contraria. Quod ad pluvias attinet quo plus pluit, eo annus humidior est, quo minus, eo siccior. Pluvie autem contingit continenter, & pluvia copiosa, id est plurimum (velut nunc, pluvia, inquit, larga, idque fiebat per totum tempus scilicet) aut pluvia copiosa, sed cum intermissionibus, & hæc, tunc est magna pluvia, cum imbres sunt magnæ, & intervalla brevia. (Velut in Thaso dixit sectio 2. primæ pluvie multæ, largæ, magnæ, nives, plerumque mista aeris serenitas.) aut pluvia exigua, sed continenter cadente, velut prima sectio dixerat, pluvie multæ, assidue, molles. Arqui hæc etiam est valde humida constitutio. Quia causa quæcumque continenter afficit, multum id valet efficere. Imbres largi, sed ex longis intervallis, non admodum possunt humiditatem asserre, quia sequens temporis pars, priorem semper emendat: minimè vero, cum neque crebri, neque magni imbres sunt. Fluvii omnes in quatuor genera distribuuntur, in quatuor partes facta terre divisione. In his vero maxime insignes & qui maxime naturis differunt, sunt austri, cabdus, & humidus: & boreas, frigidus & siccus. Proinde illo fluvio, crebro solet pluvie: hoc flante, non nisi raro. Et pluvie cum austro, sunt, quod ad putrescentiam attinet, non temperes, quia calide. Merito ergo tam multæ & malignæ putredines fuerunt illo anno: quia pluvie illud vero pluvie perfruerantiam, quandoque significat, cum sit præteritum finitum) in ardoribus, id est, durantibus moribus per æstivos ardores. Nam cum finiuntur pluvie, antequam calor magnus ingruat, etsi illæ per hyemem, & ver fuerint copiosæ, non est tam periculosum. Et pluvie per totum tempus, siue flaret austri, siue et ceteræ, maxime adæquæ flante austro. Est qui hoc loco legat, pro, maxime flante austro, maxime in dorso, vultque id referri ad carboniculos. Fortasse reperit in suo codice, καὶ μὲν αὐτὸς habetur vero ῥέτω, id quod ex dictis constare melius congruere. Cum dictum sit in adnatis partibus solet fieri pestilentes carbonices, nec in dorso.

In ardoribus sine pluvia febris maxima ex parte absque sudore contingunt. In his autem si tenuior pluvia stillaverit, copiosiores statim accidunt sudores. Hæc tunc difficiliora indicata manent, quam si aliter contingerent, tamen minus, nisi illud eveniat non propter hæc, sed ob morbi naturam.

Quidam verba illa in ardoribus siccitatis coniungunt cum superioribus, quasi nova sententiæ incipiat ab illis. Maxima ex parte absque sudore. Veram eam lectionem nemo probabit, qui quæ dicta sunt intellexit, & quæ mox die nunt. Dictum mihi antea est, febres malignas habere solet inter cetera, evacuationes symptomáticas, nihil conferentes. Nunc ergo Hippocrates per insinuationem dicit, molles in ista pestilenti constitutione, fuisse sudores mox ab initio febrium. Nam dixerat, fuisse in ardoribus pluviam largam. Nunc dicit, in ardoribus siccitatis, id est, cum maximus calor sine pluvias, ma-

xima ex parte, contingere febres absque sudore (quia scilicet corpora sunt, ut ipsa tempestas vlla est, arida) in his autem, id est in ardoribus, si super-rotaverit, (superrotare vocat pluvie raris gantis, ut per ardores solet) magis sudatorias fieri, ob hæc scilicet externam causam. Id vero fit in principiis symptomáticas, quia in summis febrium vigoribus fit decretorie, non ob externam causam, sed robore facultatis naturalis sunt copiosi sudores. Hoc observavit Hippocrates in Perintho, ut narrat sectio 2. tertia huius libri, dicens, Sub rogibus autem qui æstate desiderant, apparuit sudor in febricitantibus, & quidam sudores ab initio statim facti sunt. Hæc mala, quæ cum sudoribus à principio sunt, difficiliora iudicari magis, quam aliter, id est, quam si nulli apparerent. Nam paulo post dicit. Quæ bene indicata sunt, nesciam appereant. Indicatio non iudicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis indicationis. Non est autem semper mala febris magna per huiusmodi tempestates, quam sudores cumulantur ab initio, sed non nunquam, cum scilicet sit maligno modo, ut loco citato ex constitutione tertia huius libri dicit. Sunt hæc quæ antiqui vocabant febres clodes, perniciosum genus febrium: ut perniciosæ, & sicæ, dicebantur typhodes. Docet id Galen. lib. quem contra Lyceum scripsit. An maligno modo sudor fiat, an non, quo pacto cognosci debeat audies in commutatione tertie sectionis, seu constitutionis. Interim tamen scias, ex consuetudine, aut tolerancia, de quibus prima particula aphorismorum dictum est, dignosci. Ceterum, siue maligno modo fiant, siue non, sudores à principio apparentes, difficilis indicationis febres significant. Multo autem minus, si non ob hæc (ob intemperiem inquam æris) sed ob morbi naturam fiant sudores, ante tempus indicationis, velut in tertianis, tertio quoque in inclinatione, siue intermittens, siue perpetua tertiana sit, aut singulis diebus in quotidianis. Fiunt enim in his sudores, ob propriam morbi figuram, ac nihilominus multitudine excrementitiae humiditatis significat, hæc enim ob causam omnes sibi persuaserunt, sudor in tertiana diuturnitatem prænunciare, tamè minus quam in aliis morbis. Quia ut morbi, naturæ hominis congruentes, minus mali sunt, quam qui non congruant, ita symptomata ebguentia naturæ morborum. Velut hi sudores in tertianis sequuntur morbi figuram, in aliis malignitatem epidemiam.

Febres ardentes æstate magis grassantur, etsi in aliis quoque temporibus. Exsiccantur autem magis æstate. Autumno magis accidunt lumbrici & cardialgia: etsi hæc minus maligna sint, ipso morbo tali existente.

Febres ardentes merito sunt magis in æstate, sed & in aliis temporibus, quia ut dicitur tertio aphorismorum, morbi omnes in omnibus temporibus fiunt, quidam tamen magis in quibusdam temporibus, & fiunt, & exacerbantur. Fieri ergo ob victus praeviam in quovis tempore, etiam hyeme mediâ, possunt ardentes febres: ob naturam autem ipsius temporis, in æstate imprimis, secundo loco, & in autumno. Nam referre morbos autumnales inci-

piens Hippocrates citato lib. apho. dicit in autumno autem, & ex æstiuis multo. Sed cum veroque tempore fieri solent: tales febres, æstate succedunt magis, id est minus sudatorie sunt, quàm in autumno. Quia, ut dictum est in perenne, in ardoribus sine pluvia (huiusmodi sunt æstivi) febres maxime ex parte absque sudore contingunt: in autumno autem frequentes pluvias esse solere, expectamento didicimus, & Gale. dicit in comment. primi epidemion in ipso principio. Autumno sunt magis ferine, id est, cum veribus, aut cum fœdis cutis maculis, vel viceribus: & cardialgia, id est dolor oris ventriculi, et hæc minis maligna sunt ipso morbo tali existenti, hoc est ferino, & autumnali, quam si non esset. Idem enim, est pathognomicon ipsorum vermium, aut fœtore temporis, aliter est indicium malignæ, & venenosæ materiæ. Hanc esse legitimam huius loci enarrationem facile intelliges, consulens Galen. in enarratione contextus. decimiquarti. sectionis primæ sexpi epidemion, quo ita dicitur ferinum autumno, & cardialgia, & hœmorrhæ, & arta hælis. Præterea idem Gal. libello obsolescentiarum Hippocratis vocatur dicit, ferinum ipsod Hippocratem significare vermes, & serua vicia. Cuius potest quibus in autumno hæc sunt, Gal. docet illo loco ex sexto epidemion esse mali succi tunc temporis abundantiam, & intemperie aeris inæqualitatem. Multa præterea ad hanc rem faciebant nos de autumni vitæ in comment. tertie particule aphorismorum diximus, & rursus paulo post dicemus.

Ascarides vespere infestant ad Autumni similitudinem, & illa ea potissimum diei parte moventur non solum propter dolorum exacerbationem, sed proprio ipsorum motu.

Dici partes analogiam quidam habent cum partibus anni, non immerito. Quia verumque tempus finitur vna Solis circulatione in dies quidem circumque totius coeli, annus propria iragune Solis. Respondet vero meridies æstati (iragunem enim est pars temporis maxime Solis ad nos accedentis) nox media hyemi, quia utraque parte hatur, maxime a nobis Sol recedit, horæ circa ortum Solis veri: circa occasum, autumnus. Quia his horis medio cœrit ad nos distat Sol, manentius accedens, vespertinis recedens. Manifesta est analogia, ob quam morbi, qui quous anni tempore sunt, eadē parte, quæ illi respondet, solent exacerbari. Velut æstivi in meridie: hyemales, in nocte media: autumnales, vespere. Sed punquid & veriales mane videntur enim: si quis omnium diæ re conceptis opinioni, & consensui expere diæ velit credere, multis morbis esse aputa in malis, potest forte aliquid febri. eunt exacerbationes contingunt in eas horas incidere id vero non ob morbi naturam, sed casu, ob materiam. Certa est. Nam neque ver habet morbos aliquos, qui per se & ob eius temporis naturam, sunt, cum sit id tempus maxime moderatum, & proinde saluberrimum, ut ipsemet mox dicit: sed per accidens, ob eam quæ est in corpore apparatus, quidam morbi eo tempore sunt. Itaque hæc quæstio, nulla morborum est familiaris exacerbationi summo mane: contra vespere exacerbantur omnes, quia ea est decretima hora, ut respō-

der decretimo tempore, autumno scilicet. Velut ergo autumno quidam morbi sunt, magis quam aliis temporibus, omnes autem sunt eo tempore decretores, quia est omnium temporum insaluberrimum, ita vespere exacerbantur omnes ob horæ malignitatem: quidam vero etiam peculiari quadam ratione, quia sunt autumnales. Hoc est, quod dicit Hippocrates ascarides vespere faciant, similiter huius, id est eadem ratione quam hoc tempore, id est autumno. Quia ut in perenne dictum est, vermium generatio est autumnalis morbus, & illi eam potissimum diei partem perturbant. Non solum quod magis laboreretur. Id est non solum quod omnes morbi eo tempore magis exacerbentur, sed ipsi per ipsos. Id est ratione peculiari, quia est autumnalis morbus. Non autem soli ascarides, sed etiam omnium vermium genus. Meminit autem ascaridum, ut scilicet, utens ut exemplo, vna aliqua re, eam in quibus est ratio aliqua communis. Quod ergo prius dixerat nomine communi. Autumno magis ferine, dicit nunc in exemplo. Ascarides vespere ad autumni similitudinem magis infestant.

Autumno acutissimi morbi, & maxime lethales accidunt. Vniuersum simile ipsi vespere exacerbari, tanquam ipso anno perigridum habente morborum, ut dies morbi. Quale est vespere exacerbari, tale ipsius morbi, & cuiusque constitutionis ad se inuenio. cum nihil monetur in superiori specie, aliqui alterius constitutionis hæc principium fuerint.

Acutissimi morbi sunt in autumno, & æstate. Nam & in aphorismis cum recensisset morbos æstiales, adiecit, Autumno & multi ex his. Verum ut æstiales acutiores, ita autumnales magis lethales, quia succi autumnales calidiores, sed decretioris speciei, atrobiliter enim, ob vltionem maximam, quæ antecessit. Ob quam eandem causam, & ob propriam temporis inæqualitatem, facultates sunt debiliores, & morbi difficilioris iudicii, & vix, inquam sine productione morbi, aut malis abscissibus, aut permutationibus, aut recidiuis, relinquentes. Quo fiet ut æstus acutus habeant primas inuentiones, tamen multi ex acutis decedant. Sunt enim autumnales, mortales, aut difficilis iudicii. Fiteamur, ut qui acutis concepti autumno moventur, moriantur nihil tardius, sed citius etiam quam qui æstare: qui citadenti, euadant tardius. Simul ergo acuti, & mortales magis in autumno, quam alio quopiam tempore. Ex his & iis, quæ in perenne diximus, intelligi potest facile tota fere hæc dictio. Autumno (inquit) acutissimi morbi, & maxime lethales: vniuersum simile secundum totum annum, seu totius anni rationem habendo. Simile quiddam est, quod autumno accidunt ipsi vespere exacerbari, tanquam ipso anno periodum habente morbo, ut dicit quicumque habet periodum morbi. Quia quale est vespere exacerbari, magis quam aliis horis diei: tale est ipsius morbi, & cuiusque constitutionis ad se inuenio. Id est tale est, morbos autumno fieri gravioris, quam aliis anni temporibus, & constitutionum omnium anni, & se ceterum morborum, quæ eas consequuntur, proportio quidem

Et ratio est, velut ipsarum horarum dici, & diurnarum cuiusque morbi mutationum ad seipsas. Quæ proportio eadem semper seruetur, nisi quid in superiori specie notatum sit. Id est nisi tempestas novam aliquam, & insperatam mutationem faciat. Velut si procedente hyeme, rursum fiat autumni tempestas: aut incipiente vere, antequam instam longitudinem obtinuerit, æstas incipiat. Tunc enim alterius constitutionis hæc, principium fuerint: id est morbi tunc quoque mutabuntur, sicutque non quales tempestas, quæ præcedebat, asserre errata, sed quales ea, quæ tunc incipit. Nam & ipsa mutatio fuerit, ut initium alterius tempestatis. Cum morbi non fiat ob hunc, aut illum mensem, sed ob hanc, aut illam temperiem. Ut curandum nobis non sit, quotus dies huius mensis agatur, sed quæ temperies aeris sit.

Quare & annum ad se ipsum ita habere necesse est. In temporibus consistentibus, & tempestive tempestiva reddentibus annis, constanter, & boni iudicii morbi. In inconsistentibus vero, difficilis iudicii. Ut in Perintho accidit, cum ventorum status vel ab iis cessatio, aut imbres aut siccitates, aut æstus aut frigora deficiunt vel redundant.

Annum dicit ad seipsum ita habere debere, ut tempora sint consistentia: id est non recipientia mutationes nisi naturales, & tempestivas, id est, talia, qualia esse secundum naturam solent, suam quocumque tempore temperiem asserente. Quia cum tales anni sunt, morbi sunt constantes (id est suas naturas, quas habent à principio, retinentes, neque facientes mutationes non naturales) & boni iudicii, id est, qui perfecte iudicari solent. In inconsistentibus vero annis sicut morbi difficultes iudicari, id est, quod vix indicantur, & cum abscessibus, perniciosisque, aut productionibus insperatis. Sed quia non apposuerat Hippocrates exemplum anni tempestivi, neque id satis explicuerat, apponit exemplum intempestivi, ut vide illius & huius notitia comparatur, velut rectum indicat obliquum. Ut (inquit) in Perintho, cum aliquid deficiat, aut redundet, ventorum, aut non ventorum, imbrium, aut siccitatum, æstuum, aut frigorum. Ergo tempestivus est, cum nihil horum omnium sit, aut minus quam oporteat, sed tantum; taleque sit cuiusque horum quantum, & quale, iuxta cuiusque regionis naturam; quocumque tempore esse consuevit. Qualis vero esse solet hæc, quocumque in loco, habent incolæ observatissimum. Sed cur nunc Perinthi meminit? an non, ubique est intempestivus annus; in quo redundat, aut deficit aliquid ventorum, pluviarum, aut caloris, certè. Sed venit nunc in mentem fortasse ea Perinthi constitutio, quam narrabit in parte tertia huius libri. Sed huius dictionis Hippocratis longiuculum enarrationem inuenies apud Gal. in initio commentationum primi libri Epidemion.

Verum autem in vniuersum est saluberrimum est, & minimè lethale.

Ver, ut super cepimus dicere, nullos morbos af-

fect per se, quia ad nullam intemperiem inclinat, sed quia multorum succorum motum cohibebat frigus hyemis, quos solatio frigore, ver fluere finit, quidam in eo morbi ex accidenti fiunt. Proinde saluberrimum esse dicit, minimè autem lethale: quia qui sunt morbi, minus mortales esse consueverunt, quam aliis temporibus illi ipsi, ob clementiam cœli, & facultatum robur. Sed utrumque horum inest veri in vniuersum. Nam quoddam ver, nihil prohibet insalubribus, & perniciosius esse, quodam autumno, ob intempestivas aliquas aeris constitutiones.

Circa initia morborum considerandum, an statim vigere debeant. Manifestum autem fit ex incremento: ipsa autem incrementa ex periodis, & indicationibus cognoscuntur ex ipsis scilicet in periodis, ex exacerbationibus, nam manifestius necne, nam diutius necne, atque num magis affligant necne. Omnium autem continuorum, & intermittentium, quæ longa, & vulnerum, & sputorum cum dolore. Et tuberculorum inflammationes, & quæcumque alia apparent posteriori. Forte autem & aliarum rerum communium, quæ celerius, breviora, quæ autem tardius, longiora. Et in periodis, quod prius, & aliud incrementum resciente morbo.

Non dubium est multa verba in hac dictione, atque adeo in toto hoc libro esse veritate subtilia, alia etiam transposita, alia corrupta. Quod ipse sermo carens nonnunquam congruentia, iuxta grammaticæ regulas; ac nonnunquam mutilus, & varias lectionum, quæ occurrunt in Græcis exemplaribus, indicat. Fere contingit tota hæc dicitio eandem sententiam, quam aphorismus duodecimus primæ particule, & si quidam illic dicuntur distinctas quam hic, quidam hic, quam illic. Nam in aphorismo docet agnoscere paroxysmos & constitutiones, ex natura morbi, & temperis, & circumscriptione incrementis, & ex mor apparentibus & eiusmodi sunt sputum, vrinx, & deiectiones, & sudores. Hic solas constitutiones (non etiam paroxysmos) agnoscere docet, nullam autem morbi, neque temporis anni facta mentione; sed ex circumscriptione incrementi, & ex mor apparentibus, & eiusmodi sunt signis, quorum in aphorismo non meminimus. Dicit ergo circa initia morborum considerandum. Significat vero hoc nomen initium: neque ipsum primum insalutem, neque tempus ordinis, sed primum dicit, huius primo, huius secundo, huius tertio, & sic etiam alibi quocumque, medicus ad argumentum accedit. Quasi dicet, mor ac curam saluberrimam exortationem, considerate oportet ipsos morbos. Considerate vero oportet, an statim vigant. Significat vero illud statim, non ipsum principium (non enim vigent morbi in principis) sed quod dicit, quasi dicet, in eis morbis venturos sit ad summum vigorem, velut in aphorismo dicitur: qui bus statim viget est. Oportet itaque considerari quantum tempus super sit, & quæ ad summum vigorem (id est, ut tunc est) hæc, atque constitutionem morbi intelligere) nam

aliter nulla ratio esse potest instituendi victum neque curandi morbos. Manifestum autem (inquit) hoc fiet ex incremento, id est ex tempore, quod visque ad incrementum infumitur, & ex celeritate, aut tarditate crescentis. Nam quò citius venit ad incrementum, eò citius finitur morbus: cum sit ea morborum legitima proportio, ut tantum temporis super sit, quo primum apparent signa concoctionis manifestæ, quantum à primo die ad eam visque exactum est. Præterea tantò citius via pertransitor, quantò celerius: quare & morbus veniens ad summum tantò citius, quantò celerius crescit. Hoc est, quod dicit, ipsa incrementa periodis hoc est, circuitus indicant, aut morbus veniens ad incrementum, & quanta celeritate crescat. Obiter docet, quid ex hac notitia boni eveniat, dicens, iudicationes hinc manifestæ, id est, hanc coniecturam facies, an futura indicatio sit, & quàm cito. Nam acuta hic indicantur, & quæ cito veniunt ad vigorem, cito etiam iudicantur. Explicat deinde quo pacto circuitus hæc indicentur, dicens. Ex ipsis in periodis, exacerbationibus. Periodus constat paroxysmo, & intervallo. Paroxysmus est tempus difficilissimum intervalli, seu ipsa exacerbatio. In exacerbationibus ergo tria dicuntur consideranda, si prius an non, id est, si anticipent horas priorum, quæ sequuntur, an non: sed eisdem fiat, aut tardent etiam plus, & an plus temporis, an non, id est, an longiores sint prioribus, an non: sed æquales, aut breviores: atque, si magis an non, id est, si magis affligant (id quod agnoscitur magnitudine symptomatum, quæ affertur) an non: sed æquæ, aut minus. Nam si anticipant, & longiores fiunt, & magis affligent, morbus crescit: si contraria omnia, decrescit: si omnia æquæ accidunt, stat. Si autem quedam talia, quedam contraria, crescat, decrescet, aut stabit, ut hæc illis, aut illa his, præstant, aut equalis momenti sunt. Velut si febris anticipet (ne sit autem natura anticipans, aut tardans. Nam hoc neque incrementum, neque decrementum significat: sed naturam morbi) fiat autem tanto minor, siue accidentalium quod æquiparari possit anticipationi, neque crescat, neque decrescat. Ex his itaque tribus considerationibus constat notitia incrementi, aut decrementi. Quæ omnia complexus est illis verbis aphorismi, & circuitum inuicem incrementa. Mox addidit in aphorismo. Sed & ex superuenientibus, ut in pleuriticis si mox apparet spūritum. In hanc ipsam sententiam, addit nunc. Omnium autem continuorum, & intermittentium, quæ longa, ut vulnenum, & spūritum cum dolore, & tuberculorum inflammationes, & quæcumque alia apparent posterius. Quæ sanè verba nullum idoneum sensum continent, neque congruam orationem constant, libuit tamen cauta exprimere, ut in meo codice reperi. Sūt tamen hæc dubiè ita testificanda, ut legit Petrus Isaacus Steue. Omnium autem morborum, tum continuorum, tum intermittentium, longorum, vrinæ, excretionis, & spūriti consideranda sunt, & vulnenum doloris, & tuberculorum inflammationes, & quæcumque alia possint apparere. Hæc verba dignam Hippocratis sententiam continent, & aptè hærent cum his quæ sequuntur. Forte autem & Galenus rectum communium, quæ celerius breviora, quæ verò tardius longiora, & in periodis, quod prius, & aliud incrementum reuoluit morbo. Numquam signa quædam sunt pathognomonica, his

A definitur propria morbi species (quæ necessariò accident suis morbis semper) quædam sunt superuenientia, quæ superuenire solent morbis, adesse autem à principio nunquam. Huiusmodi sunt signa concoctionis, & contraria concoctioni. Nam incipiunt febres à crudis: cocta, aut contraria superueniunt iam crescentibus. Quædam sunt assidentia: hæc sunt quæ adesse & non adesse possunt quocumque morbi tempore, ut capitis dolor, anxietas, delirium, fastidium, & alia huiusmodi. Porro quæ superuenientia dicuntur considerantur, non indistinctè, in quibusvis morbis, sed quædam in quibusdam, velut spūritum in morbis thoracis, vrinæ in febribus, deiectiones in affectionibus alui: hæc sane libis, aut solum, aut præcipue. Quæ autem dicuntur assidentia, communia sunt multis morbis. Nam in omnibus, quæ dicta sunt, & aliis quam plurimis, consideranda sunt omnia. Proinde referens genus superuenientium, apposuit genera morborum, in quibus consideranda, dicens omnium morborum, tum continuorum, tum intermittentium longorum, id est, omnium febrium, seu morborum cum febribus (ut intelligantur etiam febres accidentales) continuorum, qui etiam magna ex parte sunt acuti: & intermittentium, qui longi, aut saltem non sunt acuti. Vrinæ, excretionis, & spūriti, consideranda sunt, & in vulnibus dolorificis, & tuberculis, consideranda inflammationes. Id est an cito & multum inflamentur partes viceratæ, & tuberculo maior ardor (qualis in suppuratione solet) accedat. Nam hæc in his superuenientia sunt: quia incrementi eorum morborum sunt signa. Consideranda ergo, hæc, & quæcumque alia possint apparere. Quia ea omnia sunt signa incrementi morborum: cognoscitur verò constitutio ex incremento. Referens deinde genus signorum assidentium, & communium [quorum in aphorismo non meminit] dicit, forte autem, & aliarum rerum communium, quæ celerius, breviora. Nam si conuersus omnium signorum, aut multorum eius generis, malorum cito apparet, cito moriturum: si bonorum, cito euasurum ægrotum, significatur. Ut in prognostico dictum eidem Hippocrati est. Si ergo insignia eius generis symptomata, seu bona, seu mala, tardius appareant, longiora mala significentur. Si simul in periodis quod prius, & aliud incrementum reuoluit morbus, id est, si simul abgit anticipatio paroxysmorum, & prorogatio, & exacerbatio maior. Nam si hæc adiit, tam firma inditia sunt incrementi, ut significent breui finendum morbum, ut quæ habeant assidentia. Hæc enim dictum est posse adesse, & non adesse. Sed dices, maiores paroxysmi, & longiores, & intervalla breviora, non sunt signa breuitatis morbi, sed contrarii. Nam sunt signa maioris morbi, & maioris causæ, morbus autem cæteris paribus, quantò maior, tantò fuerit longior, ut & quilibet alius motus. Falsè ergo dicit Hippoc. hæc significare morbum statim vigorem obtinurum. Hic quidam allocutanur magnopere, & incautè incidunt in contrarias assertiones. Sed oportet scire, anticipationem, magnitudinem, & longitudinem paroxysmorum fieri posse ob multitudinem materiæ, aut morbi magnitudinem, aut ob celeritatem, anticipationem quidem magis ob celeritatem: magnitudinem & longitudinem, æquè ob celeritatem, & magnitudinem: omnia autem hæc ob celeritatem & magnitudinem simul. Quia

cæteris paribus, quod ad celeritatem attinet. quanto maior morbus, tanto hæc magis accident & cæteris paribus quod ad magnitudinem, quanto morbus celerior, tanto hæc magis accident. Itaque quicumque morbus tanto finietur citius, quanto paroxysmus magis anticipabit, & longior, ac maior fiet: non inquam tanto finietur citius quam alius quibus, cui hæc non insint, sed quam ipsemet, aut quam alius illi æqualis, cui hæc non insint.

Nam eorum qui breui tempore morituri sunt, celeriores sunt indicationes, quod labores sunt celeres, continui, & vehementes. Quæ autem indicant in melius, ne statim appareant. Indicatio non indicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis indicationis. Quæ prematurius indicantur, si quum cruda sunt omnia, indicentur, recidivas portendunt, sin minus acrisiam. Lethalia quoque euadunt, quum modum excedunt.

Quia dixerat, indicationum tempus ex notitia constitutionis morborum agnosci, dicit nunc quod tempore aguntur indicationes. Est verò summa rei, bonas indicationes non agi ante eorum morbum. Quia quæ vigore naturæ aguntur, tempestiue, & cum ordine aguntur: malæ verò intempestiue. Et go in motu celeritate indicationes, id est, quocumque tempore, & antequam morbus veniat ad summum, fieri solent. Nam cum mala indicatione, mors quocumque tempore morbi lethalis, accidere potest: & si salus, non nisi exacta morbi inclinatione. Atque adeo & si in summo vigore morbi moritur homo, potuisset habere prius multas euacuationes malè iudicantes, vel à principio, nam tales sunt natura non ferente indicationes. Quia labores celeres, id est cum celeritate quadam vigentes, continui, & vehementes, esse solent. Quæ verò indicant in melius, ne statim appareant, id est non ante actam concoctionem, quia tanto minus bona sunt, quanto citius fiunt. Tanto enim maior irritatio, & naturæ impotentia significatur. Atque adeo, & si possint aliquando parte mali succi euacuata viles esse, tollere tamen morbum nunquam possunt. Indicatio autem non indicantia, id est quæ non tollunt, aut magno pere minuant morbos, partim sunt lethalia, partim difficilis indicationis. Itaque semper sunt signa mala: quia aut mors succedit, aut difficile iudicium. Est difficilis indicationis morbus, qui per multos abscessus, & multas permutationes finitur, quod vocatur discrisia. Sed quædam iudicari videntur, atque adeo integrè solui, cruda adhuc materia, non sunt soluta tamen perfecte, ac tunc, quia recidiva fiunt. Sin autem indicationes accidunt, id est euacuationes, & se bres manent, accidunt acrisia, id est indicationes, quod est produci plurimum febres, ut vix vnaquam finiendæ videantur. Hæc verò sunt, si paræ sufficillæ euacuationes, ut scilicet ferri possint. Non raro enim hæc cum per importetiam fiunt, profuse adeo sunt, ut homines dissolutis viribus intendant: fiuntque bæc lethalia, quia non paræ. id est quia maiora quam vi ferri possint.

Quæcumque decretoria esse debent, si hæc talia non fiant, difficile iudicium: Si verò contraria significant, malum denunciant: non solum si secutrant sed etiam si ad contraria primaria natura vergant, sicut etiam malorum signum est ad contraria transire.

In omni agnoscitæ doctrina, sine ad cognitionem præteritum, & præteritorum, siue ad perceptionem futurorum spectet, optimum argumentum est, ab iis quæ ad sunt. Quia quæcumque ad sunt, significat aliquid, illa si non ad sunt, significatur contrarium. Velut si in morbo acuto nubes in vris fieri septimo die, boni iudicii suo tempore futuri est iudicium: hoc idem non apparet, difficile iudicii est. Si igitur ita affecto, septimo, octavo, aut nono, nulla manifesta concoctio in vris sit, fiat autem alius lubrica, difficilis iudicationis fore morbus agnoscitur: ab eo quod ad est, & ventris in quam fluxu, qui ad est, cum adesse non deberet, & ab eo, quod non ad est, & concoctione, inquam, quæ non ad est cum adesse deberet. Sed in decretoriis, id est in euacuationibus, quæ solvere solent morbos, hoc euenit manifestè. Nimirum sunt quædam effusiones, & quibusdam viis factæ, quibusdam morbis congruentissimæ, quibusdam aliis minus (enarratum mihi hoc fufus est lib. 10 contronectiar.) velut iustitiam origibz partis, hepatis mictio, fluxus, deictio. Nares hepatis inflammationi, fluxus: sanguinis ex nare dextra: lenis, ex sinistra. Igitur cum fluere sanguinem ex nare dextra in inflammatione hepatis bene, indicatorium sit, hoc omnino non fieri, aut non fieri debet, sed aliud, difficile iudicii est. Velut si pro iis euacuationibus, quas morbi natura amat, contraria fiant, ut si in inflammatione hepatis fluat sanguis ex nare sinistra, & in inflammatione lenis, ex dextra. Quæ enim contraria significant, id est decretoria significantia contrarios motus iis qui sunt benedictarii, malum. Id quod fieri potest recurrente materia ad interna: aut ad partem malè affectam. Ut si abscessus qui bene fieri cepit retrocedat. Id enim si gressat contrarium motum, quod quidem est valde periculosum. Sed non ita solum mala sunt, quod significant contrarium: non solum, inquam, si recurrant, sed etiam primariæ naturæ contra repentia id est, repentia contra pristinam naturam morbi. Velut si à principio morbi videantur adesse signa motus materiz deorsum, & nunc subito mutato coimpetu, qui huic morbo videbatur esse naturalis, apparere incipiunt signa tapus contrariæ, in caput facti. Quemadmodum mala signa, quæ in contraria repunt, in contraria scilicet ei motui, quem per conuenientem regionem tenere expectant iis cæci: & ei quem natura morbi amabat. Difficilis enim iudicii hoc est, quia secundum reftitudinem quondam naturæ famularem fieri debent naturales euacuationes, bonæ ut sunt. Et quæ aliter fiunt, naturam non satis vincere materiam morbi, significant. Sed ut hæc prædicendi regula, quæ est pulcherrima, possimus vti, oportet, tenere notas, quibus nosse possimus, impetum succorum, quamcumque in partem fiat, & in contraria mutatum. Proinde Hippocrates, quibuslibet eorū, quæ vitia sunt, omisit, apponit eas notas dicens.

Considerare

Considerare vero sic oportet in coloribus, compressionibus venarum, tumoribus hypochondriorum, & motibus fortium aut deorsum vergentibus. Sed & multa sunt huiusmodi. Velut cum abortitiuum mammae graciles sunt, neque hic contrarietas est, neque quam tussis diuturna intumescit testis sedatur, & testis tumor orta tussis subsidet, & subleuatur. Quare admonet nos communio pectorum, mammarum, genitura, vocis.

Id est, agnosces in quam partem vergant succi, & ab motus impetus in aliam partem sit, ex coloribus. Nam rubor nimis faciei, impetum in superna significat, maxime si simul vergentibus sint. Velut contra, mediocri candor, & venarum compressio, significat in aliam partem sanguinem ferri. Quare si cui facies tuebatur, & tuebantur vena frons, nunc repente mutetur color in candidum, & detumescant venae, intelligimus in contrariam partem moueri iam succos. In quam autem, intelligimus, exitus, quae parti superuenient; Velut si rursus incipiant eleuari in tumorem vena crurum, & cutis rubere. Sed & ex tumoribus hypochondriorum insitum vergentibus, deorsum vergentibus: id est, cum tumores hypochondriorum adiuu, considerantes in quam partem vergant, sursum, an deorsum, intelligimus, quod inclinent succi. Nam cum tumida, & sursum retracta videntur hypochondria, sursum eunt, (quia hepatis suam multitudinem in venas sursum tendentes refundit, quibus tumentibus ille retrahitur) contra, cum retrahi deorsum videntur, Explicat deinde haec exemplis, praecipue quod de compressionibus partium, ex quibus recedunt succi, dixerat, & quod de tumoribus partium, in quas feruntur, insinuerat. Multa, inquit, sunt huiusmodi. Velut abortitiuum mammae graciles sunt (dicitur hoc idem Aphor. 37. partuque quinte) recedens huius rei causam dicit, neque enim contrarium est rationi, quia est magna communio mammis & vtero: id quod alio etiam exemplo explicat. Neque enim rationi, contrarium est quod in tussi diuturna euegit. Nimirum tussis diuturna solet cessare superueniente tumore testiculorum, & hic tumor, superueniente tussis. Obseruauit hoc Hippocrates constitutione prima lib. i ubi dixit, multos eorum, quos tussis sicca fangebat, aliter aut vtriusque testiculorum inflammationem incurrisse. Horum autem omnium causam esse dicit, communio-nem pectorum, mammarum, geniturae, vocis. Id est instrumentorum genitalium, quae sunt vterus, testes, & vitile membrum: & uocalem, quae sunt impetui larynx, & nerui recurrentes: deinde, & thorax, & omnia instrumenta respirationis. Horum consensio, & communio multis significatur indiciis. Mutatione vocis ex usu ueneris & ex testium defectu: intumescit mammae, cum ex compressione menstruum, & iis, quae hic refert, grauescentia mammarum in thorace, & mutua passione thoracis & testium, quae scilicet, ex tussi sicca, & antiqua intumescit testis, & ex il-

lius intumescencia. sit tussis. Ista uocalium cum genitalibus communio est manifesta. In uenis quoque de mammis descendunt per masculos testos abdominis, & committuntur cum ascendentibus ex vtero: & in neruis sextae coniugationis, eadem enim mittit sursculos quosdam in testes, & producit nervos recurrentes. Cum ergo habeat thoracis partes vias communes cum genitalibus, non mirum tenacem succum, qui non potest excreari, & difficilem & siccam tussim facit, per eas in testes abscedentes; & contra, qui non potest in testibus resolui, nonnunquam in thoracem repetere.

Abcessus sunt aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutem, aut alios. secessus utiles autem sunt, qui infra morbum sunt, quales sunt varices & lumborum grauitates. Ex supernis partibus demisse. Optimi vero praecipue sunt, qui ad infernas partes sunt, & maxime intra ventrem sitas, & remotissime a morbo, & qui per effluuium sunt. velut sanguis in naribus, pur ex auro, spatium, & urina, quae per effluuium sunt. At sunt abcessus qui eodem modo non sunt, velut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & qui in cutem abscidunt foras tubercula, velut tumores purulentes & purulenti, aut vlcus, aut eiusmodi exanthemata, aut squamae, aut desinuium capillorum, vitiligines, lepra, aut eiusmodi, quae repentinum consensum abscedens, non interrupto, & quocumque alia dicta sunt. Atque si non sint praerogatione excretionis morbi indigna. Velut Femini nepti, ex morbo graui quiddam de cubito ad digitum, qui enim non sufficeret ad suscipiendum morbum, recurrit. Morbus. Abcessus sunt aut per venas, aut per aluum, aut per nervos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alia effluuium, aut os, pudendum, auris, nares.

Per quas partes agi solet abcessus, & qui quibus meliores aut deteriores sint, haec disceptat docet, apponens quaedam exempla. Vt ut vero quibusdam repetitionibus, ut ipse sermo indicet non satis esse huiusmodi expellitur. Hippocrati abcessus est quocumque abcessus succorum, ut dicitur in iohannis ante est non semel, siue cum effusione extra corpus, siue sine ea fiat. Narrat per quas partes fieri solet, illud vero per quas, significat, per quas solet egeri extra corpus, ut per os, nares, aures, aluum, pudendum: & per quas vias abire de parte in partem a vterque venas de mammis ad vterum: & in quas decumbant, velut de cutem, per cutem expurgari viscerum oborta scabies. Dicit ergo abcessus, aut per venas, effluere scilicet sanguinem, ut de naribus, de humerorodibus, de vtero, aut non effluere: sed abscedere in partem, ut hypopressa mensuris intumescit.

mammae, & lac habent, aut etiam inflammantur: aut per ossa, hoc est, quod mox, eundem sermone repetens, dicit, iuxta ossa. Nimirum decurrunt sepe succi per periodum iuxta ossa, & nonnunquam in ipsa ossa subeunt, corrupti proutque ea. Nonnunquam per abscessus: aut (inquit) 2^o §. 7^o var. Hic quidam tonorum nomine nervos recurrentes solum intelligi volunt, quia scilicet sectione quarta huius libri differens de recurrentibus, dicit, duo verò toni à cerebro. Sed quid illi toni sunt, rectè intelligunt: quod illi soli, non rectè. Ita enim intelligere possis eos solos nervos esse, si dixerò, sunt duo nervi à cerebro. Sanius ergo sit putare, tonos dici nervos. Nam mox in repetitione scripti abscessus aut per venas, aut per nervos, quasi eadem res sit nervus, & tonus. Quamquam toni nomen non videretur propriè dici, nisi de nervis morus, quia illis continentur partes in tono. Itaque quod dicit est, abscessus fieri per nervos motus, eos scilicet, qui inseri musculis, tendines sunt. Per hos autem solere secundum rectitudinem fibrarum derivari succos, & per tales abscessus resolvi nonnunquam crura, aut brachia, ac nonnunquam corruptione eorum claudicantem afferri, idque fieri sepe derivatis succis per spinalem medullam aut secundum alterum, aut secundum utrumque laus, res est expertissima. Proinde mox, repetens dicit, per nervos, aut secūdum spinalem medullam. Exemplum est Fullo, de quo lib. 4. occurret scriptum, fullo collum, caput, septima manus stupida, nasa, crura stupida. In his cessavit. Aut cutem inquit (quod etiam mox repetit) tamen per cutem sunt abscessus omnes cutanei [quorum etiam enumerationem facit in hac dissectione] & insensibilis evaporation, & sudor. Sed quia nondum fecit omnium viarum per quas abscedunt succi, enumerationem, addit, & ex *typhlo* *tempore*, id est per alios succorum recessus à partibus affectis. Deinde docet designare bonos & malos abscessus: boni inquit, sunt, qui infra morbum sunt, id est infra partem primariò affectam. Velut cum sunt varices, & lumborum gravitates ex supernis. Sed quia tantum dixerat, bonos esse eos qui infra morbum, possunt autem esse iuxta morbum, & tamen in nobiliorem partem, velut si ex hepate fiant in reum, aut vterum, qui abscessus non erant optimi, cum afficiant partes minime viles: atque adeo possit aliquis abscessus fieri in partem inferiorem ex primariò affecta, qui tamen erit malus velut si ex collo in pulmonem abscessus fiat, addit, optimi verò precipue sunt inferni, idque non vtemusque, sed longissimè infra ventrem positi, & remotissimi à morbo. Nam infra ventrem sunt tantum crura partes, omnes quidem externae, & humiles. Dicitur autem ei est in prognostico, eos abscessus maxime optari debere, qui ad exteriora ferantur & ad humiliorem partem fiant. Sed ut abscessus qui sine effusione sunt, tanto sunt meliores, quanto longius ab affecta parte succus pellitur, ita qui cum effusione sunt, meliores sunt, quam qui sine ea. Nimirum ita abscedunt etiam magis. Scribit mox exempla abscessuum cum effusione, & deinde sine effusione. Cum effusione sunt, ut sanguis à naribus, pus ex aure, spiritus, urina. Sed cur addit, quæ per effusionem sunt? non quid hæc, quæ dicta sunt aliquando sine effusione sunt? certe illad, quæ per effusionem

sunt, potest intelligi appositè, aut intelligi de spiritu, & urina. Hæc scilicet esse tales abscessus, cum sunt cum effusione decretoria. Nam quotidiana mictio, & spiritus, non est abscessus. Scribit deinde exempla abscessuum sine effusione, dicens, at abscessus, quibus hæc non sunt, id est, qui non sunt cum effusione, sunt, velut dentes, oculi, nasus, sudor. Id est, ut qui ad dentes, oculos, nasum, aut sudore, fieri solent. Nimirum solent in has partes aliarum excrementa decumbere; & ita his affectis alios morbos iudicare. Exemplum abscessus in dentem facti, accommodatissimum est in calce 4. lib. huius operis, ubi describens tempestatem quandam insalubrem, dicit, quibusdam etiam dens corrosos esse, tertius præcipue ex supernis, præ omnibus autem hic reperitur corrosus. Hunc abscessum cum huiusmodi dentis corruptione iam ego vidi, sapius autem ad oculos, facta ex dolore capitis ophthalmia, aut aeri lacryma, & nonnunquam oculi corruptione, aut proidentia: & in nasum, factis Ozenis, aut Polypis. Iam verò sudor creberrimus abscessus est. Sed cur sudorem ponit in his, qui sine effusione sunt? An quia non effluit effusum, ut sanguis à naribus aut ex vesica urina, sed magis erumpit ad cutem, atque inde detergetur. Sed & omnia, quæ in cutem abscedunt per corpus, sunt in hoc genere abscessuum. Hæc verò sunt tubercula, aut vlcera, aut maculae, aut habentia horum quorundam. Tubercula quidem dicuntur omnes tumores præter naturam & omnes quidem possunt fieri abscessu aliorum malorum, crebrius verò solentur alii morbi tuberculis putrescentibus & purulentis, id est inflammationibus, quæ emollescunt, & ad suppurationem percurrunt. Vlcera etiam multiformia fieri solent abscessu; & maculae, ut vitiligines, & albæ & nigrae, & lentiginosae. Atque adeo comitari tales abscessus solet destitutum capillum, siue alopecia, siue ophiatis. Siquidem succis qui sub cutem capitis abscedunt, corruptis partibus eorum radices, hinc. Fiant etiam abscessus ex aliis morbis exanthemata omnia, in quibus est omne genus scabiei cum sanie, & squammæ (sunt verò squammæ, ut magni furfures, sicca quorundam scabies) neque solum simplex scabies, sed etiam quæ lepra dicitur, solet abscessu fieri (hæc omnia sunt partium tumores, partium vlcera, partium maculae) est lepra terra quorundam scabies, tamen non tam altè tenens carnes, quam affectus qui dicitur clephas. Proinde lepra bonus abscessus esse potest: clephas non potest. Non tamen hæc semper sunt aliorum morborum abscessus. Nam si cui per febrem longam nascitur scabies, febrenum hominis destituent, non est abscessus. sed est alius morbus, ut si alius quivis morbus accessisset. Quando ergo hæc abscessus sunt? si (inquit) sunt non interruptè sed conferunt fluentia, atque si non sunt pro ratione excretionis morbi indigna. Id est, si non fiant iniquis quod duobus modis fieri coniungit, aut quod inciperint erumpere, non eruperint tamen bene, aut quod exi eruperint, minoritatem quantitate, quam pro morbi magnitudine. Et quæcumque (inquit) alia dicta sunt. Quæ scilicet dictum est in bono abscessu desiderari, ne scilicet mox appareat, neque cum cruditate, ne sit lethale; quia parum, ne fiat in contraria primariè na-

turæ, ne recurrat. Hæc itaque necessaria sunt, ut bonus sit abscessus, & ne minor quam pro morbi magnitudine. Velut Temeni nepti ex morbo graui quiddam ad digitum decubuit, qui abscessus cum non fuisset ad suscipiendum morbum, id est ad suscipiendam totam morbi causam, recurrit, & mortua est. His dictis facte repetitione patrum, per quas abscessus sunt, mentionem noui faciens quorundam, ut alii, per quam fieri solent crebri abscessus. Pro tonis dicitur nunc nervos, ut hinc palam fiat, nervos ante dictos esse tonos. Ego verò motus tantum nervos, dixerim tonos. Addit & spinalem medullam, & os, pudendum, aures, & nares. Per hæc quidem cum effluxione solere abscessus fieri res est notissima, sed & per spinalem medullam desuari excrementa, & ita solui grauissimos morbos capitis vidimus. Quin & altera capitis pars, cum altera spinalis medullæ solet totius capitis morbos excipere, ut paraplexia solet finire apoplexiam.

Vterini affectus qui octauo mense indicantur, postridie velut in lumbos aut femur decumbunt.

Hæc dictio variè admodum scripta occurrit. Et nata est varietas, partim ex varietate Græcorum codicum, partim ex sententiæ difficultate, diuersis diuersa coniectantibus, & variè proinde mutantibus dictionem. Quidam legunt ut vtero menses: si proutque ibi superiorem orationem: moxque abiam exordiantur, dicentes indicationes postridie sunt ad lumbos, aut ad femur. Sed hæc sententia, aut falsa, aut omnino imperfecta est. Non enim omnes indicationes sunt postridie, neque omnes quæ sunt postridie, sunt ad lumbos aut femur. Non explicat autem quas indicationes dicat, neque à quo die sit illud postridie, an à primo morbi, an ab aliquo superueniente signo. Alii proinde ira legunt, ex vtero octomestri postridie iudicia facta sunt, quasi in lumbos, ac coxas malum reperit. Dicunt hii esse narrationem historiarum. Sed male ubi dicitur, aut in coxas, seu in femur (nam *μῆρος* vtrumque significat) illi pro aut, legunt &. Quomodo autem narraret postridie illi mulieri factam esse indicationem ad lumbos, aut femur? diceret enim distinctè in quam partem. Præterea hic dicens *τὸ πρὸς τὸν* evacuationem videtur significare. Nam abscessus experiri vocat evacuationem, evacuationes verò vteri, neque per lumbos, neque per coxam, neque per femur, fieri possunt. Proinde ego hanc meam lectionem, & alia sententiam sequutus sum. Ea est, ex vtero menses fieri solere, & indicationes, id est evacuationes illas menstruas, solere fieri postridie, ex quo in lumbos aut femur dolor decumbit. Id verò est expertissimum, sitque & in his quibus morbi talibus evacuationibus iudicantur, & bene valentibus, quibus non omnino facile hæc evacuationes erumpunt. Causa est, quia incubente in vterum succo antequam reseretur osculis in cauum illius subeat, intrinsecusque venæ, aut quæ ex lumbis in vteri fundum tendunt, aut quæ recurrentes à femoribus in illius os, aut v-

Et in testes aliquando ex tussi, & testis ipsæ in se ipsam.

Hæc quoque est repetitio dictorum antea. Dixerat enim, tusses diuturnæ, ubi testis intrinsecus cessant, & testis tumor cessat, à tussi. Nunc dicit, aliquando tumere testem ex tussi, aliquando per se, ipso coegrente materiam, aut saltem non per passionem secundariam. Quo quidem casu, non laborat per consensum cum thorace. Sed ille potius solet in consensum trahere thoracem, & tusses asserere.

Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sunt non aequè perfecte soluantur.

Tussiculosi abscessus sunt illi, in quos tusses intratæ sinuntur. Si ergo rectè dictum nuper est, optimi verò præcipue sunt inferni, & longissimi infra ventrem, & tenuissimi à morbo: hi quoque perfectius solent, infra ventrem, id est, infra cauum thoracis facili, quàm supra. Sed & peculiari ratione hii solent perfectius. Nam vtrumque ex thorace descendant succi liberantur, & expediuntur magis instrumenta vocis, & respiratio, quàm si sursum perunt. Vix enim est aliqua superiorum partium, quæ non solet tussim ipsa mouere, etiam cum primaria affectione teoretur, nedum cum ab ipso thorace malum exasperit, Non ergo aequè perfectè liberatur pulmo, aut thorax à tussi, euntibus succis sursum, atque quàm deorsum tendant.

Fluxus sanguinis largi ex naribus solantur multa, ut Heragora. Non agnoscebant medici.

Non solum fluxus sanguinis, sed alie multe evacuationes, quarum antea facta mentio est, solent solvere multos morbos, non quidem vtrumque, sed cum sunt copiosæ, & largæ. Nā tentatæ evacuationes, quæ ne minuunt quidem morbos, aut difficiles iudicia, aut lethales esse significant. Quod quidem de omnibus decretoriis omnium indicationibus nuper dictum est, speciatim vero de sanguine guttatum illustrante, non semel hoc ipso opere dicit Hippoc. Sed cur sensum fluxus sanguinis ex naribus nunc meminit, cum illum inter alias evacuationes iam numerasset? Certè ut admoneret, hæc solere sæpe solvere morbos acutos, ut febres ardentes, & inflammationes interius, in quibus maximè expectantur indicationes, & solere medicos sæpe falli, putantes malum aliquid esse fluxum, cum tamen sit bene indicatio, & optimus, atque adhibentes medicamenta, quibus cum maximo hominum malo, nature repugnant, quod medicis qui Heragora æderant, dicit accidisse. Sed & hoc etiam in aliis evacuationibus potest contingere, minus tamen solent medici imperiti, recitari multitudine deiectionum, aut opia sudoris, quàm sanguinis, ut potè in quo animam esse hominibus videtur. Nihilominus si per bonam indicationem erit, non hoc magno

peccato exhibebitur. Neque verò solum hoc modo peccati hac in re potest, sed etiam ex contraria opinione: si quis omnem fluxum fieri finis, decretorium esse putans. Sepè enim etiam ab vitium sanguinis, aut retentis debilitatem, aut venæ rupturam, sit fluxus mortiferus. Quid ergo faciendum? certe curandum ut teneamus methodum dignoscendi salutarem & noxium fluxum. Ea est, ut Hippocr. breuissimè omnem enunciationis speciem complectens, dixit, ex confectio, & tolerantia. Quoniam autem tolerantia, quæ ex pulsa, & colore, & viribus animalibus spectatur, non admodum exercitata, & eos qui veros facultatum lapsus & non reparabiles, à leuibus distinguere nesciunt, potest fallere, salius est in considerationem adhibere omnia, quæ Galen. tertio de crifibus sparsim ab Hippocr. scripta collegit, magnitudinem, & speciem morbi, naturam diei, iudicationem, & signa decretoria, & concoctiones, quæ antecesserint, aut non.

Qui asperas voces habent naturâ, iis etiam lingua sunt subaspera, & quæcumque asperitates à morbis procedunt, eodem modo se habent. Hoc ergo habent quæ naturâ dura sunt non ex morbo. Quæ verò molles & tardiores in peccatum, non bonum: aut prior natura talis fuit: considerandum & quæ à victu tales sunt.

Corruptionem loci huius, quæ in plerisque Grecis exemplaribus, & in versione Iani Cornarii est, facile notabit quicumque perpendit, ut à Petro Iacobo Steue primò, deinde etiam à me restitutus est: nam hæc lectio, sensum continet Hippocratei, illa nullum aut absurdum. Sed quid contineat hæc verba enarremus. Dictum est à Gal. 4. de localisfectis cap. 8. & à me in scholiis, quæ sint vocis differentia, & quas habeant causas vtque causæ nonnunquam in compositione instrumentorum, nonnunquam in temperamento, eo maxime quod secundum humidum & siccum sint variz. Rauram enim vocem humiditate, clangosâ siccitate gutturis & asperæ arteriz fieri. Clangosa vero est etiam aspera. Nam fit ob asperitatem arteriz. Asperitas verò contingit in siccitate, quia est vitium figuræ in superficie, figuram autem retinere siccum natum est, humidum minime. Et quia siccitas parit duritiem, & humiditas molliem. Merito ergo clangosa est etiam aspera, & vtique differentia siccitatem & duritiem instrumentorum indicat. Ergo qui asperas voces habent natura, asperitatem habuerunt naturalem, qui ex morbo, præter naturam. Sed si vox aspera vocalium instrumentorum vitium indicat cur in asperitatem linguæ id reiciat Hippoc. cum linguam instrumentis sermonis sit, non vocis? Certe quia laryngi & epiglottidi, quæ vocalia sunt organa, est affixa lingua, & fieri non potest, quin illis siccatis, & asperitatem habentibus, lingua quoque ita affecta non sit. Hæc verò potest à nobis melius agnosci, vt quæ in cõspectum veniat. Quæ ergo lingue sunt natura duræ, & sine morbo hoc habent, voces scilicet asperas, (hic debet suppleri) quæ verò non sunt natura tales, non habent clangosas

voces & asperas, nisi cum præter naturam, duritiem, siccitatem, & asperitatem acceperint. Docet deinde prælagire ex contrariis: hoc est ex mollioribus quæ verò (inquit) molles, & proinde tardiores in peccatum, id est balbutientes (nam qui sunt humida lingua, loquuntur pigros, & peccant in prolatione, murantes quasdam literas) non boni. Significat enim iminentem paralytim, aut prior natura hominis talis erat: & considerandum quæ à victu, id est malum est, nisi hoc sit homini naturale, aut nunc superueniat ex prauo victu, vt si ebrios balbutiat. Si ergo neque ebrius, neque id natura habet homo, incipit pigris loqui, & peccat in prolatione, non bonum; nam paralytis significatur.

Considerandum qui sint magno capite, & magnis cernicibus ab inclinationibus, & venarum magnitudo, & amplitudo ab eadem causa fit: vt angustia, & crassities, & breuitates, & tenuitates à contrariis. Quorum vena lata sunt, & ventres, & ossa etiam lata, hi sunt graciles: pingues autem his contraria habent. Et in iis qui fame maccantur, mediocritates horum reperiuntur. Ab his consideranda sunt incrementa cuiusque, quæ minuit: & diminutiones, quæ augent, & in incrementis qualia simul augentur, & qualia simul roborantur, & quales sint communes venarum distantia.

Quia caput & ceruix occurrentiam nobis hominum facile perspicuntur, vt pote quæ in conspectum mox veniunt, docet Hippoc. ex his agnoscere totius hominis robur, & firmitudinem, indicat enim magnam caput, cum quo etiam se prodit magna ceruix, hominis capite in humerum aut pectus inclinante, robur hominis secundum facultatem animale per se quidem & manifestè, quia caput radix nervorum est, & illud cum spina quæ à ceruice incipit, est radix ossium: ossibus verò & nervis firmatur, & agitur motus animalis: si d. & secundum naturalem etiam & vitalem. Nam magnitudo & amplitudo partium, cum est cum bona figura, & bona partium concinnitate coniuncta, robur formatilis facultatis indicat. Ergo magnitudo capitis concinna, & cū idonea figura (nam si malè formatum sit, quod magnum caput, redundantiam materiz potius indicabit) significat non solum animalis, sed & naturalis facultatis robur: illius, quia eius facultatis origo est: huius, quia ab ea est formatum. Si vero ambæ hæc robuste sunt, vitalis etiam robusto, quæ calorem naturalis illis imperit: calore enim aguntur omnia: & calor omnia dilatat. Comergergo orta attestentur suis principis, calidum hepatis esse indicabunt amplè venæ: calidum cor, amplè arteriz. Igitur qui magno capite cum magna ceruice sunt, & robusti, & venarum (intelligit vero Hippoc. nomine venarum etiam arterias) magnitudinem & amplitudinem habent, hoc est venas magis & amplius causas. Nam hæc omnia, ab eadem causa fiunt, & angustia venarum, & crassities tunicarum, & densitas, quæ

coninendam habet striduram viarum, & breuitates, & tenuitates, hoc est, exiguitates, secundum omnes distantias in membris quibusvis, ex contrariis, puta ex frigore. Sed qui amplas venas habent, habent etiam mox amples ventres, id est, omnes corporis cavitates amplas, vt thoracem, ventriculum, & vesicam, & magna ossa, non tamen statim & crassum corpus. Quin potius tales esse solent, graciles carnibus, & abundantes sanguine. Quod quidem est temperamentum vehementer calidi & siccissimi, obestque contraria habent, sunt enim angustis venis, & ventribus omnibus, & exignis ossibus, tales n. sunt frigidi, & humidissimi. Nam frigidi & siccissimi omnia hæc habent exigua, & præterea graciles sunt. Inter hos sunt alii neque tam calidi, neque calidi vt illi, neque frigidi vt hi, neque vt hi graciles aut obesi, sed bene corporati, bene crassi, & habentes vasa bene magna. Quia calidi sunt cum quadam mediocritate sanguinis, & temperantissimi. Hinc fit, vt aliorum nulli sustinere possint multam inedam: graciles, qui sunt amplis venis, quia siccissimi & biliosi eum sunt, facile exoluntur: obesi, aut vtremque exignas habentes venas, quia sunt debiles cum penuria sanguinis. Soli illi, qui bene temperati, & mediocriter carnosissimi sunt, possunt in victu tenui contineri, quia robustissimi, & satis abundantes sanguine. In quam sententiam dixit Hippoc. facta mentione gracilium, & obesorum, & qui fame macerantur, id est qui famem sustinere possunt, mediocritates horum, id est, sunt quibus hæc mediocriter insunt, etlor scilicet, & amplitudo valorum, & corpulentia. Sed contigit dubitare, eum dictum sit generatim, magnitudinem & amplitudinem partium ab eodem, & gracilitates & breuitates, ac omnino exiguitates à contrario, quo pacto, qui sunt magnis ossibus. Venis & arteriis, sint graciles, & qui angustis venis & arteriis sunt obesi. & valde corpulentissimi? Huic dubitationi occurrent Hippoc. addit, ab his consideranda sunt incrementa eorumque, quæ minuant, & diminutiones quæ augent, & qualia simul augentur, & qualia simul roborantur. Quasi diceret, etsi magnitudo, ac amplitudo omnium instrumentorum, & omnium partium solidarum, ab eadem causa fiant, & angustia & exiguitas à contraria: non tamen omnia quæ in homine sunt augentur simul, aut minuantur: sed quædam sunt, & in quibusdam naturis, quæ simul augentur, & roborantur, quædam, & in quibusdam naturis sunt, quæ crescentia afferunt aliorum imminutiones, & imminuta, aliorum incrementa: Velut quantum pinguedinis augetur, tantum minuitur sanguinis (docet Arist. 2. de partibus anim. cap. 3.) & ita quibus crassescenibus, aut ob mutationem ætatis, aut victus, totius corporis carnosæ moles crescit, vixit & arteriæ sunt angustiores, quia exhaustantur sanguine, & sunt densiores, quia pinguedinebus tuncis sunt minora causa: quibus contra, deinde exercitatus, aut ad calidiorem regionem translatus, aut ad totum victum calidiorem, in venis incipiunt sanguis & spiritus augeri, carnea moles incipit minui. Quibusdam autem simul augentur, & roborantur omnia hæc. Velut si quem velis, frigidum naturæ & secum, & proinde gracilem, & membris omnibus & partibus simplicibus, cum penuria succorum, transferre ad meliorem naturam, solidam & humidam victu, exercitationibus, frictio-

ribus, & inunctionibus idoneis, carnia simul augetur, & roborantur. Oportet verò hæc omnia nosse, & considerare ad agnoscendum temperiem, & robur hominum. Sed quorsum, Hippoc. de abscissibus & decretoriis euacuationibus differens, ad magnitudinem capitis, & dispositionem de temperamentis nunc dinertit? Profecto tam difficile sit vnum quendam dictum, & ordinem, in hoc secundo libro inuenire, vt in quibusdam sententiis omnino fieri non posse videretur: tamen nunc videtur locus hic alteri, libri sexti, sectionis sextæ, respondere, & ratio ordinis loci huius ex illo intelligi. Illic enim ita dicitur Quibus sanguis multus ex naribus fuit, quibus quidem colorum priuationes exat: his parum profuit, quibus autem rubri colores, non similiter, & quibus capita bonæ tolerantie, profuit, minus autem, quibus non. Hæc duo loca ex se ipsis explicantur mutuo. Nam illic dixit capita firma bene ferre fluxionem sanguinis: sed quæ essent firma capita tacuit, hic explicuit, dicens esse magna cum magnis ceruicibus. Ergo enim discessit sanguinis fluxum multos iuuare, quosdam autem ledere, addidit firma capita esse talia, vt scilicet intelligamus, quod illic explicuit, qui talibus sunt capitis solere iuuari fluxu sanguinis. Hæc occasione venit mentio similitudinis capitis. Hinc vero nata est disputatio fusior de habitu corporum & temperamentis: docuitque graciles esse latis venis, & magnis ossibus, obesos contra, angustis venis, quosdam in quibus simul augetur hæc. Nosse vero oportere hæc plurimum, quod exangues & pingues, fluxu sanguinis lædantur: sanguinei siue graciles, siue bene carnosissimi, iuuantur. Addit considerare etiam oportere, quales sint distantie communes venarum, hoc est, decisiones communes venarum, & quo modo in quamcumque partem corporis distribuuntur venarum rami. Nam ita constare poterit quæcumque pars, cum qua habeat venas communes. Iuuantur verò quibus sanguis fuit secundum rectitudinem, siue sponte siue arte fluxio fiat: non iuuantur, quibus ex contraria. Vt si cui calido hepate, aut inflammatione tentato, fuit sanguis de nate dextra, bene sedit, sin de sinistra, non ita refert, ergo multum refert nosse, & quæ simul augentur, aut non, & dissectionem venarum, cum ad alia multa, tum vel maxime ad iudicandum, an sanguis vtiliter fluat, an cum noxia.

Abdominis ruptura, qua quidem circa partem sunt, plerumque sunt statim innoxie. Quæ verò parum supra umbilicum in dextra parte, dolorem & corporis inflationem afferunt, & vomitum stercoris inducunt, quales quid Pittaco accidit. Fiunt autem hæc, aut plaga, aut distensione, aut alterius insultu.

Abdomen est id, quod tegit totum ventrem inferiorem, consistit, cute, pinguedine, & ceteris muscularibus, huius desubest hæret petronæus, ad mediastinum quidem ventris secundam longitudinem cōcretae sunt cum reprobis musciculis. Ruptura

possunt fieri hæc in parte, aut discisso abdomine secundum altitudinem: cute, inquam, & musculus, ac peritonæo simul: vel ut cum vulnera penetrantia inferuntur ielo, aut gladio: aut incipienter hæc interiori parte, euse quidem sana, disrupto autem peritonæo, vel solo, vel simul eum musculus, aut eorum aliquo. Fieri autem hoc solet, distensione facta motu aliquo vehementi, vt clamore: aut saltu, aut casu, aut incidit utre aliqua: aut vecumque illata plaga. Solum peritonæum dirumpi supra inguina: leue est, nisi sit ingratu ruptio eam partem, quæ conestescit cum tendonibus musculorum. Si autem ea parte rumpeatur, aut in inguine, aut superioribus lateribus, aut qua nascitur scrotum, excidunt loci sui, quæ intra illud natura continetur, faciuntque ita conspicui tumorem: in inguinibus quidem, aut superioribus partibus, per solam ruptionem: in scroto per hanc, aut laxitatem. Vocanturque hæc omnes, herniæ: Quia quæcumque magnæ intumescunt scroti, etiam si per dilatationem externæ cutis, interioris omnibus partibus sua loca retinentibus sunt, aut multa aqua in eo collecta: aut flatu, vt sit velut eius partis aseytes aut tympanites: atque adeo si ipsa testiculorum carnis plenum acuta, scrotum intrumuerit: vocantur herniæ, variis nomina accipientes à loco, aut causa. Vt dicatur bubonocèle, enterocèle, hydrocèle, færocèle, neumarocele, aut sarem ecèle. Sed hæc persequi nunc oportet non est, ac multo minus cursationem: Illud tantum nosse expediat, cum omnes abdominis rupturæ dolorosæ sint, & partes subiectæ debilitari faciant, non tamen omnes æque: sed quæ circa pubem sunt plerumque, sunt statim innoxie, id est, non tantum afferentes noxam, vt non sint multi, quicquid eam partes rupit, longam vitam agant, non admodum insensum. Quæ verò parum supra umbilicum, maxime in dextra parte, multo sunt periculosiores. quia per infernas rupturas intestina solui possunt exire & alterari, & ea quidem crassa, per superiores verò, omentum simul, & intestina gracilia. Omentum verò exiciens loco proprio, admodum laeditur, quia vt dicitur in aphorismo, si omentum exciderit, necesse est interficere. Intestinalium gracilium quæcumque laesio maior est. Victeriam enim non curantur (vt aliquando quidem crassa) intemperata verò aut obstructa, pro dolore colico, quin crassificationis sit: voluolum vocatum afferre solent, ne eorum perniciem sitmet, & à quo vix vllus eundem: cuius propria signa sunt, dolor acutissimus supra vmbilicum, fastidium, & vomitus fecum. Maxime ergo in periculo sunt, quibus ruptio abdominis supra vmbilicum est, quia parati sunt ad voluolum. Quod Piraco quidam euenisse dicit, quem verisimile est, ex ruptura factu voluolum, intussusc.

Abacop. de morbo vmbilico

Quibus quod est inter abdomen & cutem infistum est, & non subsides, is color est velut nitens pallidus, aut ex albo pallefcens, quoniam ab hepate totum quod tale est procedit, hepaticus etiam morbis laborant, quinetiam qui ieiunio ab hepate tenentur, coloris subcandido fassidantur, velut aqua inter cutem laborantes, & leucophlegmatici. Vtrum & hydrops & icteri, qui à liene procedunt, nigriores sunt.

A Hepatici dicuntur, quicunque laborant morbo longo hepatis, vt intemperie, quæ cum debilitate coniuncta sit, aut difficili obstructione (nam cum qui inflammatione hepatis laborat, non dicimus hepaticum: sed ita affectum) harum affectionum maxima indicatio est ex colore faciei: quia cum sit propria succorum officina, & tales in cute florescant colores, quales humores abundant in corpore, necesse est vitium sanguinis in hepate reici, & colore prodire. Ergo vitiosus color præter naturam per totam

B cutem factus, malum aliquod hepatis præstat, aut secundarium: necesse est indicet, Quia, omnis actio laesa indicat vitium, propria instrumenti species coloris talia, speciem affectionis indicabit. Velut hydrops de regis morbus, qui in hoc morbo tum genere sunt præcipui, coloris vitiosi specie indicantur. nam vitique habent minime rubrum, neque bene candidum, neque omnino naturale, sed albidum inter mortuum, & velut ex pallido, & albo.

C In hydropis vero est albi multum, pallidi omnino exiguum, vt magis si malus modus albi, quam pallidi in ictericis, est pallidi coloris multum, vt in quibusdam partibus atroci dissoluti color. Dicitur verò etiam hic color subalbidus, quia vacuus rubore cutis candida est, & sit quidam color referens effusionem flauis per candidam, & hæc quidem habent icterici, & in omni hydropis specie laborantes. Addit Hippoc. & leucophlegmatici, quasi leucophlegmatia non sit hydrops: sed aliud hepatis malum, hydropi analogum loco affecto & causa: hydrops verò sine tantum duæ species, aseytes, & tympanites.

D Gal: certe tres species esse ponit, leucophlegmatiam inter eas recensens. Hippo. videtur hanc à aliis separare, velut certè, & vulgus hominum ex solo ventris tumore hydropem iudicat. Nihil refert modò intelligatur, omnes has passiones hepatis esse. Quibus color albidus est, vt leucophlegmaticis, & hydropis, hepatis per se, aut per consentium, cum vetriculo intestinis, aut pulmone (hæc, n. non mutant colorem ad aliam speciem) frigidam: quibus verò pallidus valde vt ictericis, calidam & siccam intemperiem sine obstructione nonnunquam cum solo vitio sanguinis, plerumque cum obstructione significat. Non sunt autem hæc affectiones semper simplices, sed compositi possunt, cum inter se, cum etiam cum aliis. Velut si quis morbo regio laborans hydropis sit: huic color flauus, cum albo incipiet per insensum. Verum bilis effusio plurimum huius complicationis cognitionem, quæ ex specie coloris haberi possit, interturbabit. Maxima distinctio contingit ex tumore ventris, quia iam icterico superuenit. Nimirum ab aseyte est inseparabilis tumor aquosus ventris, & à tympanite flatusosus, quia in illa multa aqua, in hac multus aer, tenet id causum, quod est inter intestina & peritonæum. Hinc fit ille tumor qui manui occurrit. At qui vulgus hominum putat, eam materiam inter carnem abdominis, & cutem contineri. Nam ex hac vulgari opinione natum est nomen latinum, aqua intercus: & hispanum, *agua entre el terno y carne*. Hanc opinionem sequuntur Hippocrates deservens per propria symptomata hydropem, dicit, quibus quod est inter abdomen & cutem inflatum est. Non quod Hippoc. ignoraret ipsam etiam abdomen distentum esse, sed quod istam diligentiam modo sermo non desideraret. Itaque si morbus regis & icterus simul hominem tenens, con-

E

F

G

lor ad albidum aut pallidum inclinatur, ut alter altero magis affligit. Evidens autem cognitio fit ex tumore ventris. Cum aliis etiam copulantur hi morbi: ut cum ex liene fit hydrops, aut morbus regios. Nam uterque morbus incipere potest ab ipso hepate primario laborante, aut consentiente cum alio neminem male affecto: sepius autem veniunt ex liene, quia refrigeratus lien refrigerat hepar, sique hydrops, aut obstructio quæ lienem obsidebat, vique ad hepar producitur. sique icterus, sed utriusque horum morborum ita factus sit, erit cum alio complicatus, qui dicitur icterus oiger. Hic est, cum atrabiles diffusa per totum corpus, cutem tingit: sique liene non satis purgante sanguinem ab atra bile, ut dicitur atrax icterus, vesica fellis oco purgare satis à flaoa. Vtrumque autem fieri potest, aut bile plurima genita, aut parte ad quam pertinet expurgatio debilitata, aut via obstructa. Si ergo ob debilitatem, aut obstru-
 C tionem levis portio melancholiz, quæ cutem possit demigrare, dicitur, anæquam hepar debilitetur aut obstruatur, fiet solus icterus niger, & color tantum niger: si autem iam etiam debilitetur hepatis vis concoctrix, sient simul hic & hydrops, etque color ex albedo, & oigricante: si autem obstruatur quæ parte expurgatur fel, sient umbo icteri, flavus & niger, & color etiam iam mixtus. Quod si hepar am-
 D bo parietur simul, intemperiem dico & obstru-
 C tionem, sient dicti tres morbi simul: duo icteri & hydrops, atque color quidam nascetur, qui hæc omnia mala ex parte referat. Verum fieri non potest, ut lien debilitatem attulerit hepatis, non debilitatus: aut obstru-
 C tionem, non obstructus. Quare si hydrops aut icterus à liene caperit, necesse fit melancholiam iam male expurgati. Necesse ergo sit, eos qui à liene caperint, nigriores esse, siue hydropes, siue icteros. Sed enat remas totam hanc orationem: Qui hos (ita-
 quæ) quod est inter albiditatem & ceterum infirmum est, id est, quibus regio ventris inferni tumida conspici-
 tur, ut in hydropicis, & aliis omnibus, quibus tumores duri hypochondriorum sunt: & non subsidet, id est, & non citò subsidet, ut quibus ex lauta cæna, aut larga potione, aut satietate prostratum ho-
 riorum, aut olerum, aut etiam ex colico dolore, itumuit venter (nam ob tales occasiones solet ru-
 mescere sine morbo hepatis) sed mox conquiescit, vel-
 let cordæ aliorum omnium morborum, ob manifes-
 tas quasdam causas, solent species apparere, sed du-
 ratione diiudicantur. Quia scilicet talia mox con-
 quiescant) & color est qualis valde pallidus. Sed
 quia non ita tantum qui propriè dicitur valde palli-
 dus, quique in ictericis conspiciatur, indicat malum
 hepatis. Sed etiam albidus color hydropis, addit, ex
 albo pallidescens, id est non solum qui propriè est val-
 de pallidus, sed qui vtrumque ob vacuitatem rubo-
 ris, & coloris viuidi, vocatur vulgo, nunc pallidus,
 nunc albidus: ab hepate totum quod late est, pro-
 cedit, id est, vtrumque homo colorem habeat album
 aut pallidum, aut velox ex his mixtum, & ventrem
 tumidum, quod sit per inflationem, aut tumores scir-
 rhosos hypochondriorum, vel abundantiam aquæ,
 aut flatus inter intestina & peritoneum; in hepate
 esse malum significatur: & hepaticis etiam morbis
 laborant, id est, & hæc ob causam hepatici morbi
 dicuntur, quibus hæc adiungit symptomata, & icteri-
 ci, & aqua inter cutem laborantes, id est, tympanite
 aut ascite, & leucophlegmatici, qui ab hepate sunt.

A id est, quid per primariam passionem hepatis ha-
 bent (aut saltem non ex liene) ad tuberculum in-
 clinant, id est, colores habent citra rubrum, & expe-
 tes oigricit. Hydropes autem & icteri, qui à liene in-
 ciunt, nigriores sunt.

*Vlcera etiam in subalbidis & leniculis a-
 grè sanescunt, & cutis & labia diffunduntur,
 velut Antilecho & Alena accidi: quod ab ha-
 moribus corporis falsis ex his cõrur, quæ sub
 cute maxime colliguntur, & a capite decedunt,
 quæ à pulmone calefit.*

Aphoriz. 6. sexta paritatis. Etiam est hydropi-
 C tis vlcera faciliò corporis a grè sanantur. Hic idem
 dicit modo, causam præterea apponens. Dicit ergo,
 vlcera etiam in subalbidis & leniculis a grè sanescunt,
 & cutis & labia diffunduntur, id est, vlcera, quæ
 fiunt in corporibus exalbidis, simul cum maculis
 quibusdam lenibus similibus, cum & cutis maculas
 finditur, & labia, quæ erant, quæ Antilecho & A-
 lenas passim, a grè sanescunt. Quæ quidem du-
 bus affectionibus lethalius, & in extremam iam con-
 stitutis hydropi & pichis, accidere consueverunt, in
 vtriusque quidem ob humorum falsum. Hic tamen
 colligitur in hydropicis sub cute in toto corpore, id
 quæ est frequenter summum, & maxime fieri consuevit
 si autem etiam falsa purgata exiret, cum &
 D pulmone calefit, ut in phthisicis. Nimirum solet id
 malum incipere à catharro, & procedere, vique ad
 hæc vlcera insanabilia. Repletur caput primo
 fo succo, qui fuliginum quæ de pulmone ascendunt,
 calore, fit falsus, & desinit, impetis quidem in ip-
 sum, pulmoneem reffat, deinde verò & per habitum
 corporis deueniat. Impetis ergo ob falsam quali-
 tatem corrumpit, exulceratque pulmonem, deinde
 cum plurimum in eo malo, processum estierim, quæ
 rem corporis, & ob hæc, quæ in corpus deflavit, fal-
 sam humiditatem, & ob propriè quique parti alimen-
 ti corruptionem. Quæ corruptio, cum ob materiam
 differentiam variâ sit, variâ etiam parit maculas leni-
 bus similes. Quare aut hæc vlcera a grè sanantur,
 dicta est mihi causa in commento aphorismi. Hæc
 est eadem, quæ facit, pura falsa humiditas: cum ex-
 cerat partes non aliter possit curari, quam siccet-
 ur, & expurgat-
 E

*Occasiones considerande ex quibus laborare
 quis incipit siue ex capitis, siue antris, siue la-
 teris dolore. In quibusdam autem dentes, & in
 quibusdam bubones signum exhibent.*

Occasiones morborum dici solent cause præter-
 tarticæ, quæ occasionem egrossodi præstiterit quo
 significatio haud dubie verissima est hæc sententia.
 Nam multum refert considerare quæ causa aggra-
 rare cepit homo, ob inedia an ob multum cibum,
 ob æstum an ob occurrum ante frigide, ob vigiliam,
 an ob somnum nimium: sed cognoscitur quidem
 per se ad curationem verò ex accidenti. Quia à con-
 trariis causis oco potest omnino eodem modo esse
 affectum corpus, vtrumque autem affectus diffi-
 e

G

rar, debet esse ratio curationis alia. Tamen hic aliud est quod occasionis nomine significatur. Nam *ex capite* non fert hanc significationem; & illud *ex capite* *ex capite* id est, unde experire agrotare, significat esse partem primam, seu primum impetum à quo morbus exoritur, & multò magis id indicant exempla. Nam (inquit) siue ex capitis, siue auris, siue lateris dolore fuerit. In quibusdā autem dentes & in quibusdā huiusmodi signa exhibet. Ergo quod docet est, considerare oportere, ut caperit agrotare corpus, & ex qua passione caperit morbus, si febris caperit ex dolore capitis, siue ex dolore auris, siue lateris; siue quacumque alia passione: Sed dices quid refert hæc considerare? videtur enim scitis esse scire, quæ passio sit nunc, et si nescias quæ fuerit. Certe refert multum nosse qualem fuerit initium passionis quam suscipimus curandam, & qui decursus, quoscunque imitationes fecerit malum: id quæ siue prioribus passionibus abscissibus, postérieures acciderint, siue manentibus, accesserint. Si recesserint nosse oportet, quor, quæ & quo ordine fuerint, si maneant, quo ordine sint factæ. Velut si duo occurrant febricitantes, nunc quidem eodem modo. Alteri verò ex capitis, alteri ex rennū dolore, facta sit febris: nosse quidem id distinctè oportet: atque sicuti simul dolent, aut utrumque affecta sunt, ventriculus & caput, nosse oportet, an capitis dolor prius afflixerit & vetriculi deinceps sublecutus sit, an contra. Refert etiam hæc consideratio, & ad agnoscendam, & ad prognosticam, & ad curationem. Nam si dolor ventriculi antecessit, dolor capitis per consensum esse putabitur, & curatio incipiet à vetriculo: si dolor capitis antecessit, ea putabitur esse primaria affectio, & curabitur per se: atque si dolor capitis vehemens ante febrim, aut ea incipiente fuit, merito timebitur raptus materię in eam partem, præcavebitur admodum oxyrhedino. Si doluerint renes, in illos etiam timebitur, & cavebitur decubitus. Quia si quæ pars ante morbum doluit, in ea morbus firmatur. Sed quid est quod addit, signa autem exhibent in quibusdā dentes, & in quibusdā huiusmodi? Certe sunt exempla, quæ fortè fortunatè tunc occurrerit curanti, & in memoriā venerit scribenti Hippoc. velut sicuti eū dolore denticū facta sit febris, timeri debet partibus superioribus, & ipsi dentes solent excidere indicatori, ut ante dictum est. Iam verò si cum huiusmodi caperit, non est exigui momenti nosse, quia febres ex huiusmodi singularem malitiam habent, ut in aphorismo dictum est, & singularem curam exigunt.

Vlcera & tubercula que erumpuntia febres indicare possunt, si non accidunt, indicationem tollunt. Si verò inserius relinquuntur, certissimas & celerissimas recidivas afferunt.

Quid est nuper ab Hippocrate quicquid indicatoria signa sunt, eadem hæc si non fuor difficultis sunt indicationis; ergo & vlcera sponte nata & tubercula, cum decretoria esse solent multis morbis, dictum etiam nuper sit, si is morbis, qui tales indicationes amant, non sunt, difficultem indicationem, aut impediam indicationem ostendant. Morbi

verò quibus sunt tales indicationes familiæ, sunt, ut in prognostico dicitur, febres quæ prorogantur salubriter affecto homine. Proinde ego soleo moræ febrius aliqua videtur produci, & ex crassis succis pendere, effluere laboriosa, si quæ pars ignobilis dolet aut doluit, in eam abcessum vocare: si nulla talis sit, omnes partes adnoscas fouere calente oleo, aut etiam alia inunctione connoctante. Nam quibus cura iuxta naturam morbi deheret erumpere, hæc manent interius, vel non satis erumpentia, etiam caperint, ut cum sunt abcessus minores quam ut profint: vel ne tentantia quidem erumpere, celerissime, & certissimè sunt recidivæ. Nam si abcessum faceretur facere natura non potuit, multò minus poterit evacuationem. Quæ verò relinquuntur in morbis recidivas faciunt.

Crudos & humidos secessus milium solidæ in oleo coctum sistit. Exemplo est nauta puer, & Myriocharme.

Deiectiones madentes non biliosæ, quales per diarrhoeas sunt sæpe, debilitata retentrice facultate intestinorum, vocantur crudos & humidos secessus. Cuiusmodi hæc diarrhoea visu siccantium, & adstringentium: cum retentrix humiditate & laxitate maxime debilitetur. Non raro opus est medicamentis deuoratis & per se sedem in aldis, & ad motis: sæpe autem sola mutatione viæ ad sicciores, & quos apte natura difficile descendat, curatur: ut in casu veteri, & duris eorum vitellis, & hepate assio, & aliis huiusmodi, in quibus etiam est milium in cocto oleo coctum, aut solo, aut cum iure aliquo. Mihi quidē in hac Hispaniæ parte, rarus est in cibis usus, tamen pro eo utitur ad diætam, oriza cocta iure carniū aut oleo. Profunt etiam elculenta, quæ oriza poline parantur, ut qui vulgò dicitur *manar blanco*. Proderunt ergo etiam quæ parantur ex milis farina, non tantum ipsum solidū milium: cuius in nautæ puero, & in Myriocharme periculum Hippocrates fecerat.

F. SECTIO II.

*M*ulier laborabat cardialgia; quæ nihil remittebat. Hac in malipnici sacculi potentiam inspergens, & semel in diē cibum sumere contenta, non renouebat, veluti charionem accidit.

G Haud dubie hic, ut & alibi semper *καρδιαλγία* significat habere dolorem oris vetriculi. Nam rationis indicationis id indicat, & quid velut quiddam notam dignum Hippocrates narrauit, hanc non vomuisse. Accedit quod magna coniectura est huius Charionem, cuius hic mentio fit, esse illam Charionem, quinque egrorum partem tertii Epid. Aut hic aut illic corrupto nomine. Nam ille habuit capitis gravem dolorem, & turbam alia

ex tenuibus, & tremorem labii inferioris, notas facti confluxus in ventrem, & decima sexta vomit biliosa multa. Itaque cum nomen ægri occurrat via liserula mutata idem, & narratio, quod ad vomitionem atinet eadem verborum, videtur esse ille ægrotus. Chazion verò laboravit ore viciuuli, confluentibus in illud multis & acerbis excrementis, quæ quidem mox parantur cardiacalgiam, seu cardiogmon, id est dolorem, aut mortuum oris ventriculi malum sane non leue: ob consensum magnam partium principium cum illo. Nam quibuldam affert liporhiam, aut etiam sineopen, consentiente corde, quibuldam vertigines, suffusorum vitia, conuulsuos motus, atque adeo epilepsias, consentiunt cerebro. Quibus ab eruditatem acidam aut sedundantiam status vel erodorum succorum, aut intemperiem frigidam, os ventriculi dolet, calorifica ratio curationis debetur: quibus verò ob eruditatem nidorofam, aut confluxum biliosorum excrementorum, aut omnino calidam intemperiem, adstringens & refrigeratoria, vt bilis seruior sedetur & laetatur vetriculus, adstrictione roboretur: vt ea quæ adest bilis dolorem non faciat, & quæ nondum venit, fluere desinat. In quena via laudatur merito malum panicum, vti quæ eo vtiis, siue totis gravis per se, aut cum pane manducatis, siue hansto succo solo, siue panis mæcis in cum iunctis, siue etiam succum cum aliquo idoneo cibo admisti comedas; vt cum pistana, aut cum amylo, aut cum polenta. Paratur polenta ex farina hordei. Ergo paratis puliculis ex farina hordei, aut farre, cum succo mali punici, curari potest id malum, quia repletur vetriculus attemperante, & astringente cibo. Ego sane iam aliquot cardiacalgias & peroceros, iussu solum præcipiens, vt tota æstare venter pro vino, decocto torius mali punici, torius, in qua, cum cortice, & granis. Dicit igitur Hippo. mulierem Cardialgicam, quæ circa intermissionem vexabatur, curatam esse polenta, inperfo succo mali punici, & *muera*, id est & semel in die cibum accipiens. Sed dubitet aliquis: si dolor ille ex frigore erat, quæ potest possit esse succus mali punici vtilis, si verò calidus, cur semel solum in die capiebat cibum? Nā qui ita affecti sunt nulla re magis læduntur, quam ieiunio, vique adeo, vt nulli solum mane cibum aliquem capiant, ante conseruum prandii tempus linquatur animo, aut saltem grauem mortuum sentiant, atque nusquam melius habeant, quam cum plenus cibus venter est, quibus bilis imbutur, & afflicti vetriculus non recipiat. Certe ille affectus erat fluxio calidorum, vt & in Chazione, & qui ita affecti sunt, debet accipere cibos, neque exigua quantitate, neque tenues, quia tales viciantur, & augent cacochymiam, si verò accipiuntur multi, & crassi, liberant à fluxione, & coquantur: non tamen possent coqui multi & pluries accepti, à vetriculo præcipue male affecto. Proinde semel & copiose pasci debent. Sed quia neque longum intervallum sine omni cibo possunt transigere, vti debent mane & vespere cibis quibusdam leuibus, & medicamento- sis, vt polenta cum succo mali punici. Itaq; Hippocrates non vocat hic *muera* vtiam degustationem cibi, sed vnicum prandium, vt consilium sit, semel bene prandere. & aliis horis aliquid medicamentosum, quod repleat corpus non possit, degustare. Vti consulas primo mane accipere milcam

panis, ex vino diluto per hycemete, ex succo mali punici in æstare: & coræ tempore potentiam cum illo succo, aut affine pyrum. Illa igitur mulier ita curata est, semel quidem bene prandens, aliis horis medicamentum loco accipiens potentiam cum succo mali punici; & liberata quidem est, non vt Chazion, sed sine vomitibus: quod quidem indicat intemperiam fuisse maiorem quam pro materie multitudine.

Mutationes profunt, nisi in peiora mutantur, velut accidit in vomitibus qui sumpto in febribus medicamento sunt, & in meraciora desinunt, nam putrefactionem significant, ut dextippo contigit.

Vti in apborismo 14. sectionis secundæ dicitur, in alui fluxionibus mutationes deiectionum inuuant nisi ad pram mutatio fiat id cum in sponis fluxionibus verum sit, tum multo magis in iis, quæ pharmaco accepto sunt. Nam si quam significationem malam præstare, potest deiectionum varietas, multorum & diversorum excrementorum, & multiplex cacochymia, hanc minuit pharmacum. Nam ne prauæ quidem & variz excretiones, quæ cum accepto pharmaco sunt, adeo male sunt, vt apbor. 21. quare particule dicunt, his verbis. Deiectiones nigre, velut sanguis niger, sponte venientes, & cum febre, & sine febre, pessime sunt: & quæ plures fuerint peiores colores, tantò deterioris: cum medicamento verò melius, & quæ plures fuerint colores, non malè. Si ergo varietas in pessimis, quæ sponte facta mala est, facta cum pharmaco est minus mala, varietas in minus malis, quæ vt causa prodesset, & vt signum minus mala est, quæ vnica admodum syncera perferentur, cum pharmaco prodesset multo magis quæ sine illo. Proinde addit Hippo. hoc loco, *siu dicitur quæpudæan* iussu vtiis *muera* itæ. id est, velut in iis quibus ob febres pharmaca solum propinare. Dicit verò vomitibus, quia vt ex aliis locis constat, erat illo seculo maxime usus vomitionum expurgantium. Sed sit ita iussu mutatio deiectionum non prauarum, quia perpurgant corpus, sed vt signum, vti sunt detiores, variz, an simplices? Videntur enim detiores esse variz, quia multiplicium excrementorum redundantium significant: Certe non potest hoc sine distinctione dici, neutri enim sunt simplices meliores. Sed deiectiones syncera sunt, quædam quia non habent manifestam alterius generis permissionem, vt tantum biliosæ: quædam, quia à suo etiam sero sunt deputatæ, vt quæ dicuntur biliosæ syncera, vt vitellinæ, & zingiosæ. Variz sunt, aut ex tantum malis, vt ex simpliciter crudis & biliosis aut ex pessimis, vt ex opima nigra & fetida, & cruenta. Quæ variz & pessimæ sunt, omnium sunt pessimæ, vt dicitur in prognostico, & apho. 1. quantæ quæ variz ex tantum malis aut crudis, peiores sunt vnica syncera non omnino pura, quia multitudine excrementorum significant: sed minus malæ, quæ in vnica syncera secundo modo: quia talis admodum mala est, & vituperatur apbor. 7. septima, vbi dicitur Meracæ alui egessiones malæ. In quæ etiam sequentiam, causam simul reddens ita dicit,

αἱ δὲ ἐκπνεύουσι πλεονάζει τῶν ἐν σπασίμοις, οὗτος Διξίππος ut Dextippo. id est motationes excrementorum finiri in vnam speciem meracionis excrementi, graue est, quia significat putrefactionem, id est magnam excrementorum corruptionem, & magnam vim, & firmitudinem causę corruptionis. Nam in quacunque actione naturali, cum omnes materię partes in vnam speciem trahuntur, magna effectricis causę potentia significatur. Nam cum ea est minor, diuersa gignuntur secundum conditionem materię. Igitur vnicam talem diuisionem perseuerare, deterius signum est, quam mutationes fieri, & non ita inuase quia non tam fit natura corpus purgante, quā ob putrefactionem: id contigit Dextippo.

Serapis ex liquida aluo intumuit. Pruritus per nescio quot dies durauerunt, sed non ultra, habebas autem & abscessum quendam in parte inani, qui quidem denigratus occidit.

Ex quacunque euacuatione profusa solere hydropem fieri ab Hippocrate & Galeo dictum saepe est, & experimento notissimum. Nam oimīs fluentibus menstruis, ut in aphor. dicitur, morbi fiunt (explicuimus verò in commentario hydropē inter alios) fluentibus etiam plus satis hemorrhoidibus, succedit hydrops. Quō & nimis alui fluxionibus solere succedere, dicitur aphor. 43. sextę, his verbis. Quicunque lientosi à dysenteria corripuntur. Simile quoddam coniecto esse, quod mulieri, de qua præsens narratur histotia, contigit, ei quod in hoc aphor. fieri solere Hippo. dicit. Collegerat in hepate, aut liene aut alio quodam internorum viscerum multa & mala excrementa, cepitque per aluum deponere, & ob malignitatem excunium facta est effluxio nimis, vacuatis simul succis vitibus cum malignis, quo factum est, ut debilitato naturali calore hydrops successerit: hydropē verò non ex aqua tantum, sed malignis simul quæ per ventrem ibant, cum aqua distributis, tenuit natura per cutem pellere, factus est pruritus, qui durauit aliquot dies, & non potente natura eff abscessum absolvere: repente, ita ut fit in malignis abscessibus, euasit pruritus (si enim significat illa verba non ultra, quasi diceret, non ultra productus est pruritus, sed euasit) & retrocedente materia in partem inano collectus est magnus abscessus, qui ob magnitudinem cutem obfedit, & subiectas etiam partes tenuit: ob malignitatem verò succi, ex inflammatione facta est gangræna. Proprium enim inflammationis abeque in gangrænam iudicium est, denigratio. Gangræna verò quę internas partes attingit, perniciofa est.

Estimargi uxor post ventris perturbationem paucorum dierum, cum multum curasset sistere, & abortum fetus summa quadrimestris, à corruptione sana facta intumuit.

Hæc histotia quādā ex parte similis est proximæ, quia hæc etiam mulier à perturbatione ventris in-

cepit laborare, & postea intumuit. Verum hæc euasit, etsi magno cum periculo. Hæc mulier cū vtero gereret (maxime cum filiam conceperet) meritis multa & praua excrementa collegerat primis mensibus, unde factum est, ut proxima iam quarto mēsi, alui profusio corripereetur. Quod quidē magnum erat abortus periculum. Nam nisi sistere-tur, irritatione, & mordicatione intestinorū, partium vtero adeo vicinarum, aut ob euacuationem nimiam subtracto fetus alimento factus fortasse esset abortus: atque hoc forte timore medicis aliquis sistendum oimī ratione curauit: & cum nondum esset purgatum corpus, hoc idem euenit. Cōuersa sunt enim excrementa ad vterum, & corruptione acerbiorum subsecutus est abortus quadrimestris. Quod verò quadrimestris fuerit, non minimum auget significationem periculi. Nam recentiores & anriquiores fetus facilius abortiuntur. Nilominus sanata est post partū, & febte, & alui profusio: & in extremo mali intumuit, reliquis morbi abscedentibus ad cutem, & hepate debilitato, ita ut fit in magnorum morborum inclinationibus, tamē per bonum victum, pristinum habitum recuperauit, & perfecte sanata fuit. Hic casus nos admonet quantū periculi esse soleat in sistendo alui profusio. Quoniam verò non minus est periculum nisi sistatur antequam nimius fiat, considerare caute oportet in omni effluxione, quid agendum sit, an sistendum, an mouendum magis an permittendum ut fluat. Scopi verò in hac consultatione sunt, contentia, tolerantia, & modus fluendi. Nam si cum contentia, & tolerantia bene fluat, permittendum tantum: si cum illis, tamen lenitē fluat, mouendum: si sine illis, sistendum est.

Mosep admodum calculoso, in superiori palpebra hordeolum exortum est, versus aurem magis, deinde exulceratum est intro. Quinta & sexta ab interiori parte pus effluxit, quod infernas affectiones soluit. Bubo iuxta aurem erat, & infra in ceruice secundum rectitudinem superioris bubonis.

Calculosi sunt, quibus multi succi crassi in idē bos incumbere solent. Multis autem easar ea affectio in alias partes facta talium succorum abscessu. Neque mirum est factū vno aliquo abscessu magno solui affectionem, quæ saepe solet redire, ita ut non redeat amplius. Nam frequenter in eandem partem reditus sunt ob illius debilitatem, quæ platurquo confertur reliquis materię pertinaciter hęcensibus. Per magnos autem abscessus solent primarē affectę partes illas etiam reliquias perpurigare & firmari in posterum velut Mosco euenit, qui eum calculosus valde esset, oborto aliquando hordeolo in palpebra superiori ad angulum externum, qui spectat aurem, & rupto intro, effluentēque purem interna parte oculi, ut ex oculo prodire videretur, quinta & sexta die ab orto hordeolo, simulque ortis duobus bubonibus in ceruice, altero iuxta aurem, altero inferius è regione prioris, soluta est affectio calculosa, & iam inde melius habuit. Sed miretur aliquis solutum esse morbum reum, factū ad oculum abscessu, cum hæc partes nullam rectitudinem

habere videantur: deinde ad tantum morbum solvendum, hordeolum, exiguum adeo tuberculum momentum aliquod habuisse. Verum oportet nosce, plerumque fieri abscessus secundum consuetudinem & eos meliores esse quam contrarios: nonnunquam autem fieri in aliis partibus quibuscumque occasionebus non inutiles. Nam Hippo. ipse 6. Epid. parte 3. dicit, Alterius loci morbos loca experientia, aut ob gravitatem, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod aliis sunt communicationes. Hec illo loco, Fortasse ergo Mosco occasione aliqua alia doluerunt partes circa caput, aut debilitate sunt, ut hanc ob causam lumborum fluxionem exceperint, etsi id rectitudo partium non admodum fecerit. Est etiam verisimile Mosco fluxionem in lumbis à capite venisse, ut plerisque venit, atque ita oculo, & ceruicæ, etsi cum parte recipiente nulla esset, cum transmittente fuisse magnam consuetudinem & viciniam. Neque etsi abscessus adeo exigui fuerit, subsecutam sanitarum adeo mireris. Non enim fuit hordeolum solum: sed cum hoc duo bubones insignis magnitudinis. Hippocrates verbò noluit omittre quippiam eorum quæ acciderunt. Accidit nonnunquam abscessus exigui, assiduitate expurgandi, & duratione liberare solere à magnis morbis, ut vel vicia pustulæ multum tempus non sanescens, sed fordes quoddam continenter demittens, liberet nonnunquam ab epilepsia: aut morbo alio magno.

Frater uxoris Aristeli fatigatus itinere incaluit. Deinde in tibia terminari exorti sunt. Postea febris continua accidit, & postridie sudor, qui aliis diebus paribus semper recurrit. Adhuc autem febris detinebat. Erat autem subliens. Fluebat sanguis ex sinistra nare, sæpe & paulatim. Indicatus est. Postridie iuxta aurem sinistram tumor apparuit, sequenti die etiam iuxta dextram, qui tamen minor erat, & incallescere hi euauerunt nec suppurarunt.

Hic haud dubitè cepit iter ægere plenus succis melancholicis: oportuit autem redundantiam illam deponi antequam exerceretur, ne dū laboraret. Nam ut Gal. docet in apophism. 20. tertie particule, si homo vel pituita, vel fluxu bile, vel atra, vel ipsoctiam sanguine plenus ad exercitacionem perducatur, in multa atque adeo grauissima mala perducitur: nam apoplexia, aut epilepsia fiet, aut rupto vase in pulmone, morbus insanabilis & multi cum febricitare cepissent, propter exercitaciones acutissimis morbis fuere correpti, & quibusdam aliis, exercitacione propellente extenuata ad eum, vlcera oborta sunt. Nimirum Hippo dicit, si impurgatus exerceris, vlcera fient. Mento ergo hic cum cacochymus iter ageret, incalescere, id est, calore quodam febrili tentabatur, qualis per neutras dispositiones fieri solet, incipientibus malis succis putrescere ob calorem ex labore. Et in crotibus facti sunt termini, id est (ut Gal. interpretatur 6. Epid. parte 3. com. 37.) tumores quidam nigrici pustulis figuram fructus terebenti habentes. Habent enim ortum ex melancholico succo. Cum ve-

ro habebat minor esset, quàm pro similitudine excrementorum, quæ ceperant alterari. Subsecuta est continua febris, cui vixte repleto malis succis accessit sudor postridie, & alius sequentibus diebus paribus: qui sudores, ut apbo. 36. par. 4. dicitur, significat dolorem, & longitudinem morbi, & recidivam. Addit autem Hippo factos esse illos sudores non quidem quibusdam diebus paribus, quosdam non, sed sequentibus diebus paribus semper. Nimirum, & apbor. 41. eiusdem particule dicitur, sudor semper fluens significat morbum. Sed quoniam cum dixisset febris continua fiebat, dicit deinde, adhuc autem febris detinebat? Certe vix magis explicet hos sudores symptomaticos fuisse & multitudine sobolem. Nam dixit apbor. 61. dicitur particule. Febricitanti sudor euens febre non remittente, malum. Moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. Merito ergo hinc euacuationes multæ & variæ, non tamen copiosæ, & assatim liberantes, sed sæpe tentatæ, & imperfectæ euenerunt. Factus est lienosus, quod maxime declarat dictam succi speciem. Fluxit sanguis sæpe, & paulatim ex sinistra nare. Quæ euacuatiorum symptomatica, atque ut signum mala fuit, tamen quia secundum consuetudinem facta profuit liberavitque, non perfectè & turb. quod fecisset boni iudicio, sed cum abscessibus. Oborti enim sunt: tumores post aures: post sinistram quidè maior, ob dictam consuetudinem cum liene, & quia id laus succi meli: cholici magis obideat: sed quia totæ etiam corpore abundabant, alius, etsi minor post dextram, & obortis his tumoribus, incallescere bathomo, id est tentabatur tumorem febrili calore, reliquis fuctorum putrescentibus: tamen cum tam multæ antecessissent euacuationes, factum est, ut euascerent & resolutine suppuratione.

Qui ab Alcibiade venerat, ex febris modicis ante indicationem tumidum habuit sinistram testiculum. Et habebat autem plenum magnum. Et certè tunc indicata fuit febris vigesimo die, & deinde subincalescebat aliquando, & spuebat subfiliolum.

Hæc quoque narratio indicat ex crassis melancholicis factam esse febrem huius. Namque morbus recidivas, & abscessus multos habuit, & quod febris adhuc intra fines acutorum fuit modica, indicat succos non fuisse biliosos & acres: quod in lienum & partes sinistras incubuit, indicat fuisse melancholicos. Ergo primò correptus est febre continua & modica, procedente febre incuruit, primò lien ob naturam succi, mox testiculis sinistris ob consuetudinem cum liene. Indicata est febris vigesimo die, ultimo scilicet sine auctorum: sed non ratio: non enim cum manifesta aliqua euacuatore. Abscessus ergo à principibus partibus potuit facere febris interruptionem, perfectam solutionem sine euacuatione non potuit. Aliquando ergo subincalescebat, & succellit tussis, & excretio subfilioli id est seminali & rubri, quia: ut dictum est proxima sectione, tussis à tumore rebus, & tumor testis à tussis sit, ob communem generationem cum spiritualibus instrumentis.

Cuidam manus dextra, & crus sinistram, ex tussiculari affectu, quam exspnisset parum, & nihil mentione dignum, resoluta sunt præplectico modo, aliis autem partibus nullo nodo immutata est, neque facie neque mente, & ne illis quidem valide. In melius capitis progredi circa vigesimum diem. Quod serè factum est circa menstruorum eruptionem, qua fr-

taffe tunc primum apparuerunt. Virgo enim erat.

Multis atque adeo gravissimis morbis corripitur virgines tempore pubertatis, nisi maturè prodeant menstruarum evacuationes: à quibus, cum erumpunt, liberantur: ut Hipp. docet libello de morbis virginum. Nam confluent sanguis de toto corpore versus vterum, si liberum exitum non invenit, reddenda in partes alias, & nihil mali est, quod non possit facere. Nam seprum transuterum premens, retracta vtero, præfocacionem: in caput irritans, insaniam, epilepsiam, catochos, aut etiam apoplexias: occupans thoracem, facit tussiculares affectus: irruens in cor, palpitaciones, & tremores cordis, ac nonnunquam syn copas: occupans aliquando vnam aliarum partium, quæ nervos excipit, facit impores & immobilitatem; & ita resolutiones. Vnde huic virgini evenit, volentibus iam mensibus evacuationibus erumpere, neque id facile facientibus ob naturalem valorum angustiam, aut sanguinis crassitiam, aut expultricis facultatis debilitatem, tussis primum & difficili respiratione laboravit (timoram est consensus facili genitalium cum spiritibus) deinde cum nihil mentione dignum spouisset, resoluta sunt manus dextra, & crus sinistram, irruente copia in cervicis dextram partem, qua commixtur cum thorace, & in brachium, & in lumborum imam partem, & sinistram, & in femur: non occupavit autem cerebrum, neque partes superiores cervicis. Quare neque facies, neque mens alterata est, vti in aliis ex simili causa fieri solet: Neque illis partibus sortis passio facta est. Non enim eiar resolutio vera, ut quæ pituita occupante nervos fieri solet, sed stupor magnus compressis multitudinem nervis. Quod exitus indicavit. Nam fluentibus mensibus vigesimo die caput melius habere. Hippocrates dicit, fortasse tunc primum eruperit. Suspexitur id, non scivit eorè. Tamen non multum referebar scire. Nam eadem mala fieri possunt mensibus suppressis quæ non erumpentibus suo tempore.

Apamantus & fabri illius pater qui caput fregit, & Nicestratus, nihil extusiebant. Dolores autem secundum renes aliqui torquebantur. Interrogati responderunt se semper repleri potu aut cibo.

Quod dicit, pater eius qui caput fregit, nihil aliud est, quàm quædam nota ad facilem memoriam cōparata. Hi tres ægroti laborabant tussi, alioquin non

A natrasset non exrassisset. Laborabant præterea dolore circa renes, in lumbis scilicet. Difficilis erat scitu causa. Proinde interrogationibus opus fuit. Maximum autem momentum habet ad præsentem corporis statum agnoscendum, de vita autem acta interrogare. Interrogati responderunt, se semper repleri potu, aut cibo. Quid ergo ex his coniectes? Certè illos ob voracitatem collegisse multam crudæ humiditatis copiam, hinc excitatas fluxiones de capite, ut sit, decubuisse in thoracem: aut in thorace ipso primum congestam copiam, ob cruditatem verò nihil notari dignum excreatum, sed descendisse fluxionem in lumbos: ubi ob frigiditatem, & capacitatem partis multum hærens, & crudior manens, poterat diu vexare, ac fortasse facere hydroperam, aut impetgens in vrinæ vias, aut in vesicæ colum, suppressionem vrinæ facere, aut abscedens in intestina, diarrhæa solui: aut abscedens in vterum, profluvium muliebri facere. Opus ergo erat siccò & tenui victu, pituitæ expurgatione, & clysteribus.

Dolores vehementissimos conspiciat aliquis quonam modo dignoscat: terror, tolerantia, & ignavia indicant.

Docet notas quibus cognoscere possis, an dolor sit vehementissimus. Sed fortasse dices, non fuisse his notis opus, si quidem dolor ipse per sese proditur, cum sit ipse tristis sensus. Tamen quia dolor ægroti quidem manifestus est, medico verò non nisi ex narratione ægroti, aut notis huius ægroti verò non omnes eadem dicunt, aut conqueſcunt eodem modo dolentes: sed quidam ne tantillum dolorem sine vociferatione ferre possint, quidam maximos dolores silentio transigunt. sit ut non ex querela modo posset medicus agnoscere quid sit dolor, sed opus sit notis. Accedit, dolorem non solum dici vehementem, quod magnus sit, sed quod plurimum debilitet: quæ duo non necessario æque sunt, sed contingit ob morem morbi, dolorem videri minorem, noxæ verò asferre plus. Vehemens ergo dolor nunc dicitur, qui plurimum lædit. Quantum autem lædat, duo signa præcipue indicant, alterum capitur à terrore, aut tolerantia: alterum ab oblationibus, aut ignavia. Tolerantia significat virium constantiam, & rolei antiam doloris, id est, bene ferre dolorem, sine facultatis lapsu, quod ex pulsu præcipue, deinde ex animalibus actionibus agnoscitur. Oblationes dicuntur Hippo. cibi qui offeruntur. Hic verò per oblationes dicitur se bene habere ad oblationes, hoc est, cibos libenter accipere. Ponitur verò terror, ut contrarium tolerantia, & ignavia oblationi. Ergo terror significat dysphoriam, id est, difficilem tolerantiam doloris, & ignavia, tedium accipendi cibos. Causa verò quæ terror ponitur pro dysphoria, quia cum dolor gravis est, & virtutem debilitat, similem passionem affert ei quam magnus terror. Nimirum qui gravissimo dolore cruciatur, pulsam habet contractam, & extremorum frigus, & quarundam partium tremores, & ciborum inappetentiam, ut qui terrentur. Qui hæc non patiuntur, non admodum graves habent dolores. Græves ergo indicat mala tolerantia, & fastidium: non graves, bene ferre

fette dolorem, & bene habere ad oblationes.

Aqua que celeriter calefcit, & celeriter frigefcit, femper leuior eft.

Hæc fententia fine vilo ordine interiecta eft, vt alie multæ huius libri. Explicata mihi eft antea in aphorifmīs, fed nunc quoque aliquid in eius enarrationem dicetur. Non fanè fcripta eft, vt doceamur agnofcere, quæ aqua leuior fit (nam quid refert) fed quæ melior. Quia quæ leuior melior eft, nifi aliqua corruptio, aut aliena qualitas illi accedat. Nam monftratum mihi eft in philofis, totam leuitatis caufam eſſe in tenuitate. Igitur aqua quæcunque, quantò leuior, tantò tenuior: portò quantò tenuior, tantò facilius alatur, & in calidum, & in frigidum. Nam in rebus omnibus, quorum eſt eadem natura, euenit, vt quanto tenioris ſubſtantie ſunt, tanto facilius recipiant vtramque paſſionem. Nota ergo ſubſtantie leuioris eſt in aquæ generibus, facilior commutatio: atque facilior commutatio, & leuitas, ſubſtantie tenuioris. Aqua verò quantò tenuior eſt, tanto eſt melius alimentum vehiculum, quia tantò minus moratur in hypocondriis, ſed diſtribuitur, deducitque ſecum cibos ſolidiores.

An cibi & potus aequales faciant moras, experientia opus eſt.

Tota ea medicina pars, quæ ad ciborum & potuum ſcientiam ſpectat, eſt Empyrica, nam cibum aliquem eſſe multum, aut parum, citò, aut tardius nutritum, citè aut tardè excretionis, excrementoſum, aut excrementis vacans, bonum aut mali ſucci, nulla exacta ratio eſt agnoſcendi præter experientiam. Non tamen proinde dicit Hippocrates nunc, cibi & potus experientia indigent, Nam nihil horum eſt, ad æqualitatem manere. Sed id dicit, propter ciborum uſus, & quantitatem. Nam æquale, & inæquale de quanto dicitur, & dicitur ad aliquid aliud. Significat ergo Hippocrates opus eſſe experimento ad cognofcendum an cibi & potus ad æqualem menſuram maſceant cum aliquo alio. Sed quid illud eſt. Ratio vtendi cibi eſt, noſſe, quantus & qualis & quo tempore & ordine dandus ſit, id verè ſcire poſſumus, ſecundum rationem communem, aut ſingularem: ſecundum communem, ratiocinatione poſſumus diſcere: velut bilioſis dandum plus & ſolidius, pituitioſis minus & tenuius: dandum cibum poſterioriorem ubi prior deſcenderit: dandum tenuem ante craſſum: tamen ſecundum rationem ſingularem, non poſſumus fine experimento præſcribere naturæ eius cui cibus inſtituitur. Immo verò niſi præſentes, & periculum facientes, & quædam addendo, quædam detrahendo. Nam viciuſ non inſtituitur homini, ſed huic homini. Singularem verò non eſt ſcientia. Dicit ergo Hippo. opus eſſe experimento ad præſcribendū cibum & potum, ita vt ad æqualitatem maneat cum eo, quod corpus & diſpoſitio petit, id eſt, vt exactè tantum detur, quanto opus eſt. Hanc eſſe legitimam enarrationem loci, conſtat ex eodem

A Hippocrate lib. 1. de diæta, vbi ita dicit. Si quidem enim ſupra hæc inuenta fuerit ciborum menſura, & laborum ad vnamquamque naturam numerus, ita vt exceſſus, neque ſupra, neque infra modum fiat, inuenta fanè exactè fuerit hominibus ſanitas. Nunc verò prædicta quidem omnia inuenta ſunt, qualia ſunt, hoc verò inuenire impoſſibile eſt. Si quidem igitur præſens quis ſit, & inſpiciat, cognouerit quidem hominem exeuntem, & in gymaſiis exercitantem, vt cuſtodire ſanum poſſit, alia detrahendo, alia apponendo. Verum non præſenti, impoſſibile eſt cibos ac labores exactè præſcribere.

Dicendum quod ſanguine fluente expalleſcant, & quæcunque alia huiusmodi dicere debent.

Si fieri poſſet, vt medicus ſingulorum hominum naturas noſſet exactè, id eſſet optimum, atque vtiliſſimum. Sed non poteſt. Debet proinde conari, vt quantum poſſit, agnoſcat eius naturam cuius curationem luſcipit. Et multa quidem, ex hiis quæ de temperamentorum notis tradita ſunt à medicis, cognofcet, non tamen omnia. Proinde interrogare debet multa, & ipſe ægrotus debet dicere, quæcunque per experientiam proprii corporis obſeruauerit: vt, quibus ſoleat iunari, quibus lædi: quibus affectionibus, quibus ſymptomatis corripit facile ſoleat. Nihil horum debet ægrotus emittere, neque medicus negligere, ſed hic interroget multa, ille reſpondeat libenter, quæcunque circa ſeipſum obſervatione cognouerit. Velut ſi ſolet fluente ſanguine linqui animo, aut expalleſcere, dicere debet: & quæcunque alia huiusmodi. Nam quibus id accidit minus mirri ſanguis debet, quia parum iunantur, vt Hippocrates ipſe 6. Epidem. præter 6. dicit, hiſ verbis: Quibus ſanguis multus fluxit ex naribus, qui quidem decoloros meromodo ſunt, parum prodeſt, quibus verò colores rubicundi, non ſimiliter. Non ergo parum refert hoc medico nare rare, vt cautius ſanguinem mittat.

Sexaginta dierum ſætuſ maſculi corruptio in deſentionibus partuſ ſalubris.

Nomen æνδρῳα, quo hic vtitur, non ſignificat abortum ſpontè factum, is enim dicitur ἐκτρωπις, ſed corruptionem ſætuſ factam medicamento venenato. Quare præceptum hoc ad veneficos ſpectat. Medicis enim, nèque vitæ, nèque bonoris cuiuſquam gratia, licet id tentare. Quanquam antiquiſſimis illis ſeculis, quibus lex naturæ minus culta erat, corruptentibus medicamentis utebantur. Ac proinde occaſiones quibus illis vti quis tuè poterat, obſeruabant. Sed cur Hippocrates, qui iurciurando ſe aſtrinxerat, diſcipuloſque ſuos aſtringi cogebat, nihil ſe tale propinaturus, docet nunc occaſionem idoneam ad propinandum? An aliquando iuramentū obliuſ, illi quoque

propinabar? Si quidem puellæ pſalteriz abortum ſaluſ molitus eſt? An ſolum erat piaculum pharmaco corrumpere, non etiam ſaluſ? An vt alii qui corrumpentia dabant, cum minori periculo darent, hæc docet? Ao ex hac venefica obſervatione, aliquid etiam quod nobis vtile ſit naſcitur? Nimirum ſi corruptio maſculi, quæ exactis ſexaginta diebus agitur, ſalubris eſt, id eſt ſine matris periculo agitur, & abortus maſculi poſt ſexaginta dies ſponte factus, ſit ſalubris: feminæ verò eodem tempore: aut maſculi, minori, ſit inſalubris. Sed qua cauſa maſculi abortus, ſive ſponte, ſive pharmaco factus, ſexaginta diebus eſt ſalutaris? Maſculi certe ſemper, & partus & abortus eſt ſalubrior, quàm feminæ, ob dictam ſæpe cauſam. Maxime autem qui ſexaginta diebus. Nam vt ipſemet Hippocrates dicit, libello de natuta pueri, maſculus triginta diebus formationem accipit, femina multò pluribus. Arqui vt ibidem Hippocrates autor eſt, tempus expurgationis reſpondet tempori formationis, & in Leuitico præcepit Deus, eas quæ maſculus peperiffent, non adire templum ante triginta dies, quaſi id eſſet longiſſimum tempus expurgationis in illis. Itaque mares triginta diebus formantur, feminæ non tam cito. Docet præterea Hippocrates libello de alimento, duplum tempus inſumi in ſenſus & motus accieſſionem, atque informationem. Itaque maſculum ſi triginta diebus formatur, ſexaginta moueri, & ſecuire, feminam multò tardius. Ergo maſculus veneni vum, aut quamcumque cauſam abortus ſentens, poterit ſexaginta diebus iuuare exitum proprio motu, antè verò id tempus non poterit, neque ſumina eo tempore. Iam verò ſi cauſa ſuperior ſpectetur, ſexageſimus dies non eſt inſelix. Nam motus Solis habet aſpectum ſextilem luſtrata ſexta parte Zodiaci. Si menſes lunares numerentur, incidit in tertium menſem, qui ſolior eſt menſibus patibus. His omnibus accedit Hippocratis auctoritas & experimentum.

Hercules intumuit mali die octaua.

Quid eueniret Herculi non narrat, illud vnum narrat, abſceſſum eſſe illi factum octaua die, die non iudicatoria. Quid tum poſtea? hæc cauſa non fuit bonus abſceſſus. Mirum ergo ſi morbum priorem ſoluit, aut ſi nō eſt paſſus recidiam.

Dysenteria tentatur magis, qui & tenefmo.

Tenefmus eſt in extremo recti inteſtini, quod dysenteria in inteſtiniſ. Merito ergo qui eſt tenefmus, id eſt, in tenefmo tentatur crebrè, eſt etiam dysentericus, id eſt, parauit ad dysenterias. Nimirum affectiones, & cauſæ, & loci malè affecti ſunt ſimiles.

Lactans quedam papulas per totum corpus habebat. Cum autem ceſſauit lactare, ſubſederunt aſtate.

Lactantibus raro ſunt menſtrua vſque dum ceſſant lactare, aut ad certum vſque tempus: quia ob naturalem neceſſitatem ſeruorur in mammæ, quo vterum abire conſueuerant, & redundantia ſanguinis, in lac inſumitur. Neceſſe eſt ergo lactantes, niſi alioqui ſint valde euchymæ, repleri malo ſucco. Quia etſi menſtrua euacuationes ceſſant, quia lactant, oon tamen eadem eſt materia earum & lactis. Nam menſtrua ſunt ex peſſimo ſanguine, lac ex bono. Expulſione enim ſunt illa, hoc tractione, & comminatione. Expultrix verò facultas fertur in prauum, tractrix in bonum. Ergo inſumitur in lac bonus ſanguis, & retinetur malus in lactantibus. Quare non mirum, ſi lactantiſilla habebat per totum papulas referentes cacochymiam, & ceſſans lactare, proſt menſibus menſtruis euacuationibus, ſubſederunt. Aſtate oſtat ſolutas papulas, merito id quoque factum eſt, quia id tempus eſt accommodatiſſimum ad omnes decretorias euacuationes. Hic continget aliquem dubitare, ſi ſuppreſſio menſtrorum etiam in lactantibus eſt cauſa cacochymie, cur querantur nutrices quibus non profluant. Videtur enim eſſe ſatius, vt ſingulis menſibus purgentur, quàm vt impure ſit ſanguis. Tamen res non ita habet. Non inquam querendæ ſunt, quibus profluant. Quia cum non poſſit fieri expulſio extremitatum, quam non antecedit exercitio, neceſſe eſt ſingulis menſibus, tempore exercitioſis (quam doloribus totius corporis, qui antecedunt agnoſcimus) totum ſanguinem perturbari, atque adeo perturbato vitari lac. Satius ergo ſit, bene temperatam nutricem eligere, & bonos ſuccos ei idoneo vitu procurare, quàm cum illius coſturbatione crebra, ſanguinis expurgationem à menſtrua euacuatione expectare. Accedit, quod naturæ opera ordinem habent, cum ergo menſtrua ſignis ſi generationis principium, cum ſi apparet, ad aliam iam ptolem natuta conuertitur, quare ad priorem inepta eſſe incipit: quare & puerum oportet transferre ad aliam nutricem. Quod ſi non eſt copia nutricum, ſed vna adeſt menſtrua habens euacuationem ſingulis menſibus, dum profluat, vires, quoad fieri poſſit, lactationem. Magis autem vires vnum, aut duos dies antequam erumpat (quod tempus ſecretionis eſt) quam cum iam ſiuit.

F

Coriarij, qui coriacea faciebat, (uxori) cum peperiffet, & ſoluta eſſet perfectè, viſum eſt ſecundina aliquid membranofum remanere. Quod quarto die male erupit. Nam ſtranguriſa facta eſt: paulo poſt concipiens peperit marem. Multos autem annos iam habebat. Denique menſes non ſuebant, cum autem peperiffet, intermiſiſ ſtranguria paulatim.

Quomodo potuerit hæc mulier ſolui, id eſt, liberari perfectè à partu, manente intèrius parte membranofa ſecundine? Certe nullatenus. Sed perinde intelligendum eſt, ac ſi diceret, cum vi-

deretur soluta esse perfectæ, deinde vñum est secundum aliquod membranosum remanere: et tunc quarto die à partu male, idest, magno cum labore, & difficultate: quia fiebat stranguaria, idest, ceptatam antea ei stranguaria fieri quod non minimum auxit: difficultatem expurgationis vteri, & excretionis secundinarum iam putrescentium, ob viciniam collis vteri, & vesicæ. Omnibus sane iam iam partui proximis sit passio quædam stranguaria similis. Vltimis mensibus antequam dolores multum essent, ob compressionem vesicæ quam distensus vterus facit, deinde & ob hanc, & ob natalem nixum vteri deorsum, per compassionem, vesicæ collum irritatur. Plurisque nulla passio propria in eis parte sit, quibusdam autem sit, & post partum etiam manet, ut aliis etiam hæmorrhoides. Huic ergo fortasse, ob hanc occasionem fiebat, fortasse etiam multo ante fieri ceperat, antea tamen tunc est, & purgationis difficultatem auxit. Hic mirantur quidam, quod conceperit nam multos annos nata, ut iam cessassent menstrua euacuationes, idque miraculum esse putant. Ego verò non intelligo menstrua huic cessasse antequam conceperet, sed post hunc vñum partum nunquam amplius effluxisse. Mirum quidem quod ea ætate marem pepererit, non tamen adeo ut inde careere debeat. Quod stranguaria intermisserit modicum à partu, copiosa expurgatio fecit: nimirum excrementa diuerterunt à vesicæ ad vterum, & hæc ibi betata est, vsque dum collectis rursum excrementis, morbus rediit.

Cuidam coxa dolebat antequam conceperet, postquam autem concepit non amplius doluit. Vigesima autem die à partu rursum doluit, peperit igitur masculum.

Huic haud dubie vteri os erat concoctum in coxam per morbum vterinum. Nam idem Hippoc. lib. de superfectione cita reliquit scriptum: Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut in manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint, cum verò prægnans est, desinunt, conceptu autem ab vtero exsoluto, rursum insunt, odorata, & bibere, & ad vteri os appropiare, conducit. Porro lib. 1. de morbis mulieribus dicit: Quibus verò os dactylorum est, & ad coxam allapsum: sunt enim etiam talia prohibentia, ne vterus semen suscipiat: Quamvis tamen tale quid accidit, odoratis fomentis fouere oportet: Post fomentum autem per digitum aulicum à coxæ detrabit. Hic Hippo. quibus constat illum dolorem coxæ, morbum vteri fuisse. Nam illi morbo congruit curatio, quæ odoratis sustinibus agitur: Prohibebat verò ille morbus conceptum, sed vteru eorum curatur, & conceptione, & tempore prægnationis libere sunt mulieres ab eo malo, quia insinuat materia, quæ os dactylorum quæbat, in se: nam: maxime cum masculus conceptus est: quia quæ feminam concipit, extremum est, & frigidior, & plus ei extremum redundat, & insinuat minus. Huic ergo conceptione solutus est morbus vterinus, & toto tempore prægnationis, & viginti dies à partu, qui fere in expurgationem

vteri insunt solent, ut lib. de superfectione citat scriptum, duravit sanitas. Post id tempus, rursus doluit. Sed quando ita ei contigit, merito peperit masculum. Quod infinita dicit: peperit igitur masculum.

Pregnanti tertio aut quarto mense eruperunt exanthemata, ad quæ manna thuris vitæ, in inferiori parte tibie dextra; & in manu dextra iuxta magnum digitum. Nescio an peperit, reliqui enim eam se mestrem: habitabat autem; ut ego existimo, in archelai adibus ad rupem.

Vtero gerentes colligunt cacochymiam, quia non expurgant singulis mensibus, & non insunt in fortum tam purus sanguis, qui non expurgatur. Proinde primis tribus mensibus solent illis fieri Picæ, nausæ, fastidia, & vomitiones: deinde parui, & alie multæ maculæ, & exanthemata. Velut huic facta sunt exanthemata, qualia curari solent insperso pulvere maris thuris, aut ceti usæ. Sunt maculæ quædam rubræ cum excoctione. Facta quidem sunt ob cacochymiam; in illis autem partibus, quia sunt emundatoria propria hepatis, velut sinistra manus, & pes sinister, henis. Indicantur ergo illa exanthemata male affici hepatis, & consentaneum quidem est, virium sanguinis, hepatis primum perferre, quia est officina propria illius. Huic ipsa causa ego censeo sectionem venæ factam in manu dextra inter digitum medium & anulare, aut hunc & minimum (eodem scilicet loco, quo hæc habuit exanthemata) vtilem esse in lecoris affectionibus.

E

Antigenis vxor, quæ iuxta Nicomachum habitabat peperit filium, carnosum quidem, habentem autem præcipuas partes discretas; magnitudine circiter quatuor digitorum & sine ossibus, postremo etiam crassus erat & rotundus. Ipsa autem ante partum erat asthmatica, deinde simul cum partu pus euomit modicum, quale ex furniculo.

F

Huic mulieri cum conceperet monstrum, accidit etiam difficilis respiratio, sicut in carnosum si parte fundi ventriculi, aut in aliquo viscere eorum quæ iuxta ventriculum sunt, suppuratione. Id quod exitus indicat. Nam simul cum partu pus euomit modicum. Monstrum partum fuisse satis indicat descriptio. Dicit enim peperisse filium, carnosum quidem; idest, ut frustum quoddam carnis, crassum, & rotundum sine ossibus; habentem tamen in magnitudine quatuor digitorum discretas maximas partes, ut caput, brachia, & crura. Monstri verò generationem nullas non tribuit debilitati formatrici, aut defectui, aut corruptioni, aut redundantie

G

matrice. Nam monstrum fit, aut deficiente parte naturali, ut si nascatur sine brachiis: aut redundante, ut si duplicis habeat: aut partibus naturalibus male positis, ut si caput nascatur ex medio pectore: aut habentibus figuras alienas, ut caninas, aut equinas. Defectus partis, defectus matricis, aut debilitate formatricis in patta fieri defectu verò illi, qui semen de toto corpore decidere putant, dicent esse defectum partis seminis ex parte tali decidende: qui ex solis vasis seminariis, non ita, sed defectum matricis in parte factum, postquam gigni fortis coepit, aut separationem particulæ seminis, aut corruptionem. Redundantiam, qui muliebri tantum semen prestare materiam putant, dicent esse ex superflua redundantia seminis cepta generatione multarum partium, quæ ad multos fetus pertinebant, illique coalescentibus. Iuxta sententiam putantium utrumque semen prestare vim & materiam, simulque decidere de toto corpore, fiet & ob hanc causam, & quod semina non misceantur apte, ut si separatim fieri partes decideret a capite mulieris & viri, & ob id duo capita generari incipiant. Malus posuit, si de toto corpore semen decidit, sit, quod facultas formatrix non bene separet partes seminis, sed male commisceat: si de solis vasis seminariis, quod cepta iam matricis alteratione, & cum alterum est jam potentia cras, aliud manus, ante tamen quam duruerint, male contenta confunduntur. Alienæ figuræ sunt, ob corruptionem seminis. Nam figuræ alienæ non possunt fieri per se à causa formatrice, sed per accidens, ob matricis dispositionem. Dispositio autem, qua semen fit potentia aliud quam erat, corruptio est. Nisi his addas vitiole, & alienæ imaginationis vim, quæ causâ quantum quoque possit alterare fortis, ibi loco à me disputatur. Præter imaginationem verò, constat, causas omnes dictas, non nisi in morbois corporibus accidere. Nam aut defectus alimenti est, aut redundantia excrementi, aut maligna qualitas & corruptio, aut debilitas facultatis non bene coniungentis, quæ coniungi; aut separatantis, quæ separari oportet, aut quædam formatris, quædam alia non formatris. Velut in hoc fortis, caro quidem genita est, ut potest genitu facilior, ossa verò minime, deficiente formatrice in ea parte, vel difficili. Debilitatem verò facultatis constat in morbois corporibus esse, quale erat huic mulieri, cui simul cum conceptu, collectio parvis in visceribus facta est, atque ob id difficilis respiratio, compressis instrumentis respirationis. Meminir Gal. huius dispositionis, c. 12. 3, de difficultate respirationis, non longe à fine.

Eius qua filias gemellas peperit & difficulter peperit, & non admodum est purgata, intumuit totum corpus: deinde venter magnus est factus, alia autem subsederunt: rubra quidem fluxerunt usque ad sextum mensem, deinde valde alba per reliquum tempus: hæc autem fluxiones veneri officiebant, & mera rubicunda ipsi fluxebant.

Hinc ex partus difficultate facta sunt duo gravissima mala, hydrops, & vlcera vteri. Merito autem

fuit difficilis partus. Quia peperit feminas duæ. Nam & quia fortissime, & quia duæ poterant id facere, cum geminis patris simplicis sit difficilior; & feminæ quam viri. Proinde non satis est purgata, & distributis per totum corpus excrementis intumuit: suffocato deinde calore eorum multitudine, hydrops successit. Cuius manifeste notæ sunt, ventrem intumuisse alibi partibus superioribus extenuatis. Nam lib. de affectionibus, ita scriptum est, Si expurgatio non facta, fiat hydrops, venter aqua impletur, pedes autem & suræ attolluntur. Hæmeti verò, & claniculæ, & pectora, & femora, liquefunt. Hoc est quod nunc dicit, magnum esse factum ventrem, & alia subsedisse. Vlcera verò facta esse in vtero indicant fluxiones rubræ ad sextum mensem durantes, & factæ deinde albæ, factæ scilicet iam pure in vlceribus, quæ in venereo congressu dolebant ob confectionem; & mera rubicunda rursus fundebant. Fecerunt ergo hæc quod alia omnia vlcera, recentia fuderunt sanguinem, inueterata pus, refinata sanguinem rursus.

Diuturnis leuitatibus intestinorum, acidus ructus superueniens, qui antea nullo modo fuit, signum utile, qualis Demaneta accidit. Fortasse autem arte parare licet. Etenim turbationes huiusmodi alterant. Fortasse autem & acidi ructus leuitatem intestinorum solvunt.

Aphorismo primo sextæ particulæ dicit, ructum acidum post longam leuitatem intestinorum, esse bonum signum, id quod explicatum mihi suo loco est. Nunc verò dicit signum utile, ut insinuet, non esse solum bonum ut signum, sed ut causam etiâ. Nam non omnino idem est, *αγαθόν* & *χρήσιμον* non enim quod bonum, hoc etiam utile est. Ut verò non dicitur quod solum bonum aliquid indicat, nisi etiam prodest. Hic ergo insinuat esse bonam ut signum, & ut causam, vius duobus his nominibus, signum utile. Nam signum est quod significat, utile quod prodest. Sed quia magis certius est, talem ructum esse bonum signum, quam causam, addit, fortasse autem & acidi ructus leuitatem intestinorum solvunt: ut causæ scilicet salutares, atque ita fortasse licet eos arte parare. Nam quæ sunt bona tantum signa, non licet arte facere: sed quæ cum facta sunt, inuuant. Reddit causam, qua adducitur, ut suspicetur, acidus ructus licere arte facere, dicens, Etenim turbationes huiusmodi alterant, id est; nam turbationes huiusmodi mutant corporis dispositiones, quare poterunt fortasse transferre ad melius. Sed quid est quod Hippocrates docet? Eloquimur apertius. Certè henteria, cum ex debilitate concoctricis & retentricis fit, quantum illa calorem, hæc siccitatem amittit, ob frigidam & humidam intemperiem plerumque fiet. Hanc proinde, calefacientibus, siccanibus, & adstringentibus, curari vult Hippocrates, & ructum acidum, cum succedit, probari quidem ut signum, non fieri tamen arte, quin potius dari cibos, qui facile concoquantur, &

quoad fieri possit, non tam facile descendat. Si tamen hac via non succedat, quæ legitimæ est, tentari aliquando rictus acidus arte facere (allegitimum quidem hoc, sed fortasse aliquando vtile, tentandusque curatio legitimæ non cedit) dando cibos qui facillimè accedant, vt si concoquere non potest ventriculus, saltem ad aciditatem trahat. Nam magna languescit nihil faciens omnino, quàm prave committat, quia nulla ratione magis languescunt vires omnes, quàm cessatio.

Sanata est hellebori potione Lycia. Postea splen magnus fuit cum dolore & febris, dolores etiam ad humerum extendebantur: vena autem quæ secundum splenem, in cubito secabatur, & pulsabat quidem sepe, aliquando autem non fuit scissa, sed cum sudore abiit, aut sponte. Ex quo autem abierunt, splen ad dextram extendebatur spiritus intro duplicabatur, non quidem magnus. Delirabat, congebebat, status inerat, non deiecitbat deorsum quidquam, neque mingebat. Mortua est ante partum.

Hæc mulier vti inditia manifestè declarant, mortua est ex inflammatione lienis, & anæquam inflammatione ea fieri inciperet, laborabat: nunc narrat quo morbo: fortasse melancholico: aut abundabat excrementis, vt solent vtero gereotes. Hanc verbò, vt euentus declarauit, contigit tunc abundare malignis. Videbatur iuari purgatione, & vna est helleboro, atque à priori quidem passione visa sanari, postea in dictam inflammationem incidit. Non mirum. Nam medicamenti expurgantis vsus, cum non est admodum tempestiuus, qualis quidem esse in vtero gereute vix potest, habet periculum inter cetera inflammationis hypochoondriam. Nam quæcumque causa morbum aliquem, cum adest, augere potest, eadem nondum præsentem nata est facere, in corpore valde parato. In hoc ergo tam excrementoso facile fieri potuit inflammatio interna ab hellebori potione. Fuisse autem talem morbum, indicant imprimis signa parboynomia, deinde & tota syndromæ signorum: quorum quædam sunt passionis, quædam magnitudinis morbi, quædam mortis: passionis quidem, vt magnus splen, & dolor [ex tactu scilicet] & febris: magnitudinis inflammationis, vt dolores in humerum [nam dolor humeri dextri quasi dorsum detrahitur, significat inflammationem hepatis non exiguam: sinistri, lienis.] Proinde ego intelligi hos dolores humeri sinistri fuisse, & pulsus arteriæ in cubito, & quod splen in dextra intendebatur, id est crescebat vt videretur ire in partem dextram: mortis, vt spiritus intro duplicari (hic enim significat coactionem) & delirium, & quod congebebat quasi frigeos, quod cum interna vitiose pessimum est: & quod status inerat, quod & frigus inferni ventris significat, & suppressio deiectionis & vrine, quod omnium humorum ad inflammatam partem accursum significat. Non sunt autem hæc æquè mala, sed quædam superueniunt prius, quædam proximis iam morti.

A Et narrat quidam Hipp. ea eodem ordine quò supra. Primum ergo ab expurgatioe, splen magnus cum dolore, & febre, & dolore sinistri humeri, & pulsatione arteriæ in cubito, non cootinsenter, sed quibusdam temporibus. Nimirum inflammatione pleræque exacerbantur ex quibusdam intervalis. Sed quia vt dicitur 6. apho. 12. Dolores ex dorso in cubitum descendentes venæ sectione curantur, sciscit Hipp. aliquoties venam in cubito, cum pulsaret (nunc quidem eadem secabatur quæ pulsabat, sed Hipp. venæ nomen venis & arteriis tribuitur) & abibat pulsatio ex hæsto sanguine calidiori, qui venas eo loci replebat: aliquando autem non fuit scissa, sed pulsatio cum sudore abiit, aut etiam non omnquam sponte, id est, sine aliqua euacuatione, natura aut arte facta. Hæc pulsatio in cubito prænuuntiabat futuram isaniam. Nam in bocipso libro tempestare 4. dicit, Quibus vena in cubito pulsaret, insanam & furibundam. Deinde procedente malo abierunt hæc, dolor inquam humeri, & pulsus in cubito, quia totus calidus sanguis collectus est ad partem præcipuè affectam, & creuit plorimum inflammatione, vique adeo vt splen videretur inrendi ad dextram partem. Hinc iam spiritus offendens, & delirium, tracto cerebro ad magnam compassioem. Tamen non fuit spiritus magnus, etsi deliraret homo, quia aderat dolor inflammationis, qui prohibebat, & coactionis: per quam, cum dilatare ceparet thorax, retrahebat. Hinc iam gravis affecta ob magnitudinem febris internæ, & omnium succorum & spirituum ad interea reuocationem, cepit sentire frigus extremorum, & demittere status. Proximè autem iam morti suppressa deiectio est & vrina. Mortua itaque est ante partum. Admoet nos hæc historia, ocellis iis quæ vtero regunt, medicamentis expurgantibus, nisi leuissimis, vtamur.

B
C
D
E

Quæ circa fauces in alterutram partem impetu feruntur, non sunt exulcerata, ad sinistram transferunt. In splenem venit dolor non decretorius.

F Non satis cooflat an hoc enaret, vt quod Lycia conoerit, an quod illa tempestare cootingeret males. Nam Lycia factus est tumor lienis non decretorius, fortasse ante hunc tumorem reperans succi in alterutram partem fascium, & illinc collecti sunt in lienem, narraturque id nunc ab Hippo præpostere. Magis autem videtur hæc dictio continere quod in multis obseruabatur illa tempestare. Nimirum succi impetu ferebantur in fauces, hoc est, in ioternam oris partem, & quædam impetibus in eas partes, & vlcera fecerunt: quædam non hæretia ibi, in quamcumque partem fascium, siue in dextram, inquam siue in sinistram, ferrentur, colligebantur in sinistra, & in liene dolore faciebant, non decretorie, quis eo abiectione non solebatur malum, sed procedebat acerbis, vt in Lycia contigisse legimus. Nam euacuatio agi potest decretorie, vt cum tempestus venit, & quæ oportet, & soluit, aut subleuat morbum aut symptomata, vt cum non confert, ita etiam abiectione. Ergo

liene fieri potest dolor, & tumor per abscessum A
decretorie, soluiturque ita, aut subleuatur morbus
prior: aut non decretorie, velut cum febris quæ ce-
perat, mox succedit inflammatio lienis non minora,
sed augens febre. Porro cum tumor lienis febre
facit, nihil minus est ille tumor, quam decretorius,
nam est ipse præcipuus morbus: tamen cum ali-
quando ex febre prægressa fit tumor, reiciendis
venis sua excrementa in illam vicinam partem, & fe-
bris prior soluitur, decretorie fit tumor. Illis verò
de quibus loquitur Hippoc., non ita est factus, sed
intempestive, & augens magis periculum, quam
minuens.

Hieroni indicatio facta est decima quinta die.

Tamratum est indicationem decima quinta die
fieri, ut cum occurreret, velut notari dignissimum,
scilicet pro ab Hipp. mandaretur. Velut nunc Hieroni
dicit accidisse. & 4. huius operis, feminæ eadē in
Bulagore villa. Causa autem qua perpauci hoc
die indicantur est, quia illi maxime indicari possunt,
in quibus morbi mouentur diebus imparibus, sed
& in illis decimas quartus, qui inter decimum ter-
& decimum quintum positis est, atque indicatio-
nem fere semper. Proinde lib. 1. huius operis nu-
merans dies quibus indicari solent, qui mouentur
per impares, dictos duos omisit, quasi raro indican-
tes ob dictam causam.

*Coi sorori hepar elatum est splenico modo.
Mortua est secunda die.*

Ingens hepatis inflammatio fuit hæc quæ secun-
da die interfecit sororem Coi. Si enim fuisset scir-
rhosus tumor, quali soler lien intumescebat, non po-
tuisset tam brevi interimere. Quare quod dicit sple-
nico modo elatum esse, ad magnitudinem tumoris
pertinet. Namur soler lien tumescere adeo, vt in
dextram partem videatur aliquando tendi, vt Ly-
cia accidisse super narrauerat. Nunc explicans in-
flammationis magnitudinem dicit, intumuisse sple-
nico modo, id est, in tantam molem elatum esse, in
quam lien solet. Sed quantumvis inflammatio
fuerit magna, minus est occidisse mulierem secun-
da die, cum Gal. dicat, primis & secundis diebus de-
cretorius non esse, atque velit, cum in prognostico dicit
Hippoc. de tertianis febribus interimere quartā die aut
quas, intelligi, quarta aut tertia. Tamen simile est
hoc ei quod de angina diximus in cōmentatio pro-
gnostico, neminem angina, quantumvis acuta sit, non
potest ante diem tertium solui, tamen potest secun-
do atque etiam primo strangulare. Nam strangu-
latus sit crescente dolore, qui, vt congerit esse im-
petum fluxionis, erefcer, solutio verò morbi, non
nisi depulsa materia à natura, quas depulsiōnes non
potest natura nisi decretoriis diebus perfecte facere.
Ita etiam tumor hepatis potuit rursuspetere cre-
scere, vt compressione septi transuersi, & compres-
sione cerebri, secunda die interfecit, tamen solui
non potuisset ante diem aliquem decretorium.

*Bion simul copiose mingeat sine sedimen-
to, & sanguis de sinistra nare fluebat. Erat e-
nim splen in gibberum elatus & durus, & sur-
sum latus. Superflus fuit. Recidivam passus
est.*

Hanc quoque fuisse inflammationem lienis exi-
stimus. Nam in aliis eius visceris tumoribus, neque
expectantur indicationes, neque recidivæ. Quod
autem liberatus sit Bion ab ea inflammatione, fluxu
sanguinis de nare sinistra, non mirum. Nam ea est ei
morbo maxime accommodata euacuatio, & maxi-
mè secundum recidivam procedens. Tamen
quoddam fluxu multæ vrinæ, mirum fortasse videatur
alicui, qui legerit apud Gal. 13. morbo nullam boie
visceri expurgando patere per renes viam. Tamen
nosse oportet, etsi manifesta via à hunc ad renes nō
sit, nisi per multos anfractus, esse tamen haud du-
bit, naturæ vias notas, per quas possint succi abse-
dere. Nam Hipp. dicitur omnia conspirabilia &
confluxibilia, & alibi, natura inuenit sibi vias. Ita-
que expurgari posse lienem per vrinam constat per
vias occultas, etsi id frequens non sit, quod unill
sint manifestæ. Tamen videtur Hipp. docere non
hoc solum exemplo sed alibi etiam, sequutus com-
munes oblationes, posse expurgari ita lienem,
quin etiam & solere. Itaque videtur Galeno repa-
gnare. Nam libello de passionibus, seu affectionibus
D (quamquam eum libere Polibio esse Galenus
putat, non est aspernendus) docens rationem cu-
randi spleniticos, post alia quedam, suadet vt diu-
reticis medicamentis. Quæ (inquit) mollit sple-
nem, scriptum est. Si igitur diuretica molliant
splenem sunt, non mirum, neque sane rarum, mi-
nutione copiosa crasse & perturbatæ vrinæ solgi
lienem tumorem. Quin & Gal. ipse in curatione
quartanæ iubet vt diureticis, etsi ea febris cum af-
fectione lienis plerumque fiat. Annuadendum
est posse partem aliquam malè affectam iuvare, per
se, euacuata materia propria morbi, aut ex acciden-
ti, expurgato toto corpore. Prodest enim tanto pe-
rius in partium morbis totius vacuatio, vltimo sola ea
fit satis ad perfectam curationem, & ad medicamen-
ta localia procedere opus non sit. Ita ergo vias diu-
reticorum mollire potest lienem, non quidem per
se, sed quod derivata crassiori parte sanguinis, quæ
splenis duritiem fouebat, ad vrinæ vias, ille molles-
cat. Itaque michi copiosa affectioni lienis raro esse
potest vacuatio propria, derivatio tamē esse potest,
si que non raro in iis, quibus biliosi cum sunt, bilis
F vitione crassa in liene colligitur. Nam in illis cau-
sa antecedens mali, est bilis fluxa, quæ ob tenuita-
tem facile mingitur. In pituitosis & melancholicis
non ita fiet, quia neque proxima neque antecedens
causa purgari per vrinam facile potest. Quæ etiam
eodem modo curant diuretica, expurgant scilicet
totis, aut maximis venis & arteriis per eam viam.
Ita ergo Bion liberatus est ex lienis inflammatione,
mingens copiose, & sine sedimento, hoc est crassum,
& perturbatum, atque ob perturbationem non res-
siciens. Sed non potuit tam perfecte lien illa deriva-
tione per purgari, vt non recidivæ morbus, minor ta-
men, & ex quo superflus manebat, hæc verò intellige

d. & de communis formationis hominibus. Nam raris quibusdam, quibus à vena causa via quædam fertur in mesenterium, facile potest lien purgari per urinam, recurrentibus facis à mesenterio per eandem urinæ vias.

Erant autem anginosorum passiones huiusmodi. Cervicis vertebra intro vergebant, quibusdam plus, quibusdam minus. Collum etiam forinsecus conspicuam cavitatem habebat, atque ea pars ad contactum dolebat. Erat autem & cuidam affectus infra os, quod dens vocatur, qui similiter acutus non erat: Quibusdam autem valde conspicuus erat maiori circumferentia, & nisi ad dentem vocatū affectus extenderetur, fauces non inflammabantur, sed subsidebant: partes sub maxilla tumide, inflammatis similes non erant, neque glandule alicui tumuerunt: sed cum secundum naturam se haberent, linguam non facile convertebant: sed maior ipsius esse videbatur, & prominentior, & vena sub lingua conspicua erat, deglutire non poterant aut valde difficulter: sed in naves effugiebant, si valde conarentur, & per naves loquebantur. Spiratio autem his non valde sublimis, quibusdam autem vena in temporibus, & in capite, & in cervicē intumescēbant: Quibusdam autem horum quibus affectus recrudescēbant, paululum calida erant tempora, etsi alioqui non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi deglutire cuperent, aut salivam, aut aliud aliquid, neque oculi intus desidebant. Quibus tumor in rectum procedebat, non in alterā partem vergens, hinc quidem paralytici facti sunt. Ceterum si quempiam peritisse viderim, recensendo, quos autem nunc noni, superstites manserunt. Quidam autem celerimē alienabantur, plurimi autem etiam ad quadragesima dies pervenerunt, hocque accidit plurimū etiam sine febre: Multi autem per valde longum tempus partem aliquam tumoris habuerunt, prout deglutitio & vox significabāt. Columelle quoque eliquate imminationem quandam exhibebant pranam, etsi nihil mali habere viderent. Quibus autem in alterutram partem inclinabat malum: in ea parte unde vertebra inclinabant, ite resolvebantur, & versus alteram trahēbantur. Erant autem hæc in facie apparentia maximē, & ore, & intersepto secundum gargareonem. Quinetiam inferiores genæ pro ratione mutabantur. Paraplexia autem non per totum corpus fiebat, ut ex aliis contingit, sed usque ad manum, ex ea parte qua erat sub angina. Atque hi colli spūentes ranci erant. Quibus autem in rectum

amor tendebat, etiam spuebant. Qui autem erant cum febre, hi multo maiori cum difficultate spirabant, & fundebant salivam, & vena his magis attollebantur. Pedes quidem omnibus frigidissimi erant, maximē autem his, qui ad erectē standum impotentiores erant, & hi omnes si non statim, saltem quos ego novi, mortui sunt.

Hactenus singulares historias narrauit, nunc commune quendam morbum describit, qui quadam tempestate multos inuasit, Explicata est hæc narratio Gal. 4. lib. de locis partibus cap. 5. & mihi in scholiis. Quare, minus nunc opus est sermonem multum producere. Multi periculum suffocationis incurrerunt ob luxationem vertebrae cervicis, quibusdam laxatis in rectum, id est, in nullum laterum, sed intro, quibusdam in latera: rursum quibusdam cum febre, quibusdam sine febre. Fiebat verò ob hæc non exigua differentia passio- num & accidentium. Atque omnia hæc quibusdam accidebant acutiora, quibusdam tardiora, ob causas speciem: quibusdam iustiora. Atque ita erat magna differentia magnitudinis symptomatum propriorum, & superacutientium: quorum mala fere sunt, strangulatio, etsi de gluti- re non tentarent, respiratio sublimis, tumor venarum in cervicē, fronte, & temporibus, & sub lingua, & calor in temporibus, & effusio multa salivæ, refrigeratio extemorum: bona verò, contraria. Vocat Hip. hoc malum, passionem anginosam, seu anginā, ob symptoma, quia præfocabat. Omnem enim strangulationem per passionem aliquam cervicis accedentem, vocabat anginam Hip. non tantum eam quæ inflammatione eo loco abortiva fieret, ut postea: ac multo minus distinguebat cynanchas & pharyngitides. Non enim profecto inflammatio his vertebra luxabat, sed tubercula cruda in ligamentis ossium facta, ut & gibberum patientibus ex morbis, aut lentè contractum fieri solet. Nam & in illis solet fieri intro spinæ curvitas cum repanditate, aut extra cum gibbero, aut in alterum laterum, cum obliquitate. Fuisse autem tubercula, constat, quia non videntur quæ alia causa potuerit vertebra suis locis evellere: deinde, & quia solvebantur concoctione, & ex creatione concoctorum, quod quidem, si sine his essent laxata vertebra, fieri non poterat. Quæ enim esset materia concoctioni apta. Erant (inquit) anginosorum passiones huiusmodi. Cervicis vertebra intro vergebant, quibusdam plus, quibusdam minus, collum etiam forinsecus conspicuam (quæ scilicet recesserat vertebra) cavitatem habebat, atque ea pars ad contactum dolebat. Erant enim diuulsi partes, ac proinde dolentes. Erat autem & quidam affectus infra os, quod dens vocatur, id est infra secundam vertebra. Nam hæc ob figuram vocatur dens. Itaque dicit in quibusdam fuisse luxationem in tertia vertebra, immens scilicet multis aliis fuisse in secunda. Addit quod non similiter acutum est, intelligendum verò non os [nam secunda vertebra acutius os est, aliis omnibus] sed malum, non enim tam grane est luxatio tertiæ, quam secundæ: quia secunda, & prima præstant motum proprium capiti, tertia solus buccis. Accedit quod secundæ luxatio obturare magis potest spiritus riam. Itaque malum minus a.

catum est luxari tertium, quam secundam vertebra. Quamquam quibusdam simul cum tertia luxabatur secunda, & illis erat malum satis conspicuum, maiori circumferentia externa excavationis. Hoc est quod dicit, quibusdam autem valde conspicuus erat maiori circumferentia, quibus scilicet luxata tertia simul cum vocato dente, quibus fauces, id est partes oris inter laryngem & gulam, non inflammabantur (non enim inflammatione tenebantur) sed subsidebant, afflicta & compressa. Metaphorice enim subsidere dicuntur quæ male habent. Pars dictionis huius quæ hæcenus enarrata est, occurrit mille modis scripta, & in Hippocratis græcis codicibus, & in eo quem secutus Galenus est, & mille etiam modis donata latinitate, interpretibus in multos ac varios sensus euntibus. Tamen quia eam lectionum differentiam loco citato, ex opere de locis male affectis exposui, nunc satis sit simpliciter dixisse, quod est maxime consentaneum. Addamus reliqua. Partes sub maxilla, id est, interna oris partes, tumeant, non inflammatis similes, sed ut pulsæ loco à luxatis ossibus, neque glandule, externæ scilicet & quæ in ceruice [nam paratyphemia cum paribus sub buccis intelliguntur] alioqui tumuerant, id est, nullus tumor videbatur in collo aut ceruice, sed glandulæ illæ habuerunt secundum naturam. Et linguam non facile conuertebant, sed maior ipsa esse videbatur, & prominentior, & venæ sub lingua conspicuæ. Sorbere non poterant, aut valde difficulter, sed in nares effugiebant, si valde conarentur, & per nares loquebantur. Hæc omnia strangulationis symptomata sunt. Ita enim fieri solent, omnibus, quibus ceruix comprimitur, & spiritus via quacunque causa obtentat. Spiritus his non valde sublimis. Dicitur sublimis spiritus, non ut quidam falso putant, qui trahitur recta ceruice, sed per quem sublimia respirationis instrumenta mouentur, musculi scilicet venientes à ceruice simul cum clauiculis. Hic in summa necessitate sit, & viarum obstructione, aut animalis facultatis debilitate. Quibusdam autem venæ in temporibus, & ceruice, & capite intumescant, ob multitudinem sanguinis, qui accurrens ad caput hæc, & tubercula simul in ligamentis ossium, fecit, aut post factam luxationem, per præfocationis angustiam conuocatus est. De horum symptomatum malitia maiori aut minori, ita scriptum est. 6. Epid. 7. parte: Qui solum de gluitu non poterant, his valde mites & tolerati faciles erant: qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus vero etiam venæ circa tempora & ceruicem attollebantur: his aliquantum male erant. Pessimus vero iis quibus spiritus sublimis coelebatur. Hæc Hippocrates, ex quibus facile intelliges, eorum quæ accidisse hac tempestate anginosi narrat, quæ augeant, & quæ minuant periculum. Addit quibusdam autem horum quibus affectus redeadebant, paululum calida erant tempora, etiam alioqui non febricitarent. Illud *καὶ τὸ πρὸς τὸν ὄφθαλμον* ut in scholiis quatuor de locis patientibus monuimus, per metaphoram dicitur de ipsis malis. Id est, malis cum videntur facta nouora redeuntibus, & factis malignioribus, non suffocabantur (inquit) plurimum, nisi de gluitu euperent, aut saluam, aut aliquid (hoc lenis suffocationis esse dictum est antea) neque oculi intus desidebant, sed aut mane-

bant secundum naturam, aut non nihil erumpebant. Atqui secundum naturam manere esse optimum quia neque suffocationem, neque contractionem partium, quæ in extrema debilitate fieri solet, significaret, tamen lenius esset in hoc affectu tumere exteros, quod familiaris est suffocationi, quam contractos esse, quod est à suffocatione alienissimum. Hæcenus narrauit quæ in commune acciderunt anginosi non omnino grauiter affectis: sed sine febre, sine in rectum sine in alterum latus luxatæ vertebrae inclinarent. Deinde narrare incipit, quorum quæ iis, quibus in rectum, id est, in anteriorem partem, non in latus aliquod, luxatio est facta, & quæ quibus in latus: sed utique quidem sine febre: postremo, in calore dictionis, narrabit quæ febri citantibus eueuerunt, qui ferè omnes mortui sunt, cum eorum qui sine febre laborarunt vix vllus sit mortuus. Sed redeamus ad Hippocratem. Quibus tumor, inquit, in rectum, procedebat, non in alteram partem vergens, ne quidè paraplexici facti sūt. (id est nulla parte resoluebantur) omnes tamen quorum Hippocrates meminerat, liberati sunt. Merito quidem, nam lethalia signa, quorum in hoc morbo magna vis est, non admodum his accidebant. Neque tamen omnes liberabantur citò: sed quidam celerim: quidam autem non ante quadraginta dies, qui finis est morborum neque acutorum simpliciter, neque iam longorum. Hoc autem plurimis accidit etiam sine febre (certè hæcenus de his qui sine febre ita affecti erant loquitur, de febris tantibus posita loquitur) multis autem etiam chronicis post hæc morbus, & in longum tempus: in annum fortasse integrum productus est, & habuerunt partem aliquam tumoris (tumoris illius quem impulsæ vertebra faciebat) in ore (nam nullus alius tumor apparebat) & de gluitu difficilis, & vox gracilis, ut per angustam fistulam, significabant perseverantiam affectionis. Et columelle liquatæ, hoc est, extenuatæ, & factæ graciles, quales in extremo mali fieri solent, iis qui fluxione partium oris laborant, siccate, quantum suspicor, calore aëris per angustum expirari, significationem quandam præbebant mali nondum soluti, etsi nihil mali habere viderentur, id est, etsi neque inflammationem, neque vlcus, neque aliud quippiam tale habere viderentur. Quibus autem in alterutram partem inclinabat malum, in ea parte unde vertebrae inclinabant, resoluebantur, & versus alteram trahebantur. Erant autem hæc in facie apparentia maxime à ore, & inter septo secundum gargareon: id est, & gargareo: quin etiam inferiores buccæ, id est, quæ inferiorem mandibulam vestiant, pro ratione mutabantur, id est, ab ea parte in quam inclinabat vertebra contorquebantur in contrariam. Paraplexici autem, id est, lateris resolutiones, non per totum corpus fiebant, ut ex aliis passionibus. Solent, ex affectionibus scilicet cerebri, ut paraplexici quæ ex apoplexiis solent superesse, atque etiam nonnunquam, ut ego existimo ex epilepsis, sed vique ad manum, ex ea parte quæ erat sub angina, id est, à parte quæ erat sub luxatio eo latere in quod inclinabat luxata vertebra. Sed hæc omnia quæ de resolutione dicit, non sine causa eueuerunt, vique hæc acciderint, illis non, & his partibus non illis, & hoc modo, facile intelligit, qui quæ diximus 4. de locis affectis oblitus non sit. Nimirum caruitas spinæ fieri potest angulata, ut cæ-

vertebra proxima à proxima decedit, ita vt angulus ex ambabus fiat, acuta, vt cum mulx incuruatur singulis à vicinis paulatim recedentibus. Vtrumque horum fieri potest, autorsum, aut extorsum, aut ad latera: potest horum quodcumque, in teruice, aut dorso, aut lumbis. Præterea, partes controuersi possunt resolutione, aut conuulsione. Per resolutionem laxitas parialis afficit, ac proinde ea trahitur in contrariam, per conuulsionem, pars affecta contrahitur & præterea trahit contrariam. Porro ob læsionem spinæ illæ partes eorumque resolutione aut conuelluntur, quæ ex ea parte quæ spinæ læditur, accipiunt nervos: Luxatio spinæ angulosa, si magna sit, & magnum angulum facit, in quamcumque partem fiat, comprimit, aut mediam sicut spinæ medullam, quare omnes infra posite corporis partes sensum amittunt & motum, non tantum ex partes quæ regione læsionis sunt, & quæ nervos ab ea spinæ parte, quæ læsio contingit, accipiunt: Non enim solum læsio contingit secundum ipsas nervorum radices, sed secundum medullam. Si autem læsio atquata sit, feruat in incolitis medulla, quia ipsa quodque incuruat sensum nulli compressa. Potest tamen lædere nervorum radices, ad latus aliud quod facta, quia cum nervi oriuntur à lateribus spinæ, ex foraminibus, quæ commissura superiorum cum inferioribus vertebis consistit, vertebis à vertebis recedentibus, distrahantur nervorum inde orientium fibrae in ipsa radice: itaque etiam quam maxime acuta læsio sit nervi in eam partem, in quam spinæ inclinat, laxitatem facit, laxitas verò nervorum afficit partibus resolutionem: non contrariam verò parte, à qua spinæ refugit, facit contractionem, & contradio conuulsionem. Tamen hæc nula non in toto corpore quod infra læsionem est, sentiuntur: sed solum in partibus quæ inde nervos accipiunt. Atque hoc evenit magis & apertius in partibus superioribus spinæ, quam in inferioribus, quia in superioribus pertinet foramen æquale ambis vertebis, superiori, & inferiori, quantum autem pars spinæ est inferior, tantò foramen magis pertinet ad superiorem. Quamvis autem magis æquales partes tribuant ambis foraminibus, tanto quod inde prædicti magis distrahere possunt distractæ: Maxime autem conspicua est flexura partium, quæ quibusdam resolutione, & contraria conuulsis sit, in facie. Quippe in qua, cum non sunt gemini artus, vt brachia, aut crura, necesse est à conuulsis laxatas trahi, & laxitas in non laxatis abire, velut levis æquorum ab alio parte laxatis aut contradiis, capita æquorum torquentur. Merito ergo luxatio in rectum nullam resolutionem facit. Ea verò quæ in obliquum, fecit partes, ab ea parte in quam fiebat spinæ flexura, contrahitur in contrariam. Apparet verò in facie solum, & vsque ad manus, quia illæ partes sunt quæ solas attingunt nervi ex ceruice. Sed cum non etiam sentiebatur resolutio sepius transgressi, quod quidem ex ceruice accipit nervos, etiam antequam manus. Certe nervi qui ex quarta & quinta vertebis veniunt, antequam attingant septimum committuntur cum nervis ex sexta coniugatione cerebri. Non potuerunt ergo læsionem spinæ toti lædi. Atqui fortasse difficultas respiratoria, quæ angustia laryngis imputabatur, ob læsionem nervorum alterius partis accidebat. Sed redeamus ad narrationem. Virosque & eos quibus in rectis & in obliquum luxatio erat,

A spuisse cocta, & fuisse rancos dicit. Non immenso, rancitatem enim facit in larynge imbibitis humor, nisi autem co-cocta & dissipata essent tubercula, non esset illi liberati. Sunt autem liberati ferè omnes quos hæc lentis narravit. Velut quos in fine dictionis narrat, mortui sunt omnes qui scilicet cum febre magna & perpetua id mali passi sunt. Nam & in aphorismo dicitur, ei qui à febre tenetur, si colla repete peruerit, & vix potest deinde nullo tumore apparere in faucibus, lethale. Neque mirum. Nam febris magna, & repente facta verteborum luxatio significat in his inflammationes facere idem, quod in prioribus tubercula erudiora: quod verò nullus tumor appareret, significat interius prope ipsissimam spiritus viam esse. Quo pacto autem non intereat omne simul aucto plenum vsu ob febrem, & contracta via ob inflammationem? Maxime autem si non solum interia inflammatio sit, sed etiam maxima, quod quæ præparebat in ægrotis symptomata, indicabant. Nimirum hi cum febre multo maiori cum difficultate spirabant, & fundebant salivam interluquendum, & venæ his magis intollebantur, & pedes frigidissimi. Hofius autem maxime hi erigebant non poterant, quia cum conabantur erigere cervicem, dolebant ob inflammationem. Multum moriebantur, quidam non statim, quos autem (inquirit) ego novi, omnes mortui sunt.



SECTIO III.



N Perinthum circa solstitium æstivum venimus, ubi fuerat hiems temperata & austriana. Ver autem & æstas valde sicca & frigida ad occasum vergiliarum. Si quid enim pluvie decidisset, id erat rori simile. Nec Etia multa flauerunt, & qui flauerunt, sparsim id fecerunt.

Totus hic annus fuit calidus & siccus. Calidus quidem quia frigus hyemis cohibuit auster, & calorem æstatis parum emendauerunt Etæsi. Siccus autem, quia toto illo anno ab initio hyemis vsque ad initium alterius hyemis, quam æstas vergiliarum incipit, per paucos & frigidos pluvies fuerunt. Nam hyems tota fuit clementi celo, serena & sine pluvie, reliquum valde fuit æquis & equis quid pluvie decidebat erat non largus imbres, sed velut cadens ros. Solus auster potuit emendare siccitatem hyemis. Sed humiditas austriana sine pluvie, minor est quam pro naturali hyemis humiditate. Quare etiam anni pars sicca fuit.

Ab initio æstatis usque ad occasum vergiliarum fuit siccitas.

G In æstate febres ardentes populariter grassantur, sedentes turbantur veniunt, æquos non biliosos, cum multa spuma. Et ab initio autem aliquando hypostasi reposta, a quibus sunt quod subitis reponeretur simile erat.

Excretiones alui semper specie similes, male. In his multis comatosi erant, & delirantes, hi autem ex somnis tales evadebant. Cum enim expergiscerentur, intelligebant omnia. Spiritus sublimis, non quidem valde. Urina tenuis plurimus, & modica, aliqui non decolores.

Considera hic narrationem intempestivæ aeris temperiei capisse ab initio hyemis quæ antecessit, narrationem verò morborum ab initio sequentis æstatis, hoc est, ab ortu vespertiarum qui circa finem aprilis contingit, inchoare. Non enim sunt morbi populares quales illa dies petit: sed quales ea corporis dispositio quam intempestiva tempestas reliquit. Itaque necessitas aeris mutationes incipiunt multo antea, quam morborum ea species quæ speciem tempestatis referat, incipiat esse communis. Fuit ergo hic morbus qui ab initio æstatis grassari cepit, qualem temperies hyemis & vetus data fuerat facere. Fuerat autem hyems calida austrius, talis verò solet multum pituita fallam generare. Hyems enim pituita semper facit magis quam aliam speciem, calida autem calida, qualem falsa est. Fuerunt ergo febres ac dentes ex falsa pituita. Nam præterquam quod quæ dicta sunt de febre ardente id indicant, symptomata etiam quæ adferunt, multo magis id declarant, fuerunt enim sine vomitu. At verò Hippo. 1. de morbis, describens febrem ardentem ex bile dicit, plerumque vtriusque primis diebus vomitur, aut quatuor aut quinque. Nimirum bilis efferri in superiora nata est, ac proinde vomit, pituita verò falsa quæ per venas putruit, magis cepit deorsum in intestina. Ventres turbabantur tenuibus aquosis non biliosis, & spumosis. At verò lib. de ratione victus in acutis dicit in febre ardente ex bile, fieri liquidas & pallidas, biliosas scilicet ex tenui bile: hi autem facit sunt tenues & aquosæ, quia ob pluviam defectum vix totius corporis aquam multam ex ventre traxerant, ut arbores quibus desuper ros aut pluvia non decidit, largiori irrigatione indigent à radicibus. Distributa verò aqua & admixta cum putrescente pituita, falsa est, quæ iam tunc redundans ad ventrem inclinavit. Spumosa verò fecerat auster. Id enim ventris quia crassus & laxus, flatus replet corpora, qui cum aquæ substantia mistus spumam prout. Quod autem pro vomitu deiectiones acciderunt febres ardentis à falsa pituita admodum est. Nihil eo citro ex lib. de ratione victus in acutis prima notata talis febris ardentis scribens dixit. Alius scribit, itaque deiectiones factæ sunt liquide, non totæ pertotas aquæ, sed partim ex aqua falsa partim ex pituita. Prout deponitur, cum aliquando repondebantur & repositæ sensabantur, hypostasin habebant: residet enim crassum subterit. Ex quibus quod sub dio reponebatur simile erat. Illud subditi quod nihil nobis nunc significat, neque enim alterationem aliquam quam aer in deiectionibus faceret, sed naturam rem hanc ut ægi solet. Solent enim alui excrementa noctu quotidie extra domum deportari, & in sterquilinis prout, illa illo in loco dicuntur simplicem speciem multum tempus retinuisse. Vbi in primis agnoscitur oportet Hippo. hominis quidem hoc tempore nubilissimum, & phalopphi fursum deligentem in curandis ægris, quod non tantam potens falsas deiectiones domi contemplantur in

Apelui, sed sepe etiam besternas in sterquilinis requiebat, nihil censens indecens, neque indignum, quod ex officio pro tuenda hominis vita agatur. Sed quid significabat illa eiusdem formæ in deiectionibus perseverantia? malum certe. Nam excretiones, (inquit) similes specie semper, idest multum tempus, perseverantes similes, male. Causam Hippo. non dicit, ea verò est hæc. Quocumque morbi tempore excrementa sine mutatione insigui diu durent, significatur morbi longitudo. Nā distinctio temporum morbi significatur præcipue mutationibus excrementorum in concordione aut contrario, si autem idem tempus, quodcumque illud sit, produciunt, totum morbum produci constat, quæ a tota constitutio morbi constat temporibus universilibus, & eorum proportio quedam est. Si verò post multas mutationes in unam speciem incident excrementa, & eam diu retinent, iam id corruptionis & mortis signum est. Quod Hippo. ipse docuerat proxima sectione dicens, delincentia in meratoria putrefactionem significant. Id itaque mali in his morbis fuit quod: excrementa parum mutabantur. Illud etiam erat malum in multis, quod comatosi erant ob vapores pituitæ putrescentis qui in caput vi febres efferebantur, hoc verò morbi & causæ speciem non nihil referebat, illud verò erat gravior delirare ex somno. Nam in aphorismi scriptum est, ubi somnus laborem facit mortale, si iuvare non mortale: ac rursum ubi somnus delirium sedat bonum. Ergo per insinuationem dicitur si somnus delirium facit mortale. In his verò constabat ex somno esse delirium, cum enim expergiscerentur, intelligebant omnia, idest, cum aliquantulum experterat sine somno continerentur. Non enim delirantes dormientes sed recens excitati, rediebant verò ad mentem paulo post. Etiam etiam his spiritus sublimis, id est qui supersano tharacetabatur, quia ardente febre tenebatur, non tamen admodum, neque sane immerito, nam admodum sublimis spiritus valde lethale est: ex his vero febribus nulli narratur mortui. Vixit his erant tenues & non decolores, sed rursus fortasse quod in prognostico dicitur crudam affectionem insignificanti, minus veto quam si spiritum essent sibi, & tenues: ut hoc exemplo consistat posse esse vnamque boni coloris sine bona substantia. Modice etiam fuerunt hie vixit, quia erant alui turbata tenuibus & aquosis. Vt ergo copiosa mictio exiguam deiectionem facit, ita copiosa deiectio, sparse aquosa, facit exiguam mictionem.

Singulis fluxiones i naribus non vispanis contingebant neque parotides et inipebant, de quibus postea scribam: neque splenes astolebantur, neque de xiri hypochondrii aut dolores hecimens, aut fortis contentio erat. Esti aliquid significare videretur. Maxime verò indicabantur omnia plerumque circa decimam quartam, paucæ cum sudore, paucæ cum rigore, & admodum paucis recidiva accidebant. Per pluvias autem quæ raris instar astolebant contingebant, apparuit sudor. In febribus

tantibus etiam quidam sudores statim à principio accidebant, non tamen maligno modo: & quibusdam sub hoc tempore indicatione cum sudore fiebant. Superueniebant autem in æstibus febribus circa septimam, octavam, & nonam asperitates in cute miliaceæ, culicum morbos maxime similes, non admodum pruriginosa, hæc persistebant usque ad indicationem. Nulli autem videri ovis hæc erupisse. Mulier autem nulla mortua est, cui hæc accidissent. Auditu erant gravi & comatosa. Prius autem non valde erant comatosa quibus futura erant.

Narrat Hipp. indicationes, quæ non accidebant & quæ accidebant ægrotis illa tempestare, indicationes verò quæ cum excretionibus, & quæ sine excretionibus per solos abscessus, & quæ tempestine & quæ intempestine. Sed quorsum quæ non accidebant, aut cur non persequitur omnia quæ non acciderint? Non enim dicit, non fuisse copiosam excretionem, neque fluxisse pus ex aure. Certe vanum esset narrare quæ non acciderint, nisi quid accidere soleant talibus morbis, aut verisimile esset tunc temporis asputura, æque ipsa non superuenire. Significationem aliquam præstaret notari dignam. Sanguinis fluxiones ex naribus in ardentibus febribus frequentes sunt, elatis fursum succis per fetiores: atque isti quibus ob aliquam causam non potest satis erumpere fieri solent parotides. In his verò neutrum horum fiebat, fortasse quia succi pituitosi cum effluere non efferebantur sed deorsum rehebant. Sed cur narrat plenes non ærollos, neque dextræ hypochondrii aut dolorem fuisse vehementem aut fortem contentionem? An quia vir dictum Hippoc. est in prognostico debent in febribus acutis considerari semper hypochondria, vir quæ magnæ significationem præstare possunt boni aut mali. Quandoquid ergo Hippo. narrat statum quò hypochondria se habuerint, constat illum perquirere habuisse curam, habendamque provide nobis in omnibus acutis morbis. Nam ut dicitur in prognostico, Hypochondrium optimum, quod sine dolore est, & molle & æquale dextris & sinistris partibus: inflammatum autè & dolens, vel distensum, vel inæqualiter affectum dextris partibus ad sinistras, hæc omnia observare oportet. Nam tumor in hypochondriis dextris & dolens pessimus quidem si in toto est hypochondrio: si verò sit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Hoc ergo bonum erat in his ægrotis non ærollos, neque distenta fuisse hypochondria multum, significationem tamen (inquit) quandam præstabant. Id est aliquo modo nihilominus erant affecta. Et plerique indubitanter tales decimam quartam, quia erant curati morbi. Cetera verò ut in aphorismo dicitur, quatuordecim diebus indicantur: pauci cum sudore, pauci etiam cum rigore, quæcumque hæc duæ indicationes in species familiæ sunt febribus ardentibus. Nam ita dicitur in aphorismo, In febre ardente rigore superueniente, solutio, & in prognostico, Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus decretoriis sunt & febrem perficere submovent. His verò ægrotis non contigerunt hæc indicationes, nisi pauci, minimum rigores affuerunt, quia morbi pituitosi

magis quam biliosi erant, sudores verò, quia tempestas sicca. Nam per pluvias quæ rosis instat æstas te contingebant, apparuit sudor, ut etiam in initio sectionis primæ huius libri, narrans tempestatem quæ in Cranone dicitur, in his si minor æstas gurgit decidit, magis sudorosis sunt ab initio. Ita hiæ quoque dicitur apparuisse sudorem in febricitantibus per pluvias rosis instat contingentes, id est cum pluebat velut narratur, etiam quid sudores statim ab initio fiebant ante tempus indicationis, quia non fiebant ob internam causam, natura iam tante materie expulsionem, sed ob externam quæ corpora humectabat: tamen, etsi ab initio illi sudores fierent, non maligno modo fiebant, id est non manebant difficiliora indicatio quam aliter, ut in historia Cranonis dicebat, sed fiebant non maligno modo, quia etsi essent signa mala ut ceteræ omnes symptomatice evacuationes, non tamen lædebant, sed iuvabant fortasse partem aliquam materie evacuantem. Neque quidem omnes sudores erant ab initio: sed quibusdam sub hoc tempore indicationis cum sudore fiebant, quibus scilicet accidebat concordis iam esse succos cum incipiebat plueret. Una quædam insignis abscessus species superuenit horum plurimis æstibus febribus circa septimam, octavam, & nonam asperitates scilicet in cute miliæ granis similes, culicum morbis maxime similes: non admodum pruriginosæ. Hæc, ut ex hæc descriptione & accidentibus quæ mox dicitur constat, cranilla quæ Hispanis novato nomine vocantur tabardillo. Sunt enim maculæ quædam per cutem erumpentes in febribus ardentibus symptomatice, ob fetorem & malignam corruptionem succorum. Supercionibus anniis fuit malum hoc in Hispania frequens. Malum alioqui rarissimum usque adeo ut tunc temporis primum videretur morbus cum nomine natus. Tunc observavimus illis qui eo malo affliguntur fieri hæc quæ narrat Hippocrates symptomata. Nimirum antequam erumpant maculæ, anguntur plangunt & vigilant ægroti, succo qui interioribus seceant, & cuius natura parat ex pulsionem, lædente viscera: postquam eruperint & dum erumpunt delectant & comatosi sunt. Nimirum hoc malum non fit ex sanguine tenui admodum, ille enim non colibetur cute, quia statim dissipatur, sed ex crasso viscido maligne putrescente, aut tenui cum crasso admisto, ex quo accidit ut non fuerint admodum pruriginosæ. Cum tenui ergo effertur crassior sanguis in caput, faciuntque vapores potredine mala affectu delirium, crassi coma. Hæc maculæ colore plurimum differunt, indicatque colorum differentia tantam malignitatis morbi differentiam, ut ex nigris aut lividis, vix vilius evadat, ex rubris pauci admodum intereant. Tales fuerunt in ægrotis huius tempestatis, quandoquidem tam pauci ex his mortui sunt, ut nullum Hippocrates videret. Atqui profecto merito illius anni morbi, etsi magni ac vehementes, fuerunt tamen tam boni iudici, ut omnes ferè liberarentur, & per paucos accideret reodine. Quia etsi fuit annus male temperatus, qui quidem morbos multos & magnos gignere poterat, inclinavit tamen ad siccius, ex quo secutores erant & melioris iudicii. Quia ut dicitur in aphorismo, Ex anni constitutionibus, in summa siccitate pluviosis salubrioribus sunt, & minus letalibus. Quod multum solis dicitur exanthemata per febres ardentes

hac tempestate eruperit, duplicem causam esse putato, & quod ob deteriorem temperiem malignis eis succi potterescerent, & quod ob densiorem cutem, & debiliorem calorem, minus exhalatione insensibili discuterentur.

Non tamen in totum perseverabant, sed comatosa & somnolenta erant astate & usque ad pleiadum occasum. Deinde autem vigiliis magis laborabant, sed neque omnino sub hac constitutione moriebantur. Ventrem igitur scire non licebat per ea quae gustantur, sed praeter rationem putares aliquis medicationem conferre. Etiam si per multa quibusdam prodirent, quod quis in frigore iaceret prostratus, sicut exulcerat quidem frigus. Calefaciendum est autem quod tale appareat sensum progrediendo potius, ut nulla natura passio accedat. In quibus, videndum qualia signa, & plura aut pauciora adveniant, obstatio, tussis, sternutatio, pandiculatio, eructatio, status, omnia eiusmodi corrumpunt.

Hoc loco & in graecis codicibus occurrit tanta lectionum varietas, & in latinis versionibus, ut difficultillimum proinde fuerit intelligere quid Hippocrates velit, & quod ego sciam, intelligi nullus. Tamen labor hic suscepit mihi esse, & collatis codicibus, inuenta lectio haec emendatissima, & apertissima. Febres illae ardentes & comatoae, de quibus hucusque locutus est, non duratur nisi usque ad occasum pleiadum, qui principio hyemis fit. Ab eo tempore laboraverunt dysenteria curatu difficili, facta ex refrigeratione. Cuius accidentia & causam & curationem hac breui oratione complectitur similesque communem omnis refrigerationis curationem & notas insinuat. Non (inquit) in totum, id est per totum annum perseverabant dictae febres, sed comatoae, & somnolentae erant astate & usque ad pleiadum occasum, deinde autem, id est hyeme vigiliis magis laborabant, quia dysenteriae non permittiebant satis dormire. Sed oequo omnino, id est, sed neque per totum hunc annum moriebantur. Quare neque sub hac constitutione moriebantur, ut neque sub superiori: etiam si erant dysenteriae magnae, usque adeo ut non posset venter sisti, neque iis quae gustabantur, sed praeter rationem putaret aliquis curationem conferre, id est, sed omnis curatio quae conferre solet, praeter rationem agi videretur. Hic aperte insinuat Hippocrates sistendo alium maximam spem collocandam esse in cibis & potibus idoneis & medicamentis ore acceptis. Atqui profecto ego ita puto, siue ad sublimia siue ad humilia inest. na malum pertinac. Quoniam detergenium eius clysterum usus in hac passione est utilissimus, astriogentium vero eius aut potus. Itaque difficile his si sistebatur. Atqui per multa quibusdam prodibit. Occasio autem aegrotandi erat, quod quis in frigore iaceret prostratus. Itaque maxima ex parte laborabant pauperes, ita ut sit, & qui carentes lectulis decumbant in frigida humo. Id vero accidebat, quod frigus exulceret. In talibus vero oportet calefacere non re-

perente & multum sed ex appositione potius, id est paulatim (ut nulla naturae passio fiat. Quia si dysentericos etiam praeter frigore laborare ceperint, plurimum calfacias, augerebatur exulcerationes & fluxiones. Oportet ergo id facere modice & paulatim, ut refrigeratio solvatur toto, & in omnibus refrigeratis etiam, si dysenteria non tentetur, eadem ratio curationis tenenda est, quia refrigerati ob cohibitionem calidi effluuii facile incidunt in febres magnas, & internas inflammationes. Ergo in omnibus frigidis passionibus calefaciendum est modice. His & talibus signis cognosci possunt, quae in illis esse solent, aut omnia aut quaedam plura aut pauciora, ut plus aut minus secundum plures, aut pauciores partes refrigerati sunt. Haec sunt obstatio, tussis, sternutatio, pandiculatio, eructatio, status. Omnia enim huiusmodi corrumpunt, id est significant refrigerationem. Nam etiam omnis immodica intemperies corruptio est, refrigeratio maxime cesset, quia vita calore servatur precipue.

Quibus in febribus anxiosis & horridis rabescit facies, lassitudines adfunt, dolores oculorum, capitis granitates, paralexia, & haec maxime accidunt quibus menses primo apparent, sed & virginibus & mulieribus, quibus ex longo tempore, sed & quibus non quo consuetum est tempore, aut non ut oportet, apparent, deinde admodum pallide fiunt.

Hic narrat Hipp. quae mulieribus acciere solent quod menstrua non fluant, aut quod ex multo tempore, id est rarius quam oportet, aut quod non quo consuetum est tempore, sed oene crebrius nunc tardius, aut non ut oportet, sed difficile & parum. Quibusdam enim consuetum tempore semper fluit, sed semper minus quam pro corporis indigentia. Ob haec omnia merito accidunt multa & gravissima mala, quia ea expurgatio menstrua maxime necessaria est corporibus mulieribus: viresque excrementosa admodum sunt. Ergo ea prius reducta aut multis & malignis excrementis, qualia sunt quae illa evacuatione expelluntur, inciduntque in morbos quibus ob gravitatem & symptomatum horribilium multitudinem Hippoc. librum proprium dicitur, qui est de morbis mulieribus. Atqui, quia haec eadem graviora male accidunt virginibus: quippe quibus, quia veocem non videntur, sanguinis minus fluit, & semen etiam (quod est multo gravius) detentum putrescit, seorsum scriptis de morbis virginum. Hicque eandem ob causam dicit, maxime haec accidunt quibus primo, id est iis quae adolescentiam ingreditur. Sed & virginibus, id est omnibus veocem non expertis, etiam saepe iam menses fluxerint. Et mulieribus inquit, id est, sed & iis quae venerit usque sunt, si non frequentes, & consuetum tempore, & ut oportet, apparent. Hic quidem non narrat omnia quae dicta occasione mulieribus fieri solent (oequo enim tam breui possent) sed praecipua quaedam. Verum & quae dicit & quae omittit facile intelligit qui legerit dictos libellos. Nam libello de morbis mulierum docet Hippoc. non tantum quas noxae afferre solet menstruorum

firmorum difficilis fluxio, sed & quo ordine, & quomodo primo mense defecerunt, & secundo, tertio, ac deinceps, usque dum sit malum incurabile. Inter cetera dicit corpi sępe mulieres febribus cum anxietate simulque explicat quid vocet anxietatem. Nam, inquit, anxia erit & alias atque alias se ipsam iactabit. Horrida etiam esse, ac labore plenas his febres dicit. Nam hæc sunt illius verba, suffocatio aliis atque aliis in ipsam irruet, & febri aliis atque aliis corripit, & horror, & lumborum dolor. Sed hæc etiam omnia graviora fieri in virginibus, simulque resolutiones quarundam partium accidere dicit, quæ quomodo alienius tantum corporis partis sunt, paraplaxia dicitur libello alio. Iam vero dolores oculorum ad rades, & earum gravitates fieri vterino morbo detentis, Hipp. dicit, sed & mulieribus omnibus est notissimum. Omnia autem hæc sunt, non tiam cum mulier prius est fluxione confecta, quæ eo tempore quo fluxio male, aut quo tentatur ex expulsio, sed non perficitur: cum scilicet, ut dicit Hippo. libello de morbis virginum, sanguis in vteros confusus velut effusus, proinde hic dicit quibus menses primò apparent, idest accidunt hæc cum muliebria apparent male, aut cum instant. Nam quod hæc eusatio cesset, tantum colligitur in corpore cacochymia, & quomodo sunt quædam excrementa melius transigunt mulieres, dum autem instant, aggraviatur vitiosus sanguis missus in vterum undique: cumque non inveniat exitum recurrit ad superiora, & male afficit cor, caput, & insurgunt omnia respiratio, nis, atque ante etiam quam recurrat effluat agitata, unde capitis gravitates, oculorum dolores, rubores faciei, anxietates, suffocationes, nonnunquam etiam insanias facit. Cum igitur (inquit Hippocrates) oculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, tunc sanguis non habens exitum propter multitudinem resistit ad cor, & ad septum transversum. Sed paraplaxia quo pacto facit quemadmodum (inquit Hippo.) cum aliquis per longum tempus desideret, sanguis ex coxis at femoribus depressus in tibias & pedes torporem inducit, à torpore autem pedes ad iter faciendum impotentes fiunt, tunc sanguis ad supernas partes trahitur. Itaque resolutiones in his fiunt, cõsertim replente partem sanguineatque ita repete, rediunt sanguine, solvantur, ut, genus causæ ignoratibus videtur multa talia miraculosa. Sed quæ dicta sunt, fluxione sanguine, aut dū tentat natura fluxionem, maxime fiunt, postea vero suppressa fluxione cacochymia fiunt mulieres, debilitanturque earum facultates naturales, & multas obstructions contrahunt, unde pallidæ fiunt.

Magni autem momenti est considerare in omnibus & quod sequitur, & in quo tempore, & quibus: præcipue in febribus valde biliosis, omnino quibus in crura purgatio decumbit Medicamentorum etiam modos scimus, ex quibus fiunt, qualia, & quæ. Non enim omnes eodem modo, sed alii aliter bene disponuntur, & alibi citius aut tardius accipienda manuum tractationibus, velut siccare, aut tundere aut coquere & alia huiusmodi. Mitto plurima, quænam

A unicuique conducunt, & in quibus morbis & quo morbi tempore, ætatem, speciem, victum, quale tempus anni, & quod, & qualiter procedat & huiusmodi.

Brevissimè ut solet hæc oratione complexus est multa ad curandi rationem spectantia, quæ medicus scire & facere debet, & quæ considerare ut præstantia indicationem faciendorum. Sunt verò hæc omnia quæ hoc loco simul collegit, sparsim scripta ab Hippocrate in multis aliis. Pars prima orationis æquè videtur posse duo significare: alterum, magnum esse, idest, magni momenti in omnibus morbis scire: quid deinceps ægroto superuenturum sit: & quo tempore, hoc est, an mox an aliquantè an multò post: & in quibus morbis quidque superuenturum sit: quia non sunt eadem omnibus morbis superuentis æquè bona aut mala, sed quibusdam meliora aut deteriora. Atqui præfere quod deinceps futurum sit differentiam habet ex iis quæ possunt supervenire. Aut enim superuenturum morbum morbo præsentitur, aut accidens aliquid morbo, idque bonam aut malam significationem præstiturum consistens in genere signorum salutis aut mortis, vel concoctionis & contrarii: aut constitutionem aut indicationem & iudicationis speciem cum quibus intelligi signa omnia decretoria] aut salutem aut mortem. Morbus morbo superveniente potest, aut citra necessitatem aut necessario. Atqui quod citra necessitatem, aut quod ita solet, aut casu quodam. Casu quodam supervenire potest, quodcumque cuiusque cum quo potest complicari, & huius agnoscendi non est ratio aliqua ex specie morbi prioris, sed ex signis quæ solent præcedere posteriorem. Quod solet, ut primo de morbis Hipp. dicit, ex pleuritide febris ardens (febris scilicet morbus, nam febris accidens necessario coniuncta est) ex phrenitide peripneumonia, dysenteria ex typho, ex dysenteria hienneria, ex hienneria hydrops, ex pituita etiam alba hydrops (nam leucophlegmaria non vocat hydropem Hippo.) ex peripneumonia & pleuritide, pectoris suppuratio. Necessario, ut (inquit) si rigor contripuerit, necesse est supervenire febrem: si vetus disiectus fuerit convulsionem facit: ex cerebri vulnere necesse est febrem supervenire, & alievis partibus corporis convulsionem: factio fluxus sanguinis in ventrem aliquem necesse est grumos potestescere. Accidentia mala scimus, ut si vulnus cerebri aringat, superent utrum vomitum biliosum si inflammatio intercepta in sepium transversum, futurum delirium: si dentes strident, futurum furorem; bona, ut si quis purgationem copiose fluere considerans, prædicta sit futuam perfectæ purgationis notam. Signa concoctionis, ut si quis videns turbatam urinam iam clarescere, prædicta futurum ut cito aliquid contineat, & videns semirubrum semialbum spiritum, futurum purulentum: Constitutionem, hoc est, futurum morbum breuem aut longum agnoscimus maxime ex signis concoctionis, quia si mox apparent morbum contrahant, Sin autem tardius, producant. Indicationem futuram esse ex magnitudine & acutæ morbi comitantibus, quia magna iudicantur, parva solvantur, ut Gal. dicit. Ad præfationem speciei indicationis

multæ Hippocratis sententiæ spectant. Velut illa in prognostico, inquirendum nam doleat caput, an hebetudines subeant oculorum, fluxus sanguinis de naribus instat. Hoc etiam spectat quod mox in hæc ipsa sectione dicet, laterum contentio dolorosa, & hypochondriorum contentiones, & splenis elenationes & naribus sanguinis eruptiones & directo significat. Sane futuræ significat omnia signa quæ ab Hippocrate siue in aphorismis, siue in prognostico siue propter bis, siue hoc ipso opere, siue alibi, bona dicuntur, præcipue verò quæ admodum salutaria mortem, omnia quæ mala, præcipue verò quæ lethalia, ac multo magis quæ valde lethalia. Talia sunt quæ possunt deinceps fieri quæque magni momenti est præsentire. Magni quidem momenti, & ad honorem medici, & ad curationem suscipiendam ut in proximo prognostici indicatum est. Hæc verò datur præsentire non tantum futura esse: sed quo tempore, velut si nebulæ quas to die subea apparet, iudicatio erit septima: & quibus septima die excretionis incipit excretionis patrum biliosa partim purulenta, eos montuos decima quarta expectare oportet. Porro à die quæ inuadunt rigor & febris & pro dolore pectus percipitur, suppuratio nis expectare oportet vigesima, trigesima, quadragesima, aut etiam sexagesima die. Porro considerare expedit non solū quid superueniaturum sit: sed etiam in quibus morbis: quia id quoque magnum momentum habet. Nam fluxus alui superueniens surditati, hydropi, aut splenicis est bonus: pleni tidi aut perineum omoi, malus. Convulsioni ex alui profusio febris superueniens, mala, convulsioni ex partu, bona. Omnium ergo horum præsentio magni momenti est: præcipue verò in febribus valde biliosis, id est, in morbis acutis, qui cum putridis febribus continuis affligunt (nam in his est maior usus artis prognosticæ, & hæc sunt quæ iudicationes habent: sed & in iis quæ pro iudicationibus habent abscessus (velut multæ ac crura, ut potest partem externam humilim & ignobilem) id est, in longis. Itaque hæc periphrasis, præcipue in febribus valde biliosis, omnino quibus in crura purgatio decumbit significat idem, ac si diceretur, præcipue in acutis de omnibus etiam in longis. Hoc ergo est quod prima totius huius orationis pars significare potest, pertinetque iuxta hæc enarrationem ad partem prognosticam per se: ex accidenti, etiam ad curationem, ut curationi morborum prænotio subseruit. Alterum est magni momenti scire quid post quid circa ægrotantem agi oporteat. Ad quem locum spectat illa consideratio, utrum sit potius post expurgationem mittere sanguinem, an expurgare post sanguinis missionem, & illa, an ab epoto pharmaco dormiendum an mouendum, & an à clystere mittendus sanguis an contra, atque alia innumera: latissimus enim hic locus est, multas considerationes continens, quia non satis est scire, quæ agenda: sed etiam quo ordine. Atque iuxta hanc enarrationem magis propriè usurpatur illud τὸ ἐξ ἑκ τῶν πρὶν quā iuxta priorē. Nā Aristotele enarratore, idem ceptis succedere aut esse dicuntur, nō quæcumque postea utique sunt: sed quæ proxima, ita ut nihil eiusdem generis intercedat. Itaque sic hæc consideratio, à quocumque auxilio medico quod aliud mox succedere debeat, ut rectè procedat, quæcumque curatio suscipi sit. Non est autem satis nosse quæ agenda (nam hanc considerationem prio-

rem intelligi volumus) & quo ordine: sed & quo tempore morbi, anni, aut diei. Morbi, ut an expurgandum ante diem quintum, an non ante concotionem, an vtiendum solis resoluentibus in summo vigore, an oō ante inclinationem: Anni, quia quibus venæ sectione aut expurgatione est opus, vere facere expedit, ut in Apho. dicitur: Diei, quia ut de morbis dicitur, quidam morbi sunt quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, alii quibus occasio est ut curentur semel in die, nec refert quo tempore id fiat. Sed & in quibus morbis, ut an in pleuritidis sit expurgandum, an solum mittendus sanguis, an in angina sit vtiendum repetentibus, an non. An in affectu ventriculi liceat vel solis laxantibus aliquando. Sed cum hæc omnia nosse in morbis omnibus magnum momentum habeat, præcipue verò in acutis, quippe in quibus si quid ob imperitiam erratum sit, minus ob breuitatem emendari poterit. Prima ergo pars hæc continet. Secunda pars continet, quæ spectant ad materiam. Pertinet verò ad medicum, quia ut Arist. dicit ad eundem artificem pertinet osium facere, & nosse ex quibus lignis facienda sit. Medicamentorum (inquit) modos scimus, id est scire debemus, vocat verò modos differentias seu species. At qui medicamentorum nomine licet hic intelligere, aut quæ magis propriè medicamenta vocamus, aut generatim omnia auxilia medica. Atque utroque modo verum est quod dicitur, & multi modi intelligi possunt. Nam scire debet medicus omnes modos auxiliorum secundum primas differentias & posteriores usque ad ultimas. Secundum primas dico, velut quæ vici aguntur: quæ pharmacis, quæ chirurgiæ: aut ut aliis placet diuidere, in ea quæ assumenda, quæ admoventia, quæ agenda. Secundum posteriores, ut rationem mittendi sanguinem, expurgandi, instituti diuictum, medicamentis alterandi, & aliud quidvis faciendi. Medicamentorum quoque modos nosse oportet & eos qui sunt secundum differentiam facultatum, & secundum modos præparationum ad usum. Priore modo, ut quæ calida, quæ frigida, quæ humida, quæ siccæ, quæ duo horum habent: sed & secundum facultates secundas ut quæ adstringentia, quæ laxantia quæ resoluentia, quæ mouentia pus, quæ diuretica, quæ expurgantia. Sed & fecerim tertias quæ velut proprietates quædam sunt, ut quæ capitalia, quæ hepatica, quæ lienalia. Secundo modo ut quæ ore accipiuntur forma liquida, potu: aut forma boli, aut trochiscorum aut tabellarum, esse accipi posse: aut catapotiorum aut puluerum, deglotione. Quæ admoventur, effundi, ut embrochas, aut inungi ut olea, linimenta: aut ad moueri, ut cataplasmata: aut affigi ut emplistra aut ceratas linteolas. Modos hos omnes medicamentum & medicamentum nosse oportet, non enim omnes eodem modo, sed alii aliter bene disponuntur, & curantur. Et alibi citius aut tardius, id est, & alij indigent curatione celeriori, alij tardiori. Ut scilicet morbus ipse acutus est, aut tardior. Nimirum, ut dicitur, 1. de morbis, repentina auxiliorum occasiones sunt in acutissimis morbis, in aliis minus repentina. Sed hoc quod de celeriori aut tardiori curatione dicimus, ad considerationes curationis spectare videtur, quod mox addit pertinet ad materiam Assumenda (inquit) minum

tractationibus velot siccare, aut tondere, aut coque-
re, & alia huiusmodi. His verbis insinuat artem se-
ptuagies etiam esse ad curationes obeundas ne-
cessariam, ac proinde medicinam partem. Quia medi-
camenta omnia indigent preparatione a aliqua manu
facta, aut mistorum aut simplicium. Mistorum qui-
dem preparatio est artificiosa, & quæ vnicuique
congruit, misto: simplicium, vt quædam siccare o-
porteret, & in pulueres redigere in soluta aut ad ignem:
quædam tondere, idque tenuiter aut crassiusculè:
quædam elixare in aqua, quædam altiter parare. Sed
cum omnia medicamenta præparationem quandam
desiderent, ea maxime quæ intra corpus assumenda
sunt, quia plerumque qualitates aliquas noxias præ-
paratione depouunt, & in affluendis maioris pecu-
niam ab inclementis impender, quàm in iis quæ ad-
mouentur. In fine orationis per præoccupationem
dicit omnia à quibus curatio: indicationes accipi
possunt. Ea verò sunt omnia quæ naturalia, & præ-
ter naturam & non naturalia sunt. Naturalia qui-
dem, vt temperies naturalis, & ætas, & peculiaris
cuiusque natura, seu proprietates & consuetudo. Pe-
culiarem naturam intelligit dicens, quæ vnicuique
conducunt, secundum conditionem, scilicet singula-
rem: temperiem quæ secundum appellationem
communem dicitur, intelligit dicens speciem. Con-
suetudinem intelligit, dicens vitium. Considerare
scilicet oportet vitium quæ antecessit. Præter natu-
ram sunt morbus, & quæcunque morbi pars, causæ
& symptomata. Non naturalia sunt, tempus anni, &
quæ huiusmodi: vt regio. In anni tempore con-
siderandum, quod sit, vt aut ver, æstas, aut autumnus, an
hyems, magis autem quale. Non enim semper ver
est sui simile, neque omnis illius dies sit. Sed & quo
facto procedat. Nam mutationes ætatis quæ dum mor-
bus durat, succedunt, magnas enam mutationes mor-
bi constitutioni afferunt. Quare non solum quale
tempus sit semel considerandum: sed quo die etiam
quod sit ille dies. Nimirum ex his omnibus nasci-
tur ratio curationis, quæ tenenda est, rebus natu-
ralibus potentibus similia, rebus propter naturam po-
tentibus contraria, non naturalibus nunc similia,
tunc contraria, vt eueniri iure naturam aut mor-
bum.

A secundum scapulam præcipue leuatus est dolor.
Sed & prius sputa multa quæ secundum prin-
cipia spuebantur florida, & circa septimam aut
octauam. Deinde concocta. Venter restitit vs-
que ad nonam & decimam. Dolor euasit. Tu-
mor remittebat, & sudores exigui fiebant, non
tamen indicabant. Manifesta hæc erant & ali-
is, & secessit. Cum enim inciperet dolor auris;
etiam venter turbatus est. Effluxit autem pus
ex aure nona die, & indicatus est decima qua-
ta sine rigore nona, his eadem die. Caterum sputum
copiosius procedebat, & magis concoctum,
postquam pus ex aure effluxit. Sudores verò &
herpetes in capite in multum tempus fiebant
Arescentes tertio quoque die.

Difficilem faciunt hanc narrationem repetitiones
quibus vitium. Videtur enim nunc ad eadem deuo-
lui, nunc redire ad priora, nunc dicere contraria.
Causa verò est quia in principio narrat breui totam
historiam, summam attingens prima & vltima,
mox redit rursus ad eandem narrationem à prin-
cipio, narrans singularem singula. Intelligitur verbò fa-
cile verba se ipsa prius explicata vt acta esse tota. Zo-
ilus proculdubio laborat cantho ob redonda-
tiam excrementorum in capite (nam id totus pro-
cessus & exitus morbi indicat) hic fecit tussim,
quæ sicca duravit aliquandiu, ita vt sit, deinde matur-
rescente iam tussi, cum calor in eo vegetior esset fa-
ctus, roboratum cerebrum tentauit multitudine
expellere, expulitque simul magnam partem ad po-
rum auditum sinistram, & ad sinistram partem
thoracis, & ad totum id latum secundum alteram ca-
pitis & cervicis & scapularum partem. Itaque cæ-
pit simul laborare auris inflammatione, & pleuritide:
& dolore occupante totum id latum. Cum auris
dolor cepit, ac cum eo reliquæque dolores & fe-
bres, fluxit etiam alius copiosus, vnum fortasse diem,
aut etiam noctem, deinde restitit vsque ad decimum
diem, vt nihil nisi coactè, id est vix siccum & cum
clysteri egeret. A principio dolorum & febris, cæ-
pit excreare sub purulentum seu floridum, hoc est se-
misanguinem, semipus. Vtræque inflammatio, acris
inquam, & lateris, suppuratione indicata est. Auris
quidem inter octauam & nonam diem, lateris autem
decima quarta, vtræque sine rigore. Cuius indica-
tionem inflammationis auris, factus est sudor copio-
sus capitis. Ab eo tempore exigui quidam rubil in-
uantes processerunt, à suppuratione pleuritidis
processit sputum largius & magis concoctum, id
est bene purpuratum deposito iam rubore, & ad-
hibuit medicus visionem thoracis, quæ in hoc
malo maximum remedium esse solet, & multum
tempus post hæc fiebant in capite sudores, &
herpetes, qui tertio quoque die succedebant, &
tertio quoque arescebant. Ita tandem euasit. Zo-
ilo, inquit, iuxta murum habitans, ex tussi matu-
ra, febris acuta. Tussim illam ex redundantia
excrementorum in capite fuisse, euentus decla-
rat, & decubitus illius materie secundum rectitu-
dinem, cum capite, & sudores, herpeseque capitis,
quibus tandem solutus morbus est. Cerebrum en-
g ij

*Zoilo qui iuxta murum habitabat, ex matu-
rata tussi febris acuta accidit & faciei rubor, &
alius in intercepta nil nisi coactè egerat. Late-
ris sinistri dolor aderat, & auris è directo val-
de dolebat, caput verò non adeo. Expuens
quoddam purulentum semper agrotabat. Ve-
rùm alia indicata sunt, & circa octauam aut
nonam diem, ex aure pus multum effluxit. In
principio autem nona die doloris auris finis
fuit. Nescio quomodo sine rigore in diebus fa-
ctum est. Sudavit caput valde & hic. Firma
influxio sinistri lateris. Sursum simul cum aure*

excrementa abfcesserint primū ad alteram illius partem, inde magna illius pars, in aurem, & latus secundū rectitudinem positum, incubuerit. Quod verò tūsi quæ concoqui cæperat, alia graviora mala supervenerint, non mirum. Nam cum multitudinem excrementorum magis quàm cruditate sequi possint, sæpe vno malo concocto aliud supervenit deterius. Faciei rubor hic, ad suppurationem tendentibus pleuritidibus, aut ad peripneumoniam, solet fieri. Alius intercepta est præ febris magnitudine, & vehementia impetus ad superna conditit, ut qui deterius fuit, quod, ut mox dicitur, in principio multum soluta, multū siccata soluta est, illud enim significavit magnā copiam, hoc magnum recursum, atque adeo in morbis thoracis, & capiti, utrumque malum est, & multum sinere, & siccari alium. Lateris sinister dolor, & auris è regione posita, hoc est sinistra, valde dolebat, caput verò non adco. Nimirum auris dolor, quem ego ex catarrho aliquoties in me ipso expertus sum, acutissimus est. Spuens semper, id est à principio febris acutæ (cum enim hic exciperet concoctam tussim, fieri ita potuit) subpurulentum, id est semipus, ægrotabar. Alia iudicata sunt, id est, quæ pertinebant ad aurem, ceruicem & scapulam soluta. Rationem verò & tempus iudicationis indicat, dicens. Secundū autem pus multum effluxit circa octavā aut nonam diem. Explicans deinde cur dicat circa octavam aut nonā, dicit in principio nonæ diei doloris auris finis, id est finitus est dolor circa principium nonæ diei. Nescit (inquit) quomodo sine rigore iudicium factum est. Miratur Hippocrates quia suppurationes in partibus sensientibus solet rigor comitari. Nam in prognostico dicit initium suppurationis esse, ex quo primum cum rigor apprehendit. Fortasse in hoc homine absit illi rigorem copiosus sudor, qui hoc ipso tempore, hoc est, circa octavam & nonam diem, contigit. Proinde dicit sudavit caput valde & hic. Firmo in iusto sinistralateris. Id est firmam tandem curatio fuit, iustus sinister lateris. Auxilium sane Hippocrati in his & in omnibus ferè doloribus diuturnis fatigatissimū, nostro tempore non sine magno ægrotañtium discrimine inusitatum iam. Quis si qui medicorum eo uti vult, tempestivè ægroti non parere, vitæ perniciosa & minus mollia sperantes: cum iam in extremum vitæ constituti quidvis patereantur, medicus non vult id tenere, ut qui videat iam nullam salutis spem esse. Quod ego iam in aliquibus facere cæpi, cessitque optime, audi: Nihil præfatus habet emplastro aliquo ad dolentes partes vtrorū, pono medicamentum causticum, quā emplastrum hæret loco; quem uti volo. Aegrotos doloris causam non intelligens incautè patitur, vique dum facta sufficiens iniustio est. Fieri verò id potest in vna aut pluribus particulis, ut res exiger. His dictis cum extremum narrationis videretur attingisse, redit Hippocrates ad super dicta. Sursum simul cum autem secundum scapulam præcipuè levatus est dolor. Id est, simul cum dolore auris sedatus est dolor scapule & humeri, & cervicis è regione. Sed & spuma multa quæ prius secundum principia, & circa septimam, & octavam spebantur florida, deinde; hoc est, post septimam & octavam, concocta, i. suppurationem iam spebantur. Venter restitit usque ad nonam & decimam diem. Ergo intelligimus circa nonam & decimam fluxisse iudi-

cat autem bene morbos aurium, fluxus ventris. Nam in aphorismo dicitur profluviū ventris surditatem tollere. Itaque dolor auris evanuit circa initium nonæ diei, ut dictum est. Deinceps tumor, hoc est, inflammatio lateris remittebat, & sudores exigui fiebant. Non tamen iudicabant. Manifesta autem erant, excrementa quæ in corpore abundabant, & alius, & secessu. Nam etsi dictum est alium restitisse, & nihil egerere nisi coactè, tamen cum inciperet dolor auris, hoc est primo die, aut etiam secundo febris & dolor: venter turbatus est, ut etiam circa nonam, & decimam. Effluxit autem, ut dictum est, pus ex aure nona die, & indicatus est totus morbus, pleuritidis scilicet, decimaquarta, sine rigore erians fuit solutio hac eadem die, ut fuerat nona. Cæterum sputum largius ibat, & magis concoctum, hoc est suppurationem, ex quo ex aure pus efflavit, atque itaque processit, ut intelligamus post decimaquartam fuisse adhuc copiosiores puris excretiones. Hoc tempore etiam vltio facta fuit, etsi id Hippocrates non repetat. Sudores verò, & herpes in capite in multum tempus fiebant, arescentes tertio quoque die, & tertio quoque die res florescentes, quod quidem significabat biliosam fuisse capitis cacochymiam.

Quæcumque sine signo aliquo disparent, difficilis sunt indicationis, quale fuit erysipelas quod puella Pollimarchi accidit.

Erysipelas non potest bene solui, nisi paulatim & exusta in parte male affecta cute; relictoque vestigio: si nullo relicto evanescat repente, non debet probati ea solutio. Significat enim: intransire, quod tantopere in prognostico vituperatur.

In bubonibus febres male sunt, exceptis diariis, & qui in febribus accidunt bubones deteriores quam in acutis ab initio decrescunt.

Dictum mihi est in commentatione aphorismi quinquagesimi sexti quartæ particulæ, siue febris non diaria superveniat buboni, siue bubo febrili, siue ingruant ambo simul, malum esse, quia significavit viscerum graue malum. Itaque bubones malos esse cum febribus putridis. Addit nunc Hippocrates eos esse deteriores, qui in acutis febribus sunt, tales enim solent esse periculosissimi, atque adeo pestilentes. Maxime verò eos, qui ab initio decrescunt, id est mox in initio pullulantes, deinde non crescent cum febribus, sed decrescunt febribus crescentibus, illud enim & esse magnam materiam, & recondi in visceribus significat.

Flatus indicat hypochondriorum elevatio mollis, & in ventrum laevum vergens consentio, in ipsorum superna & dextra parte rotundum quiddam velut circumferentia, suppurationem portendit, Aliud longius

magis est; aliud deffusum, aliud deorsum re-
pit, & hinc inde contentio ad vmbilicam pro-
tenditur. In omni latione quæ sursum & è dire-
cto fit, siquid colligatur & comprehendatur in
rotundum, si quidem status est, sine indicatio-
ne attenuatur calore: si autem hunc effugiat, in
suppurationem tendit.

Notas causas & affectus & effectus partis in ven-
 tris tumoribus docet, et si non persequatur omnia,
 sed tangat, vt solet. Docet hæc salsus Gal. lib. 5. de
 locis partibus. Dicit Hippocrates eleuationem in
 hypochondriis mollis, hoc est, non admodum resistentē
 tactui, cum diffusio, tamen quæ facit vti soles, quæ
 compressionē facta fuerit, non multum retineatur, si
 citius & citius hoc est ad ventram partem inclinet,
 sed totum hypochondriū tenet, significare spiritus,
 hoc est status. Tale enim est, quod in tympanicis
 apparet. Si verò supra hoc est in suprema venteris par-
 te, in huiusmodi hoc est, in hepatis loco, rotundus tu-
 mor appareat velut circi differentia, suppurationē po-
 tēdit. Quia illo loco tumor rotundus est alius necessari-
 us non, inflammationem hepatis significat, & tam
 quidem magnam, exiguum enim musculi occultant.
 Ex magnis autem inflammationibus plerumque sup-
 purationes fiunt, maxime iis quæ in hepate sunt,
 nam vt in prognostico dicitur, ædema quod in ven-
 tre fatigat, minus fecit abscessum, quàm quod in
 hypochondriis; immine verò parres sub vmbilico
 in suppurationem vertitur. Atqui tumores in ven-
 tre non omnes rotundi, sed aliud longius magis,
 idest, alius tumor est in longum productus, talis
 est, qui tenet musculos rectos, alius deorsum re-
 pens, non secundum rectum, talis tumor est, qui te-
 net musculos oblique descendentes, aut oblique as-
 cendentes: oblique descendentes musculi est, qui
 repit à parte posteriori in anteriorem deorsum, ob-
 lique ascendens, qui à parte anteriori ad postero-
 rem deorsum, (quod idem est) à posteriori ad ante-
 riorem sursum. Et hinc inde contentio vsque ad vmbi-
 licā. Tales sunt tumores musculorum transuerforū.
 Aliud est diffusum, idest, ad varias partes pertinet,
 & versus varias spectans, vt cum tumores tenent
 musculos diuersos, aut internarum partium musculos
 variè distitas. Atqui tumor rotundus mox ac pro-
 ducitur vltra constitutionem inflammationis, sup-
 puracionis suspicionem præbet, tamen non semper
 suppuratio est, sed nonnunquam collectio flatuola.
 Atqui sane in vtraque collectione, & puris scilicet &
 status, & tumoribus, aut tensionibus diffusis, aut in
 longum productis, reuocatur aut colligitur in vnam
 partem materia, & in rotundum abit. Sed an status
 sit, ita dignoscitur. Si spiritus, seu status est, sine in-
 dicatione, idest, sine manifesta euacuatione, extenuat-
 ur, & insensibiliter absorbitur calore, idest, caloris
 fomentis: si autem hoc effugiat, idest hinc cura-
 tionis non obediat, in suppurationem tendit.

De si spiritus, parui, magni, rari, parui rari,
exi extra magnus, intro parvus, hic quidem
tardans, ille festinans, duplex intro reuocatio
velut super inspirantibus, calidus, frigidus.

Hæc eadem sententia cum multis sequentibus
 scripta occurrit sexto libro epidem. par. 2. atque
 adeo hæc defunt doctores vocales, quæ illuc transferen-
 dae huc sunt. Scilicet magni densi. Nam cum hoc &
 illo loco velut Hippocrates breuibus complecti omnes
 differentias respiracionis, & tres differentias con-
 tracionis magni & parui cum raro & denso scribat,
 densi scilicet & parui, magni & rari: parui & rari
 quattuor habere deest, magni & densi. Sed vt
 Hippocrates tam breui oratione ferè nullam respi-
 rationis differentiam non attigerit, considerare opor-
 tēt, & si quas omisit, addere. Differentiæ pluri-
 mæ communes sunt respiracioni, & pulsui, non tamen
 omnes. Nam quædam huic quædam illi sunt propriæ.
 Communes quidem sunt, magnitudo, celeritas, &
 crebritas, rhythmus, æqualitas, aut inæqualitas, or-
 do, aut contrarium. Debilitas & vehementia. Hæc
 quidem eodem modo in vtriusque desinuntur, &
 dicuntur vniocæ. Propria differentia pulsus est du-
 ritas, & mollities. Quia in respiracione, cum non
 sit eius iudex tactus, considerari haudquaquam

potest. Velut respiracionis est differentia propria
 sublimem, aut non sublimem esse, quia hæc differen-
 tia capitur, ex numero instrumentorum, quæ in
 actionem adhibentur, quæ quidem quia multipli-
 cia, & libere mouentia, non adhibentur semper
 eadem. At verò pulsui non potest esse differentia
 aliqua, quæ huic respondeat, quia semper agitur
 instrumentis eisdem, corde inquam & arteriis leui-
 bus. Velut etiam accidit soli respiracioni, vt quo-

dam positi facilius aut difficilius agatur, vnde ea
 differentia prodit quæ orthopnoea nuncupatur.
 Est etiam propria respiracioni differentia, quæ ca-
 pitur ex qualitate materiæ, quæ expiratur. Vnde
 spiritus calidus & frigidus dicitur: in pulsu verò
 nullus sensus esse potest materiæ, quæ trahitur
 aut pellitur. Hic igitur Hippocrates omnium diffe-
 rentiarum communium respiracioni & pulsui me-
 minit, præter vnam debilitatem, aut vehemen-
 tiam: & vnius propriæ, calidi inquam & frigi-
 di.

Duas ergo solum proprias omisit, sublimem, & non
 sublimem, & quæ ex positi capitur, orthopnoeam.
 Quas si addas, nulla amplius deesse videbitur. Di-
 cit verò Hippocrates non tantum simplices, sed
 & compositas. Simples enim sunt magna & par-
 ua: velox & tarda; seu tardans & festinans: densa
 & rara. Vnde hinc compositz quatuor differentiæ
 magna & rara, magna & crebra, parua & rara, par-
 ua & crebra. Et sunt hæc differentiæ significatio-
 nes insignes. Nam vt in prognostico dicitur, spiritus
 creber & magnus significat ardorem: creber & par-
 uus, dolorem: rarus & magnus, delirium: rarus
 & parvus, dolorem: rarus & magnus, deliriosus
 rarus & parvus, extinctionem caloris. Atqui cele-
 ritas & tarditas cum dictis differentiis componunt-
 tur. Nam qui magnus & creber est spiritus, celer
 etiam necessario erit: qui paruus & rarus, tardus
 etiam statim: qui magnus & rarus, etiam celer, quia
 cum non cogit summa necessitas, cessant à respira-
 tione qui desistant, cum verò cogit, respirabunt
 etiam celeriter. Paruus & creber, vt vrbem magis
 calor, aut dolor, ita erit tardus aut celer. Si enim
 calor etiam cum dolore viger, vt per inflamma-
 tiones, erit celer & creber: si verò dolor mul-
 tum & calor nihil aut exiguum, vt per conuulsos
 status, erit paruus & tardus. Rhythmus est, cum
 secundum naturalem proportionem respondet rari-
 tati

magnitudo expirationis & inspirationis: sunt mali rhytmi, cum ab hac proportionem deficiunt, aut quod dilatatio firmior, & restrictio, quod fit, cum maior est necessitas attemperandi cordis calorem, aut reficiendi spiritus cerebri, quam expellendi foligines: aut quod restrictio sit maior dilatatione, quod ob contrarias causas evenit. Aequalis & inaequalis multae affectibus esse possunt: & inaequalis sunt ordo & ordinatio. Tamē Hipp. vno exemplo inaequalis maximē insignis, attingit totum hoc genus. Duplex, inquit intro reuocatio vclat superinspirationibus. Hic est, qui in aphorismo vocatur offensens, dicitur quae consualitatem significat. Calidus praeterea aut frigidus. Calidus spiritus mediocriter, naturalis est: vivens est febrilis: frigidus est pessimus, quia extinctionis caloris soboles: ac proinde dicitur in prognostico admodum exitialis. Superest addamus differentias, quas hic deesse diximus, ut eadē perfecta haec lucubratiuncula. Has diximus esse tres, vnam cōtinuē cum pulsu, et si habeat non eandem rationem dignotionis, haec est spiratio fortis aut debilis. Haec est in vehementia illius motus, ut quicquid alius vehemens aut debilis esse potest. In iis qui adhuc loqui possunt, ex vocis vehementia, agnoscitur ea quae est in respiratione, utpote materiam praestante voci respiratione. Vocis autem vehementia auditu cognoscitur. In iis verō qui loqui non possunt, considerandum an super pectore poderis aliquid ferre possint, quanto enim possunt ferre minus, tanto maior respirationis debilitas significatur. Duas diximus esse proprias, vnam quae ex pulsu, quem aegrotus respirandi gratia requirit, capitur: in hoc genere est orthopnoea: quae aut ob ardorem summum, aut angustiam viarum respirationis, contingit: alteram quae ex instrumentis quae in respirationem adhibentur, capitur. Instrumentum quod primō adhibetur, idque solum necessarium, ac semper, est septum transversum, post illud, secundo loco musculi intercostales: tertio, qui veniunt ad lumbis in thoracem: ultimo, qui ad claviculas, & collo descendunt. Ea tamen lex mouendi est, ut hoc quo dicta nunc sunt ordine, priora sine posterioribus moveri contingat, posteriora verō sine prioribus, minimē: sunt verō dicta priora quae humiliora, posteriora quae superiora. Respiratio igitur sublimis, & quae sublimibus iam instrumentis agitur, extremae necessitatis debilitatis est, nulla iam potente facultate mouere satis, ac proinde mouere omnia.

Medicatoria continuarum ofcitationum, longa respiratio, non potantibus autem, & vix, respiratio brevis.

Respiratio longa dicitur, quae ex longis intervalis fit, & multum producit, magna scilicet, & rara: brevis respiratio est, quae huius contraria, parua scilicet & crebra. Medicatorium dicitur, non quod utique bonum, sed quod sanat, estque causa salutaris. Respirationem longam & raram dictum nuper est esse signum phreniticum, nunc dicitur curare assiduas ofcitationes. Causa autem est, quod crebra ofcitationes tunc fiunt, cum multus & crassus status redundat circa ventriculum, aut per capitis aut thoracis partes, ex quibus in musculos malarum re-

dantur. Vnde fit, ut oscitentur, & qui fame premuntur, quod multum statim in ventriculo colligant, & qui somnolenti, quod in caput multus vapor ascendant, & qui aliqui redundant multis excrementis flatuosis. Illos quidem cibus aut somnus euitat omnium optimē, hos cohibere spiritum, & non nisi ex longis intervalis respirare (non potest autē respirari ex longis intervalis, nisi longa sit respiratio, in quibus consilud detinetur thorax) quia ita dissipantur optimē status qui in ventre, aut vis instrumentisve respirationis continentur, ut scilicet sanari solet singultus, & tussis arida ex frigida intemperie. In altera parte, in qua Hippocrates dicit, non potantibus, & vix, respiratio brevis, intelligunt plerique, vix potantes, esse phreneticos, quia Hippocrates in libro proorriorum dicit *si quis vix & non potans*, idest phrenetici parum bibentes. Nam tertia phrenetici est virgenter admodum fiti, ac proinde saepe accipiunt potum, auidēque, si offerretur, tamen nonquam nisi exiguum bibunt. Non tamen video quo pacto possit dici phreneticorum cutariorum respiratio parua & crebra. Dicunt, quia magna & rara in phreneticis mala est, parua & crebra esse bonam. Tamen non dicimus respirationem magnam & raram esse malam in phreneticis, ut causam noxiam, neque ut signum mortis per se, ita enim contraria esset in eisdem bona, ut causa, aut signum: sed ut signum pathognomonicum: significat enim ita respirantes phreneticos esse. Quare phreneticis non potest contingere contraria respiratio. Non ergo potest esse cutatoria in phreneticis, siquidem ne esse quidem omnino. Dicunt, non posse breuem respirationem phreneticis accidere, posse tamen succedere cum phrenetis soluitur, significetque iam solui. Ceterum hoc, imprimis improprie dicitur cutariorum, deinde falsū etiam. Nam et si phrenetis soluitur: non fiet respiratio parua & crebra, nisi solutae phrenetidis succedat inflammatio alius instrumenti respirationis. Quod si diues breuem spiritum dici eum, qui tam longus esse definit, improperietis multum, vilitatis exiguum, continebit oratio. Proinde aliter puto: vix potantes dicit eos qui strangulantur, ut neque respirare, neque deglutire possint praeter multitudinem humorum, aut fuliginem irruentium in septum transversum, & cor, quae quidem passio hysterica, & hypochondriacis solet accidere. In talibus, in ipso paroxyzmo consilium est, ut quam maximē possint conentur respirare crebra (multum enim non possunt) ita enim expurgantur fulgines, & passio minus prauallet.

F Natura quidem ipsa ita affectos docet hoc auxilium. Quum verō respirationem intermittunt, oportet assistentes acclamare, & hortari ut loquantur, aut comprimentes digitos, aut aliter dolorem eiere, cogetque ut conquiescant & clament. Loquentes enim, aut saltem edentes vocem, non possunt respirationem intermittere. In quibusdam codicibus legitur utrobique respiratio longa, ut tota dictio sit: medicatoria continuarum ofcitationum longa respiratio, non potantibus autem & vix, respiratio longa. Iuxta quam lectionem placet non potantium & vix potantium nomine intelligi phreneticos, esseque penide, ac si diceret. Respiratio longa, quae necessariō magna est & rara, medicatoria est ofcitationum continuarum, & phreneticis indicatoria. Itaque non eodem modo dici esse ofcitationum &

phrenitidis, sed illarum, vt saluarem causam, huius vt signum pathognomonicum.

Et laterum contentio dolorosa, & contentiones hypochondriorum, & lienis elevationes, sanguinis à naribus fluxum secundum rectitudinem significant.

Hæc oratio pars esse videtur decia ex alia longiori sexti epidem. sectionis secundæ, qua ita habetur. Secundum rectum & laterum dolorem, & contentiones hypochondriorum, splenis elevationes, & ex naribus fluxiones. Et aures secundum rectum. Horum plurima eadem etiam in oculis. Nunquid igitur omnia, atque inferne sursum secundum rectum, utque iuxta buccas, aut iuxta oculum, & aures quæ autem supernè deorsum non secundum rectum? An etiam quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, vt in testes, ac varices? Eadem utrobique sententia est, hæc scilicet, decubitus omnes humorum, qui ex quibusdam partibus in quasdam sunt, & fluxiones spontaneas quæ secundum rectitudinem solent fieri, esse secundum rectitudinem partis recipientis, aut viæ per quam euacuatio fit, cum parte primario affecta, & quæ mittit. Rectitudo verò est dextrorum cum dextris, sinistorum cum sinistris, superiorum cum superioribus, inferiorum cum inferioribus. Dextra & sinistra dicuntur secundum hominis latera: superiora & inferiora distinguuntur, quia est hepar. Quod apertè insinuat Hippocrates, dicens, an etiam quæ infra hepar sunt supernis distributa. Itaque utrobique est hæc eadem sententia, sed interest, quia quod hic dicitur simpliciter, illic non simpliciter, sed producta quadam dubitatione, an scilicet vt ex infernis sursum secundum rectitudinem lateris sunt abscessus, vt ex hepate parotis dextra, aut fluxus singulis ex dextra nare, ita & qui ex supernis in infernas, id est infra hepar positas partes. Decisio verò est vltima illa interrogatio, an etiam quæ infra hepar sunt ex supernis, vt in testes ac varices. Quasi diceret, non solum in illis, sed in his etiam, atque adeo omnibus, rectitudinem seruari solere. Quod non dicit simpliciter, sed quibusdam exemplis, partim decubitis, (vt cum dicit secundum rectum laterum contentio dolorosa, & contentiones hypochondriorum, & lienis elevationes) partim euacuationis, cum dicit, ex naribus fluxiones. Solent quidem abscessus secundum rectitudinem fieri, non tamen omnes necessarii sunt. Euenit enim nonnunquam abscedere in partem contrapositam, aut effluere per viam nullam rectitudinem habentem. Neque mirum. Nam omnia sunt confluxilia. Sed qui secundum rectitudinem sunt, meliores & vtiliores sunt (cæteris paribus) ijs qui sine rectitudine. Atqui hæc est maxima, præcipuaque causa, qua in euacuationibus, aut reuulsionibus, quas arte paramus, dictam legem rectitudinis seruare debemus: nimirum eorum quæ naturaliter eueniunt imitatione. Tamen enim ratio hæc argumentandi est Empirica, tamen est optima propriè seu in loco, in quo prædictas rationes sectamur, magis quam logicæ argutias. Disputata verò est diffusè admodum ea quaestio in controuersijs.

Quæ relinquantur in morbis post indicationem, recidivas facere nata sunt. Primum igitur lienis elevationes, nisi in articulos finiantur, aut sanguis fluat; hypochondrij dextræ contentio, nisi profluant vrina. Hæc enim utrorumque interceptio, & recidiva horum merito.

Recidivas fieri cum corpora non sunt in primo morbo perpurata, sed quædam relicta sunt post indicationem, in apertissimo etiam dictum est. Nunc verò id docet, simulque quæ soleant relicta recidivas facere. Primum, iugiter fieri solent, ex febris difficilis indicationis, elevationes lienis, nisi in articulos fiant abscessus, aut sanguis fluat, fieri etiam solet hypochondrij dextræ contentio, nisi profluant vrina. Hæc enim est utrorumque interceptio, id est interceptio elevationis lienis est abscessus ad articulos, aut fluxus sanguinis; contentiois hepatis interceptio, est profluum vrina. Et recidivæ horum merito sunt, id est, Et cum hæc supersunt ex morbis, neque interceptiuntur illis modi, merito ex illis recidivæ morborum sunt. Hippocrates quidem docet hic quæ plurimum contingunt, constat verò neque hoc solum solere ex febris superesse, neque has solum interceptiones habere hæc mala, neque à solis illis posse præseruare quamcumque illarum. Nam multa alia solent superesse ex febris significantia recidivas, velut ventriculi durities, aut veri, aut solum oris amarendo, lingue ariditas, & sitis. Intercepti etiam potest lienis elevatio, vrinae profluio, nam si intercepti abscessus ad articulos multa vrina crassa & alba facta, vt aphorism. 74. particula quarta dicitur, & elevatio lienis abscessu ad articulos, profecto & elevatio lienis profluio etiam vrina. Contentio enī hepatis potest intercepti fluxu sanguinis. Quare & fluxus sanguinis, & vrinae profluum potest intercepti utrumque malum, non tantum alcerum malum.

Abscessus autem horum, qui non sunt, facere oportet, quosdam autem qui sunt declinare. Eos autem excipere si eant qualiter oportet, qui verò non abundè prodeunt, coadnuere, eos autem auertere oportet qui omnino inutiles fuerint: maxime autem quum futuri sunt, si aliter, cum nuper inceperint.

Brevissime dicit indicationes omnes, quas ab abscessibus accipere potest medicus. Abscessus enim aut sunt boni aut mali, aut utriusque, aut fientes aut futuri. Atqui fientes, aut satis magno impetu fiunt, aut lenit. Bonos ergo non modo fientes, id est, qui si fient, essent boni, hos facere. Malos fientes aut futuros declinare, bonos & fientes, quales operire, excipere tantum, id est nihil facere, sed solum vt fiant, bonos & fientes, non valde, id est non satis, sed lenitè, id est, id est, inuadendo naturam, conari, vt perfecti fiant. Omnes inutiles, ac multo magis noxios, auertere. Op-

timum autem fuerit eos auertere futuros, id est, antequam fieri incipiant, sin id non possit, saltem cum super ea perierit. Nam sero medicina paratur, cum males per longas immulere moras.

*Quarto die facti sanguinis fluxus, diffi-
lem faciunt indicationem.*

Nullo alio morbo posse videntur fluxus sanguinis quarto die facti esse bene indicatorii, quam in febribus continendis ex sanguine, quæ ob multitudine crassi sanguinis cum spontanea lassitudine sunt: ut a phorism. 74. sectionis quartæ dictum est, tamen in illis etiam, dictum est eodem a phorismo, non esse satis ad perfectam indicationem, nisi simul multa & crassa urina fluat, & sanguis ex naribus. Solus ergo sanguinis fluxus etiam in illis erit diffilis indicandus, ut pote non sufficiens euacuatio.

Quæ febres diem unum intermittentes, altero supererigunt indicationem ad septimum circuli terminantur.

Bene intermittere, & cum rigore incipere proprium tertianæ exquisitæ est, quæ verò talis est ad septem periodos, cum longissime prorogatur, vix a phorismo etiam dicitur.

Scopo ex coryza biliosa & faucium phlegmone cū prauo victu vteretur, alius intercepta est, & febris cōtinua facta est, & lingua arida, & sine somno, infra vmbilicum contentio vehemens & aequalis, paulatim in inum dextra partis vergens. Spiratio subfreguens, dolebant hypochondria, & cum respiraret, & cum converteretur, sine tussi excrebat subcrassa. Exhibita pelus ab hypochondrio depulsi, prodit autem nihil. Postridie autem glandes duæ appositæ non appauerunt. Urina autem crassa & turbida. Hypostasis lenis & equalis, & stetit alius in turbulentia, atque venter mollior erat, intumescebat & deorsum vergebat. In potu utebatur aceto mulsio. Decima, sanguis aquosus paucus ex sinistra nare prodit. Non erat autem valde debilis ob hoc ipsum. Et urina subsiditiam habebat, in hypostasi autem subcandidam quiddam adhaerens vasi tenue, neque semini omnino simile neque dissimile. Fluxerat hoc brevi tempore. Postridie indicatus est, & a febre liberatus, & prodit quid subuiscidū undecimā, quod quidē circa fluxum, erat biliosū. Urina autē purgatio multa, & multitudine & subficta, & priusquā vix potare cepisset, parum quiddam emolliitionis simile. Proderunt autem undecima die, ut quæ paucæ erant, vis-

A cosa alui excrementa & conturbata. Quod indicatoriè, velut in Antigēni in Perintho accidit.

Perrarum est non fuisse citò & turò coryzam, nisi quis in principio prauo victu vtarur. Tamen à principio ventibus copiosior cibo & potu, multa neque leuis mala ex ea procedere, rarum non est. Quod certè & Scopos euenit, qui cum coryza laborans, ut exitus indicauit, bibula, sed ex multa materia & phlegmone faucium ob defillationem, & prauo victu vteretur, neque idonea curatione, febre cōtinua undecim dierum laborauit, cum multis non leuibus symptomatibus. Habuit enim à principio febris alui interceptionem, lingua ariditatem & perunguam. Infra vmbilicum ad inguē dextrum fuit cōtentio vehemens, & paulatim in infernam partem inclinans, & æqualis secundum tempus, id est citra intermissionem affligens. Habuit etiam dolorem hypochondriorum, hoc est, supremæ regionis ventris, sentiebatque hunc dolorem, & cum respiraret, & cum converteretur de latere in latus, habebatque spiritum subcrebrum, excrebat subcrassum sive tussim. Causa horum hæc fuit, cum excrementa, quæ coryzam & inflammationem faucium faciebant, plurimum in capite redoundarent, natura tentasset ea pellere, non potuit autem assatum extra torpus, depulsi ergo in partes humiliores. Illa repentia deorsum, simulque putrescentia, fecerunt febre, & dolores aliarum & aliarum partium. In initio febris alius intercepta est præ febris vehementia siccitas faucibus, & humiditatibus auersis ab intestinis, conuersisque in partes, quæ doluerunt. Lingua etiam arida & perunguam significabant febris magnitudinem & bilem. Bona pars incoarum defluxit in hypogastrium dextrum, unde contentio accidit vehemens, paulatim in infernam partem vergens, & nunquam intermittens. Maxima succorum pars hæsit in hypochondriis, fecit que ibi distentiones & repletiones. Unde spiritus sicbat subcrebrum ob compressionem septi transuersi, ut in his quibus ventriculus multo cibo distensus est. Hinc etiam dolores hypochondriorum, & cum respiraret, & cum converteretur: cum enim quis, cui pars illa ventris distenta est, vehementius respire conatur, ipso septo transuerso comprimit distentam partem, simulque cum ipso septo mouet (mouetur enim inter respirandum etiam intestina) ob utramque causam dolor fit. Nam mouetur utroque modo focus aut flatus, qui in cauis continentur. Plurima autem quæ quiescit dolorem non faciunt, mora faciunt, & quæ quiescit leuiorem, mora grauiorem. In intestino id expectari est facile, cum succis aliquis, aut flatus frigidus mouetur. Conuersio corporis eadem ratione dolorem facere poterat, mouendo scilicet, nam cum conuerteretur corpus de latere in latus, quædam internarum partium laxantur, quædam distenduntur, quædam comprimuntur, atque ita quod interior est, mouetur. Quod fit, ut cum aliquis flaturum sentit, neque facile emittere potest, conuerrere corpus consiliū sit, sæpè enim hoc solo remedio pelitur. Quæ sine tussi excrebat subcrassa, de capite veniebat ad palatum. Nam si de thorace excrearentur, non possent sine tussi, illa ergo via expurgabatur, quod in cerebro erat relictum, neque abesse ferat in inferiores partes. Quidam ob vehementiam

B

C

D

E

F

G

febris suspicantur fuisse dolorem illum hypochondriacum inflammationem internam: ego verò non ita puto. Nunquam enim Hippocrates dedisset peplum, cum nihil, ut ipsemet docet, lib. 4. de ratione victus in acutis, sit à ratione alienius, quàm dare medicamentum expurgans tentans inflammationem hypochondrii. Quid si quando per eas inflammationes eo est utendum, tamen non ante inclinationem. Coctus verò nondum venisse in inclinationem illum hypochondrii malum, cum peplum Hippocrates vñs est. Nam multi dies restabant à data peplum, vsque ad vndecimum, quo febris soluta est. Non erat itaque inflammatio, sed quod diximus. Proinde vñs est peplum, quòd scilicet intelliget fucus fluere deorsum à cerebro, quare etsi non dicat quo die, vñm fuisse suspicari peplum intra primum quarennarium. Expurgationes enim reuulsorij quæque non expectata concoditione succorum, sed quòd fluant, faciendæ sunt in ipso principio, idest intra tres aut quatuor dies fieri debent, antequam scilicet cessauerint fluxiones. Nam in hanc sententiam dicit ipsemet. 4. de ratione victus; Hos si ab initio purgari volueris, id ante diem quintum facito, cum venter muturauerit: si non, à medicamentis abstineto. Venter si muturauerit, fuerintque excrementa biliosa, scammonia medioctiter purgato. Quanti verò ad aliam pertinet sanationem, quam minimè exhibebis cum potus, tum sorbitiones, ut melius arger habeat, nisi remissione facta decimam quartam fuerit egressus. Itaque duplex occasio purgationis est, altera ob fluxiones reuulsoria, cum nondum fluxio cessauit, aut inelinet materiam ventrem, quod mutmare agnoscitur, altera post exactam concoditionem. Prima quidem purgatio agi debet in principio, secunda post summum vigorem. Proinde in morbis simpliciter acutis, quorum summus vigor decimo quarto fieri solet, prima occasio expurgationis intra primum quarennarium est, secunda non nisi post decimum quartum, quod & libello de expurgantibus medicamentis Hippocrates dixit. Præter has duas expurgandi occasiones, quæ certis temporibus sunt, est alia incerti temporis, cum scilicet turget materia. Nam quocumque tempore, immo verò etiam quocumque die turgear, expurgandum est: ut flantiam tres occasiones expurgationis. Ergo Hippocrates videns Scupo descendere ex capite humores, eosque per hypochondrium viam capere cæpisse, morari autem illic, ne plus satis morarentur, & inflammationem aliquam aut grauem alium affectum concitarent, dedit peplum intra primum quarennarium arbitror. A data peplum nihil per ventrem descendit, sed vsque adeo sine expurgatione transacta res est, ut dux glandes, quæ postridie appositæ sunt, non apparuerint, sed interiorius remanserint. Nihilominus noxiom non fuit medicamentum, neque inutile, nam depulsi ab hypochondrio succos, qui depulsi, imprimis in vias vring deriuati sunt. Doinde & in ventrè post duos scilicet aut tres illos dies, quibus post acceptum peplum, ne glandes quidem redderetur, interim etiam in hac excrementorum turbatione, cum non omnes vias experiret, alui, aut vrinæ, quardam pars in hanc collecta est, quæ ille elatus est. Vrina ergo post datam peplum fuit crassa, non vt concocta, sed turbida, hypotensis tenuis & equalis. Sed quo pacto in vrina turbida erat talis hypotensis? An cum repone-

atur clarescebat, subsidebatque laxe. Non arbitror tale fuisse quale est quod perfectè cocto iam morbo solet externi, sed quale est quod incipit coqui. Durabar autè perturbatio plusquàm pro elaboratione eius, quod subsidebat, ob conditionem morbi, qui cum ex cararbo principium traheret, fluxum etiam multum habebat cum succo permixtum, qui vñiam magnopere perturbat. Aluus stetit in turbulencia, & venter mollior erat. Hec est, caput etiam postea fluere ex aluo, persisterantque ea venis turbatio aliquot dies. Licet elatus deorsum vergebat. Sæpe quidem licet intumescit secundum propriam figuram transuersim, seu in dicoromæ laxe figuram, sæpe etiam producit deorsum. Nimirum est laxe cuiusdam substantiæ, & versus quaque apta dilatari, producit, vt in totum, aut medium, aut extremum fluxio inebuit. Potu (inquit) vrtebatur oxyglyci *ὀξυγλυκὴς* esse potionem quædam parari solitam in Grecia ex fauis expresso prius melle, elixatis in aqua purissima. Gal. dicit secundo de fracturis comment. contextus. 19. Ego vel ipso nomine cogor suspicari aliquod aceti in eam potionem infundi solitum, alioqui cut vocaretur *ὀξυγλυκὴς*. Sed & vñs illius id indicat. Seruabatur enim ad æstatem vt potus sedans situm. Quod quidem si ex solo melle pararetur, non posset præstare. Verum est non posse essentia per quam exiguum aceti, quod illa potio acciperet, alioqui non esset potio utilis laborantibus in vñs partibus, vt Gal. ibidem vocat. Erat itaque potio non admodum diuersa à multa, ali-quando finium, quippe qua ad voluptatem vrtebatur homines per æstatem, velut nunc ea quæ Hispanis vocatur aloxa. Constat ergo cum potum ad catharticos affectionem esse vñem, magis verò in hoc casu repræhensione: si accipiebat aliquod aceti ob magnam febrem, & bile permixtum fluxionem. Malo ita procedente, decima sanguis aquosus paucus ex sinistra nare prodit. Qui quidem fluxus illud vñm habuit boni, quod secundum retributionem fluxit, tamen illa mala non cessauerunt, quòd die non decretorio, & quòd paucus fluxit & fetosus. Quibus causis videbatur fore inutilis & noxius, & solam debilitatem argro allaturus. Non tamen ita fuit, neque valde debilis ob hoc ipsum factus est arger, quia morax ob hoc fluxu, sequuta est bona indicatio, vt fluxus sanguinis porus esset velut initium quoddam (etsi non admodum idoneum) iudicationis vñdecimi diei, quam euacuatio decimi. Vrina adhuc subsidentiam habebat, & ex subsidentia quiddam, neque quale subcandidum adhærebat matule, tunc quidem, neque quale semen cordium & solum, neque dissimile, idest neque partes admodum diuersas habens: erat illud ex pituita, quæ sedimenti formam nondum exactè receperat. Fluebat (inquit) hoc breui, idest ex breuibus interuallis, & celeriter: ex breuibus quidem interuallis, quòd crebro mingeret, celeriter verò, quòd etsi multum succi cum vrina redderetur, neque obfluebat, neque hærebat in via, neque pigre redderetur. Cum hac euacuatione quæ post datam peplum incipit, & decima die aucta est, postridie id indicatus & liberatus à febre, & prodierat die quid subensidum, quod quidem circa fluxum, erat biliosum, idest, prodit per ventrem *ὀντοδισθηρὴν*, idest, lentum, & crassum & biliosum. Fluxus scilicet ex pituitosis & biliosis. Nam ex talibus erat morbus

carpus vno impetu per ventrem aut vrinæ vias, aut conspiciam aliam viam, egeri non posset, impetum cepit per totum corpus, distributumque est: deinde paribus rotis corporis incumbens in expulsionem sudor factus est: & ita mulier iudicata hac ratione. Et abscessus ille in partem tumentem factus, non est visus consiluisse, idest euasit. Tamen hæc indicatio nunquam fuisse tuta, & perfecta, nisi fluxissent deinde muliebria plura multitudine & tempore, tunc enim suppurantur. Idest nisi fluxissent multa & multos dies; nam per febrem suppurantur, & consentaneum est suppressionem euacuationis adeo necessariæ fecisse morbum, hunc vero artusque partis tumorem, ergo tumoris indicationem non potuit esse sans ad morbi solariem, quia tumor non erat morbi causa, sed ex morbo potius processerat, nisi accessisset euacuatio menstrua, quæ quidem morbi præcipuè causa præsemindebat. Sed videtur possum mirum quartanam febrem, cum ex crasso, & melancholico succo originem ducat, sudore quo feroci & tenuis succi euacuatur, indicatam esse perfectè. Delirios vero mirari, videns non solo sudore, sed magis euacuatione muliebri iudicatam esse, & sudore quidem abscessum illum potius quam febrem, hæc vero alia euacuatiōe. Nequit quidem crassum esse quod exudatur, necesse est ferum esse, & tale ut calore fundi possit. Neque sane melancholia succus est feri expers. Arqui per morbos melancholicos multum feri gignitur, non ob speciem succi per se: sed per debilitatem caloris naturalis, & facultatis debilitatem, ac incoctionem, velut etiam gignitur multa pituita. Illud ergo serum nonnunquam æquè per totum pronenit, diluitque ipsam melancholiam, sunt que ita sæpe copiosius flores per quartanas, nonnunquam colligitur vno loco, & ita contrahitur tumor aquosus, arqui si ea pars ventris regio sit, superuenit hydrops asces. Itaque in illa muliere reliqua melancholia sero diluta, collectæ sunt in loco qui intrumit, unde distribui in totum corpus, & exudari potuerunt.

In salientibus, seu pulsantibus hæmorrhagiis figura innenienda est, & omnino si ex profors declini acclini fiat.

Vbi ego cum Iano Cornario legi, in salientibus, seu pulsantibus, vult Iacobus Steuc deleri *ὁπός* & scribi *ὀρθός*, idest constringunt, gratis autem fingit, quoniam non assequitur quid velint sibi hæc Hippocratis verba. Ego verò legi salientibus aut pulsantibus, quia vtrumque significat verbum *ὁπός*, quoniam solum significat salire, aut subsaltare, ac proinde arteriæ *ὁπός* dicuntur, quod subsilient, itaque duo videntur posse hic significari, aut in hæmorrhagiis salientibus, idest, in quibus sanguis exit saliens, aut in hæmorrhagiis, quæ sunt ex venis pulsantibus. Arqui potest vtroque modo eadem res significari, ac si illud saliens significat modum exundi ex arteriis. Cognoscitur enim sanguis ex arteria exiens, quod subsultim exeat. Potest etiam illud saliens significare nihil aliud quam copiosam eruptionem sanguinis, sive ex arteria, sive ex vena est. Arque ita nihil aliud est quam si diceretur in

A copiosis sanguinis fluxionibus: illo modo, in fluxionibus sanguinis ex arteriis. Vbi ego legi innenienda est, legunt alii omnes, amplaque existens, referuntque ad figuram: nam Græcè habetur *ὁπός* *ἐπὶ τῷ*. Ego quia non video cur figura ampla desideretur in hæmorrhagiis; nisi improprie dicatur ampla, idest idonea. cenfeo legendum pro *ἐπὶ τῷ* *ἐν ἱερῷ*, leuis enim corruptio codicis fuerit & reddidit sensus expeditus & facilis. Nimirum in fluxionibus sanguinis magnam momentum habet innenire figuram accommodatam. Ut scilicet si declinis est pars ex qua fluxit, acclini fiat, quia positis declinis multum augeat fluxionem. Neque verò hoc solum desideratur ad idoneam figuram, ut scilicet sit acclius: sed etiam ut sit figura indolens; plurimum sanguinis enim currit ad partem dolentem propter dolorem, neque sanè sola figura solet esse sans ad sustinendas hæmorrhagias: sed multæ aliæ sunt suppressiones, quas 6. epid. his verbis colligit. Sanguinis venarum suppressiones, deliquium animi, figura alia interceptio, lineamentum, appositio, deligatura. Dicir verò hæc de figura, ut quæ ante alia sit procuranda. Neque solum sanè in hæmorrhagiis ex arteriis, necessaria est idonea figura: sed in omnibus, ut hac ratione satis videatur intrelligere in hæmorrhagiis, quæ affluenter subsiliunt. Si tamen quàm maxime videatur intelligi de hæmorrhagiis ex arteriis, dicendum de illis loquitur Hippocratem, non quod sole, sed quod maxime curatione indigeant. Difficilis enim sistitur fluxus rupta arteria quam vena.

Quapropter & ligaturæ impetum faciunt in venarum sectionibus, quæ si fortes sint remouantur.

E Hęc sententia pertinet ad chirurgiam mittendi sanguinem. Nam cum vena secatur in manu, aut crure, ut fieri solet, curandum ut sanguis copiose fluat, & ex alio corpore, quod vi fiat, conuocati debet ad partem, frictione, balneo, & ligaturis, aut horum quibuscumque. Ligatura verbis fieri debet. Antequam secetur vena, ligari debet forniciter pars, mox debet vltra ligaturam sectio fieri: a facta verò sectione debet ligatura, non solum quidem: sed laxari tantillum, ne fortis sit. Nam si solueretur omnino, efflueret id quod attactu erat, moxque venire deberet, cessaretque imperus, si autem nihil laxaretur, non posset sanguis exire astricta vena vehementius. Nam ligaturæ mediocriter fortes imperum faciunt in venarum sectionibus, idest, sanguinem faciunt impetu effluere, quia enim mediocres sunt, neque qui dolore trahitur, venire, utque qui iam venit, effluere cessat, fortes verò ligaturæ remouantur: sed quo pacto potest hæc dictio cum proxima coniungi, ut hæc incipiat à particula illa, quapropter. Genti illa particula aperte significat aliquid cæsse priorationi, illud verò fuerit, quod ego in commentatione suppleni, ac si ita diceretur, in hæmorrhagiis salientibus figura innenienda est, quæ sit sine dolore, & ut ex omnino declini acclini fiat. Quæ propter, quia scilicet dolor conuocat sanguinem, ligaturæ impetum faciunt in venarum sectionibus, quæ si fortes sint, remouantur.

Sanguineum, subtilissimumque acidum rutilum facit, forte autem & in atram bilem his desines.

Galenus 3. de locis male affectis capite 5. referens eos, qui ad melancholicum morbum parati sunt, dicit, macri vero & nigri, & hirsuti, & quibus sanguis vixit, apertissimi sunt. ut huiusmodi humor in ipsis cumuletur. Fitque interdum ut impensè rubri homines affatim in melancholicam temperiem decedant, atque post hos flavi. Hoc est, quod Hippocrates dicit nunc, sanguineum & subtilissimum temperamentum, quale est in pueris, & in flavis, solere in melancholicum mutari, atque adeo tales homines solere in melancholicum morbum incidere. Sanguineum quidem, quia abundat sanguine multo & crasso. Fit autem ex tali multum naturalis melancholiz, ut ex multo & crasso vino multæ feces: biliosum, quia bilis vitione emigrat in atram bilem. Biliosus vero incurrit ad periculum in iuventute, quia ea ætas est calidissima: virtus vero succus alioqui vitionis aptus calore eius ætatis: sanguinei vero in ætate consistunt. Tunc enim frigidiore, crassior, & minus spiritus uolus sanguis fieri incipit, quare feculentus, crassus, & terreus. Itaque hæc temperiem in melancholicum morbum nata sunt incidere. Signum autem iam iam incidentium, sunt ructus acidi. Cum enim multa melancholia alioqui naturalis, aut multa atra bilis vix colligatur in illis cæca viscera, redundetque in ventricolum, sitque omne geous melancholiz acidum, admiscens sese cum cibis eos vitiat, facitque ocellere, unde ructus acidi fiunt. Neque quidem obstat nasci semper ex frigore ructus tales, omnis enim melancholia ut acida est, ita frigida subiecto, & terrea.

Rigores incipiunt mulieribus à lumbis & per dorsum in caput feruntur. Quin & viris etiam parte corporis posteriore magis, quam anteriore, velut cubitis, ac femoribus. Sed & cutis rara. Indicat autem capillas animalem.

Hæc sententia & eisdem verbis est aphorismus sexagesimus nonus particule quinquæ, atque hæc eadem scripta est 6. epid. parte 3. atque adeo multò distinctius quàm hic, quia illic addita, aut hic sublata est quædam particula multum addens perspicuitatem. Illic enim ita dicitur, Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, & per dorsum in caput. Sed & viris posteriore corporis parte magis quàm anteriori. Horremus enim magis exterioribus quàm interioribus corporis partibus, velot cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior. Indicat autem pilos. Quid est, rigores magis incipere à partibus posterioribus, lumbis scilicet, & per dorsum vsque in occiput, quàm anterioribus, & exterioribus, ut cubitis, & femoribus, quàm interioribus: quia rigor passio frigida est, & posteriora quàm anteriora, & exteriora quàm interiora, frigidiore sunt. Cæ-

terum cum hæc ratio communis sit feminis & viris, & utrique magis posterioribus quàm anterioribus, & exterioribus quàm interioribus rigere incipiat, tamen feminæ magis quàm viri incipiunt à lumbis, quia habent vteros lumbis alligatos, qui frigidis partionibus maxime capiuntur, & viri magis quàm feminæ incipiunt à cubitis, & femoribus, quia femur impis, ut dictum est, est maior causa incipendi à lumbis per dorsum in occiput. Hinc tamen non fit, ut viri incipiant sæpius à femoribus & cubitis quàm à lumbis, neque contra: sed ut ab utrisque æque aut ab alterutris, ut conigerit. Probat verò Hippocrates partes posteriores frigidiore esse anterioribus, quia in anterioribus cutis rarior est, esse autem cutem rariorem indicat pilus, qui in anterioribus magis abundat. Vtrumque autem, & amplitudo inquam pororum, & abundantia pilorum, indicat calorem: & pili quidem abundantia indicat pororum amplitudinem.

Quibus nihil mali accidit intra constitutum tempus, singula partes vitales edunt.

Id est quibus nulla causa abortus accidit, sed manent illæ vsque ad constitutum & fatale tempus exendi, partes vitales edunt. Partes non vitales sunt non quæcumque rectos nati moriuntur (moriuntur enim citò multi alioqui vitales, obstratum aliquod, aut morbum, qui superuenit) sed qui ob imbecillitatem quam ex vtero trahunt non possunt vivere. Huiusmodi autem sunt, qui aut nondum ortui maturi ante tempus legitimum abortiuntur, aut qui intra vterum morbum aliquem contraxerunt: quoniam noddum soluto, eduntur. Ergo dicit Hippocrates quibus ante constitutum tempus, nihil accidit, id est, nulla causa abortus, quæ ante tempus exire coegit, & nullus morbus qui vel in ipso tempore fecerit exire debilem, in ipso tempore nascuntur vitales. Sunt autem abortus cause missio sanguinis, atque omnino alimentis subtractio utcumque facta, corruptio fetus veneno, aut admodum medicamentosa re accepta, ut vehementer mouente menstruas euacuatione, aut expurgante medicamento, aut motus vehemens corporis aut animi, atque ob vehementem animi motum, quantum ego existimo (et si medici quidam aniles quasdam fabulas de hac re somniant.) Pica, seu appetentia rei aliquæ quæ potiri non datur. Morbosos exire fieri facit, aut morbus aliquis, aut maligna cacochymia parentum, aut prauus vicius vtero parentis. Debiles facit tenuis vicius parentis vtero, aut euacuatio aliqua fluens, quia hæc cum fuerit, impossibile est fieri esse fortem, ut in aphorismo dicitur. Quibus ergo nihil horum accidit intra constitutum tempus,

in ipso constituto tempore eduntur & vitales. Constat tamen intelligi debere, si quæ vtero gerit sterilis non sit. Est enim quoddam genus sterilium (ut Hippocrates ipse libello de sterilibus dicit) quæ concipere quidem possunt, tamen non possunt deinde retinere, propter etasitatem, aut humiditatem, aut ob exiguitatem vterorum, aut quod omnino dilatare pro factum magnitudine non possunt. Talibus sane abortus sunt quibusdam certo, quibusdam in-

certo tempore, etiam si nihil dictorum accidat. Tempus partus non est tam constans mulieribus, quam aliis animalibus, vt Aristot. 7. de hist. animalium, & Plin. 7. hist. naturali dicunt. Habent enim multa tempora, in quibus naturales partus solent incidere. Capta verò & omnis qui 30 mensis semper, ius quarto, affina, & equa vnde comar, & ita aliorum animalium vnumquodque De temporibus naturalis partus habuisti sunt multa, & à latecon-
sultis, & à medicis. De vndecimestri aut possit esse vitalis, ac multò magis de duodecimestri, & de octomestri, ac de minori septimestri. Nonum mens-
sem esse maximè omnium naturale tempus partus, & eo omnes ferè in lucem ed, experientia est con-
firmatissimam, & nemo dubitat. Septimo etiam, & decimo mense edi posse vitales, concedunt omnes.
Vndecimo mense posse edi vitalem, negantur quidam iureconsulti, tamen de hac re consul-
tus Dignus Adrianus, considerata causa, decrenit, posse. Idque metiò. Nam Hippocrates etiam id
dicit pluries. Vltra vndecimum menssem produci
posse partum nemo dicit, præter Auicennam, qui
quatuordecimum etiam aliquando attigisse, se à
quodam accepisse dicit. Octomestris adeò non pu-
tatur posse esse vitalis, vt siquis videatur octano
mense natus viuere, puer aut mulier conceptionis
tempus ignorasse. Ante septimum mensem, aut ante
centum octoginta duos dies posse aliquem edi vita-
lem, negat Hippocrates. Ego vix quippiam in rebus
naturalibus, quod omnino impossibile, aut necessa-
rium sit, esse affirmo. Horum causas, referunt in nu-
merorum naturas, qui sectantur Pythagoricam phi-
losophiam. Astrologi in stellis errantes. Hippocra-
tes lib. de octomestri partu insinuat tres causas, quas
nos lib. 2. cont. vno capite complexi sumus, primam
ex proportionem temporum prægnationis, quòd sei-
cet tempus motus sit duplum tempore figuratio-
nis, & tempus partus triplum tempore motus. Se-
cundam quæ ex numero quadragenariorum, quòd
quandagenerat quidam magnam vim habeant in affecti-
bus fetuum: iucundat verò septimes quadragenar-
ius in nonum mensem, & quinquies in septimum.
Tertiam quæ refert hos euentus in proportionem
causæ fidei et materis, & in expectantiam. Di-
ctum mihi est loco citato, primam causam non satis
efficiendam (quamquam proportionem illam tem-
porum prægnationis teneri sapiebat Hippoc.) vel hoc
loco statim post hanc verò secundam esse commo-
diorum, tertiam omnium maximè ceteri calumnia.
Verum hæc & illo loco, & in commentario libelli
de alimento dicta sunt fusius.

*Apparentia quibus mensibus accidunt vi-
dendum est, liberos certis circumscribitur sunt &
satis qui septuagesimo die mouetur, in tripli-
ti temporis intervallo perficitur.*

Eadem sunt quæ vocat *tempus gestationis* & quæ
Nimirum eas mutationes insignis fecus, quæ
temporibus quibusdam, & articulis prægnationis
contingunt & apparent, etis quibusdam, maximè
vero laboribus & doloribus, qui illis momentis
vero generandis accidunt. Cum enim moueri inci-
piat fetus, & vivificatur, quædam articulis, quæ-

Adam doloribus, quædam deliquis animi contri-
buntur, vt quædam mulieres dicant se anime ingressum
sensisse. Hæc ergo apparentia dicit oportere confi-
derare quibus mensibus fiant. Nam sunt ex quibus-
dam circumscribitur, quorum ratione habita, poterit
præsentire tempus partus, si die conceptionis no-
tata, consideres. Nam quod in septuaginta diebus
mouetur, in triplicibus, hoc est biscentum & de-
cem perficitur. Quantum autem certitudinis hoc
habet, dictum mihi iam est.

B
*Post menstrua aliquando dextra, aliquan-
do sinistra hiant.*

Duplici causa à recens facta euacuatione me-
strua, facillimè fit obceptio in plerisque, & quia na-
pertimè aperta hiant, & os vteri, & quæ in vterum
hiantur venæ & arteriæ, & quia recens vacuatus
vterus auidè trahit humorem. Nam dum adhuc
fluit: malè tetinet vterus, vt pote conuerso per
eum ad euacuationem toto corpore, vt per id tem-
pus non concipiant nisi quædam, quibus vterus ad-
eò conuiet natura, vt nunquam satis hiet, nisi
dum fluit: reliquo tempore omnibus conuiet
aliquantò plus quàm à recens facta euacuatione. Ergo
post menstrua facile concipiunt, quia hiant vte-
ri partes, aliquando masculum, aliquando femi-
nam, quia dextra hiant, aut sinistra, aliquando ge-
minos fetus, quia utraq; hiant. Quare gignitur
secundina vterique vna, & fetus duplex. Neque
mirum videri debet, non in dextra, neque in sini-
stra parte, non in vtraque, fetum gigni, etis vte-
rus muliebri sinus non habeat: sed vnicum ca-
uum. Habet etiam nihilominus in lateris vterumque
distributas venas & arterias, secundum iusticiam
& æqualitatem laterum, quam natura semper te-
nuit, quibus productis secundine sunt, quibus
fetus continetur, & alitur. Fiant ergo non ex dex-
tris, nunc ex sinistris, nunc ex vtriusque. Cur matres
in dextra, femine in sinistra gignantur magis (quod
etis hic non dicat, insinuat tamen, quandoquidem
differentiæ laterum meminit) dictum mihi est in
commentatione aphorismi quadagesimi octauise-
cundus quatuor.

E
*Humiditas quæ per excrementa significatur,
vitiis ratione siccissima opem habet.*

Mulieres non concipiunt, quòd habeant vteros hu-
midos, & excrementosos, adeò vt neque auidè reci-
pian semen, neque possint retinere, quæ quidè dis-
positio contraria est ei, per quæ indigent menstruis,
vt hiant vteri. Agnoscentur hæc dispositio excrementis.
Effluunt enim macula quædam frequenter. Curant
vitiis ratione siccissima. Nonne vitiis hic intelli-
gi debet tota ratio viuendi, quæ & curationis ra-
tio continetur. Nā hinc passioni non semper solas
videtur, qui in cibo & potu consistit, est satis, curatio
vero fuerit, vt in aliis morbis, contraria affectui. Vt
hinc constet quàm non in vna ratio curandis quæ
non concipiunt, vt vulgares medici sibi persuad-
ferunt, sed varia & multiplex pro ratione causæ.

quæ siccitatem parit. Quasdam enim omni ratione humectare, quasdam siccare, quasdam tantum calfacere, nonnullas etiam refrigerare, & humectare convenit.

Qui citius formatur & movetur fetus, rursus augetur tardius & in longius tempus.

Mulieria corpora cum geruntur vterio tardius recipiunt figuram & motum quam masculina, postquam vero hæc nata sunt crescit citius, & breviori tempore, idque non solum dum vterio geruntur, sed postquam edita iam sunt, atque ita citius decrevant senescentia: masculina contra in vterio discernuntur & moventur citius, deinde crescant tardius, produciuntur eorum incrementum in longius tempus, atque adeo crescant & vivunt plus. Hoc ergo est, quod Hippocrates dicit, quod citius formatur & movetur, augetur tardius, & in longius tempus. Causam vero huius necesse est esse in differentia temperamentorum utriusque sexus. Nimium mulieria corpora sunt humidiora & frigidiora, maximeque opottet talia fuisse principia, ex quibus sint generata. Humidum vero difficile recipit figuram propriam, ergo embrio humidior, tardius recipiet figuram, ac proinde etiam animam. Nam cum anima sit corporis talis, hoc est ad vitam bene dispositum, præcipua autem dispositio fit organorum formatio, quæ tardius figuram recipiet, tantum etiam tardius & animam, quæ non aliter quam motu agnoscitur, quare & motum. Ergo corpus muliebre, quia humidius, tardius recipit figuram, & motum, atque hæc ipsa causa citius crescit, quia quæ humida facilius quam sicca dilatantur, dum est calor, qui id facere potest. Est vero mulieribus primis annis, quod est frigidum sicut natura, tunc per ætatem calent. Cessant vero citius ab incremento, crescantque minus, quia frigidiore sunt, non potest earum calidum incrementum usque adeo producere. Itaque augetur citius, quia humidiores, minus vero, quia frigidiore. Accedit illa menstrua evacuatio sanguinis, quæ mox atque accidit, tollit corporis incrementum.

Labores contingunt circa tertium diem supra quinquaginta, & circa sextum supra centum: super menses numeris secundo & quarto mense: quæ ad factum septimestrem vix oportet.

Dixerat antea labores in circuitibus. Nunc circuitum quendam laborum narrat, qui observari solet in futuris septimestribus, non quidem necessarii in omnibus, sed in multis. Sentunt videlicet labores quinquagesimo tertio, & centesimo sexto. Maxime hoc est, si per menses velis dicere, secundo & quarto: Nam quinquagesimus tertius dies secundus, centesimus sextus quartus mensis est. Hoc quidem, qui in Hippo. observatione vult acquiescere, minori labore recipiet. Si tamen dicendum de causa sit, quid, quod si non evidens, consentaneum tamen sit, ea esse videtur, quod de diebus quinquaginta novis, qui duo menses sunt, detractis septem, qui ob expur-

gationem menstruum plerumque detrahi debent, supersunt quinquaginta duo. Est ergo quinquagesimus tertius primus tertii mensis. Vt ergo in morbis acutissimis, qui plerumque moventur imparibus magnam viam habet tertius dies, ita in prægnatione brevissima tertius mensis. Nam mensibus constat & finitur tempus prægnationis. Est aliud genus articulorum prægnationis maxime insigne, quod in quadragenariis est. Centesimus vero sextus incidit in tertium quadragenarium, proinde hic quoque labores affert, hic vero magis quam alius eiusdem quadragenarii, quia complet tempus duplum tempore primorum laborum, redeunt vero hi secundum quasdam proportionales. Sed si quinquagesimus tertius affert labores, quia primus tertii mensis quo pacto est secundus mensis? Certè secundum computationem vulgarem mensium græcorum aut latinorum. Nullus enim computans menses, detrahit de mensibus integris, eth ratio, ex quorundam dictum detractione, constat.

Aut à mensibus numerandi sunt novem menses, aut à conceptione, & in ducentis & septuaginta dies græci menses inducunt, & siquid amplius extrahatur, aut maribus, aut feminis hæc aut contraria accidunt.

Nunc docet prædicam rationem computandi in partu legitimo, ac frequentem, quem dicit esse novem mensium græcorum, hoc est, qualium in Græcia erant communis usus, qui erant triginta dierum. Novem ergo tales menses habent ducentos & septuaginta dies. Sed dices, novem menses tales, incidunt in ducentum lunares. Videtur vero haberi debere, iuxta dictas hic & alibi causas, ratio lunarium, ergo parva communes decem mensium sunt: non novem. Ita est profecto, quodammodo novem, quodammodo decem mensium sunt. Atque ita componuntur facile autorum verba, si quando sine in natura historiographis, sine poetis, siue etiam in literis sacris, legitur, nunc novem, nunc decem mensibus fieri. Novem enim fieri plerumque scribunt omnes sequenti vulgare computationem. Sed & Virgilius de communi partu intelligens dicit, matri longa decem tulerint fastidia menses Aëstor. quoque 7. lib. de hist. animal. cap. 4. dicit feminas magna est parte decimo mense parere. Sunt verbi hic decem, novem menses græci. Est autem hic finis partus communis, potius quam lunares novem, quia longius abest fortis, qui græcos novem complevit, & sexto quadragenario, quo ut Hippocr. censet, ægrorabat, quam qui lunares. Quod autem sit exactè hic finis, scilicet 270. dies, causæ est proportio efficientis ad materiam. Causam enim celestem nullam scio, quæ huic finis admodum quatret, nisi forte id faciat æpeius tetragonus Solis, quem ferè illo die habere incipit: cum puncto quo facta fuerit conceptio, quæ præcurret tres partes integri circuli. Computatio huius communis partus incipere debet à conceptionis die, si modo is agnosci possit. Sicut vero novumquam induria necessaria, ut cum ex unico congressu cum viro conceptum est: semper autem licet considerare eas notas, quas Hipp. lib. de

genitura his verbis scripsit. Postquam coluit mulier, si quidem conceptura non est, foras procedet genitura, ubi femina vult. Quod si femina partus petita sit, & cognoverit, quando genitura non exierit, sciet quia die intra se ipsam concepit. Rursus libello de caribus dicit, Satis manifestum est, harum rerum petitis, quod mulier cum in ventre concepit, statim horret, & calor, & dentium stridor consequitur, & conuulsio occupat, tum articulos, tum totum corpus, & vterum segneries & torpor. Signitur his signis agnosce posse diem conceptionis ab illo incipere deberet computatio, si minus, à menstruis, non quidem ab his, quæ vltimò fluxerunt, sed ab eo die, quo primum defecerunt, cum expectarentur. Nam à die conceptionis procedit dies 170. Peritatum autem esse diem conceptionis esse ipsosmet diem, quo fluxerunt, sine primum sine vltimum quo fluxerunt intelligas. Si ergo computatio fiat à menstruis fluxentibus, semper videbitur produci partus ultra nonem menses graues, etique computatio incerta, atque non raro peccabitur in vultu, putante muliere se iam ingressam nonum, cum nondum egressa octauum mensem sit. Si autem fiat computatio à menstruis deficientibus, semper attinget nonum mensem, & nonnum excedet. Nam pariet post 170. dies, exceptis tot quor præcesserunt à die conceptionis usque ad diem deficientium menstruum. Si igitur concepit recensens purgata, pariet in initio noni, si cum iam menstrua immoerent, in fine, si inter hæc, medio mense: semper tamen intra nonum præcedet, & ultra ducentos septuaginta nunquam producet, si modo partus communis sit. Quoniam autem nonnumquam contingunt partus singulares longiores, addidit, & si quid amplius extrahatur. Atque quoniam nulli dicit partus necessarij sunt, neque quidem alij maribus, alij feminis necessarij sed quibus eorum masculis & feminis potest accidere, & contrarijs, addidit, aut maribus, aut feminis hæc aut contraria accidunt. In quam sententiam dicit libello de alimento, enumeratis partibus est, & non est. Hic verò quiddam aliud addidit, dicens & maribus & feminis. Scilicet non tantum non esse hominibus certum aliquem partum, sed neque sexui cuique suum. Sed utrosque mares, scilicet & feminas, posse his aut aliis diebus nasci. Quare quod Aristot. 7. de hist. animalium, mares magis quàm feminas fieri septimestres, feminas magis decimestres dicit, non admodum probat. Nam præterquam quod feminas vidi septimestres, tamen neque ratio admodum est pro illa sententia. Nam etsi tardius recipiant figuras & motus, non crescant tardius, sed et dictum nuper est, etiam citius, & proinde incidunt & marium & feminarum editus in eadem tempora.

Cibus & potibus humeri ac mamma inflantur, & eorum quæ sunt in capite infirmis ates, & inflationes incrementa recipiunt.

De vtero gerentibus loquitur haud dubitè, dicitque illis mammas & humeros intumescere (hoc enim significat hic verbum, inflari) nam hæc est nota prægnationis inter cæteras, quod mammae in-

A tamuerint, & solidæ ac duræ factæ sint. Quod apophorismus 51. & 53. particulae quintæ insinuat. Facie verò hunc tumorem sanguis, cum versus vterum vocetur vndique, in venas mammas & vtero communes venit, & in utramque partem abeundat. Sanguis verò est commune alimentum, quod rationem sequitur semper cibi & potus, atque ut Aristot. dicit. 2. de partibus animalium cap. 3. quoties cibis non ingeritur sanguis deficit, quoties ingeritur, augetur. Atque si alimenta bona assumantur, sanguis integer est, si praua, vitiosus. Igitur si vtero gerens laute capiat potus & cibos, non vtrumque mammarum, sed humeri ac mammae replebuntur: atque debilitas, & repletio capitis, si qua mulieri antea fuerat, ant ex conceptione superuenit, incrementa recipiunt, tumorem comparantibus humeris & mammis. Nam si, quibus in mammas sanguis colligitur, tumorem indicat, quia significat sanguinem melancholicum ferri in partes superiores, profectò quæcunque redundantia in mammas & humeris, potenter capitis repletionem, & imbellicitatem, quæ redundantia statim succedit, quæ quod mammas distendit & humeros, forsam petat.

Donec ossa solida sunt, mensium circuitus est. Quæ ante hæc sunt grauiora sunt, laboribus octimestrium germana, & primiparatum.

Ossa recens natis sunt mollia, & tæta, & laxius posita, procedente ætate dureseunt, densantur, & conrescunt. Itaque senibus iam solida sunt. Menstrua sanguinis euacuatio naturalis est eo genere, non quod semper mulieribus accidat, sed quod omnibus, etiam non semper. Nam neque in puertitia, neque in senectute, sed fieri incipit pubescentibus, desinit senectutibus. Est itaque circuitus mensium ab initio adolecentiæ (quia arbitror ea ætate est iam minor euacuatio insensibilis, atque per corpus totum dissipatio) vsque ad finem consistentiæ, & iniquam secundæ senectutis. Quo tempore frigidum & sicum iam est corpus, & sanguine minus abundat. Igitur ut dicit vsque ad senectutem mensium circuitus est, vsus est hac periphrasi, donec ossa solida sunt. Quod addit quæ ante hæc sunt grauiora sunt, videtur significare ante euacuationes menstruas esse difficultates & dolores, idque est verissimum. Nam secretio magnos labores infert. Tamen quod addit, laboribus octimestrium, & primiparatum germana, videtur in alium ferre sensum. Nam labores abortiuum facientium octavo mense, & primiparatum super insigniter graues: illarum, quia ægrotat fetus, & ipsæ etiam ob malam aliquam affectionem remant partum intempellum: harum, quia non hiant satis vteri. Quorsum ergo conferret quæ antecedunt menstruas euacuationes in commune, cum doloribus octimestrium & primiparatum? Proinde potandum est eum loqui, non de omnibus menstruis, sed de vltimis, & quæ antequam omnino cessent, sunt. Illæ enim solent fieri, cum magna difficultate, & doloribus, nunc exigua, oñe profusa, & sine certo ordine rarecentes. Quia sanguis iam ea ætate crassus, non nisi cum magna difficultate,

G

per vias angustiores, duriore, & minus dilatiles, effundi potest. Proinde in primis rarefcit, sex mensium nonnunquam intermissione faciens, nulla quæ sentiri possit noxa corpori accidenti, deinde rursus multum nitente natura, multum pellitur crassi, ac cum eo etiam tenuis, duratque omnium evacuationio, ac non paucæ hac occasione, profluvij menstrui periculum incurrunt, manenteque cum sistitur sicca & exsiccæ, atque hæc ipsa causa, in posterum sine ea evacuatione transigunt.

Lac nutrimento mutationem accipiente, octimestri verò perfciente.

Generationem lactis, & tempus quo in vtero gerentibus primum apparet, docet brevis hæc oratione. Lac fit nutrimento mammarum (id est sanguine, qui ad nutritionem mammarum venit) mutationem accipiente. Nutrimentum mammarum in sui substantiam trahentes sanguinem, lac faciunt, cum abundat quidem sanguis, & committatur iam abundanter, ut redundet, & exugi possit, cum non adeo abundat, commutant, quantum suæ nutritioni satisfiat, nullum autem exigitur. Quibus menstruo evacuationes sunt, raro fit lac, quia eadem est materia utriusque sed neque vtero gerentibus, quia insuntur eam materiam in fœtus generationem, sed prægnationi succedit lactis proventus, ut oportet scilicet, quo infans recens editus, lacte nutritur. Succedit vtero lac prægnationi non affatim; sed paulatim, ut succedat aliæ mutationes solent. Atque non pumiam editus infans est, incipit primum lac fieri, sed cum iam partus instat, incipit apparere, ut scilicet, cum iam vti eo infantem oporteat, maturius, concoctius, ac velut paulatim paratum lac fit. Incipit quidem aliquibus prius, plerisque autem octavo mense lac in mammis apparere. Quod Gal. docet in comment. aphorif. 39. quintæ particulæ. Huius autem rei causam esse puto, quod vltimis mensibus, octavo inquam & nono, multum iam crassior sanguinis congestio est in venis & arteriis vteri, per quas fœtus alimentum trahit quod indumenti sanguini impedimento est. Fœtus verò magnus iam multo indiget, & multum trahit, multus ergo tractus, & penetrare oon potens, recurrit per communes venas ad mammæ, qui recursus, & ad lactis, cuius usus iam incipit, præparationem utilis est, & ut fœtus alimenti penuriam magis sentiens, calcitret, dirumpatque acetabula, & in lucem prodeat. Hæc autem omnia ita mensuravit natura, ut necessarias causas, quæ fieri expedit, aptauerit. Post enarrata verba succedunt quidam aliæ de vlcibus, tamen ipsam res, de qua agitur, indicem, dilaceratas, & male commixtas esse hæc dictiones, transferendaque hæc esse verba hæc.

Quapropter menses quales octimestrium, qui sunt ad decimum tendentibus, malum.

Datum est lac fieri incipere vtero gerentibus octavo mense, quia per partus, naturaliter habent

tibus, sunt menstrua evacuationes, dum gerunt vtero, aut dum lactant. Sed à principio prægnationis insuntur in fœtum, deinde in lac illa materia. Propterea (dicit) menses quales octimestrium, qui sunt vtero gerentibus, tendentibus ad decimum mensem, malum. Insinuat verò hæc brevis dictione multa: imprimis, malum esse fieri menses vtero gerentibus: deinde solere esse talibus difficiles, & quales octimestrium, deinde solere fieri hos tendentibus ad decimum, id est, paritoris oon ante decimum, aut vndeclimum mensem prægnationis, quibus scilicet partus producendus est ultra consuetum tempus. Sane verò hæc omnia rationi consentanea. Nam si vtero gerenti fluat menstrua: impossibile est fœtum esse sanum, ut in aphorismo dicitur. Quod si ægro fœtu fluant, laboribus, quos ipsi fluxus asserere solent, accedentibus aliis ex fœtus ægrotatione, eunt quales octimestrium, id est octavo mense abortientium. Quibus verò hæc fluat, merito partus producit. Quia si robustus fœtus, non potest vitalis exire, nisi post laborem septimi mensis quadraginta dies quiescat, debilis pluri tempore indigebit ad refectionem, & præter hæc, senis veniet ad perfectionem. Duplex enim ratio esse potest, qua partus producantur, aut quod ob amplitudinem viarum matris & fœtus, & naturam alimento abundanter, tardius sentiat fœtus alimentum penuriam, & respirationis indigentiam: aut quod ob debilitatem, tardius veniat ad perfectionem. Illi eduntur robusti, ac tanto citius, quam solent alij, ridem, quanto tardius nati sunt: hi habent omnino contraria. Atque ita partos producti nonnunquam meliores, nonnunquam deteriores sunt, quam communes.

Si in vlcibus grauibz tumor non appareat, magnum malum portenditur, laxi sunt viles, crudi deteriores. Quibus tumores in vlcibus adsunt non valde conuelluntur, neque insaniunt. His autem evanescentibus repente, quibus quidem in posteriore erant, conuulsiones cum doloribus accidunt: quibus autem in anteriore, aut infanz, aut dolores lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationem lenantes, fallaces sunt; ut Andronici puero erysipelas recurrit. Nisi in eundem locum veniens vtile aliquid significet. Hoc ex generatione circa aurem, ad pabem distributum est, alteri tertia die ex nativitate factus tumor suppuratus est nona. His septima die sanus evasit. Deteriora sunt, quæ repente evanescent.

Aphorismus 65. & 66. & 67. sectionis quintæ hæc eadem, eisdem serè verbis, scripta sunt, quæ cum in comment. mihi explicata sint, hand erit hic multum immorandum. Vbi legi crudi deteriores, habetur in Græco codice *αυτοματου* id est, farsum pascens: sed restitimus hanc locum ex

aphorismo, quo legitur *diuina*, quam lectionem sequitur Galen. in commentationibus. In vulneribus tumores non apparere malum est, quia secundum rationem apparent, fluxionis gratia. Atqui, etsi medicus curat tumores medicamentis accere, nihilominus, medico id non moliente, sponte sua non apparere, non est bonum. Quia apparentes tumores, etsi mali sint ut causa, quia prohibent vlcis curationem, tamen non mali ut signum. Atqui legi potest, si tumor non appareat magnus, malum. Aut si tumor non appareat, magnum malum, litera græca utrumque sensum fert, & uterque est verus. Nam dicit in granibus vulneribus, id est, in magnis & malignis, ut quæ circa articulos, aut in nervis sunt. In talibus verò non satis est apparere qualescumque: sed magnos etiam tumores petit ratio vlcis. Si verò in foribus vlcibus, non apparere tumores magnos, est malum, nullo apparere est magnum malum: oportet enim apparere, & magnos. Non tamè qualescumque si appareant, agitur bene iam cum iegroto: sed si molles, seu laxi id est facile cedentes curationi: crudos enim id est, rebelles, & insuperabiles auxiliis, apparere deterius est, fortasse etiam quam nullo. Dicitum enim mihi in comm. aphorismi est, illud laxi, & crudi metaphoricè accipi, ac significare quod dictum est. Quis autem prober in vlcere Carbum, aut Carbonem? Tumores verò mites apparere, bonum. Quia quibus tumores in vlcere, non valde conuelluntur, neque insaniunt, quæ signa perituri ab vlcere maxime solent accidere. Quibus verò non sunt, aut euanescent, sunt hæc, & alia non minis mala, pleuritidis fortis, suppuratio, aut dysenteria cruenta. Docens Hippocrates, quibus hæc, & quibus illa, dicit in aphorismis. Quibus à postea posteriori, conuulsiones cum doloribus, quibus à anteriori, infans, dolores acuti lateris, suppuratio, dysenteria, præcipue si rubri fuerant tumores. Hic dicit: Quibus in posteriori, quibus autem in anteriori parte. Sed eadem res est. Nam quibus à posterioribus, proinde sunt illa, quia in posteriore, & quibus à prioribus, quia in priorè. Nimirum, quia posteriora vlcera, rectitudinè habent cum necrotum exortu, in eum à posterioribus recutitur, & conuulsiones cum doloribus sunt, & quia anteriora, cum cerebro, thorace, & ventre maiorem societatem habent, illis timetur, cum euanescent repente tumores. Nam salus est, tumores repente euanescente, quod Hippocrates multis docet, & nunc recordatus pueri Andronici exemplo confirmat. Fieri tamen aliquando potest, ut cum bono aliquo euanescat tumor, si scilicet ad certam aliquam partem recurat, eamque contingat esse humiliorē, exteriorē, & ignobiliorem (nam ad tales salubriter fieri abscessus. 2. sectione huius 2. libri dictum est) velut euidam, cui ex *γαστρικῇ*, id est, ab ortu, fuerat circa aurem tumor, enauit: sed ad pubē distributus est, facta scilicet est ad pubē permutatio, eaque euanescentia tumoris non fuit mala. Alteri (huius nemini obiter, quod fortè fortuna eodem tempore obseruauerit) tertius, ex qua uarus est, factus est tumor, & suppuratus est nona. Intelligi potest nona ex maturitate, & ita quasi suppuratio ipsa sanas euasit, addit, hic septima supsanus euasit, quia septima à tumore erat nona à maturitate. Aut nona à facto tumore, atque sanus euasit septima à suppuratio. Vtrumque hoc factum

A fit, cum malum sit tumores circa vlcera non apparere ob dictas causas, deterius tamen est, cum apparuerint, repente euanescente, cum non in certam aliquam partem, eamque ignobilem conuertuntur. Proinde concludit totum hunc sermonem Hippocrates his verbis. Deteriora sunt quæ repente euanescent.

B

SECTIO IV.



HEPATITIS per lumbos usque ad magnam vertebram inferne fertur, indeque vertebris committitur, sublimis per iecur ac septum transversum in cor sedit, & hæc quidem recta ad clauiculas, inde autè alia quidem in collū, alia autem in scapulas alia autem deorsum reuertentes, ad vertebras & costas inclinant, & ex sinistris quidem una propè clauiculas, ex dextris autem, ad quandam regionem alia. Hæc autem paulò inferius reflexa, unde quidem illa deficit deferuntur iuxta, costas reliquis omnibus, hæc hinc atque inde, ramos in quancumque tribuit, una cum sit. A corde quidem ad regionem quandam in dextris magis existens, in ea quæ sub arteria usque dum delitescat, & edueniat, unde hepatitis elenari caperat. Prius autè quam ed perueniat, iuxta extremas duas costas diuisa est. Et quum in utramque vertebrarum partem peruenit, consumitur. Recta autem a corde ad clauiculam contendens supra arteriam ena dit, indeque velut dum iuxta lumbos est sub arteria delitescens fertur ad hepatis partem quidem in portas & fibrarum partem excurret in reliquum quod est parum infra septum transversum. Septum autem transversum adhaesit hepatis, à quo non facile separabitur. Gemina autè à clauiculis, hinc atque inde sub pectus in abdomen procedunt. Quod autem inde ferantur, nondum noui. Septum autem infra iuxta vertebram quæ sub costis, quæ ren ex arteria hæc circumcingit. Arteria quidem ex tendine nascuntur, hinc inde arteria tonum habentes. Hic iam tandem finitur, quæ recurrit à corde hepatitis. Ab hepatitis autè per septum transversum maxima duo, alia hinc, alia inde, feruntur sublimis, multisfida autem per septum transversum sunt circum circa illud, & inseruntur superna per septum. Hæc autem præcipue conspicua.

Confer Iacobus Streue totam hanc dictionem, & quæ mox succedit, historice venarum, & netuorum, esse adulterinam, & ab aliquo imperito, aut impostore, huc cōiectam: quod narratio non videtur satis distincta & exacta, neque, ut ille putat, vera atque aded, quia occurrit hic nomen arterie pro arteria.

ut, cum id nomen non soleat antiquis significare nisi asperam, vocenturque illis arteriæ læves, venæ pulsantes. Ego verò mihi imperavi, quæ in Hippocratis operibus repererim, neque aperte falsa, neque omnino indigna, etsi subfœcurnis, ac fortasse etiam indistinctius tradita, illius esse censere, quia leve est, leviter aut toti denegare (quanquam id sit aliquando necessarium) quæ ex multis seculis sub aliis nominibus recepta sint. Maxime quæ ut genuina ab aliis antiquissimis citantur. Velut hic locus citatur, non sine commendatione, à Galeno quibusdam in locis præcipue autem 1. de natura humana commettario contextus fœxi, ubi ita scripsit. Vna est vastissima vena, quam vocant canam, per gibbum iecoris tota animantis longitudine portecta. Dicitur autem septum transversum imam animantis regionem à suprema. Hæc vena causa septum transversum penetrat, contenditque supra ad cor, infra ad spinam secundum iecoris gibbum peruectæ, itaque ex illa quæ supra petit, tanquam caudice, venas supra septum transversum germinari, aperte cernas, ex altera quæ ad spinam diuerit, inferiores. Horum Hippocrates in 1. morborum vulgarium autor est, ubi iecorariam appellat causam venarum. Hæc etiam confirmant quotquot anatomiam tractauerunt. Hæc Galenus. Itaque eo enarratore, hæc ab Hippocrate scripta sunt, atque adeo quæ Hippocrates hoc loco docet, sunt quæ Galenus verissima, & ab omnibus qui anatomiam tractauerunt confirmata, esse dicit. Esse vnam aut alteram voculam, additam, detractam aut transpositam, possum adduci, ut credam, ob libri veritatem, tamen omnino negare esse Hippocratis, neglegentiæ esse puto, nisi cum id ob maximas causas sit, quæ profectò hic sunt nullæ. Nam etsi hæc quæ de venæ distributione dicuntur, dici fortasse possent distinctius & fusius, tamen dicuntur verè. Quod quidem satis est, illo præcipue seculo, quo nōdum erat anatomie historis adeo culta. Nam faciendū & elegantiam ab Hippocrate quis requirit? Ego certè nuperrimè hunc locum discipulis meis enarraui, non aliter quam posita ob oculos vena, facta quæ coram multis illorum eius dissectione, quæ facile intellexerunt quæ docet Hippoc. verissima esse. Hepatidem vocari venâ causam Galenus autor est, quod ex hepate oriatur. Causa autè vena est, non solum quia crumpit ex hepate: sed & in quancumque partem producatur, itaque tota vena non pulsans, dicitur hepatidis: arteria dicitur vena pulsans, ac non hepatidis, atque nonnunquā arteria sine addito, plerique arteriam lænem non significant, quia antiquissimi arteriæ nomen tribuebant asperæ. Magnam vertebra hic vocat coxæ articulum. Duo enim articuli solè sunt Hip. magni dici, hæc, & qui ex secunda cervicis vertebra sit, quem autem quoque loco intelligat, descriptione solè explicare: velut libro de ossium natura, dicens, Coxa verò magno verticuli, quod iuxta os factum est, ex ligamento cartilagineo ac nervoso adhæret. Hic magnum verticulum intelligit, quod in osse sacro. Paulo post addit, hinc vsque ad magnum verticulum quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbosa est. Hic hand dubiè intelligit secundam cervicis vertebra, quandoquidem dicit, supra supernas humeri partes est. Velut hoc loco constat significari articulum ossis sacri, quandoquidem dicit, per lumbos infernè. Hippocrates quidem hic vnicò illo nomine hepatidis, insinuat venæ principium, & venarum radicationem hepatis esse, ac pro-

A inde venas hepatis humiliores ab eo descendere, superiores ab eo ascendere, atque adeò communem superiorum & inferiorum venarum radicem, esse in ipsa hepatis parte gibba, quæ exit vena. Ibi diuiditur in duos magnos caules alterum sursum, alterum deorsum, iuxta spinam repentes. Incipiens ergo Hippo. narrationem ab hepate, caulem deorsum repentem vocat hepatidem in lumbis: repentem sursum, vocat hepatidem sublimem, & ab inferiori caule incipiens dicit hepatidè quæ in lumbis est, attingere per infernam partem vsque ad os sacrum. Profectò & vsque ad extremos pedes producit, sed quia in osse sacro secuitur in duos ramos, deficiente iam caule, in eam vsque partem produci dicitur, quasi non amplius procedat vna existens. Inde [inquit] idest ab exortu vsque ad extremum ossis sacri, in ipso osse sacro & lumbis vertebrae spinæ committitur, idest, iuxta spinam iacet producta. De hac venæ parte hoc tantum dicit, & ad sublimem transgreditur dicens: sublimis per iecur, idest per iecoris gibbam partem, ac per septum transversum in cor tendit, & hæc quidem, neque insumitur in cor, neque in illud intrat, sed præteriens iuxta, & in illius dextrum ventriculum mittens ramum, & recta ad claviculas ascendit, ubi in multos iam ramos secta, vna esse definit: velut de hepatide in lumbis antea dicebatur: abit verò eo loci in venas iugulares, quæ per cervicem in caput subeunt: quarum vna quæque in duas venas deinceps diuiditur: quarum vna inter nas, alia externas capitis partes adit. Præter has sunt eò loci alia tria paria venarum non tam insignium, quarum alia abeunt ad scapulas nutriendas (quæ venæ facere cōsuevit, ut raptum sanguinem in caput, dolor scapularum antecedit) alia eodem loco præ deorsum reflectuntur magis, & in vertebrae primas dorsi insuntantur: alia dux descendentes, vtrinque vna, à dorsi initio producantur vsque ad quintam vertebrae dorsi, & mittunt, quæcumque in summum latus ramulos conspicuos, qui nutrant quatuor spatia intercostalia. Antè autem quàm vena hepatis sublimis claviculas attingat, & vna esse definariabilis in venas hæc, demittit multas alias in via ad nutritionem partium consistentium in via, & è regione positarum: velut profectò venas axillares mittit in brachia, quæ in cubitis internæ vocantur (harum hic non meminit, etsi profectò insignes facis sint) atque mox ac cor prætergressa est, mittit per partem dextram venam quæ sine coniuge vocatur, quia ci nulla in sinistra parte respondet. Hæc cepit deorsum, incipiens quæ descendit duæ, quas diximus nutrire quatuor spatia intercostalia, & mittit in septem reliqua spatia binos ramulos, in vtrinque latus, vnum, atque ita sola hæc vena est pro duabus superioribus. Hæc docens Hippocrates, dicit, ex sinistris quidem, id est, in sinistra parte, vna solum vena (intellige reflectitur per spatia intercostalia) & hæc quidem propter claviculas, ex dextris verò, duæ. Nam vna propter claviculas: coniux eius quæ ex sinistris, & ad quandam regionem (ad quintam scilicet vertebrae thoracis) alia. Hæc autem paulo inferius reflecta, unde quidem illa deficit, deserit hæc costis reliquis omnibus, hinc atque inde ramos in quancumque tribuit, vna cum sit, vna scilicet & sine coniuge. Describens rursum hanc eandem venam dicit, à corde quidem ad regionem quandam in dextris magis existens, in ea quæ sub arteria vsque dum delatetur.

& eò veniat, unde hepatitis eleuari cepit. Idem ab ea parte qua cordis suprema pars est, orta ad regionem quandam procedens per partem dextram, decurrens sub arteria aspera, nam paritum latet dextra parte arterie recta, partem etiam sub tota arteria, mittit furculos in sinistra spina, & producitur usque ad eam partem quæ vena cava, quam sublimem appellauimus, ex hepate orta, sursum ferri cepit: hoc enim finitur: aut si quid amplius procedat, extenuatur adeò, vt desitescat. Prius autem quam eò perueniat, unde hepatitis eleuari cepit, iuxta extremas duas costas diuisa est, vt scilicet & iuxta superiores, est verò hæc vltima diuisio eius venæ, atque cum alia hinc, alia inde vertebrarum peruenit, idest. cum alia in hæc, alia in illam partem, alia vltra, alia citra vertebras spinæ peruenit, euascescit. Redit deinde ad hepatidum sublimem dicens, recta autem à corde (ab ea scilicet parte qua vena sine coniuge orta est) ad clauiculam contendens, supra arteriam euadit, indeque velut dum iuxta lumbos est, fertur ad hepar, idest à clauicula delitescit sub arteria, velut dum iuxta lumbos est & fertur, ad hepar. Ita illud, sub arteria, reperi debet: collatio enim est à clauicula venam, quæ ferebatur supra arteriam delitescere sub arteria, vt & ea quæ est in lumbis. Quod vt intelligas, scias hic arteriam vocari venam pulsantem: porro per totum corpus ferri venas cum arteriis, verum per partes extremas, cuiusmodi sunt, manus, erua, & ceteris. ad tota cutis. venas esse exteriores, sub illis tamen esse arterias in partibus internis, alioqui non essent venæ tam opportune sectioni. Atque intra corporis ventres, thoracem dico, & quod intra peritonæum, venas esse interiores arteriis, propiores enim sunt arteriæ spinæ, & illis incumbunt venæ. Necessè est ergo venas & arterias, cum iam sunt ex internis emerfuræ, positum mutare, atque eas quæ superstant, submitti: atque profectò ita fit, iuxta clauiculas vena quæ incumbere arteriæ thoracæ toto videbatur, sub arteria fit, atque ita tota ceruicæ exterior fit quàm arteria. Et vena, quæ per tota crura fertur exterior quàm arteria, iam ingressa ventris regionem sub arteria fit, & ad lumbos insitit in arteriam non per illam recta producta, rotius ventris longitudine. sed transuersum super arteriam tendens, transiens in dextram partem quasi tendens in hepar, partim in portas & fibræ, partim in reliquum partium arteria septum, idest partim in gibbæ & sublimem eius partem, ex qua hepatitis oritur. Dixit vero, vt hæc hepatitis partem significaret, partim infra septum, quia septum transuersum adnascitur hepan, à quo non facile separatur. Hoc vsque adeò verum est, vt semper ex inuicello cum hepate aliquid septi transuersi deportetur. His de hepatitis, quæ in lumbis & de hepatitis partibus, & septi situ obiter dictis, redit ad hepatidum sublimem, dicens, geminæ alix à clauiculis hinc inde sub pectore in abdomem. Hæc sunt venæ quæ de hepatidæ sublimi, qua iam feparantur venæ, ituræ ad brachia erumpunt in mammæ, & repunt exteriùs per thoracem, & per musculos rectos abdominis, vrtingue vna. Quare illud sub pectus, non dicitur, quod sub ossè pectoris feratur (fertur enim per anteriorem thoracis partem) sed quod non finit in thorace, sub & per illum feratur in abdomem, idest

A per musculos rectos, quò autem (inquit) inde fertur, nondum notui. Non habebat id exactum, neque mirum, nullam enim aliam in partem tendens, sed ibi cum ascendens ex vtero congressæ coalescunt. Redit rursum ad septi transuersi situm, & hepatitis finem, dicens, septi autem infra secundam vertebram quæ sub costis, quò ten ex arteria hæc circumcingit. Septi figuram & positum oculis contemplari oportet, vt hæc intelligantur. Est quidem musculus figuræ singularis. Nam quasi quòdam membrana carne tenditum, diuidens totum corporis cauum, per medium circumcingens, quæ finis est costarum. Ex illo ergo & costis fit thorax, velut ex eodem & peritonæo, venter. Hoc septum penetrant vena hepatitis à dextra versus sinistra partem sursum tendens circa partem anteriorem, & superior pars ventriculi à sinistra versus dextram oblique descendens circa medium, & arteria magna quæ à corde recta per spinam descendit. Hæc ergo penetrat septum in postrema parte iuxta spinam, quæ illud spinæ alligatur. Hoc est ad ultimam thoracis vertebram & primam lumborum. Quæ ut significet, dicit, septum circumcingit, hoc verbo innuens illius positum infra iuxta vertebram, quæ sub costis, idest alligatum vertebræ vltimæ thoracis: atque reuera alligatur vnde cum & duodecim. Describit verò hæc partem alijs notis dicens, quæ ten ex arteria. Nimirum illo loco erumpit, vt dixi, magna arteria; ex thoracæ in ventrem descendens: atque ex ea, in ipso egressu, recipiunt renes arterias. Ergo alligatur septi spinæ, quæ ten pender ex arteria. Quia scilicet procedit inde ad renes duæ arteriæ. Eodem fere in loco, ex vndecima vertebra thoracis, procedunt tendines quidam in quosdam musculos feruntur, quibus magna arteria, quæ per lumborum vertebras proeedit vsque ad os sacrum, utrinque habens unum, firmitudinis gratià alligatur, atque adeò & quæ tendunt in renes. Hoc vt insinuet, dicit, arteriæ ex tendine, nascuntur. Non nascitur profectò exteris ex tendine, sed eodem loco ex magna arteria nascuntur, quæ magna arteria erumpit ex thoracæ, & quæ tendines nascuntur ex vertebris. Itaque dicat arteriæ ex tendine nascuntur, habentes hinc inde arteriæ, idest ab vtraque parte arteriæ magis tonum (hos ipsos tendines vocat hic tonos) liciam tandem (inquit) finitur, quæ recurrit à corde hepatitis, idest vena sine coniuge. Sed quomodo finitur quæ septum transuersum alligatur spinæ, si verè ante dictum erat, eam produci vsque dum perueniat eò, unde hepatitis eleuari cepit, nam hepar infra septum transuersum est. Certe vena sine coniuge quodammodo finitur in vltimo spatio intercostali, quia ibi mittendi in vtrumque latus furculos finem facit, quodammodo artem attingit vsque ad eam partem quæ hepatitis eleuari cepit, quia ad eam vsque, ac fortasse etiam aliquantò plus procedit quidam gracilis illius venæ finis, vt cauda quædam matris coalescens. Non est tamen prima productio quæ ex hepatitis sublimi fit, vena sine coniuge. Nam cum hepatitis penetrat septum, mittit per illos supernam partem duas venas satis magnas, aliam hinc aliam inde, quæ per supernam septi partem multiplè per illud feruntur, & inferuntur lapernè, toto septo alimentum præstantes. Hic finem ponit narrationi venarum, dicens, hæc autem præcipue conspicue, quod aut de his vltimis quæ nunc

erunt septum intelligi potest (dixerat enim eas esse maximas) aut de omnibus dictis, quasi non sint expostae venae omnes, sed quae praecipue conspicuae. Non possumus negare multas venas non ignobiles omittas in hac narratione esse. Nam venientium ad brachia nulla est facta mentio, neque venarum emulgentium, neque genitalium, neque venae arterialis, tamen non proinde colligendum quae dicta sunt, non esse dicta verè, neque pro antiquissimo illo sculo parum exactè.

Duo autem nervi à cerebro infra os magni verticuli deorsum, & ad stomachum praecipue ex utraque arteria parte procedunt: uterque in seipsum incidit, vni similis, deinde ubi vertebra & septum transversum cohaerent, ibi desinunt. Et quidam dubij, ad hepatis & lienem surculi ab hac communione ferri videntur. Alii nervus ex utraque vertebrarum parte secundum spinam extenditur ex obliquo vertebrarum, & costis distribuitur. Velut vena ita etiam ij per septum transversum in mesenterium tendere mihi videntur, in his vero desinunt. Rursus autem ex eo loco ubi septum transversum cohaesit continuitate quadam per medium infra arteriam reliquum ad vertebrae distribuunt veluti vena, donec absumantur, quum ad os sacrum pervenerint.

Exiguum quiddam docet Hippocrates de nervorum historia, mirumque dicere multò plura: neque quidem quae dicat satis exponit: non tamen proinde non sunt haec verissima. Velut nuper non narravit historiam venarum omnium, atque externarum nullam mentionem fecit, ita nunc non omnes nervos neque eos qui in proximis ex quadam spinae parte procedunt, voluit persequi, sed eos qui in multas partes, quasi multis communes, per interna deferuntur. Hi sunt tantum duo, sextum par ortorum ex cerebro, & quintum ortorum ex cervice. Quamquam sextum cerebri par, recipit tantam accessionem & sepeimo, & quintum cervicis ex quarto & sexto & sepeimo, ut contingat dubitare, sexto, an sepeimo cerebri, & quinto cervicis, an aliorum alicui, tribuenda sit illa distributio. Quin & qui ex cerebro veniunt ex his qui ex cervice, accessionem accipiant, & hi ex illis, ut quocumque eorum alterutrum ferantur, videntur quodammodo ferri vtrique: tamen singulis in proprias fibras factis, & re ita explorata, constat eos qui ex cervice veniunt, ferri in medium septi transversi, deferentes illi motum, atque in illud multifariam distribui, ibique finiri, eos vero qui ex cerebro veniunt, cum primum attingunt supremam thoracis partem, portionem quandam mittere ad radices costarum sub membrana succingente costas, in initio quidem exigam, excurrentem verò per totum thoracem deorsum, & ex nervulis venientibus à vertebrae, in singulis spatiis intercostalibus, recipientem accessionem, & hanc quidem nervorum portionem, penetrare in ventrem cum arteria: ea parte quae sep-

tum vertebis alligari diximus, atque furculos mittere, in primis in ipsum septum, deinde & in omnes ferè partes infra septum positas, nam in fundum ventriculi, & omentum, & crassa intestina, quin & in tennia, iecur, lienem, & vesicam fellea, atque adeò & in genitalia: aliam potèr portionem dictam maiorem, per internum canum thoracis procedere, ex qua sunt nervi, qui vocantur recurrentes, & furculi mittuntur in pulmonem & pericardium, & quod eius, post has distributiones superest (est verò ad satis multum infumitur in os ventriculi. Totam hanc historiam narrat Hippocrates quamquam non satis distinctè, *ἄν* (inquit) *τῶν* idest duo nervi motus veniunt à cerebro sub os magni verticuli. Os magni verticuli vocat hic secundam vertebrae cervicis. Sed quo pacto duo illi nervi veniunt à cerebro, & sub os magni verticuli: certè duo nervi, sunt duo illi nervorum paria quae dicta sunt, sextae coniugationis cerebri, & quintae cervicis. Aliud nascitur ex cerebro, aliud sub os magni verticuli, & vtrumque fertur deorsum. Itaque legendum videtur, duo autem tamen, à cerebro & sub os magni verticuli, deorsum. Narrans deinde, quò tendant, dicit, & ad stomachum (idest ad os ventriculi) praecipue ex utraque arteria (aspetz scilicet) parte procedunt. Hi sunt tam sextae coniugationis qui per thoracis cauum feruntur, quorum pars sunt nervi recurrentes, vterque (inquit) in se ipsum incidens vni similis. Tria videntur significare posse haec verba, aut vtrumque cum altero coalescere multis locis, cum inquam qui ex cerebro & qui sub os magni verticuli, & constare vnum nervum, quasi eodem in seipsum per partes incidentem: aut vtrumque eorum nervorum qui à sexta coniugatione ex utraque arteria parte feruntur in stomachum praecipue, antequàm eò pervenerint, recurrere quasi in seipsum incidentem, quodammodo vnum, quodammodo duos factum: aut hos eisdem nervos cum os ventriculi attigerint, ita congregi, ut vtrisque in se ipsos incidentibus & complicatis, vni similis fiat. Deinde ubi vertebra & septum transversum coalescunt (ubi antea dictum est) ibi desinunt. Qui ibi desinunt, sunt nervi dicti sextae coniugationis, & nervi qui nascuntur sub osse magni verticuli, qui nervi septi transversus vocantur, quia in medium illas incidentes motum illi praestant. Et quidam dubij (nervuli scilicet) ab hac communione (idest ab hoc loco quo septum & vertebra coalescant) ad hepatis & lienem tendere videntur. Certè quaedam reliqua exigua nervorum oris ventriculi infumuntur in cauum hepatis. In lienem hinc non apparet quid feratur, sed ille proinde dicit, dubij. Alius (inquit) nervus ex utraque vertebrarum parte secundum spinam extenditur ex obliquo vertebrarum, idest alius nervus (hic est pars sextae coniugationis, quae sub membrana succingente costas repit) per vertebrae, quae vtrobique, & supra septum & infra septum sunt, extenditur secundum spinam, non per medias ipsas vertebrae, sed *τὰ ἀγὰρ σπινῶν ἄλκι* hoc est descendentes non nihil à vertebrae, & per thoracem, distribuunt costas; & ut venae (inquit) ita hi nervi (quod nunc dicit *ἀλλὰ* *τῶν* nunc idem nihil refert, nam est vnus vtroque in latere, per septum transversum in mesenterium mihi videntur tendere, & in his hoc est par-

tibus mesenterii, desinunt. Rursus autem ubi septum transversum cohibet, et ubi *transversum* cohibet, hoc dicit Hippocrates secundum ipsam rationem administrationis anatomicæ. Nimirum, licet nervum illam, qui sub membrana costarum descendit per septum transversum, confectam, persequique fureculos, quos demittit ad omentum & mesenterium, eisque ibi finitis, redire rursum in eam partem, qua septum transversum cohibet veretibus, ubi videtur nervi continui exsistentes, nimirum rami ex eodem caule, inde ferri iuxta medium corporis, sub arteria magna quæ illac descendit, & reliquum, quod sperest ex sexta coniugatione, variè distribuunt veretibus, ut venæ. Nimirum ut vena caua quæ illac etiam repet, demittit ramos in proximam quasque partes, ita illi nervuli. Sed quod dicit distribuere veretibus, iuxta veritatem non satis exactè dicitur. Nam ex singulis veretibus nascuntur nervuli qui coalescant cum fureculis, quos illi nervi demittunt, quare non magis tribuunt veretibus, quam ex illis accipiunt. Sed dicitur hoc, ut monui, secundum administrationem, ad quam nihil interest, nervi hi tribuant veretibus, an accipiant ex veretibus, modo dissecctor videat fureculos ex dictis nervis demissos, ire in veretibus. Atqui ita fit, usque dum consumantur, cum ad sacrum os pervenerint. Nam si quid contrahitur ex hac coniugatione tribuitur, id quoque sub sacro osse est. Itaque horum nervulorum historia, etsi non satis exactè, verè tamen Hippocrati narrata est. Quod tamen sæpe dicere soleo, nunc non omitam, partium historiam à nullo autore petendam esse, sed oculorum intuitu investigandam. Nam citra hunc, sola lectione nihil certi consequi poteris.

In Aeno qui leguminum esu continentur utebantur mares & famina, crurum impotentia laborabant, & ad finem usque persisterant. Rursus etiam qui ororum comedeant, gennum dolore torquebantur.

Hæc eadem sententia eisdem omnino verbis scripta lib. sectione 4. scripta occurrit, quamquam fortasse perperam interposita illo loco est, hic solum ab Hipp. scripta. Galenus n. nullam illius mentionem facit in eius libri commentariis. Sed utranque hoc habet, morbo si hæc constitutio facta est quod homines multo leguminum esu esset usi per famem, hoc est, annonæ caritatem, ut dicit Galenus in comment. aphor. 16. particulæ. 3. in quo, ut alibi multis in locis, hanc citat historiam. Accidit verò id in Aeno urbe Thraciæ, regionis sterilis admodum & frigidiæ, ut vel hac ratione accidere fuerit magis consentaneum. Quod feminas & viros laborasse dicit, videtur insinuare fuisse motum epidemiale, talem enim esse dicimus, cum qui utriusque sexus & omnis ætatis homines apprehendit, tamen quod non in se causa esse dicit, sed in pravis cibis, alia ex parte non videtur epidemialis. Si enim illi solum tali morbi genere tenerentur, qui leguminibus sunt usi, non fuit epidemialis. Fieri autem potuit, ut incipiente à malo vitæ morbo, in aerem infectio ferperet, effectusque ita epidemialis, & ægrotarent ob

A communem esum leguminum, qui nunquam legumina gustassent, ita ut sit. Sæpe enim pestis grassatur in urbe, cuius causa prima non fuit communitas, sed peculiaris aliqua, ut vestis aut lectus, aut cibus: Proximam verò, cum iam epidemialis morbus est, necesse est communem esse causam. Ita fieri ponit in Aeno. Incipit tamen malum ab esu leguminum, & maxima ex parte tentari fuerunt tali morbo, qui leguminum esu utebantur. Non enim profecto quialiquando fortasse, ac cum reliquis cibis condita, ut solent, legumina gustassent, sed qui eis in præcipuis cibis uterentur semper, aliorum penuria. Hi verò merito ægrotarunt. Nam ut Hippocrates ipse lib. de rat. victus in acutis dicit, legumina omnia flatulosa sunt, & cruda, & frigida, & macefiata, & viridia. Hi autem utendum non esset nisi cum cibis. Vnumquodque verò ex ipsis sua peculiaris vitia habet. Galenus etiam libro de cibis boni & mali speciei legumina in cibis mali succi ponit, adeo ut pravis nominatis, dicat, ceteris homines non vesci, nisi fame & rerum inopia premantur, velut scilicet hi qui in Aeno. Habent itaque legumina omnia multa communia vitia, vnum quodque verò ex ipsis sua peculiaritatem, velut nunc omnibus qui leguminibus utebantur crura sunt debilitata: qui utebantur eruo debebant petere genera: & hæc quidem non per ipsas putidas & malignas febres, quibus consentaneum est, fuisse correptos in initio mali (quod & lib. 4. huius operis dicitur, ubi de hac tempestate aliquantulum plura etsi brevissimè etiam, scribitur) sed postea etiam per totam vitam crurum vitia persecutebantur. Quia, arbitror, ex leguminibus multum pravi & crassi succi colligebatur. Atqui quod crassum in crura paulatim subdit. Hinc sunt varices, elephantoses, cancri, sine ulceribus aut cum ulceribus, hinc atrophie crurum, quia vbi malum mali, exiguum est visus succi, & id quod est vitale, à pravo nonnunquam prohibetur affigi. Hinc etiam fit, ut nerui crurum ab humoribus crassis occupati, nonnunquam resoluantur. Erum præterea habet insignem vim succidendi, & partes acres, vique adeo ut ne bobus quidè detur sine magna præparatione, ut Gal. lib. de alimen. facultate cap. 29. docet. Potuit ergo siccare ligamenta articuli genu, ac facere male flexilia, ut, cum flecterentur, dolerent, atque eius acres partes, in alium articulum collectæ, dolorem mouerent. A talibus autem succis, ram crassissimam & consumacibus, paulatim factæ infirmitates, non poterant non tota vita durare.

Curandum diligenter ut præcipitem iram inferamus & renocandi coloris gratia, & effusionis succorum: tum letitiam & timorem & huiusmodi: atque si aliqua corpora pars simul ægrotet, simul curemus, siis minus hoc ipsum

Quandoquidem ita, gaudium, timor, & huiusmodi passionis, animi sunt non solius, sed communes cum corpore, usque adeo ut ex impressione sanguinis & spirituum definitiones physicas & materiales habeant, constat esse causas alterantes vasa corpora, usque adeo, ut quidam illarum sint æg

lortificæ, quædam refrigeratorie causæ: id quod ex differentis quas pulsibus afferant, manifestum fiet. Quod si alterare nostra corpora possunt, possunt esse causæ salutares, possuntque sanare, cum contingit, ægros teneri morbo contrario affectioni, quam naturæ sunt asserre. Vel hoc solo argumento, quod possunt morbos quosdam gignere, possunt à contrariis liberare. Vti ergo potest medicus omnibus animi moribus in curatione morborum. Vtatur verò singulis opportunè, & ad quosdam morbos, aut quibusdam occasioibus. Vtatur moribus quibusvis nuoc ob communes causas: nunc ob proptias. Communes appello, eas quæ non nascuntur ex morbi natura, sed aliis rebus aduentitiis, quæ quidem in aliis etiam morbis fieri possent. Vt cum suspicamur aliquem assistentium morborum esse ægroto, & suademus ægroto ut cum arceat, si non possumus aliter, etiam curantes ut in eum irascatur. Aut cum timidum esse suspice natura ægrotum videmus, aut timere nunc morbi periculum, visque adeo ut debilitetur, animum facimus, suademus nihil petiti in malo esse: contra cum ooo vult ægrotus nobis obedire, timorem iocunmus, graua comminantes. Si videmus tristem esse exhalatamos. Hæc verò communia sunt. Propria autem, per morbos frigidus ad iram provocare, ut pote ita caloris existens causa. Nam ut 6. lib. epidem. sectio. §. dicitur ira trahit in caput calidum & humidum. Feruet enim per eam passionem sanguis circa cor, proinde calefcunt thorax & caput, replenturque sanguine feruente, ut feruore redundat in olla succus. Simul etiam cum præcipuis paribus calefcit totus habitus corporis. Ergo cum friget multum corpus, redodaturque crudus, & calot, vtriusque sub viridibus lignis periclitatur suffocari, quod color cutis albidus & intermortuus prodit, noo abs re erit, ad iram provocare crebro hominem. Ita enim funditur sanguis & reocoretur color, patieturque visificatur calidum naturale, & expeditur ab obtinentibus fuligineibus. Potestque esse vsus ire, & in reductione corporum morbidorum, & in curatione ægrotantium. Læticia vomit, ut propeiorum indicamine, per morbos melancholicos. Nam metus & mæstitia sunt symptomata propeiorum morborum, leduntque duobus modis, & debilitantia virtutem, & consuuantia augentiaque rursum morbum, à quo nata sunt. Si enim multi occasione aliqua correpti metu & mæstitia, cumque hæc passiones multum persequerentur, melancholici euaserunt, poterunt tandem præsentem seruare & augere. Igitur tollere tristitiam (quod est lætitiæ inferre) est curatio legitima, quia ex causis fouentis sublatiooe, estque symptomaticum facultatem debilitatum sublatio. Timore curatur etiam infans, quia metus facit ut mens sese colligat, & ad sapientiam redeat. Timore eam repentinum cutatur singulus, quia terribi continent spiritum, spiritus autem detentione singulus tollitur. Quin & quartanam febrem vidi, timore hora proxiymi superueniente sublatam, non amplius redisse, & multalij testificantur. Id verò fit, quia timore cietur alius succorum imperus vehemens mori paroxysmi: atque ita natura obliuiscitur motus illius confecti. Accedit, timore turbari ventrem oon tardè deponique ita feces, cum ex toto corpore, tum vel maximè ex liene. Itaque non tardè vtendum est moribus animi, ut propriis morborum auxiliis. Nunquam tameo omittenda sunt alia auxilia, si morbus aliud auxilium ex-

gat ratione sui, aut causæ, aut corpus alio morbo teneatur, præter id quod petierat animi motum: aut ipse motus animi, dum vnam curat, aliam passionem intulerit. Velut si sublati aliqua ex parte videatur infans, aut quartana febris, timore, non est proinde omittenda expurgatio melancholicæ, atque si timor ob singulum illatus, deliquium fecerit, deliquium curare. Si quartana febre simul cum obstructione laborat homo, & timor quartanam substulerit, licet oem propriis auxiliis mollire, & aperire. Itaque si reliquum corpus ægrotet simul, simul curare: sin minus, idest si non sit affectio alia, neque alia curationis indicatio, hoc ipsum, idest, hoc solum facere sit satis. Vt si solo singulo ob flatum in ore ventriculi laboret, solus timor est satis.

Stymargi famula Idumæa erat, cum peperisset filiam, os vteri contortum est, & in coxam & crus delata exortum est. Liberata est iuxta talum dextra vena, etiam si tremores totius corpus occuparent. Sed ad occasionem oportet venire, & occasionis initium.

Filiarum partus solet esse difficiliotes dictum antea est sæpe. Huic dolorem ad coxam & crus faciebat, os vteri plenitudine contortum, & proinde premeos oeruos, qui rectè ebant ad crus eius læteti, ita scilicet ut sit cum lapide laborat reo: videbatur, huic non mittendus sanguis, ut neque aliis quæ præfocatione cum vteri peruerfione, aut retractione laborant, quia ex passio frigida est, sanguinis verò missio auxilium refrigeratorium, maximè cum tremores frigus aut debilitatem, aut vtrumque indicarent. Id dico quia si concussiones cum rigore vocat tremores, passio calidi innati est, sin autem veros tremores, est facultatis motricis impotentia. Nihilominus secuti Hippoc. venam, quia oportet ad occasioem & occasionis principium venire. Namurum, ut cognitio incipit à postremis, hoc est à symptomatis, ab iisque procedit ad effectus essentias, & ad causas, proximas primùm, deinde remotas visque ad primas: ita curatio incipere debet ab indicationibus causarum, primarum primùm, mox proximarum, deinde affectus; tandem symptomaticum, si quæ sunt, quæ non tollantur simul cum morbo. Hoc ut significet, dicet, veniendum ad occasioem, & occasionis principium, idest, per causas visque ad primam. Nam occasio, est causa procatartica, quæ prior est antecedenti; & in ijs procatartidis, sunt alie ante alias. Oportet verò venire ad omnium primam, quia est procatartica quæ recessit, curatorium indicationem non habeat per se, præstant tamen multum ad cognitionem affectus, & causæ interuatum, quas habent. Oportet ergo in curatione, rationem habere prius causæ quàm effectus. Velut in hac, sedæ est vena, quia est effectus frigida affectio ac cum debilitate, tamen erat ex exigua purgatione partus, quod ex ipsi symptomatis palam fit, & Galenus libro de rigore tremore & palpitatiooe dicit. Fieri verò ex hac occasione, indicabat frigidam passioem ex accidenti fidam esse. Nam sanguis per se calorem magis natus erat fecerat. Si

ergo erat affectio ex accidenti frigida, auxilio indigebat ex accidenti calido, cuiusmodi est missio sanguinis. Est etenim per se auxilium refrigeratorium, aliquando verò per accidenſ calfacit, cum refrigeratio multitudine obruente erat facta. Atqui debilitas ex euacuationis suppressione, non in essentia, sed per aggregationem esse cognoscebatur, hanc verò restitit euacuatio. Quod si mirtendus erat sanguis profectò ex talo eiusdem lateris. Quia id exigit ratio ceterudinis.



SECTIO V.



Quicumque rufi sunt, & acuto naso, ac parvis oculis, prauus: qui vero rufus, simi, & magnis oculis, bonus.

Hæc sententia & aliæ quædam huius libri, spectant ad physiognomiam, quam philosophiæ partem esse non inanem probat Arist. multis argumentis, in libro cui Physiognomicum, titulus est. Gale. quoque libello quod animi mores corporis temperaturam sequuntur, multa physiognomica docet, cum ex illo libello, tum vel maxime ex i. de historia animalium. Esse autem physiognomiam, manifestum est, quia norunt venatores bonos canes & venationi idoneos ex corporum formatione dignoscere, & equites agnoscent solo intuitu generosos equos. Si ergo bellæ potis corporis agnosce possunt, possunt & homines, cum præcipue illis colorum, & formæ totius longè maior differentia sit, quam alicui alit animantium generi. Sed & ratione constare potest. Si enim animi mores corporis temperaturam sequuntur, vt Gal. toto illo libello confirmatur, & compositio idonea instrumentorum sequitur cuiusque mores & temperaturam, vt septimo cap. illius libelli de sententia Arist. dicit Galen. constat ex forma externa posse ingenium & mores coniectari. Hoc verò est physiognomiz, videlicet ex naturalibus notis agnoscere, quæ intra hominem, ad animam pertinentia, delitescunt. Sequi mores hominum & ingenia temperaturam, constat, quia cibus & potibus, morbo, & langore, & ætate, & mutatione temporum, videmus eundem hominis mores sæpe mutatos. Constat verò hæc mutare corpus, manente anima eadem. Præterea regionis differentia facit ad differentiam ingenii & mori, quod exemplo Europæorum & Asianorum docet Hippocrates libello de ære locis & aquis. Constat verò id ad differentiam temperamenti regionum referri, quæ non aliter, quam corpora aliter afficiendo, possunt mores permutare. Præterea, humores multum præstant ad mores, vt i. de natu. huma. comm. 19. Gal. docet, humores verò rationem quandam habent ad temperamentum. Sed præter dicta constat quod dicitur, quia virtutes & vitia, vt Arist. docet de sententia Platonis, quæ Galeno maxime placet, sunt in tribus animæ partibus, aut earum aliquæ, rationali inquam, irascibili, aut concupiscibili, quæ in tribus præcipuis membris sedem habent, rationalis in cerebro, irascibilis in corde, concupiscibilis in hep-

ate. Prudentia ergo est in rationali, fortitudo in irascibili, temperantia in concupiscibili, iustitia in omnibus. Igitur mutatis membris, mutantur potentie illæ aut partes animæ, ac cum illis virtutes & vitia. Præterea si quæ pars est animæ propria, & non communis cum instrumento corporeo, ea est mens seu intellectus: si igitur mens perturbari potest, aut lædi per corporeas passiones, vi ceterè potest, quandoquidem vino & phrenetia, constat omnia quæ ad ingenium & mores spectant, posse cum corporis temperie permutari. Sed & cum his mutari instrumentorum formationem, ac proinde externam corporis speciem constat. Quia animalium cuique dedit natura compositionem, maxime accommodatam illius moribus, nam audacibus dedit cornua, rapacibus vngues, timida inermia fecit, sed ad velocitatem comparata. Igitur et in singulis cuiusque speciei ita fecit, deditque cuiusque moribus accommodatum corpus, simileque eius animalis corpori, cuius mores maxime imitetur. Atqui stulte, nisi ita faceret. Velut si quis sutori fabella instrumenta, & fabro sutoria tribueret. Si igitur temperamentum facit ad mores & ad compositionem & compositio etiam ad mores, poterit significare forma exterior mores & morbus. Dico autem mores, non qui sunt (nam hos educatio, & doctrina, & Dei gratia, solet mutare) sed ad quos propensus natura quisque est. Morbos dico, quos natus quisque

habere est. Si enim in vinculo animæ & corporis hæc æstus principii habet, poterunt eisdem signis præsentia morbi animi & corporis, constareque iam hinc, quo pacto physiognomica doctrina ad medicinam referatur. Versantur physiognomici circa naturalia apparentia, indeque capiunt notis, vt circa partes omnes, & particulas, earum figuram, & colorem: circa voces vt quod gracilem habeant aut crassam, & morus, vt quod oculi nictent, aut non & mores apparentes, vt quod tristes sentiantur aut hilares. Argumentantur cuiusque notæ significationem, relatione ad alia animalia. Velut oculos magnos rotundos & eminentes, bouinos mores, & ingenium significare docet Arist. i. de historia animalium, cupiditates scilicet & hebetudinem, quia tales oculi bobus sunt: & relatione ad alios homines, velut molles carne, mansuetos etiam esse & prudentes quia tales sunt Asiani: aut relatione ad passionem, vt nares secundum pinnas valde apertes, iracundiam esse, quia irati solent nares iraperire: & relatione ad alias ætates, vt caluities significat senilem maturitatem & prudentiam, quia senibus solet accidere. Est alia ratio argumentandi, ex obseruatione morum, vt quibus aures arctæ, loquaces sunt, quia tales esse solent, quicquidmodi. Sunt dæ alie rationes philosophicæ, & potiores relatione ad causam. Vt magnitudo partium præcipuarum & virium, bonos mores, quia significant robur facilitatis, platumque autem meliora, quæ fortia & virilia, deteriora, quæ debilia & muliebria: alia ratio est ex quibusdam, quibus aliud necessarîo succedit, velut tristitiam & iracundiam necesse est esse inuidiam, si more tristitie & inuidiæ sint, etsi non sint notæ inuidiæ, indicabitur inuidiosus. Obseruandum verò in hac parte est: vt in alio omni prudenti coniectura, ne communia signa pro propriis capiantur, vt si quis leoninum signum vocet, quod non minus sit in equo, eum morem leoninum, quem habeant eque alia animalia.

Et

præterea, ne etiam multa signa sunt, vni soli credatur, aut ambiguo, sine aliis quæ possint significationem ambiguum certam facere. Velut nunc dicit, rufus bonus esse & malos, sed distinguit ex adiunctis. Color rufus capillorum mediocritas est, inter eos qui frigiditatem temperamenti significat, & eos qui caliditatem. Proinde rufi temperie mediocri sunt, atque ingenio acuto, tales autem non norunt esse mediocres moribus, sed aut probi aut nequam, ut in hæc aut illa studia incumbunt. Præterea rufus color capillorum videtur fieri posse ob mediocritatem temperamenti, aut ob mixturem contrariorum extremorum, quæ quidem ex mixture contrariorum succorum, & contrariorum principiorum, ortum trahit. Mediocritas facit ad probos mores, mixture contrariorum ad perfidiam, itaque his rationibus videtur, utriusque contrarii nota rufus color. Quin & in factis literis celebrantur duo rufi, Esau & Dauid, quorum alterum odio habuit Deus, alterum secundum cor suum esse pronuntiavit. Rufi itaque, & boni, & mali sint. Bonitas quidem non est una aliqua virtus singularis, sed in omnibus consistit. Desinitur autem bonitas præcipue benevolentia, & inuidiæ vacuitate. Nam qui omnibus bene vult, nulli unquam iniurius esse poterit, sed quo ad fieri poterit, omnibus utilis, & in bonum diiger semper consilia, & operabitur, atque proinde Plato proprium bonitatis esse putavit, nulli invidere: erique contrarii, omnibus male velle, & facere. Sed cum rufus color utriusque possit esse nota, accedente naso acuto, id est angusto, & ad extremitatem in acumen desinente, & oculis parvis, pravos significabat: accedentibus naso limbo, & magnis oculis, bonos. Nimirum ex Aristotele in physiognomico docet, nasus amplus, & latis visis, qualem quidem nunc simum vocat, significat magnanimos, & audaces homines, quia refertur ad leones, atque quia cerebrum & thorax facilius ventilantur & expurgantur, quare minus vrgentur fuliginibus, suntque animosi, qui et *μᾶλλον* dicitur grecis, non iracundi, qui *ἔργον*. Magni etiam oculi, maioris facultatis formatricis in cerebro (quia orta attestantur principis) & naturalis coloris plus acutus nasus, & exigui oculi, contraria. Omnia autem quæ magnanimitatem & robur significant, sunt probitatis, quæ pusillanimitatem & debilitatem, improbitatis signa. Quia ut Cicero in officiis dicit, iniuria nascitur ex timore. Quare minime sunt perfidi, aut iniurii, qui minime timidi. Ceterum neque simum quod in naso comprehendat, est quascunque, neque magnam in oculis. Qui enim valde simi sunt, ut angusti sunt parium porum, neque bene ventilantur, neque absque ab omni nequitia, quia sunt valde fallaces, referuntur enim ad ceruosi: sed simum nasum vocat, amplum, non valde pressum. Oculis magnos rotundos & prominentes Aristoteles virperat, de historia animalium. Boni ergo sunt qui magni, angulati facis, & mediocriter demissi. Tales ergo sunt boni. Exigui vero mali, maxime si exigui simul & caui ad modum sint.

quia dictum nuper est significari talibus signis, ut mores, ita & morbos. Itaque existimabitur nunc dicere, charopos & caluos paratos esse ad hydropem. Mihi tamen id non videtur admodum consentaneum. Nam charopos color significat temperamentum calidum & siccum, caluitum siccum: hydrops verò natura est fieri ex frigore & humore; quod verò solet fieri parsium per atrophiam succedere hydropi, nihil facit. Nam temperamentum cui morbus aliquis est familiaris, non est simile ei quod ex accidenti succedit morbo, sed naturæ quam habet morbus à principio. Proinde censo hanc sententiam, pertinere ad prognosticam medicinæ partem, significareque hydropicos solere, procedente malo, fieri charopos & caluos. Cum autem charopos dicit, intelligit glaucos abutens nomine, velut etiam in calce tertie sectionis tertij epidemij, enarrare Galeno. Nimirum illic Hippocrates descriptens temperatam quandam hydropicorum tabescentiam, dicit, forma tabidorum erat levis, subalbida, lentis colore referens, subrubra, & charopa, pituita alba referti. Galen. in com. dicit, hydropici non posse fieri charopos oculis, hos enim esse leoninos, ac proinde calorem & siccitatem referentes, fieri tamen illis glaucos, abscedente in oculos pituita, atque ad eam consentaneum esse Hippocratem abutens nomine, dixisse charopos pro glaucis. Est autem finis enarrationi admodum consentaneum, quod articulo cuiusdam hydropicæ glaucos oculos factos esse narrat, 4. epidemij. Hoc verò facit pituita, quæ in hydropicis redundat, quæ cum putrida & salsa sit, radices capillorum corrumpens, ophiasis, & alopecias, & caluitium infert. Tameñ caluitium nomen propriè non dicitur, nisi de naturali capillorum defectu, qui ob naturalem siccitatem, aut senectutem fit, transferretur tamen etiam nomen ad id defluum quod corruptione pilorum supra frontem fit. Solent autem fieri redundancia pituitæ deflunia capillorum: aut canicem inter: pestuam cum oculorum glaucedine, experimento didicimus. Fieri itaque possunt hydropici calui præter naturam, tamen secundum naturam calui non erunt parati ad hydropem. Neque sanè glauci & calui esse naturaliter possunt, cum alterum humiditatis, alterum siccitatis sit. Quare si glauci pro charopis intelligantur, non potest esse hæc sententia physiognomica, sed prognostica, ut *ἀπὸ τῆς φύσεως* est.

Vocis gracilitatem soluit varix ad sinistrum & dextrum testem suboritur: absque horum altero fieri non potest, ut solvatur.

Gracilitas vocis fit, aut ob angustia asperæ arteriæ, quam vocat *ἀσπὴρ τῆς ψυχῆς* græcè aut ob debilitatem muscilorum vocis, quam vocant *ἰσχυρὸν τῆς ψυχῆς*. Quo nomine hic videtur Hip. Pueris usque ad pubertatem est vox gracilis, debiles enim sunt vocales in pueris, ut alij musculi, ob humiditatem temperamenti, & arteria est gracilis usque ad ætatem. Quibus ex testibus semen effunditur, siccantur partes, præcipue autem vocales propter eam communem, quæ est inter vocales & genitalia quam sectione huius libri celebravit Hipp. Firmamur

Hydropici charopi & calui sunt.

Existimari posset hæc etiam sententia ad physiognomiam pertinere, ut prior, & quæ mox sequitur,

ergo musculi vocales, & hac causa, & quia procedit arteriæ incrementum, mutatur vox in crassiores. Quibus verbis testes persciuntur, manet musculorum humiditas, & cessat subtrahere caloris dilatatio arteriæ, & ita gracilitas vocis perseverat. Virginitas puerilis vocis gracilitas tumescentibus semine testiculis tollitur, ita quæ per debilitatem ex morbo contingit, solentur varicibus in testem utrumque. Non enim ut iussim solui diximus sectione. r. tumore factio in alterutro testiculorum, ita vocis gracilitatem putandum est: sed factis in utroque varicibus. Nimirum tussis plerumque fit ob succos in altera thoracis parte impios. Gracilitas aut debilitas musculorum omnium. Proinde dicit, absque horum altero fieri non potest, ut solatur.

Magni, calui, balbi, gracili voce præditi, boni.

Non dicit Hippocrates hos omnes magnos inquam, & calues, & balbos, & gracili voce præditos, esse bonos: sed eos qui omnia hæc habeant, qui scilicet simul magni, calui, balbi, & gracili voce præditi sunt. Nam quodcumque seorsum nasci potest est aliqua causa mala: magnitudo, ex materie redundancia: caluitium ex siccitate balbuties & vocis gracilitas, ex debilitate musculorum. Cæterum hæc simul, signum quoddam non exiguum probitatis exhibent: physiognomica causa, quia caluitium refertur ad senes, balbuties & gracilitas vocis refertur ad infantes, itaque ambo simul representant senilem prudentiam cum infantili simplicitate. Præterea est causa naturalis hæc: magnitudo fieri potest ob facultatis robur, aut ob materie redundanciam, tamen cum caluitio coniunctam, non est verisimile ex redundancia materie effecti caluitium ex siccitate sit, quæ neque cum multa, neque cum valde humida materia esse potest. Caluitium præterea siccitatem significat, quare per se mores duros & seniles, tamen magnitudo & balbuties ac vocis gracilitas, non ferunt siccitatem esse nimiam, neque quidem caluitium ferre humiditatem, quæ balbutiem facit & gracilitatem vocis, esse nimiam, neque pertinere ad cerebrum. Quare horum signorum contra pugnantia, significationem bonam facit. Neque contraria ipsa in extremo possunt consistere, cum in particulis adeo vicinis, & ad eandem corporis partem, puta ad caput, pertinentibus sint.

Morbo autem habent balbus, aut caluus, aut gracili voce, aut hirsutus, vehementer atrabilarios.

Non debent legi hæc coniunctim ut in proxima oratione, sed diuisim, quod illa particula, &, quæ semper interponitur, aperte significat. Nimirum cum cui aliquid horum accidit, esse inquam balbū, aut caluū, aut gracili voce, aut hirsutum, paratum esse ad morbos atrabilarios, non inquam, cui duo aut tria horum contingunt, necessarium esse talis, sed cui aliquod eorum seorsum. Nam qui simul est caluus & balbus, & gracili voce, accedente magnitudine, bene temperatus ac moderatus est. Sed hæc nota seorsum

sum vnaqueque, morbos atrabilarios significant. Caluitium quidem, & hirsuties, quia utramque est siccis temperamenti, quo proinde succi terrei multum colliguntur. Sed caluitium significat melancholiam naturalem, ut quod siccitatem solum cerebri significet, non etiam calorem aut frigus: hirsuties atramentalem, ob calidum & siccum temperamentum. Sed consideratione dignum est qui balbuties & gracilis vox possint tales morbos significare, cum pituitosa potius signa esse videantur, & pituitæ substantia tam longè absit à melancholia, ut in illam transire vna mutatione haud possit. Certe Alexander Trallianus, vnam quandam speciem resolutionis esse putat ex melancholia, quia et si succos potentia siccus est, succus tamen cum sit, videtur nec eos emollire posse. Adducitur ut id ita patet, quod nihil magis expertura sit, quam melancholicis passionibus laborantes, resolutiones multarum partium pati: atque adeo salina acida abundare solent, & humidis vomitionibus. Ego quidem an ex melancholia fieri possit resolutio, non contendo, modo ramen qui negant, dicant plerumque eorum qui resolutionibus simul & melancholicis morbis tenentur, non ob melancholicum succum utroque pariti, sed resolutiones ob pituitam, quæ in melancholicis multa colligitur ob incoctiones. Nam & quartana febre affecti, crebro vomunt pituitam, & melancholici sunt saluosi, atque pituitosi, & melancholicæ passionis sæpe concurrunt, non quidem pituitoso homine melancholiam generante (nihil enim minus) sed melancholico pituitam. Itaque balbuties, & gracilis vox, possunt in pituitosis fieri per se, possunt etiam fieri in melancholicis ex accidenti, atque tunc temporis significabant melancholicos morbos: Itaque non dicit hæc notas morborum melancholicorum, quod semper fiant in melancholicis hominibus, sed quod possunt, & solent, quodque in pituitosis aut melancholicis nata sint fieri, & qualis sit is, in quo tales notæ considerantur ex aliis dotis facile iudicari possit. Si enim balbus, si malus sit totus corpore albidus, glaber & mollis, & piger, pituitosum esse constabit, & pituitosis morbis obnoxium si vero quæ pituitosam naturam significant, non adfuerint, & balbus sit, melancholici morbi merito expectantur. Quodam etiam alia balbuties est, ut in commentatione apho. 32. sextæ diximus, quæ iracundum hominem significat, ac proinde biliosum, quod cum alicui valde inest, atrabiliarum morbi in iuuentute media sunt.

Qui lingua titubant, & manuum sunt impotentes, necesse est cum hæc solvantur, suppurratos fieri.

Eadem passio significatur in lingua, atque in manibus, nimirum quod in nervis septimæ coniugationis, deferentibus motum linguæ, facit illius titubationem, hoc idem in nervis æ cerevicæ venientibus ad manus, facit illarum impotentiam, & debilitatem, ad tremorē. Id verò est nervos pituitosis & crassis succis irrigatos esse. Multis igitur, pueris adhuc, accidit, lingua titubare, & manibus tremere, & beneficiis temporis curantur paulatim, sine alio malo, ut alias omnes pituitosæ passionis. Atque illud idem fieri potest mutatio victu ad suavius, aut mutata regione,

quod cum victu etiam intelligi potest. Tamen quibus citra hæc affatim illa passio tollitur, necesse est, abcessum materiz in partem aliam fieri, expectari verò multò magis debet, ad eam quæ cum primò affecta habet maximam rectitudinem, & alioqui recipere paratissima est. Quorum vtrumque thoraci inest. Nimirum cum lingue radice, & ceruice tota, maximam habet rectitudinem, atque ut inde facile recipiat, facit positus declivis, & assidens thoracis, & pulmonis motus, quo succum ad se allicit. Crasso autem succo, ad locum cui exitus expeditus non est, derivato, necesse est putrescentiam, & suppurationem fieri, quam qui in thorace habent, dicuntur antonomastice suppurati. Quidam vbi Hippocrates dicit, *χρυσὴν ἐκ τῆς γαστρὸς*, id est manum in potentes, volunt, etiam invito autore, pro *χρυσὴν* legi *χρυσὴν* id est labiorum. Quia fortasse maior vicinis labiorum cum lingua, & maior rectitudo in labiis ad thoracem, quam in manibus. Sed profectò, si non ipsorum partium ratio habeatur, sed nervorum ad ipsas venientium, ut sane oportet (non enim illæ tirubant aut tremunt propter se ipsas, sed ob nervos qui in eas insuntur) non est minor communio nervorum manuum & lingue, quam lingue & labiorum, neque minor rectitudo in thoracem ab illis, quam ab his. Ego quoad possum malo sequi lectionem quam in codicibus, aut omnibus ad optinens repetitionem, quam eam quam quis somniavit.

Dolorem inferiorem locorum fertis surditas soluit, aut fluxus sanguinis multus ex naribus, aut mania.

Surditas est signum raptus humorum in caput, proinde qua ratione potest leuare euacuationes per inferna factas, quales sunt diarrhææ, ut aphor. 28. particule 4. dicit Hippocrates, eadem & dolores partium inferiarum, translati scilicet sursum materia. Atqui materia in superna repens, & poros auditorios occupans, potest surditatem afferre: aut per venas singulares, rectam nasens tendens, effundit aut occupans cerebrum, facere maniam. Potest etiam facere aliud ex alio, ut post surditatem maniam, cum surditatem in phrenitidis signis posuit Hippocrates lib. de iudicatione morborum, & post surditatem fluxum sanguinis de naribus, fluxum soluentem surditatem & priorem passionem. Fieri verò hæc observantur, ut ex dolore coxæ surditas, ex dolore hæmorrhoidum mania, ex dolore hypochondrii fluxus sanguinis de naribus.

Si puerperis spasmi superueniat, febrem excitare conuenit, & in vesicam ceratum infundens multum tepidum, lauare.

Convulsionem superueniente febre curari dixit aphor. 57. 4. atqui ego in commentario indicavi, non quæcumque, sed eam solum, quæ ex repletionem. Si ergo mulieri cui ex partu plurimum sanguinis fluxisset, convulsio superueniret, nihil esset deterius, quam febrem facere. Nam convulsio ex nimia sanguinis euacuatione, ab inanitione esse merito censetur.

Verum quia hæc raro fit, & semper ferè puerperæ defectu expurgationis ægrotant, consueamus consulationem à partu ex repletionem esse, quare febrem facere non videtur fore alienum. Nimirum febris assumit humorem, & siccatur nervos. Ego, ut verum fatear, facius esse puto in talibus venam secare quam febrem facere. Ples enim euacuare potest missio sanguinis, quam febris absumere, idque tutius, quia citra putredinis occasionem. Quod si ob vires dimittatur (nam ob quid aliud?) certe neque febris excitari tunc potest, maiori enim facultate opus est ad ferendam febrem quæ tantum absumat, quam missionem sanguinis quæ tantundem euacuet. Sed si excitari etiam febris debeat, non proinde ab auxiliis localibus ad vterum abstinendum est, sed collendum cerato infuso in vesicam aut catheterem, vti si que enim vti solemus pro clysteribus. Sed quo pacto infundatur in vesicam ceratum, aut quod ceratum? Coniunctarum solidum sit, minimè fluxile, quæ huc hodie vocantur in officinis vnguenta: Certe aut ceratum, aut linimentum, aut vnguentum, aut irrigatio, aut quodcumque aliud, donatum erit facultatibus, quales affectio exigit, laxans vias, abstergens vterum, mitigans inflammationes, & anodinum, ac mediocriter resoluens: Ceratum tamen si quod est ad eam rem vtile, & in vterum infundere vis, facile est liquido sibi dissoluere.

Si capitis fractum sit, lac & vinum aquale equali permixtum propinandum: si autem vlcus sit, secanda sunt vena interna, nisi febricitet, si autem deliriet, caput irrigare, nisi hypochondria eleuata sint.

Non eadem occasione hæc omnia fieri debent, etsi in eodem morbo fieri possint: neque scripta sūt, quo ordine sunt faciendæ. Nam capite vulnerato, mox à principio mitti debet sanguis nisi admodum sit corpus inanitum, & exuacuum. Non enim solum profectum cum reducens corpus succis est, sed etiam eum est eorum moderata copia, quia oportet membra reliqua penuriam pati, nec mittantur ad caput, atque inde tractio agatur. Verum sanguinis missio non eadem ex parte fieri debet, ex qua ob inflammationem: sed ex aliquanto remotiori, dum vlcus solum est, & non etiam accessit inflammatio. Nam inflammatio per se, petit missionem sanguinis, vlcus non nisi propter inflammationem. Cum ergo nondum est erit inflammatio, ob morbum qui nondum est sed timetur, mittitur: talibus verò debetur reuulsio, ut presentibus iam deriatio. Si igitur inflammato capite, ex externa brachii eiusdem lateris mittitur merito: exulcerato tantum, ex interna eiusdem, aut externa contrarii sanguis mittitur: ex externa verò si iam inflammatio aut affectio alia huius similis, in capite condicari sit. Hæc tamen concitata esse non poterit, sine aliqua febre. Secunda ergo ob capitis vlcus vena interna est) internam vocat hic Hippocrates eandem quam Galenus, eam, inquam, quæ respicit hypochondria) nisi febricitet, si autem iam febricitet, externa, quia febris tentari iam exulceratam partem alio malo indicat. Si iam deliriet, duorum alterum esse potest, aut initium phrenitidis, aut signum deceptorium, indicans instare fluxum sanguinis de naribus. Si illud est, oportet irrigare

caput, Oxyrrhodo in infuso ex alio in futuram cotonalem: si veto hoc, abstinere, ne indicatio, futura vitilis, prohibeatur: Sanguinis ex natibus instantis præcipuum signū est, tetrahi sursum hypochondria. Dicit vero nunc eleuata quæ retracta, quasi sursum tracta. Metuo ergo si delirare incipit, qui vlcus capitis habet, irrigatione vtetur, nisi hypochondrium tetractio accedat, atque alia huiusmodi signa, quæ prænuntiare possint iudicationem eam sanguinis fluxu. Tunc enim permitendum est fluere: quia si nihil impediatur, soluetur febris; & mitigabitur omnis affectus, supereritque solum vlcus, quod vbi sedata fuerit omnis inflammatio, atque suppurata omnia confusa, & expurgata sordida, nil aliud desiderabit, quam idonea medicamenta ad partium regenerationem, cibos boni facii facile nutriendos. Maxime vero si os etiam deficiat, vt cum confractum, non solum istam fuit. Nam ossa habent difficile generationem, ac proinde ad eorum productionem, quod facile nutritur, debet medicocriter abundare. Talia vero imprimis sunt lac & vinum. Atqui cum iam conquiescent omnia symptomata, licet dare vinum. Si enim in principio daretur, vix esse potest aliquid periculosius vino, aut lacte. Vtrūque enim replet caput; vinum præterea affectus conuulsiones, & fluxiones commouet. Hac mixtura vini & lactis paribus portionibus, nullum vidi vni, neque video an alicui esset futura satis suavis, tamen in occasione dicta auderem tribuere ægro, in cibus lac, & vinum in potu, temperatum aqua, magis si illi per bonam valetudinem assueuisset. Mixturam verb illam quam licet vocari *anemien* non dum hæcenus præscripsimus.

Si caput doleat in pectus descendis, deinde in hypochondrium, deinde in coxam, omnia autem non possunt simul dolere.

Dectus hic est familiaris theumati, quem quidem cathartici ferè omnes expetiunt. Cerebrum vapore humidum & frigidum & ex toto corpore vapores semper excipiens, congerit multa excrementa, quæ deinde deponit in partes inferiores, per thoracem, hypochondria, ad coxam, ac nonnunquam ad extremos pedum articulos. Non possunt autem (dicit) omnia dolere, non quod non possit aliquando fieri, vt hæc omnia ob maximam omni in parte redundantiam dolent, sed quod plerumque alij aliis dolores succedant, & nouis accedentibus priores solui soleant, quia permutatione succorum de parte in partem fiunt, quare qui in alias partes irruunt, destituunt eas, quæ affecterant prius.

Anemien venæ sectio

A *quæ* duo videtur posse significare, difficultatem vomendi à verbo *quæ* idest vomo, aur idem quod *quæ* idest flatus. Eriplā quidem vox hoc secundum videtur significare magis, vtrumvis autem significet, non videtur facile dictū, quia ratione soluitur venæ sectio. Quid enim missio sanguinis cum difficultate vomendi, aut cum flatu hæc cau-

A sa suspicatur Iacobus Stenē, anemien significare sēmen quod citta concubitus effluit (pourre, quasi subuentaneum semen, vt dicitur quā subuentanea. Itaque anemien esse gonorrhæam, hæcque solui missione sanguinis, quippe quæ nasci solet ex sanguinis redundantia. Mihi vero non probatur hæc enarratio, quia est longè poetia. Sed si difficultatem vomitus significet, quod Hippocrates docet, est, multis alioqui difficile vomens ibus, euerit ventriculum, fieri quæ vomitus per sanguinis missionem, vt scilicet solet fieri alui fluxus & sudor. Sed vt dixi minus videtur ipsa vox ferre hanc significationem. Nam libello de antiquatis Hippocratis vocibus, dicit Galenus *anemien* (vnde hæc dubitasti fuit *anemien*) idem esse Hippocrati, quod inflatur, quare anemien est profecto flatus. Habet verd hic locus non incongruum enarrationem ex libello de flatibus, in quo Hippoc. monstrat, febrium & morborum apoplecticorum, & omnis feruoris sanguinis, causam esse flatus sanguinem perturbantes. Tales ergo morbos vocat nunc anemien à causa accepta appellatione: curanturque tales sectione venæ, quia sanguinis detrahitio sanguinem attemperat, & venas laxat, & facit corpus respirabilius. Itaque hæc sententia non multum abest ab illa quæ paulo post occurret, repente voce priuatis, si febre careant, sanguinis missione curari. Quamquam anemien plures affectiones significet, quam apoplecticas: nam & feruores, ac perturbationes spirituum, quibus solent repente per corpora fieri maculæ, tumores, ardores cum pruritus, quæ omnia fuso sanguine conquiescunt.

E

Fluxus medicamento inuncto sistendus est. Fluxus enim ex magna vena oritur. Si autem sponte fluat multum, ieiunet, aut aqua duat, quatuor lactis partes hauiat.

Rationem sistendi fluxionem sanguinis, docet optime Galenus li. 8. methodi reuulsiois euacuationes & reuulsiones sine euacuatione, vt quæ agitur frictione & ligaturis, atque videri idoneo, & portionibus medicamento sis, & medicamentis ad motus partium ex qua fuit. Monet vero cap. 6. eius libri, non esse veniendum ad hæc, quæ parti admoventur, antequam necessaria reuulsio, & totius corporis euacuatio facta sit, quare tunc solum est his vtendum, cura reuulsio sola, & euacuatio corporis non sufficit. Potro scire oportet, fluxionem aliquam nimiam fieri posse, aut ob ruptam partem ab externa causa factam, vt fuit sanguis vulnerata vena fetto aut ictu, aut sponte & citra causam manifestam, ob internam scilicet. Rediguntur vero omnes internæ causæ fluxionis ad duas has, multitudinem, acrimoniam, & malam qualitatem, ac tenuitatem, scilicet succorum. Hæc enim duo solum sunt, quæ retentricem irritando faciunt, suo munere male fungi. Nam si quam maxime velis, præter has causas, panete propriam retentricis debilitatem, quæ ob partis intemperiem fiat, hæc quoque quodammodo in illis causis est. Nam vt debilitata quidem retentrix cessat retinere, nisi irritata, irritatur vero à tanto minoribus causis, quanto debilius est. Quare id quoque quod debilitatam irritat, multum aut qualitatem

G

i ij

molestum est, si non simpliciter & omnino, tamen ad hanc facultatem. Dicit ergo, cum vena aliqua magna vulnerata est ferro aut ictu, necesse est sistere pharmaco, inungendo partem vulneratam idoneis scilicet medicationibus, quales sunt astringentes. Necesse inquam est ad hanc venire, quia si fluxus ex magna, hoc est, ex insigni vena, non exigua & capillari est, non erit satis cura totius corporis, vt cesset. Quod si quando erit satis vt cesset, consultum tamen nihilominus erit, inuogere, ne rursus effluat. Si vero sponte fluat multum, hoc est, si fluxus spontaneus accidar ob multitudinem, ieiunet, inquit, homo, quia ieiunium euacuatio quodam est, & plurimum prodest ad fluxiones sistendas, vt nihil est, quod fluxiones adeo moueat, ac cibis & potus. Si vero ob actimoniam succorum fiat spontaneus fluxus, opus est alimentis dulcedinem asserentibus & attemperantibus, proinde consulto dare duas aquas, & quatuor lactis, aut vnam aquas, duas lactis partes. Sunt vero hae consilia, non ad fluxus sanguinis solui, sed ad fluxus etiam ventris, & reliquis fluxionibus vtilia: patarique solet hoc lac, ex aqua, & lactis ductis portionibus, immixtisque lapillis ignitis, aut ignito ferro, vsque ad consumptionem tertiae partis. Estque ita paratum magni vtilis in dysenteria, & omni fluxione, quam succorum mordacitas pepercit.

Steriles fovere, ac pharmaco uti oportet.

Quoniam, ac sequitur, quo nunc vritur, medicamentum expurgans significat cum simpliciter dicitur, neque additur aliquid, quod aliam speciem medicamentum significet, vt in proxima sententia dicebatur pharmaco inungendo. De causis sterilitatis, quae multa ac variae sunt, & de multiplici earum curatione, scripta sunt multa, lib. de sterilibus, & in aphorismis, modo autem quodam rediguntur penes earum curationes in haec duo capita, fomenta & expurgationem. Fomenti autem nomine intelligi velim quaecumque interius & exterius, cataplasmatis, irrigationibus, elyskeribus, pessis, & suffitu admoventur, vt expurgationis, ac pharmaci nomine, vomitiones & alii subduktiones. Nam sterilitatis causa omnis est, aut vitium compositionis, aut temperamenti, aut vicius vteri, aut totius corporis cacochymia. In vitia compositionis vteri, est vteri exiguitas, aut crassities, oris vteri strictura & durities, vt non dilatetur satis: aut peruersio oris vteri, aut amplitudo, & quod dehiscat adeo vt non retineat, aut strictura venarum vteri, vt hanc ob causam menstruae euacuationes non insistant, aut laxitas, vt nimium effluant. In vitio temperamenti est calor nimius qui semen absumit, aut frigus quod non concoquit, aut siccitas quae etiam semen & fetus alimentum absumit, aut humiditas quae retentionem impedit: quam vlcera etiam vteri impediunt: cacochymia etiam cum in vterum refunduntur, corrumpunt semen, cum non refunduntur, non impediunt conceptionem, tamen fortum malo succo uti faciunt: ac proinde abortus, aut morbosus fetus. Compositiones vitia, si a prima generatione contractae sint, incurabiles esse solent, sin autem aliis morbis succedant, illorum etiam curatione tollun-

tur. Cacochymia omnes pharmaci vteri postulant, interperies omnes vteri, quae cum succo consistant accum aliqua rotius corporis cacochymia committuntur sunt, & vlcera in primis postulant pharmaco, deinde fomenta, affusiones, infusiones, pessos. Sint vero hae omnia ad calorem frigida, ad frigus calida, ad humorem siccum, humida ad siccitatem, & ad vlcera qualia ratio curandi vlcera petit. Sed hae omnia longius persequi non est huius loci: hic satis vindicasse rotam sterilitatis curationem, fomentis & pharmaco contineri.

Qui repente voce priuantur, si sine febre sint, is venam secare oportet.

Apoplectica affectioes, quarum commune accidens est vocis interceptio repente facta, nonnunquam ex manifesta causa fiunt, vt ex ebrietate, aut lauiori cena, nonnunquam sine ea. Hoc accidens venarum interceptionem significare. 4. de ratione victus in acutis dixit, ac proinde sanguinis missione vtendum esse, vt scilicet laxentur, & peruiis spiritibus fiant. Dicit etiam quiota aphorismorum, eos qui ex vino voce priuantur, repente solere mori conuulsos, nisi eos febris corripuerit, quasi febris salutaris causa in his sit. Atque et si illud, de obmutescerebatur repente sine manifesta causa dixerit in disputatione de ratione victus, & hoc, de obmutescerebatur ex vino in aphorismis, tamen ratio eadem est, causa enim externa internam quandam parit similem, puta venarum repletionem & interceptionem, sicque sponte fit cum nulla causa manifesta est. Proinde nunc de vtriusque dicit, curari debere missione sanguinis si sint sine febre, si enim febris superueniat, fieri poterit vt ea sola sit satis ad morbi solutionem. Neque vero hinc fit, vt nunquam sit mittendus sanguis si febris addit, ad aliquos enim vtroque auxilio opus erit, febre, & missione sanguinis. Sed quod nunc docet esse, si alterum, hoc est febris desit, altero saltem esse opus, puta missione sanguinis. Nam si neutrum horum sit, aut fiat, mori solent conuulsi aut resoluti, corripiente humore nervos, & eorum principium, vt patrum quidem dictum est in aphorismo, atque i. proethericorum dicitur his verbis: Vocis interceptiones cum singultu pessimae. Vocis interceptiones cum exolatione pessimae.

Pituita defluxus ex mamma oculi trahunt, & pituita quae per nares eructabat, in pulmonem descendit.

Catarrhi plerumque solent cieri accurrentibus excrementis in caput ex toto corpore, atque inde in modum Euripi descenditibus rursus in pulmonem & thoracem per asperam arteriam. vbi tollunt & raucedinem pariant: antequam quam in thoracem incumbant, solent nasi poros occupare, & vocatur ea passio coryza. Fluxus sicciorum ex corpore in caput, mammarum tumore maxime innouescit, quia succis sursum repennibus, repleri soleat. Quam ob causam, vt in aphorismo dicitur, sanguis qui in mamma colligitur, significat furorem. Porro oculi sunt,

qui redondantiam quæ in capite est, maxime protendunt. Quod ergo dicit, *de his partibus dicitur si ipsæ perinde est, ac si diceret, in caput ex corpore confluent. Nimirum cum corpus in caput mittit, videtur caput trahere.* Arqui lib. 4. de morbis ita dicitur. Quantum in cibo, & potu pituita inest ubi in ventriculum peruenit, partim corpus ad se trahit, partim caput, ut quod cauum sit, & velut cucurbita corpori incumbat. Mihi verò magis videtur, venter & corpus in caput mittere. Caput verò repleri indicant oculi, atque ita videntur oculi trahere. Hanc verò, seu impulsionem seu tractionem, prænotant prius intumescences mammae.

Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor in coxam, aut in crura, aut in testem irruat.

Didum est primâ sectione huius libri, tussis sicca cessare solet intumescere teste. Neque verb in solum testem fieri potest abscessus ex vocibus instrumentis, quamquam in cum sapibus sed & in aliis inferiores partes, ut coxam, & crura. Nam in hac ipsa sectione dictum est antea, ex dolore capitis ad thoracem descendere, deinde ad hypochondria, postea ad coxam. Nunc ergo dicit tussim siccam solui facto abscessu in coxam, aut crura, aut testem, quem abscessum indicat dolor. Nam ut in aphorismo dicitur, si quæ pars per morbum dolet in eam sunt abscessus, dicit verò non solui aliter tussim siccam. Quod quidem de sicca & antiqua intelligi debet. recentem enim facile sperate potes, excretionem solui, maturata fluxione: inueterati verò & plurimum producti morbi abscessus desiderant.

Si hydropicum tussis corripiat, malum.

Enartata mihi est hæc sententia in commentariis aphorismorum, est enim trigessimâ quinta sectionis sextæ illius operis.

Si quis statim animo linguatur, calidis omnibus vti debet, sive in iunioribus, vinum bibere & cibis repleri.

Statim animo linguari, idem est ac sine causa manifestâ, aut ex leuicula quauis causa id pati. Hi sunt de quibus in aphorismo dicitur, qui crebro, ac inultu, sine causa manifesta exoluuntur, repente moriuntur. Dictum verò est à Galeno, & à me in commentariis, eam passionem debilitatem naturæ calidi significare. Tota ergo ratio curationis, talis esse debet, ut robur naturæ caloris augeat. Hoc ergo est quod dicit, *supra enim dicitur Hippocrati.* Non quidem quod omnia utrunque calida illis sint vilia. Multis enim præ intemperie extremè calida & bibulosa, naturæ calidum debile est, & facile exoluitur. quam sunt alii quibus ob temperamenti frigidi aut est ea debilitas. Nimirum omnis immodica intemperies laedit omnes facultates. Frigidis ergo calida labuntur, quæ non vt alimenta calfaciant solum, sed vt

medicamenta etiam alterando: calidis verò & debilibus non ita, sed quæ vt cibi calfaciant, nutriendo scilicet & bonorum spirituum, & boni sanguinis copiam augendo. Non itaque omnium calidorum vtilis est vilis: sed dicit *supra enim dicitur Hippocrati* quasi diceret totus victus sit calfaciorius, ut oportet tamen. Velut in aphorismo dicit, omnis victus humidus febricitantibus conuenit, non tamen proinde omnia humida sunt febricitantibus vilia: sed quia totus victus debet ad humefactionem spectare. Hoc itaque est quod dicit calidis omnibus vtiur. Verum quia talium duplex ratio est, alia quæ imbecillitatem illam tollat: alia quæ, cum paroxysmo tenetur homines, reuocet, utramque docens Hippocrati addit, sive minus, id est, si autem non possit deliquium vitari, sed nihilominus deliquio correptus fuerit, cogatur vinum bibere, & cibis repleri. *Quædam* quod nos vertimus vinum bibere, omnes ferè putant esse vinum mero vti, mihi verò indicatum est in commentariis vigessimâ primâ aphorismi secundæ, simplicius significare uti vino, sive mero sive diluto. Ita hic oportet legi. Nam etsi plerisque, ut ex animi deliquio reuocentur, vtile sit haustum merum, quibusdam tamen vtile est dilutum. Vinum inquit bibere, & cibis repleri, ne intellige cibis seingurgitare, ut quidam Hippocraticam phasim minime tenentes transuleret. sed cibis refici, & vt ita dicatur, renutriri. Ita enim dicitur in aphorismo, facilius est repleri potu quam cibo: id est, facilius ac citius reficimur potu quam cibo. Quod nunc Hippocrati dicit, vinum bibere & cibis repleri, optime fit ossa panis ex vino, & vino haustu vini aut enim duobus, aut ossa ex iure carnis, & potu vini.

Venas internas secare oportet, quum morbus magnus in contentionem euadit.

Morbum factum *in se* vocat morbum magnum pendentem ex multo sacco. Talem enim solet antecedere sensus tensionis. Venas internas vocat Hippocrati, aliquando venas magnas quæ sub cutē producuntur, vt externas exiguas & capillares quibus cutis textitur, explicatum est à me in commentatione illius aphorismi. Difficultatem vrinæ venæ sectio soluit, secare autem internas oportet. Itaque secare internas, est venam secare, velut secare externas, est scitificare. Est verò in sanguinis missionibus, maius efficaciusque remedium sectio venæ maioris, quam scitificatio: proinde & commodius ad morbos magnos, quales lassitudini tensionis, & phlegmonodi succedere solent.

Solutio doloris coxarum fit per oculorum distorsiones, & caecitatem testium verò tumoris, per mammarum elationem.

Dicit oculorum distorsionem & caecitatem, esse solutionem doloris coxarum, & elationem mammarum, tumoris testium: non quod hi sint boni abscessus, sed quod fieri soleant, etsi sint mali. Nam & primo libro prædictionum ita est scriptum. Ex lumborum recursum oculi distortio, malum. Id est oculi distortio fieri solet ex lumborum dolore, estque mala

pérmutatio, quia ex récurso humorum ab infènis, & ignobilioribus, ad superna & nobiliora, à quibus solent, estque facius, excrementa in humiliora derivant. Vt ergo ex lumbis, ita ex coxa solè succi recurrere in caput, & vtriusque oculorum distorcionem, ita & caputem: vtrumque verò cū magno ægritudine malo. Nam vt antea dictum est, ex dolore capitis solent succi in pectus, hypocondria, & coxam descendere: estque hic bonus abscessus: si contrà ascendunt, malignus recursus est, verum fieri solet. Iudicantque vt nuper dictum est, capitis mala, oculi B maximè, qui occupati humoribus, conuulsi distorquentur, & obtrantur exaccantur. Porro mamma- rum elatio ex testium tumore, & testium tumor ex mammarum elatione fiet, ob communionem voca- lium, & genitalium partium, vt sectione ptima huius secundi libri dictum est. Eadem enim ratione, qua tussis, vbi testis intumuit, cessant, etiam testis sub- sidet tumor à tussi.

Si febre tenente, qua circa faciem extenuatur die legitimo, sequenti die soluetur febris.

Celebratissimum est apud Galeñum, & reliquos medicinarum doctores, iudicationem duabus partibus constare, anxietate, & dolore, & difficultate, quæ dum fecerunt mala à bonis, coniungunt, quæque vocant signa critica: & euacuatione quæ consequitur, & euacuata causa affert morbi solutionem, aut remissionem (nisi tamen sit iudicario mala) solutionem quidem, cum optimæ conditionis est crisis, quæ, inter cætera illud habet, vt fiat in die decretorio: remissionem verò, cum est tantum bona, cuique aliquid bonorum deest, velut si fortè dies non sit in optimis. Diem ad iudicationem accommodatum vocat Hippocrates nunc decretorium, nunc contemplabilem, nunc legitimum, nunc imparè. Inter cætera symptomata terribilia, quæ instante iudicatione fieri solent, est faciei repente facta extenuatio. Extenuatur enim sepe facies destituta succis, quod alio conuersi sunt, vt pote facultate expultrice euacuationem perante. Ergo dicit, si febre tenente, hoc est, per febres continuas Nam hæc propriè tenent homines, alie reperunt. Atqui indicatoria signa in acutis præcipuè morbis habent vim, qui vt in prognostico dixit Hippoc. cum febre aliquant. Si itaque febre tenente, qua circa faciem extenuatur in die legitimo, sequenti die soluetur febris. Non quidem sequenti die naturali, velut si septimo facies gracilescat, soluetur febris octavo. Alioqui soluetur non legitimo, atque ita non erit iudicatio perfecta: quod si non est, cur soluetur? Sed vt in aphorismo dicitur, quibus crisis futura est, nox ante accessum est difficilis, quamquam illa nox & accessio in eundem naturalem diem incidunt, ita quæ dicit, sequenti die febris soluetur, si iudicatio cariora anxietas incipiat hac nocte, & sequenti nocte, si nuncipiat hoc die. Neque te debet deterere, quod extenuatio faciei signum lethale esse solet, & in lethali bus ponatur ab Hippoc. in initio prognostici: omnibus enim signis decretoriis euenit, vt aliquando signa mortis sint, vt lachrymæ inuoluntariæ, nunc significant faciem relictis corruptionem, nunc fluxum sanguinis

de naribus: tremor labiorum, nunc cõuulsioem, nunc vomitum. Vtrum autem significet quodcumque horum, ex adiunctis agnoscitur. Non ergo quæcumque extenuatio faciei pollicetur febris solutionem, sed cui accedent alie notæ iudicationis bonæ, in quibus est, vt die legitimo contingat. Refert autem quæque, vt signa concoctionis antecesserint, & iudicatio in quaternario antecedente facta sit. Et quod maximè in presenti est, ne alia signa mortis attestentur.

Hydrops, si cum crurum tumore tussis, malum.

Dixerat antea, si hydropicum tussis corripiat, esse malum: nunc addit tumorem habens in cruribus, non quidem fortasse augens periculum, sed vt passionis signum apponens. Non enim graue est hydropico pedes intumescere, propius enim est huic morbo incipere & pedum tumore, neque grauius semper est tumentibus adhuc pedibus tussis corripit, quam iam detumescantibus. Multis enim vidimus proximis iam morti, si tussis esse pedes plurimum ob atrophiam, & excrementis prædebatitate facula, tis manentibus iam in superioribus partibus. Tussis quidem horum non est manus mala, quam si is accidat, quibus adhuc pedes tument: quamquam grauissimum etiam est tantopere reducere aquam, vt supernas & infernas partes simul occupet, & grauius, quam si, tussis incipiente homine, remittet tumor pedum, non atrefactorum, sed quod fluxio ad superiora cõuertatur. Facilius enim potest ad inferna reuocari humor nobis plurimus, quam qui omnia iam occupat, morbus curari. Si igitur ad hæc referat hæc sententia Hippocratis, augens periculum dixit, si cum crurum tumore tussis, malum: si autem non, dixit id, apponens hydrops signum, quasi solo morbi nomine non satis concitatus.

Si auris doleat, lacte utatur.

Lactis insillatio utilis est ad sedandum dolorem auris non quemcumque, neque quacumque occasione sed cum, qui ex ardore, aut inflammatione, non dum inueteratis, excitatur, velut etiam cõuulsio musæ ad ophthalmias. Ignoscendum tamen est Hippocrati, quod neque distinctione affectus, neque cause, neque occasionis apposita, simpliciter dixerit, si auris doleat, lacte utatur, ob consuetum breuiolum, etsi id in aliis, merito vituperetur.

Nisi in die legitimo recedat febris, necesse est redeas.

Dictum super est Hippocratem eosdem dies vocare iudicatorios, contemplabiles, legitimos, & im- pares. Indicatorios, quod iudicia in illis contingant plerumque legitimos, quod iudicia, quæ in illis sunt, legitima esse puerunt, quæ in aliis diebus non ita, sed ob illegitimum aliquam occasionem: contemplabiles, quod contemplatione dignos: im- pares,

quod impar ferè sit totum horum genus. Dicit ergo nunc, quod in aphorismo dixerat, nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet repetere.

Cui vena in cubito pulsar, is maniacus est & iracundus, cui autem quiescit, ira vacuus.

Vbi Hippocrates scripsit *neque* vertunt quidam, stupidus, alii lentus, alii etiam murus, quia Galenus libello de antiquis Hippocratis vocibus hæc omnia dicit significare id nomen. Ego verò legi, ira vacuus, quia idem Galenus enarrans hunc locum 6. libro de placitis dicit *neque* significare idem quod *arxam* itaque sententia est, venam in cubito pulsare, esse hominis parati ad maniam, & iracundi: totà quiescere, esse hominis tranquillū, & tardi ad iram. Quæ sententia hand dubie pertinet ad physiognomiam, non ad prognosticam medicinæ partem. Non enim morbi cuiuspiam euentum: sed sani hominis naturam & mores docet agnoscere. Venam antiquissimis diei solere etiam artem, celè brachissimum est apud Galenum, & à me dictum serpe. Cubitus est ea pars, quæ inter mediam totius brachij flexuram & manum est. Itaque ad cubitum pertinet ea pars, quæ frequenter solemus pulsus requirere arteriam attestare. Pulsus nomen non de quocunque arterie motu: sed de conspicuo, usque ad id vbi solo restu sentiri solet, posset videri, dicit ab Hippocr. vel ex hoc loco monstrat Galenus loco citato. ex 6. de placitis. Nam, vtrumque, omnibus hominibus pulsar arteria in cubito. Cum ergo Hippocrates dicit, quibus pulsar in cubito, non vtrumque intelligit: sed multum, ac vehementer. Quoniam ergo vltis pulsus in arteriatione caloris est, cunctis quibus maximus est natura pulsus, eos maxima attemperacione indigere: atque adeo temperamento esse calidissimo, quod modè parit iracundiam, & magnum proeuentum vltis bilis. Quæ qui abundant, maniaci fieri periclitantur. Pulsus vero dicto contrarius, contrariam significationem præbet, necesse est. Magno & teleri contrarius est exiguus, & tardus. Iracundo quod *arxam* seu ira vacuus. Ergo, quod Hippocrates dicit, Quibus verò quiescit, non est omnino non pulsare, id enim nunquam euenit, nisi in *arxam*, cum proximi iam sunt morti homines: sed perinde est, ac si diceret, quibus verò lente moueretur. Talium enim natura frigida est, ac proinde ad iram minimè prona. Hæc itaque est huius loci enarratio, iuxta hanc versionem, quæ Galeno placet. Quoniam vero, illius nominis typhodes, non videtur admodum legitima significatio, quæ dicta est: sed potius videtur significare eum qui facile inflammatur, & non in quibus eodicebus occurrit eadem lectio: sed in quibusdam legitur, *arxam* id est, quiescat, in alijs *arxam* id est, exadit, ac verè dicar, cogor suspicari, ferre posse locum hunc alium sensum, ac fortasse legendum *arxam* id est, *arxam* id est, vtrumque exadit dicatur, inflammabilis. Quæ lectio, & enarratio, est facilissima, verissima, & iuxta legitimum vocum significationem. Talis enim est hæc nota dictio. Cui venam cubito pulsar, maniacus, & iracundus, vtriusque exadit dicatur, facile inflammabilis. Rectè autè dicitur, vtrumque dicatur, quasi diceret,

ut per causam dicatur, & in causam referatur. Nam sunt maniaci, & iracundi, quia calidissimi, & hoc ipsum est, esse facile inflammabiles, & ad ardentem febrem opportuno. Galenus in calce citati libri interpretatur, hanc pulsationem in cubito sinistro magis notari, quam in dextro. Quam enarrationem mihi videtur Galenus inuexisse deceptus, & sui sermonis in petra delatus. Nam neque id dicit Hippocrates (nisi forte ille habuit alium codicem antiquiorem) neque rationi videtur consentaneum. Nam et si arteria aorta ex sinistro cordis ventriculo nascatur, maior tamen arteria in brachium dextrum, quam in sinistrum distribuitur. Quo fit vt copiosiores spiritus in brachium dextrum veniant, atque vt in omnibus bene compositis, & temperatis hominibus, maior & vehementior pulsus in eo sit, quam in sinistro. Quid si medicis naturis, plus pulsar arteria in dextro cubito, & in calidis crescit ad portionem. Itaque quod Hippocrates dicit, de vtroque cubito intelligi potest, aut de dextro potius.

Vulnus si sanguinem fundat, irrigare vltis non conuenit, caput verò calidè irrigare prodest.

Cum pars aliqua vulnerata est, imprimis oportet partem lauare à sanguinis gromis, & si quid foras inter labia vlcera collectum est, deergere: nisi magnus sanguinis fluxus addit: tunc enim satis est alligare partem, vt ipse sanguis in guttus versus, fluens obstruat viam: aut ytre, aut fuscis, aut alijs stringens medicamentum. Prohibet vero Hippocrates in initio libelli de viceribus vltis lauati nisi vino, præterquam cum fuerit in articulo: tunc enim quia faciliè tentatur homo confusione, satis est lauare calida aqua. Aqua quidem ne mordet, calida, quæ frigidum est vlcerebus mordet. Atqui et si illo loco articulo tum tunc memini, eadem ratio est vulnerum in capite, & nudatorum, defractorumque ossium. Quæ inde etiam imminet confusionis periculum: atque proinde in aphorismo dixi, calida plurimum confert ossium fracturis, maxime his quæ nudata sunt, maxime verò habentibus vlcera in capite. Ex his prodiit facillima huius loci explicatio, si quædam vobis interponantur, quia Hippocrates quædam dicit, quædam insinuat. Ac si diceret, si ex lesa parte fluat multum sanguinis, ne haerent omnino: sed alligetur vsque dum sanguis restiterit, sinistram talis fluxus non sit, reliquias partem lauare oportet vino, caput vero vulneratum aqua calida, dictam ob causam. Quamquam nisi opus sit pus multum mouere, ego non consulerem simplici: sed molli aqua vti.

Si cor doleat, calidum panem cum vino mero dare conuenit.

Ovis ventriculi dolor, ex quo afficitur vltis & oluntur, vocatur Græcis cardialgia, id est, cordis dolor: cuius curationem nuper attigit Hipp.

pocrates, dixitque ipsam animi deliquium solui vino & cibis facile nutriendis. Quæ duo, ossa panis vino intincta, optimè præstari diximus: quod nunc ipse Hippocrates aperte dicit. Quod verò dicit panem calidum cum vino mero dandum esse, intelligi ut explicatum antea est, etsi enim optimum ad hanc passionem remedium sit hoc, nullum tamen potest esse omnibus optimum circa illi distinctione. Vinosis enim & frigidis hyeme maximè, vino mero, atque adeo generoso intincta debet ossa dari, abstermuis verbò, aut biliosis, æstate maximè, satius sit succo granarorum, aut etiam vix æcerbæ intingi: medicis naturis, passionibus, aut temporibus, scilicet ut intingi dylabo. Vinum vgrò, modò non sit multum, neque merum, nisi sit austerum (hoc enim merum enim esse potest) cardiacis etiam biliosis utile est, quia astingit, & roborat. Proinde ego biliosis hyeme do vinum dilutum, æstate succum malorum granarorum: pituitosis hieme merum, æstate dilutum. Panem (inquit) calidum cum vino mero. Ne sit autem panis calidus: quòd retens, talis enim non facile coquitur sed tostus, aut intingatur panis frigidus bene coctus in vinum calidum:

Vomitum soluitur, exhibito aqua, calida potu, ut vomat egër.

Vna quædam curatio vomitus est hæc, non parum artificiosa, vomitu scilicet. Nimirum excrementa quæ ventriculo hæserunt, plerumque solent facere, ne quæ ingeruntur contineri possint, & quæ impacta sunt illius tunicis, ut euomantur quæcumque in ventriculi cavo continentur. Vomitum ergo arte factus, qui expellat quæ hærent, aut impacta sunt, curabit vomitum sublatione causæ, velut etiam alui profusum, ac dysenteria, expurgatione & clysteribus curantur: quas curationes ego si sepe fecisset scio me tentasse. Neque tamen temere tentari debent: sed cum auxilia, quæ per se sunt morbo contraria, non videntur posse opem ferre. Hæc enim sunt per se similia, ex accidenti contraria, ut & alia multa in arte. Temerarii autem fuerit medici, expari ea, à quibus ex accidenti aliquod expectetur auxilium, si nihil prohibeat, illis quæ per se sunt, vitia, curare. Sed hic, ut in aliis plerisque, obseruari debet ne minoribus, facilioribus, certioribus, & tutioribus, maiora, difficiliora, incertiora, & periculiosiora præferantur. Non ergo ad quemcumque vomitum iubet Hippocrates dare vomitorium medicamentum, aquam scilicet calidam (intellige verò modicè calidam seu tepidam, huiusmodi enim est quæ vomitoria) ut vomat plus, & ita euacuata causa ventriculus conquiescat: sed cum non potest expectari auxilium ex roborantibus ventriculum, & astringentibus, eo quòd impacta, aut admodum hærens euasa sit. Tunc verò non aquam tepidam solum, quæ ut facillimum, ita est optimum auxilium, licet dare: sed & mulsam, & decoctum feniculi, & oxymeli cum tepida, & acetosum, ac succum etiam rapanæ, & narcissi folia, atque huiusmodi multa.

Quæcumque sphacelo corripuntur, intercepta vena exulceratæ & sanare oportet.

A Sphacelum ossium corruptionem propriè dicit, ut gangrænam carnis, Gal. docet lib. de tumoribus præter iterarum, tamen latius etiam patente nomine, sphacelum dici omnem cuiusque partis corruptionem, ut gangrænam etiam, quæ est carnis corruptionis ob magnitudinem aut maius inflammationis facta, sphacelus sit. Huius curationem nunc docet Hippo. dicens intercepta vena exulcerare & sanare oportet, id est, sanatur non aliter, quàm intercepta vena & parte exulcerata. Intercepti autem venæ dicit, eam, aut eas, quæ ad partem gangræna tentatam deferunt sanguinem, in via, scissione, vltione, aut laqueo intercepti. Exulcerare dicit, alius partem scarificare. Oportet ergo cum gangræna notæ in parte incipit apparere, ciliatè toti corpori prospicere, & si quæ vena videatur tumidior & nigricans, eam interceptare cauterio, ac morientes iam particulas alris scarificationibus vitare, aut vitæ, aut partem exulcerare, & exedentia medicamentis admovent, partim vitæ. Minora verò his, inutilia in hac affectione sunt,

In conuulsione digitorum manus sine febre, scarificare oportet, nisi caput doleat, sin minus aquam calidam affundere.

D Sempër Hippocrates quid ad affectionem quamcumque agendum sit, vno quodam exemplo docet, oportet autem nos ob communem rationem ad alia omnia eiusmodi sententiam transferre. Velut nunc docere volens Hippoc. nihil aliud, quàm in conuulsione partis, si affectio propria sit conuulsæ partis, illi adhibendam esse curationem, si autem per consensum cum nervorum origine, nervorum principio dicit in conuulsione digitorum manus sine febre, scarificare oportet nisi caput doleat: sin minus id est, si verò caput doleat, & proinde opus non sit curare digitos, sed caput, quod primatè laborat dolor indicat, aquam calidam affundere. Non tamen hoc verum est in conuulsione digitorum manus magis quàm in manuum ipsarum conuulsione, aut digitorum pedum, neque scarificatione solùm curatio ea agitur, sed & idoneis inunctionibus, & irrigationibus, quin & affusione aquæ frigide aliquando. Neque sanè cum solo capite potest esse consensus, sed & cum spinali medulla, ex hac enim plerique nervi motus ducunt originem, neque certe capitis aut spinalis medullæ vicia curatio est, affusio aquæ calidæ, sed & olei, & amygdalini, nonnumquam & costii, aut ex castoreo, aliquando etiam solus violacei, & aliorum medicamentorum innumerabilium admodum. Neque certe in conuulsione, siue propria passione facta sit, siue per consensum, tota curatio localis esse debet, sed hanc debent antecedere communes euacuationes. Verùm hoc ut commune omni affectui omittit, & propriam considerationem, in conuulsione maxime necessariam, exponit. Nimirum in conuulsione digitorum manus, aut partis cuiusque alterius talis, si per propriam passionem pars laborat, & sine febre sit, oportet partem ipsam curare, medicamentis resoluendis succum, qui conuulsionem parit, in quibus optimum est profectus, ac potentissimum scarificatio cum cucurbitulis. Dicit si sine febre sit, eadem ratione, quæ prius

dixerat, qui repente voce priuatus, si sine febre sine
venæ sectione curare. Nimirum quia si febris adest,
& consilium est ex repletione, ab ea potest auxilium
expectari. Si verò laboret pars consensa per consen-
sionem cum capite, aut spina, eo oportet transferre
curationem, & irrigare nervorum principium ido-
neis medicamentis. Non est in postremis aqua cali-
da ad consensiones, quamquam ad resolutiones es-
set inuoluntaria, nisi esset medicamentosa, vt nitrosa,
aut aluminosa. Hæc enim siccat, dulcis & calida aqua
resoluit & laxat, atque præter hæc, si quid nervo-
rum mordet principium, dulcedinem infert. Di-
guoscendi consensionem propriam, ab ea, quæ per
consensum fit, multæ rationes sunt, quas Galenus in
opere de locis patientibus persequitur: præcipua
verò est ex accidentibus, quæ contingunt parti per
se laboranti. Velut si consensu sunt digiti dextere ma-
nus, & doleant vertebrae postremæ cervicis, & nulla
peculiaris læsio digitorum antecesserit, consensa-
neum est per consensum digitos conuelli. Hanc ob
causam dicit, si caput doleat, si enim dolet, est mor-
bus capitis, non digitorum. Tamen si enim nervi mo-
tus digitorum, non ex capite, sed ex cervicis medulla
oriuntur, tamen non potest pars tam vicina capitis,
ex ipsa substantia cerebri producta, ab excrementis
occupari, quin caput doleat. Sed neque illud ob
cervicem, quia doleat & ipsa cervix. Quare facius
est omnia considerare, ac nihil omittere.

tum repererunt. A quibus vtile tunc quoque fuerit,
aquam frigidam coronali capitis sursum affundere
ex alto, vt oculorum & totius capitis calor extingui-
tur, & fluxio arceatur. Sed qua ratione iuuabunt al-
lia cum maza, quos iuuat aquæ frigida infusio? Cer-
tè vtutrumque iuuare potest eos, qui oculis male affe-
cti sint, sed non eadem occasione. Quæ ergo occasio-
ne vtutrumque explicemus? Maza græcis dicebatur
quodcumque edulium paratum ex farina, aut panis.
Quare in hoc genere sunt massa cocta, & pulvis, &
offæ, ex iure, vino, lacte, aut aceto & oleo, aut quo-
cumque alio succo. Constare hoc facile potest ex
Hippocrate lib. 2. de dieta. Itaque alia cum maza
dicuntur offæ, quæ eam aliis parari solent, quibus-
que vtuntur rustici cum sunt dolia musto plena ver-
saturi, aut vvas conculeantur in torcularibus, vt in
patria mea fieri consuevit. Id verò faciunt, quia alia
fumos noxios multi arcent & absumunt. Igitur ea-
dem causa cum iam cessauit fluxio, & quod influxit
impactum, & contumax est, iuuare possunt alia
in maza, vt & vini potio dolores oculorum soluit.
At verò aqua frigida capiti affusa non hac occasio-
ne, sed cum adhuc fluit, estque fluxio calida. Tunc
enim frigida affusa scindit, arceat fluxionem ex ca-
pite & oculis, quæ ex toto corpore agitur per venas
iugulares. Itaque Hippocrates docet nunc auxilia
ad oculos, quæ non simul neque eadem occasione,
sed sua quæque agi debent.

*Oculorum medicamentum spodi duodeci-
mam partem, croci quintam, gumorum thu-
ris vnam, ce. ssa vnam, myrrhe vnam. A-
quam capiti affundere iuuat & dare alia cum
maza.*

Constat nullum medicamen esse ad omnes oculo-
rum affectiones idoneum, sed dicit Hippocrates v-
num quoddam esse oculatum medicamentum,
quæ vsu probata sunt, quod nunc describitur: quod-
que accipit, pinguis partis thuris & cerussæ, & myr-
rhæ vnam quandam mensuram, siue vnciam, siue
trientem, siue quadrantem, siue drachmam, siue
scrupulum, siue aliam quamcumque spodi duode-
cimam, & croci quintam: relatis duodecima & quin-
ta ad certam illam mensuram, quam accepimus, vt
vnciam, aut drachmæ duodecimam, vt si dicemus
R. pinguis partis thuris, cerussæ, & myrrhæ, ana-
drac. iii. spodi scup. i. croci. scrup. ii. & grana vii.
Hoc medicamentum est maxima ex parte conoecio-
rum, Nam crocus, thus, & myrrha, hæc virtute ma-
ximè pollent. Est etiam agglutinans & siccans. Nam
dicta omnia habent siccationem bonam, & siccationem
quandam. Siccationem verbò insignem habent
spodium & cerussa. Est etgo vtile medicamen-
tum ad antiquas iam fluxiones, ophthalmias, & ad
vulscula, in quibus coquere, & absumere succos
opus est, & agglutinate labia vulsculorum, aut ro-
borare partem. Quæ etiam vi prohibetur ue fluxio
noua fiat. Sunt verò hæc omnes medicamentorum
materies oculares, quia mordacitatis expertes, qua-
libet ad oculos vtendum semper est, nisi summa co-
gat necessitas acriter tentare. Verùm incipiente oph-
thalmia, aliis collytiis fuerit opus, quæ scilicet tan-

*Varices caluorum nisi fuerint magni, ma-
niam percutiunt.*

Dicitur sexta particula aphorismorum. Quicquid
que calui sunt, is non sunt magnæ varices. Quo
pacto ergo nunc dicit, varices caluorum, nisi magni
fuerint? Quasi magni esse soleant? Explicatum mihi
est, quod Galenus prior dixerat, illo loco caluitum
non dici, quod ob siccitatem & duritiem quibus-
dam hominibus naturaliter fit, sed quamcumque
pilorum corruptionem, quæ ob malignam cacochy-
miam, quæ melancholicæ habet semper quàm mul-
tum, significatque proinde redundare eam in parti-
bus superioribus. Quo fiet, vt quibusdã acciderit, raro
varices fiant magni, vnum enim vtriusque in partibus
superioribus dico, & inferioribus poterit adeo re-
dundare: sed aut nulli varices fient, aut exigui. Si
quando tamen fient magni, acciderit permuto con-
trariam in partem excremento, quare solentur cal-
uitium, quod quidem per varices exiguis non sol-
uerit, imò vero grauius affecti capitis inditum, & ri-
t quod tentatur solum & imperfectus abcessus
grauius signum est, quàm nullum abcessum fieri.
Merito ergo in caluis, factis exiguis varicibus, tunc
tur magis mania, quàm si nulli ficerent.

*Ad vitiliginem & lepram calcem in aqua
adhibeas, ne exulceres.*

Vitiligo & lepra morbi sunt curis, & satis extimul
ex succis pituitosis, aut melancholicis, vtriusque ma-
lignis. Calcem viam aquam non expertam respuit,
quia aliis excedat, rectius madefactam, & sem-

extinctam amant, quia hæc licet, & eam non am, At
detrahta veteri, gignit.

*Vt secundarium, si qua supersint, expurga-
tio promoueat, sternutatorium naribus ap-
ponere oportet, & apprehendere nares & os
sternutantis.*

Hæc est 46. sententia quintæ aphorismorum, B
quam suo loco explicui.



SECTIO SEXTA.

S*I caput magnum, & oculi parui, bal-
bi, iracundi sunt.*

Hæc sententia, & multæ aliæ huius particulæ
ad physiognomiam spectant, & obseruatione eor-
um, qui huic philosophiæ incubuerunt, constant.
Oportet verò etiam naturales singulorum causas
inuestigare. Caput magnum magnitudinem cranii
significat, non tamen mox opus est vt internæ capi-
tis partes magnæ sint, & interna orificia lata. Quin
potius fieri potest, vt canum cranii factum sit à prin-
cipio latius, quam pro magnitudine eorum, quæ in-
terius contineantur, aut vt cranium fit valde cras-
sum, & altitudinem magnam inter duas tabulas os-
seas habens, vt cranium sit magnum & canum illud
exiguum, atque vtrique ratione in capite magno
erunt internæ partes exiguæ. Hanc figuram signifi-
cant, in capite magno, exigui oculi: nam oculi exo-
riuntur proximè ex cerebro, orta verò plerumque
sunt qualia sua principia. Angustia internarum par-
tium capitis & thoracis multum facit ad iracundiam.
Nam cum præcipua membra malè ventilantur, &
à fumis expurgantur irritationis crebris initium ha-
bent intra se: maxime si angustia organorum ac-
cedat calida iotemperies. Hæc eorum gignit plures &
mordaciores fumos, & strictura prohibet expurga-
ri. Magnitudo capitis calorem profecto significare
nata est magis quam frigus. Hæc ergo accedens
oculorum exiguitas, augeat significationem iracun-
diæ: quamquam, cum reliqua quæ in capite sunt,
magnitudinem habent illi respodentem proportio-
ne, significat hominem probum, magoanimum, &
alioquin ab iracundia. Confirmat verò iracundia
suspicionem balburies accedens. Nam dictum est in
superiori sectione, dicensque in hac rursus, quod-
dam balburire præ iracundia, quod præcipitantur
loqui velint, & præ bile, quod eorum musculi irriten-
tur multum, & parùm firmi sint. Quibus igitur caput
est magnum, & oculi parui, suntque balbi, iracundi sunt.
Sed contrioger dubitare, qui fieri possit, vt cum magno
capite exiguum cerebrum sit factum, cum sint partes
admodum vicinæ, & quæcumque causa magnitudinem
capitis fecerit, videatur cerebri quoque magnitu-
dinem figurare. Certa multa talia contingere so-
lent in formatione, vt in magnis manibus fuor qui-
busdam exigui digiti, aut quod inæqualis fuerit ma-

teriz generationis temperies, aut quod inchoata
iam generatione partium inæqualiter facultas for-
matrix illam materiam subegerit. Vtunque au-
tem cerebrum exiguum factum fuerit, etsi ob frigi-
ditatem eius partis, facit angustia ad iracundiam:
quod si cranium ob calorem creuerit, multo magis:
si autem frigidum etiam sit, sed ob materiz redun-
dantiam, tunc quoque iracundus erit homo, non
quia caput magnum, sed quia cerebrum exiguum,
etsi sit caput magnum.

Longi plures dentes habent,

Duplici ratione constat dentium raritatem, &
paucitatem, breuitatem vitæ: densitatem & mul-
titudinem, longitudo significare: & quia pars
hæc plusquam alia quæpiam indicare potest robur,
aut debilitatem caloris naturalis in partibus, & fa-
cultatis naturalis, & quia est apprimè necessaria ad
vitæ custodiã. Nam sola hæc pars post aliquot men-
ses iam edicis nascitur, non quasi partis alicuius plus
antæ particula, sed quasi alius innascens, ac inha-
es, & post aliquot annos exiciens, renascitur. Itaque
est particula, quam nullam antè existentem, bis
producit natura denuo, ac proinde ea maxime in-
dicare potest, quam fortis sit naturalis partium fa-
cultas: si scilicet multos densos & firmos producat,
fortis est facultas: sin minus, debilis. Quæ quidem
ad longitudinem & breuitatem vitæ, maxima om-
nium causa est, cum nutritioe seruetur vita nostra.
Præterea ad felicem partium nutritionem, faciunt
dentes plurimum. Nihil enim quod non probè
comminutum in ore sit, potest in ventriculo benè
cômuni, neque in aliis officinis. Coostat verò quòd
rari, qui etiam infirmi semper sunt dentes, non pos-
sunt satis cibos comminuerè, etsi multum in ore
versentur.

*Balbi, ceteri lingua præditi, melancholici,
biliosi, incontinentes afficientes, iracundi
sunt.*

Duplices balbos esse sapientiam, & in hoc opere, &
in aliis dictum est, quosdam pueriles, ob molli-
tatem & debilitatem musculorum lingue balbutien-
tes, alios ob mæris celeritatem, aut iritantem bilem.
Illi siue loqui tantum, siue cantare velint, sine co-
stanter, siue rapidè, nunquam non balbutiunt, sicut
que hi pueriles, & tardi, & minime iracundi: Hi
ceteri lingua præditi sunt, & vno impetu, antequam
hæcant in sermone, loquuntur expeditè, & cum
sedato impetu, canant. Hi sunt biliosi, adeò vt
etiam siant in iuuentute ea biliosus melancholici,
proinde etiam sunt ad furorem parati. Quod maxi-
mè prodir inuitus incontinentes & iracundia. Ni-
mirum vt tradunt physiognomi, oculi incontinentes
significat homines cogitabundos, inuerecundos,
& macacos, Solent hæc omnia in eosdem incidere.
Non autem semper. Nam multi studiosi & probi,
sunt cogitabundi. Quidam alij sunt, qui parùm tan-
gantur pudore, non sunt tam maniaci. Quæ ita
distinguuntur. Oculi incontinentes & torti sunt

maniacorum, si tamen non torui, non significat maniam: horum qui cum quodam humore, studio forum: cum siccitate, inueterandorum sunt.

Qui magnum caput, oculos nigros & magnos, osum crassum & sinum habent, ii boni sunt.

Dixerat in initio superioris sectionis, simos magnos oculos habentes, bonos esse, nunc addit, caput magnum, & oculos nigros: alterum quidē, ut quod per se conferat ad probitatem, alterum, non quod conferat, sed quod etiam per se malum signum esse soleat, adiunctum tamen aliis, nihil detrahit. Nam magnitudo capitis haud dubie bonam significationem praestat, & facultatis formatricis robur indicat, & cerebrum bene perfusibile. Oculi nigri significant, ut Galeu. in arte medicinali auctor est, exiguitatem, aut aliam posicam crystallini humoris, aut quod splendidus exquisitus spiritus visorios non sit, aut quod humor aqueus sit crassus, vel redundans. Quae omnia mala potius, quam bona censeri debent. Nam robur formatricis, & calor naturalis, partium solidiorum prominentiam & magnitudinem patiunt, sed aequarum multitudo, & excrementa crassitudo hoc robur non indicat. Fulgor vero ipsa instrumenti facultatis animalis perfectio est. Tamen in capitis totius & oculi magnitudine, & nasi dicta similitudine, exiguum est ad improbitatis significationem, oculos esse nigros. Atqui cum causa nigritudinis non omnes sine sequē male, in bonorum signorum conuersu, minime male consentaneum est imputari, ea verō est aliorum crystallini positi: velut pessima, spiritus obscuritas.

Oculi rari & magni, caput magnum, cervice tenuis, pectus strictum, hominem quadratum attestantur.

In plerisque codicibus legitur caput paruum, Inuit Cornarius transulit magnum, quae lectio hoc loco magis artidet. *Idemque*, seu congrue aptatum hominem esse, ad corpus, aut animum referri potest. Nam ita appellamus eum cui congrua totius corporis, & elegans compositio est, & cui bene compositi mores. *Idemque* oculus, qualis leonibus est, & magnus, omnibus hominibus videtur facere ad pulchritudinem. Magna verō caput, & tenuis cervice, & pectus angustum, nulli probantur, nisi gracilis cervix ad magnum caput dicatur, non quae admodum talis sit, sed quae producta, ut caput non humeris haret (quod ad proceritatem corporis facit plurimum) & stricta pectora dicantur, non quae ad maximas talia sint, & prope alas, sed quae sub thorace, quā thorax a ventre separatur: cuius loci angustiam, pulchritudinis gratia, sunt qui adeo procurant, ut fasciis & laqueis suis corpora vehementer comprimant. Ad corporis igitur congruam compositionem, ita faciunt haec: sed & ad morum probitatem videntur posse multum conferre. Si enim, ut Plato dixit, cervicem separauit Deus caput à thorace, ut minus perturbaretur mens ab irascibili parte, pro-

Afectu cervicem esse non valde crassam, & productam, & thoracem non nihil angustum, quod cor non feruidum, neque aestuans significat, facit multum ad mentis tranquillitatem, idque ad temperantiam. Cum hac verō tranquillitate, caput magnum esse, & spiritus fulgentes (quod charops color indicat) facit multum ad mentis perspicaciam, ac proinde ad prudentiam. Haec verō ad omnem probitatem. Haec igitur, nisi in extremo sint, ad prudentiam & temperantiam, si autem extremē angusta sint cervix & thorax cum magnitudine capitis, facient ad versutiem & astutiam. Quia cum nimia vitalis facultatis debilitate, aut angustia cordis, quae improbitatis sunt, prudentia mutatur in calliditatem.

Qui capite est paruo, non erit balbus, neque caluus, nisi fuerit glaucus.

Observatio physiognomonica haec esse videtur, eius philosophi peritis experientia cognita. Si quā tamen rationem oportet dicere, haec erit. Capitis exiguitas, aut ex debilitate facultatis, aut ex materialis penuria videtur orta. Penuria materiae cum bona temperie caput facit exiguum, non tamen caluum, neque balbum: debilitas facultatis quae exiguum capitis incrementum peperit, multoties etiam crudorum causa erit. Crudum autem alimentum oculorum glaucedinem solet facere. Nisi ergo glaucus fuerit homo, non habebit exiguum caput ob defectum facultatis. Si autem ob facultatis defectum, qui cum vitio temperamenti coniunctus est semper, poterit esse balbus, aut caluus, atque alia etiam habere vitia, praeter exiguitatem capitis.

In convulsionibus si vox in die legitimo ressituitur, liberatur a magno morbo.

Convulsionis nunc vocat, eas venarum intercepciones, quae succis aut vaporibus copiosis occupantibus actuos fieri solent, ut in ebriis: aut sine occasione plethora occupatis, & in mortem cum manifestis convulsionibus finiri possunt. A qua quidem liberantur, si loquuntur legitima hora solutionis ebrietatis, qui ebrii sunt: aut qui repleti, quae solent solui apoplexia, & aliae apoplecticae passionibus. De his aphorismo quinto sectionis quinta ita dicit. Si ebrius quispiam repente obmuerit, convulsis motibus, nisi cum febre contempnat, aut ad eam horam veniens, quae solent solui crasiales, loquatur: Hic addit nunc, in convulsionibus (in his scilicet passionibus) si vox soluitur in die legitimo (est verō legitimus solutionis dies cuique morbo, quo solent solui) liberatur a magno morbo. Vox quidem non liberat ut causa, sed ut signum, quia indicat liberari hominem à convulsionis lethali. Nimirum in omni vocis interceptione, maximas metus est ex convulsionis, siue ex manifesta causa, siue sine ea vocis intercepcio acciderit. Nam de iis, qui ob manifestam causam voce priuati, dixit in iam citato aphorismo. De iis qui contra talem causam, dixit in libro de ratione victus in morbis acutis his verbis. Cum aliquis repente voce priuatur, venarum intercepcio significatur, si sane hoc

contingat absque manifesta, aut alia forti causa. Interiectis paucis addit, incidunt autem plurimis ipsorum hæc, rubores faciei, oculorum stabilitates, digitorum in manibus distensiones, dentium stidiores, maxillarum contractions. Constat verò hæc convulsiva signa esse. Sed & libro 1. prædictionum, de vocis interceptione in eorum, siue ex causa manifesta, siue aliter, ita scriptum est. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ. Et rursus, in vocis interceptione spiritus, velut iis qui strangulantur, malus est. Nimirum hæc convulsivæ sunt signa, cum quibus aphonia pessimè affectos significat homines, qui si legitimo solutionis tempore loquantur, evadunt, & a morbo quidem gravissimo. Atqui profectò multo magis evadunt, qui ex forti apoplexia non loquuntur, vique ad legitimum solutionis tempus, ut vique ad tertii diei initium, aut usque dum saltem totus dies naturalis exactus est, quam qui statim, aut non multo post quam correpti sunt. His enim paulò post redit gravius & moriuntur. Ac multo magis si sine vlla partis cuiuspiam resolutione loqui incipiunt, quia multo magis præter rationem ea solutio est, cui metus non fidas. Sed tunc solum putetur evasisse homo, cum legitimo solutionis tempore loqueretur.

Parturienti febricitanti, & dolore affectæ aquam affundere prodest, & dare, ut in die pristinam crassam calidam.

Vbi ego legi parturienti, habetur Græcè *μῆτις*, quod nomen recens enixæ potius significat, atque proinde omnes vertunt puerperæ febricitanti. Mihi tamen videtur nomen *μῆτις* non de ea tantum, quæ peperit, sed de parturiente dici posse, & iuxta hanc lectionem sensus est valde consentaneus. Nam ob puerperas febricitantes, aut dolore affectas, non hæc tantum levia, quæ Hippocrates consult, sed magna quædam, ut in primis missiones sanguinis, solemus facere. Tamen vterque gerentes, nullas curationes, nisi omnino exiguas ferre possunt, quia missio sanguinis abortiuit, & expurgandæ non sunt, nisi cum magna cautione, si materia turgat, neque ita quidem semper, sed à quatuor mense vique ad septimum. Sed neque tertium admodum viduum sustinere possunt, quia privatur fortis alimento, neque auxilium aliud, quod magnopere possit corpus permovere. Atqui diuresis vsum multo minus, quia movent etiam menstruas evacuationes, & abortus. Proinde, siue febricitent, siue dolant, blandius tractandæ sunt, atque si fieri possit, febris solo victu, & dolor solo fomento anodino curari debet, victu vero humectante, nam talem amat febris, non autem admodum tenui. Huiusmodi est prænata crassa (quam totum prænatum soler vocare) data ter die, ne, si detur semel, aut bis, detur plusquam ventriculus benè ferat, si neque tantum, neque pluries, minus quam res desideret. Detur vero hæc actu calida, quandoquidem cibi loco sumitur, ita enim melius coquitur, nique proinde est minus humectans. Atqui eadem ratione tu possis uti pulli exigui cum lactuca, elixari cremore, atque etiam carnibus, & alio quocumque tali cibo. Non enim vnicui est ad affectionem aliquam idoneus, sed neminam Hipp. sibi maxime fa-

milarem. Fomentum quoque anodinum si fieri potest, ne sit stupefaciens, sed aliquod eorum, quæ ob mediocritatem, & blandum sensum, quem faciunt anodina propriè nuncupatur, cuiusmodi maxime est aqua calida. Ergo dixit Hipp. parturienti febricitanti prænata crassam calidam ter die dare prodest, calidam dolore affectæ affundere. Quasi diceret hæc blandius tractandas esse. Non tamen proinde nunquam est aliis utendum, sed nisi res vrgat. Hoc enim alia omnia præcepta tollit.

Puerulus nutritur septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce polles, & robur assequitur, & manibus validus est. Voce soluta omnia solvuntur, horum enim solutio vocis solutioni similis est. Solvitur autem in legitimo.

Quædam tempora esse legitima partui, hæcque esse septimum, nonum, & decimum mensem, præcipuè, & quas ob causas, dictam antè est. Nunc docet eisdem ob causas eadem tempora esse legitima, quibusdam mutationibus, quas editi iam in lucem pueri subeunt. Hæc sunt dentitio, & tempus dandi cibos solidiores, & solvendi manns, & ambulandi, & edendi voces, & loquelæ. Est enim vocis duplex solutio, prima quæ voces articulatas incipiunt edere nihil significantes: secunda, quæ iam loquuntur. Et reliquæ etiam mutationes geminæ sunt, & ead proportionem accidunt, ut ipsa vocis solutio. Nam septimo mense, aut nono, aut decimo (rarò autem tardius) incipiunt garrere, & hoc ipso tempore incipiunt dentire, quod ob miram naturæ providentiam iam significat opus esse ut aliquid cibi infanti detur, & tunc iam manibus apprehendunt, incipiuntque manuum vsum nosse. Duplo tempore, inquit 18. aut 20. mense iam loquuntur, & ambulant, & possunt omnino carere lacte, cibos solidiores iam capientes. Hoc est, quod dicit voce soluta omnia solvuntur, *ὅτι καὶ τὸ πρῶτον ἐκείνη, id est si similem solutionem habent omnia solutioni vocis solvitur autem quodcumque horum in tempore legitimo*. Sunt hæc tempora dictis solutionibus legitima, quia duplum & triplum tempore partus.

Si vene in manibus pulsant, & facies rectè valeat, & hypochondria non sint mollia, diuturnus morbus significatur, qui sine convulsione non solvitur, aut multo sanguinis ex naribus fluxu, aut dolore in coxam decumbente.

Videntur esse hic triæ sententiæ, alia de morbi diuturni signis spectans, alia ad doloris coxæ solutionem. Mihi vero non ita videtur (nam cur in coxæ dolore speretur salus ex fluxu sanguinis de naribus?) sed vnicam esse hanc, venarum in manibus pulsam, & faciem rectè valentem, & hypochondria non mollia, significare morbum diuturnum, & cuius solutio non contingat sine convulsione, aut sanguine multo ex naribus, aut dolore coxæ. Proinde vbi dicit *ὅτι ἰδίως ἐστὶν ἰσχυρία*, id est dolor in coxam, legendum fuisse *ὅτι ἰδίως ἐστὶν ἰσχυρία*, id est.

an dolore coxæ. Facit enim hæc exigua literæ mutatio magis congruentem sermonem. Sed perpendamus singula. Si venæ (inquit) in manibus pulsant. Hoc certe nihil aliud est, quam si diceretur si pulsus indicet febre renari hominem. Nam venæ nomen de artériis dici constat, cum addat, pulsant. Manus Hippoc. non dicuntur solùm extremæ manus, sed brachia tota atque pulsare vocat illi, non utcumque pulsare, sed plusquam benè valentibus solent. Itaque perinde est, ac si diceret, si pulsus deprehendatur in brachijs, iis scilicet locis, quibus commodius attingitur ad corpus, maior, celerior, & crebrior quam solent. Est verò hoc, quod nobis solent febres indicare. Vt ex hoc loco cõstet Hip. ad deprehendendos febres, vsum fuisse pulsus, vt & Gal. & alios posteriores. Si itaque dicit, febricitet, & facies recte palcat, id est, non sit pro febris magnitudine extenuata, duratus morbus significatur. Quod etiam in aphorismo dicitur his verbis. Febricitanti non omnino leniter, nihilominus corpus, aut plusquam pro ratione extenuari, primum: alterum enim longiorinē morbi significat: alterum autem imbecillitatem. Sed addit, & hypochondria non sint mollia. Merito profecto: quia nihil est, quod tam faciat ad citam morborum indicationem, quam hypochondria libera ab obstruptione esse: per ea enim agitur omnis humoris distributio, & omnis commectus, siue ad ventrem per mesenterium, siue ad vesicæ per veteres, siue ad totum corporis habitum ex alto sit penetraturus. Durities vero hypochondriorum significat obstruptiones. Sed & alia ratione significat hypochondriorum durities morbum longum fieri, quia significat succos, ex quibus morbus pendet, crassos esse, aut crassos esse factos. Si igitur dicta signa adint, morbum fieri diuturnum significant: cum vero qui talis est, non speres soluendum siue abscissu. Nam, vt in prognostico dicitur, si quæ febris protogatur saluo affectu homine, abscissum expectare oportet. Abscissus verò pleuique sunt ad articulos, vt innumeri in locis Hippocrat. dixit, atque in illo loco prognostica, & in hoc libro, iam sæpe ad articulos ligamenta, & tendines, qui ex eis in mufculos producantur: nam sectione prima huius secundi libri dixit, abscissus aut per venas, aut ossa, aut nervos. Abscissus ergo in nervos aut tendines faciunt conuulsiones, aut resolutiones in articulos, articulares dolores, in quibus præcipue est dolor coxæ. Merito ergo ex longo facto morbo, timetur conuulsio, aut dolor coxæ. Nam vt in aphorismo dicitur, quibus febres diuturnæ, iis vel tubercula, vel dolores in articulis sunt. Fient verò nisi talem abscissum anteverat fluxus sanguinis de naribus. Nam vt dixit nuper, sectione quinta huius libri, dolorem in locis internis fortem, lardieus soluit, & sanguis multus ex naribus erumpens. Sed & alie copiose evacuationes possunt etiam abscissum solvere. Nam vt in aphorismo dicitur, quibus spes est ad attenuandos abscissum fore, liberat ab abscissa vena multa & crassa, & alba facta. Si autem etiam ex naribus sanguinis profuerit, admodum cito soluitur.

A lidissima danda est & vinum meracum.

Guttur est caput asperæ arteriæ. Constat verò non posse ad omnes gutturis affectiones vllum auxilium, necdum tam simplex, vile esse. Ergo ad aliquam certam gutturis passionem, intelligi oportet hanc curationem esse vtilem. Ea vero non potest esse alia, quam tussis arida, aut deffillationem rennem & acrem & capite in guttur. Ea enim si non ex multo, sed ex exiguo, tenui, falso, auracti siccio pender, neque corpus vnà plenum sit, affusione aquæ calidæ in caput curatur, præcipue quibus caput lavare consuevit. Nam ita reuocatur ad cutem, per eamque expirat quod in guttur deffillabat, atque si quid reliquum est, mitigatur, & citra irritationem gutturis, excreatur. Id vero fieri nihil magis prohibet, quam frigus aeris ambientis. Nam laxatum balneo caput facile frigore larditur, & nouam ac deteriore fluxionem parit. Confert quoque ad deffillationem, vt cibis crassitudinem afferentibus, & hebetantibus, cuiusmodi puliculae ex farina parantur, aut ex amylo, aut etiam oryza, & huiusmodi: contra ac eum ex crassis & erudis fluxio pendet, in qua vten dum cibo calorifico & extenuante, sed & in his exiguo vt excrementa cruda absorbantur: in illis, farina copiosa, ne reddantur actiora. Sed oportet omnia quibus ad pectus vitimur, indicatione pariti, actu esse calida, etiam si aliquo medicamento frigida, ob humoris speciem, sint. Merito ergo dicit, equam calidam capiti affundendam esse, nisi frigus adsit, sin minus, id est si frigus adsit, ac proinde nō liceat balneo vri, farina quam calidissimā dandā. Addit & vinum meracum. Hoc sanè mihi est in talibus maxime suspectum, ac proinde haud scio an id præbere aliquando tentauerim: conferre verò potest, vt & ad oculos dolores, & ad dolores capitis, & ad solvendam ebrietatem. Coquendo scilicet, & dissipando. Cauendam ramen quā maxime est, ne teneretur pleno corpore, neque cum fluxio potest desuo concitari. Id enim faciet potius, quam potior absorberet. Ego proinde pituitibus auxilijs contentus, & alijs eiusmodi, malopaulatim huic malo succurrere, quā semper in fluxionibus periculosum vini propinari. Propinat verb ille vinum, cum frigus est, pro balneo, vt discutiat. Neque enim, quia dicit, sin minus farinam quā calidissimam dandam esse, intellige non esse hæc danda, nisi quibus affundere aquam non liceat. Nihil enim prohibet simul, & fieri balneum, & cibos tales dari, sed perinde est, ac diceret. Si autem non licet vri balneo, & farinam quam calidissimam dare, da farinam, & potionem copiosam vini meri, & dormiat, vique dum cum vino partim absorbatur, partim coquantur fluxio.

In turbatione ventris fabas coctas dare oportet, nisi superiora sunt admodum biliosa, aut cumini edendum dare cum fabis.

Guttur affecto aqua calida capiti affundenda, nisi frigus adsit, sin minus farina quam ca-

Quos in calce primæ sectionis vocauit crudos, & liquidos secessus, nunc vocat turbationem ventris & quâ ratione illis simili coctum dari iussit, nunc

Inter fabas coctas, ut cibos tardi descensus, ut si orizum etiam diceret. Ceterum fabae integrae sint, ac cum corticibus. Nam farina deterget plusquam ut possit filtrare. Habet id incommodi, quod multus flatu ex ea provenit, qui in su pernatum partium imbecillitate maxime debet timeri. Nam effert ad superna, excrementa, atque ita capitis dolores facit, aut auget. Proinde cum caput repleti excrementis ex toto corpore patatum est, vel etiam thorax, ut cum calida intemperie laborant, vitari debet usus fabae, aut aliquid, quod flatum possit tollere, & ventrem nihilominus liceat, cuiusmodi cuminum, cum fabis est admiscendum.

Interceptio morbi non potest fieri, nisi in die legitima, neque quidem principium fieri potest, nisi in die illegitima, & mense, & anno legitimo.

Dictum non semel iam est, dies legitimos vocari iudicatorios, quibus scilicet moriuntur aegroti, & quibus salvi fiunt. Itaque dies sunt fatales, & extremi morborum acutorum. Qui menses, & anni, dicantur legitimi, exigit hic locus, ut dicamus. Huiusmodi quidem sunt, qui iudicatorii, qui fatales, qui insignes mutationes nati sunt afferre. Non tamen hi perinde atque dies, sunt velut atticali quidam morborum, sed aetatum, & vitae hominum. Itaque menses & anni, qui insignes vitae hominum mutationes afferre solent, sunt legitimi. Menses quidem, ut nuper dixit, partus, dentitiones & loquaciam fieri solere quibusdam mensibus: autem, velut septeni fiunt infantiam, pueritiam, adolescentiam, & reliquis etiam aetatibus mutationes afferunt. Atqui in his ipsis naturalibus mutationibus morbi nati sunt fieri. Ac proinde Hippocritis particula aphorismorum, omnes morborum differentias, quae cum aetatum mutatione fieri solent, persequutus est. Accepimus praeterea ab antiquissimis rerum naturalium observatoribus, annos certos esse hominum vitae fatales, quos climactericos (attigit id Plinius lib. 7. cap. 49. Quasi scalares appellabant, quod per eos velut per scalas quoddam gradus, ex quibus omnibus solent praecipitari, homines procedant. Illos annos esse periculosos, quod aut mortem aut morbos insignes portendant, etiam iacturas dicunt quidam, sed non ergo afferre solent. Hos esse dicebant septenarios, & novenarios, & qui ex multiplicatione huius septenarii & novenarii fiunt. Veluti in primis 63. quod est septies novem, deinde 84. quod novies novem: & 49. quod septies septem, sed & 34. quia est sexies novem, estque à 63. gradus proximus, quia fit ab illo detractus novem: sed & 20. quia est septenarius factus ex 63. additis septem. Sed & ante hoc sunt climacterici omnes septenarii qui à primo, quin & septimus, & novus menses sunt climacterici infantibus, morbis enim maximis illis mensibus tentantur, & multis deficiunt in dentitione, & in lactu cum solido cibo commutatione, ex febribus, ex ventris profluio, ex epilepsia, ex vermibus, & aliis puerilibus morbis. Sunt itaque dies legitimi solutionis morborum: & menses, & anni legitimi

Aegrotandi. Non tamen perinde sunt dies legitimi incendi in morbos. Non enim ut dicimus septenis mensibus, & annis, morbos accidere solere ita possis dicere hoc aut illo die. Nulli enim sunt legitimi dies morborum, sed accidunt incertis diebus. Proinde dicit Hippocrates, interceptio morbi non potest fieri nisi in die legitima, neque principium fieri potest, nisi in die illegitima, & mense, & anno legitimo. Cum verò audis non potest fieri, perinde intellige, ac si diceretur, non fit, aut non solet. Si enim rigidius intelligas, profecto, neque anno climacterico aegrotare, neque morbum die decretorio finire necesse est. Alia quoque ratione dici potest dies aegrotandi illegitimi, quam quoddam incerta. Nimirum Gal. lib. de dieb. decretorius auctor est, omnes dies esse plus minusve decretorios, praeter primum, & secundum. Primum enim non esse decretorium. Significare ergo potest hic locus Hippocrit. finire morbos die decretorio, diem quo incipit decretorium non esse, sed illegitimum, malum, improprium, contrarium diei solutionis. Huc spectant, quidam, qui, dies decretorios cum multis numeris consentientes, dicunt, decretorios dies esse eos, qui dissoni sunt primo.

Nitrum Aegyptium, & coriandrum, & cuminum terere, & cum unguine iungere prodest.

Malè coniecta videtur huc haec sententia. Nam & ipsa videtur aliunde decisa, & ceptum sermonem interrumpit. Sed hoc non adeò multum facit ad rem, si singula legitime enarrentur. Nitrum Aegyptium secundo loco commendatur à Dioscoridis, solum enim praefert Philadelphicum, estque, ut & coriandrum & cuminum, calidum, siccatum, & discorsorium. Non explicat autem Hippocrates ad quas passiones, neque cui loco debeat hoc linimentum, ex nitro coriandro & cuminum oleo paratum. Quare oportet hos ex alis coniectiones. Profecto non ad vnicam affectionem, neque vnicam parte utebantur eo antiqui: sed ad quamcumque frigidam passionem, quaeque calorem cum quadam diffusionem desideraret. Nam paulo post in hac ipsa sectione Hippocrates dicit, ut mulier in utero concipiat, nitrum Aegyptium tritum, coriandrumque, ac cuminum, in pilulis efformato, in pudendum bene subdito: Quoties scilicet ob frigidam & humidam veri interperiem non concipiat: Dioscorides cap. 80. lib. 5. tritum, cum cumino, aut ruta, aut anetho porum ex hydromelite, aut sapa, sedare tormina: illini verò ad febres circuitu redeuntes, ante suspensam accessiorem. Ad haec ergo omnia illini videtur potest, & ad alia huiusmodi nitrum cum coriandro & cumino & oleo. Ori veri ad steriles, ad febres circuitu redeuntes, lumbos, & toti spinæ, quia ut in aphorismo dicitur, & hoc ipso libro, inde incipiunt rigores: sed & ad ventris perturbationes, ad quas cumini edendum dare iussit, si ex intestinorum frigida intemperie initium traxerint, alio hanc ventri sacra velis cur.

Quotiesq; moriatur, necessum est in die legitimo.

Et legitimo mense, Et legitimo anno. Prædicere autem mortem aut vehementes dolores medico decorum est.

Qui ex acutis morbis moriuntur, die legitimo mori solent. Nam solent mori ex iudiciis. Moriantur verò homines eisdem diebus, quibus salvi fiunt. Sed & mense & anno legitimis mori solent, quia his solent ægrotare, eisdem autem mensibus & annis necesse est moriantur ex morbis, quibus ægrotant. Ceterum non est ea solamvis dei decretorio, ac mensi & anno claudicari cisdem interim afferant, sed menses quidem & anni morbos insignes & acutos, à quibus vix evadunt, aut chronicos dolores, à quibus reliquum vix vexantur, ut podagram, aut calculum renam inferre solent: dies decretorii, etiam cum male iudicant, aut mortem, aut mutationes in deteriora afferunt. Proinde dicit, prædicere autem mortem aut vehementes dolores medico decorum est. Nimirum ut in initio prognostici dicitur, metidum vi providentia optimum est. Atqui professio ad medici honorem, & admirationem artis, magis refert prædicere mortem in morituris, quam salutem in evasuris. Nam in his, maxima laus est in restituta sanitate, & servata vix incolamitate: in illis nulla superest, nisi ut culpa putetur medicus vacare, quod prædixit.

Quibus oculorum vigor non constet, mors brevis imminet, si autem in anno legitimo fiat, ab utroque legitimis fieri necesse est: si autem illegitimo anno, & illegitimo die, necesse est mori die legitimo.

Vnum quoddam lethalius signorum est, oculos non esse robustos in morbis acutis. Nam in prognostico dicitur, si lucem effugiant, aut nolentes illacryment, aut distorqueantur, aut alter altero maior fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut venulas lasivas, aut nigras in ipsis habeant, aut lippæ circa oculos appareant, aut etiam sint instabiles, aut eminentes, aut cavi vehementer facti, aut squallentes, & obsecuti, hæc omnia mala & perniciose esse putandum est. Et rursus albi, si neque videat, neque audiat, mors sit proximo est. Sed scire oportet, ut bona signa diebus decretoriis accidentia meliora sunt, ita mala illis diebus fieri deteriora. Nimirum dies decretorius addit signis omnibus firmitudinem, sed & annis legitimis & mensis. Si quis enim in anno claudicet, colaboret morbo acuto cum signis lethalibus, maiorem metum facit, quam si alio anno. Nimirum ipse annus horribilis est, proinde si hoc signum, aut aliud quodpiam valde lethalius appareat anno legitimo, & die legitimo, ab utroque id est, utriusque temporis vi, legitimas fieri significationes necesse est, & proinde eodem die morietur. Si autem fiat anno illegitimo, & illegitimo die, morietur quidem (tanta est signi vis) tamen non eodem die: sed aliquo sequentium decretoriorum, aliquanto quidem tardius, si utroque est illegitimus: aliquanto citius, si alter sit legitimus, dies inquam, aut annus.

Numerorum quidem, tertius validissimus est.

Tertius numerus, si generatim, & quantum à ipsa numeri ratione agitur, consideretur, est omnium perfectissimus: quia primus impar, atque primus numerus. Vitas enim & bilis principia potentis numeri sunt, ut forma & materia. Horum congressu conficitur ternarius, primus, totus & perfectus, & primi tres dicuntur omnes, & ob id omnia constant trinitate, physica, principiorum: mathematica, dimensionum: intellectualia, potentiarum & virtutum. Sed & si in diebus contemplabilibus morborum spectetur, tertius est validissimus. Nam est primus decretorius in acutis tertius, quique affert paroxysmum, & tertii est tanta vis, ut vix vix quam permittat quarto (alioque in primis iudicetorio) iudicare, præcipiens illi iudicationem.

Cynanchem & ophthalmiam vena sectione curat.

Utrique huius affectionum missione sanguinis curatur, siquidem utraque est inflammatio, & ex eadem vena ambæ, puta ex cephalica, cum ambæ ad partes supra claviculas pertineant. Non tamen eadem ratione ad utramque mitti debet. Nam ad ophthalmiam licet copiose mittere, & affari, nullo ex deliquo animi timore imminere; tamen ad anginam non licet vix nisi repetita, ne per deliquo animi introitus collectus sanguis, in pulmone incumbar, & perineumoniam faciat. Nam hæc post pleuritidem aut anginam, desperata affectio est.

Vulnerato intestino, respiratio descendit obscura per vulnus, vacuanturque pectora, datur igitur lac & vinum aequale aequali comixtum.

Hanc sententiam merito reicit Petrus Iacobus Steue, tanquam suppositiciam, quia neque per ventris vulnus respiratur, neque idoneum ita vulneratis, sit lac cum vino mixtum.

Quorum pectus est admodum biliosum, balbi, furibundi & calui sunt: horum quicumque ab ortu etiam strabones sunt, amentes, lapidei, maniaci; quibus autem non, aliterius malis solutio.

Dixerat sectione quidam, morbos habent, balbus, calvus, & hirsutus fortiter atrabiliarios. Hoc idem est, quod nunc dicit, quorum pectus est admodum biliosum, sunt balbi, furientes, & calui. Nam hirsutus pectoris calidi iudicium est. Porro hæc eadem sectione necesse dixerat: Balbi, ceteris linguae, atque bilis humoris obnoxii, biliosique sunt, oculus non iudices iracundie. Hæc quoque verba continent eadem sententiam, puta

iracundos, hirsutos, balbos, & caluosi paratos ad maniam, quia calidi sunt & sicci, atque irascibilissimi. Nunc addit his alios ad maniam parati hominis signum, dicens, horum qui strabones etiam à primo ortu sunt, amentes, maniaci, *adstruunt*, id est, parati ad insaniam, & ad stupidam quandam immobilitatem; quæ creepsens, solet in cathocum finire. Hoc idem significans oculi non nictantes, quorum mentionem antea fecerat. Sed quod strabismus à primo ortu insaniam significet, argumentum physiognomicum est, relatione ad passionem. Nimirum qui iam insaniunt, ita solent oculos iactare: quibus autem non est strabismus à primo ortu, sed successit, aliter morbi est solutio. Solare enim abscessu ex alio morbo oculos distorti, didicisti nuper ab Hippocrate dicente, solutio doloris coarum fit per oculorum distortionem.

Circa naturam plurimam vim habet mamma dextra, & oculus dexter, & quæ infra sunt, nam & mares dextris partibus habent.

Mulda præstant naturali calore dextræ partes finitris, quia in dextra parte hepar situm est, principium omnis nutritionis. Iam verb & generatiua membra sunt dextræ finitris valde calidiora, testis enim dexter ex vena caua venam accipit, finitris ex emulgente serosam sanguinem. Porro ren dexter sublimior, & hepatis propior. Sed & arteria aorta, à sinistro ventriculo cordis orta, mox versus dextram partem flexitur, & dextro corporis lateti maiores arterias impertitur. Hinc fit, ut omnes partes dextræ finitris sint firmiores, quod vel inde cognoscas, quod mares dextris veteri partibus hærent magis, ut in aphorismi. dicitur. Ergo plurimam vim habent circa naturam dextræ partes. Hoc est magnum momentum habet, dextra pars an sinistra sit, quæ affecta est; aut viciniquæ patiens aliquam significationem præstat. Nam si pars dextra quàm sinistra præstantior est, etiam morbus dextræ quàm finitris maior, ac deterior. Porro si oculi perueri in morbo acuto, aut lachrymare graue est, perueri dextrum, aut lachrymare, grauius. Si mammam gracilescere generi vero significat abortum, gracilescere dextram abortum matris. Si hypochondrium alterum habere tumorem & dolorem est periculosum, dextrum ita se habere, multo grauius est. Atque ita dextra pleuritis, & arthritidis, & hemiplegia, quàm sinistra, deterior est.

Mulieri menstrua ut cohibeas, cucurbitulæ maximam secundam mammam affigere oportet.

Hic est aphorismus quinquagesimus sectionis quintæ, in cuius commentario diximus nullius partis cum alia vili esse rectitudinem maiorem, quàm mammae eam vtero. Causa autem est communio partium thoracis cum genitalibus, quam esse præcipue in communibus venis, quæ per sectos musculos abdominalis produciuntur, iam diximus, non semel in hoc ipso libro.

Trimestris fatus omnia habet manifeste figurata, & lac tunc habet. Si multum fluat lac, necesse est, ut langueat, quod in ventre est: si solidiores sint mammae, magis sanne est embryo.

Secunda pars huius sententiæ, est aphorismus quinquagesimus secundæ sectionis quintæ. Illa vero verba, *quoniam multum lactis habet, & quia in ventre*, significant tertio mense esse iam partes omnes fuerat distinctas, itaque finitam partium figuram, seu formationem, & tunc primum apparere lac in mammis vtero contentum. Quod de figura dicitur aliis omnibus placitis videtur consonum. Siquidem cum Hippocrates, & in libello de alimeno & in libello de carnibus, & in hoc ipso libro, multos ac diuersos figuræ fines ponat, nullum tamen non intra tertiam mensam. Nam feminae etiam, quæ tardius quàm mares figuram accipiunt, circa sexagesimum diem accipiunt, eam tardissime. Huc enim videtur spectare, quod Deus sexaginta sex dies prohibuit templum adire, eam quæ filiam peperisset. Communis enim analogismus est, tempus expurgationis enim, respondere tempori formationis infantis. Sed quod dicit de lacte repugnare videtur ipsi Hippocri qui nuper in hoc ipso lib. sectione 3, dixerat, lac nutrimenti mutationem accipiente, *octimestri* vero perficiente. Quibus verbis diximus significari octauo mense lac fieri, quin & Galen. in comment. sententiæ trigemæ nonnæ particulæ quintæ, octauo mense lac fieri docet, quo pacto ergo tertio? Certe Aristot. 4. de generatione animal. cap. 3. decidit hanc controuersiam, dicens, septimo mense primum fieri mulieribus lac vtile, ac concoctus, & copiosius, ante id tempus exiguum esse & inutile quod apparet. Sed quid quod vtile ne octauo, ne nono quidem mensibus fit, siquidem etiam vsque ad peractum tempus expurgationis sunt, enixis etiam, quæ vocantur colostræ: Sunt enim colostræ (dicit Plinius lib. 28. cap. 9.) prima à partu, spongiosa densitas lactis, & infantes eo lacte videntes inquadit morbus, qui dicitur colostratio, dicunturque colostrati. Certe ita est, lac vsque ad extractum tempus purgationis non est satis vtile, tamen ante septimum, aut octauum mensem omnino inutile, & exiguum, ab hoc tempore plus iam est, & nutrire, tamen cum aliqua incommoditate, potest, fit tamen qualecunque lac mense tertio. Quidam tamen pro *tercio* legunt *primo*.

Vena habetur crassa in utraque mamma, in his maxima est sita prouidentia pars.

In utramque mammam et tempus ab internis venis quædam valde manifestæ, tunc saltem cum mulier gerit vtero, aut lactat, aut cum instant menstrua evacuationes. Huius venæ pars maxima in mammam, distributa infunditur, reliquæ venæ recipiunt deorsum, per musculos rectos abdominalis vsque ad vterum. In his (inquit) maxima est sita

providentiæ. Hoc est, hæc multum præstare potest ad præventionem. Nam ut superiori sectione dicebat, prævenit fluxus ex mamma oculi trahitur, & rursum in aphorismo, si lac in matris appareat infanum & furibundum. Quæ significatur, tumorem mammarum significare transmigrationem succorum in capite ad corpus, & contrò, ob hæc scilicet venas. Sed & alium sensum, quem trahit probò magis, hæc verba ferunt. Nimirum magnam significationem præstare providentiæ formatæ, hæc venas erumpentes in mammas ob infantis necessitatem, & in uterum productas, ob necessitatem foetus, & ut eadem materia utriusque, quæ generis est.

Vrina stillicidium soluit vena sectio.

Trigesimus sextus aphorismus sectionis sextæ est hic. Quare eius enarrationem suo loco require ex meis commentariis, quoniam enim putant esse ad lectum.

Si supernæ partes, quæ sunt circa caput, urgeant ulcerum purgatio, vomitus, & aqua conferunt.

Vbi ego scripsi aqua, in omnibus Græcis codicibus *εὐδαι*, id est aqua intercus. Tamen quia nihil potest illa lectio continere, quod dignum sit Hippocrate, immo neque quod verum, suspicor scriptum fuisse ab Hippocrate *εὐδαι*, id est aqua. Nam facilis lapsus libranorum erit pro *εὐδαι* *εὐδαι*, & hæc sententia est vera, & aliis Hippocrate præceptis valde consentanea. Illud *εὐδαι*, id est turgere, significat turgere, & irritatum esse partem vlcere. Si igitur, inquit, supernæ partes quæ circa caput turgescant, id est si caput habeat vlcus, & adhuc tenetur inflammatione, & tunc, vlcus purgatio, vomitus, aqua. Id est curatio est, dare in potu aquam, & expurgare corpus pharmaco, deinde vti ad vlcera extergentibus, & aliis idoneis medicamentis. Nam Hippocrates vomitum vocare solet expurgationem, quæ pharmaco fit. Quia expurgare bilem crebro solebat ille vomitione. Huiusmodi est illud, helleboro qui non facile supra purgantur, eorum corpora pluri cibo & quiete humectare, & rursum illud, si velis magis ducere helleborum, move corpus. Hæc enim, & huiusmodi omnia, vomite helleboro, & vomitionis, de omni expurgatione dicuntur. Igitur purgationem & aquam commendat in talibus vlcibus capitis. Atqui vtrumque in præcipuis posuit. Nam lab. de vlcibus, non longe à principio, ita scriptum est. Modicis vlcibus & aqua quam maxime omnibus vlcibus conducunt, & magis recentioribus, quam vetustioribus, & si quod aliud vlcus, inflammationem est, aut inflammationem minatur, atque si periculum est corruptionis, & vlcibus, ac inflammationibus in articulis, & vbi convulsionem fieri periculum est, & vlcibus in ventre: maxime vetò omnium fracturis in capite & femore. Porro de purgatione paulò inferius dicit: Purgatio ventris deorsum plurimis vlcibus confert, & in vlcibus, quæ sunt in capite. Quod

purgationem vomitu fieri in bear, consentaneum videtur aphorismo decimo octavo sectionis quartæ, in quo dicitur. Dolores supra septum transversum, qui purgatione opus habent, rursum versus purgationem indigere significant: qui verò infra, deorsum. Quamquam ut in commutatione illius aphorismi dixi, purgatio sursum ob caput facta, magna consideratione indiget, & raro potest magna noxa carere. Cuius gratia in capitis vlcibus, ego non tantum non moueo expurgatorium vomitus, sed ne purgationem quidem pharmaco per os ingesto facere soleo, præcipue si tempus anni calidum sit, sed si possum clysteribus acrioribus, & tenui victu contentus sum, tunc, quod libet de locis in homine dicitur. Febricitanti caput ne purgato, ne furiosus fiat. Calciscunt enim caput pharmaca purgantia, & ad caliditatem febilem accedente ea, quæ in medicamento est, infansia facit. Hæc illo loco, quæ mihi videntur admodum rationi consentanea, ac proinde, siue homo vehementer febricitet, & præcipue secundum partes superiores, siue caput inflammatione tectum sit, siue tentari periclitetur, siue phreneticus sit, siue magnam habeat vlcus, quod possit non sine periculo irritari, deinde pharmaca quoad possum, cetero sciens hæc magnopere tentari caput. Indicat enim id somnus, quævis, qui expurgantur, mox ingruit.

A ventris turbatione, aut à tussi, abortio ceteros amare fecit. Dandum autem in potu electerium bis aut ter, nisi balbus sit. Alligare oportet aris florem cum vsseris usque dum rufus sit, & spongiam, nisi balbus sit.

Dicendum mihi est in enarratione aphorismi 24. particula quartæ, dysenteriam ex atra bile, quam lethalem Hippocrates vocat, esse cancerum intestinorum: atra enim bilis in eo loco, ut in aliis, solet cancerum cum vlcere excitare, ut flava bilis, aut salis pituita facit, per minus periculosas dysenterias, vlcera alia simpliciora. Simile quiddam accidit in aspera arteria per tussis. Nimirum ut dysenteria sit distillationem patientibus intestinis, & ea quidem primo radeat, deinde exulcerante manifeste, mittit aut malignius, ut est ipsa influentis succi species: ita per tussim asperæ arteriæ tussica interna, primo detersionem patitur, pro cedente malo etiam exulcerationem, aliquando etiam tantam, ut magna membrana frusta tussis recidantur, atque adeo etiam cartilaginum: & hæc vlcera pro specie succi aliquando sunt simplicia, aliquando maligna, non aliter sò in ipsa ore videmus fieri, tunc aphras, tunc malignas notas. Itaque maligna, & dysenteria, & tussis esse solet, adeo ut cancerum patiatur intestina, aut aspera arteria. Cuius affectionis essentiam, & notas, & curationem, complectitur brevis hæc distinctio. Essentiam quidem his verbis, à ventris turbatione, aut tussi abortio cancerò: notas, his, os amare fecit: reliquis, curationem. Nimirum alui turbatio dicitur omnis ventris fluxio immodica, siue diarrhæa, siue dysenteria, siue tussis sit: quæ verò cum intestinorum exulceratione sit, dysenteria est, & tussis etiam sit patiente aspera arteria distilla-

tionem aciem, quæ eam procedit multum, exulcerat. Exulceratio utraque, timeri debet, ne cancræta fiat: ubi enim facta erit talis, erit incurabilis. Timebis autem multo magis, si videris os ægroto amarefcere, non ut comque, sed multum. Quia vlcera tunc fiunt, cum corpora ægrotantium sunt cacochymia: nam quæ bono vtuntur succo, aut nulla aut simpliciora habent vlcera: cacochymia autem biliosa nora est, os amaritudo, qua quidem multum vitur Hippocrates, vt innumeris in locis videre licet. Non quidem est hæc sola cacochymia eius nota, sed est hæc magna, mala quidem in omni febre, tumore, aut vlcere, communi ratione: peculiari autem magis io rufsi atque dysenteria, quia oris tunica interna habet cum ventre continuitatem & texturam, atque cum aspera arteria viciniam & continuitatem, per gulæ partem anteriorem, & asperæ arteriæ posteriorem. Significat ergo oris amaritudo non solum esse in corpore multam bilem, sed etiam regurgitare in illas partes. Sanius autem fuerit, non hæc solum considerare, sed alias etiam notas adiungere cacochymia totius corporis & harum partium, quæ ab excrementis præcipue, & totius corporis colore capiuntur. Sed veniamus ad curationem, quam duplici auxiliorum genere exequi iubet, pharmaco, & ad moris ventri medicamentis. Elaterium inquirandum bis, aut ter. Elaterii historiam & vires, apud omnes qui de materia medicinali scripserunt, licet legere, vtque is sit succus valde purgans. Quem quidem ego, aliis omnibus medicamentis expurgantibus, ad dysentericos, potiores esse non existimo, sed forte aliis minus commodum. Vtrem antiquus mos est Hippoc. expurgatorem præcipere, nominato semper aliquo medicamento, eorum quæ sibi erant familiaria, vt elleboro, elaterio, aut croico. Perinde ergo tu intellege, ac si diceret, expurga. Illud, bis aut ter, festinationem continet, quasi diceret, expurga cito, ac si opus sit, repete medicamentum sine mora. Sed quorsum expurger quis io dysenteria: Annon trahat ad partem affectam excrementa? Certe. Laxetur ergo interim: Haud dubie, tamen præseruat expurgatio multos à maligna dysenteria, tempelhuat extrahens multam copiam succorum. Quia multo magis exulcerantur intestina paulatim in ea excrementis influentibus, quam affam per ea effluentibus malis. Itaque expurgatio non tollit periculum, quod à succis ipsis impendit, siquidem hos trahit ad intestina, sed quod à mora & lenta stuatione. Proinde si expurgandum in dysenteria est, præproperè faciendum, quia ubi multum processerit malum, frustra suscipitur. Neque tamen hoc curationis genere in omni dysenteria vtendum: temeritas enim aliquid habet excrementa omnia eo vocare, quod cum magno hominis malo spontè stuant: sed tuos solum cum maligna dysenteria imminet, adeo vt non videatur mediocrius alia curatio, quæ detergentibus & abstergentibus agitur, posse esse satis. Tunc enim satius est, aliquid cum remittere facere, quam scire hominem certo perire. Hæc igitur iubet facere, cum turbata est aluus, & os amare sciat, nisi ægrotus sit balbus. Balbo enim familiaris est turbatio alui, vt in aphorismo dicitur, æquum ergo est eum eisdem notis minorum morbum esse suspicari, quam in alio quopiam homine. Cum ergo non sit expurgandum, nisi in periculosissima dy-

sententia, non mirum si io balbo, his ipsis apparentibus, expurgatio deuietur. Accedit, quod vtfacilius sit alui fluxio in balbo, ita facilius angebitur, & fiet nimia, & minus poterit sustinere. Ergo à morbo est balbo periculum minus, ab expurgatione maius. Quare satius sit in talibus non expurgare, etiam si in abis dysentericis, eisdem & æqualibus symptomatis apparentibus, expurgandum sit. Docet deinde eam rationem, curationis quæ exterius ad moris perficitur, dicens, alligare oportet florem aris, vsum adeo vt rufus sit, & spongiam. Flos aris medicamentum est siccans & astringens, quale vlcera desiderant, sed est etiam exedens, & nimis acre, verum hanc acrimoniam (vt alia omnia acris) vitione deponit, adeo vt fiat, pro exedente, valde extergens, quod etiam amant vlcera, præcipue maligna. Spongia vt possumus, vt instrumētio ad fomenta & irrigationes accommodato, & vt medicamento, ipsa enim per se, præcipue recens, & quæ mate adhuc olet, siccans admodum est, & multa vlcera sanat. Quare inspergere florem aris vsum, & spongiam alligare, citra aliud quidpiam, erit ad vlcera sananda potentissimum: aut etiam pulvis spongiæ recentis, & vsum, cum flore aris mixtus, & inspersus. Neque verò mirum tam vehementi medicamento Hippocratem vti. Non enim quamcumque dysenteriam, sed malignam docet curare. Poscente verò nobilia medicamenta vlcerum specie, pars affecta tale admodum possit, quia est natota siccæ, & in alio posita, & excrementum humiditatem habens multam: quæ omnia siccantium vim augeti postulant. Sed quooiam hæc curatio est vehemens, non nisi cum vehementis morbi suspicio est, ea vtetur: quare raro ad balbos: quia vt dictum est talis natura minuit eam suspensionem, proinde nunc quoque adiecit, nisi balbus sit.

E

In inquietudine, horrore, oscitatione, vinum æquale æquali permixtum confert.

Hic est aphorismus quinquagesimus sextus secundæ particule, figura sermonis tantum differens. Illic enim legitur, inquietudo, horror, oscitatio, vinum æquale æquali potum morbo soluit. In aliis codicibus inquietudinem, horrorem, oscitanonem, vinum æquale æquali potum solvere. Sed hæc differentia sermonis, nihil addit aut detrahunt sententiæ. Hoc loco occurrit in omnibus græcis codicibus, quos mihi contigit videre, adiectum præscriptis verbis, aut lac. Verum suspicor, vtrū etiam multi, corruptionem esse codicis, atque illas duas voculas, male in hunc locum cecidisse: quia non sunt in aphorismo. Sententiam autem io aphorismis & in epidemias scriptam eandem, coniectaneam esse, in aphorismis perfectius scriptam censeo, atque ita lectionem aliam emendari. Nam aphorismos scripsit Hippocrates, elaboratissimas sententias colligens, hos autem liberos non ita, sed vradhuc obseruans, & elaboranda deinceps compilans: accedit quod ad has passionum minime est vtile dūce, quam ego inquietudinem appello, aut anxietatem, quidam etiam vocant pandælationem. Tamen lucè clarius est,

eos errare, ex his quæ Galen. dicit in commenta-
tio citati apophorismi (æquum autem est illi crede-
re in nominis græci expositione.) Dicit enim esse
eam passionem, quæ quæ tencitur, nonquam quies-
cunt, sed semper præsentibus molestantur, & ab
vix re in aliam se transferunt. Itaque iniquitudi-
nem seu anxietatem licet dicere. Anxietatem inique-
ritatem. Hoc verò nihil est minus quàm pandeula-
rio. Nam hæc est in totius corporis musculis, quod
osforatio in buccis, siquæ vi hæc; quod crassus fla-
vus moueatur inter musculos; eique exitum præ-
stet, musculi; variè sese mouentes, vt ille erum-
per. Itaque hæc multum crassumque flatum indi-
cant, qui aut ob multum crudumque adhuc cibum
in ventriculo sunt, vt iam iam dormituris, aut quod
excrementa in ventrem consueant, vt esurientibus,
aut quod alioqui crasso & crudo excremento abun-
dant, vt iam iam ægrotaturis. Horror sponte obor-
tus (dentali enim Hippocrates nunc loquitur) ex-
crementa abundare, quæ per eorum delata com-
passione inferant, significat. Anxietatem inque-
ritatem, nulla causa magis fieri potest, quàm quod
os ventriculi maligna aliqua excrementa qualitate
molestantur, vnde & cardialgia, ac lipothimia fieri
sola est. Dictum verò est Hippocrati proxima se-
ctione, ad cardialgiam vole esse, panem cum vno
dare. Nunc ad omnes has passiones iubet vi vino
mediocri, & temperato, scilicet æquale æquali.
Nimirum hæ passiones sunt neutre potius quàm
morbi, proinde ad eas omnes nihil vtilius, quàm
victum ita moderari, vt cruda coquantur, & quæ
digeri possunt, digerantur, euacuatione manife-
sta, aut insensibili. Quæ omnia vinum præstare po-
test, valde diluunt, debilitat: & meracius, cum fe-
bris periculo: proinde iubet æquale æquali tempe-
rare. Intellige autem hanc mensuram in vino me-
diocri retinendam, non in omni. Nam perinde
est veteri & generoso vino duplam aquæ infunde-
re, & oligophoro subduplum, & mediocri æqui-
le. Sed & totum victum oportet, ad procuran-
dam concoctionem, & corporis puritatem, adhi-
beri idoneum. Nihil enim refert vinum temperare,
si vteris multis horæis fructibus aut porris, cepis,
& aliis.

*Ad auris dolorem concubitalam, affigere
conuenit.*

Multo familiarior etat Hippocrati vsus cucur-
bitulæ ad dolores omnes, quàm medicis huius tem-
pestatis, quæ iam adeo riment, vt ne nominare qui-
dem audeant, nisi semimortuo iam ægrotæ, quum
scilicet satius esset agere nihil. Verùm Hippocra-
tes (vt videtur licet libro de medico) multis ad do-
lores vtebatur, & pro dolorum differentia, figura
differentibus, ad dolores scilicet in alio positis, ad
magnam aut fortem tractionem, opus est angustis
ore, ad dolores per eorum velut effusos, ampliori-
bus. Ego certe in doloribus circa quoddam partes
côdistentibus tæd non vtor cucurbitulis cum scarifi-
catione, aut sine ea, cum dolor non cedit vniuer-
salis vocatæ euacuationi. Quamuis enim id nunc Hip-
pocrates taceat, tamen intelligi debet quod dicitur,
sua methodo. Nimirum affigere oportet cu-

A cucurbitulam, prægressa totius corporis euacuatio-
ne, quàm affectus exigat, & ægrotus possit tolera-
re. Nam neque ad aliud aliquid auxilium valenter re-
soluens, veniendum est prius. Neque tamen proinde
expectandum est, vsque dum totum corpus sit
euacuatum, & cæcæum, vt plerique medici hodie
faciunt, quibus nulla euacuatio ad cucurbitula-
rum admotionem videtur esse satis, sed quantum
virgeat partis passio considerandum, atque, vt re-
soluentia medicamenta admoveamus vacuari capto
corpore, non semper euacuatione finita, ita non raro
virgente passione cucurbitulæ euacuationibus
sunt interponendæ, vt morbus qui non potest ex-
pectare totam euacuationem, cum eam patitur opus
est, alternatim scilicet vena & cucurbitulis admotis,
perficiatur. Neque enim vbi pondum est iam admo-
dum plenum corpus, neque fluxibus primis in-
sultus est, suspicari oportet tantam futuram traditio-
nem, vt toto ex corpore in affectam partem fluxio
commoueatur, aut augeatur: satis enim erit, si de
interna doloris sede ad eam trahatur. Neque enim
hypochondrio admoveat, hepatis aut lienis: & ad-
moveat hypogastrio, vesicæ, aut vtero: & admo-
uere lumbis, renibus admoveat, est. Interfunt enim
musculi & alia multa. Quod si post admotas cucur-
bitulas dolor recurrit denovo, & fluxio, quid pro-
hibebit iterum misso sanguine deriuare? Nam & in
aliis euacuationibus, cum virgentia aliqua ratione sa-
nificum est, redimus ad legitimas indicationes,
quæ procedunt à causis. Libuit hæc suis dicere,
propter eos medicos, qui non tantum non volunt
Hippocratem hac in re imitari, sed hæc etiam
praxim hæc causa vituperant. Quod hic Hippocra-
tes ad auris dolorem; in calce libri de indicationibus
commendat ad omnes partes circumcirca caput
dolentes, his verbis, Caput circumcirca dolen-
ti, quicunque ex superius locis doluerit, cucurbitula
tam affige. Itaque & ad dolorem oculi, & occipitis,
& temporum. Ob aurem quidem humero in pri-
mis, deinde ceruici & regione, deinde, post aurem
glandulis eius loci. Nam ipsi auri admoveat non po-
test, sed neque oculo, sed si alter laboret ipsa
partibus quibus ad aurem, sin ambo, medietate cerui-
ci ad occiput, vt & ob tempora. Dixerat proxima
seccione Hippocrates, si auris doleat late vtriusque,
Quæ sane videntur longè diuersa auxilia. Sed non
mirum, multis sæpe opus est ad eandem passionem,
aut ob differentiam causæ, aut temporis. Velut si ad
phlegmonem auris in primis insillatur lac, tem-
perandi partem & mitigandi dolorem gratiâ,
procedente malo affigatur cucurbitula puelles
& euacuans: aut ad phlegmonem, insillatur lac,
ad dolorem ex flatu, admoveatur cucurbitula.

*Quæcumque superiorum partium doluerit,
in coxas aut in genua dolor, & asthma obor-
tum, soluit omnia:*

Hæc quoque sententia scripta est loco citato li-
bri de indicationibus, & non est à proxima disti-
ne decisa, sed eadem sententia. Nimirum dicitur quæ-
cumque pars superiorum in capite doluerit, curat
cucurbitula. Quod verò curationi vno cedat, neque

hominem interimat, sed producat, soli solere cum abscessu, ut alios omnes morbos productos & salutare. Abscessus quos solent habere, sunt in coxas, aut genas, aut firmantur in thoracem, & facilius asthma. Quod, quidem consonum est illis verbis, quæ proxima sectione enarrata sunt, si caput doluerit ad pectus descendit, deinde ad hypochondria, postea ad coxam. Omnia verò ut dolcant fieri non potest.

In voluulo tenui frigidum vinum multum merum secundum rationem dandum, donec sanum aut crurum dolor oboritur, quem etiam soluit & febris, & dysenteria sine dolore.

Pulcherrimam, & mihi iam experimento probatam, docet curationem voluuli: non omnis (neque enim eius qui ob inflammationem fit, & quem acuta febris comitatur) sed eius qui à flauo crasso distendente, aut feces duras ad intestina gracilia afferente, aut à succo frigido impacto. Talem enim nihil potest solvere melius, quam vinum merum. Coquit enim cruda, extenuat crassa, dissipat flatus, digerit deducitque per corpus. Quare aut coquendo, dissipandaque causam, aut in aliam partem trahendo, liberat ab hoc malo. Accedere enim somnum solet vinum, aut artuum dolores, aut articulorum, suscitare: & utraque harum est in hac affectione causa salutatis. Somnus quidē, quia per quietem & indolentiam facultas reficitur, & reuocato intro elido, causa coquitur. Dolor articulorum, aut artuum, quia facto tali abscessu cessare solet morbus prior, velut in podagricis habemus observantissimum. Vix est morbus à quo non liberetur podagra superueniente. Nimirum vt Hippocrates nuper dixit, non potest fieri ut omnia simul doleant. Igitur vel his rationibus est vile vinum, quod somnum conciliet, & dolores crurum afferat, & cum horum aliquid fecerit, satis vini putetur datum. Si enim in his doloribus stupefacientia sæpe sunt vitia, quod somnum faciant, ipsa alioqui per se noxia morbo, quanto vitius fuerit vinum, quod somnifacitum etiam est, & per se vitale ad morbi causam tollendam? Non tamen vitæque datum hac faciet, sed ut quam optime hoc possit facere, dato satis multum & merum. Dilatum enim aut exiguum, neque somnum, neque dolores crurum afferat. Multum si affatum detur non poterit retineri, sed statim euertitur, ut fieri potest ventriculo conuerso ad vomitionem tabuli, quin etiam fæcū, neque multum & merum si retineretur, coqui posset à facultate debili, accresceret ergo, & factum acetum angeret morbum. Quid ergo superest ut detur multum merum, sed paulatim, crebro soliet & exiguo hausto. Ita enim paulatim retinebunt, & coquentur, & coquent, & reliqua præstabit bona: Hoc in calce libri de iudicationibus, ubi hæc eadem sententia verbis nonnihil differentibus, scripta est, docuit Hippocritus, vinum multum merum *Εκ' αμφοτέρων* idest paulatim dare. Et hoc idem est quod nunc intelligit dicens, *Εκ' αμφοτέρων*, idest secundum rationem. Nimirum illud datur ad hanc passionem secundum ratio-

nem, quod datur frigidum, multum, merum, & paulatim. Reliqua quidem ob causas distas, frigidum verò, ut ita quoque minus euomat. Adde, soluit autem & febris & dysenteria sine dolore. Quæ verba partim nouum sensum, partim prioris confirmationem continent. Nimirum febris & dysenteria sine dolore, cum sponte superueniunt, tollunt voluulum: febris quidem, enim quid flauo, aut crasso & pituitoso: dysenteria, & hunc, & enim quid fecis facibus. Sed vinum multum paulatim datum potest facere febrem, & dysenteriam: omnes ergo bonos voluuli exitus, qui amentantur quatuor, somnos, dolor artuum, febris, & dysenteria sine dolore, facere solet vinum. Quare voluulo admodum salutare est. Sed quæ vocat dysenteria sine dolore? Si enim in testinorum exulceratio, quo pacto sine dolore est?

Certè Hippocritus loco citato ex lib. de iudicationibus, non addidit illud sine dolore, sed simpliciter dixit, febris aut dysenteria. Quapropter quidam censent hinc delendum, ut codicis corruptione interfectum. Ego verò non ita censeo, sed dysenteriam hic & illic dici quæcumque alui perturbationem, addi verò hoc loco sine dolore, ut significetur diarrhoea, quæ in hoc differt à peculiariter vocata dysenteria, quod sine dolore, aut cum minori dolore intestinorum est crebra deiectio, & hæc sane succedens illi, solet tollere voluulum.

Si hypochondrium distentum fuerit, comprimere manu oportet & lauare: aqua recedentis à lacte, octo cotylas bibendas dare: si autem vomat, & non bibat, alij intritus acutum.

Distentiones hypochondriorum fiunt flatu, aut aqua, aut succis crudis eo loco redigantibus, aut tumoribus scirrhis cum obstructionibus viscerum consistentibus, ut per hydropsis duo genera, ascitem & tympanitem, & per morbum focatum flauosum (est verò melancholia hypochondriaca) & ventriculi peptis frigidus. Fiunt etiam hypochondrii elationes ob inflammationes magnas. Quæcumque ex causa intumescat hypochondrium, curatur horum aliquo, aut his omnibus, compressione manus, lotionis, expurgatione, & mouentibus vrinæ, ac appetentibus cibis: inflammationes missio sanguinis ante hæc omnia amant, & reliquæ etiam affectiones aliquando, sed non semper, neque tam copiose. Verum comprimere, cum flatu, aut aqua, aut etiam tumoribus scirrhis eleuantur, vile est, quia aqua & flatus expulsi inde, coguntur exitum querere, & tumores prohibentur adeo crescere, & cum sint indolentes, nihil læduntur. Comprimere autem manu quam fasciæ: maiorem quandam habet vilirationem, quia manus calidior naturalis, & nobis familiari, coquit, & soluit flatus. Lotionis sunt seu irrigatio hypochondrii, ad omnes distas passionis vitia est, sed non ex quacunque materia, neque ex eadem ad omnes, sed ex diuersa pro affectionis & partis indicatione: velut ad obstructions ventriculi, ex mentha & absinthio: hepatis, ex hoc ipso & mentha, cum exiguo aceto: lienis, tamarisco, corpari, & aspleneo, & aceto pluri. Et his

verò parantur oles, aut decocta, & hæc, ex aqua marina, aut vina. Serum lactis, quod aquam succedentem ex lacte vocat, frigidum & humidum medicamentum est, verum participatione quarundam acrium particulatum est expurgans, & extergens deobstruens, & mouens vrinam. Quare in dictis obstruccionibus maximè est vtilis. Vtinar verò eo, nunc simplici, vt cum obstruccionibus cum calore aliquo præter naturam, siue febricula consistunt, nunc verò composito, vt cum sunt cum frigida materia, & interpetie. Tunc enim, ad piritam, aduiscemus illi mel & salem, ad melancholiam infundimus quæ cum humorem possint extrahere. Iuber verò Hippocrates dare octo corylas. Caput verò coryla vnicui nouem, quate octo corylæ ferè capiunt, quod Hispani vocant azumbre. Hippocrates ceterè potiones omnes medicamentosas dabat maiori quantitate, quam nunc est in vsu, verum hæc maxima quantitas est, vt bibatur vno die. Ille verò dabat vt assatum sanique multum expurgaret. Ego hæc expurgandi rationem nondum sum expertus. Seriatem duas corylas sepe dedi ad expurgandum pagulatim: vt per aliquod dies corylæ duæ summo mane acciperentur, nunc simplicis, nunc cum aliqua infusione. Atque ad expurgationes copiosas, in sero lactis medicamina bene purgantia dissolvo. Merito verò timet Hippocrates ne tantum feri non possit bibi, sed euomatur, præcipue distento antea ventre: proinde inbet intrire, quod paratur ex alio, vti. Nam hoc vt Dioscorides cap. de alio monet, vrinam ciet, & hydropicis est vtile. Ceterè & status dissoluit, & obstruccionem omnes tollit. Febricitantibus vero, aut dolentibus capite, ne detur, præcipue infusis. Alioqui vero ad distentiones ex flatu aut aqua eius vtilis est vtilissimus.

Ad redunias galla nigra cum melle prodest.

Abcessus qui iuxta vngues oritur, exiguus esse solet, quare siue suppurerit iam, siue nondum, siccante medicamento ac resolvente, quale hoc est, aut fieri prohibebitur, aut factus breui delebitur, & circa vnguis corruptionem. Nam galla & pellis &

& siccat, ac siccando absument humorem. Mel resoluens vim habet.

Ut mulier concipiat, polypus super flamma affusus quam calidissimus, & prope semisustus edendos dare oportet. Et nistrum, Egyptianum, & coriandrum, & cuminum terere, & pastillos facere, & apponere pudendo.

Non ad quancunque steriles vtilis curatio est hæc, sed ad eas solum quæ frigide, & semine secundo parum abundantes sunt. Polypus enim est salacissimum animal, & quod coitu nimio resolutum tabescit. Quæ verò talia sunt, necesse est vt augendi semen vim habeant, tali enim succo sunt, & in talem nata mutari. Iam verò quod apponi iubet calorisum est, ac proinde tenuginem faciens. Quancunque ego cuminum detraherem, vt pote quod absument flatu, veluti ruta. Dixi ego autem, hæc infusionem in dorso factam, ad vehementes rigores esse vtilem.

Si caput ex crapula doleat, vini corylam bibere oportet: si vera aliter doleat, panem calidissimum cum vino mero edendum exhibere.

Non temere dari debet vinum dolentibus capite, nec ex vino, sed tunc solum, cum etiam dolores oculorum soluit, vt in aphorismo dicitur, cum scilicet corpus plenum non est, & dolor firmatus ob causæ difficilem distensionem. Quod dicit si vero aliter doleat (intelligit) vero ob cardiagram vt plerumque fieri solet) edere oportet panem quancunque calidissimum cum vino mero. Nimium superiori sectione dixi, hoc solacium cardiagram. Constat vero sympathice curationem debere incipere curatione protopathica.

LIBER TERTIVS.

EPIDEMIORVM.

SECTIO I.

Ægrotus primus.

Pythion qui habitabat iuxta telluris templum. Hunc cepit tremor à manibus, prima die febris acuta, delirium. Secunda omnia exacerbata sunt. Tertia eadem. Quarta à ventre pauca, mera, biliosa fluxerunt. Quinta omnia exacerbata sunt, somni tenues, & alui resistit. Sexta sputa varia, subrubra. Septima os distortum est. Octava omnia exacerbata sunt, tremores persenerant, urina autem ab initio, & usque ad octavam tenebatur, decolores, suspensiones habentes nebulosæ. Decima sudavit sputa subcocta, indicatus est, & urine subtenuæ circa iudicium, quædraginta autem diebus post iudiciû suppuratio circa sedem, & stranguriosus factus est abscessus. x. x. iv.

Ne liber hic incipiat à sollemnissimo, satius est putare, verbosilla, Pythion qui habitabat iuxta telluris templum, seorsum scripta esse, ut titulum huius narrationis, & narrationem incipere ab his, cepit tremor à manibus. Ex tota narratione constat, hanc fuisse acutam febrem à principio, vnam earum, quæ intra decimam quartam diem finiuntur (iudicata enim est undecima) sed imperfectè iudicium decidisse ex acutis, in genus earum quæ durare solent quadraginta dies. Est consideratione digna motus figura, quam ab initio retinuit. Incidit enim exacerbatio in secundum diem, ut fieri solet in his quæ mouentur per pares: sed iam inde non habuit exacerbationes per omnes pares, sed quartanas. Nam exacerbatio repetit quinto, & octauo, & iudicatio undecimo. Atqui iudicatio eiusdem diei est, cuius esse solet exacerbatio. In diem secundum incidere exacerbationes, morbi est ex multa materia pendens: quartana verò signa, attrabiliaria. Atqui profecto morbus erat ex multis, & variis, & concoctis difficilibus: Pariebatur verò præcipue cerebrum, & nervorum principium, quia cepit primo die delirium, & tremor à manibus. Nam ex

A si Galenus poterit, tremorem hic vocari, eum qui per animalis facultatis debilitatem evenit, atque hic significare debilitatem ex aggravatione, ego verò suspicor motum convulsivum, per quem non possunt manus consistere, vocari tremorem, quia petratum est incipientibus febribus tremere rentari vero convulsione, aut concuti rigore quodam, admodum frequens, atque hunc etiam vocare tremorem effluensissimum. Accedit, quod cum hic teneretur febre acuta, & deliraret, & somni essent tenues, utinabatur cerebrum biliosis & acerbis. Quid ergo magis consentaneum, quam nervos quoque in principio irritatos, convulsivè moveri? Maxime cum Galenus mox dicat, quia habuit die sexta sputa varia & subrubra, & deinde subcocta citra difficilem respirationem, fuisse collecta excrementa multa circa spatia prima & suprema intercostalia, ex quibus halcuntur nervi manuum, quæ enim fingi potest maior convulsivæ occasio, quam excrementa congeti in partem ex qua nervi oriuntur? Itaque die prima cepit febris acuta, tremor manuum, & delirium. Secunda omnia exacerbata sunt. Maxime profecto acutiei. Acutus enim est morbus in quo pericula cito veniunt. Tertia eadem. Quarta à ventre pauca mera biliosa fluxerunt. Iam hinc sicut agnoscere morbum lethalem aut difficilis iudicii, quia deiectiones intempestivæ erant, hoc est non pinguetella concoctione, quas eversiones vocantur Hippocrates detestatoria non decernentia: sed & quia exibat pauca, nam & stillas sanguinis de natis vituperat hac ratione Hippoc. Nimirum cum tentat natura pellere, tanto maioris importunitatis est, quanto minus pellitur: sed quia mera & biliosa. Nam excretionis omnes metaciores vituperat Hippoc. in prognostico, ponitque in lethalibus biliosas deiectiones. Mortuus ergo haud dubie hic homo esset, nisi admodum firma facultate fuisset, quæ quia fuit, evadere potuit, sed cum difficili iudicio, decidit, ac tandem duplici abscessu. Quinta, omnia exacerbata sunt, & somni tenues, quinetiam somni significabant cerebrum passionem. Quin etiam & alium ea die resistisse, malum. Resistit enim ægro non levaro, sed malignè ægotante: quare sine ulla conferentia. Præterea recursum in superiora minabatur: maxime cum contingerit septima die os distortum: quod sine convulsione aut paralyti musculorum moventium buccas, non potuit fieri. Unde magis adducor ut suspicem, manuum tremorem fuisse convulsivum, aut paralyticum. Quia nervi motus buccarum & manuum, proximum actum habent. Si igitur sputa sextidiei varia, subrubicunda, signa

B

C
D
E
F
G

ficabant redundantiaſſi ſanguinis & pituitæ intra thoracem, non autem in pulmone, neque ſepro tranſferſo, neque humilibus intercoſtalibus (quia Hippoc. difficilis reſpirationis meminiſſet) ſed in ſuperiſſis intercoſtalibus, quæ oriuntur nervi maxium, & proximi his nervi buccarum, aſperæ ſunt conſuſſant reſoluiti, quis iam non ſuſpiceret tremulum manuum motum, conſuſſionis aut reſolutionis fuiſſe initium? Accedit quod octava, quæ omnia rntum exacerbata ſunt, perſeuerabant tremores, quæ die probabile eſt euacuata fuiſſe iam multitudine, partim ſpontaneis deſectionibus quæ antecceſſerant, partim ab ipſo Hippoc. Narrat poſtea quales vrinæ fuerint in Pythione. Hoc enim nunquam contemnendum eſt. Narrat verò diſtinctiſſimè perſequens omnes vrinæ partes. Nam ſuſuræ ſubſtantiam & colorem, & id quod continetur, & quibus diebus ſimiles fuerint, & quibus receperint mutationem, dicens, vrinæ ab initio, & viſque ad octavam tinges, decolores, ſuſpenſiones habentes nebulolas Decolores dicuntur aquoſæ. Tales enim ſunt, quæ colorem minimè omnium habent. Tenues verò & aquoſæ maximè cruditate indicant, quare ſuſpenſiones non fuerunt bonæ, candidæ & læues quales in coquenda materia fieri conſueverunt, ſed obſcure, turbidæ, nebulosæ, quales crudis adhuc morbis apparere ſolent. Perſeuerauerunt tales vrinæ vnam ſeptimanam. Ab octava die quæ ſecundæ ſeptimanæ eſt prima, cœperunt fieri, pro tenuibus aquoſis, ſubtenues, quales perſeuerauerunt viſque ad diem vndecimam, quæ indicatus eſt. Decima enim ſudavit, ſputa ſubcocta, quæ ſcilicet antea varia, & ſubſubra, iam candida, & medioeriter craſſa, copioſius excreari cœperunt, & in indicatus eſt, die ſcilicet proxima quæ quarta erat ab octava, quæ fuerant exacerbata omnia, & viſus eſt à febre liberari: ſed quia ſine conſecutionis ſignis iudicatus eſt, imperfectus eſt iudicatus, ac proinde, exactis aliis quadraginta diebus, duplex abſceſſus contigit, ſuperioris circa ſedem in clune ſcilicet, in quam veriſimile eſt craſſa & cruenta abſceſſiſſe: & ſtragutioſus abſceſſus, hoc eſt fluxer vrinæ cum dolore receptis in vrinæ vias acris tenuibus. & falſis. Hoc genus iudicationis eſt quod apparuiſſe in multis eorum, qui in Thulo ægrotauerunt, ſecunda ſedione libri primi narravit, dicens. Multis autè & vrinæ fluxiones cum dolore, bilioſæ, aquoſæ, ſamcoſæ, purulente cum ſulcidio, non, renales. Sed hiſta pro aliis Sed hæc verba ſuo loco enarratimus. Nunc ſuper teſte literas hæc exponamus. π, μ, ν has literas, & multas alias, quæ in ſequentibus hiſtoriis ſubſcribuntur, conſtat ſcriptas eſſe ab Hippo. breuitatis cauſa, vt ſolent poni notæ exitus morbi, & ſpeciei iudicationis. Nam in omnibus qui morati ſunt, vltimoliter eſt. π in his qui eualeſerunt. vnde euident ſignificat ſanatus eſt, id eſt, mortem: hoc, π, id eſt ſanatus. Prima litera ſemper eſt π, quæ eum in omnibus ſcripta ſit, quid aliud eſſe poteſt, quam illud id eſt probabile: medie verò literæ variè pro differentiis iudicationis ægrotum ſcriptæ ſunt. Quare oportet in ſingulis, quæ eis euenerunt conſiderare, indeque conſectari quid literæ ſignificent, idque habere pro vero, quod maximè quadret. Velut nunc, quia vrinæ ſponte quadageſimo ſanatus eſt, fuerit, π illud id eſt, i. probabile. π, μ, ν, i. multitudine. π, μ, ν, i. vti-

narium. M. hoc eſt quadageſimo (nam eius numeri nota eſt.) π, μ, ν, i. ſalutem contigiſſe homini. Dubitare verò poſſis, an quadageſimo à primo abſceſſum haberet, an ab vndecimo quo eſt iudicatus. Mihi quidem ab hoc videtur, qui fuerit à primo quinqueageſimus. Nam eſt quadageſimus ſit magis indicatorius, fuerit verò duplicis generis morbus, acutus & decedens, & duplex motus, & duplex iudicatio, & duplex dies decretorius. Non alia ratione adducor, quam quod Hippocrates ipſe ita factum narrat, dicens, π, μ, ν, i. id eſt, poſt iudicationem poſterioris, morbus eualeſcit. π, μ, ν, i. quadageſima diebus. Sed hæc hiſtoria non petit plura.

AEGROTVS. II.

Hermocratem qui decumbebat iuxta nauum murum, febris ingens corripuit: cepit autem capitis & lumborum dolore affici. Hypochondrium molliter contendebatur, lingua autem ab initio aduſta fuit. Statim obſurdit, inſomnis erat, nec valde ſtictuloſus, vrina craſſa, rubra, reſpoſta non ſubſidebat. A ventre autem vſta non pauca exibat. Quinta minxit tenuia, habebant ſuſpenſionem. Non ſubſidebant. Sub noctem delirauit. Sexta iſtericus factus eſt, omnia exacerbata ſunt, mente non conſtabat. Septima cum difficili tolerantia, vrina tennes ſimiles, ſequentibus diebus eodem modo ſe habuit. Circa vndecimam verò omnia viſa ſunt eſſe ſubleuata. Coma incepit, vrina craſſa, ſubrubra, infra tennes non ſubſidebat, placide ratiocinabatur. Decima quartà ſine febre non ſudavit, dormiuit, intelligebat omnia, vrina ſimiles. Circa decimam ſeptimam rediit morbus, incaluit diebus ſequentibus, febris acuta, vrina tennes: rurſum autem vigesima indicatus eſt à febre liber, non ſudavit. Cibum non capiebat per totum tempus, mente conſtabat, loqui non poterat: lingua arida, non ſiticebat, dormiebat ſoporofus. Circa vigesimam quartam ſanatus eſt, alius humida, multis tenuibus ſlens, & ſequentibus febris acuta, lingua exuſta eſt. Vigesima ſeptima mortuus eſt. Huic ſarſitas ſemper perſeuerabat, vrina aut craſſa & rubra, non ſubſidentes, aut tennes & decolores, ſuſpenſum quid habentes. Cibum capere non poterat.

Galenus narrat, priores enarratores commentos eſſe multa, excogitantes cauſas quibus dixerat Hippocrates Hermocratem decumbere ad nauum murum, putantes magnum aliſquid eis verbis innuati, continerique occaſionem, quæ febricitare cepit. Verum omnia illa merito cenſet Galen. meras nugæſſe, hæc enim & huiusmodi alia quæ occurrent, quale etiam fuit Pythionem iuxta telluris templum habitare, ſolium memoriz gratia ſeti pte-

ab Hippocrate sunt. Sed febris speciem & constitutionem consideremus. Fuit haud dubie febris ardens, quæ ab hepatis inflammatione præcipue incipit, & phrenitidem attulit, ac tandem per naturalis caloris extinctionem interimit: duratur verò usque ad vigesimum septimum. Vt iam hinc constet, non omnes acutos morbos finire intra vigesimum vt Galen. videtur putasse; sed ad vigesimum septimum etiam posse produci, non depolna acutis. Neque id profecto immerito. Nam quatuor septimana, quæ eo die finiuntur, vnico lunæ motu complentur à quò vires diebus decretoriis accedere probabile esse, indicatum iam sibi non semel est. Habuit morbus hic semper signa pernitiola, multa, ac varia, partim phrenitica, partim extinctionem facultatis præferentia. Illud verò habuit insigne, intra dictos dies visum esse hominem febre liberatum non semel, cum tamen esset tam citò mortuus. Sed singulorum significationes & causas percurramus. Hermoeratem inquit corripuit nō hoc est ingens febris, cepit capitis & lumborum dolore affici: hæc causæ morbum faciens multitudine & commotione indicant, solentque magis in morborum initio vigere, quam cum iam sunt plurimum aucti contra ac symptomata alia, quæ ob materis alterationem contingunt. Agitata autem multa materia caput dolet, quia summum è toto corpore excipit: & lumbi, ob magnam venam, quæ per illos cum arteria etiam magna, preterit. Verum hæc etsi multarum febrium initia sunt, non sunt illis paragonumica, prout non sunt in omnibus, sed quibus maxime contingit repleri caput, & sanguinem conturbari. Hypochondrium distendebatur molliter, hoc est sentiebatur hypochondrium distensum, sed non sentiebatur durities, sed velut vacua distensio. Hoc oportet considerare hoc loco, diligentissimum Hippocratem, nunquam in febribus acutis omisisse hypochondrium attractionem, quam in prognostico commendauit, & merito quidem. Vix quippe vnquam occurrit vlla earum febrium quæ vehementer ardent, vt per quæ lingua exusta est, & per quæ ex eunt de ventre torrefacta, quin aliquod internum viscerum præcipue pariat; habereque inflammationem, aut eam quam phlegmonem græci vocant, aut pro hac erysipelas, aut quam vocant phlogosim, hoc est ardorem. Sentianturque hæc, duritie, tumore, dolore, aut calore insigni in ea regione, quæ visus affectum locarum est, velut hunc Hermoerati hypochondrium erat distensum, verum, quia non dicit vtrum fuerit, dextrum an sinistram, cum solcat vbi ambo intelligit, dicere hypochondria, alterum, idque dextrum magis consonum est intelligere, quia lingua erat exusta, & quæ exhibent valde biliosa, quæ in hepate refertur sanguinis officinam, est consentaneum: & quæ huius hypochondrii quæ contrarij tumor periculi plus affert. Sed quia non sentiebatur durum, licet intelligere, si quæ fuit phlegmone, fuisse in parte caua, aut fuisse exiguiam, aut fuisse solum erysipelas, aut ardorem. Ita enim rure potuit pars fluxione, sine duritie. At qui ego mox ac visionem maximam in febricitante intueor, si phlegmonis internæ signa, quæ diligenter requiro, non appareant, de aliqua tamē tali affectione cogito, etiam de curationis rationem dirigo. Statim, inquit, obdurdur, insonus erat. Hæc duo signa phrenitica sunt, hoc est phre-

nitium futuram significantia. De sorditate video conceptam vulgo hanc opinionem, quæ in medicos etiam transfusa iam est, in morbis acutis bonum signum esse. Eos enim qui morituri sunt, plus faris audire. Verum hi ex quibusdam quæ tenera solent euenire falsam assertionem colligunt, & Hippocrati ac Galeno valde repugnantem. Qui extenuati plurimam, illa mente moriuntur, aut fortasse etiam lesa, auditorio tamen poro non occupato, acutius solent audire, vt mirentur qui adsunt. Quod in extenuationem partium poti auditorij, & nuditatem nervi, reiciendum puto. Quanquam non raro qui adsunt mirentur, non quod ægri plus aliis audiant, sed quod eos audituros iam non putarent. Sed sit ita, quidam morientium audiant solito plus (nam id aliquando fieri non nego) cur tamen proinde sorditas bonum signum putetur? Verum est etiam quosdam acutè febricitantium, quibus sorditas superuenit, liberari fluente sanguine de naribus, alios fluxione alii, alios coxæ & genu dolore, nihilominus sorditas nihil boni per se fert, nisi bonum signum habeatur, quod significet ægrum aliquo modo posse evadere periculum. Certè sorditas constante facultate significat phrenitidem imminere, debilitat mortem. Si verò post phrenitidem, aut gravem alium capitis morbum sorditas succedat, prior morbo cessante, aut alluato, & facultate non debilitata, haberi potest bonum signum, quia poterit esse facta, abscedente materia ab interno cerebro ad externas eius partes, expectabunturque tunc temporis à sorditate parocides. Hinc igitur cui sorditas non in extremo superuenit, sed statim; signum fuit raprus bilis in caput, maxime subleto somno. Bilis enim in cerebro peruegitum, vt piruita verum facit. Addit non valde sordidum fuisse, quod in tanta febre duorum alterum significare poterat, corruptionem sensus, aut delirium. Nam non dolere cum sit causa doleendi in parte, nulla alia ex causa fieri potest, quam aut quod propria partis natura admodum sit corrupta; ac proinde in ea sensus, aut quod mens, quam paribus omnibus, (vt in controuersiarum lib. quinto capite de sympathia protopathia, antipathia & consensu, indicamus) vt sentiant adesse oportet, sit per delirium uocata. Ac proinde etsi pariat non sentiat. Iuxta id quod in aphorismo dicitur. Quicunque parte aliqua dolet, sensum omnino dolorem non sentiant us mens agnorat. Sensum statim non est consentaneum fuisse corruptum, sed cepisse eum à principio mente capi, fuisseque hoc etiam signum phreniticum, vt prius. Ex eunda maximam biliosorum redundanciam significabant. Vrina enim erat crassa rubra, & deiectiones multe, vitz. Vrinæ poro repositæ non subdebant, quod agitationem magnam sanguinis biliosi significabat, ac proinde, hoc quoque capiti minabatur. Itaque vrina simul significabat passionem calidam quæ hepate aderat, colore, & quæ cerebro immincebat, perturbatione. Hæc à principio usque ad quintum diem adsuerunt. Quinto vrina ceperunt apparere renues, habentes suspensiones sublimis, quæ magis etiam quam priores significauerunt phrenitidem. Nam cum semper mixta essent crassa & rubra, repente factas esse renues, quid aliud quam in contrariis & superuenies partes rapta excrementa significabant? Id enim significare solere renues vrinas, dictum ab eodem Hippocrate est in aphorismo,

his verbis, Quibus vrinæ perspicuæ & albæ sunt, male: maximè in phreneticis si apparuerint. Iam vero suspensiones sublimis idem significabant. Cùm etiam non ob manifestam coctionem fierent, ut nubes bonæ solent, constare statum multum in causâ fuisse, qui crudum succum efferret. Merito ergo eadem die ad noctem mentis commotus est, duravitque hæc commotio usque ad vndecimum diem, quo, ut dicemus, cepit placidè ratiocinari. Sed priora percurramus. Sextâ, inquit, ictericus est factus. Hoc in acuta febre ante septimum gravissimum esse in apborismo dicitur, significabatque phlegmonosi affectus in hepate magnitudinem: sed & quia sexto, se habebat multò gravius. Omnibus enim euacuationibus & abscessibus infansus est dies. Quanquam aliquos enim contingit ictericos eo die factos liberari, quod primo huius operis sectione secunda multis accidisse narravit. Sed hic nullum aliud signum renuebat, omnia enim erant lethalia, & ea diè omnia exacerbata sunt, & non mente constabat. Hoc dicit, quod non fuerit delirium intercisum, ut per paraphrenitidem solet, sed perpetuum, ut per phrenitidem. Septimam transiit cum difficili tolerantia, omnia scilicet maleferens, & languescens. Vrinæ adhuc perseverabant similes prioribus, tennes scilicet, ut & in sequentibus usque ad vndecimam. Circa vndecimam verò omnia visâ sunt esse subleuata, non tamen leuata sunt reuera, sed periculum, anxietas, ac magnitudo commutata cum comate, quod nihilo melius erat. Non enim minus somnus quam vigilia, si modum excedit, malus est: sit enim aut debilitat facultate, adeo ut non possit vigilare, aut refrigerato, aut obstructo primo sensu frigidis & pituitosis. Hæc non erat verisimile, cum tam multis signis morbi merè biliosi, repente pituitam cepisse abundare, sed potius langore naturalis caloris, & debilitate facultatis, hominem debite non potuisse vigilare. Vrinæ, specie mutata, redierunt ad crassas subrubras. Erant verò nunc infra tennes, hoc est in summo crassâ & perturbata, in imo minus crassâ, quasi clarâ fecæ, ut fieri solet in vini dolis, cum bullit mustum. Hæc vrinæ putat Galenus mediocres fuisse, & ac proinde ob contrarii signi concussione, rardatam fuisse hominis mortem usque ad vigesimum septimum. Ego verò nihil boni puto præ se tulisse hæc vrinæ: & longè diuersas fuisse ab illis, quas in prognostico longitudinem morbi & securitatem significare dixi. Hæc enim erant perturbata sine subrubro sedimento, infima parte tenuiores, quas arbitror significasse exusti sanguinis perturbationem, cum crassioris status redundantia. Neque mirum durasse hominem usque ad vigesimum septimum. Nam cum duplex sit moriendi modus, & alij moriantur vi morborum preempti, alij sensum extinctâ facultate, illi brevius, hi tardius mori solent, contingitque mirari sæpe medicos, quod post signa desperationis, tardius vita producat. Nimirum extinctio facultatis, non afferente morbo repentini casum, magis producit, quam atrox morbi solent. Hic autem Hermocrates à quarto usque ad vndecimum phrenitide tenebatur: iam insoluta phrenitide naturalis calor sensum elanguit. Addit, *τοῦτο καὶ αὐτὸν* hoc est, iniquitatem de-

positâ redibat ad mentem aliquando, quia deinceps fuit delirium intercisum usque ad diem decimum quartum, quo omnia intelligebat, liber iam omnino à delirio. Consideratione dignum est, post diem septimum non amplius facere mentionem Hippocratem singulorum dierum, sed vndecimæ, decimi parti, decimiseptimi, vigesimi, vigesimiquarti, & vigesimi septimi. Nimirum hi sunt quaternarii, qui imprimis sunt contemplabiles in morbis acutis, & afferunt in signis mutationes, & singulorum mutationes indicant mutationes alias in sequentibus proximè. Ut cum vndecima videretur alenata omnia, decima quarta attulit mutationem maiorem, quia à febre fuit liberatus. Addit, non sudavit, quod non de sudore solo intelligi debet, sed de omni alia emanatione, quasi diceret, liberatus est à febre, tamen non habuit euacuationem aliquam, quâ febris solueretur. Nominat autem fortasse sudorem, quod hic ardentibus febribus sit familiaris euacuatio. Sed quorsum hæc dicit Hippocrates: non enim videbatur necessarium, ut narraret, quæ non acciderunt, sed quæ acciderint Hermostati. Certè, ut insinuat causam, quâ non est soluta febris tunc, sed habitura proximo quaternario recidivam. Nam quia tuta habebatur iudicio, debet fieri cum signis concoctionis, & euacuatione idonea pro morbi ratione: quæ aliter fit, etiam præter rationem fit, quare non est ei fidendum, utpote homo quod præter rationem euenit. Cum ergo Hermocrates neque concoctionis signa, neque sudorem, aut aliam euacuationem habuit (nam inquit, non sudavit, & vrinæ similes prædictis,) quibus medicus solentis particeps iudicationem habuisset suspectam, timuissetque recidivam. Sed qui valde solers esset, mortem etiam timeret ab eo morbo, qui videretur esse solutus. Perinde enim iudicaret, ac si non esset febris soluta. Cum vero nondum essent concoctionis signa, & antecessissent signa tantæ debilitatis, ut per impotentiam comate esset rematus, timori debuit, ne non posset durare virtus, donec morbus conquerebatur, maximè cum signa contraria concoctioni apparere cepissent in vrinâ, non solam cruditatibus. Subleuatas autem adeo est, ut febre liber dormiret: dormiret scilicet sine sopore, & omnia intelligeret. Sed contingit hæc dubitare, qui fieri possit (videtur enim id admirationem parere) ut qui reuera fuit propioris mortis, videantur habere melius, & à febribus, & doloribus, & anxietate liberari. Triplex autem mihi nunc succurrit ratio. Quibusdam emortiente sensu per partes internas, & cessantibus concoctionibus remittuntur dolores & febres, ut incipiente gangrena in parte inflammata solet contingere: quibusdam naturalis facultas præ debilitate cessat excrementa mouere, ea vero quæta minores dolores faciunt, quam mota, quantumvis putrescant, quia minus occurrunt nouis partibus: & minores febres, quia minus funi mixtunt ad principes partes. Quibusdam etiam abscedunt excrementa à partibus principibus ad tempus, extremos conatus apponente facultate. Hoc mihi persuado factum in Hermocrate à die decimo quarto usque ad 17. quia dormiuit, & intelligebat omnia, quod liberati aliquantisper cer-

brī magis, quam corrupte naturę videbatur. Decimo septimo rediit & *thyphus* homo, hoc est febre correptus. Et sequentibus diebus usque ad vigesimum fuit febris acuta, vrinę nihil habuerunt boni, sed mutatae in crudiores fuerunt. Iam hinc tenuet. Nihilominus vigesima rursus est indicatus, & liberatus à febre, quę febris subitanea multo magis quam prior in extinctionem caloris referenda fuit. Nam vrinę fuit tenuis, & neque omne sudauit. Itaque neque concoctionem neque euacuationem habuit, & præterea neque cibum neque potum appetebat, cum utroque indigeret, & non deliraret. Quantum ergo periculi præ se ferret non sinit illa indicant, quod morbo coexistabat, & loqui præ poterat lingua arida, idest non poterat loqui præ linguę ariditate superaret enim vi casus facultatis esset. Quam coniecturam confirmabat, quoddam dormiebat soporosus, cum ergo ex tam lethali causa esset non soluta, sed extincta febris, circa vigesimum quartam rursus calfactus est, & alius humectata, fluentibus malis tenuibus, per debilitatem cessante iam retentione, ut in moribundis [qualis postremo hoc quaternario Hermocrates fuit] fieri solet. Et sequentibus usque ad fatalem diem, febris acuta, & lingua combusta. Quare vigesima septima mortuus est vltimo die mensis lunaris. Quam proinde ego finem utrophorum acutorum esse existimo, tamen Galen. vigesimum, & Hippocrates decimumquartum aliquando statuat. Reliqua dicit Hippocrates velut epilogum faciens & in summa redigens, quę maxime notari oportuit in tota hac historia. Hęc scilicet, surditatem huic semper à principio perseuerasse, de quā primo prædictiooem ita scriptum est. Surditas in acutis & turbulentis succedens, mala. Vrinę fuerunt semper, atræ crassę & rubrę non subsidentes, aut tenues & decolores, & sublimem suspensionem habentes; nec cibum capere poterat, neque eihum enim neque potum appetebat. Addit. *π. u. d. x. ζ. θ.* quas notas continue hæc *π. u. d. x. ζ. θ.* habemus idest probabile excurrentibus deiectionibus vigesimo septimo mortem accidisse. Constat ex morbi fine respondente literę vltimę, & numero respondente proximis, & ex communi explicatione literę primę, & ex modo moriendi, fluente iam aluo, & omnino dissipata vi, qui reliquis literis congruit. Quanquam Galeno magis placet pro *π* dicere *thyphus*, idest suppresis, putatque die 27. suppresis deiectionibus quę 24. ceperant, obuisse, id vero Hippocrates oon narrauerat, & his literis nihil ooni solet narrationi addere, sed quę dicta sunt literis notare. Accedit locus ex primo prædictionis, qui cum hoc adeo consonat, ut eadem omnino res narrari videatur, & literasit ipsam expositionem trahit. Nam ita habet. Surditas, & vrinę non subsidentes valde rubicundę, innotantes, mentis emotionem portendunt. His morbo regio corripit malum est. Mala etiam est, & ex morbo regio soliditas. Hos voce priuari sed sentientes esse coniungit, venterque arbitror his copiose fuit, ut Hermippo accidit, unde obiit. Ferre eadem videtur narrare accidisse illic Hermippo, quę hic Hermocrati, ut mihi cootigerit dubitare, an forte hic vocatus fuerit Hermocrates Hermippus, fueritque eiusdem utrobique facta mentio,

Tamen illic dicit ex fluxu obuisse, quare & hic censeo magis consentaneum intelligere *thyphus* quam *thyphus* *thyphus*. Nam etsi Galenus censeat librum prædictionum oon esse Hippocratis, utpote minus quam aphorismos & librum prognostici elaboratum, ego tamen minus elaboratum, ac proinde minus dignum fide esse video, non proinde despero scriptum ab eo viro esse, quem video oon tantum scripsisse, sed firma iam & rara esse putaret, sed quædam solum, ut obseruationes, quædam ut assertiones. Huiusmodi sunt quę hi libri Epidemion continent, noudum satis experimentis confirmata, sed cum quadam suspitione probabili. Huiusmodi etiam quę in libro prædictionum scripsit, noud quasi ita statuentia, sed quasi examinanda magis [scribebat vero fortasse sibi soli hæc & illa] quędam veto ut experimentis iam exploratissima, & rationibus confirmata satis, ut quę io aphorismis & prognostico. Ita quę medicorum quendam modum docting mihi videretur tenuisse in libro prædictionum, hisque libris de morbis popularibus, atque in illis aphorismorum, ac prognostici. Sicenim maxima ex parte agit tantum historicum in aphorismis & prognosticis, certus iam rerum agit doctorem in libro prædictionum de multis velut inuestigans dubitat. Quare is liber non habebit aliis parem fidem, erit tamen fortasse in eisdem Hippocratis scriptis, & ab eodem scriptus.

AE GROTVS IIL

Q Vi decumbebat in horto *Dealcis*, capitis gravitate & dextri temporis dolore affectus per diuturnum tempus, ex leni autem occasione vehementi febre correptus decubuit. Secunda, ex sinistra nare paucus & merus sanguis fluxit, à ventre autem stercora bene exierunt: vrinę tenues, varię suspensionem habentes minutatim dispersę, farinam crassiorem referentes & gustura similes. Tertia febris acuta, excretionibus nigra, tenues, spumosa, & quę in deiectionibus subsidebant livida erant, sopore premebatur, difficulter surgebat, in vrinis subsidentia livida, subviscosa. Quarta, enomuit biliosa, flavı, xigra, paulo post atriginosa. Ex sinistra nare paucus sanguis merus effluxit. Deiectiones similes, vrinę similes, exordavit circa caput & claviculam. Splen elevaris intumuit, femoris dolor accidit secundum rectitudinem; hypochondry dextri contentio submolli. Noctē non dormiuit, deliravit aliquantulum. Quinta deiectiones plures, nigra, spumosa, & quę in deiectionibus subsiderant nigra erant, noctem non dormiuit, deliravit. Sexta, deiectiones nigra, pingues, viscidę, fatida, dormiuit, mente melius consistabat. Septima lingua sicca, striculosa, non dormiuit, deliravit, vrinę tenues, nō boni coloris. Octava,

deiectiones nigra, exigua, consistentes, dormi-
nit, intelligebat, siticulosus non valde. Non
ex rigore febris acuta corripuit, sudavit, per-
frinxit, deliravit, dexter oculus distortus est,
lingua arida, siticulosus erat, & in somnia.
Decima, eadem. Undecima, intelligebat sem-
per omnia, à febre liberatus erat, dormi-
nit, urina tennes circa indicationem, duos di-
es febris in termis, decimaquarta rediit,
statim autem per noctem non dormiuit, mentis
motus est, omnino deliravit. Decimaquinta,
urina turbata, qualis fit ex iis que subsede-
runt, quum agitantur. Febris acuta, omnino
deliravit, non dormiuit. Genua & tibia dole-
bant, à ventre autem, glande appositâ; nigra
stercora exierunt. Decimasexta urina tennes,
habebant autem quod in eis ferebatur nebulo-
sum. Deliravit. Decima septima summo mane
extrema partes frigebant: contigebatur. Fe-
bris acuta. Toto corpore sudavit, subleuatus est,
mente melius constabat, non est à febre libera-
tus, siticulosus, vomit biliosa, flaua, pauca.
A ventre autem stercora exierunt. Paulo au-
tem post nigra, pauca, tennia, urina tennes,
non boni coloris. Decima octaua, mente non
constabat, sopore tenebatur. Decima nona eo-
dem erat in statu, urina tennes. Vigesima dor-
miuit, intelligebat omnia, sudavit, à febre li-
beratus est. Non sitiuit. Urina autem tennes.
Vigesima prima parum deliravit, parum siti-
ebat, hypochondry delor, & circa umbilicum
palpitatio usque ad sinem manens occupavit.
Vigesima quarta urinis hypostasis, intelli-
gebat omnia. Vigesima septima coxa dextræ do-
lor cepit. Urina tennes, & habebant subsiden-
tiam. Alia autem placidissime se habebant.
Vigesima nona dexter oculus doluit, urina te-
nues erant. Quadragesima egerit pituitosa,
alba, aliquantulo plura, sudavit multum & toto
corpore. Perfecit indicatus est.

Morbis hic acutus fuit, quique hominem intra
finem acutorum interemisset, nisi forte cum con-
tingisset esse robustissimum, quod cum esset, factum
est, ut morbus, qui neque finiri potuit ob mul-
tam, variam, & concoctu difficilem materiam inter
suos fines, neque hominem interimere ob eius fir-
mitudinem, decidens ex acuto, quadragessimum
diem attingeret, qui indicatorius est acutorum ex de-
cidencia. Miraretur itaque aliquis percurrans signa le-
thalia, quæ omnibus fere diebus apparuerunt, si-
gnificata partim multam, partim variam & cras-
sam, partim malignam materiam, partim etiam
membrorum principum affectionem, non interis-
se hominem. Cuius causa puto, hanc narrationem
incepisse ab ea dispositione, quæ febrem antecessit,
quam vocare soleamus neuram dispositionem, &
monuisse hominem ex occasione cepisse febricitare.
Nimirum occasio vocatur causa procacitica, seu

manifesta. Dicit ergo hunc capitis gravitate & dex-
tri temporis dolore diu fuisse affectum, & cum ita
se haberet, ex occasione vi ex ira, aut longa moram
Sole, aut vini potu, aut causa aliqua tali, cepisse fe-
bricitare. Sed quid intererat hæc monere? maxime
cum non dicat quæ occasio fuerit? Certe capitis gra-
vitas & temporis dolor significabant pleni esse domi-
nem, præcipue secundum caput multas succis (do-
lere enim solet caput cum gravitatis sensu ex abun-
dantia, præcipue secundum tempora, ob vas no-
tatu digna, quæ in eo loco sunt, & multam carnem,
& nervos, & ossium commissuras) ac proinde para-
tum esse in morbum, timerique debere capiti, ac
præcipue dextræ illius parti, qui vi in aphorismo di-
citur, si quæ pars ante morbum doluit in eam mor-
bus firmatur. Quia ergo morbosus apparatus ade-
rat, quæcumque occasio accederet, potuit in febrem
acutam incidere: eam verò, quod ex occasione fieret,
minus periculosam esse, quam foret aliæquæ,
erat consentaneum: quia vi in commentario in pro-
gnosticum satis iam diximus, ac monstravimus, pro-
caccitica cause præstare omnibus detrachunt, at-
que lethalia ex occasione facta, minus lethalia sunt,
quàm si aliam ob causam acciderent. Potuit ergo
non mori ex morbo, qui toto fere tempore mori
acuti, videbatur lethalis, quod homo esset robustus;
& ex occasione cepit ægrotare. Potuit verò ea
ocasio facere morbum in homine, etsi robusto, pa-
ratum tamen. Robustum verò naturæ, paratum esse
& dispositione neutra teneri, non mirum. Aut si
quis miraretur, legens quæ Hippocrates dicit in nu-
meris in locis, maxime in ultimo primi libri de dieta,
desinet mirari. Ibi enim monstrat fieri non posse quin
bomo paulatim congerat morborum causas, & ex
quibusdam intervallis ægrotet. Sed videamus sig-
nificata quæ huic homini acciderunt. Die prima ex oc-
casione cepit febricitare & vehementi febre cor-
ruptus decubuit: secunda fluxit ex nare sinistra exiguus
meri sanguinis. Quod quidem iam hinc significabat
sine robusta facultate, mortem: cum ea, difficile iu-
dicium. Nam omni ratione vituperanda fuit evacuatio,
& quia secunda die (dictum enim erat ante Hip-
pocratem non statim apparere) & quia fluxit pau-
cus sanguis. Cum enim id in omni evacuatione ten-
tata vituperetur, in sanguinis stillis vituperatur ma-
xime, primo prædictionum, neque immerito.
Quod enim aliæ evacuationes tentate significant
alus in partibus, purè morbum malignum & debi-
litem, illud eadem in capite indicat. Sed & quod
id exiguum fuit meri sanguinis. Meris enim sanguis
dicitur, qui sine sero & pituita (his enim diluitur,
ut aqua vinum) crassus & niger, in vero significa-
bat malignam qualitatem. Ex omnibus enim tem-
porariis amar sanguis. Sed & quod ex nare sinistra, do-
luerat enim tempus dextræ, quare tentata iam sine
rectitudine evacuationis debilitatem facultatis, & mul-
tis in partibus abundantem maligni morbi causam
significabat. Illud vnum habuit bonum ea dies quod
stercora à ventre bene exierunt. Urinæ enim satis
male fuerunt, tennes enim & varis, id est, non æ-
quæ tennes, sed varis per partes, aut etiam fortasse
coloribus variæque, & minutatim habentes suspen-
sionem, quæ quidem referebat farinas crassiores, &
genitæ partes, & crudorum succorum vi febris
crustorum redundantiam significabat. Tertia, die
fuit febris acuta, excretiones ex aluo nigra, tennes

& spumose, referentes redundantiam bilis vitz, & statum perturbantem succos. Spumose enim deiectiones aliquando fiunt præ seruitute, vt in ollis spuma, & tales comitantur colliquatio & pinguedo, suntque simul spumose & pingues: aliquando fiunt redundantia flatu, quæ & ipse pessima sunt in acutis febribus, quia significant perturbari sanguinem flatu per rotas venas & arterias, id quod capiti significat adesse, aut affuturum esse malum. Huic vtriusque causæ spumose deiectiones affuerunt, nã erat ea die febris acuta, & non multo post delirauit. Vrinæ quia tennes erant, habebant subsidensiam, partem scilicet crassioiorem quæ subsidebat. Eam dicit fuisse liuidam. Qui color omnium deterimus censetur, quia semper putatur esse extinctionis naturalis caloris soboles, adeo vt nunquam putetur bene ac salubriter exire posse. Quare mirum est, si liuida tam citò exierunt homini superuicturo, & morbo tam longo. Ac fortasse tenuis nigra erant hæc magis, quam liuida, auriuoris illa species, ex mixtione excrementorum aliorum colorum nascebatur. Sopore, inquit, premebatur. Hoc quoque ex pituita erat, aut pituitolo sanguine, qui ante febrem nondum putrescere, grauaat tantum iam putrescens fecit carum. Difficiliter sargebat, vt caro pressus, & vt pondus alienum toto corpore ex multitudine excrementorum sentiens. Vnins erat subsidensia liuida, & subulicosa, facta arbitror mixtione pituitæ & nigræ bilis, hac præstante remissam quandam nigritiem, illa lentorem. Quarta die euomit biliosa, flaua, exigua, paulo post ætuginosa, quas vomitiones in prognostico vituperat, vitæ metationes, & magnum recessum à mediocri temperamento, quod natura partium amat, significantes. Ex sinistra nate pauca & merus sanguis effluxit. Quod quidem & secundo si factum fuerat enim mala significatione, sed nunc illud etiam mali accessit, quod quarto die euenit. Id enim etiam per se vituperatur primo prædictionum in initio, vbi ita scriptum est. Scillanò è naribus his perniciofa, cum aliis, tum si quarto ceperit die. Neque sane citra causam, quodcumque enim signum graue, die iudicatorio grauius est. Dies autem quartus est primus impetus, eorum qui mouentur per pares, & quod ad celestem causam attinet, primus eorum qui magnam vim habent. Primi enim quaternarii sunt. Vrinæ & deiectiones fuerunt similes illis quæ in die tertio, sudant circa caput & clauiculam, quod sudoris genus potest duo significare, aut exolutionem innari calidam (in his enim qui animo linquantur fieri solet) aut redundantiam excrementorum in sublimibus partibus, quia vbi sudor ibi motus, vt in aphorismo dicitur. Atqui nunc trians secundam sudoris eius causam verisimile est fuisse, cum tam multa adessent, vel ante morbum, signa redundantie humorum in capite. Splen eleuatus, & femoris dolor secundum reditudinem, hoc est finit. Hunc solum abscessum commendat Gal. inter ea quæ quarto die apparuerunt. Mihi verò & hic videtur malam significationem præstare, quia abscessus in febribus in prima eruptione non soluentes morbum, longitudinem morbi significant, vt in aphorismo dicitur. Constat verò hunc abscessum non soluisse neque subleuasse morbum. Quare quia abscessus, significauit longam fore morbum, vt euenit: quia verò ad bene & finitum semper in sinistro etiam latere, ex quo etiam

sanguis destillauit, magnam redundantiam excrementorum significabat. Sed & hypochondrium dextrum habuit contentiorem mollem, hoc est, sine duritie quæ premendo digitis sentiri posset. Quod quidem significabat hepatis affectionem, quin & noctem egit infomnem, & delirauit aliquantulum, quod pertinebat ad caput, vique adeo in omnes partes principes redundabant excrementa, & turgere non nihil videbantur: atque iam hinc fuit phrenitis. Neque mirum, quia ante febrem etiam doluerat caput. Sed videamus quæ attulit dies quinta. Deiectiones plures, nigræ spumose, & habentes subsidensiam nigram: ferè quales proximis diebus, & ob similes causas, quia & infomnem egit noctem, & delirauit. Sexta fuerunt deiectiones etiam nigræ & pingues, & viscidæ, & fetidæ. Nuntium significantes succum nigrum malignè putrescentem, cum colliquatione & mixtione aliqua crudioris pituitæ. Dormiuit & intelligebat omnia. Fortasse liberatum ad tempus cerebrum est, indinans ad inferna excrementis. Nam septima, quæ vrinæ apparuerunt tennes, non boni coloris, hoc est, minus tinctæ colore quam naturales solent, & lingua sicca, & siccis maior, quæ recursum in superiora significare poterant, rursum non dormiuit, & delirauit. Octaua rursum videtur bilis superiora reliquisse, quia deiectiones fuerunt nigræ, & dormiuit, ac intelligebat, non valde siticulosus. Quod autem deiectiones nigræ fuerint exiguæ & consistentes, vltio faciebat, & quod bilis vitz quæ descendit cum fecibus, non erat tanta, vt soluere ac diluere feces, sed vt tingere solum posset. A nona die vsque ad vndecimam peractum est iudicium quoddam, specie sanè, morbo satis accommodatum, rigorem enim & sudores quæ quidem indicatio febribus ac denubus suis commoda esse solet, vt in aphorismo dicitur) difficile tamen fuit, & imperfectum. Difficile quidem malignitatem symptomatum, imperfectum defectu euacuationum, quæ etsi liberare interim potuerunt, non ita tamen, vt non rediret citò febris: Nimiam ante concoctionem fuit iudicium, quod delatbat vrinæ quæ tenues erant circa indicationem. Cùm itaque iudicatio duas partes habere, difficultatem & laborem qui sit ob secretionem, & euacuationem quæ secretioni succedit: illam habuit difficilem, puræ rigorem, febrem acutam, frigus extremorum, maius delirium, oculi distortionem, auditum lingue, sitim, perisplasmum: hanc insufficiens, puræ sudorem, & insensilem euacuationem, & oculos in aliquas internas partes abscessus. Nam sine his, ob sudorem noni & decimi diei, non adeo conualuisset vndecimo, vt sine febre & delirio dormiret. Est hic notatu dignum, quod oculi etiam distortio, quæ conuulsium tantum signum esse solet, fuit huic iudicatorium, humore qui secernebatur, vt exaudaretur, interim musculum oculi penetrante. Duos dies intermisit febris, rediit decimo quarto, vno scilicet quaternario à die quo intermisit, atque die, per se primæ notæ inter decretorios: talibus vero diebus omnes insignes morborum mutationes, & bonæ & malæ, fieri consueverunt. Rediit vero cum febre acuta phrenitis, delirauit etiam rursum, & sine somno fuit. Neque sane solum ante hunc diem fuerant delirii interruptiones: sed neque reliquis diebus equè semper delirauit. Ex quo fortasse dubitabit ali-

quis, quo pacto id fieri possit, cum hanc phrenitide fuisse concedamus & phrenitidem perpetuum delirium esse, inter omnes medicos conueniat. Sed scias vis villam esse phrenitidem, per quam nulla interruptio delirii fiat, & non tantillum agrotus ad mentem redeat: nihilominus verè ac propriè delirium perpetuum appellari, quòd non habeat intermissiones certas, & ex statis periodis inuadat. Velut profecto hinc agroti sentire continua laborasse nemo negauit (non enim intermittente, cum neque quotidianam, neque tertianam, neque quartanam) tamen duos dies sine febre fuit. Nimirum illa, interruptio non fuit ex propria morbi figura, ut in intermittentibus, sed ex casu contingentibus indicationibus imperfectis; ita de perpetuo delirio phrenitidis sentiendum est. Urina turbata decimiquinti diei, cruditas in fecoribus & morbi capitis nota erat. Nam ita dicitur in aphorismo. Quibus urina perturbata quales sunt iumentorum, iis dolor capitis adest aut aderit. Eadem die tentauit natura abscessum ad inferiora, qui tamen non processit, & dolore genium & tibiari indicatus est. A ventre autem (inquit) glande apposita nigra stercorea prodierunt. Sed quorsum nunc dicit glande apposita, cum non cepit narrare auxilia, quibus ad morbos utebatur: sed quæ agrotis euenierunt, & sponte facta sunt? Non quid sola glande usus est Hippocrates in toto hoc morbo: non fuit. Sed dicit apposita glande, ut insinuet fuisse aluum suppressam ea die, & indiguisse glande, aut etiam fortasse quòd commenderet assiduum curam exonerandi ventrem, glandibus, aut clysteribus. Id enim nisi sponte aluusse esset, nunquam omittendum est, ut pote sine noxa vile. Quamquam neque hoc ita accipiendum est, ut crebris duque, non expectantibus naturalibus euacuationibus, vtatur illis instrumentis. Affluebat enim natura illis, & impotentior in reliquum sit, & eiusdem opis indiga: sed tunc solum cum natura cessat, aut cum occasionebus quibusdam ipsam iuuare opus est. Decima sexta, mutata est urinarum species, factæque sunt tenues, & continentis quiddam nubilosum & turbidum, cruditatis quidem signa non minoris, sed maioris erant, quam turbida. Decima septima, ut pote finis huius extremi quaternarii, & recidivæ quæ à decimaquarta cepit, attulit indicationem alia difficilem, & imperfectam, aliqua ex parte similem ei quæ die nona, incepit. Nam illa die habuit rigorem febrem & sudorem, hac habuit febrem & sudorem, & pro rigore solum frigus, quale fieri solet per febres putrissimos, ut inestiro putremus, talem fuisse partem foci, qui ea die motus est. Sed mirum in modum non potest ad monere hic agrotus, ut leuiter & ex quacunque occasione de morbi exitu, aut constitutione, aut etiam figura propria, sententiam feramus, aut beneiciam conceptam, mutemus. Sed tardiores in ferenda sententiis, expectemus singulorum exitus. Quotus enim quisque non affirmasset nona die, atque hac etiam decima septima, illa quidem tertia nam exquisitam, hac verò quotidianam aut tertianam non exquisitam esse factam, absque iam continuam febrem in intermittentem, aut factam duplicis febris complicationem? Quotum neutrum euenit: sed fuit vtraque indicatio quædam imperfecta, sanè etiam hæc. Nam etsi leuatus sit, & mente melius constitit, tamen non est à febre liberatus,

A & fuit siccilofus plus etiam quam ante, quod verisimile est fecisse bilem in ventriculum irruentem. Nam vomit biliosa staus pauca, à ventre exierunt stercorea imprimis, hoc est tibiurum feces, & paulò post nigra pauca; etiam, ex bile atra. Urinae fuerunt tenues, non boni coloris, hoc est albæ & tenues, quæ maximam erandierem testantur. Proinde indicatio proxima imperfecta fuit & morbus quasi denud inchoatus, & denud auctus, vsque ad vigesimum, quo rursus indicationem aliam imperfectam recepit, vsque adeo per singulos quaternarios videretur malum reduisse ad principium, habuisse multa principia, atque reliqua etiam tempora. Nam decima octaua, iam non intelligebatur soporosus, & decima nona eadem, & vigesima dormiuit, intelligebat omnia, sudauit, & fuit à febre liberatus. Sed considera quam attentè omnia narret Hippocrates, qui cum dixerit eum fuisse decima octaua, & nona soporosum, dicit vigesima dormisse: quasi sopor, non sit somnus, sed impotentia vigilandi, aut somnus cum addito, puta præter naturam. Exercitatus vero medicus facile distinguet à sopore somnum, ille enim grauis, & ex quo difficile excitatur, aut si non excitatur difficile, tamen excitari male redeunt ad sese & vigiliant. Quin potius non nisi magna vi contineri possunt vigiles, & somno tententur, aut consiliiis moribus tentantur, aut pulsus concedunt, & refrigerantur extrema, & colorem viuidum faciei amittunt, aliquando febres augentur plurimum, ut de his verè scriptum ab Hippocrate sit, somnum laborem facere: dormientibus vero sine sopore, nihil tale accidit, sed contraria omnia. Itaque hoc modo dormiuit die vigesima, qua & sine febre mansit, & non finitur. Sed cur non fuit hæc indicatio satis fida, & sine recidiva? Nam quia sine febre fuit homo, ea videbatur esse perfecta, quia non finit, videbatur manere sine signis recidivæ, sitim enim inuitus relictam dicit Hippocrates 6 huius operis, principium signum esse reliquiarum prauis humoris à quo timere debeamus recidivam. His accedebat, ut fides tribueretur indicationi, dies, qui optimè indicatorius est. Ita est sanè, hæc omnia adierant: sed deerant signa concoctionis, sine quibus nulla indicatio fida esse potest. Quod ut innocebat Hippocrates, addit, urinae autem tenues, & proxima die, purè decima nona, dixerat, urinae renues. Proinde rediit mox malum, & nihilo minus quàm antea, etsi vergere iam ad inferna magna ex parte succi cepit, quamquam portiones quædam exigæ sursum sunt elatae. Nimirum non tam est tota materia, aut vno genere euacuationis pulsa, aut in vnam partem, quam per multas euacuationes, & in multas partes pulsa & dissipata. Vigesima prima rediit delirium, & sitis, etsi vtrumque parum. G Hypochondrii dolor, aut totius aut certe dexteri, & palpitatio circa umbilicum. Vigesima quarta, ut per omnes quaternarios conuenierat, mutationem in melius fecit, habuit in urina hypostasim (non quidem quantum suspicor, optimam & quæ concoctionis perfectæ esse dicitur, sed multam crassam & ex succi crudis) & intelligebat omnia. Vigesima septima, quæ alio quaternario distat à vigesima quarta, attulit aliam indicationem, partum per abscessum ad coxam

dextram, partim euasatione vrinae tenuis, multae, & habentis multam subsidentiam. Sed considera, vt euenerint abscessus postremi huic secundum restitutionem, & secundum rationem, respondentique morbi principio. Nam vt quinta sectione libri secundi dixit Hippocrates, si caput doluerit descendit ad pectus, deinde ad hypochondria, postea ad coxam. Huic caput primum, hypochondrium deinde doluit, & circa umbilicum palpitauit, deinde coxa. Tempus quidem dextrum, & hypochondrium dextrum, ac dextra coxa. Palpitationem docet Galenus in commentario prognostici, non aliter ac pulsus in hypochondriis, significare delirium, aut perurbationem. Vtrumque quidem etat in hoc aegrotto, delirabat enim, & aegrotabat cum periculo, quod perurbationem facit. Si autem palpitatio erat haec, & non pulsus, haud dubie fiebat statu aliquo fumoso quereente exitum, atqui fortasse illi mot, illusit in caput, fecit dolorem dextri oculi, qui vigesima nona hominem vexauit, & eadem die finitus est, & reliqua omnia fuerunt à die vigesima septima conuenientissima. Scilicet fuit sine febre, sine delirio, sine sopore, aut perigliis, sine sui magna, aut magno fastidio, & aliis huiusmodi. Sed neque haec omnia satisfecerunt, vt homo integre liberaretur, neque haec iudicatio perfecta fuit, quia adhuc vrinae tenues. Sed reliquum tempus mitius, aegrotans transegit vsque ad quadagesimum, qui est finis morborum acutorum ex decidentia. Et tunc habuit deiectiones copiosas & albas, atque sudorem: illis crassa, hoc tenuia euacuata sunt. Et homo per purgatus, sed hic quoque aegrotus confirmat, quod ego antea dixi, finem morborum acutorum esse integrum lunae mensem, nam vsque ad vigesimum nonum fuit huic morbo acutus.



SECTIO II.

AEGROTVS IV.



N Thaso Philistes diuturno capitis dolore confectus, tandemque sopore aliquantulum correptus decubuit. Excitata vero post potationem febre, dolor exacerbatus est. Nihil incaluit primum. Prima die vomuit biliosa pauca, flana primum, postea vero arginosa plurima. A ventre stercorea fluxerunt, Noctem difficulter tulit: secunda surditas accidit, & febris acuta cum hypochondrii dextri contentione, qua in partes internas vergebat. vrinae tenues, pellucidae, quae habebat suspensum quid geniturae simile: parum insanuit circa meridiem. Tertia grauiter se habuit. Quarta convulsiones acciderunt, exacerbata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

Philistes paratus erat ad graues morbos capitis. Nam dolorem capitis multo tempore habebat

A & aliquando sub soporosis decumbebat. Quae duo redundantiam sanguinis crudioris significant, & vius vini largiori potu incidit in febre continuam, & dolor exacerbatus est. Atqui fortasse dolor & sopor, qui multo ante febre acciderunt, ex assiduo vini potu nascebantur, quod homo vinosus esset, aliquando vero potu aliquo solito largiori, etiam febricitauit. Fortasse illa ob alias causas acciderunt, & potus insolitus febre fecit, & dolorem auxit. Vtunque hoc habuerit, grauis febricitandi causa, parato homini, superuenit. Quo factum est, vt grauius, acutè scilicet, & lethalius, aegrotaret. Et euenerunt sane omnia, vt talis causa nata erat facere. Euomuit enim prima die biliosa, primum flaua, deinde arginosa, bile scilicet ad modum visca. Notemulit difficultet erefcente visione. Secunda die surditas accidit, bile cum vino ietente in caput. Febris eadem ratione acuta. Hypochondrium dextrum contentum est & vergebat in internas partes quasi tractum in internas, & superiores partes, quae sunt in thorace sub costis: quod etiam succorum in superna irrinentium indicium erat. Nam cum hepar sit venarum radix, & succorum fons, quum succi, velut plenis canalibus, per venas in superiora feruntur, turgent vehè, & distinctè retrahi faciunt sursum hepar. Vrinae etiam tenues & pellucidae, habentes suspensum quid geniturae simile: colore & substantia propria significantes triditatem, & tactum in caput: contentio vero, visionem etiam succi. Insanuit parum circa medium diei, & tertiam diem tulit difficultet, et ceteris cum reliquis delirio. Merito sane. Nam vt in primo praedictionum scriptum est, qui in capitis doloribus ad uigilos vomitus patiuntur, vigilantque tum surditate, cito & vehementer insaniunt: quarta die acciderunt convulsiones, quas si vomitus arginosis sollem apparuisse, suspicaretur aliquis consensum cerebri cum ore ventriculi fuisse: verum cum surditas etiam apparuerit & delirium, consentantum magis est fuisse propriam passionem cerebri, & nervorum: maxime, cum vinum tantopere soleat peruerso tentare, & vt in aphorismo 5. quintae particulae dicitur, etiam soleant convulsi mori. Velut etiam hic, qui cum convulsione mortuus est: quinta die mane. Merito hoc quoque. Quia morbus hic est acutissimus ex acutè, quales qui quarto die finiuntur. Nam & in aphorismo citato proxime dicitur, eos qui convulsione corripiuntur, quatuor diebus perire.

E

F

AEGROTVS. V.

G

C Herionem qui decumbebat in ieta Demetrium, ex potu febris vehemens corripuit: statim autem capitis grauitate cum dolore laborauit. Non dormiuit. Alui turbata est tenuibus, subbiliosis. Tertia febris acuta inuasit, & capitis tremor; precipue autem labii inferioris: paulo post autem rigor, convulsiones, omnino delirauit. Noctem difficulter tulit. Quarta quieuit, parum dormiuit, delirauit. Quinta laboriose se habuit, omnia exacerbata

breui indicauit: & rursum decima septima rigore
tudecanit reciduiam. Atqui profecto non solum ad
presensuonem iudicationes futuræ referri notare, in
quas partes extremæ inclinent, sed etiam ad cura-
tionem aliquando, quia illam et euacuationes pro-
mouendæ sunt, si natura pigritas monet. Quia ab oc-
taua usque ad decimam septimam, vrinae nullam, &
aliorum acciderunt exiguum mentionem fecerit.
Addit, vrinae post reciduiam, & iudicationem, hoc
est, postquam facta iudicatione die septima cepit re-
ciduiam die nona; semper fuerunt melioris coloris, &
subsidentiam habentes: hoc est, tales semper perse-
uerauerunt, quales apparuerunt die octaua, neque
delirauit homo in tota recidua. Verum quia vrinae,
nondum processerunt ad concoctionem, neque hæc i-
udicatio cedere potuit reciduiam, sed die decima octa-
ua visum est malum cepisse denuo, nouo calore, &
noua siti accedente, & vrinae rursum crudiores: ex-
dem enim quæ fuerant primis diebus, tenues cum
suspensio quodam nubuloso. Non arbitror eadem
materia facta crudiori, quæ coqui cepetat, sed por-
tione alia denuo putrescente, & mota. In hac secun-
da reciduiam parum delirauit, Circa decimam nonam
factus est à febre liber. Supererat tamen quidam
dolor circa cervicem. Successit vrinae subsidentia,
multa scilicet & crassa, qualis solet iis qui per vrinam
putantur, & indicatus est perfecte vigesima. Dolo-
rem illum cervicis suspicor fuisse signum dectero-
cium. Nimirum iudicatoriam euacuationem ante-
cedit semper secretio, & in secretionem dolores par-
tium multum. Nam si instat euacuatio aliqua, earum
quæ per eam aguntur, vt rigor, sudor, & in-
sensibilis euacuatio, exstantia excrementa de venis &
arteriis in musculos, dolores excitant tenues, aut
punctorios, vt sunt excrementa: si verò aliqua earum,
quæ aguntur per internas vias vt ventres, vesicam, &
vterum: cōstibunt excrementa ex corporis habitu in ve-
nas maiores, inde in vias euacuationum transmitten-
da, & tūc committuntur excrementis, tūc, tūmen-
tibus venis, fiunt dolores partium. Quod in iis qui-
bus instant menstruae euacuationes, sepe licet obser-
uare. Itaq; dolor hic cervicis ita factus est, dūa utiq;
donec copia in vrinarias vias colligeretur. Sed quo
pacto cessare potuit febris ante iudicationem? Certe
vt bis iam deherat febris, homine nondum à morbo
liberato, qui, si ante reciduiam euacuatio sufficiens
materiam antevertisset, potuit à reciduiam præseruari,
& liberari à morbo, cuius iam ante soluta esset fe-
bris, vt certe fit sepe. Sed superest exponamus has
litteras x. x. v. primū. v. significare Nona-
m, idest probabile, & vltimum. v. signum, idest salu-
tem, indicatum est antea. Indicatum etiam penulti-
mam litteram significare numerum, quod hic maxi-
mè respondet. x. enim significat vigesimum. Indica-
tum etiam hanc priorem, prioresque significat speciem
euacuationis. Quod hic quoque satis quadrat
nam N. m. significare solet quædam ei pars, hoc est mul-
titudine vrinae. Hunc verò ita indicatum esse, iam
diximus. Vnde rursum constat subsidentiam illam
vrinae vigesimi diei fuisse copiosam, & euacuato-
riam, non iudicatoriam solum, vt exiguum illam,
quæ octaua die cepit apparere. Voco iudicatoriam,
illam quæ ad agnoscendam materiam concoctionem,
& morbi tempus, consideratur: ad euacuationem
autem nihil, aut omnino exiguum præstat: euacuato-
riam verò, eam quæ copiosa est, adeo vt magna

A materiz pars vrina expurgetur. X. in multis codici-
bus non est, vbi tamen est, nomini ægroti responde-
re videtur, quasi illis literis diceretur, probabile
Cherionem multitudine vrinae vigesimo sanatum.

ÆGROTVS VI.

B E Vryanactis filiam virginem febris vehe-
mens corripuit, permansit autem usque ad
finem sine siti, & quavis alimenta respuebat, à
ventre pauca exierunt. Vrinae tenues, exiguae,
non boni coloris. Incipiente autem febre circa
sedem dolebat. Sexta autem die febre libera,
non sudauit, iudicata est. Quod autem circa se-
dem, parum suppuratum est, & exiit cum iudi-
catione: post iudicationem verò die septima ri-
guit, nonnihil incaluit, sudauit. Post iudi-
cationem verò octaua die riguit non multum, po-
stea verò extrema frigida semper fuerant.
Circa decimam post eum quem habuerat sudo-
rem delirauit, & rursum confestim ad mentem
rediit. Dicebant autem, eam hæc pati, quod gu-
stasset racemum. Intermittebat autem, duode-
cima rursum delirauit, vter iuratus est bilio-
sis, paucis, & meris, tenuibus, mordacibus. Cre-
bro surgebat, septimā autē qua postremū delirā-
uerat, mortua est. Hæc autē incipere morbo do-
luit fances, & perpetuò ruborē habebat, & colu-
mella reuulsa fuit, fluxiones multa, exigua,
acres: insitit coacta. Nihil excreabat. Nullum
cibi toto tempore accipere poterat, neque appe-
tebat quidquam, neque sitiebat. Neque bibit
quidquam notatu dignum. Tacita, nihil loque-
batur. Tristis, desperata statim erat. Erat au-
tem patina quadam ad talem propensio.

Narratio hæc duas partes habet: prima continet,
quæ quibusdam diebus acciderunt, usque ad eam
quæ virgo mortua est: secunda, quæ per totum motu-
m perseuauerunt. Hæc duos morbos habuit,
inflammationem quandam in ano, quæ sexta die,
cum suppuratione soluta est, vt nihil notatu dignum
ex ea inflammatione post eum diem relictum
sit: & desquillationes quasdam acres, quæ à morbi
principio fluxerunt à capite in columellam, fauces,
ventrem, & pulmonem, & tandem intra vigesimum
notum diem, vt ego existimo (non enim est dierum
suppuratio facilis in hac narratione) in tabem finita
est. Quod ad hanc secundam affectionem attinet, in
ægrorantibus, quos habere petiisse, prima sectione pri-
mi libri narravit, virgo hæc esse videtur, fert enim
habuit, quæ ea tempestate in ægrotis apparuisse, nar-
rauit. Sed persequamur totam narrationem sigilla-
tim. Euryanactis (inquit) filiam virginem vehe-
mens febris corripuit, permansit autem usque ad fi-
nem sine siti, & quavis alimenta respuebat. Hæc fuit
grauissima pars mali illius, sine siti & fame tandu
fuisse, vt neque potum, neque vllum omnino

cibum, vel gustare, sustineret. Est enim hoc maximæ corruptionis, facultatis eius quæ appetimus, inditum. Ea verò non potest tantopere deficere, nisi extincto calore naturali in ea parte, ad quam ea facultas pertinet. Hoc proinde ut granissimum, & maximum mortis quæ successit causam, in principio narrationis ponit Hippocrates & in calore reperit. A ventre exierunt pauca, & vrinæ etiam tenues, exigue, non boni coloris. Quæ omnia debilitatis, constricticis, & expultricis erant. Incipiente autem febre, circa sedem dolebat. Hunc dolorem ex inflammatione sedis fuisse, exitus declaravit, quia die sexta à febre est liberata, & iudicata sine sudore, & exitum ea indicatione pus. Nimirum factio pure cessavit febris, quæ dum pus fieret, ardebat, vr̄ solet. Sed quia non id solum malum erat impleri, sed de stillationes etiam acres capite, cito post hanc indicationem redit febris. Nam se prima die riguit, nonnulli incaluit, & sudavit, & sudore rursum iudicata est. Et rursum octava post indicationem (post indicationem scilicet proximam septimæ dei) riguit non multum. Nimirum est familiare admodum, distillationibus ex capite decurrentibus, sive, & citra certam penam rigere, & atdere, & sudare excrementis nunc tangentibus sentientes partes, nunc putrescentibus per partes, nunc eorum calore dissipatis. Sed ex hoc secundo rigore non recaluit satis, nam extrema frigida semper fuerunt, quod debilitatis naturalis caloris erat. Circa decimam, post eum quem habebat sudorem (nimirum sudabat decimam) & post ceptum sudorem deliravit, & rursum cito respuit. His diebus interponit Hippoc. causam externam, quæ dicebat hanc mulierem cepisse ægritare, incondito profecto ordine, in principio enim totius narrationis oportuit dici, aut certe in fine. Sed Hippocrates fortasse die morbi decima factus est certior eius occasibus, & scripsit rem tantam, vt accepit. Fortasse vetustate codicum est conurbatus ordo. Vtūque hoc habeat, occasio erat satis noxia mulieri, & morbus recte occasione respondit. Comprobat enim vix racemum (magnum arbitror) mulier natra parata ad tabem, & fluxionibus de capite tenuibus & acerbis correpta est. Vix vr̄ fluxionibus maxime replere consueverunt. Dicta ægrotandi occasione, redit ad narrationem, dicens, intermittens autem (diem scilicet undecimam, delirandi intermissionem faciens) duodecima die rursum deliravit: Venter turbatus est biliosis, paucis, & meris, tenuibus, mordacibus, & crebro surgebat, ex biliosis scilicet distillationibus, quæ in intestina repebant. His ita procedentibus, die septima, à qua postea deliravit, hoc est septima à duodecima (nam decima deliravit prius) mortua est. Die itaque decima, haud dubie, tabida facta ex dictis distillationibus. Fuisse verb hæc, quas dixi, legittimas singulorum causas ostendunt, quæ subdit in secunda orationis parte. Hæc (inquit) incipiente morbo doluit fauces, & perpetuo ruborem habebat, & columella renulta fuit. Constat hæc fluxionis à capite esse, quod ipse etiam dicit appetere, addens, fluxiones multas. Columella reuclitit aliquando multitudine fluxionis tumens, nonnumquam siccante fluxione, velut salita, & corrugata: cum illa est causa, est tumida: cum hæc, flava, aut rubra, siccata, & exasperata, atque facta exigua. Talem fuisse in hac consat, quia fluxiones fuerunt te-

naes & acres. Itaque fuerunt multæ, non quod copiosæ, sed quod affligentes continerent, & in multas partes incumbentes. Nam in fauces, & columellam (quod indicant dictis rubor) & in asperam arteriam, quod fecit, vt extulisset concocta, & nihil excrearet, hoc est, vt crebro rursus, raro extulisset, vt per tenuissimas distillationes sit: aliquando vero concreta & crassa quasi vitam pituitam (hæc enim nunc ob similitudinem cocta vocat) quia tamen præ intemperie sicca & calida peccoris fiebant, referri debebant magis ad efficientem causam, quam ad materiam, cum non esset morbus pituitosus. Esse vero hanc legitimam expositionem, intelliges ex his verbis primæ sectionis libri primi. Spuebant autem exigua densa cocta, modicum quiddam vix excreantes. Sed & in ventrem inferioriorem decubuit maligna fluxio, tantam noxam illi inferens, vt ferè mori fecerit, ac sustulerit cibi & potus appetentiam (nimirum vt solet externa pars in alvum pati, præ maligna fluxione, quam excipit) & in inferiori, faciens crebram cupiditatem desidendi, cum biliosis, paucis, meris, tenuibus, & mordacibus deiectionibus. Teneri eum granissimum aliquo morbo interius, non tam magno, quam mali moris, & quasi subdolo, indicabat tanta taciturnitas, vt nihil loqueretur, & tristitia tam desperata, vt neque conquereretur, neque auxilium peteret, aut omnino velle videretur. Tale quiddam est hoc, quale quod in externis morbis videmus. Si quæ pars magna inflammatione corripitur, quæ, vt magnæ solent, in suppurationem mutatur, febres accidunt & dolores ingentes, & æger vigilans vociferatur, sin autem in gangrenam abit, febres exigue sunt, & dolores nulli, sed pars velut silens (licet metaphoræ vti) moritur. Non mihi breui ergo, si calor naturalis tabe, mulier tam brevi conuulsit, & mortua est. Quo minus autem mireris, moxet Hippocrates fuisse huic naturam quandam ad tabem propensionem. Itaque in illis erat hæc, de quibus Hippocrates dixerat citata sectione: Est autem quibus incepit primæ his vengebat natura in tabem: moriebantur autem eelerius, quam solent hæc transigi. Mihi vero citæ consumptionis, causa alia maxima videtur accedere, illa integra ferè cibi & potus abstinencia. Nam cum vita hominis iuxta Hippocratem septem dierum sit, quomodo poterit non marcescere hæc virgo decem & nobem.

ÆGROTUS VII.

Anginosa quæ iuxta Aristonem agebat. Hæc primum à lingua incepit. Obscura vox erat, lingua rubra & ressecata. Prima die horrida, incaluit. Tertia rigor, febris acuta innasit, ceruicis tumor subruer, durus, & super pectus ab utraque parte. Extrema frigida. Linida. Spiritus sublimis. Potum per naves reiciebat, bibere non poterat. Deiectiones & vrina resistenter. Quarta omnia exacerbata sunt. Quinta mortua est. Anginosa.

Hæc angina tenet partes internas oris, & externas ceruicis, quia incipit à lingua, quæ rubra, & ressiccata erat, quasi erysipelatosa. Vnde vox facta est obscura, & fuit tumor durus, & sububer, inflammatio scilicet erysipelatodes, ceruicis, & super pectus ab utraque parte. Horrorem primi diei, & rigorem tertii, biliosa fluxio, quæ in eam partem ferebatur, occurrens partibus sensientibus, fecit. Illa verò frigida & liuida extrema, & spiritus sublimis (hoc est, qui superioribus thoracis partibus trahitur) longè deterrima erant, significabantque, naturalis caloris, & facultatis extinctionem. Quod potum per nares reiciebat, & bibere non poterat, angustia viz inflammatione compressæ ascribi potest, aut resolutioni gulæ, vel fastidio extremo, quod scilicet ob facultatis corruptionem deglutire mulier non posset, & cum ore quàm maximè conaretur, per nares reiceret. Atqui Galen. extremæ debilitati id vult ascribi, quia deterrima illa signa aderant, quæ dicta sunt. Ego verò utramque causam adfuisse suspicor, & viz incommoditatem, & facultatis debilitatem. Deiectiones & vrinæ reiectiones præ debilitate expulsi sunt, in internis manentibus excrementis. Quarta, sunt exacerbata omnia. Quinta mortua est anginosa. *P. i. c. 8. hoc est, mæori deiectionibus* *Unguentis mæori, laborem*, hoc est, probabile deiectionibus sup prellis quinta mortuam: hæc enim significari his literis antea explicatis est à Galeno. Ob has censer, non fuisse tales literas scriptas ab Hippocrate, sed ab aliis adiectas, quia non probat mortuam esse hanc ob suppressas deiectiones, sed ob anginam, deiectiones verò esse suppressas ob debilitatem facultatis. Ego an ab Hippocrate scriptæ, an ab alio adiectæ hæc literæ sunt, non possum dicere, tamen has literas non esse male hoc loco adiectas, affirmo. Nam angina per quam fauces & ceruix rubent, maxime descendente rubore ad pectus, diuturnior est, & multi ex ea euadunt, vt in prognostico dicitur, neque alia ratio moriendi in tali est, quàm recurrentibus inter excrementis. Non ergo hæc mulier mortua esset ex hæc angina, nisi facultas fuisset debilissima, quod frigus & haor partium, & sublimis spiritus indicabant, neque omnino fuisset mortua, nisi recurrissent intro excrementa: recurrerunt verò, quia suppressæ sunt deiectiones, & vrinæ itaque & ob hanc causam est quinta mortua, alioqui non mortura, aut non tam citò. Si enim valuisset per ventrem, & vesicam, atque vndique facile pellere, neque tantam naturalis caloris extinctionem passa fuisset, neque mortua. Cur enim ab angina externa? Quia verò non valuit, excrementa retenta sunt, quæ extinxerunt calorem, & debilitatem facultatum retraxerunt, & mortem attulerunt. Tam longe abest à vero loci huius sensu Galenus, vt mireretur, qui potuerit hæc angina produci vsque ad quintum, quin prius mulier mortua faceret.

ÆGROTVS VIII.

Adolecenti illum qui decumbebat in foro mendacium vehemens febris corripuit, ex lassitudinibus, & laboribus, & cursibus insolitis: prima, aluus turbata est biliosis, tenuibus, multis. Urina tenuis, subnigra, non dor-

Aminuit, siticulosus fuit. Secunda omnia exacerbata sunt, deiectiones plures, intempestiores, non dormiuit, mente turbatus fuit & leui sudore persusus. Tertiam difficulter tulit, siticulosus, anxius: multum se iactauit & perplexus erat, delirauit. Extrema liuida, & frigida. Hypochondrii contentio submolliis utrinque. Quarta non dormiuit, peius se habuit. Septima mortua est, circiter vigesimum ætatis annum agebat. Acutum. *Æ. 8. c. 2.*

Adolescentia ægri duorum quidam causa fuit: primum, vt ex occasione tam acuto & calido morbo corripetetur, deinde vt cum tam graui morbo vsque ad diem septimum durare posset. Proinde bis id monuit Hippocrates in principio, nationem inde incipiens, adolecentem illum: in fine, dicens, circiter vigesimum ætatis annum agebat. Quia ergo erat adolecens, ac fortasse natura calidus, & nutritus calidis, etsi alioqui otiosus, poruit ex labore corripitur tam calido morbo. Atqui quamquam reliqua omnia, quæ naturam & victum calidum spectant, facientes ad facilem passionem, tamen olosum fuisse, non subleuauit periculum, immo auxit plurimum, nulla enim causa magis labores læserunt, quàm quod insoliti: quia insolita omnia ferè male natura. Proinde hic male tulit, etsi adolecens, & alioqui fortis. Nimirum vt in aphorismo dicitur: soliti labores ferre, minus lædi solent, etsi sint debiles, & senes, quàm si qui non sunt assueti, etsi sint robusti & iuuenes.

DQuoniam autem dicit, lassitudinibus, & laboribus, & cursibus significat, vehementes & multiplices motus eum sustinuisse, atque inde defatigatum esse: Labores enim sunt motus nimii, longè per productiores quam exercitationes: lassitudines vero affectiones, quas labores pariunt. Ergo cursibus & aliis motibus laborauit, vsque ad magnas lassitudines. Nam exiguas, & velut incipientes lassitudines, exercitationes etiam faciunt, non solum labores, & ea est

Emeta exercitationis, vbi lassari ceperit corpus, statim quiescere: vltra quàm, si motus procedat, iam est labor. Hic homo, bile vehementer agitata, & malignè putrescente, videtur in hepate & liene contraxisse inflammationem tantam, vt sepe etiam transfusum attigerit. Nam ambo hypochondria inflammata fuisse, declarauit, cum reliquis, contentio submolliis hypochondrii utraque ex parte: attingisse fortasse, etiam septum transversum, ex delirio suspicio est. Quamquam per malignas etiam hypochondriorum inflammationes, contigit delirare. Acutissimum & malignum affectum significauerunt euacuationes symptomaticæ, quæ, & tempore, quia statim apparuerunt, & qualitate etiam, malæ erant. Puta biliosa tenuia multa ex aluo, & secunda die deiectiones plures, Quod dicit intempestiores: non quidem intelligentiam prioribus. Nam tales deiectiones, quanto citius apparent, tanto intempestiores sunt, sed accipiendum comparatum propositum, quasi intempetum. Sed & vrinæ à primo

Fdie tulerunt præ se contraria concoctioni, & lethalia, tenues enim fuerunt subnigra. Præter excrementa vero, reliqua etiam quæ sunt in genere signorum salutaris, aut mortis, statim ceperunt maligna apparere, & vigere continenter, quod acutum & periculo-

G

lum significabat. Graue enim die prima non dormisse, & fuisse siticulosum (intellige enim valde) grauius verò, secundò omnia exacerbat fuisse, sitim scilicet, & percuilum, & mentem turbatam fuisse, & sudasse parum. Graue enim secundò die sudasse, grauius autem quòd parum. Exiguus enim sudores in talibus animi deliquia comitari solent: grauius adhuc quòd diem etiam tertium difficulter tulit, (hoc grauius omnia symptomata significat) siticulosus, anxius. Anxietatem verò indicabat multa iactatio, & perplexitas, & quod delirauit. Quod quidè verbum maius aliquid significat, quàm mentem turbatam esse. Quare intellige, die hac tertia crenisse delirium. Longe autem ductis omnibus grauius, extrema liuida & frigida fuisse. Hic profectò nullus non parauerat hominem die quarta, qui primi morborum imperus finis est, moriturum, præcipuè cum iam videret die quarto non magis quàm prioribus dormire, & cir in pectus. Quid enim iam penus, excepta morte, poterat expectari? Atqui profectò ita esset factu, nisi hic beneficium ætatis, quæ ferè viginti annorum erat, & robustæ facultatis, vsque ad septimam durasset, quæ necessario mortuus est. Hoc vt significaret, cum dixisset septima mortuus est, addidit (vt antea etiam dixi) circiter vigesimum ætatis annum agebat. Itaque ætas effecit, vt tardius interiret, quàm pro morbi acutè. Ergo motus acutior fuit, quàm pro ætate quem habuit. Hoc vt significaret, addidit, acutum. In quatuor autem literis his, $\pi\epsilon\chi\upsilon\varsigma$, solida dubitari potest, quid significet. Nam primum significare probabile, vltimam, mortem, penultimam, diem, quæ hic septima fuit, ex dictis antea est apertum: & verò significare solere $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$ $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$, id est suam bilem, aut $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$ $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$, id est nouum seu raturum, aut $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$, id est strigmentum, aut $\chi\alpha\lambda\iota\upsilon\varsigma$, id est, siccitatem, ex sua & antiquiorum sententia dicit Gale. Hunc verò magis confirmantem est, dici mortuum ex nouitate, hoc est, quòd repente mortua multum consuetudine, ad labores magnos se transiit, quam ex bile, aut siccitate, aut strigmentis. Nam quòd nouitas causam externam, & non affectionem significet, nihil refert. Non enim solum ex affectu, aut internæ causæ, aut magno aliquo symptoma re dicuntur homines interire, sed & ex causâ aliqua externa, cum eam contingit esse valde noxiam, velut Philistes ex potationibus.

ÆGROTVS IX.

Mulier, quæ decumbebat iuxta Tisamenum. Huic voluulosa moleste concitabantur. Vomitus multis torquebatur, potum continere non poterat, dolores aderant circa hypochondria, & in inferioribus secundum ventriculum partibus, dolores & tormina continenter affligebant, non erat siticulosus, incallescerebat. Extrema frigida vsque ad finem, fastidiosa, sine somno. Vrina tenuis, pauca: excretionis cruda, tenuis, pauca, non erat remedio locus, mortua est.

Voluulus affectio est acutissima, & grauiissima, quæ ad intestina grauius pertinet, vt colicus dolor ad

A crassa, & in eisdem habet essentiam, & causam. Est enim obstructio aliquando ex induratis fecibus, aliquando ex crassis siccis, & crudo, crassoque flammâ, nonnunquam etiam ex inflammatione. Hic morbus tanto periculosior est colico, quanto inestina gracilia, & remota, & acutior sensus, & propiora principis partibus, hepatis, leni, fundo ventriculi, & sepro transuerso. Vnde contingit ea trahi ad compassionem. Hoc morbo occupatam fuisse mulierem hanc dici t, narrat s primum signa pathognomonica, deinde etiam supernæsentia. Pathognomonica sunt hæc, vomitus etiam multi, & potu continere non poterat, dolores ac rotæ commeneret affligentia circa hypochondria, & infernam ventriculi partem, hoc est, inter thoracem & umbilicum. Hæc enim per hunc morbum accidunt, & nihil videretur descendere deorsum, sed totus ventris motus videtur ad os sursum præter naturam conuectus, vsque adeo vt nonnunquam feces etiam soleant vomere, quod fortasse huic non contigit (& fortasse etiam contigit, etsi Hippocrates non exposnerit vomitus speciem) ob vim & acutem morbi, anticipare mulierem mori. Illa vero sunt supernæsentia [quæ quia lethali adeo morbo superueniente, fuerunt etiam lethalia] non fuisse siticulosam cum incallescere, hoc est, febricitasse, & non secundum rationem febris sitilis. Quod quidem pessimum erat: nam delirium, aut corruptionis magnæ facultatum in ventriculo. Atqui fastidiosa simul obos, ad ipsimum genus pertinerebat, & corruptionem magis facultatis, aut malignos succos indicabat. Extrema frigida vsque ad finem, hoc est, ex quo non recaluerit, magnitudinem internæ inflammationis significabat, vnde & ex febre, & ex tanta rotis mali acutè, manifestum, eam eius voluuli causam inflammationem fuisse, tamque magnam & malignam, quæ non minus pernigilium, quàm alia dicta, erat nata facere. In eæ narrationis, speciei exennum mentionem facit. Quæ quidem species est in genere signorum, quæ Galenus vocat assidentia, quia quocumque tempore morbi possunt accidere, & non accidere. Meminit vero Hippocrates vrinæ in morbo, qui non erat venarum, ob communem rationem quam Gale. arguit, quo scilicet coustet, an venas arteriger affectio, sed & ob peculiarem etiam, quam ego addo quia scilicet, cum soleat hepar ad compassionem cum intestinis trahi, & inde maximum ægri periculum incurrant, refert quàm plurimum scire, quantum læsione hepar accipit, quod ex nulla re melius, quàm ex vrina intelligi potest: præcipuè, si secundum gibbam partem patitur hepar, vt si secundum causam, ex detractionibus. Vrinæ ergo renes & pauca, creditatis, & mali hepatis esse poterant. Sed quia renes, præcipuè vero si etiam pauca sint, heri solent raptu humorum in aliam partem, vt cum in phrenitis apparent: mihi significasset potius inflammationis magnitudinem rapientis ad se omnia more cucurbitæ. Mirum vero, quod voluulo tanto laborante, detractiones habuerit. Nam vt diximus, nihil omnino solent per sedem emittere. Sed neque hic fuit pars quæpiam extremitatum, expultricis facultatis vi præcipuè pulsæ, sed tenæ quiddam & crudum, vt quidam ichor, calore hepatis & mesenterii liquefens. Tantu erat morbus, ex quo tam cito mortua est, vt nullus fuerit remedio locus. Quare verisimile est, etsi id tacuerit Hippocrates, mor-

tum fuisse secunda die, aut paulo post. Nam de iis, quibus ob morbi breuitate subuenire non possumus, dicit ipsemet Hippocrates in initio prognostici; Quidam enim diem viuentes vnam, aut paulo plus, moriuntur, antequam medicus arte repugnet. Eiusmodi fuit hæc, & Hippoc. tacuit diem mortis, vt hinc multo magis intelligeres citissime mortuam esse, vt vix dies interfuisset, quasi diceret, statim mortua est.

ÆGROTVS X.

Mulierem quandam, ætatem, quæ apud Pantimedem debebat, ex abortu recentis fatus vehemens febris prima die corripuit, lingua sicca, siticulosa, fastidiosa, in somnis erat. Alius turbata est tenuibus, multis, crudis. Secunda superriguit, febris acuta inuasit, ex alio multa egressa. Non dormiuit. Tertia dolores angebantur. Quarta delirauit. Septima mortua est: alius per totum morbum humida cum deiectionibus multis, tenuibus, crudis. Urina pauca, tennes. Febris ardens.

Febres acutæ in recens enixis, & iis, quæ fœtus corruperunt, valde periculose sunt. Non enim sunt iis, quæ citè purgantur, sed quibus supprimuntur evacuationes. Id verò fit locis vteri, à quibus euulsa sunt secundina, ob ruptas inflammatis, & proinde obstructis, atque materiâ, alioqui malignâ, multum sedundante, & ita incuneat vt non possit exire. Atqui, etsi possit aliter, circa inflammationes inquam, fieri, tamen acuta febris in enixa raro aliter fit, & ita semper fieri, putare oportet, quia hæc curationis rationem dirigens nunquam errabis. Neque professio minus periculi est, in patientibus abortum, quam in enixis, sed, vt Hippocrates lib. de morbis dicit, multo plus, quia quod naturaliter in his fit, in illis fit præter naturam. Quod verò violentum, periculosius, quam quod naturale. Sed, vt in matena dicatur apertius, constat magis dilacerari acerbula vteri, à quibus vi fœtus euellitur, quam à quibus naturaliter excidit: vt pomum nondum maturum ex arbore decerpitur difficilis, quam si sponte cadat. Minus. n. lacerum, & sano propius manet id, vnde naturaliter velut separatur. Si ergo in abortiente magis vlceratur vteri, facilis etiam inflammabitur, ac reliqua mala fient, vsque adeo vt de iis quæ corruperunt dicat loco citato Hippoc. In huiusmodi enim periculum est, ne vteri exulcerentur, & inflamentur. Hoc autem est periculosum. Non parum autem refert, quo mensis conceptionis abortus fiat. Nam quæ corruperunt fœtum nondum menstruum, aut non antiquiorem, quæ scilicet primo prægnationis mensis abortiunt, exiguum, aut vix vllum periculum habent, quia acerbula adhuc sunt mucosa, vt separari vellis manentibus viceribus possint à sanguinis vero expurgatio non maior desideratur, quæcumque earum, quæ singulis mensibus contingant, vt pote cum nulla aurea salum euacuationum intermissio facta sit. Quæ aliquanto tardius, vt secundo aut tertio mense abortiunt, cum periculo id faciunt,

A solidioribus iam aliquanto acerbulis, & suppressionibus menstruum prægressis, non tamen cum tanto, quanto quæ mediis, aut postremis mensibus: quarum quæ mediis mensibus, ob firmitudinem acerbulorum periclitantur plus quam aliz omnes: ob multitudine autem excrementorum, plus quam quæ primis, minus quam quæ vltimis: quæ vltimis, multitudine excrementorum plus omnibus, firmitudine acerbulorum non quantum quæ mediis, vt omnibus collatis, in mediis & vltimis mensibus non admodum impar sit periculum: in primis autem manifestè minus quam in aliis. Itaque huic mulieri non admodum erat futurus periculosus abortus, vt qui recentis fatus, nisi magnus apparatus in corpore fuisset. Corripit autem fuisse tantum, vt ex febre ardente, hiliosa, acutissima, facta phrenitide quarta die, mortua fuerit septima. Acutem autem maximam satis indicauit, quod prima statim die fuit lingua sicca, & mulier siticulosa, & in somnis. Bilis redundantiam & malignam qualitatem indicabant hæcipsa, & fastidium, & alius turbata, tenuibus, multis, crudis. Bilioforum enim est valde sitire, & cibos non posse capere. Deiectiones vero tennes, & eradas vocat ex tenui bile, quæ prima die non nisi ob redundantiam aut malignam qualitatem exercebatur. Secunda die eadem fuerunt. Nam non dormiuit: & ex alio fluxerant multa, & insuper riguit id quod in iis quæ ex abortu, aut partu laborant, sæpe euenit ob sensus vteri acrimoniam. Tertia die fuerunt eadem, & insuper angebantur dolores, vterinos fuisse arbitror. Quarta eadem, & insuper delirauit, facta iam inde phrenitica, quia, arbitror, proximè dici dolores facili fuerunt malignis succis occurrentibus ad vterum, qui non poterant erumpere, cum ergo exire prohiberentur, inde imperum fecerunt in sublimem partem, & tenuerunt caput: cetera transacta sunt, vt patet est, in postrema parte lethalis morbi, vsque ad septimam, quæ mortua est, quam indicauerat maligna permutatio quarta. Dicit deinde per recapitulationem. Alius per totum morbum humida cum deiectionibus multis, tenuibus, crudis, urinae pauca, tennes. Fortasse repetit hoc,

E quod de deiectionibus dicitur, significans id fuisse à principio signum omnium grauissimum. Vrine verò fuerunt tennes, quod crude; pauca vero, ob deiectionum tenuium multitudinem, & ob feurem vrentem. Talem enim fuisse testatur Hippocrates ipse, dicens, febris ardens. Si modo verba hæc vltima Hippocrates sunt, ac non potius, vt Galenus putat, adscripta.

F.

ÆGROTVS XL.

Alteram ex abortu circa quintum mensem, Oeceta uxorem, febris vehemens corripuit. Initio comatosa erat & rursum in somnis cum rennum dolore & capitis gravitate. Secunda alius turbata est paucis, tenuibus, meris primis. Tertia plura & deteriora. Nihil dormiuit. Quarta delirauit. Timores, tristitia aderant, dexter oculus distortus est, sudore circa caput paucos & frigido maduit, extrema frigida. Quinta omnia exacerbat sunt. Multum

tum deliravit, & rursus celeriter ad mentem rediit. Siticulosa erat & infomnis, Aluus multis & meris usque ad finem defluxit. Urina erant pauca, tennes, subnigra. Extrema frigida sublimida. Sexta eadem. Septima mortua est. Phrenitis.

Periculosior abortus est quinto mense, quam primis tribus, quamquam huic, & proximæ mulieri par malum & periculum videtur superuenisse, cum ambæ septima die mortuæ, & ambæ quarta die phreniticæ factæ sint. Id quod factum fuit, quod prior illa tantò maiorem ad acutum morbum apparatus habuerit, quanto minus periculosam ægrotandi causam. Atqui profectò illa fuisse, utriusque morbi symptomata indicant. Semper eòim sunt tales morbi, quales antecesserunt apparatus. Illa verò habuit biliosissimum morbum, ut omnia symptomata indicantur, hæc verò ex variis succis. Nam quædam symptomata pituita, quædam bilem, quædam etiam nigram bilem, indicantur, atque adeo quædam sanguinis redundantiam. Illa ergo biliosior est, hæc succorum habebat quandam commixtionem. Coma enim pituitam indicabat, periplegmiam, & aluus turbata tenuibus & meris, bilem; dolor renum & capitis grauitas; redondantiam sanguinis, & toto corpore, & circa vitæ præcipue, cum non ritè expurgarentur: timores vero & tristitia, melancholiam. Itaque prima die fuit comatosa, & rursus infomnis eadem die. Scilicet primæ diei parte dormiebat *admodum*, altera vigilabat, ut nunquam amplius dormitura. Quod quidem in semitranis; aut quæ illarum naturam referunt, vsu venit. Hæc verò febris eandem habuit causam: hæmorrhagica non valde dissimilem, ex pituita enim & bile maxime. Eadem die renum dolor, & capitis grauitas. Secunda aluus turbata paucis, tenuibus, meris, exunte bile, vapore tenuiori, ante alios succos: tertia exierunt plures & deteriores, purtiores, scilicet, & variegata, ex variis iam excrementis. Noctæ eius diei nihil dormiuit, antecedente scilicet, ut solet, periplegmiam, delirium. Nam quarta delirauit, occupans putridis succis cerebrum. Fuit vero species delirii in timore, & tristitia, ut iis qui ex toto succo delirant. Fuit verò eadem die dexter oculus distortus, quod signum non fuit huic indicatorem, ut ei, qui decumbebat in horro Dealeis, qui huius libri fuit tertius ægrotus, sed lethale, iuxta illud quod in aphorismo dicitur. In febre non interueniente, si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus, distortus fuerit. Nimirum hoc erat signum consultiuum, quod quidem cum delirio coniunctum, & febris ardentis superueniens, grauitè affici cerebrum indicant. Reliqua etiam omnia, quæ ea die accidisse narrat, lethalia esse, ex prognostico didicimus, ut sudore circa caput paucos & frigido maduisse & habuisse extremas frigidas. Quæ omnia quinta exacerbata sunt, & multum delirauit. Quod dicit celeriter ad mentem redisse, non significat phrenitidis solutionem, sed quod in plerisque phreniticis obseruamus, ut cum valde common mente sunt, repente quædam prudenter loquantur. Siticulosa etiam fuit, & infomnis. Quamquam hæc duo non erant tam graua, quam reliqua. Non enim erant præter rationem fo-

bris, quin potius fortasse, siticulosa fiebat, cum ad mentem redibat. Aluus, inquit, turbata multos meris usque ad finem, id vero non potuit cum vtnis tenuibus & subnigris morbum soluere: euacuationes enim sine signis concoctionis, nedum cum concoctioni contrariis, symptomatice sunt. Extrema etiam hæc die non frigida solum, sed liuida etiam fuisse dicit, quod vt in prognostico, dicitur, magis pestiferum est, quam si nigrescant quamquam hoc quoque morientibus iam partibus fieri solet. Sexta eadem fuisse, & septima mortuam; dicit. Merito quidem; quia acutissime processerat morbus, & die quarta facta fuerat insignis mutatio in deterius. In calce dictionis scripserat, phrenitis. Quamquam in quibusdam codicibus reperitur *aprimia*, id est, phrenitica, ego sequor eam lectionem, quam ex eius commentariis intelligi, sequentem fuisse Galeum illa enim fuit antiqua & certa. Galen. dicit scripserat fuisse *aprimia*, quam vocem, ut nuper dixi, non putat scriptam ab Hippocrate, sed ab alio adiectam. Ego oihil possum de ea re affirmare. Sed si Hippocrates voces has solutas, in fine narrationis adiecit, cur hæc potius phrenitidem, & proximam, febrem atdemem vocauerit, cum vtrique fuerit febris ardeas, & vtrique in phrenitidem abierit, non habeo quod dicam aliquid quam vtramque laborasse vtroque affectu, proinde huius illi vtramvis ægrotationem alterutrus nomine appellare.

AEGROTVS DVODECIMVS.

My licet, qua decumbebat in foro mendacior, enixam primū laboriose masculum, vehementi febris corripuit. Mox in principio siticulosa, fastidiosa; dolebat cor; lingua arida; aluus turbata tenuibus paucis, non dormiuit. Secunda parum rignit, febris acuta inuasit, paucis sudor circa caput & frigidus defusus est. Tertia laboriose ex aluo cruda multa tenuia fluxerunt. Quarta superriquit. Omnia exacerbata sunt. Infomnis. Quinta laboriose se habuit. Sexta per eadem. Ab aluo fluxerunt humida multa. Septima superriquit, febris acuta prehendit, sitis multa aderat, & corporis lassitudo. Circa vespem frigidus toto corpore sudor dimanauit. Perfrixit, extremæ erant frigida, nec recalescebant; & rursus ad noctem superriquit. Extrema non recalescebant, non dormiuit, parum quiddam delirauit, & rursus cito mente constitit. Octaua circa medium diei recaluit, siticulosa; comatosa, fastidiosa, vomuit biliosa; pauca, flaua. Noctem difficulter tulit, non dormiuit, minxit multum, conseruium, inscia. Nona remissa sunt omnia, erat comatosa. Ad vespem parum superriquit. Vomuit amara, biliosa. Decima rigor accidit, febris exacerbationem habuit, non dormiuit quidquam. Mane minxit multum, subsidentiam non habens. Extre-

*mare calefacta sunt. Undecimā vomuit viru-
lenta biliosa, riguit non multū post, & rursū
extrema frigida. Ad vesperam rigor, sudor,
vomuit multa, noctem laboriose trāsegit. Duo-
decimā vomuit multa, nigra, fetida, singul-
tas multus ad suis & sitis laboriosa. Decimā
tertiā nigra, fetida, multa vomuit, rigor
obortus est. Circa meridiem autem voce pri-
uata est. Decimaquartā fluxit sanguis de nari-
bus. Mortua est. Huic per totum alius humida
fuit & horrebat, annum ætatis agebat circiter
decimum septimum. Febris ardens.*

Haud dubie febris hæc incepit cum maiori acu-
tie, quā priores duæ, ac non minore temporis in-
teruallo terminata est. Nam prima statim die ha-
buit omnia, quæ mulier quæ habitabat apud Pan-
timedem, & insuper dolorem cordis, hoc est oris
ventriculi, & reliqua omnia acutissimè processit,
ruot, vt miraculo simile fuerit, septimum diem
mulierem hanc effugisse: durauit tamen usque ad
secundum septimum, fortasse quia erat ætatis tam
florentis: qua causa verisimile est Hippocratem in
calce narrationis, vt huic admirationi occurreret,
dixisse, annum ætatis agebat circiter decimum sep-
timum. Nam in historia adolescentis illius, qui de-
cumbat in eo ipso foro mendaciorum, quo hæc
mulier, perinde fecit Hippocrates. Est considera-
tio dignum, io iis, quæ ex partu laborare ce-
perunt, nunquam oon dicere Hippocratem, matrem
an foeminam peperint. Nam hanc dicit matrem, &
uxores Sileoi, & Dromeadz, quæ etiam ex partu
mortuæ sunt, dixerat filias peperisse. Qua in re
aperit insinuat, non parum facere id ad partus dis-
tinctionem, & periculum. Longè enim difficilius est
affectio gerentium vtero foeminas, & periculosior
partus. Nam & ob deteriore apparatum, & ma-
iorem excrementorum redundantiā, foeminae

conciuntur, & maiori expurgatione indigent fi-
lias enixæ. Nam sexaginta sex diebus expurgari so-
lent, enixæ filios solis triginta. Suppressio ergo in
illis est maior. Atqui profecto si memoria velimus
repetere omnes Hippocratis historias, plures eni-
zarum filias mortuas fuisse, repetimus. Ergo pe-
perisse filias periculum augeat, sed peperisse filios, &
nihilominus mortuas fuisse, anget admirationem.
Quamquam filios peperisse, & æquè grauius te-
neri morbis, periculosius est, quia minus naturale.
Multos rigores citra vllum ordinem habuit per
totum morbum hæc: quod familiare esse omnibus
enixis, aut quæ foetus corruerunt, ex illis ipsius hi-
storiis, quarum nunc memini, & aliis eiusmodi, li-
cet intelligere. Quin etiam omnibus suppressione
menstruorum laborantibus, tam familiares esse ri-
gores putant Hippocrates, vt in aphorismo 61.
quintæ particulæ dixerit. Si mulieri purgationes non
prodeunt, neque horrore, neque febre accedente,
verum cibi fastidia ipsi accedant, hanc in ventre ha-
bere existimato. Quasi scilicet suppressionem pa-
tientibus hoc conceptu, rigores accidere soleant,
multi autem sine febribus, aut per febres. Neque
sane id citra rationem. Maligna enim qualitas excre-
mentorum, & acer sensus vteri, possunt id facere.
Quibus accedit consensus oris ventriculi. Quod in

hac muliere peculiare etiam fuit. Nam plios quā in
proximis, & plios quā in aliis mulieris solet, labo-
rauit os ventriculi, quæ pars cum morderetur, om-
nium maxime, rigores solet facere, vt ipse Hippo-
crates lib. 6. huius operis dicit. Laborasse vero in
hac tantopere os ventriculi, indicauit prima die
præter sitim, & fastidiom, & linguae ariditatem,
cardialgia, seu dolor oris ventriculi, præcipue. Iam
enim inde in eam partem ferri excrementa constab-
bat, sed & ex processu morbi nausæ, & vomicio-
nes. Primum enim tantum biliosa, deinde virulenta
biliosa, postremò etiam vomuit nigra fetida. Hic
enim decursus indicabat materiam morbi semper ire
ad deteriore putrescentiam, ventriculum verò
continenter pati, quæ eadem causa fuit, vt postre-
mò etiam singultus magnus superuenerit, signum
adeo lethale, cum extenuatis iam, aut ardente fe-
bre, malignaque afflictis, superuenerit, vt nunquam
me ex hoc signo deceptum meminerim, tametsi ex
eo multos morituros esse prædixissem. Huius etiam

particulæ passio, & materis mala qualitas in causa
fuerunt, vt sudor paucos frigidus circa caput, & alia
extremorum refrigerationes, quæ iam iam morita-
ris soleat accidere, usque adeo anticipauerunt, vt
vel à secunda die inceperint. Nimirum huiusmodi
non fiebat primis diebus, ob extremam naturalis
caloris extinctionem, vt solent, sed per deliquia
animi, similia iis quæ afferre solet cardinalgia, etiam
in oon morituris, ac nonnuquam in nondum de-
cumbentibus. Licet autem, inter cætera, in hac
narratione vires dierum decretiorum obseruare.
Per singulos enim quaternarios videtur semper
morbus denuò ioualuisse, facta semper accessione
deteriorum signorum. Nam quarta, dicit, omnia
exacerbata sunt. Die septimā fuit extrema illa frigi-
ditas sudoris, & totius corporis, quæ plus quam vi-
ginti horas durauit. Nona cepit vomitus pernitio-
sus, virulentus, & biliosus: & inde fetidos, & nigr-
get. Decimaquarta mortua est. Noo sane penuria
evacuacionum. Sed quod nullæ fuerint morbo con-
gruentes, neque concoctionis materis signa fue-
rint vlla. Nam huic fuit per totum morbum alius
humida, & vomitus non paucus, sudores quidam,
& postremo sanguis de naribus. Sed hic morbus
expurgacionem ex vtero desiderabat, hæc alia eua-
cuaciones nihil aliud indicabant, quā multam &
malam materiam à natura coerceri non posse, sed
inuidiam erratico modo, hac & illac effluere.

F

SECTIO III.

STATVS PESTILENS.

*ANus austrinus, pluviosus fuit, & con-
tinua à ventis cessatio facta est. Cum ma-
xima accidissent siccitates in paulo superioris
anni temporibus. Circa Arcturum flante Au-
stro multum pluit. Autumnus umbrosus fuit
& nebulosus cum magna aquarum copia.
Hyems Austrina, humida, mollis. Malis
autem post Solis conuersionem circa æqui-
noctium sera hyems aduenit, & iam prope*

*equinoctium Aquilonares flauerunt venti & A
ninxis non multo tempore. Per rursus Austri-
num, aut à ventis quietum. pluuie multe &
vsque ad Canem continua. Æstas serena, cali-
da, Æstus magni & presocantes. Etesia par-
ua sparsim spirauerunt. Rursus verò circa Ar-
cturum flante Borrea multum pluit.*

Describit statum quandam pestilentem: habet
verò narratio duas partes, primà narratur aeris
intemperies, quæ pestilentem statum fecit; secun-
dà, narratur morbi populares, qui ex ea intem-
perie nati sunt. Fuit verò annus inroger, qui in-
signem habuit intemperiem ab oru arcturi inci-
piens, vsque ad alium eiusdem sideris ortum. To-
tus hic annus fuit austrius, pluuiosus, sine ventis.
Nam et si partes quædam exiguæ eius anni fuerunt
flauosæ, & quædam etiam sine pluuia, tamen
exiguæ partes non prohibent totum annum talem
appellare. Toti enim tribuitur quod secundum omnes
ferè partes conuenit. Proinde primis verbis
summum totius anni temperiem complectens,
dicit status pestilens, annus austrius, pluuiosus
fuit, & continua à venis cessatio facta est. Deinde
percurrit singulas anni partes. Sed quo pacto fuit
annus austrius, si sine ventis? Certè auster est
ventus quidam placidus, & qui sæpe flar leuiter,
vt non videatur rapide moueri aer: dicimus autem
non esse ventos, cum non flant vehementius. Ita-
que quod dicit, est, toto anno fuisse placidè au-
strum, & pluuia multas fuisse, & raras, aut nul-
los venos fortiores. Singulas anni partes percur-
te incipit, dicens: *ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος, ὅτε τὸ αὐτὸν ποιεῖ
ῥηθρὸν ἐστὶν ἡμεῖς*, id est, cum in temporibus su-
perioribus, & proximis anno ei de quo dicimus,
æstas scilicet superioris anni, fuissent siccitates ma-
gnæ, circa arcturum, id est, in vltima parte mensis
Augusti (Arcturus enim oritur vigesima sexta, &
vigesima septima eius mensis, & inchoat autum-
num) flante austro multum pluit. Autumnus
etiam totus fuit vmbrosus, nubilosus, & pluuios-
us. Hyems quæ inchoat ab occasu vergiliarum,
septima scilicet & octaua Nouembriis, fuit austri-
na idem, humida, hoc est, pluuiosa: mollis, hoc
est, sine frigore multo, & ira se habuit ferè tota
hyems. Nam solum post solstitium hyemale, quod
vocat *ἡμεῖς ὁ χειμῶν*, non statim, sed multo post, iam
scilicet propè æquinoctium, quod inchoat ver,
fuerunt ferè hyemes, hoc est, ferè frigora. Ex-
plicans quid vocer feras hyemes, & quo pacto hoc
actum sit, dicit, & iam circa æquinoctium, *ἡ βροχὴ
ῥηθρὰ ἐστὶν ὡς καὶ τοῦ χειμῶνος*. Ver quod ab æquinoctio
incipit, rursus redit ad statum priorem, factum
austrium, sine ventis, & pluuiosum temper, vs-
que ad Canem. Scilicet, durauit illud, totum ver,
quod octa vergiliarum, in fine Aprilis finitur, &
primam æstatis partem, quæ durat vsque ad or-
tum Canis. Æstas serena, inquit, calida, vltima. Æ-
stas (nam dixerat primam fuisse quæle ver), erat
calida, serena, sine pluuia, cum forti æstus, & ete-
sias, quæ illis diebus inordinu spirantes, magni
remedium æstus esse solent: parua fuerunt, &
sparsim spirauerunt. Non tamen diu durauit serenitas:
nam ne per totam quidem hanc postremam
æstatem, quæ ferè quadraginta dierum est; sed iam

B

*Cum autem factus esset annus austrius, &
humidus, & mollis, per hyemem quidem salu-
briter agebant, præter tabidos, de quibus scri-
betur: ante ver autem una cum frigidibus
consecutus eryspelata multa contingebant,
C quibusdam cum, quibusdam sine occasione,
quæ cum essent maligna, multos peremerunt.
Multis fauces doluerunt, voces vitiatæ erant.
febres ardentes cum phrenitide, ora ulcere
feruido affecta, pudendis tubercula, oph-
thalmiæ, carbunculi. Alii turbati, fastidiosi,
quidam autem striculi erant, quidam non.
D Vrina turbata, multa, male reddebantur. Co-
matosi plurimum, & rursus vigiles, morbo-
rum indicationes aut nulla aut difficiles: Hy-
dropes, tabidi multi. Hi quidem morbi popu-
lariter grassabantur.*

Morbo qui ob dictam intemperiem popu-
lariter grassati sunt, nunc colligit, postea de sin-
gulis seorsum acturus. Sed cur incipit narratio
hæc à hyeme? Cur non dicit, qui morbi fuerint
in eo autumno, quo stans ille pluuiosus incepit?
Certè quia illo autumno nihil noui actum fu-
it, nondum enim mutata fuerant adeo corpore,
vt morbos gignerè poterit. Semper enim
necesse est causas externas morbos antecedere.
Autumno ergo illo nihil noui in hominum com-
muni valetudine fuit, sed neque in hyeme
multum. Sed per hyemem salubriter degebant,
præter tabidos, de quibus scribetur postea. Ex mo-
riò sanè tabidi facti sunt multi in hyeme humida,
& austriua. quam autumnus etiam talis, & æstas val-
de siccæ antecesserat. Nam vt in aphorismo 13, tertio
dicitur, si æstas siccæ fiat, & aquilonaris, autumnus
verò pluuiosus, & austrius, capitis dolores per hye-
nem fiunt, & tussis, & rancedines, & grandines,
quibusdam etiam rabes. Sed si hæc omnia in tali sta-
tu per hyemem fiunt, quomodo factum est, vt ex sola
tabe agrotarint in hoc qui describitur? Certè illa
omnia ad eandem affectionem pertinent. Nam capi-
tibus repletis dolores fiunt, inde destillantes succi faci-
ciunt, partim grandines, partim tussis & rancedines,
procedentes verò faciunt etiam pulmonis corrosio-
nes, & hæc rabes. Sed hi, & reliqui omnes morbi, quos
ante ver vna cum frigo ribus consecutus, id est, in po-
strema illa hyemis parte, qua flante aquilone nimix,
dicitur incepisse, metirò in hoc anno acciderunt, fue-
runtque pestilentes; vt prope anno pluuioso, & austri-
no. Nam vt in initio huius operis didimus est, pesti-
lentem statum facit putrescentia aeris, nulla autè in se-
m

perie magis putrefcit aer, ut neque res alia quæ piam, quam calida & humidâ, cuiusmodi est antrina, & pluviola. Atqui quoniam plerique, & pessimi morbi sunt qui ex putredine oriri solent, merito dicit Hippocrates in aphorismo. Ex anni constitutionibus, in summa, siccitates pluviolas salubres sibi, & minus lethales. Sed qui morbi fiant in pluviolis temporibus, quæ sunt insalubriora, & magis lethalia, in aphorismo alio, qui est decimus sextus tertie partielæ, ita dicitur; Morbi per assiduos ventos magna ex parte fiunt, febres longæ, alui deiectiones, putredines, epilepsie, apoplexie, & angine. In his generibus sunt omnes morbi, quos hoc anno accidisse dicit. Nam erysipela cacoethe, & ora vlcere feruido affecta, & pudendorum tubercula, & ophthalmia, & carbunculi ex putredine fiunt, quin & febres ardentes cum phreniæ. Quandoquidem in commentatione alius aphorismi diximus, intelligi putrefcentiam succorum in venis & arteriis, & viceribus, & tumoribus præter naturam, & viris curis. Dolores facium, & vitiatæ voces ad anginas referuntur, alui turbae ut ibidem dictum est, ad alui deiectiones. Hydropes, & tabes videntur mihi referri ad febres longas, vtrumque enim mali genus solent longissimæ febriculæ comitari. Reliqua huius orationis symptomatum nomina sunt, non morborum. Fastidiosi enim fuisse eius tempestates ægrotos, & alios sicciculosos, alios sine siti, & urinas fuisse turbatas, multas & malas, & comatosos fuisse multum, & rursum vigilas, & indicationes sublatas, & indicationes difficles, ad symptomata pertineant: non pathognomonia, sed partim assidentia, partim superuenientia. Sed singulorum causas nos summam dicemus, ut ab Hippocrate narratur. His collecta æstate, ob blandam hyemis temperiem non est extincta, & per hyemis humiditatem sine frigore, oblecta est pueria salua: duplici hoc humore, aut eorum altero putrescente malignè orta sunt omnia. Biliosus enim, quibus bilis ab æstate inest vique tempus retinebatur, consurgente cute vellemus paucorum dierum in frigore, putruit, & ad externas partes pulsâ, erysipela fecit: Fuerunt verb. ex maligna ob malam putredinem. Potest enim quicumque morbus, ut febres quæcumque, & quicumque tumor præter naturam, esse magnus etiam simplicior, aut malignus, etiam minor, illud quidem est in causa facientis magnitudine, ut multo succo, magna vitione; hoc in malignitate, ut malo modo putrescenti. Proinde hæc erysipela fuerunt cacoethe, & multos peremerunt. Quod quidem est fuisse pestilentes morbos. Fauces, & partes circa illas, paratissimæ sunt recipere excrementa cerebri, pulmonis, & ventriculi, in quibus omnibus, per annum humidum, multos succos contineri coecepit. Proinde fauces excipientes fluxiones diluerunt. Deinde cum de partes, ut & genitalis facili putrescant, vocalibus instrumentis, aut aliquibus partium proximarum, quæ vsum aliquem præstant exfissæ, voces vitiatæ sunt. Eandem ob causam fuerunt in multorum ore vlcera feruida, id est nomine male cum magno caloris sensu. Nimirum ex bile aut salsa pituita, malignè putrescentibus in pudendis etiam fuerunt tubercula, in adenosus videbatur partibus circa genitales: ut fauces excipiebant excrementa superiorum partium, ut cerebri & pulmonis: ita genitalia excipiebant excrementa inferiorum, ut renum, & mesenterii, & hepatis. Nam hoc

A initit in vtrasque partes. Febres ardentes sunt putrescentibus in venis bile, aut salsa pituita (nam ex duplici hoc succo ponit Hippocrates duplex febris ardentium genus esse) male autem patientibus capitis, ut flante austro solent (dicitur enim in aphorismo austri caput grauantes) merito ex illis phrenici facti sunt, succo putri delato in caput. Oculis verò excipientibus excrementa capitis, acciderunt ophthalmia, non aride, quales solent fieri in aëquilanibus, sed humidæ, & ex multo succo Anthracis, sunt in pestilentibus constitutionibus, ex sanguine feruente præ maligna putredine, ut in Cranone accidisse proximo libro dictum est. Profluvia alui contingebant præ multitudine excrementorum, & maligna qualitate, & debilitate reneritricis, quam humiditas temperies maxime facit. Quæ eadem in humidis natura corporis faciebat hydropes. Tabidi verò euadebant quidam ex hydropis per atrophiam, quidam ex putrescentia pulmonum, initium capiente à destillationibus. Fastidia mali succi abundantia, aut corruptione facilius in gula, & ore vetriculi sequi, consueverunt, sitis ingens bilem aut salum suum ibidem imbutum: sitis vacuitas per febres, deteriores causas sequi solet, de quibus dictum sæpe est. Urinæ multæ, multorum succorum: turbata, multorum flatuum: male, id est contraria concoctioni signa habentes, male putrescentium succorum erant soboles. Quod comatosi & vigilas alternatè erant, duplicem succi speciem, quam diximus, referebat. Quod indicationes solent & difficles fierent, rationi erat consentaneum, quandoquidem, ut in aphorismo dicitur. Cum non tempestivè tempestiva redduatur, inconstantes & difficles iudicii morbi fiunt.

Hi erant morbi populariter vagantes. Ex unaquaque autem scripturarum specierum, multi egrotabant, & moriebantur plurimi.

E Nisi ex unaquaque morbi specie laborasset multi, etiam si plurimi morbis non eisdem ægiotarent, nulli fuissent epidemiales, sed sparsi omnes: atque etiam si fuissent epidemiales, nisi ex eis morerentur multi, nulli fuissent pestilentes. Quandoquidem aptem fuerunt multa morborum genera, & ex singulis ægrotauerunt multi, & multi mortui sunt, constat non vnicum solum, sed multas fuisse pestes: quodammodo autem etiam vnicam eamque maximam, quæ commune quiddam omnibus erat maligna putrescentia.

Accidit autem singulis horum hoc modo. Multis quidem erysipela accidit cum occasione, ex fortuitis omniæque partium vulneribus. Per totum corpus, maxime autem in quæ sexagesimum circiter annum attingebant: & quidem circa caput, si quid vel minimum negligeretur. Multis autem etiam in ipsa curatione magna inflammationes contingebant, & ipsum erysipela multum, celeriter, & undique depas-

cebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus in suppuraciones vertebantur. Carnium & nervorum & ossium deperditionem magnam patiebantur. Neque autem quæ colligebatur fluxio puri erat similis, sed putredo quadam alia, ipsæque fluxio multa & varia. Quibus igitur circa caput aliquid huiusmodi fieri contigit, his glabries totius capitis & menti accidebant, ossiumque denudationes & prolapsus, & multa fluxiones, hæcque in febribus, & sine febribus aderant: hæc autem magis horrenda erant quàm funesta: quibus enim ad suppurationem pervenit ipsorum maturatio, plurimi horum servabantur. Quibus autem inflammatio & erysipelas evanuerunt, nec ullum eiusmodi abscessum fecerunt, multi horum mortui sunt. Similiter etiam quacunque corporis parte oberravit, ista acciderunt. Multis enim brachium, & totus cubitus defluerunt: quibusdam autem hæc mala infestabant latera, aut anteriorem vel posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem semur totum aut tibia aut per totum denudabantur. Horum autem omnium gravissimum erat, siquid circa pubem & pudenda accidisset. Atque ista quidem contingebant circa vlcera & cum occasione. Multis autem in febribus & ante febres, & post febres, acciderunt. Illud autem habebant, ut quacunque horum abscessum per suppurationem fecissent, si aut tempestiva quadam alui perturbatio aut bonarum virinarum excretio contigisset, per hæc solverentur. Quibus autem nihil horum accidisset, sed temere & sine signis evanuisse, mortem inferrent. Vere igitur multo plures appetiunt quæ ex erysipelate nascantur mala: per assem tamen & sub autumno extendebantur.

Particularim nunc percurrit singula mala, quæ antea summam narraverat, recensens singula eodem ordine, quo prius. Proinde de erysipelate dicit nunc horum etiam primam mentionem fecerat, dicens: Ante ver autem vix cum frigoribus consecutus erysipela multa contingebant, quibusdam cum, quibusdam sine occasione, quæ cum esset maligna, multos peremerunt: Hæc eadem nunc dilatat & explicat. Explicat inquam, cum quibus occasionibus acciderit quibusdam, & quibus partibus, quibus hominibus præcipue, & quæ accesserant illis erysipelatis, & quos exitus habuerunt. Multis quidem, inquit, erysipelas accidit cum occasione, & fortissimis omnino: quæ patuit vlcusculis. Vocat omnino parva vlcuscula eadem quæ & occasiones appellavit. Erant verò hæc causa manifesta, seu occasiones, vlcuscula exguia cutis, ut quæ per vulgarem scabiem sunt, aut pruritus, aut tale quiddam, quæ scalporebus sunt, iniqui præstabant erysipelatis. Constat verò hæc esse, quas vocat occasiones. Nam paulo infra dicit: atque ista quidem contingebat circa vlcera, & cum occasione.

Ergo dicit erysipelas contingebat in quibusvis hominibus ex valde parvis causis, ut vlcusculis, aut pruritu toto corpore, præcipue autem circa caput in sexagenariis. Non quidem arbitror, sexagenarios reliquo corpore liberos esse à morbo, sed (quod erat omnium gravissimum) secundum capita plus alis laborasse, quia, arbitror, sunt excrementosi, & ob naturalis caloris debilitatem facili eis pinna putrescit, sicque falsa. Quo fit, ut familiares sint illis pruritus totius corporis, ut in aphorismo vltimo tertie particule dicitur. Ergo ex pruritu, & scalpore contingebant illis in capitis vlcuscula, & inde erysipela. Hæc verò quibus parum negligebantur, quibusdam verò etiam non negligenter, sed in ipsa curatione, fiebant in medio erysipelatum magne inflammationes, & ipsum erysipelas multum vicique celestiter depascebat. Duplicem exitum dicit habuisse hæc erysipela, quædam abscessus quosdam horrendos, per quos multi liberabantur, fecisse; quædam, ex quibus mortui sunt, nullo relicto signo evanuisse: neque mirum, nihil enim periculosius esse potest, quàm recurrere in id excrementa, periculatur enim omnia membra præcipue, & verissimè erat, si quibus evanesceret, interius retrocedere id, quod iis, in quibus fiebat abscessus, ad exteriora pellebatur. Abscessus verò erant huiusmodi. Verbebantur abscessus in suppuraciones, & putrescentibus, & in pus resolutis partibus: contingebant carni, nervorum & ossium *dentibus puribus*. Er fluxio collecta in vomica, non erat parvi similis, idest bono parti similis, quale fieri consuevit ex bono sanguine, in inflammata particula mediocriter putrescente, sed putredo quædam alia multa & varia, nimirum sanies ex bile collecta & partibus computrescentibus. Er quibus circa caput horum aliquid evenit fieri, glabries etiam totius capitis & menti facta est, putrescentibus radicibus capillorum & ossium nudationes, exsca cute & subiecta carne, & ossium prolapsus. Quasi diceret, computrescebant etiam subiecta ossa capitis, ut particule eorum extraheretur exsca. Er multæ fluxiones, hoc est, multæ sordes, & copiosum virus redudans in affecta parte, & hæc, quibusdam cum febribus, quibusdam sine febribus evenerunt. Erant autem inquit hæc horrenda magis, quàm funesta, quia quibus ad suppurationem pervenit horum maturatio. Coerte ut non erat bonum pus, ita neque bona maturatio, sed qualescumque maturatio, ut qualescumque pus) plurimi horum servabantur, liberatis scilicet interne partibus. Quibus autem inflammatio, & erysipelas (dixerat in erysipelate oriri plegmonas) evanuerunt, repente scilicet, & insperato, ac præter rationem, & huiusmodi abscessum nulli fecerunt, multi mortui sunt. Nimirum ut in prognostico dicitur, & in hoc ipso opere non semeliam vocatū est, erysipelas in toto recurrere periculosum est. Iodiar vero intro recurrens, evanescit. Non tantum autem quibus circa caput oriebatur erysipelas, eveniebat quod dictum est, sed similiter, quibus in alia quacunque corporis parte oberrabat erysipelas (oberrare dicit, quia, ut dictum est antea, depascebat undique & serpebat) multis enim brachii & cubitus defluerunt, quibusdam incidit hæc mala in latera, quibusdam in aliquâ partem in anteriori aut posteriori. Quibusdam semur totum & tibia nudata sunt, & pes totus, quibusdam circa pubem & pudenda erysipes depascebat. Itaque, recte dixerat, quacunque corporis parte, Nulla, n. externarum

non enamerant. Erant autem inquit omniū gravissimū cum circa pubem & pudenda accidisset. Nimirum hae partes sunt putredini valde opportunae: in quibusque ob eam naturam adeo solet putredo serpere, ut cogantur in eis chyrurgi, mox vtrere & secare. Non mirum ergo si in tam maligna putrescente, quibus abscessus, aliis in partibus futuri salutare, in has erumperent, periclitarentur. Atque ista quidem, inquit, contingebant circa vlcera & cum occasione, aliis verò fiebant sine omni occasione, idest nullo vel exiguo prægrosso in cute vitio. Fiebant verò his (ut prioribus etiam) quibusdam cum febribus, quibusdam sine febribus: & quibus sine febribus, quibusdam ante febres, quae postea succedebant: quibusdam post febres, quae antecesserant. Malum autem esse, & cum febre, & ante, & post febrem, quodcumque eorum quae ad cutem erumpunt, constat ex iis quae mihi dicta sunt in commentatione aphor. quinquagesimi quinti quattor particulae. Contigit haec quoque erysipelata, ut priora, si evanescebant sine signo, idest nullo vestigio relicto in parte (quod in puella Polimarchi vituperaverat, sectione tertia libri secundi) neque facta aliqua evacuatione per venterem, aut urinam, aut aliter (quod est praeter rationem evanescere) lethalia esse. Solata autem sunt per abscessum cum suppuratone, ut priora: & quae dā etiam per turbationē alui tempestivam, idest per signa concoctionis accidentem, aut per excretionem urinarum vitium, idest, excrementum cum coherencia & tolerantia, soluebantur. Dicit tandem haec erysipelata, quae vere inceperunt, durasse per totam aetatem & autumnum. Neque mirum, nam & intemperies aëris per totum annum duravit.

Multa autem turbatio quibusdam contingebat, & circa fauces tubercula, & lingua inflammatioes, & circa dentes abscessus. Multaeque voces vitatae & impedita significatio facta est, primum quidem tabescere incipientibus, sed & febre ardente & phrenitide laborantibus.

Cum satis iam de erysipelatis dixerat, ad reliqua properat. Dixerat vero mox post praescripta de erysipelatis verba, multis fauces doluerunt, voces vitatae. Haec nunc explicat, dicens, circa fauces tubercula, & linguae inflammationes, circa dentes abscessus, & voces vitatae, & impeditae. Quasi causa fauces, & partes circum circa laboraverint, dictum antea est. De abscessu in dentes dixeramus sectione prima secundi libri in hac Hippocratis verba, abscessus quibus haec non sunt, sunt velut dentes. Vbi & loci alterius ex illic libri quarti, meminimus. Sed cur dicit, voces vitatae & impeditae significationem praestabant? An quia vitium vocis non semper fuit pathognomonicum, ut fortasse in tuberculis faucium, & linguae inflammationibus, sed in quibusdam, ut signum praeium superueniens, ut in tabidis, & in laborantibus febre ardente & phrenitide. Quod dicit, multa turbatio quibusdam contingebat, & ad priores, & ad eos qui sequuntur, referri potest: turbatio enim Hippo. significat periculum, quod perurbationem & timorem affectu solet agrotis, & iis qui adhaerent.

Inceperunt igitur febres ardentes & phrenitides ante ver post ea quae praecesserant frigora, & plerimi tunc agrotaverunt, & in acutos & lethales affectus inciderunt. Talis autem erat febrium ardentium quae vigeant, constitutio. A principio comatosi erant, fastidiosi, febris acuta, non valde siticulosi, non delirabant. E naribus paucus exibat sanguis. Plerimis paroxysmi diebus paribus contingebant, circa paroxysmos autem obliuio, exolutio, & vocis privatio. Iis pedum & manuum extremitates semper frigidiores erant, maxime autem circa paroxysmos: rursumque tarde nec probe recalescebant & iterum ad mentem rediebant & loquebantur. Illos verò detinebat aut sopor continuus, non somnolentus, aut cum laboribus vigiles erant. Plerimis horum alui turbabantur deiectionibus crudis, tenuibus, multis. Urina multa, tennes, neque indicatorium neque bonum quicquam habebant. Neque aliud quicquam indicatorium ita affectis accidit. Neque enim sanguis bene fluctabat in naribus, neque alius quisquam abscessus eorum qui consuevi sunt, decretorius accidebat. Vnusquisque moriebatur fortuito & inordinatē, plerumque tamen circa indicationes: quidam diu voce privati, multi cum sudoribus. Iis igitur qui sese lethaliter habebant, haec acciderant. Similia verò phreniticis fiebant, atque hi sine susceperant. Neque vehementer insanivit phreniticorum quisquam, ut in aliis solet, sed ex alia quadam gravi ac lenta propensione in somnum, graviter peribant.

Post faucium dolores, & vitatas voces febrium ardentium & phrenitidum meminerat Hippoc. hanc nunc dicit qualia fuerint, primum quidem agens de laborantibus sola ardente febre sine delirio, deinde de phreniticis. Ambo genera malorum (erat verò id quodammodo eorum vnum, succedente phrenitide in multis ardenti febre) dicit cepisse ante ver, cum iam fierent frigora flante Aquilone, & plurimos tunc agrosse. Sed mirabitur quisquam quomodo factum fuerit, ut cum constitutio quae morbosum fecit annum, faceret austera & humida, tunc agrotare comperint, cum ad contrarium mutata est, antea salubriter degentes: cum tunc temporis emendari potius anxi intemperiem, quam augeri, effectus constanter. Tamen id factum est ex accidenti, non quod ea mutatio aëris ad frigidiores excrementa auxerit: sed quod obstructione citius excrementa antea genera cohibuerit, & putrescere fecerit: haec si evenit, inquit, & horum ita evenit, symptoma manifestum, quae autem ea fuerint, deinde percurrit, dicens, erat autem constitutio febrium ardentium quae vigeant, talis: agrosse, idest a principio comatosi erant, ob gravitatem capitis quae Ausser fecerat fastidiosi, ob malignam putrescentiam: horrefiebant, quia familiare est morbis omnibus cum destillationibus in capite,

aut undecunque fluxionibus vagantibus, arque adeo solis catharris circa alios morbos, horrores inordinatos habere. Neque id immetito, si enim certæ fluxiones, & ordine quodam repetentes, ex certis partibus in partes certas, certos & ordine re-potentes faciunt hædiores, & æternæ febres in-certe: & vagæ faciunt incertas. Febris, inquit, ac-
ta, id est acuta ad manum. Nam quod ad constitu-
tionem attinet, omnes ædentes sunt acutæ. Tamen
non valde siticulosi, addit, non delirabant, quasi
diceret, non erant valde siticulosi, etsi non delira-
rent. Si enim delirassent, non mirum si fuissent sine
fieri, tamen citra delirium & cum febre acuta, satis
præter rationem, ac proinde etiam malum. Signifi-
care enim poterat naturæ corruptionem, tamen in
his non propter illud ad malignæ causam debere referri:
sed ad multo humiditatis redundantiam, quam affi-
due pluviz illius anni pepererint. E naribus paucos
exibat sanguis, quod recuperatum sæpe ab Hippo-
crit: nimirum, vicalia quævis evacuationis tentata, &
ut propriam capitis abundantiam representans, aut
raprum humorum in illud. Omnia verb quæ gra-
uitatis capitis signa sunt, erant austriacæ constitu-
tioni congruentia. Quod patoxyfmi contingerent die-
bus partibus, malum esse, & quam ob causam, di-
ctum est mihi tertia sedione primi libri huius ope-
ris. Graves admodum fuisset paroxysmos, sympto-
mata sans indicabant. Per paroxysmos enim, inquit,
oblivio, exolutio, & privatio vocis. Oblivio iam
ob mentis alienationem, non enim ob abolitam me-
moriam, cum id frigoris sit. Exolutio & privatio
vocis, deliquit animi erant: idque debilitatis calidi
imati, vt & illud etiam atque adeo multo magis,
extremas manus, & extremos pedes frigare semper,
maximè verb circa paroxysmos, & tardè nec probè,
id est non satis recalcere. Sed quo pacto, si sem-
per hæc erant frigida, aut saltem subfrigida, erat
febris acuta ad manum? Certè secundū ventrem, &
costas. Rursum, inquit, intelligebant, & loqueban-
tur, insinuant, illam oblivionem esse non intelligen-
re. Non iam delirare [dixerat enim non delirabant]
sed velut mentis stupore teneri, ac proinde artoni-
torum modo, neque æminisse, neque loqui: dis-
positio catæphæ similis. Tanto opere laborabant ea
tempestate capita: quod id etiam quod addit, indi-
cabat. Detinebat, inquit, eos, aut coma perpetuum
non somnolentum, aut erant vigiles cum doloribus.
Id est, nisi dolore aliquo excitarentur, tenebat eos
coma vigilans vocatum, hoc est, passio media inter
coma altum & vigiliam. Fit verò id à causa etiam
media ex bile & pituita, quos duos succos merito
per illam tempestatem redundasse, nuper indicatum
est. Erant his multæ evacuationes intempestivæ, ni-
hil consentientes: quod redundantia maxime est, &
vt in inconstantibus temporibus solent, inconstan-
tes morbi fieri: per quos neque moriendi dies cer-
tus erat, vt solet, aut ob certam morborum con-
stitutionem, multis idem iudicium certum omnia. Proin-
de dicit, atque turbabantur plurimis horum, deiectioni-
bus etiam, tenuibus, multis. Venit etiam ventres
tuitæ, neque indicatorium neque vile quiddam
habebant, id est neque tollebat, neque subleua-
bant morbos. Neque aliquid quidpiam indicatorium
ita affectis consuebat. Indicatorium scilicet indi-
cans, nam quæ indicatorium non iudicantia ille vo-
cavit, libri secundi prima ledione, multa appa-
runt, indicantia autem, non: quia neque sanguis
bene fluxat, neque alius quidpiam abscessus, eo-
rum qui confecti sunt, decretorios accidebat. Mo-
riebatur quicunque, & non inordinatè id
est incertis diebus, plerumque autem circa iudi-
cationes, id est cum aliquibus evacuationibus. Hæc
enim etsi non iunent, immo, verò etsi ledant, iudi-
cationes aliquando appellantur, tamen id nomen
de bonis dicitur antonomastice, quo sensu ante de-
xerat, nihil habentes indicatorium. Sed certe non
minus mors quam salus solet ægrotis cum evacua-
tionibus subrepere, vt his qui circa evacuationes
morebantur, quidam in aliis evacuationibus, mul-
to antè, quam morentur, privati voce, quidam
lodites. His igitur, inquit, qui lethaliter se habebant,
ex solis scilicet febribus & cutis, acciderunt hæc. Si-
milia autem, inquit, & phrenitica, sine fieri autem
hi erant, priores dixerat non valde siticulosos, hos
qui delirant fuisse sine fieri omnino. Neque mirum
nā si qui sine delirio erant, non erant valde siticulosi,
quo pacto allevati mente percipissent passionem,
aliquilem, cum vin aphorismo dicitur, quibus
mens ægrotat, etsi dolendi causam habeant, passio-
nem non sentiant. Sed quod est illud enigma quod
addit, dicens, neque phreniticorum insaniuit quis-
quam? Quia pacto erant phrenitici, si non insani-
bant? Certè non dicit id simpliciter: sed, neque
phreniticorum insaniuit quisquam, vt in aliis: ita
aliis scilicet phreniticis, qui vigiles & loquaces, &
inquieti, & aperte delirantes sunt: sed cum grani ac-
lenta in somnum propensione, grauit peribant.
Vocat vero, vt cum aliis tum vel maxime toto hoc
opere constat, phreniticos, non eos solū, quibus
calidis excrementis abundat catæphæ: sed vt cum-
que alienatos mente, in quibus sunt etiam lethargici,
& typhomania laborantes. Sed de ardente febre
& phrenitide bre.

*Vigebant insuper alie febres, de quibus
scribetur.*

Cum morbos summam colligit, febrium ar-
dentium solū meminit, quamquam non illis solis
laboratum est, neque consentaneum, nam vt in
aphorismo tertie particulæ quem citamus dic-
tur, longæ febres familiares sunt pinniosis tempe-
statibus, quæ non solæ ardentes: proinde quasi
aliatum febrium antea oblitus, obiter, & velut
aliud agens, nunc eas etiam viguisse dicit, ædentes
de eis postea, suo loco.

G
Oram multa aphidis affecta fuerant & ulce-
rata fluxiones multa circa pudenda, ulcera-
tiones, tubercula fori & intus, quæ circa in-
guinæ erant, Ophthalmia humida, longa, den-
tata cum doloribus, eruptiones palpebrarum
fori & intus exoriebantur, quæ multum oculorū
aciem corrumpent, & sic nominant. Erum-
pebant autem & in alijs ulceribus multa, & in
pudendis, & carbunculi multis per æstatem, &

alia quæ putredinis nomine donantur, exanthemata magna, herpes multus magni. Circa alium autem multus multa & noxia acciderunt, primum quidem tenebris multum cum dolore, plurimis vero puerulis, & pueris impuberibus, eorumque plurimi peribant. Lienterici multi, dysenterici, neque hi admodum moleste sese habebant. Biliofa autem & pinguis, & tenuis, & aquosa excernebant, multus quidem ipse morbus eo decubuit, & sine febribus, & in febribus, cum doloribus tormina & voluuli maligni, multorum quæ inerant & suppressa erant, exitus: nec ex euntia dolores soluebant, & his quæ offerebantur agræ cedebant. Nam purgationes multos ladebant, multi autem eorum qui ita se habebant, citò moriebantur, multi autem diutius vivebant. Ut autem summam dicam, omnes quæ & longius & acutius morbis tenebantur, ex alui affectibus maxime moriebantur, omnes enim alius sustulit. Omnes autem in quos eadem tunc incidi, præter morbos antea scriptos, etiam cibos fastidiebant. Multi autem, maxime hi ipsi, & qui ex talibus aut alijs morbis laborabant, & qui lethaliter sese habebant, alij quidem siticulosi erant, alij autem non. Nec ullus eorum qui febribus & alijs afficiebantur, potum intempestivè sumpsit, sed quoad potum instituerè victum quem velles, licebat. Urina autem multa prodibant, ingesto quidem potui non respondentes, sed multum superantes. Multiplex autem erat ex euntia urinarum vitium, neque enim crescitiam, neque concolitionem habebant, neque per eas vitale quicquam expurgabatur. In multis enim probe per vesicam purgationes conferunt. Plurimum autem colligationem, & turbationem, & dolores & indicationem nullam significabant. Comatosi autem erant præcipue phrenitici, & qui febribus ardentibus laborabant, sed & in alijs omnibus morbis maximè, qui cum febre contingebant. Plurimos autem omnino aut sopor gravis comitebatur, aut tenues & exigui somnos habebant.

Hæc quæ habere psecutur, ut ipsemet monet, quibusdam cum febribus, quibusdam etiam sine eis accidebant, atque adeo quibusdam cum ardentibus, quibusdam cum alijs, de quibus mox scribetur. Atque adeo omnia hæc mala, quorum in hac constitutione fit mentio, alia cum alijs complicebantur, etiam quædam cum quibusdam magis, & hæc est causa quæ Hippocrates videret repetitionibus quibusdam vel, quas nisi quis quod dicimus intelligat, putabit esse inutiles. Nam vel nunc dicit, quod & antea dixerat, comatosos fuisse phreniticos, & febre ardente laborantes. Sed antea de ipsis febribus & phrenitidibus agebat seorsum, nunc alia, quæ sine eis in quibusdam contin-

gebant, in quibusdam autem cum eis, vult in memoriam revocare. Cur internæ partes oris, & pendenda, & laxæ partes inguinum, per succorum putrescentiam, facilius quam aliæ partes, ulcera, fluxiones, & tubercula, interioribus & exterioribus contrahant, dictum antea est. Dictum est etiam oportuisse ophthalmias humiditas esse, per hanc tempestatem pluviuosas & Austrinas, non aridas, quales per Aquilonares fieri solent. Constat verò, eas quæ ob humiditatis abundantiam sacre humide, statim debuisse esse longas & diuturnas, ac cum doloribus. In diuturnis autem & concoctu difficilibus ophthalmiis, multorum malorum periculum oculis impendit. Nam vngues, leucomata, suffusiones concretæ, rixæ, hypopia, cataractes, & alij multi abscessus fieri solent, à quorum quibusdam visio, ab alijs oculis etiam corrumpitur: velut nunc fiebat fucus, hoc est tubera quædam carneæ, fucus ob figuram vocata, quæ in ulceribus, ut ipsæmet ulcerata caro rotunda, subdura, subtrusa nascuntur. Oriuntur verò magna ex parte in capite, ut auctor est Paulus cap. 3. libri 3. sed & in reliquo corpore, quod & hic dicit Hippocrates. addens, erumpere autem & in alijs ulceribus. Multi in pendendis carbunculi per ætatem nascuntur, & ulcera alius ex euntia, & serpentina, quæ ob id vocantur ætæ, id est serpentes. Nimirum carbunculi vrendo sanguine & fervente fiunt. Ulcera illa ab atra bile acerrima nimirum sunt cancri ulcerati: ætas verò tales succos maxime parata est gignere, & ea corporis pars omnem malignam putrescentiam maxime parata recipere, eadem prorsus ratione quæ erysipela, de quibus multa iam dicta sunt, fiebant exanthemata magna, & herpes magni multis. His dictis de malis quæ in cute efflorescebant, transit deinde ad ea mala quæ ex alno particubantur ægroti, quæ omnia cum summarum mala omnia colligeret, dixit alui turbationes nunc hæc explicans, dicit, circa alium autem multis multa & noxia acciderunt. Primum quidem tenebris multus cum dolore (magno intellige, nam sine omni dolore nulli accidit) plurimis verò puerulis, & pueris masculis, denique usque ad pubertatem quæ pueritiam finit, & adolescentiam inchoat: fortasse humida natura, in humida constitutione præcipue, patiendi occasio fuit. Acciderunt etiam lientericæ, dysentericæ, & diarrheticæ quæ sunt tria genera deiectionum morbosarum. Neque dysenterici fuerunt cum magno dolore intestinorum, ut solent, quia arbitror multitudo humiditatis mordentem qualiter habebat. Diarrheticæ verò fuerunt nuchiliporum, & pinguium, & tenuium, & aquosorum, aliquando cum his, simul exantibus deiectionibus variegatis, aliquando seorsum. Biliofis quidem ex eius ineci redundancia pinguis ex colligatione: tenuibus, & agnolis, ex crudis & petuitosis. Multis quidem inquit, morbus eo decubuit, & sine febribus & cum febribus pariter morbus, id est cum doloribus intestinorum. Nam dixerat antea erysipela illa boerenda, quæ nunc cum febribus nunc sine febribus accidebant, aliquando soluta per alui turbationem, iam verò per febres turbatas fuisse alios, planissimè dictum etiam iam antea est. Sed cum de dysentericis dixerit, neque hi cum magno dolore, quo pacto dicit decubuisse morbos ad alium cum dolore? Certè dolores dysentericorum, qui ex intestinorum exfione fieri solent, fue-

rootesigui: alii vero dolores intestinorum, vt tormina & voluosi, magni, & maligni. Maligni erant quod periculosi, quod inde maxime deprehendebatur, quod non soluebantur euacuationibus. Multorum enim, inquit quæ intant, & suppressæ erant, fiebant eritus & exentia dolores non soluebant, & iis quæ offerebantur, medicamentis scilicet expurgantibus, ægrè cedebant. Ægrè cedere dici poterant, aut quod non erient dano pharmaco, aut quod exentia nobis prodessent: nam purgationes plurimos ladebant. Certè granissimum signum est in quouis morbo, nihil prodesset, neque quæ sponte fiant, neque quæ arte tententur. Pharmaca vero non raro ledunt in morbis pestilentibus, qui conuocant malignos succos versus eor, & in os ventriculi, nisi mox in iunictis & turgentibus succis exhibeantur. Neque sanè nisi raro in talibus spontaneæ alui fluxiones viles sunt, accommodatiores enim sunt euacuationes, quæ ex alto corpore in eum erocant, & tales etiam sunt arte procurande: vt euacatio ad eum per fustiones, euertibule cum scarificatione adhibita, & prouocatus sudor, cum tamen ob hæc negotia antecedere debet missio nem sanguinis, ac si res erigat, expurgationem turgentium. Maximum vero appetitum expurgationis, hypochondriorum inflammatio. Hoc autem quod dicimus ex hac tempestate licet agnoscere, nam inquit, eorum qui ita se habebant multi quidem cito moriebantur, multi autem etiam diutius vivebant, vt autem in summa dicatur, omnes & qui longi & qui acuti morbis tenebantur, ex alui affectibus moriebantur precipue, omnes enim alui sustulit. Repetitione significat Hippocrates se velle, vt hoc velut notari dignissimum consideremus, quid etiam aliud erat dicere omnes ex aluo moriebantur, quàm omnes alui sustulit? His dictis de alui turbationibus transit ad alia quorum erat facta mentio, ea verò diximus esse symptomatica potius quàm morborum species, fastidium scilicet, sitim, & vrinæ copiosas. Proinde magna diligentia explicat, quibus morbis illa acciderent. Omnes autem, inquit, in quos equidem tunc incidi, præter morbos antea scriptos, etiam cibos fastidebant. Nimirum Hippocrates multas vrbes, quo & iofulas multas perlostrabat. Non enim vt ridiculè quidam Lusitanus interpretatur, id dicit, quod ipsemet Hipp. illis omnibus agrotauerit. Quis enim id diceret, nisi leuissimus? Multi autem maxime hi ipsi, id est maxime autem multi cibos fastidebant qui laborebant ex aluo, & qui (inquit) ex talibus, vt qui et non precipue ex aluo sed febre laborarent, fluxiones alui habebant (nimirum quibus vt eoque semiebantur mali succi tepe ad ventrem) & ex aliis autem morbis fiebat fastidiosus, qui perniciosis affecti erant. Nimirum fastidium maximum magnam casum facularum significat. Sitis, non perinde ac fastidium omnes agrosos tecebat, sed alij quidem erant siticulosi, alij autem non. Qui laborabant cum febribus, illi omnium maxime fiebant, quoquam neque illi omnes ægrot. Eorum autem qui in febribus, & aliis eiusmodi, in phrenitide scilicet, nullas potum intempertate sumptis, sed quod potum victum institueret quem velles licebat. Diuturni etiam antea erat, bosnoo fuisse siticulosos, & quæ causa. Vrinæ dicit fuisse multas, & potum

A multo excessu superantes, initium fortasse diabeticæ passionis, quæ, vt in aliis solet, ex renum calore, & omnis potu incipere, ita inus incipere ex renom ardore febrili, & multa humiditate, ob anstiliatum in corporibus redudante. Multiplex autem dicit fuisse in vrinis vitium, quia oque vt signa, neque vt cause booi aliquid habuerunt. Quia neque crassitatem & concoctionem præ se ferebant, vt inde boni aliquid significaretur, neque his humores purgabatur, vrita saltem aliquid corporibus conferrent. Itaque neque bonam significationem præstabant, neque conferentia euacuabantur, vt sapienter solet. In multis enim probæ per veticam purgationes conferunt. Hoc est, nam multos sunt expurgationes viles per vrias, præstareque talis expurgatio bonam significationem morbi integre soluendi, & hominis ab abcessibus, & aliis morbis liberandi. Merito profecto Hippocrates vrus hic est occasione laudandi euacuationem per vrinam: quia morbis quam plurimis est accommodata. Rati enim morbi oobis curandi contingunt, qui non sunt in genere febriom putridatum, quæ omnes causam præcipuam habent in vehis & arteris, vnde vrina destituit, quæ decretorie excretur. Nam quotidianis mictio, ex potu est nondum distibuto. Congruit verò per vrinam purgatio reliquorum etiam morborum maxime patti, nam conuenit morbus vesicæ, renum & hepatis patti gibba. Hepar verò, vt bene se habet bonorum succorum præcipua causa plerunque est, ita etiam malorum, quam male afficitur. Sed & alii omnes morbi, quibus causa proxima intra venas non est, habent tamen ibi causam quam vocant antecedentem, quæ velut radix proximæ, & per eam morbi, plurima mictione solui possunt. Merito ergo in multis purgationes per vrias viles sunt. Quæ causa ego soleo, hac in te Galenum imitatus, omnes ferè morborum ex materia pendunt curationes diureticis finite. Non autem, quia in omnibus possunt, & solent esse viles, & bonæ significationem præbere, necesse est vt semper adsit, & ea præteor, sed tunc solū, cum siustaculate expultrice eò excrementa pellem. Cui verò præ mala vétris affectione, quod dolores significat, aut præ corporis colloquatione, aut ob malignam qualitatem succorum facultate non potente reuocare, ledunt & malam significationem præbent, vt borum plurimis significabant colloquationem, turbationem, & dolores & indicationum sublationem. Nam vbi copiosa aliqua & noxia euacuatio adest: ea quidem non iudicat, & alias indicationes fieri prohibet. Comatosi autem erant precipue phrenitici, & qui febribus ardentibus laborabant. Ita quoque antea dixerat, neque insinuit phreniticorum quicquam, vt in aliis, sed alia quadam graui ac lenta in somnum delatione moritur peribant. Addit vero, & in aliis omnibus morbis maximis, qui cum febre continebant. Nimirum omnia mala eius tempestatis dixit fieri aliquando cum febribus, etiam quidam eorum sine febre etiam aliquando: vt neque ergo essent grauiora mala & cum febre, erant etiam comatosi. Plurimos autem, inquit, eorum qui hoc anno agrosauerunt, omnino aut grauis sopor comitabatur, aut tenues & exigui somnos habebant, id est, habebant coma vigilans.

Multa autem alia febrium genera populariter vagabantur, tertiana, quartana, nocturna, continua, diuturna, erratic, fastidiosa, inconstantes.

Omnia febrium putridarum genera populariter vagata sunt, nam continua, & intermittentes, quæ tertianæ, quartanæ, & quotidianæ, & erraticæ, & acutæ, & longæ, & malignæ, & inconstantes. Sunt vero hæc omnes febrium differentie, neque secundum unam solum, sed secundum multas partitiones. Nam secundum figuram sunt hæc, febres continuæ & intermittentes, æque intermittentes tertianæ, quartanæ, quotidianæ, & erraticæ; secundum constitutionem acutæ & longæ; & rursus constantes, & inconstantes; secundum morem, simpliciores aut malignæ. Inconstantes enim sunt, quæ illegitimas habent constitutiones, & non recipiunt diebus legitimis legitimis mutationes, ac proinde sunt iudicatu difficiles. Intellegit vero nomine nocturnarum quotidianarum, quotidianæ enim sunt, ut primo Epidem. sect. tertia dicebatur, nocturnæ aut diurnæ. Non refert autem parum, hæc sint aut illæ, quia ut illo loco Hippocrates dixit, neque æquæ longæ, neque æquæ periculose sunt, sed diurnæ nocturnis deteriores. Proinde voluit Hippoc. hic vno nomine dicere fuisse quotidianas, & quales fuerint. *Audius* nomine intellexit malignas, quia magnum fastidium, vnum quoddam accidens est eorum, quæ maxime possunt significare morbi malignitatem. Omnes ergo ex genere putridarum febrium, & omnes malignæ, & inconstantes. Nam circitus quartanis longiores, ut quintanarum, & septimanarum, rariore sunt in febribus. Ut non opus fuerit, si dicti tres circitus febrium eo anno erant, illos etiam fuisse. Sed miror Galenum censere, quod de illis febribus loco citato ex primo Epid. dicitur, non esse Hippocratis, quia hic nullam quintanarum aut septimanarum mentionem fecit. Quasi vero hic omnes febrium differentias persequi statuerit, ac non potius narrare quæ acciderint illo anno; aut quasi necesse sit febrium omnia genera, quæ omnino sint, eo anno grassata esse. Nō est sane necesse, etiam si omnia quæ nō sunt rarissima, populariter vagata sint, neque sanè citra causam. Nā calor bilem vitæque humiditas pituitam peperit, in tribus autem his generibus sunt febres omnes putridæ. Malum autem motem maligna putrescentia fecit; inconstantiam, quod non fuerit tempestiva & constans temporum anni temperies.

Omnes autem hæc cum multa turbatione contingebant, alii enim plurimis turbabantur cum horrore, sudores nihil decernebant, & urina præscriptis similes erant. Plurimis autem eorum hæc erant diuturna, neque enim qui ipsis contingebant abscessus, ut in aliis, decernebant. Omnia quidem difficulter indicabantur omnibus, vel nullo modo indicabantur vel producebantur, his vero multo maxime. Pauci horum vero circa octogesimam dicuntur

A iudicium contigit, plurimis autem ut contigit, defecerunt. Moriebantur horum pauci ex hydrope erecti & stantes & multos etiam in aliis morbis infestabant tumores, multo autem maxime tabidos.

Turbationem cum sine addito dicitur, significare periculum dictum iam est, dictum etiam alii profluvia esse in malignis febribus periculosa. Dicit ergo omnes dictas febres cum multo periculo fieri, quia alii plurimis tuchata sunt. Sed quia dictum est antea fuisse inconstantes, necesse est fuisse difficilius indicationis, hoc verò est, euacuaciones omnes esse non indicatorias, aut saltem non bene indicatorias: quare merito fiebant sudores non indicatorii, id est non soluentes febres. Sudores certè ob pluviosam anni tempestatem; non indicatorii, ob malignitatem morborum. Urina, inquit, præscriptis similes erant. Significat verò illud *ὑποκρίματα*, id est scriptum est, hoc loco & multis aliis; quod antea scriptum est. Erant ergo urinae multæ potum superantes, & neque coctionem, neque excretionem vitalem habentes. Hæc vero tandem causam habebant, quam sudores. Longa ergo mala fuerunt plurimis horum, hoc est ita febriquantum, quia abscessus qui contingebant his non iudicabant, id est quia euacuaciones (has enim vocat plerumque Hippocrates abscessus) non soluebant febres, neque dieliones scilicet, neque sudores, neque urina. At verò ut dicitur aphorismo 56. particula 4. Febriquantum sudor obortiens febre non remittente, malum. Moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. Aliarum euacuacionum est eadem ratio. Merito ergo dicit fuisse longa mala, quia euacuaciones non conferebant, ut in aliis solent. Horrores etiam, ut & rigores, indicationes tentatæ erant, & præterea passionem oris ventriculi sequi poterant. Omnia, inquit, difficulter iudicabantur omnibus, vel nullo modo indicabantur, vel producebantur, his verò multo maxime, febriquantibus scilicet his febribus. Iudicabantur vero horum pauci circa octogesimam, quia in affectionibus diuturnis habent magnam vim quadragenarius dies, octogesimus verò absoluit duos quadragenarius. Plurimis autem defecerunt febres ut contigit, id est in octidies diebus, quod etiam ad inconstantiam febrium pertinebat. Horum pauci enadebant hydrofici, & recti obambulantes moriebantur. Neque solum, inquit, in his, sed in aliis morbis infestabant tumores, id est, hydropes; multo autem magis infestabantur hydrope qui tabescebant, per debilitatem scilicet facultatis concoctricis.

Maximum autem & gravissimum morbum fuit tæph & multos occidit. Namque cum multis circa hiemem incepisset, partim hi decumbebant, partim erecti ambulabant. Ante ver autem moriebantur plurimi ex decumbentibus. Nulli autem aliorum cessauerunt tussis, sed per astatem remisierunt, sub Autumno autem decubuerunt omnes & multi interierunt: diu autem eorum multi egrotarunt. Horum igitur plurimi ex his requirere laborare cepe-

tunt, frequentes erant rigores, sæpe febres continuæ, acutæ, sudores in tempestivum, multi frigidi perpetui, multum refrigerabantur, rursusque vix incallescabant, alii variè substituerunt, rursusque citò humectabantur, & omnia quæ circa pulmonem erant per inferna distribuébantur. Copia urinarum non bonarum, colliquationes mala. Tussis autem inerant usque ad finem multæ, & multa colica & humida educcent, non admodum cum doloribus. Quod si etiam aliquantulum dolerent, admodum leniter purgatio ex pulmone procedebat. Fauces non admodum mordebantur; neque sanguines quicquam infestabant. Viscida tamen & alba & humida & spumosa multa à capite descendeant. Longè autem maximum malum & hos & alios comitabatur cibi fastidium, ut antea scriptum est. Nam neque potum neque cibum libenter sumebant, sed prorsus sine siti degebant, gravitas corporis aderat, & sopore detinebantur. Plurimi eorum tumeant & in hydropem eadebant, horrebant & circa mortem delirabant. Species autem tabidorum erat ex iis qui glabri erant, subalbidi, pituitosi, subrubri, castos habentes oculos, alba pituita referti, si quibus scapula alarum instar eminebant, mulieresque eodem modo se habebant. Melancholici item & subsanguinei. Febres ardentes & pbenitides, & dysenteria his accidebant, tenses in iunioribus pituitosi; longa diarrhæa, & acres deiectiones & pingues biliosæ.

In prima morborum narratione, quæ brevitè omnes morbos qui illa tempestate fuerunt, complexus est, omnium vicinum meminit tabis, dicens *phlogistis morbus*, non sine quod leuissimum malum, aut nemine commune fuerit, fuit enim, ut dicit, tabes maximum & gravissimum malum, & occidit multos; sed quod morbus is diutius quam alii, productus sit, ultra totum illud annum, partim incipiens à principio, sed sola tussi & destillatione, ut fieri solet, partim capiens initium ex acuto aliquo morbo. Atque adeo omnes, quinon sunt acutorum vi sublati, sed diutius vixerunt, videntur mihi facti tabidi ex acutis, ut aliis etiam à tussi sola & destillatione tabidis factis, acuti morbi accedebant, usque adeo omnia contigit eo anno complicari. Dixerat in principio totius narrationis, per hyemem quidem salubriter agebant, præter tabidos de quibus postea scribetur. Hinc nunc redit, & præstans quod promiserat, de solis tabidis seorsum scribit, ad illam hyemem reuocato sermone. Multi, inquit, ceperunt byeme reborescere, non tamen omnes æquè grauitè, sed quidam eorum decumbere cogeantur, quidam uero, sed erecti ambulabant. Decumbentes, quique grauitè affecti erant, plurimi moriebantur ante ver, postremis scilicet byemis diebus, quibus uinxit, & haui boetas, quia, ut in aphor. 17. sectionis 3. dicitur. Boreales constitutiones, si circa thoracem aliquis dolor prius sit, magis affligunt, non autem dolorem so-

lùm, sed eadem ratione morbum quemtuncque rhoracis angit Boreas, quare qui graui tabe tenebantur, non immerito hac mutatione temporis mortui sunt; nulli uero aliorum qui non decumbebant omnino cessauit tussis, sed remisit plurimis per æstatem, quia scilicet, cum æstas esset serena & siccæ, minuebatur destillatio. Sub autumnum autem, hoc est postrema parte æstatis, ac prope autumnum, cum rediit boreas, omnes decumbebant, & eorum multum etiam moriebantur. Neque mirum eos, qui primam aeris ad borealem conuersionem sustinere poterant, secundam non sustinuisse, sed aut mortuos esse, aut saltem decubuisse, & per longum tempus deinde ægrotasse. His uero qui longum tempus ægrotarunt, quid eueniret facilius quis intelligat. Nam quod crebris solet, cum longa scilicet tussi, & putida excretionè, lenta extenuatio. Cæterum quod euenit iis qui tam grauitè ægrotarunt, ut eadem byeme quæ ægrotare ceperunt, mortui sint, opere præcisè est audire. Proinde ad hos rediens dicit. Ceperunt igitur horum plurimi ex his laborare repente (repente enim dicitur malum incipere, quod breuissimum quidem solet sit summum) ergo dicit plurimi horum repente ceperunt laborare, ex his, seu cum his quæ sequuntur. Rigores crebri, quales scilicet fieri solent ex catharris dictum à me antea est. Sæpe febres continuæ acutæ: Id est erratico modo accidentes febres continuæ, & satis ardentes, quales fieri solent excrementis per partes putrescentibus, aut fientibus in pulmone supurationibus: sudores in tempestivum, significantes scilicet nimiam extremitatum abundantiam, qui deteriores etiam erant, quod multi, frigidi usque ad finem malorum contingebant. Frigidi enim sudores sunt, aut quod valde cruda sint, quæ abundant excrementa, aut ob calidi innati debilitatem. Ad quam etiam causam refertur, quod erat multa extremitatum refrigeratio, & rursum vix recallescabant. Alii variè substituerant, humida esculentorum parte eunte in caput & pectus, aut declinante in vias, quæ multæ erant, & rursum celeriter humectabantur, regurgitante succorum multitudine in aluum, & omnium eorum quæ circa pulmonem, distributione deorsum facta. Neque est quod hic labores, dubitans, quibus vis de pulmone in venter abire possint faccinatura enim ipsa inuenit sibi vias, ut in hoc ipso opere dicit Hippocrates, & ut alibi dicit, omnia conflabilia, & per pauci admodum abscessus sunt, qui per manifestas vias sunt, præ iis qui per occultas. Atqui Hippocra. non ea solum, quæ in ipso pulmone sunt, dicit in aluum distribui, sed quæ circa pulmonem in capite & thorace. Ut ego quæ fertilitatem faciunt, ad aluum inclinare solent, ita & quæ circa pulmonem, sed & iis quæ intra ipsum pulmonem conuoluuntur, manifestas vias esse ad aluum & vesicam cap. 4. lib. 6. de locis affectis, Galenus indicauit, per arteriam scilicet venalem, & cordis finistram ventricularem, sed & per venam arterialem & dextram ventricularem & venam celiacam, & hepaticam & mesentericam. Itaque nullo modo hoc admirationem habet. Illud solum oportet meminisse, tales fluxiones phrycicas non solere esse viiles, quia ut aphorism. 14. sectionis quintæ dicitur. A tabe habito diarrhæa superueniens, letalis. Næstæ, inquit, *super diarrhæa*. Multitudo enim humiditatis anni illius augebat vixæ copiam, & symptomaticè exercebatur vi caloris colliquantis. Quare colliquationes

malis significabat, magis quam indicationes. Tussis inerat mulierique ad finem, neque enim poterat aliter fieri, malè putrescente pulmone. Educabant multa, concocta, id est suppurata, & humida, id est fluxilia quod quidem fiebat ob nimiam humiditatem & putrescentiam circa pulmonem, atque quia è pulmone affectio educitio fiebat, non admodum cum dolore, quia pulmo exiguo sensu ac ferè nullo præditus est. Quod si aliquando doleret tangente corrosione membranam qua vestitur, statim leniter facile scilicet, & expedire ac sine dolore purgatio procedebat: quæ tamen ob nimiam redundantiam quam annus attulit, non fuit satis ad perpetuandum. Atque quoniam in tanta multitudine non poterat, quo à acre, & mordax, non esse contemperatum, & diluunt, fauces non admodum mordebatur ab æribus, neque à falsis. Dictam autem multitudinem aperire indicabant, quæ è capite descendebant, viscida quidem, & alba, & humida, & spumosa, multa. Pituitosa scilicet & statu permixta, qualia peperisse erat consensantium pluvias & Austri. M. Hic enim fatus caput replet, ibique moram trahens, & cum pituitosis se admiscens, spumosa facit è capite descendere. Longè autem maximum malum inquit, comitabatur hos, & alios omnes eius anni ægrotos, *ἡ δὲ ἀσθενεία*, id est ut antea scriptum est, cibi fastidium, idque non qualecumque, sed maximum, per quod neque cibos, neque potus libenter fumebant: sed prorsus sine siti erant. Cur non dicit sine fame? Quia certe id dictum erat, cum d. *ἄσθην* fastidium, poterat autem esse fastidium cum siti, non erat tamen, sed fastidium, quod facultatum omnium, & scilicet in ventriculo corruptionem indicabat. Erat præterea grauitas corporis, & ægroti comateli ob dictas iam causas, ac fortasse etiam iam prope mortem constitutus, ut fieri solet, tabidis ob debilitatem, facultatis, & impotentiam vigilandi, coma sitiat. Plurimas ipsorum accidebant tumores, ventris scilicet, & (hæc est particula declarativa) ad hydriopem deveniebant, collecta è multa, quæ per totum corpus redundabat, humiditate. Iuxta mortem iam, horrebant & delirabant. Horrores debilibus facie facile poterant Boreales flatus, qui & sustulerunt. Deliria horum, vacillationes mentis sunt, naræ ex debilitate. His dictis de his qui intra hyemem mortui sunt, narrat qualis fuerit species, seu facies tabidorum omnium eius anni. Talem vero fuisse qualem esse tabidorum, in hydriopem ob pituitæ redundantiam abeuntium, consensantium erat. Lævis scilicet & subalbida: non enim alba, ut nix aut papyrus, sed ob caloris debilitatem inter mortuum quædam candorem, & cineritum referens: & pituitula tota scilicet, qualis pituita redundante fieri solet. Erant denique leucophlegmæ tumide. Adde, & subrubra, fortasse eadem facies erat reliquis partibus subalbida, & maxillis subrubra ob calidam passionem pulmonis. In multis enim tabescentibus, id vidimus, aut fortasse alii erant albi, alii subrubri. Fugunt enim subrubri, quibus forma melancholica & sublinginea, de quibus mox dicitur. Dicit fuisse tabescentium, patetque hydropicorum faciem charopam. Quod haud dubie ad oculos pertinet. Explacatum vero iam est sectio quinta libris secundum illa verba enartaremus quæ ad hunc locum multum faciunt, hydropici charopos oculos habent, hic & illic charops nomen abusive usurpari, diuque de

A glaneo, quod exemplo aniculæ cuiusdam, cuius historia in calce libri quarti occurrerit, confirmamus. Itaque bis fiebat oculi glauci, pituita in oculos abcedente. *ἡ δὲ ἀσθενεία* etiam fuisse dicit tabidos, non arbitror quod tabes alani fierent, quanquam extenuatio carniū aliquid nonnunquam ei figuræ adiicit, sed quod alati tabescerent, utpote ad tabem paratissimi, ut primo libro huius nuper dictum iam est. Addit Hippocrates *ἡ δὲ ἀσθενεία*, id est, & mulieres ita afficiebantur, non quidem solæ, sed quasi diceret non tantum viri, sed & feminae, ac fortasse his plus etiam quàm viri, quod per se se sunt humidiores, & excrementis magis afflicte, cui naturæ accedens anni humida inrempies, maior morborum occasio aderat. Quorundam etiam tabescentium forma erat melancholica & sublinginea, hoc est subnigra & subcruenta, referens redundantiam sanguinis crassioris, in us scilicet in quibus sanguis redundaret. Dictum enim antea est, succorum omnium eo anno fuisse redundantiam, iuxta cuiusque naturam. Horum ergo facies fuit subrubra ut pituitosorum subalbida. His etiam quibus tabescentibus forma melancholica & sublinginea, acciderunt febres ardentes, & phrenitides, & dysenterie, dum corpus eam pulmonis putrescentia tabesceret, putrescente & bilecente sanguine per totas venas: aut irruente in caput aut ventrem. Cum verò dictis ægrotis multa circa alium mala acciderint, ut teneismi diarrhææ longæ, & deiectiones acres, & pingues, narrat Hippocrates, quibus & quæ acciderint, secundum ætates, & naturales temperaturas differentiam accipiens.

D Galenus legit, teneismi iunioribus pituitosis, longæ diarrhææ & deiectiones acres, ac pingues, biliosis. Ego verò non video cur minus longæ diarrhææ acciderent pituitosis quàm biliosis, aut cur potius actia & pingua iunioribus (quorum nomine adolefcentes, aut pueri adolescentæ proximi, videntur intelligendi) quàm iunioribus, & consuetibus ætate. Proinde ego ita lego. Teneismi iunioribus, hoc verò est quod antea dixerat, teneismi pueris (& quos vocauerat *νεῖς*, nunc vocat *νέες*) & pituitosis longæ diarrhææ, ob abundantiam scilicet multæ fluxionis; & biliosis deiectiones acres & pingues ob calorem. Vbi lego, forma tabidorum erat lævis, subalbida, pituitosa, in quibusdam codicibus pro *ἡ δὲ ἀσθενεία* legitur *ἡ δὲ ἀσθενεία*, id est lentes referens, tamen apertum est mendum, quia Gal. lectionem hæc sequutus est, & multo magis videtur congruere, ut ex ipsa interpretatione iam patere potest.

F Omnibus autem quos supra descripsimus ver erat grauißimum, plurimòque sustulit: ætas verò commodissima, paucissima que interierunt. Sub autumnum autem & sub vergiliam rursus perierunt multi quartanarii.

G Dictum autem erat tabidos multos abstulisse prius, autem melius habuisse, & autumno rursus multos esse mortuos, eorum qui ver euaserant, dictumque quam ob causam. Quod nunc dicit *ἡ δὲ ἀσθενεία*, id est, *ἡ δὲ ἀσθενεία*, est idem ac si diceret toto autumno, incunite scilicet, & sub autumnum & ad occasum Pleiadum, quæ occasus sunt autumnum & inchoat hyemem. Dixerat nuper multos eorum qui antea decum-

decubebant, extremaestate mortuos esse, & eorum qui non antea decubebant multos tunc decubuisse. Constataneum ergo est, hos, qui inueniuntur antea decubebant, & morbo, hoc est, occiditibus pleiadis, tempore mutato ad frigidissimum (ea enim hyems fuit qualis solet, finito iam anno in tempestu) decubuisse. Vox illa quartanarii, censetur à Galeno esse adiecticia, quia nihil pulchrum videtur significare posse. In quibusdam codicibus occurrit scriptum *interdixit* quarta, in quibusdam *interdixit* quartanarii. Quod autem significet, multiplex coniectura est, quidam antiquorum dicebāt quarta die mortuos, sed quo pacto tabidi quartanarii die moriebantur? An superueniebant illis in extremo constitutis malum quatuordecimum? At id oportebat dictum prius. Quendam dicebāt, hos esse quatuordecimos, quasi quartam constitutionem epidemiam, post duas in Thaso, in primo libro scriptas, & tertiam in Crahone scriptam in secundo. Sed vix constat, an hos libros omnes in ordinem digesserit Hippocrates quasi in lucem emittentes, quomodo ergo putabimus tantam præscriptorem toto opere habuisse rationem? Alij putant multos eorum, qui ex febrilibus erraticis hunc annum euaserant, sequenti anno fuisse quartanarios, ut fieri solet. Aut hoc est quod Hippocrates dicit, aut nihil, sed adiecticia est illa dictio. Superfuit usque ad extremum huius libri tertii decem & sex agroti, quos quidam interpretam putant, fuisse quosdam eorum qui dicto anno agrotarunt, scorsum exempli gratia scriptos, adducti illa vocula *interdixit*, quæ videtur significare non scriptos antea, sed subscribendos deinceps. Dicunt ergo cum hic dicit, erat autem omnibus *interdixit* granissimum ver, intelligi, omnibus qui sequuntur, indeque constare eisdem esse qui sequuntur, & qui antea dicti sunt. Ego quidem suspicor quosdam fuisse eorum qui eo anno agrotarunt, non tamen hoc argumentum quod pluries enim iam vidimus, tota hæc tempestate dicit *interdixit*, id est subscriptum, quod antea scriptum | sed quia scilicet adiecti sunt huic constitutioni, & quidam illorum videntur habere multa symptomata quæ narrata sunt, & qui aliis modis videntur agrotasse, fortasse hæc ipsa ratione à communi narratione excepti sunt, quod peculiari morbi forma agrotauerint. Sed veniamus ad singulares historias.



SEXDECIM AGROTI.

Agrotis primus.

IN Thaso Parium, qui decumbebat supra domum Artemisii, febris corripuit acuta, circa initia continua, ardens, sticculosa ab initio comatosus erat, rursusque insomnis. Alnus turbata in principibus. Urina alba. Sexta minxit oleosum, delirauit. Septima exacerbata sunt omnia. Nihil dormiuit, sed urine similes, & mens turbata. Ex alno autem biliosa pinguis fluxerunt. Deinde ostendit parium à paribus desillauit. Vomuit vitrosa pauca; parium

A dormiuit. Non à eadem adfuerunt. Decima omnia remisierunt. Undecima sudauit non per totum, circum frigus quidem, circa aurem recaluit. Duodecima febris acuta fuit, deiectiones erant biliosæ, tenues, multæ, urinis encores, delirauit. Decima septima laboriose transmissa est. Neque enim somni aderant, neque febris intendebatur. Vigesima sudauit toto corpore, insomnis, deiectiones erant biliosæ, cibum auersabatur, comatosus erat. Vigesima quarta recidit contigit. Trigesima quarta sine febre, alnus non subsistit, & rursus recaluit. Quadragesima sine febre, alnus non diu restitit. Cibum auersabatur, parum rursus febricitauit, & perpetuo erraticè, aliquando à febre liber, aliquando non, si enim aliquid intermisset, & allenata esset, rursus reuertebatur, cibariis multis & malis utebatur. Somni male in reciditis. Delirabat. Urinas crassitiam quidem habentes: mingebat tunc, iurbatas autem & pranas, & alnus asstricta fuit, & rursus soluta. Febricula aderant continua, deiectiones multæ, tenues. Centesima autem vigesima die mortuus est. Huic alnus ab initio ad finem usque lubrica erat, excernebatque biliosa, liquida, multa, aut si subsisteret, feruida & cruda. Urina usque ad finem male. Comatosus erat, aut plerumque cum doloribus insomnis, cibos fastidiebat, & continenter febre ardente laborabat.

Hæc fuit febris ardens & acuta usque ad diem vigesimæ, inde cepit ex acutia cadere, acutem adhuc aliquam retinens usque ad quadragesimam, quæ finiantur morbi medijs inter acutos & diuturnos, inde iam eroticus factus est morbus, & sensim tabescens homo, alios duos quadragenarios durauit. Tribus verò exactis, die vigesima supra centesimam mortuus est. Habent enim suos dies decretorios morbi omnes, sed in acutis habent perit vim maiorem, & notantur brevioribus intervalis, in longis minorem, & ex longioribus. Proinde Hippocrates usque ad vigesimum, omnes ferè dies percurrit, & vigesimo iam attingit ratiore, usque ad diem post quadragesimum nullum usque ad centesimum vigesimum, nominauerit. Habent vero vim magnam ut in acutis septimane; ita in longissimis affectionibus quadragenarii: quorum tres dictæ dies sunt. Sed percurramus singula, quæ ex dictis antea non semel intelligi possunt facile, legentes | solum quæ nondum explicata sunt, interpretantes. Nam ita fiet, ut opus neque fastidiosum sit, neque in incensum crescat. Parium, inquit, febris corripuit acuta, circa initia continua, ardens, sticculosa, id est quæ primum fuit acuta, continua, & ardens, cessi deinde in longam decidit. *Agrotis*, id est, primis morbi diebus fuit comatosus, rursusque insomnis. Quibus quidem notis satis videbatur esse vni quidam eorum: qui illo anno agrotarant, dixerat enim eos non sapere, nunc periculum teneri, redundantem scilicet dupliæ succo. Alnus turbata in

principis, & vrinae albae fuerunt verò vrinae tales ob
crassitatem: & declinante in aluum bile. Talia ha-
bit vique ad diem sextam, qua mixxit oleosum, id
est vrinam oleo similem. De hac vrina dubitatum est
à prioribus interpretibus; quibusdam putantibus
esse omnino similem oleo, crassitie, & pinguidine,
fierique liquata corporis pinguedine. Galeno, cuius
sententia mihi magis placet, videtur hoc fieri non
posse, quia pinguedo liquata mox cohaerescit & su-
pernatat, atque adeo, etsi aliquando vi caloris fie-
ret vt non concreveret, tamen innataret; nam & o-
leum ipsum euehitur in aqua. Proinde supersunt
duae probabiles opiniones, oleosum esse in qua innat-
tat pingue dictamque oleosam, quasi pinguem, eo
quod oleum pingue sit; aut esse vrinam similem o-
leo crassitie, & colore, etsi ipsa satura lentam pin-
guedinem non habeat. Pinguis colligationem si-
gnificat, aut secundum renes cum confertim mingi-
tur, aut secundum corpus totum, eum aliter. Fieri
verò hanc in Patio sexta die, non erat dissonum; ita
enim fieri solet in aliis febrilibus acutis. Neque verb
pinguedinem liquari tam graue est, vt propterea du-
bites potuisse huic tam cito fieri crassiam, & olei co-
lore: quidam putabant significare colligationem
multo maiorem, quam pingue, fieri enim ex parti-
bus carnis velut affatis, vt si succum eum qui ex as-
satis carnibus destillat, quis colligit. Tales fortasse
vrinae de quibus nuper dicebat Hippoc. multitudo
vrinarum non vrilium colligationes malas indicat.
At verò consumptio tanta non posse sexta die fieri,
videtur vsque ad centesimam vigesimam. Proinde
censeo, vt & Galenus oleosam vrinam, vnam quan-
dam carum esse, quae conturbatione crassescunt. Ita-
que esse conturnatam, referentem colore oleum.
Talibus vero malum capitis imminere solet. Velut
huic accidit qui talem mingens, mox delirauit. Sed,
& de Pichione, qui tertius est huius partis agrotus,
ita scriptum occurrit. Vrinam mixxit oleosam,
nocturno turbatio multa, delirabat. Licet considerare
mutationes insignes septima, vndecima die, & deci-
ma septima. Miror quod decima quarta nihil noui
agulerit, aut quod ille omiserit. Fortasse Hippocra-
tes non affuit agrotis ea die. Die octaua stillic-
sanguinis de naribus mala significationem praestare
poterat, vt non semel iam dictum est. Sed & illud
quod duodecima die dicitur accidisse vrinis enzo-
rema, & delirasse, est consonum ei quod primo pra-
edictionum, dicitur, vrinae innatantes praetertita.
Quod dicit, decima septima laboriose transmissa est,
quia neque somni aderat, neque febris interdebat,
videbitur fortasse dissentaneum. Dices, n. laboriosus
fuisse somnos & febrem intendi, vt febris esset in-
guens cum comate. Verum non ita intelligendum est
sed, neque somni erant, id est dormire non poterat;
neque febris intendebatur, id est, neque extrema ca-
lescebat; effuso aequaliter per totum corpus cal-
do; sed erat insomnis cum extremorum frigore. Na-
bilomius vigesima iudicatus est, non tamen perso-
nae, neque enim poterat nullis concoctionis signis
pergressus; neque tamen id, ea ipsa die quis posset ex-
pectare; quia exiguae conferentiae nocte aderant.
Tamen enim factus est sudor non qualis vndecima,
sed toto corpore transiebat insomnis nunc, nunc
comatosus, aut fortasse in somnis comatosus, id est
cum comate vigili, & cibum fastidies. Satis ergo
fuit, neque sane parum fortis naturae argumentum.

imperfectè iudicari, sudore & deiectionibus solim
tunc biliosus, euacuationibus quidem symptoma-
ticis, sed ex parte facilis ea die vtilibus. Itaque
febris non sanè, quantum intelligo, sublata, sed
remissior multò facta est. Sed quia imperfecta
fuerat iudicatio, fuit etiam infida, & rediit fe-
bris aperte vigesima quarta. Trigesima quarta, in-
quit, sine febre est factus. Addit, alius non substi-
tit, & rursus recaluit. Sed cur dicit, alius non
substituit; aut si dici oportebat, quae non sibi-
tur, cur non dicit etiam non sudauit, aut non vomuit,
aut alud quidvis? Certè significat melius actum fore
cum agrotis si alius relinisset: atque adeo con-
sentaneum fuisse sisti. Nam velut consentaneum est
in mutationibus in melius, fieri euacuationes vtilis,
ita sisti noxias. Huic vero noxae erant biliosa &
pingues euacuationes, consumentes magis quam
expurgantes corpus. Consentaneum ergo, cessare
febre, cessare aut minui liquationem, & bilis fluxio-
nem, & sisti aluum. Dicit itaque alius non substituit,
& rursus recaluit, quasi insinuas inter cetera, ob
hoc etiam cito recaluisse, quod non substituerit. Hoc
multo magis declarat, quod addit, quadagesima
sine febre, alius resistit. Sed quia ne tunc quidem
dixit resistit, & cibum auersabatur: rursus, non vt
prius, sed parum febricitauit. Nimirum fastidium,
& oris amaritudo, & similia, vt dicitur sexto libro
huius operis, significant intus manere reliquias, &
recidivam. Verum vt facta est mutatio insignis, &
declinatio ab acutis, die vigesima, abeunte morbo
acuto in morbum medijs generis, ita oportuit die
quadagesima agi, quia qui hanc excedunt, aperte
iam sunt diuturni, & vt vigesima multorum acuto-
rum est finis, ita quadagesima morborum medijs
generis. Quare iam inde febris erat minor, &
perpetuo erraticè, aliquando sine febre, ali-
quando cum febre erat. Intellige vero id non ex-
actè, sed quod videretur. Nam reuera, num-
quam sine febre fuit, ac multo minus post qua-
drigessimam, quia tabescebat iam, tabescentes
autem ex febris semper habent febrientes. Et
ipsamet Hippocrates mox addit, febriculae conti-
nuet, sed & hic ita debere intelligi, vt explicui, ip-
somet indicat, addens, si etiam aliquid intermis-
set, & alienata esset, rursus reuertebatur. Nam
illud est declaratum, quod illud, aliquid
intermittere, sit non simpliciter intermittere, sed
aliquid intermittere, & alienari, quare & illud
tenenti, esset rursus intendi. Addit ebaris
suis & malis urebatur. Sed quo pacto,
si, vt in fine hystoriae dicitur, cibos auersa-
bat? Certè suspicor hunc, vsque dum iam
tabescebat, fuisse fastidiosum, vt nullum ci-
bum libenter caperet (dixerat enim Hippocra-
tes, cibos, & deinde tamen, perueniam ali-
menti sequentibus partibus, & excrementis ci-
bi boni appetitum corruptentibus, ingessisse
multos & malos. Itaque semper fuit quodam-
modo fastidiosus: quia semper fastidit bo-
nos, etsi multis diebus vltus sit multis ma-
lis. Dicit, vrinas mingebat crassissimas quidem ha-
bentes, turbatas autem & prauas. Mox ita ad-
dit, turbatas autem & prauas, quia cum simpli-
citer dicit crassas, coctas solet Hippoc. signifi-
care, aliter profecto ac Galenus, qui crassarum nomi-
ne turbatas intelligit. Per dicta narratione vsque ad

diem vigesimo in septa ceterisima, quā mortuus est, epistolo colligens quæ fuerunt in Partu deterrima, dicit, huic alius ab initio vsque ad finem lubrica erat (id est fluxus biliosus, humidus, fluxibilis, & liquidus, multis) aut si subsisteret, feruida & cruda excerneretur. Sed postea facta feruida & cruda, si subsisteret? Certe nunc erat laxa fluentibus multis biliosis liquidis. nam atrata fluentibus paucis feruidis & crudis: feruidis sanè exustis; crudis, ex malè coctis in ventre cibus; virisque tamen, paucis, & non fluxilibus, cessante fluxione ad ventrem. Dicit alius signis pessimis, finis sermopem, dicens, continenter febri ardente laborabat: quod intelligi debet, dum acutè laborabat, & vsque ad vigesimo.

AEGROTVS II

Mulierem in Thaso iuxta frigidam decumbentem, cum filiam peperisset nec purificationes procederent, tertia die febris acuta cum horrore corripuit. Multo autem ante partum tempore ex febre decumbebat, & cibum fastidiebat. Postquam autem riguisset, continua fuerunt febres, acutæ, & cum horrore. Octaua & sequentibus diebus multum delirauit, rursusque citò ad mentem rediit. Alnus turbata est multis, tenuibus, & aquosa bile permixtis. Nō stiebat. Vndecima constabat mente, comatosa tamen erat. Urinas multas, tennes & nigras reddidit, in somnis erat. Vicesima parum circumfrizit, & rursus citò recaluit. Parum delirauit, in somnis erat. Venit eadem demisit. Urinae aquosæ & multæ erant. Vicesima septima à febre immunis fuit. & alnus subsistit. Non multò post autem vehementi & diuturno dextra coxendicis dolore vexata est. Febres rursus comitabantur & urina aquosa. Quadragesima coxendicis dolores remiserunt, infuses autem continua, humide, multæ. Alnus subsistit. Cibus auersabatur. Urinae eadem. Febres autem omnino quidem non desinebant, sed erraticas aliquando habebat exacerbationes, aliquando non. Sexagesima passus quidem sine signis euenerunt, nulla enim sputorum concoctio apparuit, neque alius consuetus accessus. Maxilla autem dextra conuulsa est, comatosa, rursus delirauit, & citò ad mentem rediit. Ceterum à cibus auersum habebat animū. Maxilla quidem ad locum suum rediit, alnus autem biliosa panca reddidit. Febricitans acutius cum horrore, & sequentibus diebus vox defecit, rursusque rediit ad mentem, & loquebatur. Et octogesima mortua est. Huic urina vsque ad finem erant nigra, & tennes, & aquosa, & coma comitabatur. Cibum non sumebat, animo erat deiecto, in somnis, irā & inquietudine torquebatur, animo erat melancholico.

A Vt Parius tertio, ita hæc secundo quadragenario, qui die octogesimo finitur, mortua est. ex partu foetum. Dicitur verò & obseruatum in hoc opere ita sepe est, difficilius esse partum famularum quam masculorum. Dicitur etiam sepe, xenitis occasionem ægotandi, sepe semper esse in purgatione non satis procedente, peculiariter verò noxia est hæc causa enxis femininis, quia hæc pluribus abundant sordibus, & maiori expurgatione indigunt. Erat autem hoc conspicuū maxime in hæc, quæ multo tempore ante partum erat febriculosa, & fastidiosa, & decubens in lecto, aut continenter, aut assidue, ut fieri solet. Animaduerte hoc loco Hippo. dici computationem ducere, non à die febris, sed partus, iuxta id quod in prognostico docuerat. Dicit enim tertia die febretem horridam mulierem corripuisse. Tertia ergo mali fuit prima febris, & ea dies in qua primò febris orta est, fuit tertia, & fuit octaua qua delirauit, & octogesima qua mortua est. Nimirum in his primariis ac præcipuum malum, est partus malus. Dicitur etiam, antea est, semper solere esse febres enixarum, & earū quæ ex suppuratione magna menstruarum evacuationum laborant, acutæ & horridas. Acutæ quidem sunt quia magnæ & periculosæ: horridæ verò, ob naturam vteri, ad quæ præcipue pertinent illæ affectiones, & ob hanc ipsam causam, cepit hæc febris ex rigore: nimirum rigor est horror magnus, & quæ causæ ante quam febris magna fieret, rigorem fecerant: hæc eadem, aucta iam febre, afferebant horrores. Quia horror est exiguus rigor, & febris rigorem minuit, ut & in hemitritæ fieri consuevit. Merito ergo postquam riguisset, factæ sunt febres continuæ, acutæ, horridæ. Octaua & sequentibus diebus vsque ad vndecimam, omne delirium multum, nunc breui redibat ad mentem, habente scilicet compassionem cerebro cum vtero, & totius venis, non autem firmam passionem, ut veram phreosidem. Alnus turbata tenuibus multis, id est, ex redundantia humiditatis aquosæ, & bilis, quod, ut vidimus, ægrotis omniæ bilis illius aui commune fuit, ut & hoc sit esse; quod in hac, præter humiditatis redundantiam, delirium etiam facere poterat. Vndecima ægrotis, id est iam tota ea die fuit sine delirio, comatosa tamen, pituita abundante in superioribus, deriuata bile ad inferiora, per deiectiones dictas, & urinas multas tennes, & nigras, quæ bile nigra tingebantur. Nolle verò oportet, hæc urinas familiares fuisse passioni, quæ valde fuit melancholica, ut vltima rotas narrationis verba declarant: hæc scilicet: Vsq; ad finem erant urinae nigrae, tennes, & aquosæ animæ deiectionis, in somnis, ita, difficiles tolerantiæ, mens autem melancholica, id est, cum metu & tristitia. Hæc enim omnia melancholicæ passionis sunt signa. Neque sanè, quod urinae erant tennes & multæ, prohibet ex melancholia esse. Nam hæc non erant decretoria expurgationis melancholicæ, ut si multa existet quæ crassas viros faceret sed symptomaticæ, cū exiret serū quod urina non crassam, sed nigram facere posset, & melancholiam non euacuare, sed significare. Neque verbū alienum est à melancholia abundare multo sero; per incoctionem enim fit melancholia serosa, & hanc ob causam videas melancholicos, teoem & multam saluam habere, & compositæ frequenter sudare. Quæ eadem causa fuit familiare huic morbo habere hæc urinas, familiare etiam est iis qui-

bus mēstruē euacuationē retinentē, melancholicis passionibus tenari; nimirum hęc deterioris sanguinis euacuationes sunt, vt & hēmorrhoides. Sed veniamus ad reliqua. Quo pacto eadē erat insomnis die vndecima, si soporosa? Certē vt agroti alii huius tempestatis, comate vigilantī. Vigesima (decima-quarta, & decima septima. aut nihil fuit noui, aut forte non affuit Hippoc.) quare desolatus, id est secundum extrema parum refrigerata est, & rursum breui recalcuit. Parum delirauit, insomnis, venter eadem demisit, vrinæ etiā aquosæ multæ. Vigesima septima facta est sine febre, & hic fuit finis acuti morbi. Nimirum dictum mihi est sæpe, mensem lunæ esse legitimum finem acutorum morborum, etsi Galenus vigesimam statuerit. Iam hinc decidit morbus ex acurie. Est verò in hac, vt & in Pario, in indicatione febris sublata euacuatio, quæ symptomatice, & insulser ante fluxum non tētem verò suppressa hęc euacuatio fuit; sed & pro ea factus abscessus, quia non multo tempore post, vehēmentē & diuturno dextræ coxendicis dolore vexata est, nam vsque ad quadagesimam. Neque febris intermissio durauit diu; sed febris rursus comitabatur, & vrinæ aquosæ. Quadagesima, quæ finis morbos medii generis, facta est alia insignis, & perinde mala permutatio. Nam dolor coxæ alieuitus est, factæ autem tussis continuæ, humidæ, multæ, id est, per quas multum excrebatur. Nam tussis arida vocari consuevit, per quam nihil excreatur. Non autem solum alieuit tussis; sed & alius substitit, recurrentibus rursus vitiosis succis, patientibus autem instrumentis respiratoriis, quia hic morbus erat, vt dixi, præcipue vici. Est verò vt li. 2. sect. prima dictū est, magna communio vocalium cum generalibus; quia ipsa causa omnes mulieres, quæ ob has occasiones agrotant, solent incidere in morbos thoracis, tussis, asthmata, hæmopticas passiones, phthisis, an pleuritides. Reliqua fuerunt qualia prius, & febris nunquam omnino desinebat, iam enim habebat mulier habitalem febriculam, etiam tamen præterea exacerbationes erraticæ, ob excrementa multa, & varia putrescentia per partes. Quadagesimā rursus attulit aliam insignem mutationem, nimirum tussis desierunt sine signis, id est euasuerunt repente, nullo relicto vestigio, quod genus desinendi in omni abscessu, quin & in omni passione vituperatissimū est, quia quod repente euascescit, ac non potius paulatim, aut simul cum euacuatiōe aliqua, præter rationem soluitur, quæ verò ita euascescit malignius redeunt, aut in graviorē aliam passionē permutantur. Velut nunc, quia nulla concōctio spūtorū manifestā accidebat, vt cocta, & expurgata materia solueretur tussis, neque alius consueus abscessus, vt expurgatio ex vtero, quæ maximē omnium erat huic expectanda, aut coxæ dolor denuo factus, aut tumor aliquis circa genitalla, quæ etsi minus bona, solent tamen tussis succedere, dicitur tussis desisse sine signo. Et re in deterius eunte, maxilla dextra diuulsa est secundum dextrum lateris rectitudinem in mutis abscessibus, contra tamen ac oportebat, ab infernis enim sursum. Nam à dextræ coxæ dolore tussis, ab hac dextræ maxillæ diuulsio facta est. Quod quidem suprema petente excremento fieri, confirmantur coxæ & delirium accedentia. Sed ne tunc quidem fuit firmata phthisis; sed etiam mentem rediit. Non tamen proinde non erat iam affectus grauius, habebat enim iam à

A cibis animum auersum, non solum, vt antea, cibum non capiebat. Nimirum magna exagitationis gratia dicit, *quæ si mihi pignora dederint, dixi, quod laud scio an melius verū possit, qui habebat auersum animum à cibis, aut saporibus.* Vnus est verò vt Gal. restitit censei, diuisione affectata, vt significaret fastidium summū. Quod sanē maximū iam periculi potēndū, quia sit corruptis facultatibus retribitus. Quod vbi factum est, nulla salutis spes superest, quia etiam si aliqua euacuatio succedat, nihil confert, immo verò quæ confert solent, ea ipsa videntur mortem propere, deficiente facultate quæ tollerēt. Velut huic accidit, quæ cum redeunte maxilla ad locum suum, alui fluxionem biliosam haberet, nihil est iuuata, sed febricitauit acutiùs, & fuit magis horrida, & sequentibus diebus est voce priuata, & octogesima mortua est. Sed quo pacto priuata iam voce & mortu proxima, rursus ad mentem rediit, & loquebatur? Sed quid mirum? Certē & ex magna apoplexia vidi quā plurimos mortu iam proximis, ad mentem & vocem rediisse, vt assistentibus viderentur liberati. Hęc sanē facit extremus conatus, qui, si non expellit, facit tamen abscedere à quibusdam partibus, ad quas, ob vitium impotentiam, nouo impetu irruentia excrementa mortem afferunt, cum ipse aliquis salutis sese cepit insinuare. Reliqua quæ per epilogam dicit, explicat iam sunt.

D
AE GROTUS IIL.
IN Thaso Phythionem, qui decumbebat supra templum Herculis, ex laboribus & lassitudinibus, & prauo victu, rigor magnus, & febris acuta corripuit. Lingua arida erat, siticulosus, biliosus. Non dormiuit, vrina subnigra suspensum quid sublime habebant, non sudauit. Altero sub meridiem die extremarum partium refrigeratio accidit, & maxime circa manus & caput, obmutuit, vox defecit, breuem spiritum traxit, post diuturnum tempus recalcuit, sitiit, nocte quiescit. Sudauit circa caput paruum. Tertiam diem quietam habuit. Vespere circa Solis occasum aliquantulum frixit. Turbatio accidit. Noctem laboriose transiit. Nihil dormiuit. Ex aluo autem pauca stercora compacta exierunt. Quarta mane quiescit, circa meridiem autem omnia exacerbata sunt. Frixit obmutuit, vox defecit, deterius se habuit recalcuit. Post aliquod tempus minxit nigra suspensum quid habensia. Noctem quietam habuit, & dormiuit. Quinta allenatus esse visus est. Circa ventrem tamen pondus sensit cum dolore. Siticulosus fuit, noctemque habuit molestam. Sexta mane quidem quiescit, vespere autem dolores creuerunt, exacerbationem habuit; iniecto autem clystere vespere ex aluo probè deciecit, noctem dormiuit. Septimo die fastidiosus erat &

inquietus, minxit oleosum. Noctem turbulenter transiegit, deliravit, nihil dormiit. Quarta mane quodam dormiit parum, mox autem accidit refrigeratio, vocis defectio, spiratio exilis & imminuta. Vesper autem rursus recubuit. Deliravit, instante iam die parum lenatus est, deiectiones erant mæta, panca, biliosa. Nonā soporosus erat, fastidiosus, & quā excitabatur non valde siticulosus. Circa Solis occasus moleste sese habuit, deliravit, noctem habuit incommodam. Decima mane vox defecit, multa refrigeratio, febris acuta, multus sudor. Mortuus est. Labores huius in diebus paribus accidebant.

Duplici causa mihi videtur Hippocrates meminisse causæ procatarrictæ huius morbi, primum quia hic non admodum videtur laborasse, ut ubi etiam rempeltis ægroti: sed modo quodam proprio, & insinuat non esse illud referendum ad communem causam intemperiei aeris, sed ad peculiare vitium in victu. Deinde quia morbus videtur durasse diutius quam pro malignitate, quam præ se ferebant symptomata, quod fortasse factum fuit, quod morbus ex manifesta causa incepit, non ex solo interno apparatu. Nam quodcumque signum, siue bonum siue malum, sit tanto debilius, quanto causam habet aperiorem, Si igitur hic nullo victus vitio prægresso ægrotasset, merito censetur, essetque reuera gravis affectus, & mortuus citius. Ne ergo gravissima symptomata legens, mireris non mox fuisse extinctum, & diutius peripetis apertis. Non explicat quia in te. Pertinet verò victus ad res omnes non naturales, & præcipue ad cibum & potum. Significat ergo hominem negligenter usum illis omnibus rebus, sed & pravis, & nullo ordine ingestsu cibis. Considerandum in hoc morbo est, quod Hippocrates monet, fuisse labores, hoc est, exacerbationes diebus paribus. Nam secunda, quarta, sexta, octava, diebus interiectis difficiliore fuerunt, & decima mortuus est, quia eisdem diebus moriuntur homines quibus salvi sunt: & morbi qui per pares moventur paribus ludicantur, qui per impares, imparibus. Eandem ob causam nox secunde diei fuit quæta, & noctem quartæ diei quietam habuit, & sextæ nocte dormiit. Noctem autem tertie molestam habuit, & noctem quintæ laboriosæ transiegit, & septimæ noctem turbulenter habuit, & nonā die noctem habuit incommodā, quia nox quæ accessione præcedit difficilis est, quæ verò subsequitur magna ex parte lenior existit. Octavæ etiam noctem quietam esse oportuit, proximus vero iam status morbi lethalis id prohibuit. Nihilominus postrema noctis parte, iam instante die parum lenatus est. Sed redeamus ad initium, & beatè omnia perstringamus. Incepit hæc febris à rigore. Unde constat, à rigore incipere non esse proprium intermittentium, sed quibusdam etiam continuatum accidere, iis vero maxime quæ à causis procatarrictis incipiunt: velut hæc incepit à rigore, vel ob extenuentia per corporis habitum (ut in lassatis fit) effusus, ut & viciatose lassitudines rigores afferte consueverunt: vel corruptis aliquibus fucis in

ventriculi ore ob prævium victum. Sed & malignam febrem hoc indicat. Maligna enim qualitas rigorem intemperatum, ut alium quemcumque abscessum, facere potest. Merito ergo hæc, alioqui continua, à rigore incepit, quia utrumque habuit, & esse malignam, & à procatarrictis causa incipere. Cum dicit fuisse febrem aliquam acutam, ad constitutionem referri debet, ut cum in calce variationis occurrit subscriptum, acutum, aut febris acuta. Cum vero dicit die aliqua fuisse acutam, ut die prima, quinta, aut septima, aut alia, non ad constitutionem (constitutio enim non vnius diei, sed totius morbi est) sed ad tactum, & eius diei symptomata: hoc est ea die calorem acutum memorasse, aut symptomata magnam acutem referentia affuisse. Velut prima die huius morbi fuit rigor magnus, calor acutè mordens, lingua arida, siticulosa, biliosa, idest amara & pallens, non dormiit, quæ omnia bilis vrentis abundantiam significabant. Sed & urinae subnigra, quæ vitam iam bilem præ se ferebant, & transpiratio sublimis. Galen. quod sublime vult vocari nubeculam: quod subdissidens, sedimentum; quod pendet in medio, transpiratio. At vero Hippocrates hæc omnia nomina generatim versus præ eo quod in urina continetur, proinde plerumque addit aliquid, quo explicet, quod contenti genus dicat, velut nunc dicit, transpiratio periculis, innuens nubeculam tenuem. Non explicat, an illa nubecula fuerit etiam subnigra, ut ipsæ urinae; utrumque autem hoc habuerit, significabat tantum bilem essam, & statim capiti periculum portendentem. Quale illud est de quo dicitur primo prædictionum. Urinae sublimes phrenitice. Nimirum, ut in pituitosis solet apparere ante concoctionem crassum quiddam, album, hircens sando manule: ita in biliosis, tenuis, sublimis, dissolutum. Addit, non sudavit. Id dicit, quia tota ea die febris aliquis tertianæ speciem præ se tulerat, incipiens à rigore, ac deinde breui ardens, & cum ad extremum expectaretur sudor, qui tertianæ paroxysmum finiret, non ita factum est, sed continua evasit, & nullas ea die sudor fuit. Secunda die à merissem fuit restitueratio extremorum, præcipue circa manus, & caput, & homo fuit sine loquela, & sine voce, & brevispirus. Quod idem accidens aliis ferè omnibus diebus paribus factum est; nam & quarta, & octava, & postrema, qua mortuus est, quin etiam fortasse, & sexta, usquam id minus explicet. Dicit tamen exacerbationem habuit, quam verisimile est fuisse tunc quoque similem illi, quas alii difficiles eius morbi articuli asserbant: Si sine voce erat, non poterat non esse sine loquela, nam vox materia sermonis est. Dicit vero velut exaggerans periculum, *transpiratio periculis*, & sine voce, quasi diceret, non solum sine loquela, sed etiam sine voce. Illud *periculis*, necesse est, significet spirituum exiguum. Magnus enim non diceretur curtus, aut brevis. Non tamen perinde constat, crebrum, & parvum, an rarum; & parvum, significet. Nam utrumque sit spiritus parvus, videtur posse ita appellari. Si tamen hic spiritus fuisset creber & parvus, inflammationem aliquam in partibus spiritalibus, significaret, & refrigerationem etiam extremorum tali spirationi accidentem, in eam causam referre, esset consentaneum.

Sed si inflammatio magna & maligna (nam non posset quæcumque) ea symptomata faceret, non ex quibusdam crenitibus nunc faceret, nunc non, sed continenter, ut febris lipiria solet. Præterea inflammatio non tolleret loquelam, saltem non vocem, & querulos gemitus: Consensaneum ergo magis est, eam refrigerationem indicare debilitatē naturalis caloris, quare & spiritum illum fuisse tarum & parum, veluti si ad *dephlay* tenderet. Vnde alia etiam symptomata serie quadam procederent. Si enim frigus tollebat spiritum sublato usu, necesse erat cum spiritu tolli vocem, & cum voce loquelam. Nam ut sermonis materia vox, ita vocis exspiratio, non quætulacunque, sed maiuscula. Accedit, quod eandem spiritus speciem significans dixit, octava *αὐτὸν πνεῦμα ἐ μιν ὄντα*. Videtur autem imminurus dici, per quem spiratur parum aëris, is verò est rarus & parvus. Nam per crebrum & parum non spiratur minus, sed per minores partes. Merito itaque videtur Galenus potasse hunc spiritum fuisse paruum & tarum. Sed est admittatione dignum, qui posset, qui præ caloris naturalis extinctione tantopere frigaret, denud tantopere recalescere, & qui recaluisse, frigere rursus, arfutus iterum non semel. Certè cū naturalis calor est exiguus, & is qui præter naturam magnus, accidunt hæc vicissitudines, excitara nunc flamma ingente in putrescētibz succis, & eorum fuliginibus, ut vel in cadaveribus aliquando; nunc ipsiusmet ignei caloris vi consumptis quibusdam, & dissipatis, apparenre interno frigore. Ita enim fit in aliis omnibus rebz natura constantibus, quæ frigida sunt naturali frigore. Accedente enim igne calefcunt, cum recedit, refrigerantur. Corpus ergo ægroti, in quo frigus internum iam vincit, accedente causa calorifica inflammatur, & recedente frigescit; accedit verò & recedit per vicissitudines, ut in aliis cum facit exacerbationes. Nam exigua illa febricula, quæ per remissiones superest in aliis continuis febribz, non potest, cum calor naturalis est exiguus, totum corpus calefacere, sed eam solum particulam, in qua putrescens fucus hæret. Quia nisi calor naturalis calorem, à quacumque causa excitetur, in corpus deferat, non potest is in totum corpus se effundere, nisi omnino fit maximus. Si enim cadaueri vna in parte ignem admooveris, eam solum partem vrens, reliquum corpus frigidum esse senties, neque certè totum calefacies, nisi totum occupet flamma: scilicet non adsunt spiritus, & arterialis sanguis, qui calorē præter naturam concipientes, in totum deferant. Hinc fit, ut qui debili calore sunt, ut senes, exiguis febribz tententur, & ut quædam corpora præ debilitate naturalis caloris febricitent interius, exterius refrigerata, atque adeo non solum secundum caput manus ac pedes, sed & secundum asperam arteriam, pulmonem, & thoracem, & internum os: ut hanc ob causam expirent frigidum, exiguum, & etat d, & habeant frigidas linguas. Cuiusmodi hæc in valde lethali bus esse signis. Reliqua ferè omnia ex dictis intelliges, quid potterentur, & quas haberent vires. Pauca illa compacta sterena, quæ ab alio prodierant die tertia, feces in intestinis ex multis diebus impactas significabant: per longam enim moram fuerant compacta, quod magis declarauit, pondus cum dolore circa aluum, die quinta: Semper enim dolor grauis multitudinem significat in dolente parte, quod sentiens Hippocrates, sexta die vesperis

A clysterem infundi iussit, quo ab alio eiecit bene, id est, copiose stercorea, vt sani solent. Sed rogabis, cur Hippocrates cum curationis morborum taceret toto hoc opere, nuic clysteris meminit, & cur clysteris solius, quoniam etiam cur toto opere vix vnaquam auxilii cuiuspiam meminerit, praterquam glandis, aut clysteris. An his solis curabat hos morbos? Non sane, nam & missionis sanguinis alicubi meminit, & in narratione status pestilentis huius annidixit, ut quæ offerebantur difficultat cedere. Nam purgationes plurimos lædebant. Quod sane videtur dixisse, vt purgationibus expertus, misisset, vt qui alios purgationibus lædere animaduertisset. Vtque autem hoc habeat, ex innameticis locis constat, cum plurimis aliis auxilijs vsus esse, quin etiam omnia quæ in hac vsque diem in vsu sint, ab eo viro fluxisse, & quædam alia, posteritatis negligentia, concidisse. Meminit verò crebrius in singularibus historis huius libri, glandis & clysteris, vt qui curationes vellet tacite, hæc verò non tam vt auxilia curantia, quam vt quibus aliquid teneretur, & à quibus aliqua capebatur indicatio, nominat. Velut nunc, quia clystere bene euacuat algo, dormiuit, constat quid prauitas cum dolore significaret. Nolo tamen proinde non intelligas, familiares fuisse Hippoc. clysteres, & glandes, & multi vsus esse hæc in re medica. Oleosa vrina qualis sit, proxima historia dictum est, atque ex eo loco dictis constat, merito ab hac missione hæc delirasse. Exitus etiam huius morbi consideratione dignus est. Nimirum decima die motuus est cum sudore multo, vt constat hoc exemplo, & multis huic similibus, quæ partim occurrerunt, partim etiam occurrerent, non tantum eisdem diebus mori homines, quibus salui sunt, sed eisdem prope euacuationibus, vt merito dicat Galenus euacuationes, & alia omnia dexteriora, neque bona, neque mala esse simpliciter, sed vt euenit, amanda, scilicet & expectanda, si signa futuræ salutis se exhibeant, detestanda verò & fugienda, si lethalia. Nam tunc temporis simul cum humoribus vitalis spiritus exhalat.

Æ G R O T V S IV.

Phreniticum prima die qua decubuit, vomit aruginosa, multa tenuia, febris corripuit cum horrore, multus sudor & continuus capitis & colla accidit per totum, & granitas cum dolore. Urina tennes, suffusiones exigue, dispersa. Non sudauit. Ab alio vero eiecit sterces conseruim, multa delirauit, nihil dormiuit. Secunda mane vox defecit. Febris acuta innasit. Sudauit. Non intermisit. Palpitationes per totum corpus. Nocte conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Mortuus est.

In multis codicibus latinis & græcis occurrit scriptum, quattuordecim est. Ego verò nolui eam

lectionem sequi, quia Galenus, ut constat ex eius commentario, non habebat voculam illam; quarta, in suo codice, quem verisimile est, ut antiquiorem, ita fuisse certiorum. Miratur tantopere Galenus phreniticum mortuum esse ante diem quartam, ut putet id non factum esse vi phrenitidis, sed succi pressi, & venenari, quem homo collegerit ob primum vitium, phrenitidem vero fuisse, ut vnum quoddam veneni symptoma. Velut si quis accepto veneno, aut morsus a fera, delirans moretur: non diceremus fuisse eum phreniticum, sed venenum. Videtur verò hoc quod Gal. affirmat multo probabilius effici, vomitu illo ætuginoso, qui nisi materia venenosa esset, & celestima corruptio, non posset die prima fieri. Ego verò, etsi Galeno concedam, rursus admodum esse phreniticum finiti ante quartum, & produci ultra vigesimum, impossibile tamen neutram esse suspicor. Neque miror admodum, si id Galen. nunquam viderit, & Hippoc. occurrerit: quin potius ob hanc raritatem puto propositum nobis ab eo esse, & scriptum in intro narrationis, phreniticus. Raro enim Hippoc. narrationem inchoat à morbi specie, nec nisi cum momentum aliquod habet inde incipere, velut fortasse nunc dixit phreniticus, quia illud erat maxime notandum, phrenitico ita cunctis. Sed si inflammatione aliqua partis caluspium, extertæ, possit intra diem septimum interimere, cur non poterit inflammatio cerebri, si malignam eam esse contingat, interimere tertia, vel etiam citius? Quod si tunc dicas, non esse impurandum inflammationi, sed maligno succo, perinde est, ac si dicas, nonquam phrenitidem interimere, sed succum à qua illa sit. Imputatur tamen hoc inflammationi malignæ. Neque finit morbi lethales, & exacte acutissimi quarta die interimant, sed quarta aut citius, ut in prognostico ipsemet dicit Hippoc. Itaque ego Galeno concessim, posse intra nostra corpora gigni venena, quia horrendi quidam casus id indicant, atque adeo posse paulatim genitum, aliquando noxam repentinam insisteri, aut repentinum impetum capiens in partes principes, aut quod verius puto, venenatam qualitatem repentinæ alterationis contrahens, ad quam ante longo tempore tantum disponebatur. Velut signa multo tempore siccantur, & repente inflammantur: atque adeo in hoc talem succum fuisse ob vomitum illum ætuginosum, & febrem acutam, & horridam, & ob incredibilem illum lapsum vitium, quo factus est die secunda manē sine voce, & ob palpirationes per totum, ac denique secunda die factas convulsiones; tamen non proinde non fuisse hunc phreniticum maligna ex maligno succo. Nam præter dicta, ad extremam non est hic mortuus syncope, sed convulsionibus, quæ ad cerebri noxam pertinebant. Sed quo pacto dicit, prima die multus sudor continuus per totum, moxque eadem die dicit, non sudavit? Certè non est legendum, ut occurrat in multis codicibus sudor multus continuus per totum, capitis & colli gravitas cum dolore; sed sudor multus continuus capitis & colli per totum, scilicet diem. Ac deinde gravitas eum dolore. Nimirum per totum diem sudavit multum capere & ceruice, ut solent, qui languunt animo, & præterea habuit gravitatem cum dolore, significantem multitudinem prævæ materie: non sudavit tamen æqualiter, ut qui

A indicantur. Reliqua, ex dictis iam sæpe intelliges, quam præstare significationem.

AEGROTUS V.

IN Larissa calvus femoris dextri repentinus dolore correptus est, nihil eorum quæ offeriebantur iuvabat. Prima die febris acuta & ardens sensum corripuit, dolores autem comitabantur. Secundæ quidem femoris dolores remiserunt, febris autem intensa est, submoleste sese habuit, non dormivit. Extrema partes frigida erant, urinarum non probarum copia prodibat. Tertiæ, femoris dolor sedatus est, mentis autem alienatio accidit & perturbatio & multa iactatio. Quarta circa meridiem mortuus est acutissime.

Periculosum admodum est simul cum abscessu febrem invadere, & periculosius multo, cum ita ignaverit, abscessu evanescente febrem angere, ac multo magis si cum ille evanuerit, quæ partis principis lesionem indicent, superueniant symptomata, quæ omnia in hoc calvo videre licet. Repente enim correptus est femoris dextri dolore, & febre acuta ardente, quæ paulatim crescebat, & dolores consequebantur, id est, crescebant pariter cum ipsa febre: & secunda die dolores femoris remiserunt, & febris intendebatur, symptomata alia difficilia, quod significatur illo verbo *ὀνδρῶς*; & tertia, omnino sedatus est femoris dolor: & vt dolor femoris tolleretur, ita apparebant inditia passionis membrorum principum. Nam secunda non dormivit, tertia mentis alienatio accidit, quæ ad caput pertinebant; secunda extremæ partes frigida erant, tertiæ & perturbatio & multa iactatio adfuit, quæ ad facultatem vitalem cordis. Non mirum ergo, cum tam celeriter faculares labefcerent, & præcipue partes lederentur, tam brevi hominem mori. Urinarum multitudo, quæ exibat, redundantiam succi maligni significabat. Dicit verò fuisse eas urinas inutiles huic, ut plurimis eius tempestatis ægrotis, de quibus antea differens, dixerat, multa autem malicia erat urinarum excrementum. neque enim crassitudo, neque concoctiones, neque expurgationes vitiles habebant. In multis enim purgationes per urinas vitiles fieri, bonum. Itaque hunc non iuvabat evacuatio, quæ multis vitilis esse solet, sed neque quidquam eorum, quæ à medico offerantur, proderat: quod sanè grauissimum signum esse, non pridem dictum est. Nihil refert nunc dicere, quæ sit conscientiam fecisse Hippocrati. sed illud vnum sibi facile persuadere quisvis, Hippoc. secundam artem fecisse rectè, omnia quæ expedirent, siue aliquid quod ore acciperet offerendo, siue aliquid circa ægrotum faciendo, vt secundo venam, aut tale aliud, siue admovendo exterius repellentia, aut anodina. Illud est admodum consentaneum, etsi, aliis locis, oblata, aut quæ offeruntur, ex solum dicantur ab Hipp. quæ ore accipiendæ dantur, hic tamen id nomen dici de exterius etiam admotis. Non dubium enim in tanto dolore, illa etiam tentata esse, præcipue cum dicit, nihil eo-

rum, quæ offerebantur, proderat, quasi renato omni genere auxiliorum. Gravissimi ergo mali erat, cum rectè omnia, quæ secundum artem possunt, agerentur, nihil iuvare, neque etiam us evacuacionibus, quæ spontè fierent. Non ergo, sicuti videmus dolorem magnam partis cuiuspiam externæ repente accidere, hoc exemplo recti, debemus mox tantum periculum valde formidare, sed si simul cum dolore febris ardens fiat, & nullis auxiliis malum cedat, & reliqua, ut huic casui, succedant lethaliter per symptomata gravissima. In quibusdam codicibus habet hæc narratio in fine hæc, idest acutum: in quibusdam hæc, idest, acutissime in aliis hæc, idest, acutissimè. Gal. suspicatur nihil horum esse Hippoc. sed adiectionem, nihil refert. Malum fuit acutissimum exactè.

AEGROTUS VI.

Ardens Periclen morbus corripuit acutus, continuus, cum dolore. Multum sitiebat, anxius erat, potum continere non poterat, erat autem subleñosus, & capitis gravitate laborabat. Prima fluxit sanguis multus ex sinistra nare, febris intendebatur, mixtus malum, turbatum, album, repositum non subsidebat: secunda omnia exacerbata sunt. Urina autem crassa quidem erant, residentes autem magis, & anxietas lenata est, dormivit. Tertia febris remissa est. Urina copiosa, cocta, multam hypostasim habentes. Nèstem quietè transiit usque ad medium diem, sudavit sudore multo calido quarta die per totum corpus, a febre liberatus est, & indicatus. Non rediit. Acutum.

Ecce exemplum iudicationis quarti dici, quam tam raram esse dicit Gal. ut Archigeni toto vitæ tempore contigerit videre bis, & ipsi in eum usque diem, quo id scribebat, semel: quia est hæc dies caelestes causas habet adiutrices, quia est dimidii primæ septimanæ, tamen motum materię, quem causam infernam dicimus, non ita adiuvantem habet, hinc enim in tertium, aut quintum semper ferè incidit, (qui enim acuti per pares moventur ex multa materia pendent, & contumaci, ut dictum antea est, ac proinde vix possunt esse constitutionis adeo brevis) cum autem materia non obediit, causa efficiens non multum potest: Rarum ergo meritò est. Verum huic evenit, quia coenit illud quod rarum esse dicimus, tam breuem scilicet fuisse morbum & exacerbari per pares. Secunda enim, inquit, omnia exacerbata sunt, & tertia febris remissa. Fuit in hoc morbo aliud notatu dignissimum, quod iam dicam. Velut medici cum nihil nimis urget, legunt prosequuntur curationes, studentes concoctioni primam, deinde incisioni & apertioni, vltimè evacuacioni, verum aliquando virginitas cuiuspiam gratia omnia pervertunt, auxilium quod ex curatione legitima non expectant, se posse consequi, illegitimè procurantes: ita natura, cum nihil

A plurimum irritat, ordinem sibi familiaritatem retineret, retinendi primùm, & coquendi, secernendi, deinde & expellendi, cum verò irritationem, quæ multitudinem, aut qualitate sit, non potest sustinere, evacuat antequam coquat, quæ evacuaciones est ex bonâ causâ aliquando oriuntur, evenit aliquando in robustis, morbos etiam magnos, ab ipsa natura curati præpostero ordine, antequam coqueret. Id

B quod rarissime fit perfecte, imperfecte autem valde raro. Atqui cum hoc fit, evenit quiddam aliud, quod rarum etiam est, minui febre, & propria eius symptomata, materia concoctionem non consequuta, sed coquenda, quia evenit, ut etsi materię alteratio crescat aliquantum, minuat tamen quantitas magis, & proinde affectus decreseat. Exemplo est hic tegorus, qui cum laboraret acuta febre, & lienis tumore, & capitis gravitate cum dolore, & siti, & anxietate, quæ ambo calidæ intemperiei sunt familiaria, & non posset sustinere potum quin vomeret, fortasse ob eandem intemperiem debilitata retentio, aut (quod ego magis consentaneum puto) ob tenuem & multam humiditatem, quæ in melancholicis ex liene redundat, quæ solent fieri saluosi: cum inquam hæc haberet, fluxit multi sanguinis de nare sinistra, & multum multa urina turbata & albæ, quæ prima die acciderunt, adeo diminuta materia morbi est, ut tertia secunda, tendente morbo in incrementum, omnia exacerbata sunt, tamen durante expurgacione pervivens, tertia remissa, & quarta sublata febris fit. Sed quo pacto evacuaciones tam intempestivæ, ut prima die apparerent, fuerunt tam viles causæ? Certe quia etsi contigit illis id mali, ut intempestivæ fierent, contrigerunt tamen alia bona,

C sanguis enim ex sinistra nare secundum reditudinem lienis & capitis fluxit, neque fluxit stillarim, sed multus. Et duplici malo duplex evacuatio, utraque accommodatissima accessit, tumori lienis & gravitati capitis fluxus sanguinis, febrile acutæ expurgatio per urinam. Sed quo pacto tam perfecta & secunda iudicatio esse potuit, quæ ab intempestivis evacuacionibus incipit? Certe etsi ab intempestivis inciperint evacuaciones, easerunt in tempestivas. Nam urina ceperunt coqui obscure die secunda,

D tertia die iam manifestè tales apparuerunt. Quamquam ergo fluxus sanguinis, & mixtus copiosus, qui morbum minuerunt, fuerunt ante concoctionem, tamen sudor qui finivit, post concoctionem fuit, multus, & calidus, per totum corpus. Quare meritò fuit a febre liberatus nec rediit morbus.

E tertia die iam manifestè tales apparuerunt. Quamquam ergo fluxus sanguinis, & mixtus copiosus, qui morbum minuerunt, fuerunt ante concoctionem, tamen sudor qui finivit, post concoctionem fuit, multus, & calidus, per totum corpus. Quare meritò fuit a febre liberatus nec rediit morbus.

F tertia die iam manifestè tales apparuerunt. Quamquam ergo fluxus sanguinis, & mixtus copiosus, qui morbum minuerunt, fuerunt ante concoctionem, tamen sudor qui finivit, post concoctionem fuit, multus, & calidus, per totum corpus. Quare meritò fuit a febre liberatus nec rediit morbus.

AEGROTUS VII.

G **A**rdens virginis, quæ decubebat in via sacra, febris ardens corripuit, erat autem siticulosa, & infans. Fluxerunt autem mulieris primus ipsi. Sexta fastidium multum, rubor in contraxit, cum horrore & inquietudine. Septima eadem perseveraverunt. Urina tenues quidem, boni autem coloris, quæ verò circa alium sunt partes non conturbabantur. Octava, surditas accidit & febris acuta, in-

somnis erat & anxia, horrebat, intelligebat. Urine similes. Nona eadem, & sequentibus, manebat item surditas. Decimaquarta mens curabat. Febris remisit. Decima septima de naribus sanguis fluxit multus, surditas parum remisit, & sequentibus fastidium, surditas inerat, & delirabat. Vigesima pedum dolor cepit, surditas & delirium intermisit, fluxit parum sanguinis de naribus, sudore à febre liberata fuit. Vigesima quarta febris redijt, surditas rursus, pedum dolor permanfit, alienatio mentis. Vigesima septima sudavit multum, à febre liberata fuit. Surditas desit. Dolor pedum permanebat. Alia autem perfecte indicata sunt.

Ut nunquam tacere solet, femina àn vir ægrotet, ita neque nunciatum fuisse virginem. Nimirum ut sunt morbi proprii mulierum, ita & in ipsis mulieribus, virginum : ac proinde Hippoc. scripsit post morbos mulierum, seorsum de morbis virginum. Morbi mulierum, ex redundantia eius sanguinis, qui singulis mensibus solet fluere, nascuntur, virginum vero, ex ea ipsa redundantia, & seminis. Quo fit, ut horrenda ægri sint virginum mala (sunt verò eadem & iuvenum viduarum) quam aliarum mulierum. Hæc virgo non multum habuit eorum passionum, quæ virginibus præcipue familiares sunt, earum autem quæ mulieribus, multum. Nam cum laborasset febre acuta, quæ iudicata est vigesima septima, quæ ferè est postremus finis acutorum, processisse morbum ex redundantia sanguinis illius pravi, expurgatio muliebri, quæ in principio statim apparuit, ostendit. Non valente tamen evacuatione minuire multam materiam, factus est recursus ad superiora sextæ, septimæ, & sequentibus diebus : qui recursus facili cognosci poterat, ex iis quæ aderant, & iis quæ non aderant. Nimirum cessavit muliebri evacuationi, & iam non aderat, neque pro hac fluxit alius (hoc enim est, quod dicit, neque alius conturbabatur) aderat verò rubor faciei, & mastitæ, quæ significabant malum sanguinem ferri in caput, & superne oclus surditas, & perigiliun, quæ omnia pertinebant ad caput. Sed & fastidium, & horror significabant, ventriculi, & partium eius oris passionem, quæ etiam accidebat potentibus excrementis sursum. Sed cum dixisset hæc superuenisse, hædit, intelligebat, quasi aliquid mirabile, quia rubor ille, & surditas fuerant signa præsentia. Contingit tamen non tam cito lindi mentem, neque usque ad decimaquartam, quæ iudicatio quædam imperfecta est facta, febre non soluta, sed remittente, cum mentis turbatione. Nimirum mentis turbatio aliquando est signum decretorium. Non dicit quæ evacuatio decimaquarta affuerit, verisimile autem est affuisse aliquam : aut certè cum evacuatione insensili, & copiosa, ipsa suam causam abluens & dissipans febris inclinat. Non potuit tamen fieri iudicatio perfecta, erit multa ac copiosa evacuationis affuerit, quia nullæ manifestæ notæ concoctionis antecesserant. Urinæ enim tenues, & boni coloris, sunt rursus te-

noes, quas crudum morbum significare, in prognostico dicit. Itaque videtur, in principium morbi insuperos fuisse dies quatuordecim : quare meritis in totum morbum, viginti septem insuper sunt. Legitimum enim est infanti duplum principii in totum morbum. Reliqui omnes quatuordecim, post decimaquartam sequentes ordine, attulerunt aliquid insigne. Decima septima, fluxum multum sanguinis de naribus, quo surditas parum remisit (notat remisisse parum, quia & sententiam erat multum remittere) sed illa evacuatio alioqui multi sanguinis, tanto fuit minor, quam pro capitis redundantia, ut manserit surda & delira usque ad vigesimam, qua rursus recurrentibus deorsum succis, factus est ad pedes abscessus, acciditque pedum dolor, fluxitque simul parum sanguinis de naribus, & sudavit : atque ita, materia partum abscedente, partium evacuata, intermisit surditas, & delirium, & febris : surditas & delirium abscessu, & sanguinis fluxu : febris sudore. Nihilominus suspectam oportet esse hanc iudicationem, ut pote cum non esset absoluta constitutio legitima, longius enim fuerat principium, quam ut vigesima solus febris posset. Atque ita vigesima quarta febris redijt, & surditas rursus, & mentis alienatio. Illud verò habuit hæc mutatio boni, quod dolor pedum permanfit, alioqui magnus rapas in superam rursus significaretur. Vigesima septimam (quam acuti morbi esse postremum finem censeo) rursus indicat multum, & liberata est à febre, finito iam morbo legitime. Dolor solus pedum permanfit, ita ut fit, ex morbis indicari difficultibus, alia autem perfecte indicata sunt, febris scilicet, & surditas, & delirium, & fastidium, & reliqua symptomata. Unde manifestum erat, nulli quid committeretur in victu, illum morbum nullam recidivam habiturum. Nam cum intrus manet aliquid cause, etiam symptomata aliqua illorum restant.

ÆGROTVS VIII.

Abdera Anaxionem, qui decumbebat ad portas Thracias, febris acuta corripuit, lateris dextri dolor continuus, tussis erat sicca, neque expuis primis diebus. Siccitudo, in somnis. Urine boni coloris, multa, tenues. Sexta deliravit, post samenta autem calida nihil remittebatur. Septima laboriorè se habuit, febris enim intendebatur, & dolores non sunt minuti, & tussis infestabant, & difficulter respirabatur. Octava venam in cubito secuit, fluxit multum, ut debebat, remissi sunt dolores, tussis quidem arida permanserunt. Undecima febris remisit. Parum circa caput sudavit. Tussis adhuc durabat & quæ à pulmone exibant humidiora erant. Decima septima incipit pauca concocta sperere : lenatus est, sitibundus autem erat. Et eorum quæ à pulmone exhibant proba non erant expurgationes. Vigesima sudavit, à febre liberatus est. Post indicationem autem sublenatus. Vigesima septima

*febris rediit; extussit, excreavit coctam multa. A
In urinis erat subsidentia multa alba. Desistit
sistere, dorminit. Trigesimā quartā sudavit toto
corpore, liberatus est à febre & omnino indica-
tus.*

Pleuritis fuit hæc multò longior solito. Non enim solet citra suppurationem ultra vigesimum produci. Nón tamen proinde recessit à constitutione legitima; nam decimasextima videtur, finem principio, & incrementum initium dedisse, qui dies duplicati facior triginta quatuor, quibus liberatus à morbo est. Fuit enim tempus cruditatis summe usque ad undecimum, cum semper habuerit tollim siccam, & nihil excreaverit usque ad eundem diem, quo mutatione facta ad concoctionem obsecram (quæ & ipsa est principii) tussis factæ sunt humidiores. Verum decimosextimo incepit excreare pauca concocta. Est eodem pleuritis principium, cum neque multa, neque concocta excreantur; status & inclinatio, cum multa & cocta; iocrementum, cum aut multa non cocta, aut pauca sed cocta. Itaque iocrementum habuit à decimosextimo usque ad vigesimum septimum, quo excreavit cocta multa, statim ab hoc usque trigessimū quartum, quo indicatus est omnino. Mirum est, si pleuritico Hipp. non ante octauum diem venam secuerit: mirum etiam, si oecque vilo sequentium dierum, sed semel extraerit quàm extrahere erat necessarium, Galeo. putat Hippocratem secuisse etiam venam prius, neque dicere octauo venam secui, quod tunc primum, sed quòd tunc quoque venam secuerit, præter opinionem antiquam, quæ fortasse illa tempestate iouluerat, non esse secandam ultra quartum. Cui opinioni Celsus etiam, ætate Galeno posterior, præter rationem fuit. Sed si sexto die tentauerit Hipp. fomentum, & septimo obseruauerit nihil illiusuari, quia eo die febris incedebatur, & dolores non sunt imminuti, & tussis infestabant, & difficulter respiciebat: non est cur ante octauum venam secuerit. Nimirum ipsemet lib. 2. de ratione victus in acutis iubet, fomentum tentare antequam vena secetur, atque iuxta illud præceptum dicere, nunc, sexto delirauit, & post fomenta calida non remittebatur dolor. Hoc ergo dicit, quasi reddens causam, quæ de secanda vena cogitauerit, quia scilicet eodem tentatum esset fomentum calidis dolorem soluere, ille nihil remittebatur. Si igitur sexto hæc acta sunt, non mirum octauo esse secandam venam. Sed cur tam serò tentauit fomentum, aut cur tam multum in hac curatione perseuerauit, ut tam serò vena secaretur: fortasse præsensit constitutionem morbi, futuri tam longi, ut octauus dies in primam principii eius partem incederet, putauitque non tardius murti sanguinem octauo, morbi triginta quatuor dierum, quàm quatto, morbi decem & septem. Sed & semel ex-
traixit Hippoc. sanguinem, non mirabor, eum ipsemet citato libro de ratione victus scribat: neque ut copiose sanguis detraheretur est cunctandum: sed eo vique asferendus, donec rubidior multò, vel pro puro rubidoque liuidius fluxerit. Itaque Hippoc. fecit huic, quod pleuritici fieri suadet, tentauit primum calidis fomentis, deinde copiose & semel sanguinem detraxit. Non tamen proinde ego

ita fieri suadeo. Non enim opus est tentare, nisi cum dubia est affectio (non semper autem est dubia) neque scire, euacuari totum expedit, ne forte accidat produci euacuationem usque ad delirium animi, quod in thoracis inflammationibus vitandum est. Non mirum autem aliquid Hippocraticis curationibus tam multa tempora addidisse. Nam neque illud probatur, sectionem venæ non tollere dolorem, oisi is ad claviculam pertineat. Itaque Hipp. secutus suam sententiam, secuit octauo cubiti venam, scilicet internam cubiti, hæc enim est, quæ cum parte affecta rectitudinem, ut alibi indicatur est à me. Quod dextri lateris fuerit morbus potius quam sinistri, satis congruit cum Auicennæ sententia, putantis dextri lateris esse pleuritides salubiores & longiores, qualis profecto fuit hæc. Ego verò non puto, magnani habere periculi, aut securitatis, neque longitudinis, aut breuitatis differentiam, quia pro sinistri ventriculi cordis calore, est hepar locarum in dextra parte, & tribuit naturam dextro lateri arteriam maiorem. Quare aut nulla differentia est in latere, aut certe dextri est acutior, quia laus est calidius, atque eadem ratione in sinistro erit periculosior, si eam contigerit esse æquè magnam, quia erit minus congruens. Neque quod Hipp. (si modo Hipp. is liber est) dicit cap. de pleuritide ex dorso, lib. 3. de morbis, contrarium est huic sententiæ, etiam videatur. Dicit enim optandum magis, ut ex sinistra: id vero dicit de suppuratione iam rupta in hoc, aut illud laus, non de pleuritide, neque certe ob morbi magnitudinem, aut malignitatem: sed ob difficultatem curationis, quod grauius putet secare, ac vires nobilium quam viles partem. Curationis habet differentiam affectum laus. Hæc enim causa oportuit dextri brachii venam secari, & ei lateri fomenta admoeri. Synecholum esse, & iocummem, & delirare, non erant propria huius passionis. Nam si in pleuriticorum, aliquando subleuat tussis leuiter irritans. Peruigilium, & delitium patiente per osentium cerebro accidunt, quod quidem aliquando euenit plenitudo, rarius aptem euenit. Vrinae boni coloris, satis multas, & tenues, in multis pleuriticis conspiciunt. Fiant enim boni coloris etiam in principio, quod ea passio non pertineat ad venas, tenues vero ob febrem, quæ extenuat solet bilem, ut alia etiam diarria, aut etiam ut sola ira, aut fames, aut exercitatio aliquando. Euenit etiam huic, quod & plerisque pleuriticis, ut passio sanguine dolores remitterentur, tolli adhuc citata & morbo in principio consistente. Nimirum inflammatio omnis est morbus multiplex, partim in magnitudine, partim in temperamento, magnitudinem auget copia fluentis succi, intemperiem qualitas contingit ergo alterum decretere crescente altero. ac plerumque anticipat dissolutionis decrementum, materiam concoctionem, præcipue verò in succis concocta difficilibus, quales erant huic. Sed quid est quod dicit, decimosextimo eorum quæ à pulmone exant probè non erant expurgationes certe expellantur cocta, & pauca, quæ quia cocta, bonam significationem præbebant, sed quia pauca, non poterant ad minuendum morbum conferre manifestè, proinde erant bona signa, sed non vilia, id est non tam boni effectus cause, quàm signa. Indicatio dei vigesima merito fuit infusa, quia intempestua, facta

quoniam est ante perfectam concoctionem in incremento medio: quæ facta est post vigesimum septimum, fuit perfecta, & fida, quia iam inde excreant multa concocta, & in urinis fuit subsidientia multa alba. Cum verb Hipp. dicat, subsidientia multa, multo maior copia significatur, ea quæ significationem concoctionis optimæ præbere solet, quanta scilicet fieri solet in crassis succis per urinam expurgandis. Itaque hæc subsidientia, quæ alba, erat bonum signum, quia multa, bona etiam causa. Bonum autem est in morborum indicationibus, multas diversasque evacuationes fieri, etsi quædam earum sint, quæ peculatim morbo non respondeant. Multis enim opus est ad corporum purgationem. Aut enim proxima causa, quæ morbum facit evacuabitur, aut communis, quæ proximam fouet. Velut nunc excretionem expurgans est thorax: urinæ venæ maiores: sudore, totus corporis habitus: laborat verb in pleuritidis inflammatione latus, fluxionem verb illi totum corpus aliquando suppeditat.

ÆGROTUS IX.

A Bdera Herophytus capite relictus & obambulans dolebat, non multo autem postea decubuit, habitabat prope superiorem viam. Febris enim corripuit ardens acuta. Vomuit ab initio multa biliosa: Siticulosus. Difficilis tolerantia multa. Urina tenues, nigra, in quibus suspensum quid sublimè aliquando erat, aliquando autem non. Noctem laboriosam habuit. Febris aliàs aliter exacerbescbat, plerumque sine ordine. Decimaquarta verò surditas accidit, febres intendebatur urinæ eadem fuerunt. Vigesima multum delirauit, & sequentibus. Quadragesima multus sanguis exiit de naribus, & intelligebat magis. Surditas inerat quidem, minus tamen. Febres remiserunt: sequentibus diebus sanguis erumpebat crebro & paulatim: Circa sexagesimum autem fluxus sanguinis cessauerunt. Coxa autem dextra dolor fortis exortus est, & febres intendebantur. Non multo autem tempore postea doluerunt omnes inferiores partes. Contigit autem, aut febres esse maiores, & surditatem multauit hæc quidem recedere, & subleuari, infernorum autem partium circa coxam maiores esse dolores. Iam verò circa octogesimam remiserunt omnia: dereliquit autem nihil. Urinæ enim boni coloris, & copiosiores subsidientia habentes prodibant, & deliria minoræ erant. Circa centesimam autem alius multis biliosis turbata est. Et tempore non exiguo, multa huiusmodi prodibant, & rursum dysenterica cum dolore. Aliquam autem quies. In summa febres desecerunt, & surditas cessauit. In centesima perfecte indicatus est. Febris ardens.

A In morbis lōgis rariore esse diēs indicatōris, vique adeo, vt perinde sit in illis quadragesimos & vigesimos notare, atque in acutis septimas, & quatermiones, dictum est antea, & ex hac narratione etiam intelliges, quæ post vigesimum semper per vigesimos facta additio est, quadagesimi, sexagesimi, octogesimi, & centesimi mentione facta. Quidam etiam centesimum vigesimum scribunt, ita scilicet centesimo vigesimo perfecte indicatus est. Verum in meis codicibus Græcis non habeo eam lectionem: sed centesimo perfecte indicatus est. Galenus non explicat in commentariis qualem habuerit. Illud est notari dignissimum, omnes vigesimos attulisse magnas mutationes. Sed petenramus narrationem à principio. Non parum refert scire, an ante morbum pars aliqua doluerit, quia in eam morbus firmatur. Proinde narrat, Herophytum ante morbum rectum & obambulantem capite doluisse, vt scias merito per morbum delirasse. Febris, inquit, cum corripuit ardens, acuta, vomuit ab initio multa biliosa, siticulosus, multa difficilis tolerantia. Hæc omnia multa & acerrimam bilem indicat, vt & urinæ tenues nigra, quæ vitionem magnam indicant in hoc ægroto, cum non responderet color niger spaciei propriæ materiæ morbi. *Expositio* periphrasi quod apparuit aliquando, aliquando non, dictum iam (scpe est) doliorem portendere. Sed quam noctem intelligit, dicens, noctem laboriosam tulit? Nam nullius diei huiusque meminit: sed vnicam narrationem fecit omnium vsque ad decimum quartum. Dubium alterum videtur posse significare, aut noctem decimi tertii, proximam scilicet decimo quarto, & quæ eum diem inchoauit, quia noctes quæ accessiones antecedit, aut indicationes, difficiles sunt: aut (quod magis probò) dixisse noctem, non, quæ vnam quandam noctem, sed quod noctem per eam morbum laboriosam ferret, quàm diem semper, aut plerumque. Nam quasi de multis diebus narrationem faciens dicit, febres aliis aliter exacerbescbat, plerumque sine ordine, idest, nunc vt tertiana, nunc vt quotidiana, nunc vt quartana, plerumque tamen sine villo ordine. Decima quarta, tendente iam malo in phrenitidem, facta est surditas, quæ est signum phreniticum diximus iam non semel. Est vrinæ eadem sicut tenues arbitror eum appendiculo sublimi, & febres intendebantur, calidis siccis fursum agnatis. Merito ergo vigesimo, & sequentibus vsque ad quadragesimum delirauit multum. Quadragesimo multus sanguis fluxit de naribus, & indicata est phrenitis lenè ac imperfecte, melius enim intelligebat, & surditas minus aderat, & febres remiserunt, nihil tamen horum omnino dereliquit, neque euacuatio semel facta est, sed sequentibus diebus vsque ad sexagesimum semper fluxebat sanguis, crebro & paulatim. Sexagesimo cessauerunt sanguinis fluxus, & per mutationem facta ad partes infernas superuenit primum dolor dextræ coxæ fortis, qui vt alii fortes dolores solent, febres auxerunt, paulo post eam dolores partium omnium inferiorum, femorum fortasse, & genuum, ac extremorum pedum, ant coxarum, & lumborum. Verum non est firmatus satis hic abscessus, sed succis reciproè, nunc sursum, nunc deorsum motis, contigit à sexagesimo ad octogesimum, aut febres esse maiores, & surditatem multam, infernorum vero partium dolores

miiores, a ut febres & surditatem recedere, & subleuari (non enim omnino recedere) inferoarum autem partium circa coxam dolores esse maiores, iam verò circa octogesimum remiserunt omnia. Iam scilicet, per multas evacuationes, & multos abscessus, imminuta materia: dereliquit autem nihil, vtpote nulla in parte sanis consumptis excrementis. Tamen iam hinc melius habuit: nam & deliria minora erant (vnde constat hunc, plus aut minus semper à vigesimo die delirasse) & fuit hæc in melius mutatio, firma & secuta, quia concoctionis notæ apparuerunt, in urinis boni coloris, & habentibus subsidentias multas: quæ quidem, quia boni coloris cum subsidentia, concoctionis notam præ se tulerunt, quia verò subsidentias multas habebant, fuerunt vires euacuatioes. Iam hinc, vt fieri solet, semel cepto morbo vincimur, multæ processerunt euacuatioes. Nam circa centesimum atque multo huiusmodi prodibant, factæ scilicet diarrhæa, & rursus eisdem excrementis lædentibus viam, accidebant dysenterica cum dolore. Aliorum verò (inquit) quies; dolorum scilicet aliorum, & febrium; & surditatis. In summa (inquit) febres desierunt, & surditas cessauit, Centesimo per se ite iudicatus est. Scriptum est io sine, febris ardens, vt in aliis historiis, & in quibusdam phrenitis. Quas quidem voces semper putat Galen, adiectas: æquifortasse non sunt. Verum hic morbus non semper fuit febris ardens (nam non habuisset tam longam constitutionem) sed multas fecit mutationes. Vique ad diem vigesimum fuit febris ardens, inde vique ad quadragesimum fuit phrenitis, inde vique ad sexagesimum fuit etiam phrenitis; sed cum fluxu sanguinis de naribus declinans ex acutie, à sexagesimo ad octogesimum fuit ite vocatus morbus, seu dolor coxæ; ab octogesimo diarrhæa, & dysenteria vique ad centesimum, qui fuit morbi finis.

AEGROTVS IX.

Abderea Nicodemum ex Venere & potu febris corripuit; initio fastidiosus erat, & cardialgicus, & siticulosus. Lingua vasa. Urina tenuis, nigra. Secundo febris exacerbata est cum horrore. Fastidiosus, nihil dormiuit. Vomuit biliosa flaua, urina similes. Noctem quietam habuit, dormiuit. Tertio remiserunt omnia, & quies erat. Circa Solis occasum rursus subdifficilem habebat tolerantiam. Noctem laboriosam transiit. Quarto rigor cepit & febris magna, omnium dolores adierant, urina tenuis in quibus suspensum quid erat, delirauit multum. Septimo tranquillitas adfuit. Octauo alia omnia remiserunt. Decimo & sequentibus manserunt quidem dolores, leuiiores autem omnes. Accessiones autem & dolores huic vsque ad finem in diebus paribus magis contingebant. Vigesimo urinam reddi-

dit albam, cui crassities inerat, reposta non subsidebat. Sudans multum, visus est à febre liberatus. Vespere autem rursus incaluit, ijdemque dolores perseuerarunt cum horrore & siti, parum delirauit. Vigesimo quarto urinam reddidit copiosam, albam, in qua multa subsidebant. Sudore copioso & calido diffusus est per totum corpus, à febre liberatus est & indicatus.

Vix est vllum morbi genus, quod non possit vtpote nimia facere, quam facit malignas focorum putrescentias, & omnium partium principum debilitates, & nervos emollit, & fluxiones commouet, & cruditatibus replet. Vtuntur verò plurimo vtpote, qui à nimia venere, & eam etiam ob causam multo plus ea mala incurruunt. Vt verò vtiuntur, enent, quia ii maxime sunt Venere dediti, qui & Baccho, sed & qui Venere indulgent, sentientes sese debilitati, vinum, vt debilitatis temedum, appetunt, euenitque illis multo lædi magis, quia vinum ipsum caput & neruos tentat, & fluxiones commouet, & incoctum cruditates auget, si tamen coqui potest, calefactis febresque excitat, sique vt, Venere naturalem calorem minnente, & vino præter naturalem augente, febres fiant malignæ, vt huic accidit, & adolenscenti Melibee, de quo postea scribetur. Valde familiaris est febrieticumque ex Venere cardialgia, hoc est, oris ventriculi dolor, & inde anxietas. Prompte enim debilitatem sentit ventriculus, & cum genitalibus habet magnam sympathiam. Merito ergo primo die hoc habuit hic ægrotus, & secundo vomuit biliosa flaua, idest sincepta. Habuit etiam fastidium, se sitim, & linguam visci, quæ febris vrentis signa sunt. Urina tenuis, per incoctionem accidebant, nigra fortasse ob passionem renum, qui nunquam bene habent in venere deditis. Secundo febris exacerbata est, sed & quarto & sexto, quantum suspicor, etsi id non dicat, quia paulo post dicit, accessiones & dolores huic vsque ad finem in diebus paribus magis contingebant. Sed quo pacto verum possit hoc esse, cum paulo ante hæc verba dixerit, octauo alia omnia remiserunt: decimo & sequentibus inerat quidem dolores, minus autem omnes: Certe ob hanc ipsam causam, quia inquam hoc dixerat, monuit in medio narrationis, cum idio sine solet dicere, dolores fuisse diebus paribus. Quasi dicere, etsi octauo alia omnia remiserunt, & decimo & sequentibus, poita duodecimo, decimoquarto, decimosexto, & decimooctauo fuerint dolores minores, non ita tamen, quin octauus difficilior fuerit septimo, faciliior tamen secundo, quarto, & sexto. Ac proinde dixit octauo remiserunt alia omnia, non scilicet quæ fuerant septimo, sed quæ aliis diebus paribus, & prioribus. Ita etiam decimus, & sequentes patet attulerunt quæ priora symptomata, quam patet prioribus, sed maiora quàm imparis quia ipsis proximis imparibus fuerunt difficiliores; ac proinde noctes imparium difficiliores, & parium faciliores: quod & in Pythionis historiis oortum est. Sed qui factum est, vt in morbo vigesimo quarto iudicando, dolores ab octauo minus ceperunt? Nonne circa initia, & fines sunt omnia symptomata imbecilliora, &

cani conspiciunt, ac vigent, ita. Ita? Certè ita est, A
venit verè id (vt suo loco diximus) intelligendum
de symptomatis propriis, & quæ fluxerunt à pro-
pria morbi essentia. Quædam enim alia, quæ mor-
tum materiam sequuntur (sunt læsiones quædam, si-
mul cum morbo oras à causa aliquæ prociharidica,
decretere solent antequàm morbus. Velut nunc,
cardialgiæ, & anxietatem, & quædam alia, quæ
non tam faciebant febres, quàm simul cum febre re-
cens defatigatio à venere, contigit conquiscescere, an-
tequam ipsa febris. Horror & rigor cum non sunt B
proprie febrium figuræ, significant malignam qua-
litate succorum, aut passionem partium nervo-
rum. Sed & urinx. rationem quandam habue-
runt causæ, non signi solum in hoc morbo. Nam
cum à principio, dictis ob causam, fuissent tenues
& nigre. & sexto tenues etiam cum appendiculo
(sublimi arbitror) vnde & delitavit, vigesimo
minxit album crassum non subsidentem, vt lacteam
scilicet, aut puri similem urinam, multitudine hu-
morum in renibus, & circa genitalia, velut suppu-
rata, & scientia ea via viderem evacuationem. Vig-
esimo quarto, eadem ratione, minxit multum, can-
didum, & multam subsidentiam habens. Vtroque
etiam die sudavit multum, vigesimo quidem quar-
to plus. Sudor verò is qui ex Venere male habent
congruit plurimum. Quia venere putrescit semen,
quod computrescit rotes partium, vtpote analo-
gos succos. Vt, bacratione mihi persudicem, sole-
re nonnunquam hoc eo vsque procedere, vt ob
solum Venere immoderatum vsum, citra ullam
contagionem, fiat id vitium, quod morbum Gal-
licum vulgo appellant. Vt ergo eo morbo laboran-
tibus, ita quibusvis, qui à nimia Venere ægrotare
coeperunt, congruit sudor, nisi sit nimius vt dissol-
uat vires.

AEGROTVS. XI.

IN Thaso mulier morosa, ex amore cum oc-
casione, recta & obambulans, in somnū fa-
cta est, & cibum non capiebat; & stitiosa
erat, & anxiosa. Habebat vero prope Pyladem
in Læto. Primò sub initium noctis, terrores,
sermões multi, tristitia, febricula tenuis.
Manè convulsiones multa contigerunt. Cum
autem intermisset convulsiones illa multa,
deliravit, turpia loquebatur. Multi dolores,
magni, continui. Secundo eadem. Nihil dormi-
nit. Febri acutior. Tercio convulsiones quidem
desierunt, coma autem & cataphora eam deti-
nerunt, & rursus expergescens exiit, con-
tinere se non poterat. Multum delirabat, fe-
bris acuta erat, per hanc verò noctem sudor co-
piosus & calidus toto corpore dimanavit. Libe-
rata est à febre, dormiuit. Omnia intelligebat.
Indicata est. Circa tertium autem diem urina
nigra tenuis erant, suspensum quid verò ha-
bebant valde rotundum, non subsidebat, citra
indicationem autem muliebria multa fluxe-
runt.

An mulier hæc morosa antea fuerit, an ex morbo
morosa sit facta, non explicat, vtrumque autè hoc fit,
interens ex occasione, facta est melancholica. Non
enim quia melancholica, cepit esse morosa, sed
postea id est ex causa manifesta: cum antè moror
duraret plurimum, aut esset maximus, adeo vt erectè
ad huc caperet præ morore, neque dormiret neq;
cibum peteret, & esset stitiosa, facta est melanco-
lica. Nimirum vt in apbor. dicitur. Mors & me-
lancholia longo tempore perseverantes. melancholia si-
gnificat quia aut ex melancholia procedunt, aut si
quàm maximè procedunt ab occasione, melancholia
faciunt. Imaginationis enim, & cordis debilitatè pa-
riunt, vt illa facili terret, & hoc facili terreatur, & san-
guinè facit crassiorè, & sicciorè. Quod quidè huic
evenit per vigiliæ, & inedia.ambo enim hærescunt.
Sed & per vehementes motus animi, obliuiscitur na-
turalis facultas suorum operum, quare & eo cibo qui
accipitur minus fruiuntur partes, & naturales, neces-
sariæque evacuationes minus fluunt, vt huic epacu-
tiones interstunt minus, arborior, fluxerant. Nam &
equè is huius morbi id indicavit, qui illis fluentibus
solutus est, & ita solere fieri certò scimus, Næ & cum
fluunt, si terror aliquis, aut tristitia nuntii superuenit,
sisti solent, multo autè facilius retinentur, cum non
dū fluunt. Sin autè, vt est consentaneum, buic non
secundum naturā fluxerunt, hæc ipsa satis magna oc-
casio fuit caco chymicæ melancholicæ. Vnde factū est,
vt phrenitis hæc fuerit melancholica, & tota affectio
velut ex phrenide & melancholia mixta, & vt ma-
niaca & cum terribus, ac nonnunquæ exidido, de-
lirauerit. Nimirum species, seu modus delirandi, duo
semper solet transferre, & succi, qui in corpore esset, spe-
ciè, & occasione delirandi. Succus speciem, vt qui ex
sanguine delirant cum risu: occasionem, quia solent
delirantes alia loqui, qualia iam iam deliranti cogi-
tarunt, præcipue vero cū, ex forti aliqua imaginatio-
ne delirium inchoavit. Itaque motus animi vebemē-
tes, multum, & multis modis lædere solent, magis au-
tem mulieres, & viros debiles calido innato, aut im-
prudentes. Nimirum cum illi motus sint innati calidi,
eius debilitas facit ad facile passionē: sed & imprudē-
tia, prudētia enim omnes eos motus teporat: vtrique
autem ratione magis afficiuntur scēminæ, quàm viri.
Accedit his naturalis illa mulieris evacuatio, quæ sup-
pressa multos & horrendos morbos facit, quos Hipp.
libris de morbis mulierum, ac multo magis libello de
morbis virginum complexus est. Quædam ergo ear-
um solent præ morore tabescere, atque adeo præ
tabescente mori, nunquam prius febricitantes, quàm
laborent febribus hædicis. Quædam alie ob sangui-
nis malam qualitatem, & eam evacuationem suppressio-
nem, præoccupantur febribus acutis, quæ ob cordis
debilitatē passionem, & eerebri cum corde cōpassio-
nē, atque alia etiam ratione, ob cōpassionem vtrius-
que (cordis dico & cerebri) scū vtero, in quo illæ ex-
crementorum suppressiones contingunt, laborat de-
liquis animi, & deliriis, & cōvulsionibus, & ob ma-
lignam materiam qualitatem, non vtrumque infamant,
sed nunc furibundè, nunc procaciter, nunc deuotē-
tes sese, nunc loquentes turpia, vt vulgus hominum
imundis spiritibus eas potest vexari. Talis ergo
fuit hic morbus, adeo acutus, vt tertio die indicatus
fuerit, cū fuerit phrenitis. Vt minis iam hæc admi-
rationis habeat, quartum huius ordinis ægrotum
ex phrenide die tertia esse mortuū. Difficile enim

est morbum quemcumque ante suam constitutionis
 tempus solus, quam egrum ex eo mori. Sed virtusque
 iam in phrenitide fieri posse cognovimus, scilicet est
 phrenitis aliquando tam acutus morbus. Sed percur-
 ramus brevis lingua, quæ acciderunt. Facta, inquit,
 est insomnis, *ἄνους*, id est cibo abstinent, & siticulo-
 sa, & *ἀνός*, id est, fastidiosa. Sed quorsum hæc di-
 citur videtur enim idem esse dictum, cibo abstinent, &
 fastidiosa. An non est? Sed *ἄνους* est, qui non capit,
 quacunque causa id fiat, siue quia non vult, siue
 quia non habet, siue quia fastidit: *ἀνός* vero qui
 fastidit. Petinde ergo est, ac si diceret, non capie-
 bat cibos, sed neque poterat, quia erat fastidiosa.
 Accedit, quod *ἀνός* videtur significare quiddam
 aliud, nam & fastidiosum, & anxium. Primo, in-
 quit, sub noctis initium terrores, & sermones
 multi, & tristitia (hæc ob dictas causas) & febrili-
 cula tenuis, quia cum vitus sanguis esset, phreniti-
 dis materia non poterat magnam flammam excita-
 re, sed lenis vti, convulsiones etiam multæ. Ob
 hæc convulsiones quas in tristibus, & ipsas expe-
 riti solemus, putat vulgus hominum, epilepsiam, &
 convulsiones omnes, esse passiones cordis, siunt
 verò hæc omnia per compassionem quas explicui-
 mus. Quanquam in hac muliere, rapto in caput
 sanguine, propriæ eius passio, & phrenitis facta est.
 Quo magis consentaneum erat conuelli. Cum au-
 tem intermisissent convulsiones, excussis excre-
 mentis ex nervorum radicibus, & hærentibus cir-
 ca cerebri substantiam, deliravit, & loquebatur
 turpia diæti ob causam. Dolores multi continui ma-
 gni: hi fieri solent in nervos irroentibus excremen-
 tis: unde per tales passiones, cum non tenentur de-
 liquio, aut apoplectica aliqua passione, gravissimè
 vociferantur. Secundo fuerunt eadem, & febris
 acutior, morbo eunte ad summum. Tertio desie-
 runt convulsiones, quia arbitror, inieperunt iam
 eruti in nervis in carnes, & deturbati à capite ad
 vterum excrementa, unde acciderunt sudores, &
 menstrui fluxus. Sed factum est coma, & cataphora,
 ob antegressam arbitror defatigationem, ex qua re-
 creata rursus vigilavit. Illud & cataphora, decla-
 rativum tantum est. Nam nihil aliud est coma,
 quam cataphora apud Hippocritem, ut Galenus
 explicat lib. obsoletoarum vocum Hippocr. Cum
 verò nondum esset facta è corpore euscuatio, non
 evigilavit placide, sed exilit, & continere se non
 poterat, & delirabat, & febris maior. Hæc erant
 decretoria; quibus cum fuisset dies difficilis, suc-
 cessit ad noctem iudicatio, cum sudore calido per
 totum, & liberata à febre, reliquum dormivit, &
 intelligebat facta iam iudicatione. Sed qui potuit
 esse fecura, cum vrina tenui & nigra, & enzotema-
 te rotundo, non subsidente: Hoc enim, visum est
 a coctionem sanguinis: illud, atram bilem & cru-
 ditatem significabat. An hæc vrina ob instantes
 euscuationes menstruas fiebat? Successit ergo eua-
 cuatio, quam verisimile est, mulierem perlassisse,
 reliquisque multo magis sanam, quam antequam
 egrotaret, atque adeo deposuisse merorem. Sæpe
 enim excrementa, quæ ob animi passionem conge-
 ri ceperunt, eam ipsam passionem conservant &
 augent, nec eam deponi sinunt, antequam ea eua-
 cuata sint.

AEGROTUS XII.

Larissa virginem febris corripuit ardens
*Lacuta; Insomnis, siticulosa, lingua fuligi-
 nosa, arida. Vrina boni quidem coloris, sed
 tenues erant. Secundo laboriose se habuit, non
 dorminis. Tertio multa fluxerunt ab aluo, ut
 aqua biliosa, & sequentibus fluxerunt hæc
 cum bona tolerantia. Quarto vrinam reddi-
 dit tenuem, paucam, habebat suspensum quid
 sublime quod non subsidebat, deliravit sub
 noctem. Sexto sanguis ex naribus copiosus &
 multus effluxit, horrore correptæ est & sudore
 copioso & calido persusa per totum corpus, à fe-
 bre liberata est & iudicata: Per febris autem
 & iam perfectæ iudicatione muliebria tunc pri-
 mum fluxerunt, virgo enim erat. Perpetuo au-
 tem stomachi fastidio laborabat, horrebat; fa-
 cies rubor aderat, oculorum dolor, capitis gra-
 vitas. Hæc non passa est recidivam sed iudica-
 ta. Dolores paribus diebus contingebant.*

Bis dicit fuisse hanc virginem, insipians, occasio-
 nem ægrotandi fuisse, quod tunc primum menses
 ei fluxerunt. Ita enim dicit, muliebria fluxerunt
 tunc primum, virgo enim erat. Merito quidem hæc
 dicit simul. Non enim sunt mulieres maturæ viris,
 antequam menses fluant, & præter naturalem ordi-
 nem sit, si quæ aote id tempus nubet. Morbus itaque
 vaginalis hoc fuit. Nimirum plerique mulieres mor-
 bo aliquo tentatores, cum iam instat tempus mulie-
 bris fluxus, quia adolescentulis Venerem in expertis
 exigui sunt vteri, & viæ omnes, quæ ad vterum fi-
 niuntur, angustæ, quæ angustia facit difficilem pri-
 mam mensium excretionem. Quo fit, ut quibusdam
 quibus angustis est plus, aut debilitatis facultatis ex-
 pultricis, aut crassitiei succorum, eo tempore pro
 bona & salutari excretionem, fiant obstructio nes mul-
 tæ viscera. Aliis verò non hæc sunt, sed fluunt me-
 dioctiter menses, tamen ob sanguinis agitationem
 insolitam (omnia enim insolita mala fert natura ma-
 le) quam facit secretio, quæ euscuatione antecedit,
 corripuntur febribus, à quibus liberantur fluctibus
 mensibus, ut huic evenit. Constitutionem habuit

F hæc & alia omnia febribus ardens. Nam intra primam
 septimanam finita est, & fuit à primo die ardens, acuta
 insomnis, siticulosa, lingua fuliginosa, & arida. Vrina
 primo die tenues & boni coloris, quales scilicet sunt
 he, de quibus dicitur in prognostico, rufa tenuis cru-
 da significat ægrotationem. Secundam diem laboriose
 transiit, magis scilicet quam primum, quia morbus,
 vi morx dicit, dies pares habuit difficiles, & non
 dorminis. Vbi legimus, tertio fluxerunt ab aluo
 multa, ut aqua biliosa, habebat in quibusdam codi-
 cibus *ἰσχυρὰ* id est coloris aquæ. In aliis *ὑδαρὰ*,
 aut *ὑδαρὰ*, (nam idem est) id est, ut aqua co-
 lore chlora. Quam quidem lectionem censéo esse
 legitimam, quia aquæ nullus color est. Quare si
ἰσχυρὰ vellet Hippocrates dicere, diceret aquo-
 sa, ut solet. Accidit quod vox hæc *ὑδαρὰ* pro
ἰσχυρὰ est familiaris Hippocrati, ut Gale-
 lib. obsoletoarum vocum Hippocratis. Quoniam

verò chloeam, vt in commentatione prognostici dixi, significat flauum & viride, & ambo hi colores sunt bilis. transiit autem ego, vt quia bilioſeque quidem fluxerunt tertio & ſequentibus cum bona tolerantia. Quæ quia tenues & colore tali prædixit, cruditatem morbi & bilis redundantiam ſignificabant, & ſymptomaticæ erant. Sed bona tolerantia ſignificabat non eſſe inutiles. Quarto mixit paucam, quod tunc fieri ſolet, cum in ſuperiores partes ſucci tacti ſunt, aut certe aliam in partem. Fortaſſe enim huic deiectioni aquoſa vrina minuit. Suſpenſum quid verò ſublime nunquam notat. Hippocrates, quin aut eadem, aut ſequenti die dicat ægrotum deliraffe: quod & huic ad noctem contigit. Sexto per nares fluxit mulus & copioſus ſanguis, euacuatusque illac eſt ſanguis, qui ſeſem caput collegerat, & reliquus qui per rotas corporis venas putreſcebat, in habitum corporis exiit, & fecit primo horrorem, deinde exudatum eſt, & mulier ſoluta à febre, & iudicata. Non tamen fuiſſet rura iudicatio, niſi tunc illi fluxiſſent menſes, ea enim fuerat occaſio febricitandi, vt diximus. Quod quidem vel illud confirmat, quod per epilogram addit, dicens, perpetuo ſtomachi ſuſtudio laborabat, horrebat, rubor faciei aderat, oculorum dolor, capitis grauitas. Hæc enim omnia retentionis menſtruoꝝ ſigna eſſe ſolent. Sed qui fieri potuit, vt die omnium peſſimo, ſexto iocum, iudicaretur, & nulla ſuccellerit recidiva, cum niſi diebus impaſibus febris reliquerit, ſoleat reciditare, vt in aphoriſmo dicitur: Ipſemet Hippocrates reſpondet, quia dolores diebus paribus. Nam vt dicebatur primo Epidem. quæ paribus moriuntur, paribus iudicantur.

DECIMVS IIL AEGROTVS.

A Pollonius Abdæra morbum diu rectus & obambulans ſuſtinebat. Magna autem illi erant viſcera, & circa hepar dolor conſuetus multo tempore comit abatur, & tunc ſanè icterici factus eſt, flatuoſus, colore ſubalbido. Cum cibo & potu intempeſtuo uiceretur & præcipue carne bouina, primò incaluit parum, decubuit. Cum verò uſus fuiſſet copioſo lacte, cocto crudoque, caprino & ouino; prauaque victus ratione, ingreſſes omnium leſiones factæ ſunt: nam febris exacerbata ſunt, nec uenter quicquam ex ingreſſis effatu dignum reddidit. Vrina tenues & pauca prodibant. Inſomnis erat. Inſtatio mala aderat, multa ſitis, comatoſus, hypocondrii dextri elenatio cum dolore. Extrema omni ex parte ſubfrigida erant, parum delirauit, omnium quæ locutus eſſet obliuiſcebatur, mentis compoſ non erat. Circa decimam quartam verò ex quo cum riguiſſet incaluit, decubuit, & inſaniuit, clamor, perturbationis, ſermones multi, ruſusque ceſſatio, & comatunt temporis acceſſit. Poſtea verò aluus turbata eſt multo, bilioſis, meris crudis. Vrina nigra erant, pauca, tenues, plurima anxietas. Deiectiones varie erant, aut enim nigre, & pauca & arginoſa erant; aut pingues,

A & crude, & mordaces, poſtea verò videbatur etiam lacti ſimiles reddidiſſe. Circa Vigintiſimum quartum autem lenius ſe habuit, alia verò eodem modo manſerunt, parum autem ad mentem rediit, verum ex quo decubuerat nullius recordabatur, ruſusque celeriter deſpiebat, procedebant omnia in deterius. Circa trigeſimum diem febris acuta corripuit, alui excrementa copioſa erant & tenuia, delirauit, extrema frigida erant, vox deſecit. Trigeſimo quarto mortuus eſt. Huic ex quo cum uidi, uſque ad finem aluus turbata fuit, vrina tenues, nigra, comatoſus, inſomnis, extremitates frigide, delirauit uſque ad finem. Phreniticus.

Narrat Hipp. & apparatus morboſum, quem ante hanc febrem habuit Apollonius, & occaſionem proximam febricitandi, & occaſionem, quæ cum modicè cepiſſet febricitare, deinde grauius quam principio eggorauit. Fuit verò apparatus morboſus, quod eſſet magnis viſceribus, hoc eſt maiori quàm ſecundum naturam hepate & liene, & circa hep ar haberet dolorem continentium multo tempore. Vnde fiebat, vt etiaſi obſtaculis ſeſe multo tempore ſuſtineret, ideſt magno cum labore, & viſ ſeſe potes ferre, ſuſtineret. Atq; ob viſcerum affectionem hebetaretur, & colore ſubalbido, vt ſimul laborare uideretur incipere, ictero & lencophlemaria. Nimirum laborabat obſtructionibus magnis, & tumorib; ſcirrhioſis hepatis & lienis. Dolebatque hepar, cum adhuc per recentem fluxionem eius meliora diſtenderetur: lien natura ſua habet minores dolores, quàm reſes & hepar, & maiores quàm pulmo: huic verò nō dolebat, quia erat fortiaſſe magis ſcirrhioſa, ac proinde indolens affectionio: hepatis erat etiaſi flauoſa. Verum obſtuctiono hepatis fecit, vt ſoler, icterum obſtucta via veſicæ felis: hydropsis verò inſitit fecit hepar reſtigitatum, aut per ſeſe à ſuccis eo loco hærentibus, aut potius à liene. Itaq; icterus accidit, non tam quod multa bilis gigneretur (nā qui poſſet in frigida affectione hepatis) quam quod non expurgaretur, hydropsis verò ob cruditate. Cum tam morboſus eſſet apparatus, leui occaſione febre correptus eſt, vt certe ſolæ qui talibus laborant obſtuctionibus, ob diſficile ſuccorum diſpenſationem per corpus, & facilem putreſcentiam corſi quæ oppilata ſunt. Quo ſi, vt crebro, nunc ex facilis occaſionibus, nunc etiaſi ſine illis febricitent, & euacuationibus indigeant. Huic verò occaſio fuit, quod aliquando laute bibat, & comedit bouinam carnem: carnem con coctu diſficilem, & ita diſficile putreſcentem. Primum ergo incaluit modicè & decubuit, fuiſſetque fortiaſſe lenis morbus, ſi probò eſſet uſus victu. Verum acceſſit alia occaſio ingruſceſcendi, nā quia iam febricitans uſus eſt lacte multo, nunc crudo, nunc cocto, nunc caprino, nunc ouino, & in ceteris etiam victu prauo, factæ ſunt omnium leſiones, ideſt, omnes leſiones magnæ. Nimirum lac dare febricitantibus malum eſt, præcipue verò obſtuctione, & inflatione viſcerum laborantibus. Flatus enim multos parit pars lactea, & obſtineat caſeoſa. Corruptur facili lac, & nonnunquam in gramom conſcreſcens malignum ſatietatis genus parit. Explicans vero quas leſiones omnium diſcreti addit, febres enim exacerbatae ſunt, & aluus ex ingreſſis

nihil mentione dignum reddidit. Quasi diceret, corripit lacte creverunt febres. Id autem, unde in suscitatus solet auxilium expectari, non adfuit, quia nihil mentione dignum reddidit alius, quod referret cibos ingestos. Vixit tenuis & paucis prodigant, (tenuitatem cruditas, paucitatem faciebat venientia febris, aut capitis in superiora) infomnis erat & comatosus. Nimirum anxia dictum est multos huius tempestatis fuisse, qui laborantes comare vigili, neque dormire neque vigilare poterant. Huic verò periculum fecit febris magnitudo, coma lachrymas: velut ista fecit inflationem malam lac. & melanciam suam febri. Hypochondrii dexteri elevario cum dolore, accedente magna febre, & ingente siti, significabat hepatis tumorem fictum esse phlegmonosum. Ad quod etiam referri poterat extremum frigus, & quod in primis diebus parum debrat: nam in hepatis inflammationibus sæpe delirant per confusum. Cum verò læsio partium omnium principum procederet, malo iam tunc in phrenitidem, corripuit eum oblitio omnium que loquebatur, & mente motus est: quod quidem gratius est dicti, quam parum deliravit. Hæc acta sunt usque ad diem decimumquartum, quæ omnia cumulatè nullis nominatis diebus narrauit, quia forte non affuit mox à principio ægroti, quod ille insinuat, postremis historiarum verbis dicens, huic ex quo ego illum vidi, quasi non à principio viderit. Circa decimumquartum, inquit, ex quo cum rigusset incaluit, decubuit. Sed quo pacto dicit decimoquarto decombuisse, quem dixerat primo die febris decubuisse? Certe legendum cenfeo circa decimumquartum, ex quo decubuit, cum rigusset incaluit, insaniuit. Aut circa decimumquartum, ex quo cum rigore incaluit, decubuit, insaniuit. Hoc verò insaniuit, plus etiam significat quam delirare, & mente moueri, quæ antea acciderant. Quæ aperte explicat Hipp. his quæ addit, vociferatio, turbatio, sermones multi. §. *ad 10*, inquit, *Hyeme*, & comatunc temporis comitabatur, quasi diceret, tanto tempore laborabat cerebrum, ut cum non erat futurus, esset comatosus. Post hæc fuit albus turbatus, multis, biliosis, meris, crudis. Crudis non vi quæ anonomatice dicuntur cruda (ea enim sunt pituitosa) sed vi biliosa sunt cruda, tenuibus scilicet. Non tamen semper erant deiectiones eadem, sed varix, nunc enim quales dictæ sunt, nunc nigre & panice, nunc æruginosæ, quæ indicatæ vltimo, nunc pingues, quæ colloquatione, & crude & mordaces, id est, quales ex corruptione ciborum male concoctorum in venere. Nam per ventriculi sariates, cibi, qui non coquantur ut oportet, corruptiones quasdam recipiunt, nunc acidas, nunc acres, nunc secundum diuersas partes, ambas: amibz verò sunt mordaces. Esse verò has deiectiones ex corruptis cibis, indicauit subsequens deiectiones. Nam postea, inquit, videbatur lacti similia reddidisse, ex lacrimis scilicet quibus se repleuerat. Interim vixit erant nigre, panice, tenues, quas lethales esse, sæpe iam dictum est. vt & commemoratas omnes deiectiones, maxime accedente multa difficili tolerancia: quod quidem significat vires maxime languescere. Circa vigesimum quartum, qui erat videsimus à decimoquarto, quo insignis acuties accesserat morbo, ac proinde, vt contemptibilis consideratur est ab Hippocrate, fuit *ad 11* *peripneumonia*. Hoc est, minus

A anxius & tristis, & videbatur sibi melius habere, eratque proinde cum minori desperatione, alia autem eodem modo manserunt: quod est, vixit autem & deiectiones, alique mala signa, ex quibus poterat medicus agnoscere moriturum hominem, eodem modo manserunt: minus autem delirauit. Vix inquam vixit moritur, quin aliquando antequam decedat, videatur sibi, & vulgaribus qui adfunt, habere melius. Medici verò ne leuiter his fidat, sed consideret, an reliqua eodem se modo habeant, an scilicet signa pessima, & quæ maximi momenti sunt, quæque vulgus non intelligit, perseuerent adhuc. Adit Hipp. quiddam aliud, quod video multos, vulgares etiam, solet animaduerrere in morituris. Ex quo, inquit, decubuit nullius recordabatur. Nimirum omnium eorum quæ quis amat recordati. & de eis loqui per morbum, bonum signum est, & vitale hunc esse homines dicunt, quia de hac vita videtur cogitare: contra, si quis neque charissimæ uxoris, neque dulcissimorum pignorum videatur vllam curam habere, neque amicorum, quos vnice diligebat, recordari, neque rerum quibus oblectari consueuerat, grane admodum est, & lethale; neque causa est obscura. Omnia enim quæ simplicia sunt, quæ in eis aderant cum bene valerent, bona, quæ dissimilia, mala. Ita ergo & sermones & curæ. Nam vt in summa dicatur, ægrotum non esse sui similem, grane est. Non tamen vt erat valde obliuiosus, ita multum semper delirabat; sed celeriter ex *vixit*, id est, ad mentem reuocabatur facile ad rerum autem recordationem, & consuetudinem, nunquam. Ita procedebant omnia in deterius. Quare mortuus est circa trigessimumquartum, quartum, qui à primo totius morbi erat indicatorius, quæ vigesimo septimo, qui est finis acutorem, a dicit septimo, & à decimoquarto, quo morbus comparatur maiorem acutiem, est vigesimus. Vt iam hinc intelligas, non solum esse habendam rationem dierum contemplabilium à primo; sed pariter ab hoc & ab eo qui attulerit insignem mutationem in acutiem. Cætera, quæ per epilogum dicit, emarrata iam sunt.

DECIMVS IV. AEGROTVS.

IN Cyrica mulierem quæ gemellas, & quidem ægri pepererat, nec satis expurgata erat, primo febris corripuit cum horrore & acuta, capitis & cervicis gravitas cum dolore, infomnis à principio erat, taciturna, & icterica, & non obsecranda. Vixit tenuis erat & decoloris, siticulosa, vt plurimum fastidiosa & anxiosa. Alius erraticè turbata fuit, & rursus astricta. Sexta sub noctem multum deliravit, nihil dormiuit. Circa vndecimum verò insaniuit, rursusque ad mentem rediit. Vixit nigra erat, tenues, & rursus cum intermississent, oleosa, & alius multa, tenuia, turbata & egressa. Decimoquarto conuulsiones multa exorta sunt, extremities erant frigide, neque amplius ad mentem rediit. Prima suppressa sunt, mortua est. Phrenitis.

Non est numerus certus muliebrium festum, ramen duorum est partus frequens, plures raro eduntur vitales. Gemelli propriè dicuntur, qui simul concepti simul eduntur, alii enim edi solent simul, non simul geniti, sed ex superfecundatione. Causa numerosa fecerunt non est multitudo sinuum, ut qui dissectionem ignorant suspicantur, vnicus enim sinus est toto muliebri utero; sed abundantia, & decisio principiorum, ex quibus sicut fœtus, feminis inquam utriusque. Decisionem dico, non separationem seminum ab invicem, sed cum ex commixtis fiunt velut diversa ona, quæ fœtus inchoant. Grauius esse non satis expurgati eam quæ filiam pepererit, quàm quæ filium, dictum iam antea in multis ægronis est, grauius est etiam eam quæ peperit geminas. Nam etsi non abundet tam multis, quàm quæ unicam, tamen quæ duabus alimentum præstiterit, habebit vitæ excrementa deteriora, utpote ex qua duæ exuerint bonum sanguinem. Merito ergo hæc cum peperisset ægræ, hoc est, cum magnis doloribus, & partu difficili filias duas, & non esset rectè expurgata, correpta est febre magna, & lethali. Habuit verò febris, quæ emixis febriarum; familiaria esse indicatum est sæpè. Nimirum fuit *sepsis*, acuta, & melancholicam fuit mulier taciturna, & repleta, & non obfuscandans, quod idem est, atque morosa. Habuit capitis & certis granitatè cum dolore, quod multitudinis in superiores partes collectæ signum erat: quod idem ob beliosam qualitatē faciebat eam insomnem esse. Vnde etiam factum est, ut sexto delirauerit, & vndecimo etiam insuperit (quod quidem grauius est quàm delirare) & ut ante mortem passa fuerit: multas convulsiones. Omnia enim hæc pertinent ad cerebri passionem. Urinæ tenues cruditiæ erant; nigre tenues, vltionis esse poterant, & melancholici succi, qui redundabat. Quod verò erant rursus intermutescentes, & oleosæ (id est, factæ aliquando intermissione tenuitatis, & nigrities, erant oleosæ) significabat admixtionem crassorum, & agitationem. Has vtriusque in nullo ægroto notatas vidimus, qui non delirauerit. Quod erat sinuolosa & fastidiosa, signum erat magnitudinis & malignitatis febris. Quod alius erratè rubræbat, & rursus adstricta, significabat multitudinem, & in quietudine succorum. Nunc enim reddidantes effluabant, nunc in aliam partem rapti decinebantur: ex quo etiam, prope mortem iam constituta muliere, sunt urinæ pressæ. Quin & extrema frigere fecit similis quædam causa. Omnibus enim ad cerebrum raptis, evacuationes naturales suppressæ sunt, & vni eum excrementis calidum etiam naturale ad malignè inflammantem partem raptum, extrema deseruit: unde phrenitis tantopere aucta est, ut nihil iam tollens mortua sit. Est autem considerandæ dignum, quod decimum quartum videtur Hippoc. dixisse, ab eo quem vocauerat primum, quo dicit fuisse febrem cum horrore acutam. Non fuit autem ille primus, idem dies quo peperit, nam antequam febre corripere, pepererat, & non satis expurgata erat, quod quidem eadem die non videtur posse esse satis persudum. Mortua est ergo die decimo quarto, ut sine quodam proprio acutorum, fuitque is decimusquartus, non à partu, sed à febre. Non ergo dies decetoresi febriacutantum ex partu, videtur fluere à partu, sed à febre; quare hinc videtur ducenda computatio, atque Hippocrat. ipse

videtur docere contrà ac in prognostico scriptum est. Quomodo res habeat in hac questione, dictum à me est decimo libro controversiarum. Pro hoc loco, duorum alterum dici potest, aut eadem die qua peperit correptam esse febre, & quod dicit, & non satis expurgata erat, intelligi in ipso loco (nam ut Hippocrates definit, debet mulier in ipso loco effundere sanguinis sesqui berniam) aut fortasse diem illum à febris principio decimumquartum, ab ipso partu fuisse alium etiam insignem, ut decimumseptimum, aut vigesimum. Quod autem Hippocrates neque hoc monuerit, neque à partu supputauerit, nihil habet incommodi. Nam, ut dictum etiam antea est, hoc libro historicum agit Hippocrates, licet illi rem narrare, ut vult, modo narret, ut est acta. Sed & in hac ratione narrandi, est aliud quiddam utile, quod notes. Nimirum est computatio dierum decetoresium ducenda sit à partu præcipuè, numquam tamen omittendum considerare, quicunque dies qui à partu sit insignis, quotus sit à febre: si in proxima historia rectè monimus, non solum esse habendam rationem dierum contemplabilium à prima die morbi (sed pariter ab eo, qui attulerit insignem aliquam mutationem. Nam cum insignis mutatio plerumque habeat rationem aliquam numeri contemplabilis ad primum diem morbi, quicunque dies secundum rationem aliquam notatu dignam adieciuntur illi, habebunt etiam rationem aliquam insignem ad bene. Velut in Apollonio conigit esse trigessimum quartum à primo, qui erat vigesimus ab eo, qui attulit insignem mutationem.

DECIMVS V. AEGROTVS.

IN Thaso Dealeis uxorem, quæ decumbebat in Leio, febris cum horrore & acuta ex matre corripuit. A principio autem contegebatur, & semper usque ad finem taciturna erat, palpabat, vellebat, scalpebat, pilos legebat, plorabat, rursusque ridebat, non dormiebat. Alnus irritabatur sed nihil exibat, exiguum admonita bibeat. Urina tenues erant & pauca. Febres ad manum leues apparebant, extrema partes frigeant. Nono mulier deliravit, rursusque quiescit tacita. Decimâ quartâ spiratio fuit rara & magna per aliquod tempus, rursusque brevis. Decimâ septimâ alnus turbulente irritata est, deinde ipsi potus pertransibant, neque consistebant, omnium sensu privata est, & cutis arida circumtensa. Vigesiâ multū loquebatur rursusque quiescebat muta, breuem spiritum traherebat. Vigesiâ primâ morua est. Hinc spiratio rara & magna fuit usque ad finem, omnium sensu privata est, semper contegebatur, aut multum loquebatur aut taciturna erat usque ad finem. Phrenitis.

Quod miror soleat inferre languorē facultatū, quibus nostra corpora reguntur, & excrementorum retentiones, & proinde grauissimos morbos, dictam est in historia mulieris illius morose, quæ penitebatque hæc, ex morore cepit ægrotare, & decumbere in Leno, nunc satis dicere, quæ in hoc morbo sunt præcipua: ea verò non contingit agnoscere abunde, quàm ex symptomatis: ex eis verò constat, hanc duo præcipua habuisse mala, alterum quidem lethale, alterum verb admodum lethale & exitiosum: phrenitidem scilicet, & extinctionem caloris naturalis. Neque sane mirum. Nam mœstia, & metus extinguunt naturalem calorem. Phrenitidis ergo signa erant hæc, semper esse tacitam, palpare, vellet, scalpere, pilos legere. Hæc enim in prognostico ponit Hippoc. in phreniticis. Taciturnitas vero significabat delirium, non simpliciter, sed ex morore, vt & plorare. Ex ploratu videtur tursum ridere, maior infamia erat, præcipue laborantem ex morore, & nunc cum multis verbis, nunc tacitam esse, & delirare, & spirationem magnam esse & raram, & non bibere nisi exiguum, & admonitam. Phrenitici enim sunt *ἀεργαῖοι* idest, exigui potu videntes primo, prostrictiorem, extinctionis naturalis caloris, & languoris facultatum signa erant reliqua ferè omnia. Horrore concun, & à principio semper tegi, febres admanum tenues, & extemorum frigus, & quod erat *ἀεργαῖον* & tandem muta (indicatum enim est in historia Pythionis, talem spiritum esse paruum & ratum, & significare caloris penuriam) atque adeo quod illi potus probaret, & nihil consistebat. Hoc enim est vnum quoddam eorum, quæ in certis moribus sæpe observantur. Nam cum potus cadunt in ventrem cum quodam sordore, nihil in via consistentes, sed velut incidentes pendere, non aliter ac si inde mortuum iam corpus, & omni naturali facultate carens demitteretur, vnde & moribundos arguit homines comitum epilepsio. Cui simile etiam est illud, quod nihil sentiebat, hoc est exiguum iam omnibus in partibus habebat sensum, quod proximam mortem significat, quale est illud prognostici. Si non videt, neque audit, prope iam est mors. Talis etiam erat *διπλὴν ἀδύνην* nappardus, de qua in initio prognostici scriptum est: cutis circa frontem dura, intentata, arida. Itaque duobus his malis premebatur, proinde quædam alternatè accidebant ei symptomata, ambo referentia (vt spiratio nunc magna erat & rara, nunc brevis) quædam accidebant simul (vt pariter habebat extemorum frigus, & delirabat) quædam etiam accidebant communia, vt non dormire (id enim & passionis cerebri biliosam fluxionem iam recipientis, & detilitatis signum esse poterat) & vrinæ tenues & pauca, nam & per debilitatem facultatis, & per raptum in cerebrum panice esse poterant. Quædam etiam alia mala qualitatem succorum, quæ illorum malorum causa fuerat, referebant: magis quàm ipsa mala, qualis erat illa crebra irritatio alui, ex qua nihil exibat, quam torsam vocat *ἰσχυρὴ γαστήρ*, idest,urbationem ascientem magis quàm euacuationem. Illud enim refert malignam qualitatem magis quàm copiam. Maligna autem qualitas facere solet morbos hos malignos magis quàm magnos. Vbi dicitur ab alio irritatio,

A nihil exibat, exiguum admonita bibebat, legunt quidam, nisi cum exiguum admonita bibebat. Quæ lectio significabit hæc omnia, illam exiguum bibere, idque non nisi cum admoneretur, vt pote phreniticam, & mox à potu reddere ex alio, vt pote non consistente potu. Verum quia hoc signum graue admodum est, non mihi persuadeo accidisse ante nonum morituræ vigesimo primo, quare magis probò hanc lectionem, quam iam sequutus. Porro ubi dicitur, *αἰσθητὰ πάλιν πάλιν ἀδύνην*, & *ἀεργαῖον*, illud *ἀδύνην* duo potest significare, aut spirationem magnam & raram non fuisse semper, sed per aliquod tempus, quia scilicet fuit rursus *ἀεργαῖον*, aut per tempus seu spacium longum, quia diceret spiritus magnus rarus non vtrunque, sed per longa intervalla. Hunc sensum solum probat Galen. quia, inquit, Hippoc. in fine historiz dixit, erat huic vsque ad finem spiritus magnus & rarus, id vero non diceret verè, si per tempus tantum, id est non perpetuo esset. Ego vero æque probò vtrunque sensum, nam cum adiecit & rursus *ἀεργαῖον*, constat non habuisse perpetuo spiritum magnum & raram, sed Hippocratem dicere semper factum per morbum, quod sæpe, & per omne morbi tempus, nam ita loqui solemus, neque sane opus fuit, vt semper contegeretur, etsi dicat, semper contegebatur.

DECIMVS VI. AEGROTVS.

IN Melibea adolescens, ex potu & multa Venere, multo tempore calefactus decubuit. Horrore concussus est, fastidiosus erat & anxius, & sine somno, & sine siti. Ex alio autem primò multa stercorea prodierunt cum multa defluxione, & sequentibus aquosa, biliosa multa prodierunt. Vrinae tenues, panice, decolores. Spiritus rarus magnus per tempus. Hypochondriorum distensio submollis, producta vtrinque, cordis palpitatio perpetua vsque ad finem. Mixxit oleosum, delirauit modicè, modestusque & mansuetus, cutis arida & distensa, deiectiones multa tenues, aut biliosa pingues. Decimaquarta omnia exacerbata sunt. Menie est motus, multa delirauit. Vigesima insanauit. Sese iactauit, nihil minxit, vix potum continebat. Vigesima quarta mortuus est. Phrenitis.

Non valde dissidet hic morbus à proximo. Hic enim etiam fuit phrenitis cum facultatum debilitate, & caloris naturalis defectu: quorum quidem illud, vinum: hoc, Venus nata erat facere. Tametsi ab vtroque etiam factum meuro esset vtrunque. Vinum enim sumptum immodicè calorem naturalem suffocet. Venus caput insigniter debilitat. Cepit hæc adolescens ægrotare eisdem occasiōibus, quibus Abderæ Nicodemus, decimus huius sectionis ægrotus: tamen ille non inedit cum tanta debilitate, quo factum est, vt melius se potnerit expedire, habueritque calore exitum & merito, quia mor-

bum habuit minus mali moris. Ille enim habuit febrem magnam, sitim ingentem, viñas copiosas, quibus multū contenti crassi reddebatur, & copiosū sudorem, quæ magnam indicant, sed non proinde malignā febrem: hic verò, cum magna febre cætebat, sitis non mingeat, nullam aliam idoneam habuit evacuationem, quæ omnia debilitatem facultatum significabant. Præterea habuit distentionem hypochondriorum submollem, vtrinque productam, & cordis palpitationem, quæ viscerum significabant affectiones. Nam ut ex Gal. antea diximus, distentio submollis hypochondrii in morbo acuto, inflammationem significat internam hepatis, aut henis, aut vtriusque: distentio enim tumorem, mollietatem non ad musculum, sed internam partem pertinet significat. Cordis palpitatio excrementa collecta intra pericardium, & angustiam interentia cordi indicat. Cutis etiam arida, & distensa est signum admodum lethale, ut ex prognostico nuper diximus: ut etiam vix potius conciuere posse, corruptionis facultatis perentricis ventriculi signū est. Species etiam delirandi fuit præter rationem, homo enim vinolus & libidinosus, delirauit antiquus, fuitque in delirio molestus, & mansuetus. Omnia verò ea quæ præter rationem sunt, deterioris moris morbi suspicionem faciunt: nisi forte non erat natura neque longa consuetudine talis, sed contigit tunc agere incontinentem. Deiectiones omnes fuerunt crudæ aut biliosæ, aut pingues; aut biliosæ pariter & crudæ: aut biliosæ pariter & pingues; quæ omnia quales corruptiones significant, dictum iam est sæpè. Neque minus dictum est, quem dicat spiritum magnum & ratum per tempus, & quid significet.

Videtur autem mihi, æstatem quæ secundum rationem facta est, profuisse. Nam æstius morbos superueniens hyems soluit, & hyemales æstas superueniens transmutat. Quamquam ipsa per se æstas quæ accidit non erat bene constituta, sed repente calida austriua, & sine ventis, tamen ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam autem partem artis esse existimo, posse considerationem facere rectè de iis quæ scripta sunt. Qui enim scit, & vritur his, non vtrique mihi videtur multum falli in arte. Oportet autem discere exactè quancūque temporum constitutionem, & morbum: bonum est etiam scire quid commune sit in constitutione & in morbo. Qui morbus longus sit & lethalis, qui longus & sanabilis, qui acutus lethalis, qui acutus sanabilis. Ex his ordinem dierum decretoriorum considerandi ac prædicendi facultas datur, siquidem ex his contingit scire quibus, & quando, & quomodo oportet victum instituire.

Ex his quæ in calce huius libri scripta sunt, immo, scilicet, decem & sex præscriptos ægrotos, quosdam fuisse eorum, qui in ipso illo anno, qui in hac tertia constitutione descriptus est, ægrotarunt. Nam rediens nunc, ad narrationem eadem dicit,

A videtur mihi æstatem quæ secundum rationem facta est, profuisse. Nimirum in fine narrationis dixerat; erat autem omnibus subscriptis difficillimum quidem ver, & platinos abstulit, æstas autem facilis, & minimè moriebatur. Nunc huius causam reddit, cur vitilis fuerit illa æstas, nimirum ob commanent rationem, quia æstus nos morbos superueniens hyems soluit, & hyemales superueniens æstas. Quia cum vnicuique temporis familiares sint morbi, qui cum eo habent analogiam, contrariis temporibus non erunt idè familiares, sed qui in vno generabuntur, in altero extinguentur. Atqui profecto illa æstas non fuit vitilis, quod per se admodum esset bene constituta, id est, optimè suam naturam retinere; non enim erat, cum repente facta sit calida austriua & sine ventis, æstas verò soleat panlatim ingnere, & habere ventos Aquilonares, vocatos Etesias, sed quòd, etsi per se esset futura insalutaris, superueniens verò contrariæ temporis naturæ, facta est causa emendans & salutaris. Ita enim fit. His diebus, commendat hanc doctrinam, dicens, Magnam autem partem artis esse existimo, posse considerationem facere rectè de iis quæ scripta sunt. Qui enim scit & vritur his, non vtrique mihi (inquit) videtur multum falli in arte. Explicans deinde, quæ scire ex hoc opere & quomodo us vti oporteat, dicit, oportet autem discere exactè quancūque temporum constitutionem, & morbum. Id est enim aduertere, quæ constitutio temporis est, & qui morbus populariter graffetur hominum est etiam scire, quid commune sit in constitutione & in morbo; id est, bonum etiam est considerare analogiam speciei morbi, & constitutionis temporis. Nimirum sunt singulis temporum constitutionibus morbi quidam congruentes, quidam non: qui autem quocūque tempore sint nati fieri. Licet discere ex iis quæ scripta sunt. Oportet etiam considerare quales morbus sit longus & mortalis, ut qui Parisi, qui longus & salutaris, ut qui Heropythi; qui acutus mortalis, ut qui Calui, qui acutus salutaris, ut qui Periclis; neque quidem hæc solum potes discere ex iis quæ scripta sunt; sed ordinem etiam dierum decretoriorum considerandi facultas datur ex his. Nam ut in singulis historiis explicuimus, maximam rationis ordinis dierum talium visus est semper Hippocrates habuisse, vt videtur hæc esse praxis doctrinæ de diebus decretoriis. Hæc verò non tantum vtilia sunt ad rectè prædicendum, sed etiam ad rectè suscipiendas curationes, vt in proximo prognostici ipsemet dicit, siquidem ex his contingit scire, quibus & quando & quomodo oportet victum instituire. Quæ verba videtur mihi posse duo sensus continere, & ambo vera. Quos & quando curare oporteat, & quomodo victum instituire, vt in his verbis insinuetur curatio tota, & tota victus institutio, aut quos & quando & quomodo cibare, vt contineatur his tribus voculis sola victus institutio, quæ magna medicæ artis pars est, cum tres habeat, & pharmacis, chirurgia, & victu vitatur. Sed quo pacto pendente hæc omnia ex illa cognitione constitutionis, & periculis morbi, & dierum decretoriorum? Certe quos curare oporteat & quos secus, non potes exactè scire, nisi morituros; non morituris dignoscas. Ghos enim curare oportet, & illos sinere. Neque sane scire potes, quando oportet curare, quando agere quietem, nisi tempora vniuersalia, quibus tota constitutio constet, dignoscas. Quia inchoam-

tibus morbis mouendum est quidquid videtur, aut iam inclinantis; cum vero consistunt ac vigent, melius est quietem agere, raroque est agendum tunc temporis aliud, quam occurrendum symptomatis, quæ tunc sunt vehementia, aliter vero non est facultas occupatissima interturbanda. Sed neque in diebus decretoriis, quibus mutationem aliquam insignem accidere speras, aut times, instandum auxilium est. Quia quæcunque indicatio fiat; aut instet, neque mouendum, neque nouandum quidquam est. Ergo non potes exa-

A Et scire quando curandum nisi dierum decretoriorum ordinem consideres, & constitutiones morborum, multò autem minùs quomodo victum instituere oporteat. Cum vbi morbus peracutus est, statim extraneè tenuissimum victu vti necesse sit: vbi vero non, pleniori victu vti liceat, & tantò plus indulgere, quanto morbus est minùs acutus, & morbo in vigore consistente tenuissimo victu vti necesse sit. Non potest itaque rectè victus institui, nisi constitutio morbi & futurus vigor perscrutetur.



LIBER QVARTVS

EPIDEMIORVM.

POST aquinoctium & post pleiadæ, quadam velut exedentia & sordida, qua caput aperuerunt, prodierunt supra aurem, & ei qui prope Leocydem habitabat, in pedem decubuerunt. Phniodico digiti in pede corrupti sunt, in pectore vlcus fuit. Cuiusdam cum scicta esset tibia, hac quidem illi denigrata est. Magnum erat vlcus, quod ad externam tibiæ partem ex posteriori extendebatur, cum purum factum esset, pectoris & lateris sinistri secundum rectitudinem dolor & febres corripuerunt. Mortuus est ex febre.

In hoc quarti libet initio, nullum morbosum statum describit, neque communem constitutionem; sed singulares narrationes, & eas quidem breuissimas, non tam persequens ipsas historias, quam notans in singulis quædam, quæ ipsi videbantur observatione digna, non quæ in vna aliqua constitutione aut in vno oppido, sed in multis, & incertis notauerit, & suæ memoriæ consulens, vt solent diligentissimi quique facere, in priuatis chartis reposuerit. Neque profecto in aliis constitutionibus, aut urbibus, ab aliis quas superioribus libris descripsit, necesse est hæc contigisse, sed quædam fortasse in aliis, quædam etiam fortasse contigerunt in eisdem. Velut quæ nunc in initio narrat, hæc dubiè pertinent ad proximæ libri vltimæ sectionis statum pestilentem, vt hæc ratione ego censeam, quæ sunt vsque ad illa verba, circa Solis conuersiones hyemales, quæ paulò post occurrunt, adscibenda ponam fuisse lib. 3. aut esse velut illius appendicem: quorum verò & ab illis verbis incipere. Hæc vero ad tertium pertinere constat, ibi enim ita dixit, multis quidem erysipelas accidit cum occasione, ex fortunis omninoque paruis vulnusculis per totum corpus. Maxime autem is

B qui sexagesimum circiter æonum attingebant, & quidem circa caput, si quid, vel minimè negligenter. Multis autem etiam in ipsa curatione magnæ inflammationes contingebant, & ipsum erysipelas multum, celeriter, & vniuersè depalescebat. Plurimis igitur ipsorum abscessus in suppurationes vertebantur. Carnium & nervorum & ossium depreditionem magnam patiebantur. Neque autem quæ colligebatur fluxio puri erat similis, sed putredo quædam alia, ipsaque fluxio multa & varia. Quibus igitur circa caput aliquid eiusmodi fieri contigit, his glabries totius capitis & menti accidebant, ossiumque denudationes & prolapsus, & multæ fluxiones hæcque in febribus, & sine febribus aderant. Hæc autem magis horrenda erant quàm fœnula, quibus enim ad suppurationem peruenit istorum maturatio, plurimum horum seruabantur. Quibus autem inflammatio & erysipelas emanauerunt, nec vilius eiusmodi abscessum fecerant, multi horum mortui sunt. Similiter etiam quæcunque corporis parte abarrant, ista acciderunt. Multis enim brachium, & totus cubitus defluerunt, quibusdam autem hæc mala infestabant latera, aut anteriorem vel posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem femur totum aut tibia, aut pes totus denudabatur. Hæc illo loco, quibus nunc addit, illa vlcerà exedentia, quæ erysipelate depalescente bebant, & sordida, in quibus scilicet erat fluxio collecta non potè similis, sed putredo quædam alia, & fluxio multa & varia, & caput aperuerunt; id est fecerunt in capite ossium nudationes, produsse supra aurem. Verum quia dicebat, non omnibus hæc exedentia vlcerà accidisse in episcio, sed similiter etiam quæcumque alia in parte, nullis in brachio & cubito, aliis in lateribus, quibusdam in femore, tibia, aut pede: exempla non sinit scribere, vt scilicet ei qui prope Leocydem habitabat, in pedem decubuerunt. Phniodico digiti in pede corrupti sunt, & in pectore etiam habuit aliud vlcus exedens. Alius fuit cui tibia scicta est, quia denigrata est ea parte, propter gangrenam scilicet. & habebat vlcus magnum in extrema parte tibiæ, eâ sci-

licet parte, quæ ad anteriora nostra spectat, quæ id os acutum maxime & præhensivum est, & procedebat ex posteriori parte tibie. Nam vocat ribiam hic non totam cutis partem quæ est inter malicolum & genu, sed os illud magnum, quod ea parte est, & cum femore & pede articulos facit, cui à posterioti parte coalescit aliud os gracilius; non valde brevis, ad popitem spatium quoddam in interna cutis parte formans, quod carne plenum est. Ab hac ergo carnosa, & interna cutis, & posteriori ribie parte, producebatur vlcus ad anteriorem. Cui curaretur hic seclit one & vitione ut par est, & purum factum esset vlcus, superuenit dolor lateris, & sinistæ thoracis partis, externæ scilicet, quam in multis etiam tentatam fuisse in hac peste dixerat, & febris, & mortuus est à febre, nimium venenata materia cor iam oblescente. Fortasse dum curaretur, repente factum est vlcus parum plus satis, contigitque quod multis aliis contigisse dixerat, his verbis. Quibus inflammatio & erisipelas evanuit, horum multi mortui sunt, fortasse etiam ob curationem artificiosam sanatum est crus, & in deterius cessit. Nam vilius & externarum partium morbi, ut internis & nobilibus securitatem afferunt, ita nonnunquam cum earum periculo curantur. Cui autem nunc medicorum narraretur, alicui facta esse in capite vlcera fordida, & glabrieum capitis & menti sine febre, & cum exulceratione pudendorum & faucium, ac postremo nudata excidisse ossa, qui non assuaret esse citra dubium Gallicum morbum? Fuerunt verò in illa respestare plurimi tales. Ob quos, & multos alios affectus, qui in hoc opere, & aliis ab Hipp. narrantur, adducor ut censeam, nihil in illo morbo esse novum, quodque priora secula non viderint.

Biliofum restiario moracum decubuit.

Galenus libello obsoletarum Hippocratis vocum dicit *restiario* esse alacgeft ones ex morata bile: & pectora *restiaria*, quæ eiusmodi succum generant, quidam tamen huius intellixerunt. Sed & *restiario* hæc homines similitur appellat tali bile abundantes, pharmacum autem *restiarum* vocat, aut propter humorem qui ab ipso euscatur, aut ob proprium colorem. Nominat etiam firm alacubi *restiarum* quæ vel ob talem humorem orta est, aut summe mentis. Itaque *restiarum* vocat Hippoc. interprete Gal. omnia biliosa, siue hominem. siue excrementa, siue pharmaca, siue passiones. Hic posuionem aut excrementum significare posse videtur, ut significetur, restiario morbo exquisitè bilioso fuisse affectum, & ad deiectiones sincere biliosas habuisse. Atqui hoc est lógè probabile, quia euacuationem quæ ægrotis accidebant, videtur Hipp. præcipue rationem habuisse. Non parum verò est dignum consideratione quam sint sincere deiectiones biliosæ, quia omnes euacuationes sincere significant extremas intemperies, & magnas naturæ corruptiones.

Et causica affrentis circa æquinoctium sanguis multus fluxit deorsum.

Καὶ τὸ ἐκ τῆς ἀφροδισίας haud dubiè dicebatur aliquis. siue vnguentarius, siue chirurgus, qui hæc maxime præcebat, & causica parabat. Illi ægrotanti circa æquinoctium fluxit sanguis multus deorsum. Quod circa æquinoctium, verum scilicet, sanguis fluere, non erat præter temporis rationem. Nam in vernis morbis ponit Hippo. 3. aphor. sanguinis fluxiones, quod deorsum exiret, multò melius erat quam si sursum, quia ut in aphor. 25. particula quartæ dicitur, sanguinem sursum vicinque exire malum, deorsum verò bonum. Quare coniectandum huic accidisse, ut multis solet, quibus inerte vere, deiectiones cruentæ salubriter contingunt, aut fluunt hæmorrhoides.

Seni valde vehementer abscessit, non ultra quatuordecim dies.

Quæ notata digna in ægrotis occurrebant, mandabat Hippocrates memoris. Abscedere hoc loco non est quod aliis *ἀνέμω* seu abscessum facere, sed *corrupti*, corruptumque abscedere, ut cum morientes partes decidunt, aut decidantur: quale illud quod in non ita pridem scripta oratione dixerat, carniam, net notum, & ossium *ἐκπίπτειν*, id est deperditiones magnæ. Hoc verò constar ex ipsis autoris verbis. Dicit enim *τὸ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῇ ἀνέμῳ*. *ἀνέμω* enim non est abscedere, aut longè fieri, sed aboleri aut corruptum decidere. Dixerat ergo proximi libri sectione vltima ad quam hæc primam quartæ libri partem pertineat puto, multos, senes præcipue, habuisse de pascencia vlcera in capite, ex malignis erysipelatibus, vique ad ossium nudationem. Non tamen omnibus quibus hæc partium decessio processit, sed quibusdam tardius, quibusdam celerius: constar verò celeritatem corruptionis serpentis, periculi magnitudinem augere. Proinde hic senex, cui valde vehementer abscessit, non potuit ultra quatuordecim dies morbum sustinere, sed putredine multum serpente, ac fortasse in internas nobilisque partes, brevis mortuus est. Fieri etiam potest, ut illud *ἀνέμω* non dicatur de parte, sed de homine, sitque sensus, seni valde vehementer corruptione contigisse, senemque citissimè mortuum esse. Nā ut *ἀνέμω* significat superuivere, & à morbo librari, ita *ἀνέμω* significat mori. Sed dices, quid habet admirationis, aut quæ tanta acuties mori senem intra quatuordecim dies? Certè nunquam est stupenda acuties, quæ morbum ad dies quatuordecim produci sint: tamen intellige, eodem tempore ac eodem morbi genere, ægrotasse plurimos lentius, & quod quidem id seni acciderit, admirationem auget, quia senes ut minus curabilibus, ita minus acutis morbis laborare solent. Ecce duos loci huius sensus satis congruentes. Constare verò hoc secundò sensu esse figuratam orationem, & potiù casum pro casu.

Perçusso ab Antiphilo inuulso, facta est indicatio septimo die, bilioso, & typhode febre laboranti. Tertia post indicationem sanguinem sanè spuit, superflus manebat, & recidiva postea

facta est. Indicatus est, ut par erat, circa pleiadum occasum primum. Post pleiadum vero occasum biliosus ad insaniam vsque. Facta circa diem nonam sine sudore indicatione superuixit.

In hac quoque dictione ponitur casus pro casu, perinde enim est ac si diceret, percussus ab Anriphilo, terra post indicationes, sanguinem spuit, & superstities manebat, alioqui committeretur solacismus. Habet hac dictio duas particulas; prima dicit hominem febricitasse acute, & imperfecte iudicatum, habuisse recidivam; secunda, quæ inde incipit, iudicatus est ut par erat, dicit, quibus temporibus facta fuerit indicatio prima, & recidiva. Illis primis verò his *τοῦ δὲ πρώτου καὶ ἀπορίας ἀπορίας* haud dubie videtur Hippocr. occasionem morbi significasse. Suspicio autem hunc inusta ciarctice, aut signo aliquo ab Anriphilo (erat fortasse illius seruus) correptum fuisse ex dolore & vlcere, vt ex occasione, febre vrente. Nam *σπασμὸς* est percutiendo signare, quare *σπασμὸς* percussione signato, addito verò *ἀπορίας* aperte significat, inuisione signato. Quæ sanè in homine allopi parato, non exigua fuit occasio. Erat verò biliosus, atque febre typhode, id est vrente correptus est. Hic est iudicatus die se prima. Non dicit quæ euacuatione, fortasse sine vlla manifestata acroide non fuit indicatio tura, sed cum recidiva. Tertia die post indicationem (nona scilicet) sanguinem spuebat; quod etiam intus manere causam indicabat, nam aut multitudinis, aut malæ qualitatis signum erat, nihilominus superstities manebat, id est benetobustus, & salubriter affectus videbatur. Recidiva postea facta est, nimirum imperfecte iudicato. Quo tempore hæc acciderint, & qualis fuerit recidiva, narrat postea, dicens; iudicatus est ut par erat, circa pleiadum occasum primum, post pleiadum occasum factus est biliosus ad insaniam vsque, id est recidit in phrenitidem cum magna insania & furore. Non enim fuisse manifestum, sed phrenitidem indicat constitutio, iudicatus enim est die nona, manifestum verò est longior morbus. Sed cur dicit iudicatum esse primum circa pleiadum occasum, vt par erat? Certè aliud ad illud, quod libello de ære locis & aquis ipsemet dicit, his verbis. Oportet autem astrorum exortus considerare, præcipuè Canis, deinde Arcturi & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maximè diebus iudicantur, alique perimunt, alii verò desinunt: aut in aliam speciem alioque statum mutantur. Itaque cum prope illud tempus, in postrema scilicet autumni parte, hunc ægrotorem contigisset iudicatus primum est circa pleiadum occasum, vt par erat, id est, vt temporis ratio poscebat, cum verò circa euacuationem insignem, à typhode & biliosissima febre liberatus imperfecte esset, & bilis maximè vltima interitus maneret, & ob mutationem ad frigidiorē tempestatem, in aliores corporis partes sepelleretur, post occasum pleiadum biliosissima phrenitide correptus est, à qua rursum nona die iudicatus superuixit, habuitque illud etiam notatu dignum, quod circa sudore, atque adeo circa omnem aliam euacuationem manifestam liberatus est. Antiquum enim est Hippocrati dicere sine sudore, quasi sine euacuatione manifesta. Multi verò morbi etiam acuti sunt ut insensibiliter, ipsa febre suam materiam absorbente, vt

A inflammatione resoluitur suo ipsius calore.

Circa æquinoctium Chalcidionius à portis delatus ad forum, ex ruptura circa dextram mammam, dolens spuebat subinde subviride: Venter egebat, sudor incipiens septima fere ad octavam vsque durauit. Indicatus est decima quarta. Circa quadagesimam verò tumores facti sunt circa autem utramque. Non immerito videbatur suppuratus fore. Non factum est.

Cum tuncpitur alicui vas aliquod in pulmone, aut thorace, aut ob vehementem motum, aut perfrigerationem maximam, aut multitudinem ad vasa vocatam, aut ob totidem qualitatem (corrosio enim etiam rumpit vasa) nisi citò coalescat, periclitatur suppurari, non minus quam ex inflammatione eius loci, primum quia vlcusculum ipsum aliquando dilatur putrefcens, & pus colligit, deinde, quia sanguinem ex rupto incidente in ventrem, seu eam thoracis, concretumque in grumos, necesse est pus fieri, nunc melius, nunc deterius. Hic ergo Chalcidionius rupturam accepit circa dextram mammam in thorace: ex corrosione arbitror, ob biliosam sanguinis qualitatem. Nam locum affectum indicat dolor, sanguinis verò qualitatem spurum, *ἐλαττον δὲ λευκόν* *ἐν τῇ ἀσπληνι*. Id est, nunc flauum, nunc subviride, ac fortasse etiam nunc subflauum. Nam omnis hanc colorum speciem continet quod chlorum: totum vero hoc genus est biliosum. Cum igitur is affectus manifestus factus est, fibrem attulit, vt & pleuritis solet. Venter etiam egebat, & sudor copiosus fuit fere per totam septimam. Quæ omnia multitudinis erant. Vt iam constet multum & biliosum fuisse huic succum. Quo factum est, vt etiam iudicaretur, id est, à febre liberaretur decima quarta die, non tamen postea, & tuto liberaretur, sed circa quadagesimam tumores facti fuerint circa autem utramque.

Qui tumores hominem omnino liberauerit à morbo peioris citra suppuracionē. Quæ quidem suppuratio merito timebatur. Atque cum, inquit, merito putaretur suppuratus fore, non factum est, sed resolutione finiti sunt: aut cum merito putaretur fere suppuratus intra thoracem, quia vt ipsemet Hippocrates dicit in prognostico, quicumque dolores ex his locis non sedantur, neque ad superiorum purgationes, neque ad steretorum alui fundutionem, neque ad venæ sectiones, & victus rationem, & medicamenta, eos ad suppuracionem vertendum est. Ergo cum huic fluxisset alius, & excreta esset multum, & exudatum, & nihilominus non esset perfunctus hemo, merito putabatur suppuratus fere, tamen non est factum, quia commutatio facta est, morbi thoracis cum peioridibus.

G *Pectus Aristodemum vltimum est. Philidis filio, cui quod aliquando ex casu abscesserat, etiam pectus vltimum est. Supra autem dolor aliquis prius existerat.*

Quam familiaris fuerit Hippocrati vltio pectoris nō suppreat, siue ex casu, aut alia manifesta causa, siue citra omnem occasionem suppreat fuerint, hinc & ex aliis multis locis intelliges Quomodo fieri debeat, docet Paulus lib. 6. quanquam non promde non sit alia comoda vrendi ratio Ego sane, vt ablit terror, & zgori pateant, causis vtor, quanquam inuisionem cadenti ferro factam, si zgori sint quomosi, non nego esse meliorem.

Post equinoctia autumnalia recidua facta sunt, & alia vsque ad solstitia hyemalia, post solem astitum.

Vere ob optimam temporis conditionem, &estate ob calorem, fieri solent morbi citra indicationem. Autumno verò ob inaequalem èntis intemperiem & debilitatem, quam superior tempestas reliquit, morbi fiunt, qui lethales, acutissimi: qui salutare, difficilis iudici, & vix vnaquamque per multas reciduas, desinentes. Hoc est quod dicitur *improbus phremones* id est in autumno, improprie quoniam verò non solum post æquinoctium, sed ab initio etiam autumnii, quod est ab ortu Arcturi, incipiunt esse multæ recidua; & neque solum per totum autumnum durant, sed etiam per primam hyemem, quæ solis conuersione finitur, velut corrigens se ipsum, addit, aliis, quasi diceret, an vt melius dicam vsque ad solstitia hyemalia: post solem æstiuum id est ex fine æstatis, quàm finit ortus arcturi vsque ad solstitia hyemalia. Nimirum æstas sanguis & excrementa omnia exuruntur, vires debilitantur, aciam inde ob hanc causam, & quia sol à nobis recedit longius (ad quem omnium corporum ortus, vita, & robur referuntur) nulli morbi perfecte iudicantur, & vix vllus sese potest à morbo expedire, & robur pristinum recuperare, donec idem Sol ad nos redire incipiens, corporibus ortus naturalis & salutis auctor esse incipiat. Quod tam est experimento cognitur, vt vulgus etiam hominum, eos qui diuturno morbo teneantur, beneficium primi veris & rediens solis, iubeat expectare.

Archeli vxor sexta die abortum fecit, sanguinea cum esset, & horreret, & sudores manerent. Decimaquarta indicatio contigit. Quot mensium esset fœtus non noui. Masculum autem etiam alium, vigesimo post die se abortisse dixit. An vera dixerit, non scio.

Sexta die febris fecit hæc abortum, quem febris, vt solet, attulit: & decimaquarta accidit fieri iudicium: decimaquarta (intellige) eiusdem febris quæ est indicata, Nam vt cum febris superuenit partui, computatio à partu esse debet, ita cum partus febris, à febre. Sed est hic notatu dignum, quod dicit, cum esset sanguinea, horreter, & sudores manerent. Dicit enim id, velut causam abortus reddens. Nimirum huic, quia gerebat vtero, fortasse non est sanguis missus, & ea quia sanguis, abortiuit, multitudine scilicet sanguinis expultricem vteri facultatem

A prouocante, aut acetabula vteri dirumpente. Quorum vtrumque natum erat in hac muliere fieri. Nā qualitas mala sanguinis irritare, multitudo distumpe, solet. Horror verò indicabat mordentem qualitatem, & frequens sudor multitudine, vt iam hinc constet verissimè quosdam dicere, non semper missionem sanguinis facere abortum, sed multas hoc auxilio ab eo præseruari. Sed quorsum dicit se non nouisse, quot mensium fuerit fœtus? Cui si nescierat, non tacebat potius? Certe vt intelligas, momentum aliquid habere ad abortum, quot mensium sit fœtus. Nam primis & vltimis mensibus facilius, ac proinde minus periculose abortitur. Porro, quorsum commemorat tam dixisse, abortisse se alium masculum *scilicet ex æstate*, præcipue cum dubiter, an vera dixerit? An quia hæc quoque resert disquiere in abortientem, an consueuerit abortum facere. Quia quo plus est in mulietis natura, eo minus imputandum est affectui præter naturam. Quo etiam tempore prægnationis abortiat nunc, & antea abortierit; in eodem semper, an altero. Nam vt lib. de sterilibus dicit. Hinc pendet causæ cognitio, quia quæ eodem tempore multoties abortiunt, ob exiguitatem naturalem vteri, aut substantiam non bene dilatabilem, id pati consuevit.

Circa solstitium hyemale venti Boreales flabant. Ictero ex bile meracè laborabant & eorum quidam horrebant, quidam non. Lingua adusta erant tertia die & circa sextam & septimam perturbationes accidebant, quæ longè etiam extendebantur. Decimaquarta alui renitentes & medicamentis non obediētes, nec pro ratione febrium vllis sudores. Lienēs quibusdam erant exigui, ad dextrum hypochondrium extensi, & ad manum murmur aliquod edentes. Sanguinis fluxum patiebantur, & per vrinas expurgabantur & indicabantur. Multo autem magis deorsum nitebantur, etenim hoc occurrebat sub hoc tempore. Quibus autem ista non aderant, sed lienēs intumescēbant, sanguis ex sinistrâ nare fluebat. Solstitio præterito, hyberna hyerno modo in Borealis sese habuerunt, paulo autem post Austri per quindecim dies flauerunt. Post hæc autem nives quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionem ietherici ex bile meraciori, qui perfecte indicati non fuerant, facile in morbum relabebantur. Post nives autem Austri & pluuia successerunt, grauedines & cum febribus & sine febribus eruperunt. Cuiusdam verò in dentes etiam destulerat, qui antea ex media corporis parte doluerat, ad dextra, & supercilium & oculos occupauit. Erant autem & rancedines & sanctum inflammationes & tonsilla spongia vocata intumescēbant, & circa aures & malas tumores, molles qui etiam cum febre subsidebant: incipientibus febricitare pleraque horum superne & ad vtramque partem eriebantur, quibusdam

etiam sub Autumnum & hyemem non solum A
transillatam tumores, verumetiam porrigi-
z.25.

Verantem dicitur, hinc videtur mihi liber quartus
 melius incepturus, à quodam scilicet statu morbo-
 so. & communi, ut priores inceptant. Principiū
 cum quæ hucusque sunt enarrata, veluti partiē illæ
 quædam historiæ libri proximi esse videntur.
 In hac narratione oportet distinctionis gratia sepa-
 rare ea quæ pertinent ad æris temperiem, ab iis quæ
 ad morbos: indistincte enim videntur commixta
 genera. Verum ita distinguuntur, ut *etiam* *etiam* *etiam*
 hoc est: cum solstitiū hyemaleis præterierat,
 boreales v. e. stabat. Nimirū hyberna fese habebant
 hyberno modo in borealibus. Paulū post solstitium,
 scilicet ad finē Decēbris, fuerūt austina quindē
 diebus, post hæc tursim natiuit alius quatuordecim
 diebus: post nubes: apparent iam veteræ austina
 superueniunt, & pluuie. Per hanc anni consti-
 tutionem, duplex morbi genus fuit commune. Pri-
 mum facti sunt multi icteri, cum febris biliofis
 difficilis indicationis, deinde multi catarrhi in va-
 riis partibus, ut fieri solet, incumbentes. Fuerunt,
 inquit, icteri *etiam* non recipientes iudicatio-
 nem per se, sed afferentes reversiones, id est. habē-
 tes recidivas. Dictum est nuper, *etiam* signifi-
 care apud Hippocratem, inter præter Galen. libello an-
 tiquitatum vocum, quod est valde biliosum, siue de
 morbo, siue de succo, siue de homine, siue de
 causa, siue etiam dicatur de accidente. Velut nuper
 significabat excrementum, cum diceret, biliosum
 restitit catarraces: nunc ex symptomate morbum.
 Nam icteri *etiam* dicuntur, per quos est maximus
 pallor per totam eum. Nam sunt quidam per quos
 soli oculi, aut soli illi multum pallent, neque verò
 erant hi morbi, soli icteri, sed cum acutis febribus.
 Nam alij (inquit) innadebant cū horrore, alij
 non. Erant autem plurimis communia hæc: Lingue
 vitæ tertia die, & turbationes circa sextam & septi-
 mam accidebant, quæ longè etiam extendebantur.
 Id est, seua accidentia, & inquietudo quæ turba-
 tionem afferbant (hoc enim solet ab Hippoc. vo-
 cari turbatio) acciderunt sexta & septima, neque
 ea turbatio præterit breui, sed duranti satis mul-
 tum utraque die. Decimaquarta nullæ euacuatio-
 nes acciderunt, ut in acutis febribus par erat, qui-
 nimo alij erant adeo retentæ, ut neque pharmaci
 obedirent: neque villerent sudores pro ratione fe-
 brium. Non enim intelligendum venit, non obe-
 dientes medicamentis pro ratione febrium. F
 Quia febris vehementia per se non iuuat ad facilem
 expurgationem, sed ut explicuimus, non erant sa-
 dores pro ratione febrium. Febribus enim acutis
 valde familiaris est sudor. Itaque hi icteri facti sunt
 à prima die febrium acutiorum, non tamen proinde
 dicit mortuos esse omnes aut plurimos, sed fuisse
 difficilis iudicii, & amantes recidivas. Vtrumque
 est consideratione dignum, qui facti sunt icteri tam
 biliosi in tempestate boreali & frigida, & qui po-
 tuerint tam multi euadere à morbo regio ante sep-
 timum. Nisi enim euasissent multi, non dixisset fuisse
 morbos difficilis iudicii, sed grauius aliquid. Con-
 siderare oportet Hippocratem non dicere tota hye-
 me fuisse hyberna hyberno modo, sed circa solsti-

nium fuisse hyberna hyberno modo in borealibus.
 Quibus verbis insinuat, ante id tempus, in prima
 iuncta hyemis parte, non fuisse *etiam* *etiam* *etiam*
 tuncque factum borealia accideret, hoc est quædā bo-
 reas flaret. Ergo ante id tempus fuerat hyemis pri-
 ma pars veri similis, & tunc flante boreca repente,
 ut solet, magnum frigus factum est. Cum ingruit
 bilem ab æstare collectam, frigus prioris tēporis non
 extinxisset, erant adhuc biliosa corpora, & à repen-
 tino frigore obstructa, priusquam emendata, in
 morbos biliosissimos inciderunt. & obdurata cute,
 prohibitoque bilioso effluuio, tincta est bile cutis
 Frigus enim paulatim ingruens æquè emenda-
 tionem bilis, & densat corpora, quod vero ingruit
 repente, anticipat cutem densare. Unde ex acci-
 denti biliosi morbi sunt. Hic ergo, illud symptoma
 mutati coloris rationem externæ causæ morbi se-
 quutum est, quæ ratione oportebat minus petico-
 losum esse, quàm in talibus soleret, iam verò Hippo-
 crati dicit ex morbo regio ante septimum omnes
 C ægrotos mori, sed malum esse, neque hoc quidem
 vbiq; eodem modo. Nam quarto libro de ratione
 vicius in acutis contra octo §. simo primo, ita oc-
 currit scriptum, In biliosa febre morbus regius cum
 rigore ante diem septimum factus morbum soluit: si
 vero absque rigore præter occasionem superuehe-
 rit, mortale. Itaque morbo regio accidit quod aliis
 abscessib. Est enim malum signum cum ante diem
 morbi decretorium fit, atque cum non solum ante
 diem decretorium, sed languidè etiam atque tenta-
 D to magis, quàm factio abscessu, pessimum, & nihil
 tunc temporis potest habere boni, ne vt causa qui-
 dem. Significat vero rigor morbo regio adhuc hien-
 ti accedens, maiorem quandam impetum facultatis
 expultricis in partibus. Ac proinde, non mirum, si
 rigor cum morbo regio solbat febrem, & ante
 septimum fit, siue rigore non ita, quamquam ne
 tunc quidem necesse sit, omnes ab eo signo intente.
 Nam etsi mortale esse ponatur, possunt ab eo signo
 ægroti conualescere. Occurrunt etiam lib. 1. sect.
 3. multi qui à morbo regio diei sexti superuixerunt.
 E Potuerunt ergo etiam hi superuivere ante septimum
 icterici, cum præcipue multi illorum corperen-
 tur ictero cum horrore, qui est quidam rigor. In
 hac excrementorum redundancia, cum nullæ euacua-
 tiones manifestæ coningerent, sed versus quæ-
 que diffunderentur, contigit crassiores partes visci-
 centis sanguinis in lienem colligi, ut eertè plerunque
 fit in morbis difficilis indicationis, ob eius visceris
 laxitatem. Verum in quibusdam ita obfederalit lie-
 nem, vt deorsum versus reparent, quod quidem
 exiguo lienis tumore, & quadam intentione versus
 dextram partem, & murmure: quibusdam tursim,
 quod elatione, & tumore eius hypochondrii signi-
 ficabatur. Illis succedebant hæmorrhoides, & vrinæ
 iudicatorie, & expurgatorie, & infra nitebatur. ten-
 tati scilicet testes: his fluxiones sanguinis ex na-
 re sinistra. Nimirum murmuris hypochondriorum
 vt ad inferna vergentium succorum potè, crebta
 apud Hippocr. mentio est, vt & intramscencia hypo-
 chondriorum cum sensu cuiusdam reuulsionis, &
 ad superna retractionis, futuri fluxus sanguinis ex
 naribus est indicium. Hoc erat primum genus mor-
 borum qui ea tempestate acciderunt. Aliud, quod-
 que posterius accidit post austriam fuit catarrhus,
 quem ea temporis nane borealis, nane antrini,
 diuersissime

diuersitas hand dubie erat allatura : nunc anstro A
replente, nunc borea exprimente. Desillant verò
humores non in eandem partem omnibus, sed vt
quisque paratus est, aliis in nares, aliis in palatum
aliis in laryngem, aliis in dentium radices, vnde qui-
busdam excidunt, aliis etiam ad oculos, vnde hu-
midi lacrymantur : aliis ad externas faciei partes,
vnde circauites, aut boccas, aut supercilia, mol-
les innumescentia cedematose. Quibusdam nasce-
bantur tumores in internis oris partibus; vt in fau-
cibus, aut spongij vocatis, quibusdam etiam for-
tasse in gargarione. Quas vocat Hipp. spongiarum ex-
plicat Galen. lib. vocum antiquitatum citans hunc
locum, & ita dicens, *enysa* sūt glandulę circa fau-
ces vt in quarto morborum popelati. Non fiebant
hęc vt febriam abscessus, immò verò febres illis
succedebant, aut simul cum illis nascebantur, qui-
bus etiam sedebantur. Nimirum vt in controuer-
siis monstratum est, morbos huiusmodi, qui ex
incoctis succis pendunt, succedentes aut acceden-
tes febres sanant. Nascebantur itaque aut ante fe-
bres, aut incipientibus febricitare. Multis super-
ius ad utramque partem pleraque horum. Ante-
cesserunt verò in hac tempestate, vt in aliis et-
iam valde morbofis, quedam inditū futurarum
passionum. Nam quibusdam etiam sub autumnum
& hyemem, id est, per autumnum & hyemem, an-
te febrem quam morbi dicti inciperent enim circa
solstitium byemale acciderunt *enysa* hoc est
tumores glandularum, sed & porrigines alius, id est,
furfures multi in capite. Quę omnia excrementa
multa in caputibus indicasse constat. In quibus verò
talis apparatus erat, necesse erat futuram aëris in-
temperiem dictos morbos asserre, præcipue secun-
di generis.

Virgini cum die sexta indicatio aduenis-
set, sexta in morbum recidit, indicata
verò sunt omnia per sextam. In his tempo-
ribus sexta & octaua indicabantur circapleia-
dum occasum.

Non tantum mutationes insignes vnus perpe-
tuoque morbi diebus indicatoris sunt: sed & teci-
duz, cum contigit morbos impetfede indicati,
pari temporis intervallo solent recurrere. Proinde
virgini illi, vt sexta die indicata sunt primum sua
mala, ita sexta à primā indicatione reuerterunt,
& sexta indicata sunt rursum omnia. Nimirum
illis temporibus sextam & octauam contigit esse
indicatorias. Id quod certe fieret, quod morbi es-
sent acutissimi, & mouerentur per pares. Nam vi-
acutissimi qui per impares mouentur, finiuntur se-
ptima, ita qui per pares, finiuntur sexta aut octa-
ua. Qui enim alias finis par sit vnus septimanę
Moueri verò per pares, vt sepe est indicatum, mor-
borum est difficilis indicationis. Itaque iudicari
sexta aut octaua est signū acutissimorum & diffi-
ciliū morborum: tales verò merito fiebant circa
pleiadum occasum. Id enim tempus est autumnus
cui tales familiares sunt.

Mendricæ vxor statim ex pallore vi-
rescens & statim purulentum exiit cir-
ca sextam diem, hepatis cum feruore intum-
uit, & deorsum pauca demisit, sputa car-
nis instar purulenta pauca, alba, lata reiecit:
cibos fastidians mortua est circa vigesi-
mam.

Hęc laborans ardente febre, & biliosa, qua he-
par præcipue inflammabatur, collecta in pulmo-
nem bile, in suppurationem incidit, penuriosam
admodum, vt merito prope vigesimam diem mortua
fuerit. Factum est enim huic, quod in prognostico
his verbis scriptum est; suppurationes, quę cum
bilioso adhuc sputo excreantur lethales admodum,
sue per partes biliosum cum pure excreetur, siue
simul. Maxime autem si incipit procedere suppu-
ratio à tali sputo, cum morbus iam est septimū
diem. Talis verò excrecentem forte vt decimo
quarto moriturū sperandum est, nisi aliquid ei
superueniat bonum. Hęc certe mala superuene-
runt. Nam *capitum* excreant pulmonis, celeri-
ter cōputrescentis signum erat. Alba etiam & lata,
quę sunt etiam rotunda, & consistentia excreta
te malum est, & cibum etiam fastidire. Quare ma-
gis mirandum non ante decimam quartam esse mor-
tuam, quam pauld post interuisse. Sed erat fortasse
firma alioqui natura.

Ex vicinis textoris famula ex visione
deiectiones habuit biliosas, copiosas, hy-
pocondry contentionem. Sexta post suppres-
sionem alui tenuia, copiosa vna vice egestit.
Statim sudauit & indicata est, alui restitit,
eandem autem hora cum riguisset febricitauit,
& eadem rursus hora sudore indicata est.

Illud *ex visionibus* significare potest materiam, aut
causam procarcardicam. Hoc modo significat mul-
terem hanc ex victu calido corpisse egrotare: illo
verò deiectionem biliosam fuisse *ex visionibus* hoc est
ex acrimia & vrente bile. Vtunque hoc ha-
beat (neque enim Hippoc. satis explicat) const-
tat ex ipsa narratione hanc laborasse deiectione
biliosa, & copiosa per aliquot dies, deinde suppressa
alio, nondum vacuatis excrementis, hypochondrii
regionem distentam esse, collectis. s. eo quę an-
tea fluebant. Deinde sexta die à suppressione (ni-
mirum iudicabantur eo tempore sexta & octaua
pleraque) factam illi esse vna vice copiosam dei-
ectionem tenuium & liquidorum, & statim sudas-
se, & indicatam esse, & rursum alui restitisse, ne-
que iam inde fluxisse amplius copiosam deiectionem:
Verum quia tenuia fluxerant ex alui, & sudore te-
nuia etiā euacuari solēt, hæret circa viscera crassum,
ac velut cineriticiū, vnde febris inter mittens (cū rigo
re. n. repetebat) est suscitata: quę vt est verisimile
fuit diuturna, cum repeteret semper eadem
hora, & in aphorismo dicitur. Quibus sunt pa-
roxyismi, quacunque hora febris dimittitur, ita eadem
P

sequenti die ingruerit, difficilis iudicationis est malum.

Therisandri uxor cum leucophlegmatica non valde esset & lactaret, acuta febre correpta est. Huic lingua exusta est, alijs simul vitionem subeuntibus. Sub hoc tempus lingua etiam exasperabatur ut grandine densa, & lumbrici per os eiekti Circa vigesimam vero non perfecte indicata est.

Mulier hæc febricitauit ardente febre ex pituita falsa. Nam incipiens illa leucophlegmatica pituitosum apparatus indicabat & exasperatio lingue velut grandine multa conspersa, & lumbrici per os reiekti significabant eundem succum. Non mirum autem quod ex eo febris ardens nasceretur, & lingua atque omnia existerentur. Nam ut idem Hippocrates 4 de rat. vict. in acutis autor est, duplex est febris ardens, alia ex bile, alia ex pituita falsa. Pituita verò falsa non semper fit putrescentia, sed cum quiddam habet terreæ naturæ admixtum. Quod vero pituita talis fuerit, maxima causa fuit quod lactaret. Lactantibus enim menstrua euacuationes non fluunt, quæ cum ex maligno sanguine fiant, admiscentes se se pituitæ illam reddiderunt malignè putrescentem. Est vero hæc maxima lactantium noxa, impura excrementa quæ singulis mensibus exire solent, retinere pro puro lacte quod exsurgit. Lumbricos, etsi per os nonnunquam reiciantur, in intestinis præcipue gacibus habere generationem, alijs locis dictum est.

Circa pleiadum occasum puero Metrophan-
ti caput ab alio puero percussum est testa, qui cum attigisset duodecimam diem, febricitauit. Occasus autem fuit, quod vlcus detergens partes ambientes attriuit, & refrigeratus est, & intumuerunt statim vlcus labia: Undique extenuata est cutis ultra vlcus. Cum autem non cunctanter scissus fuisset, neque pus effluxit, neque alleuatus est. Iuxta autem verò videbatur suppurationem moliri versus maxillam sinistram, hæc enim parte etiam vlcus erat. Deinde nec hoc suppuraui, sed in humerum dextrum pus subito collectum est. Mortuus est circa vigesimam quartam.

Mirum profecto est mortuum ab vlcere fuisse puerum, cum neque mox percussus ceciderit, neque vomuerit, aut quidpiam habuerit eorum quæ lethaliter percussus accidit, ac multò magis cum duodecimam diem attigerit febre vacans. Non immerito autem dicit Hippocr. Nullum capitis vlcus quantumvis leue contemni debet: sæpe enim cutis sola confusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligenter, aut cum quadam cautione curetur, velut si sanguis concretus non expurgetur, aut aliud quiddam negligatur vlcus recrudescens, non parum molestus exhibet, & aliquando etiam febrem

inducit: & medico quidem negotium, & groto vero periculum non minus affert. Hæc Hipp. Mori vero contingit ex vultu capitis solacite concisa: aut ea sola reuera concisa, & nulla alia parte solutionem patiente: aut quod ea sola concisa esse videatur, lateat vero interius fractura aliqua. Hoc quidem manifestum est, quam sit periculosum: quia dum cutis sola frusta curatur, occidit in insanabilem interior noxa. Sed & citra hanc contingit quosdam mori, ex cutis capitis ruptura, ob pessimum corporis apparatus, aut capitis maximam debilitatem, aut curationem malam, aut tempestivam, regionemque, aut denique vultus rationem incommodam. Numquam cum quippiam horum accidit, ex leui occasione fiunt grauissimi affectus, & ex minimis incitis accipiunt maxima incrementa, ut in statu illo pessimi sectionis tertie libri, tertii accidebat ægrotis, de quibus ita dicebatur. Multis quidem erysipelas accidit cum occasione, ex fortuitis omninoque paruis vulnusculis per totum corpus: præcipue autem circa caput, si quid vel minimum negligetur. Potest itaque nulla interna parte diuisa, fluxio quæ ad sciam cutem conuocetur, lesionem incurabilem in internum caput refundere. Namque ex solo digito gangrena affecto contingit mori, si malum negligatur: Ita accidit Metrophan-
ti puero. Si .n. internæ partes à principio læsæ fuissent, aut mox percussio symptomata aliqua id indicasset, aut certe multò ante duodecimam diem febris & alia superuenissent. Sed non venit ante eam diem, neque tunc citra occasionem sed quod vlcus detergens partes ambientes attriuit, & refrigeratus ea parte est. Leuitas autem occasione indicauit malignum corporis apparatus. Quanquam hinc quoque nos oportet admonitos, arcendos esse capite percussos ab scalpulo, & vlcus nonnunquam esse nudandum citra medicamentum, linamentum, aut lietheolum, donec cicatrix omnino obducta sit, quin & firmata nonnihil. Facillimè .n. alterantur vlcerae partes à frigore, & ut Hip dicebat, vlcera incrudescunt: quod huic eo magis evenit, quod contempnit tege vulnusculum circa pleiadum occasum, frigidissimo scilicet tempore. Narrat verò Hipp. percussum fuisse testa, non oblitus suatum præceptionum, qui libro citato post dicta verba ita scripsit. Primum igitur, capite vulnerato interrogare oportet, per quid vulneratum sit. Nimirum testa non potuit scindere citra partium adiacentium contusionem, quarum si neglecta suppurationis est, meritis succedere potuit maligna putrescentia. Intumuerunt ergo labia vlcus frustione & frigore læsa, & noua fluxione recepta, extenuata autem est cutis multis locis per partes ultra vlcus, hoc est in capite superiori, ut tangenti videretur pus subesse. Atqui etsi illæ partes scissæ sunt non tardè, sed maturè, ut oportet suppuratas, tamen neque pus exiit, neque puer leuatus est. Nimirum illæ cunctis extenuationes non sunt factæ per suppurationem, sed per corruptionem faculatum naturalium in parte male nutrita, ac proinde tabescente eade eodem modo, quo labia ipsa vlcusum malignorum solent extenuari & arescere. Erat verò vlcus in sinistra capitis parte iuxta aurem, parte quidem per se minimè periculosa, ut potest in qua os firmissimum est. Videbatur postquam labia intumuerant, suppurationis colligi eadem parte ad maxillam, quæ iam suppurationis si processisset

B

C

E

F

G

set fuisset salutatis, vt pote secundum rectitudinem in proxima vlceri parte & humiliori facta. Vtrum ea euauit, & humerus dexter suppuratus est. Quod quidem fuit graue signum ob loci contrarietatem, eadem ratione qua vt monet Hipp. ipso libello citato, in perituris conuulsiones in contraria parte fiunt. Si (inquit) in sinistra capitis parte vulnus habeat, in dextra corporis parte conuulsio corripit, si verò in dextra capitis parte vulnus habeat, in sinistra corporis parte conuulsio corripit. Cum ergo tam graue iam signum accederet, breui mortuus est, circa vigesimam quartam. Fortasse quia vigesima quarta sit ex bis duodecim, & duodecima acceperat insignem mutationem. Hæc enim est ratio constitutionis legitima. Sed cor conuulsio in contraria parte fiat, moriturus ex capitis vulnere, & non potius in eadem supersens dicamus. Athenens huius euentus causam facilem commentus est; sed non adeo veram. nervos nullos in sui lateris partes rectâ ferri, sed statim in exortu sese mutuo interfecantes, ad figura græci X. singulos ferri in lateris contrarium. Sed cum hoc falsum esse ipsa anatomie indicet, nihil refert à quo dictum sit, sed alia opus est ratione. Ea verò est hæc: vlcerâ in perituris, vt in prognostico dicitur, siccescunt, & deponunt tumores labiorum. Quibus enim in vlceribus tumores apparent (vt dicitur in aphorismo) non valde conuelliuntur, sed his euanescentibus quia cum perit facultas restringi in parte læsa, cessante sensu & dolore, & trahutione alimenti, ac proinde arescente parte, non recipitur quod venit quare quod mittebatur non receptum quò mittebatur, repellitur in partem contrariam, euanescentique in vlcerata tumores, & conuulsiones apparent in contraria: magis verò si vlcerata pars posterior est, quàm si anterior. Hæc enim, vt in aphorismo citato dicitur, insaniam aut mala alia potius facit, quàm conuulsiones, nisi forte oculorum, qui quia ab anteriori cerebro recipiunt motum, possunt per vlcerationem partium anteriorum, facile conuelli. Sed cur (vt hoc obiter in gratiam lætorum dicatur) si ex dextra sinistra, & ex sinistra dextra patitur, non etiam ex anteriori posterior, & ex posteriori anterior? Certè anterior eiusdem lateris cum posteriori, & posterior cum posteriori parem contrarietatem habet, non tamen parem distantiam. Propior enim est posterior posteriori, quàm anterior. Cum verò fluxio ob dictam debilitatem errat à parte in quam tendebat, consentaneum est declinet prius in contrariam proximam, quàm in contrariam remotam (alioqui & in longissimè positam) & multis modis contrariam feratur primum, quare ex vulnere dextra & posterioris partis, in posteriorem sinistram feretur prius quàm in anteriorem dextram, & ex anteriori in anteriorem aliquo modo contrariam potius quàm in posteriorem. Accedit quoddam aphorismus ille non de vlceribus capitis, sed de quibusuis intelligitur. Sed hac obiter dicta sunt. Huius loci gratia illud solum dicere intenderat, signum lethale esse in vulneribus, conuelli parte contraria, eadem enim ratione lethale fuit huic puero euanescente suppurationem è sinistra maxilla, & dextrum humerum suppuratum esse. Similis vulnerate partis langor, & similis expultricis error.

Post pleiadum occasum, ille cui auris dolebat circa vigesimam diem, postea voce priuatus fuit, & dextrarum partium impotentia laborans sine febre sudauit. Dextra auris, dexter oculus, consistebat non valde, & trahebat aliquid ex inferna parte, in sinistris verò distortus est oculus grauiter dolens. Cereix dura facta est & tertia postea hora aequaliter doluit.

Huic vigesima die febris sapta multitudinem in caput auris dolebat, crescente postea passione cerebri factus est paralyticus toto dextro latere, & vt solent paralytici, voce priuatus sudauit & febris cum abscissu tùm sudore extincta. Auris dextra, & dexter oculus non valde consistebat, idest, mouebatur, vt solent quibus resolutio immineat. Sed quo pacto auris non consistebat? Auricula enim non mouetur, auris verò solus sensus instrumentum est. Certè ita intelligendum est, dextra auris & dexter oculus consistebat non valde, & trahebat aliquid ex inferna parte. Quia oculus non consistebat, & vtraque pars trahebat aliquid ex inferna parte: idest, recipiebat fluxionem ex infernis sursum venientem: quod quidē iudicabatur humiditate circa eas partes redundante. Non admodum curat Hippocr. distinguere, an pars quæ aliunde recipit trahat, an recipiat solum, vtrumque enim hoc habebat, trahere dicit eam quæ recipit: id quod præcipue in oculorum fluxionibus obseruari. Nā & quinta sectione secunda libri dixit, punitæ fluxiones ex maxillis trahunt oculi. Sed addamus reliqua. In sinistris inquit, distortus est oculus grauiter dolens & cereix dura facta est, & tertia postea hora aequaliter oculi doluit. Hæc conuulsione facta sunt. Nimirum dextra pars erat resoluta, & in sinistra oculus & cereix musculi conuulsi. Nam etsi distorti posset oculus resolutione & conuulsione, conuulsiones verò potius sunt quæ à graui dolore incipiunt: & durities illa, ac velut rigor cereix longè aberat à resolutione, Quare argumento à dolore antecedente, & à passione proxime partis, constat sinistri oculi passionem conuulsionem fuisse. Non mirum autem alias partes conuulsione, alias resolutione tenari, passionem enim sunt loco affecto & materia finiales.

Post pleiadum occasum seruus Attici quartand correptus stupidus permansit.

Fauitas frigida passio cerebri est, ex crudis succis, quales sunt puritiosi & serosi. Hæc enim succi vergentes ad corpus faciunt resolutiones, & vergentes ad animam, fauitatem: velut melancholici vergentes ad animam faciunt insaniam, vergentes ad corpus conuulsionem. Nihilominus videmus multos ex melancholicis morbis in passionem illam incidere, vt ex epilepsia melancholica, aut ex melancholia morbo, in resolutione.

nes, & ex quartana, & dicta epilepsia, in fatuiores: quia melancholicus sanguis est admodum serosus, quia in eo boni, & mediocri sanguinis exiguum est, sed totus resoluitur in faciem & serum, velut quaedam vitiosi lactis genera, ex quibus casei & feri extrahitur multum, mediocriter crassi lactis & butyri nihil fere. Hac causa ex quartana findatur multum, & melancholici sunt salinosi, ac reddunt copiosam urinam. Pituita etiam multum colligitur in melancholicis, ob debilitatem caloris & incoctionem. Hæc ergo ob causas, non immerito potuit hæc ægrotus ex quartana fatuus fieri. Quanquam Alexander Trallianus, ut resolutiones nervorum quasdam ex melancholia esse dicit, videtur mihi dicturus esse fatuitatem ex melancholia.

Alius eodem tempore vera typhlomania laboravit, in coxas & crura venit dolor, conquisivit, quota die haud scio.

Ut fatuus, & qui velut mentis stupore tenetur, proxima sententia dicebatur *typhlomania* & qui aperte multumque delirat, dicitur maniacus, ita qui mixtam habet passionem, dicitur ab Hipp. typhlomanicus, & passio ipsa typhlomania. Quanquam apud Gal. occurrit semper scriptum *typhlomania*, non vetustate mutatis in *o*. Cum hæc ægrotus hac passione teneretur, dolore descendente ad coxam & crura liberatus est. Nimirum ut sectione quinta secundi libri dicebatur, si caput doluerit ad pectus descendit, deinde ad hypochondria, postea ad coxam.

Eodem tempore quidam horrebant, vomibant, & post indicationem cibos fastidiiebant, & bile referti erant, & splenis magnitudine, dardite, dolore, & sanguinis fluxu laborabant. Quibusdam autem eodem tempore post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus fluxit propter lienis affectum.

Vexabantur hoc tempore, ut in autumno plerumque solent, ora ventriculorum bile flava, & fiebant morbi difficilis indicationis, & amantes recidivas. Illud quidem indicabant hoerotes & vomitus, hoc fastidia post indicationes, & bilis effusa, & magni splenes, quia ut 6. epidemiorum sectione, 5. dicitur, rigor (est verò eiusdem generis & horror) à superiori ventre fit: & vi 2. sectione eiusdem libri dicitur. Oris resicatio & amaritudo, & fastidium post indicationem relicta, recidivas minantur. Abscessus etiam ad lienem in difficilibus morbis fieri solent. Sunt verò sepe lienosi tumores *apoplyctici*, id est, sanguinem fundentes: quanquam non omnes per eandem partem: sed quibus tumor & intentus ac velut sursum retractus lien est, præcipue si phlegmonosis videatur affectus, quod dolore & calore maxime significatur, ex naribus sunt erupciones, ut sectione 3. lib. 2. dicebatur. Quibus verò minus tumor, & velut in latera & humiles partes distenditur, sunt fluxiones ex hæmorrhoidibus. His ita-

que merito sanguis ex naribus biliosus flebat ob spenes, cum illi essent magni, duri, & dolorosi.

IN Cra none Nicostriati uxorem correptam, decimaquarta die statim anticipavit impotentia colli & aliarum partium, & cibus ad decimam usque intro conclusus est. Spiratio densa, parva, incontinentia aderat, digitis palpabat, delirabat, sudores erant, contracta sunt in dextrâ ceruix, os, oculus, nasus,

Correptos, seu deprehenso vocantur medici, eos qui apoplectica aliqua passione repente corripuntur, & omnium maxime catochos. Hac ipsa ratione dicit mulierem hanc correptam fuisse decima quartâ die morbi, hoc est in apoplexiam aut catochum ea die incidisse, unde haud dubie mortua est. Narrat verò quæ hanc apprehensionem antecesserant, dicens correptam decima quartâ, anticipavit statim impotentia colli, & aliorum, hoc est, mulierem illam quæ decima quartâ die morbi correpta est, anticipavit statim à morbi initio impotentia, hoc est, debilitas, & ægre movebat collum & partes alias omnes, ut brachia, & crura, & cibus inclusus est usque ad decimam, hoc est alium non exoneravit usque ad decimam morbi diem. Quod quidem duplicem habuisse causam est consentaneum, debilitatem musculorum abdominis, similem ei quæ erat in reliquis partibus, & raptum humorum in partes superiores: quibus fiebat, ut feces duræ, à debilibus musculis exprimi non possent. Spiritus etiam hoc tempore fiebat parvus & frequens. Sed cur dicens spiritus parvus densus, addit impotentia? Præcipue cum dixisset mox, anticipavit colli impotentia & aliarum partium? Videtur enim frustra repetitum illud nomen impotentia. Certè rarum quiddam & magnum innuens. Id verò est, respirationem talem non esse factam, quod dolorem partium supra septum transversum, ut in prognostico ab ipsomet Hippocrate dicitur fieri solet, & qua sola causa fieri posse à Galeno putatur, sed ob impotentiam movendi septum transversum. Nimirum anticipaverat hanc impotentia colli & aliarum partium, quare & musculorum pertinetium ad respirationem, quorum præcipuus est septum transversum. Necessarium autem viderur, causam hanc ponere respirationis talis, quanquam eius Galen. non meminerit. Nam si semeresolutum, & cum movendi impotentia septum fit (quid autem prohiberet ita esse) non poterit longum dilatari, quare dilatabitur motu cuto: cum verò vsui, ut pote quem non ponimus diminutum, non fiat satis, necesse est moveatur crebro. Indicar etiam hoc ita habere. Spiritus sublimis, qui creber & parvus plerumque est & delirari imputatur. Verum quia per morbos acutos, qui cum febre sunt, de quibus in prognostico agebatur, dolorosi affectus intra thoracem frequenter sunt, impotentia verò huiusmodi rarissima, atque non ob ipsos acutos morbos, sed ob alios casus ipsis accedentes, ut paralyism, velut perpetuum quiddam statuit illic Hippocrates.

Crebrum spiritum significare dolori: em, aut incendium, crebrum scilicet cum exiguisse dolorem, cum magnitudine incendium, Gal. eum in libris de dyspnœa, tum etiam ubique alibi, videtur contempnissse quatum & quintum libros epidemiorum, quoniam arboris, videntur negligentius scripti quam tres priores, & qui proximè sequitur. Misi verò ex his etiam videtur multum frugis capi posse. Fuit etiam palpius digitis. Quod signum instantis delirii esse in prognostico dicitur, in hac verò euentus id aperte significavit. Nam deliravit etiam. Quia propter videtur hæc affectio, donec in magnam & manifestum deprehensionem venerit, velut exingruente apoplexia & phrenitide mixta fuisse, delirabat enim, & partes omnes sensim in resolutionem ibant: quæ quibusdam in partibus manifesta fuit, nam ceruix, os, oculus, nasus, in dextram partem contracta sunt, per resolutionem, arbitror, partium sinistrarum. Nam etsi tortura faciei, convulsione partis versus quam distorquetur, aut resolutione contrariæ fieri possit, tamen impotentia quæ antecessit, & apoplexia subsequuta, nos vocant in resolutionem. Non poterant autem hæc nisi admodum pleno corpori contingere, unde & sudores crebri fiebant: & decimaquarta die in apoplexiam malum finitum est.

*V*rinarum subsidencia alba orobina, alia alba ramentosa, alia subchlora vitellos pisces refertens. Hinc aliquando ut pingue quiddam superstabat, hocque acervatum, non multum dispersum, ut enzorema disparatum, ut quod exiit ex ouicula. Non subsidens quid deinde mingebar, quod quidem interdum huiusmodi erat, interdum autem residibat. Aliud huiusmodi paucum in latitudine dispersum: aliud perturbatum erat, aliud huiusmodi. Enzorema nubecula nigra quæ videbatur crassitudinem habere. Laxum autem aliud tenue aliud enzorema tenue tale, aliud quale equi, aliud velut quæ caliginosa sunt.

Non est Hipp. institutum hoc loco, logicam partitionem, & quæ differentias omnes urinarum continet, facere, sed memoria mandare eas quæ ea tempestate in ægrotis occurrerant excretiones, & experientia gratia. Proinde veritatis nunc & observationis magis quam logicarum differentiarum studiosus, collatione cum rebus quibusdam, quæ extra nos sunt, & cum vitiis aliorum animalium, qualia & quomodo apparebant, quæ maxime ratione potest, conatur fideliter explicare. Atqui, quia non solum in multis ægrotis apparebant variae differentie, sed in quibusdam etiam eisdem, nunc hæc nunciat, cum dicit aliud huiusmodi, aliud alterum, significat, cum idem ægrotus pluries videretur, aliam urinam fuisse huiusmodi, aliam non. Sed percurramus singula verba. Vinarum, inquit, subsidencia alba orobina, alia alba ramentosa, alia subchlora vitellos pisces refertens. Orobinum contentum urina duplex est, quoddam

sola figura orobinum ut grana orobinis similia, alba tamen, quoddam colore & figura orobi granis simile. Itaque quæ ut grana quædam sunt figura, simulque frustulis veterum vitellorum colore similia, orobina simpliciter sunt. Quæ grana alba sunt orobina alba: quæ verò sunt frustula alba, non rememora figura ut grana, sed ut ramenta, est alba ramentosa subsidencia. Hæc quidem sunt exulceratione viarum: orobina verò visione succorum, alba, pituitosorum humorum simpliciter signa sunt: orobina, sanguinis biliosi. Hinc (addit) aliquando ut pingue quiddam superstabat, hocque acervatum, non multum dispersum, ut enzorema disparatum, ut quod exiit ex ouicula. Scilicet, hypostasi orobina simili vitellis pisces (illam enim refert illud, buic) superstabat aliquando ut pingue quiddam, non qualecunque, sed acervatum mixtum. Metico sanè; nam illud orobinum sit, sanguine bilioso in renibus vito, significat verò pingue confertum mixtum, ut in aphorismo dicitur, eodem tenore. Proinde consentaneum est, quibus talia orobina munguntur, supernatant etiam pingue acervatum, non multum dispersum, ut simile sit enzoremati disparato, ut (inquit) quod exiit in ouicula, id est quæle est quod apparet in ouium urinis. Quo loco licet mirari Hippocratis diligentiam, qui observabat non solum hominum, sed aliorum etiam animalium urinas, quod aliquid inde fructus caperet, conferens urinas cum urinis ad eorum agnitionem, aut etiam ad cognitionem naturæ. Nimirum erat contemporaneus, & amicus Democriti, qui omne genus animalium, etiam reptilium dissecabat, tanta erat philosophorum illius seculi diligentia. Sed videamus reliqua, non subsidens (ait) quid deinde mingebar, & aliud quiddam huiusmodi, aliud autem residens, aliud huiusmodi paucum in latitudine dispersum, aliud perturbatum erat, aliud huiusmodi. Hoc est, aliquando erat urina ex qua nihil separabatur. Neque ramentilla perseverabat, sed alia mingebar huiusmodi, alia residens, alia huiusmodi, hoc est, non residens manifeste, sed habens paucum dispersum in latitudinem, alia perturbata, alia rursus huiusmodi, hoc est non perturbata, sed in qua nihil residerebat. Quod quidem significabat, mellos, varios, & inæqualiter coctiles succos. Enzorema, inquit, erant nubecule nigre, hoc est in quibusdam erat quod contineretur nubecula nigra, quæ videbatur crassitudinem habere, hoc est, quæ ob nigritiem videbatur crassior quàm erat re vera. Erat verò aliud enzorema laxum (hoc est disruptum, deinductum, seu sparsum, denique non coherens, & coherens) tenue, aliud tenue tale, hoc est, tale qualis nubecula coherens, quæ etsi ob nigritiem videbatur crassa, erat tenuis. Nihil autem habet admirationis descendere cum urina nigrum quod tenue sit. Nam habet etiam melancholia partes faris tenuis, imo verò multas. Næ ut super monstramus, est admodum serosa, & lenis substantia nutritur nigro & tenui, quæ proinde, ut est nigrior, ita tenuior hepate & aliis visceribus. Addit, Aliud quale equi, aliud velut quæ caliginosa sunt. Quæ verba ad ipsam fufuram urina referuntur, non ad aliud quidpiam quod in ipsa contineretur, aut innaret. Constat urinam qualem equi esse eam, quam in aphorismo vocat similem urinas fufurorum, dicitque significare dolorem capitis, qui adest aut aderit, quæ quidem est perturbata, non

vicioque, sed perturbatissima. Itaque quamquam dixerat antea perturbata, & nunc dicit quale equi, non est repetitio inutilis. Non enim quamcumque perturbatam dicimus esse qualem equi. Caliginosam urinam, aut similem caliginosam vocat urinam; obscuram magis quam crassam. Ut ergo videmus fucos quosdam esse crassos non valde obscuros, sed pelluceos: ita constat esse alios turbidos, obscuros, & renues. Non enim obscuritas semper comitatur crassitatem, ut dictum est. sed est aliqua crassis clara, aut saltem non valde obscura urina, & alia caliginosa tenuis, aut saltem non valde crassa. Cum summa enim tenuitate non potest esse nisi aquosa, quæ est alba perspicua, neque cum summa crassitie, nisi cænosa, quæ est etiam obscura. Verum potest esse inter has alia minus obscura, quam pro crassitie, alia minus crassa, quam pro obscuritate: illa significabit pituitam vitreæ substantiæ non ab similem, hæc melancholicæ tenuem ichorem.

Qui primus mære captus est adolescens, huic urina erat pura tenuis, omnium deiectione tenuis, multa, sine bile. Lingua aspera admodum, febri valde urens, in somno. Alius gibbosa. Hic deliravit arbitror octava die procaciter, exurgebat, pugnabat, turpia loquebatur fortiter, cum insolitus esset. Huic cum urinas multas,ennes confertim reddidisset, ex suppressione somnus accidit continuus, & sudor qui ex eo indicatorius videbatur, quod fortasse circa decimam: Deinde & insaniuit statim, & mortuus est celeriter undecima die. Occasionem fuisse arbitror, quod multum merum bibisset, antequam insanires. Huic pauci erant anni prope viginti.

Quæ febris esset hæc, & quæ eius causa, & quod, quous tempore, quique humoris reperiret, ex ipsis symptomatis licet agnoscere. Ardentem enim fuisse ex bile, eaque exalta, ut arde bilis naturæ iam accederet, iudicat lingue asperitas, & quod febris esset valde urens, & perunguiliu, & delirii species. Causa autem quæ bilis metaciore est facta, duplex esse videtur, ipsum incendium febris, & quod aqua, quæ soler bilis delui, funderetur largiter, in primis per fecesum, deinde per urinam. Et cum aqua deorsum inclinaret, bilis facta calidior & metaciore rursus efferebatur. Quod indicabat urina pura tenuis, hoc est, alba & perspicua, qualis aqua, & deiectione per febrem, urentem sine bile, & perunguiliu, & gibbosa alius. Hoc est alius tumida, clara, & protoda incurua. Cum enim ea deiectione aquæ multa fieret, ob retentionem circa viscera bilem, & sursum eant, fiebat. Quod sublequutum delirium declarauit. Delirauit (inquit) arbitror die octava, Nimirum cum non esset Hippocrates satis certus quæ die, ut fieri solet, cum principium morbi non satis exatè ex relatione agnosceretur, aut inter duos aliquos dies mutatio

venit, reiecit illud in octavam ob naturam tempestatis illius, quæ omnia sexta aut octava recipiebant insignes mutationes. Quamvis verò delirium esset, multis exagerat Hippocrates dicens, delirauit procaciter, exurgebat, pugnabat valde torpia loquebatur, & (quod magnitudinem delirii maxime auger) cum huic insolitum esset, hoc est cum ipse alioqui esset honestus, & modestus, & temperans. Huic ab initio fuerat mictio exigua, aqua, ut est consentaneum, deriuata ad aluum, & bile,

ut mictionem moere solet, sursum clara. Nam ut dicit, fuit omnium deiectione multa, sine bile. Cum verò nomen hoc *διὰ σπινος* latine fecesus significat præcipue deiectionem alui, & hic non de omnibus eius tempestatis ægrotis ageret, sed de solo hoc adolescente, constat dictum esse omnium deiectione, quasi omnis deiectione. Itaque quia erat omnis deiectione tenuis, multa, sine bile, urina reddebatur exigua donec post octavam,

erumpente arbitror patte aliqua bilis eius quæ alui tuncbat, per vesicam, minxit confertim multa tenuia, & somnus factus est continuus, & sudor, bile effusa pariter per vias urinae, & corporis habitum, & ad tempus recedente in cerebro, quod tunc temporis sanguis pituitosus occupauit. Sudor ille indicatorius videbatur, quia circa decimam, quæ his morbis qui moentur per pares, est pro undecima. Et ob hanc ipsam rationem, Hippo. non satis certus diei, reiecit in decimam, dicens, circa decimam fortasse, & quia sudor calidus erat per totum, ut hæc etiam causa magis indicatorius esse videretur. Tamen cum nulle concoctionis notæ antecessissent, non poterat esse iudicatio perfecta. Fortasse non fuisset inutilis, nisi, dum hæc agerentur, adolescens per intemperantiam bibisset multum merum. Ex hac verò occasione insaniuit statim, & mortuus est celeriter, undecima enim die. Mortuus fuit intra diem & noctem hæ occasione. Eo enim tempore iudicantur, quæ à causis procaciter eis sunt graues noxæ. Et quidni fieret, ex vino multo meto, adolescenti viginti annorum, in summo febris ardentis cum prenitide consuetor

Eumenis vxor, autumno vomuit bilem nigram, hoc ipsum autem odores manifestabant, & febris cum horrore, & cardialgia, biliosa pauca vomuit & lumbricum. Deiectionesennes erant per totum tempus ante occasum pleiadum, desinebant etiam circa ipsas, & fluxum sanguinis aderant, & breuiores febres, & statim reuertiennes breuibz recidimus. Egri cibos non capiebant & excocti erant & anxii, oris ventriculi dolore & lumbricis infestabantur in indicationibus, & rigoribus concutiebantur, & bile reserui erant.

Iocipiens ab ijs, quæ vxori Eumenis acciderunt digreditur ad ea, quæ in commune ea tempestate accidebant multis. Non dicit qui fuerit morbus præcipuus vxoris Eumenis, consentaneum autem

fuisse febrem acutam, & periculofam, quales autumno folent fieri. Quicunque autem fuerit, ex his symptomatis quæ illi acciderunt, constat fuisse periculofiffimum, siquidem os ventriculi laborabat multum à materia biliofa malignè putrefcente. Vomebat enim nigra, & admodum graueolentia, & habebat cardialgiam biliofam, hoc est, dolorem oris ventriculi à bile. Vnde oriebantur febres cum horrore, quia, vt dictum est, sæpè sensus eius pariter facit, vt eas patiente crebrè rigeant, aut horreant ægroti. Hincetiam fiebat, vt crebrè vomeret, irritato scilicet ore ventriculi: mirum vero quod tales succos in ventriculo colligens, lumbrici vomeret. Nam acres & acidi occurrere solent animalculis huiusmodi. Sed hoc quidem, occesse erat fieri, in intestinis gracilibus genitis ex semiputris chylo lumbricis, & affeodentibus in ventriculum, ubi necarentur à malignis succis, & eorum vi extincti reiciuntur. Non dicit quem habuerit exitum morbus: ego verò suspicor, mortuam esse hanc mulierem. Quia vomitus nigros, & graueolentes, in perniciosus ponit Hippo. in prognostico. Deinde diuertit ad ea, quæ in multis obseruabat, hæc scilicet; deiectiones erant tenues per totum tempus ante occasum pleiadum, hoc est, per totum autumnum; desinebant etiam circa hyemem, hoc est, circa ipsarum occasum, & ineunte hyeme sanguinis eruptiones; & febres fiebant breuiores quam superiori autumnò, & statim reuertentes breuibus reciduiis, hoc est, ex breuibus intermissionibus habentes breues, & multas reciduias, & erant ægroti valde anxii, & exocchi, hoc est, viti, & anxii, & huiusmodi, & prædictis in indicationibus, & ægroti, & anxii, hoc est, bilem hæc & illac effundentes, & colore, æ reliquis symptomatis bilem præ se ferentes. Vbi legi, anxii. Græcè dicitur *ἀνξιος* quæ vox solet significare fastidiosus, eos præcipuè qui ex satietate fastidiunt. Hic verò constat, id nomen non dici de fastidiosis, nam dixerat *ἀνξιος* hoc est, cibum non capientes: non adderet verò fastidiosus, quia vox hæc *ἀνξιος* multo magis abhorrentes à cibis significat, quam *ἀνξιος* etiam cum hæc de fastidiosis dicitur. Quare ineptè, cum dixisset *ἀνξιος* adderet *ἀνξιος*. Sed hic *ἀνξιος* dicuntur anxii, velut & paulo post, in hoc ipso libro. Quædam Hippocrati enarrante Gal. libello de antiquis vocibus, significat nonnunquam lumbricos, aut morbum per quem bestiolæ illæ reiciuntur, non nunquam vlcus ægeste & malignom. interdum etiam significat refectionem. Hic nulla ratio est, ob quæ de vlcibus intelligatur id nomen, men duorum alterum significare potest, ægrotos circa solutiones morborum acutum tabescere, aut per morborum indicationes reicere lumbricos, & vtrumque quadrat nature temporis. Nam tabes familiares sunt autumno, & Hippoc. (quem locum Gal. lib. de vocibus antiquis citat) vocat *ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ*, à lumbricis, qui eo tempore multi gignuntur. Et in hanc de lumbricis suspicionem feror potius, ob id quod de vxore Eumenis dixerat, *ἡ ἀρχὴ ἀνέστη* id est, *ἐκ τῆς ἀρχῆς* itaque dicit in indicationibus illa tempestas lumbricos apparuisse. Quibus autem causis siogola illorum fierent, constat ex sæpè iam dictis. Illud solum nunc sit satis dicere, omnia quidem fuisse morbo-

rum periculoforum, & difficilis indicationis, quales autumno, præcipuè solito insalubriori, erant familiares.

Adolescenti peregrino sanguis ex naribus multus fluxit tertia & quarta & quinta. Sexta cessit, comatosus erat reuersio tertia die, alius desistit reniti. Vrinam non vidi circa indicationem, vt oportebat: circa pleiadum verò occasum austris flabant & pluuia aderant, & tunc adolescens mucosa; subbiliosa, cocta demittebat, & lentas multas deiectiones. Febris erat continua, lingua arida. Indicatus est sexta. Septima statim arripuit, dimisit eadem die cum tremore, fluxit ex aure sinistra lentum & crassum sexta.

Ex te redundantia sanguinis pituitosi magis quam biliosi, ob austrinam constitutionem caput occupante, videtur morbus hic uetus. Nam occupati caput, fluxio sanguinis de naribus in principio appareos, & expurgatio ex aure, quæ morbum fuit, uir, apertissime indicantur, præter delirium & coma: non fuisse autem sanguinem biliosum, nisi modicè, probat modus delirandi, qui fuit moderatus, & compositus, velut ex sanguine minori abundantiam pituitæ indicant coma & deiectiones mucosæ, lentæ, & multæ, & quod ex aure exiit. Lentum enim illud etiam fuit & crassum, fuisse tamen etiam noui nihil bilis (nam qui posset nouo esse in ardente febre) indicant deiectiones, quæ etiam fuerunt subbiliosæ, & arida lingua: tamen hæc minus, quia ex salsa etiam pituitæ qualitate fieri poterat. Vbi dicitur, & tunc adolescens mucosa, subbiliosa, cocta deiciebat, in quibusdam codicibus desideratur illud cocta, & sententia nihil læditur. Nam reuera illa oon erat cocta. Crassa enim sunt quæ coquuntur, non lenta. Quare suspicor redundare eam voculam, aut significare descendisse simul cum succis crassis, & lentis, faeces similes iis, quæ ex aluo egeri solent. Illæ enim cum crassiniem quandam, & colorem quandam sunt consequutæ, sunt quodammodo coctæ. Enumeratio dierum in hoc morbo est difficilis, quia Hippocrates noluit id oratione satis explicare, & præpostero ordine videtur narrationem prosequi, vt vix intelligas quæ dicit, in de eisdem diebus pluries differens, an de diuersis, dicat. Ego verò curabo, vt apertè explicem, *καταρτισθαι ἀνέστη* seu, *ἀνέστη* (nam os illud differt) significare solet Hippoc. vt Galenus dicit in libro antiquarum vocum, accessioem quæ cum comate reuertitur velut solent quibusdam, tertianæ, aut quotidianæ, redire semper cum sopore. Quare ubi dicit, erat comatosus reuersio tertia die ne intelligas aliquam rediunā factam esse tertia die ab aliqua indicatione sed eam figuram morbi exponere, ac si diceret, tertia quæque die fiebant accessiones cum sopore. Nam si de aliqua recidua loqueretur, non diceret, erat reuersio comatosus, sed fuit. Itaque dicit hanc febrem

foris continuam cum lingua arida, & habuisse accessiones comarosas terribiles, & vsque ad sextam diem, quæ restaret. Fluxisse sanguinem à tertia. Alio etiam die fecisse septima: antea enim fluxerat, qualibus postea dicitur. His dictis de morbi figura, ad sitque ad indicationem pertinuerunt, dicens primam quæ circa indicationem, & ante ipsam enervant, deinde qua die facta sit indicatio, deinde quæ subsequuta sunt. Alius, inquit, desistit remitti, & vinam non vidi circa indicationem, ut oportebat. Hoc est cum alius antea nictetur semper ex-cernere, & fluere, circa ipsam indicationem desistit (nato ut mox diceretur, indicatio facta est die sexta, & septima alius iam fecit) & vinam, inquit, non vidi, qualem oportebat quo bona esset indicatio, concedam scilicet. Quid ergo apparuit ante indicationem? Cui, inquit, tunc, circa plethum, occasum Austri flarent & pluvie adessent, quæ scilicet alui fluxiones nata erant facere, adolescens mucosa, sub-biliosa cocta demittebat, lentas & multas deiectiones quæ scilicet redundantie erant magis, quæ quod materia superata reieceretur. Proinde tamen febri esset continua & acuta (hoc significabat lingua) quales sunt, quæ indicati consueverunt, tamen iudicio quæ sexta die est facta tam fuit infida, ut mox die septima febri reuertetetur. Neque mirum: nam illa indicatio, habuit omnia contra se oportuit. Nam concessionem non apparuerunt, & euacuationes, quas tunc oportebat inire, tunc cessauerunt. Itaque indicatus est sexta infide. Quia septima statim attriuit eum febris, quæ tamen rursus eadem die dimisit illum eum tremore. Non arbitror cum tremore propere, ut Galenus vti eo nomine vult, ut scilicet est motus talis à sola debilitate facultatis animalis, non enim tam repente fit facultas ex forti ita languida, & rursum ex ita languida fortis. Quare non tam repente incidit, aut diutius durasset tremor. Sed quia incidit est *primus rigidus* hoc est, partim tremor, partim rigor. Quem Galen. dicit Hippoc. vocati non *primus* sed *tertius*. Mihi etiam nomine *primus* videtur Hippoc. vi pro tremore rigoris participio. Sunt verò tales multi tremores. Ita enim tremunt, qui timent, & labia eorum quibus inflat vomitus, & erura eorum, quibus partus. Huic adolescenti magna causa rigendi fuit, cum, ut enectus indicauit, pus aliquod circa auris partes gignetur. Languidioti ergo facta facultate à febre prægressa, coniungit cum dimittit, sicuti tremorem cum rigore: non expurgata verò malicia: sed procedente eius suppuratione, sexta die à recidies (non enim est à principio sexta, quam antecessit septima) fluxit ex sinistra aure curum & crassum, pituitosum scilicet, non bene suppuratum, quandoquidem lenum. Itaque hic etiam ægrotus fuit vnus eorum qui sextis diebus recipiebant insignes mutationes, & totus morbus videretur attingisse, aut decimam tertiam, aut solium duodecimam, ut longior, aut breuior fuerit ea intermissio febris, quam sexta attulit. Tamen enim dicit statim septima febrem reduisse, non dicit qua hora, potest verò esse in viginti quatuor horis septima, & si quas alias sextæ etiam dimisit tanta intermissio. Sed hoc non multum refert. Quod tota dictio continet, ego, aliter compositis verbis dicam apertius. Adolescens peregrinus habuit febrem continuam, & linguam aridam, & comarosas reuersiones tertis diebus. Tertia die sanguis ex nari-

bus multus fluxit, & quarta, & quinta, & cum esset tunc circa plethum occasum Austri flabant & pluvie aderant, adolescens mucosa, subbiliosa cocta demittebat, non utcumque sed lentas, & multas deiectiones. Sexta restitit sanguis, & ille deltrauit compositus, & indicatus est alius niri cessauit, & non vidi vinam circa indicationem, ut oportebat. Septima fecit alius, & statim febris attriuit, & dimisit eadem die cum tremore, fluxit ex aure sinistra lenum & crassum sexta.

Puero Phagedana laboranti, dentes inferiores & ex superioribus & inferioribus anteriores emergebant, & cavitatem habebant quibus os ex palato abscedit, iis medius nasus subsidet: quibus verò dentes anteriores superna parvis excidunt, ij extremum nasum habent latum. Qui quintus ab anterioribus numeratur, quatuor habet radices vnicuique vicinorum dentium veluti connexas, omnes quidem ad internam partem reflexas. Iuxta tertium dentem plures accidunt suppurationes, quam iuxta alios omnes, & quæ ex naribus fluxiones & ex temporibus dolores ex hoc maxime contingunt. Exeditur hic maxime quintus, ex medio quidem excrescentiam habebat: duas autem ab anteriori parte. Parvus primus interius iuxta duos exedebatur. Radicem vnā crassā, acutam habebat septimus.

Hæc oratio partim pertinet ad disputationem de abscessibus, partim ad causas similitatis, partim ad anatomiam: tota tamen ad dentes. Accipere solent dentes, magnam, & numeri, & magnitudinis, & figure, differentiam in variis hominibus, maiorem multo, quam alie quæcumque partes. Septem enim qui hunc minores, alii sunt maiores: & qui huic plures, illi pauciores radices habent, est tamen quedam formatio communis plurimis: quedam eorum, quæ Hippoc. hic dicit, notat ut pertinentia ad communem formationem, quedam ut rara. Quæ tamen hæc sint, non aliter intelligere possis, quam sciens, quæ accidunt plerisque. Dentes esse solent triginta duo, in utraque maxilla sexdecim. Quatuor anteriores sibi in anteriori, & media mandibule parte, ampli, & acuti, quibus ad incidendum vitium, vocanturque ob id incisori: duo vocati canini, ob figuræ similitudinem, utrinque vnus, quibus vitium ad frangendum: decem molares, quibus vitium ad comminandum, utrinque quinque. Incisori, & canini habent radices lingulas: canini longiores multo, & crassiores ac magis rotundas, ut cum omnes infixi sint ut clani, hi videantur esse clausi grandiores. Molares habent radices plures, duas enim aut tres, aut quatuor. Nam neque in omnibus hominibus, neque omnes molares, neque in ambabus maxillis, totidē. Superiores enim plures, quam inferiores, & qui ad postremam maxillæ partem spectant, plures quam anteriores radices habent: ut plurimum, in superiori maxilla tres postremi molares habent quatuor,

& duo anteriores binas. Postremi etiam habent
radices tortuosas magis, firmitudinis gratia, quam
anteriores, & superiores quam inferiores. Omnes
recipiunt per radicem venam& arteriam, ex
ijs que in totum caput ex ingularibus distribuun-
tur, & neruorum ex tertio paricorum qui descendunt
ex cerebro. Omnes solent excipere abscessus præci-
pue ex capite. Nam & secundo libro sectione
prima, inter partes abscessibus opportunas den-
tes numeravit. Nunc ergo dicit, puero laboranti
phagedæna (secundum os scilicet, quæ pars ex-
terioribus viceribus crebro solet corripi) dentes
maxillæ inferioris (omnes scilicet) & utrinque
maxillæ anteriores (qui dicuntur incisori) eme-
gebant, idest, excidebant, nempe suis alveolis, &
cauitatem habebant, hoc est, cum alveoli pro den-
tibus relinquebantur. Sed cum dixerat dentes
inferioris maxillæ omnes emergebant, addit ex
superioribus & inferioribus anteriores Frustra enim
videtur repeti, ex inferioribus? An ut significetur
facilius corrumpi inferos superis, & in utrisque
anteriores posteriores? Hinc arripit occasionem
digrediendi ad similitatis causas (quod physiologi-
cum nunc pathologicum est) ac dicit, quibus os
ex palato abscedit, iis medius rasis subdidit. Os
hoc esse videtur, quod Vesalius vocat sextum ma-
xillæ superioris, quia collocatur ad finem palati,
quæ narium foramos in oris amplitudinem per-
tinent. Hic cum firmetur, ut quodam cemento
nares, si ob corruptionem id os dehiscit ab aliis,
& subdidit, media etiam nasi pars subdidit, ut si
folet ipso Gallico, aut Elephantæ corceptis.
Quoniam autem duodecim officulis, propriis si-
nibus circumscriptis, constat maxilla superior (nisi
etiam pluribus) sit sæpe, ut illorum aliquod pu-
tredo denaset, quæ oc alia quidem attingit. Qui-
bus verb, inquit, dentes anteriores superæ par-
tis excidunt, hi censentur habere, extremum na-
som latum, quia maxillæ lamina exterior, eleuari
ab infixis dentibus desinens subdidit, ac cum illa
nasi extremum. His dictis transit ad dentium hi-
stotiam, & vocat quintum ab anterioribus ter-
tium, molarem. Anteriores enim hic dicitur duos an-
teriores, & omnium medios, quorum uterque est
primus sui lateris. Oportet eum intelligere man-
dibulam per medium in distas partes locari, ut
revera gemina est. Inter distas enim duos dentes
habet osium agglutinationem. Ergo post hunc
primum in quouis latere superest incisivus unus,
& caninus alter, quare tertius molaris est post pri-
mum quintus dens. Ille, atque ab illo etiam reli-
qui molares, quartus & quintus præcipue in su-
periori maxilla, habent quatuor radices, binas ad
vtrumque vicinum dentem, omnes reflexas ad in-
ternam partem. Hinc redit ad abscessus ac docet
quiddam, quod apud Hippocratem magna cum
voluptate reperi, ut pote sæpe à me uocatum. Iuxta
tertium dentem suppurationes plures fieri quam
iuxta alios omnes, ac proinde sæpius exedi, & huic
condolere magis tempora, & fluxiones crassas na-
sum ob hunc magis pari. Causa quæ tempora con-
lent dentibus, est in ea portione verui terræ
coniugationis, quæ erumpit è ciliaria, quæ con-
ticularum mandibulæ: Ea enim distribuit in
tempora & radices dentium, unde compassio
temporum, & dentium. Quod verò maior com-

passio cum tertio, hoc est, cum canino sit, causa
est maior crassities, & longitudo radices, excipit
eom ob id plus nerui venæ & arteriæ, quam alii,
& nariibus propriis accedit, & rectius situs est.
Quæ mox sequuntur pertineant ad dissolutionem.
Quintus, inquit, ex medio quidem excrecentiam
habebat, duas autem ab anteriori parte. Quintus
hic dicitur secundus molaris. Duo enim incisivi
sunt, & unus caninus, post quos secundus molaris
est quintus dens. Hic ut & primus raris habet qua-
tuor radices, sed tres, quum plurimas, duas ab an-
teriori acie, & aliam velor ex medio deote erom-
pentem. Addit parvus interius iuxta duos exede-
batur. Hoc rursum pertinet ad abscessus, parvus
primus verò dicitur secundus incisivus, quia
incisivi sunt primi dentes, duo verò medi sunt
maiores multo aliis, proinde alii dicuntur primi pa-
rui. Alter ergo horum interius exedebatur iuxta
duos proximos, hoc est, pertingente exfione duos
dentes proximos. Addit deinde aliud, quod ut ra-
rum notavit. Septimum scilicet in quodam homine
habuisse radicem vnam crassam. Septimus enim est
quartus molaris, qui habere solet quatuor, aut mi-
nimum tres radices. Verum, ut diximus, dentium
formatio magnam recipit varietatem.

*Athenade puero masculo doluit à sinistra
parte infernus dens, superius à dextra.
D Hinc auris dextra suppurata est, cum non
amplius doleret.*

Quandoquidem non dicit, qui dens, suspicor
fuisse tertium, quem omnium maxime solere ten-
tentari dolore nuper dixerat. Fuit verò ille
aut quivis alius, merito malum ad pus per aurem
venit, ut solet scilicet, quia communio magna est
dentibus cum aure, cum quintæ coniugationis
E nervorum cerebri pars abeat ad aurem, pars co-
alescat prope maxillarum articulationem cum parte
tertiæ, quæ emittit furculos in dentes. Merito
etiam cessavit, cum primam pus apparuit, den-
tis dolor: quia quæ in hanc partem mittebat cere-
brum, in aliam mittere cæpit. Atqui hoc est per
abscessu liberari. Nam ut de his mutationibus dixi
Hippocrates, impossibile est omnia simul dolere.

*Post vergilias clemens cælum, nubilosum
& caliginosum. Iudicationes quinta &
sexta, & septima die contingebant, quadam
etiam longius extendebantur. Recidivum fa-
cientes febres aderant, & ad erraticarum na-
turam accedentes, agri cibos fastidiebant, bi-
le referri erant, & dysenteria cum cibi fasti-
dio, & febre vagabantur.*

Mala de morbo dicit, quod paulò post dicit post
pleiadum occasum, tunc enim fluxerunt Austri,
qui placidum reddunt cælum, & nubilosum
& caliginosum, ut ex superioribus constat.
Tunc, inquit, contingebant iudicationes tri-
stium & febrium & id quodam quodam etiam longius
extendebantur recidivam facientes febres aderant,
& ad erraticarum naturam accedentes, hoc est, indi-

cationes accidebant quinis, sextis, & septimis diebus, aut ad plures dies producebantur. Revertebantur verò & certis diebus, & erratico modo. Ad hanc eandem sententiam pertinent, & eius exempla sunt, quæ paulò post dicit. Post pleiadum occasum austri habant. Quæ quina die iudicabantur, intermissa una repetebant. Et illa etiam. Sutor quædam septima iudicatus est, cum vnam diem intermisisset, altera verò rediisset, rursus quartâ iudicatus est. Alius ex iis qui à Leocyde venerant septima iudicatus est. Alius quartâ. Moschus, paucâ. Largus stillauit sanguis à sinistra nare, paucâ ex dextra: ad decimam quartam in iudicationem morbi tendebant, errantibus circa edulla vsque ad decimam septimam producebantur. Nimirum hi partim iudicabantur quina, sexta, septimâ, partim tardius recidebant, partim vna die interposita, partim incertis intervallis. Quia hæc omnia pertinent ad difficiles iudicationes, quales morbus autumnalibus, aut in autumno contractis familiares sunt. Erant enim cum cibi fastidio, & biliosæ febres. Quia arboriorum non acciderunt initio hyemis frigora tempestiua quæ extinguere bilem, & ob eandem causam vagabantur dysenteriz cum cibi fastidio & febre. Optimum est in dysenteris non fastidire cibos, quia venter superior bene sese habet.

Circa Pleiadum occasum austri vehementer flauerunt, hæmorrhagiæ vagabantur & febres tertianarum figuram referentes, & ad epialarum naturam accedentes.

Cum, vt dictum est, hoc initium hyemis non posset bilem extinguere, vagabantur hæmorrhagiæ (biliosus enim sanguis maximè fluit, & austri non cohibet, sed potius fundit) & per putredinem bilis intra venas, quam austina constitutio omnibus succis, quin & rebus omnibus nata est afferte, tertianæ continuæ: quas Hippocrates vocat *typhloides*. Cum verò non possent non ea anni pars aliquid pituitæ adicere, succorum calidi & frigidi mixtione, contrahebant febres naturam epialarum, per quas simul ardere & algere videntur corpora.

Qui in strata decumbebat, sanguinem fudit valde biliosum; paucâ deniquebat, iudicatus est septima cum rigore.

Quia sanguinem fudit valde biliosum ex natibus, paucâ deiecit: Conscendens enim multa humiditate & ea biliosa in caput, siccata sunt stercora in ventre, & cessauit fortasse quotidiana irritatio intestinorum, quam affert bilis. Siccauit etiam fæces ipsa febris, quæ fuit ardens: cui familiaris iudicatio est rigor, siquidem à febre ardente rigore superueniente solutio. Cum ergo hic non acciderit sexta, quæ solet esse malus, sed diem optima, potuit iudicare, etsi morbus processit per difficilia. Fluxus enim ille sanguinis ante

A indicandi tempus. malum erat signum, vt causa verò videtur fuisse bonus, quia non vt stillæ, sed copiosus.

Per qui iuxta extremam camponam decumbebat, sanguinem ex naribus profudit die quartâ, statim rugabantur multum, alius resistabat, hypocondrium durum dolébat. Supposita glande die sextâ deiecit sunt mala, virulenta. Septimâ manè corporis iactatio accidit, multus clamor, venarum pulsationes iuxta umbilicum.

Non dicit quem habuerit exitum his morbus, suspicor tamen puerum mortuum fuisse non multo post aut si forte fortuna euaserit, factus est suppuratus. Quia sanguis de naribus fluens malus est, vt dicitur vntio primi prædictionum, præcipue si quarta die appareat (causa dicta iam à me antea est. indicat verò phrenitidem quæ mox enitit, mox enim multum rugabatur, quod est blandius debetare. Alius renitebatur huic, vt proximo peritoto, grauius verò, quia hypocondrium durum doluit. Hoc enim est inflammationis signum, quam etiam fuisse ex valde calido ac bilioso sanguine, excentia diei sextæ declararunt, cum essent virulenta. Sed inflammatione in summum aucta die septima, factæ sunt venarum pulsationes in hypocondrio, de quibus in prognostico dicit Hippoc. furorē significare (sed verò est ob magnitudinem inflammationis) cuius sententiæ accommodatissimum exemplum hic puer præstat, cui simul cum pulsu circa umbilicum iactatio & clamores contigerunt. In tanta ergo ventris inflammatione, quid posses aliud expectare, quam mortem, aut saltem suppurationem? Non enim inflammatio infra umbilicum consistebat, sed ab hypocondriis ad umbilicum excedebatur.

In acutissimis febribus pulsus creberrimi ac maximi.

FContentundum quidam Hippocratem nullibi de pulsibus agere. En verò locus, vbi febrium pulsus describit. Pulsus, inquit, in febribus acutissimis creberrimi ac maximi. Quia febris, hoc est, aucti præter naturam caloris in corde pulsus sunt magni, celeres, & crebri. Maximarum ergo febrium pulsus sunt maximi, celerissimi, ac creberrimi. Si verò sunt maximi, ac creberrimi, necesse est sint etiam celerissimi. Si enim sub aucto calore incipit magnitudo prius accedet celeritas quàm crebritas: si verò à debilitate, aut incommoditate arteriz incipit crebritas, prius accedet celeritas quàm magnitudo. Non possunt ergo esse creberrimi, & maximi, quin sint celerissimi. Tales verò sunt magnarum febrium, vt febrium omnino, maiores, celeriores, & creberriores.

A

Quale est ad vesperam exacerbari, tale in omni morbo.

Hoc est, omnis morbus exacerbatur ad vesperam. Constat verò intelligi morbum pendentem ex materia, atque cūsi figura propria morbi impedit. Si cui enim summo mane est accessiois initium, & ad vesperam inclinatio, leuabitur ad vesperam. Cūm verò accessio id non faciat, ipsa diei hora ex sese, facit vt morbus exacerbetur, & egroti, quin & valetudinarij omnes, sibi ipsis magis displiceant: quia vt lumine, calore, & motu, & vigilia, euocantur ab internis excrementa, ita tenebris frigore, & quiete, & somno, recurrunt ad viscera, & grauante partes. Proinde cum accessiois inclinatio non incidit in eam horam, ad vesperam ingrauescunt morbi. Quod nō est imputandum morbi naturæ, sed horæ. Quin & quibus inclinatio ea hora febris, inclinat minus ac deterius soluitur, quàm quibus mane. Et hac ratione fit vt febris diurnæ, quarum inclinatio incidit in noctem, minus veniant ad infestationem quàm nocturnæ, quarum in summum mane declinatio incidit. Ea proinde diurnæ nocturnis deteriores sunt, vt lib. 1. sect. 3. dictum est.

D

Ad principia verò dignoscenda & paroxysmi considerandi sunt, & quod præcedit, & continuatur, & anni tempus.

Hæc est prima pars aphorismi duodecimi sectionis primæ. Docet enim nos eo aphorismo Hippo agnoscere accessiones, & constitutiones ex duplicibus signis: alijs quibus vt possumus ab ipso morbi initio, hæc sunt morbi, & anni tempora, & circōitum insuper incrementa: alijs quibus nō possumus vt, nisi cum bona iam morbi pars processerit: hæc sunt quæ superuenientie vocantur, vt quæ concoctionem aut contrarium iudicant. Prima pars aphorismi continet prima signa, quæ & hæc oratio continet; secunda, quæ inde incipit, sed & ex mox apparentibus, continet secundam. Quod illic diei et noctis, hic dicit et matutinis id est, an morbus sit continuus, an intermitiens. Quod illic dicit et noctis et matutinis hæc dicit et matutinis et noctis hæc dicit et matutinis et noctis hoc est, an paroxysmi prius an posterius fiant. Anni temporis meminit vtrobique.

E

Post pleiadum occasum ægri horrorem & sanguinis fluxum & narium patiebantur

Quod antea dixerat circa pleiadum occasum, fluxiones sanguinis, & febres epiales referentes, dicit nunc his verbis. Nimirum epiales sunt, vt perpetui quidam horrores febribus admixti.

F

Post pleiadum occasum Austri stabant, quæ quintâ die indicabantur, vnâ intermissâ repetebant.

G

Stior quidam septimâ indicatus est, cū vnâ diem intermisset, alterâ verò redisset, rursus quartâ indicatus est. Alius ex ijs qui à Leocyde venerant, indicatus est septimâ, alius quarta, Moschus nona.

Exempla sunt hæc iudicationum in varios dies incidentium, & reciduarum per varia intervalla repetentium, vt ouper diximus.

S

L Argus stillavit sanguis à sinistra nare, paucus ex dextra.

Plerumque ab ineunte verè, & usque ad medium ætatis fluit sanguis ex dextra nare magis; ob sanguinem & bilem ac hepatis affectiones: à media ætate & usque ad extremum autumnum, ex sinistra, ob bilem nigram & tumores lienum. Merito ergo ad pleiadum occasum hoc fiebat.

A D decimam quartam in indicationem morbi tendebant, si ut oportet incipientes exacerbarentur.

Quandoquidem morbi erant acuti, merito eorum finis intra decimam quartam expectabantur, quia acuti his finiuntur plerumque. Quoniam ergo morbi indicant constitutiones, quia erant acuti, indicabatur indicatio intra hos dies: non tamen morbi solum, sed & circuituum inuicem incrementa. Multi enim morbi non videntur moveri tam acutè, quam exigit eorum natura & species, sed videntur à sua acutè de generare, ac tunc quidem producantur magis quàm solent. Si verò à principio exacerbantur, ut oportet, id est, ut exigit sua natura, finiuntur intra legitimum tempus.

E Rrantibus circa edulia usque ad decimam septimam producebantur.

Cibus copiosior quàm res exigit facultatem grauat, & morbum auget, ac proinde nihil est quòd crebris indicationes, aliqui suo tempore futuras, impediat, & morbos producat. Velut nunc qui decimam quartam ut alij erant iudicandi, non iudicabantur ante decimam septimam, quòd errassent in cibis, accipientes plures. Si enim pauciores accepissent, facultas perisset ante morbi concoctionem potius quàm indicationem distulisset.

Iuxta autem dextram exiguum tuberculum, introsum durum, extrorsum parum molle, dolens, nihil remittens, superuenit decima nona noctis.

Quum febris aliqua supra legitiuam constitutionem prorogatur, saluo affecto homine, ut dicitur in prognostico, abscessum exspectare oportet, ut huic supra decimam quartam, quæ maximè erat eo tempore decretoria, atque adeo supra decimam septimam, quæ erat etiam quibusdam, prorogata febre, decima nona ad noctem factus est post aurem tumor. Fuit verò is, ut constat, phlegmon edematodes. Phlegmon quidem, quia introsum

A durus & dolens: edematodes, quia extrosum molle. Nunquam autem omittit Hipp. dicere, ad quam partem pertinent abscessus aut euacuationes, quia cum membrorum natura semper mouet secundum rectitudinem, inde agnoscimus, quæ pars princeps laboret excrementorum multitudine. Quare attente notar ad dextram aurem eripissam.

B Valde biliosus, suppuratis maximè, sepiè atramento similis purgatio contigit.

Suppurationes valde biliosæ pessimæ sunt, nunquam enim ex bile pars bonum, sed sanies aliqua chlora, viridis, aut nigra atramento similis. Ac proinde maiori cum periculo suppurantur valde biliosi, quàm sanguinei aut pituitosi. Quam ob causam scriptum in prognostico est. Ex suppurationibus quæcunque dum spiritum adhuc biliosum est suppurantur, perniciosæ valde sunt.

C Vi cucurbitulam affixit, cum in coxa dolore haberet, huic in cruris deorsum venit, & melius habuit.

Vulgares huius temporis medici, reformidantes cucurbitarum usum, neque assigentes nisi iam moribundis, & qui reuocari nequaquam possunt, fecerunt id remedium infame, cum tamen Hippocrates frequenter illis vteretur, ac fortasse non rarius quàm venæ sectione: nam & in doloribus plerisque, & in aliis quos solum vacuare studium est, ut qui ex alto ceciderunt. Sed quid est, quòd tantoperè reformidant? Ne dicant in partem cui affigitur trahatur vndique. At verò Hippoc. dicit affixam cucurbitulam coxæ ad crur deorsum venisse, & habuisse melius. Tam longè abest, ut semper trahat ad partem laborantem, cui superponitur. Quid ergo? Nunquid cucurbitula inde detrussit materiam? Non certè. Nam quomodo posset. Sed ex alto in cutem trahens ac digerens fecit ut ex

E pedioti iam articulo narra deturbaret. An parum est cucurbitam ex loco affecto, qui in alto positus sit, in cutem trahere, nisi etiam in illum vndique que connoct? An non potest locus qui præter naturam erat distensus vacuari, quin tandem aliunde recipiat? An non possunt partes subdere? Falluntur certè quàm maximè: nullum enim in omni magno dolore remedium magis presentaneum, & ut à parte affecta in aliam ignobiliorē materia abscedat sæpè causa est, ut huic evenit. Ex his omnibus continum Moschi historiam contexunt plerique interpretes, contra Valesii nostri mentem, volentque Moscho bonè die largum stillasse sanguinem & sinistra nare, paucum ex dextrâ, atque idem morbum decimam quartam indicati potuisse, verum cum decimam septimam quendam in victu errorem commississet, in decimam nonam morbum fuisse prorogatum, tandemque abscessu induratum.

Qui à Ceramici equo cecidis, & non affixit statim cucurbitulam, vltus est intro, & vigesima recruduit malum. Sanguinis fluxiones faculente & exedentes acciderunt.

Vt nunc ex equo, aut ex edito aliquo loco cadenti venam secamus, ne contriatur sanguis in partem contusam, aut in aliam aliquam internam (quod esset multo grauius) incidens, affectum aliquem grauem patiar, ita Hipp. tempore mixtebat sanguis scarificatione cum cucurbitis sparsim corpori affixis. Hoc cum omisisset facere hic, id est, in febrem incidit, exvltu intus qui fundendus fuerat sanguine, & malum vigesima à casu recruduit, id est, exacerbatum est, & acciderunt fluxiones sanguinis faculente, & exedentes. Non narrat, per quam partem, neque quid factum de homine sit. Ego quendam vidi, qui missionem sanguinis à casu contempsit, & aliquot deinde dies, nihil mali putauit se habere, post aliquot verò alios magna febre correptus, faculentum sanguinem vomens mortuus est. Hic fortasse per sedem deiciens, vt per conuenientiore regionem fuit liberatus. Ex casu verò multarum sanguinis fluxionum periculum impendit. Quidam enim vomunt, alij deiciunt, alij meuiunt, alij excreant ex thorace, alii etiam ex auribus erumpit.

Tenedia mulier quartà die abortu deiecit, vt dicebat, masculum triginta dierum. Aliis humida tenuia egerit, lingua exusta est. Indicatio quartà die contigit.

Hæc ex febre acutissima quartà à febris initio abortum fecit, & quartà ab abortu, quæ septima febris fuit, iuxta legitimam acutissimarum constitutionum indicata est. Certe vtero gerentes non nisi lethaliter contriuntur morbo acuto, inter cætera, quia paratissimum est abortus periculum, & ex morbo ipso, & ex curatione, & victu. Abortus verò etiam solus est partu periculosior, ne dum cum morbo acuto. Verum fortis recens, quanto facilius, tanto cum minori periculo abortitur. Difficilius enim mediis mensibus ob similitudinem accubulorum: postremis, ob magnitudinem ipsius fetus. Hæc ergo abortiuit facile, & citra dispendium salutis, septima indicata est, quia fetus vnius solidi mensis erat. Aborti verò merito marem trigesima de conceptionis, & quartà febris. Quia vt diximus lib. 2. & in commen. lib. de alim. trigessimus dies est primus suis, quo fetus accipere possunt primam mutationem, quam signaturationem vocamus: hanc verò accipiunt mares citius quam feminæ. Proinde trigessimus conceptionis mensibus mutationem insignem afferet; eritque in masculinorum conceptionibus contemplabilis etiam verò quartus, in morbis septimo indicandis multò magis, quia index septimi. Inciden-

Altos ergo in eandem diem trigessimā conceptionis maris, & quartā febris, abortus est factus. Male verò agebatur cum muliere, quia humida tenuis alius deiciebat, vterni quia erat constitutione acutissima febris (quod vltā lingua indicabat) indicata est septima.

B Post pleiadum occasum splenici affectus grassabantur, qui ex fluxu ad quintam usque diem indicabantur.

Ad occasum pleiadum merito intumescunt lienues multis obaurumtum, optimè verò liberantur, quum dysenteria ex faculentis ac melancholicis superuenit, nisi, vt in alio aphorismo dicitur, dysenteria plurimum daret, tunc enim hydropes, aut leuitate iactationum succedente moriuntur. Optimè ergo hac tempestate actum est cum splenis, quibus splenica excrementa usque ad quintam solidum diem fluxebant, & mox cessabant. Merito indicabantur à liberabantur ab splenis affectione.

Quidam septima die urinam orobi loturæ similem reddidit, sibi ipsi similem, deinde puram. Recidiva accidit. Intermissa etiam Megaris filio, præterquam quod sanguis non fluxit. Urina qualis Antigenis, alba, crassa, similis.

Hypostasim Orobiam vocare solet Hippocr. qualdam velut carunculas, seu sanguinis grumulos, nunc verò fustam ipsam confert orobiloturæ, quæ referret colore orobum; quæ sanè urina redundantiam sanguinis crudioris significabat. Urinam similem ipsam sibi ipsi, aut omnino similem vocat ounce, quam aliis locis æqualem. Nimium, vt æqualis per totum tempus hypostasis dicitur, quæ talis perseuerat: ita hæc ipsa dicitur fuisse similis, aut simpliciter similis, quæ non recipit mutationes multas, sed fuit similis manet. Puta dicitur hæc, quæ aliis locis alba perspicua. Hæc verò est decolor, & aquosa. Non enim aliter ex otobi loturæ simili fieri potest pura, quàm deposito colore hunc ehm præcipue habebat illa ex impuritate. Itaque cuidam fuit septima die urina similis erui loturæ, & non quidem ea die solum; aut primam, sed fuit similis ipsa sibi ipsi, quia talis etiam fuerat prioribus diebus. Cui ergo dicit septima die fuisse, si antea etiam fuerat? Certe quia septima intermisit febris; refert autem multum scire cum quali urina intermisit. Intermissa vero per insinuationem dicit, quia addit; deinde pura facta est urina; & fuit recidiva. Quomodo posset autem recidiva fieri, nisi intermisisset? Intermisit ergo septima, & quia sine signis contionis, successit recidiva. Non autem solum intermisisse, sed qua indicatibus specie dicit per insinuationem, addit enim intermisit etiam Megaris filio, scilicet vt illi, etsi non fluxit sanguis, vt illi, & vt ea tempestate fluxebat plurimis (nam hoc quoque dixerat antea,) Urina erat huius, velut An-

tigenis, alba crassa, similis id est, talis manens multis diebus. Constat hanc quoque factam esse recidivam, ut priori, etsi id non dicit aperte: quia nisi rediisset, dixisset potius indicatam fuisse, quam intermisse febrem, dicit vero intermisse etiam filio Megaris, ut priori scilicet cui rediit. Sed & per se se est consentaneum, quia cessavit febris sine urina cocta, perturbata solum.

IN solstitio hyemali astrum non exiguum apparuit. Quinque autem postea ubique terra motus subsequutus est.

Astrum significat stellarum congeriem, seu congreffum. Congreffi magnos stellarum vocant Astrologi, eos qui sunt notari digni, rarique, quos eosdem dicunt magnæ efficaciz esse in permouendis his corporibus, quæ penes nos sunt. Sunt autem tales duplici ratione, aut quod pluraastra conueniant quàm solent, aut quod aliqua, quæ rarissimè, congregiantur, & quæ tardius, ubi semel fuerint congregata, decedant, ut si Saturnus, & Iupiter coniungantur. Hippo. astrologicas consideraciones ad res medicinales non parui pendit. Nam libro de aëte, locis, & aquis dicit, ortus & occasus astrorum considerari debere, præcipue vero pleiadum & arcturi. Non solum autem has dicit considerari debere, sed has præcipue: considerasse enim non eas solum, sed quasque etiam ex hoc loco constat, quo dicit in solstitio hyemali fuisse astrum non exiguum. Id vero non potuit esse ortus aut occasus pleiadum, aut arcturi, quia non incidit in id tempus, præterquam quod ortus aut occasus alienius stelle non dicitur astrum, sed solæ coniunctiones aut congeries. Quodnam astrum fuerit hoc non est vili ratio. intelligendi; non exiguum fuisse dicit, & ob illud, quia de a solstitio subsequitur terre motum ubique, id est, hæc per multas terras partes, & multa oppida. Non sunt ad medicam opera terre motum fieri intererant, sed quo intelligas astra, quandoquidem tantum terre motum afferre possunt, corpora etiam nostra vehementer mouere, ac proinde rationem eorum habendam esse medico. Non tamen, quia ortus & occasus astrorum, & astra insignia, quæ incident in tempus, quo quis ægrotat, vtiliter considerantur, proinde medicos nimios esse oportet, & ad ægrotum natiuitates, ac multo minus ad interitus tempora, & alia huiusmodi procedere, quæ vana hominum curiositas excogitauit. Nullum vero, talium, apud autorem quemquam fuisse, exemplum inueniri possit.

Quæ in Perintho morabatur Antigenis uxor Asthmatica permansit, nec sciebat, an prægnans esset, ei rubra quadam superueniunt, venter alias parvus, alias magnus apparebat. Tu sciebat semper quasi contigisset celerius ster ferisse. Mense octavo conueniunt taffectus, postquam febricitasset.

In quibusdam codicibus legitur separatè, quæ in Perintho morabatur asthmatica, quasi alia fuerit

A ab Antigenis vxore; quæ in Perintho, asthmaticè laborauerit: in aliis coniunctim, quasi sit eadem, quæ ignorans an prægnans esset, erat asthmaticæ rusticulosa. Non vultum refert, eadem enim prorsus symptomata dicuntur, sine tota hæc vitæ sit discussio, siue dux, incipiatque secunda inde, Antigenis vxor. Nam dicit fuisse semper similem ei quæ iter fecisset celerius, hoc est, anhelasse, & spirasse difficulter. Itaque Antigenis vxor dubitans an vtero gereret, venit ad mensentem, quem putauit esse prægnationis octauum. Neque mirum, tamen enim multa sunt, quæ ad cognoscendam hanc affectionem faciunt, nulla tamen sunt, quæ id possint euidenter à quibusdam aliis dispositionibus separare, ut à molis, & aliis affectionibus vteri, quibus menstruæ euacuationes supprimuntur. Tamen enim quædam prægnationes conspicuæ admodum sunt, ut nullus sit dubitandi locus, quia aliæ quædam folles fieri obscuræ, & affectionibus præter naturam similes, contingit merito non ratò dubitare, etiam usque ad mensentem, qui putatur esse postremus. Quia menstrua euacuationes ob multas alias affectiones supprimuntur, & his suppressis intumescit venter, quin & hæc in tumidis mammis colligitur; & nanque ac fastidium, pleno excrementis corpore, sunt. Quinetiam morum fallacem aliquando crassus status in obstructis locis conclusus, dicit ferus grandioris motui similem.

C Iam vero pulsus & respiratio, utcumque distenta vtero, sicut quales in vtero gerentibus: & si quæ talium urina est, ob menstruorum suppressionem perinde fiet. Multo autem mirabitur quis magis, quod vxor Antigenis in ea dubitatione fuerit, *imporre plus* hoc est superuenientibus etiam postquam in ea dubitatione fuit, rubris mensibus. Verum constat, etsi soleant deficere, posse tamen etiam vtero gerentibus fluere, quia præter venas & arterias, ex quibus pendunt secundine & fetus, subeunt in os vteri aliæ recurrentes & semirubris, quæ possunt in illis sanguinem fundere. Quod alias venter esset parvus, aliis magnus, status multum cum excrementis admixtionem indicabat. Illis enim nunc crassioribus nunc renioribus factis, facit intumescit & subdit venter. Crassis vero succis, ac multo minus molæ, non potest in alterutrum tam facili mutatio contingere. Non fuisse itaque huic molam, sed succorum & flauum abundantiam in venter partibus, vtero inquam, aut etiam in amibus partibus eam intestinis, hinc constat, atque adeo ex exitu quem habuit. Corrupta enim febre acuta, ab ea affectione liberata est, febre scilicet crudos succos, & flauum absorbente.

D Iam vero pulsus & respiratio, utcumque distenta vtero, sicut quales in vtero gerentibus: & si quæ talium urina est, ob menstruorum suppressionem perinde fiet. Multo autem mirabitur quis magis, quod vxor Antigenis in ea dubitatione fuerit, *imporre plus* hoc est superuenientibus etiam postquam in ea dubitatione fuit, rubris mensibus. Verum constat, etsi soleant deficere, posse tamen etiam vtero gerentibus fluere, quia præter venas & arterias, ex quibus pendunt secundine & fetus, subeunt in os vteri aliæ recurrentes & semirubris, quæ possunt in illis sanguinem fundere. Quod alias venter esset parvus, aliis magnus, status multum cum excrementis admixtionem indicabat. Illis enim nunc crassioribus nunc renioribus factis, facit intumescit & subdit venter. Crassis vero succis, ac multo minus molæ, non potest in alterutrum tam facili mutatio contingere. Non fuisse itaque huic molam, sed succorum & flauum abundantiam in venter partibus, vtero inquam, aut etiam in amibus partibus eam intestinis, hinc constat, atque adeo ex exitu quem habuit. Corrupta enim febre acuta, ab ea affectione liberata est, febre scilicet crudos succos, & flauum absorbente.

E Iam vero pulsus & respiratio, utcumque distenta vtero, sicut quales in vtero gerentibus: & si quæ talium urina est, ob menstruorum suppressionem perinde fiet. Multo autem mirabitur quis magis, quod vxor Antigenis in ea dubitatione fuerit, *imporre plus* hoc est superuenientibus etiam postquam in ea dubitatione fuit, rubris mensibus. Verum constat, etsi soleant deficere, posse tamen etiam vtero gerentibus fluere, quia præter venas & arterias, ex quibus pendunt secundine & fetus, subeunt in os vteri aliæ recurrentes & semirubris, quæ possunt in illis sanguinem fundere. Quod alias venter esset parvus, aliis magnus, status multum cum excrementis admixtionem indicabat. Illis enim nunc crassioribus nunc renioribus factis, facit intumescit & subdit venter. Crassis vero succis, ac multo minus molæ, non potest in alterutrum tam facili mutatio contingere. Non fuisse itaque huic molam, sed succorum & flauum abundantiam in venter partibus, vtero inquam, aut etiam in amibus partibus eam intestinis, hinc constat, atque adeo ex exitu quem habuit. Corrupta enim febre acuta, ab ea affectione liberata est, febre scilicet crudos succos, & flauum absorbente.

F Iam vero pulsus & respiratio, utcumque distenta vtero, sicut quales in vtero gerentibus: & si quæ talium urina est, ob menstruorum suppressionem perinde fiet. Multo autem mirabitur quis magis, quod vxor Antigenis in ea dubitatione fuerit, *imporre plus* hoc est superuenientibus etiam postquam in ea dubitatione fuit, rubris mensibus. Verum constat, etsi soleant deficere, posse tamen etiam vtero gerentibus fluere, quia præter venas & arterias, ex quibus pendunt secundine & fetus, subeunt in os vteri aliæ recurrentes & semirubris, quæ possunt in illis sanguinem fundere. Quod alias venter esset parvus, aliis magnus, status multum cum excrementis admixtionem indicabat. Illis enim nunc crassioribus nunc renioribus factis, facit intumescit & subdit venter. Crassis vero succis, ac multo minus molæ, non potest in alterutrum tam facili mutatio contingere. Non fuisse itaque huic molam, sed succorum & flauum abundantiam in venter partibus, vtero inquam, aut etiam in amibus partibus eam intestinis, hinc constat, atque adeo ex exitu quem habuit. Corrupta enim febre acuta, ab ea affectione liberata est, febre scilicet crudos succos, & flauum absorbente.

G Vxor autem fratris Apemanti abortu deiecit feminam sexaginta dierum, ut dicebat septima die, ad nonam autem perturbata est. Post crisin vero dextra partes doluerunt, velut à recidina. Hæc concepiebat cito, & abortu deieciebat.

Merito Tenedia, & hæc corrupterunt factus, illa trigesima, hæc sexagesima die, quia ut lib. 5.

cundo dicebatur contingit abortus, quomodo labores menstruales adueniunt. Iidem enim circuibus, quibus nisi vtero gererent, menstruae euacuationes aduenirent: natura (quæ naturalis motus omnium obliuiscitur) commouet corpora. Velut etiam per morbos consingunt commotiones, non solum diebus quibus indicantur, sed aliis etiam decretoriis. Merito ergo illa corripit quarta morbi, & conceptionis trigesima, hæc sexagesima, & morbi septima, insignibus articulis prægnationis, & morborum in eisdem dies incidentibus: cum præcipue alia etiam causa vtrique accesserit ex ipsius sortis mutatione. Vt enim loco citato diximus, tres sunt sortis mutationes, formatio, vita cum sensu, & partus: his omnibus commouetur corpus vtero gerentis, quare vltima est ipse editus, io prima contingere solent abortus. Cotingit verò prima duplo tardius feminis quam maribus. Hi enim triginta diebus possunt eam recipere, illæ recipiunt sexaginta, aut circa sexaginta: vt ob hanc mutationem non caruerit ratione, 30. abortiri marem, - feminam sexaginta. Sed neque marem quarta, & feminam duobus quartenariis, quia inares gerentes calidiores sunt, & morbis acutioribus corripiuntur, & vt partus marium breuius sunt, ita abortus celeriores. Velut hæc, etsi ea die abortiuerit, non est septima iudicata, sed nona: quod significans dicit, ad nonam perturbata est. Nimirum iudicatio semper agitur cum perturbatione: id autem cum velle constat, quia subdit mox, quasi de crisi loquutus, post crism verò dextra doluerunt. Sed quia non explicat quæ dextra, patet est intelligere circa vterum, vt dextram coxam, femur, ac renem, hæc enim ob vteros dolere solent. Dicit, velut à recidua, significans non esse factam recidivam, vt solet, redintegrato morbo, sed cum dolore fuisse pro recidiva. Volens dicere aliquid ad mulieris conditionem pertinens, addit *omnes sexus & ætatis præter.* Sūt enim vt lib. de sterilibus dicitur quedam, quæ concipiunt sepe, sed cito corrumpunt: & quedam earum totidem diebus semper, ob exiguitatem vterorum: quedam incertis temporibus, ob intemperies extremas, humidam, aut siccam. Quibus enim sicca est, male alitur sortis, & corrumpitur cito: appetit verò humiditas, ac proinde facile concipitur. Quibus humida, excidit ob lubricitatem, atque eam fieri potest, vt hæc ob hanc causam apperant, & facile concipiant, quæ cito corrumpant. Velut reos in diabete, quia facultas retentrix debilis est, & multum trahunt, & mox depouunt.

A *Lia cum albis mensibus filiam peperit, alia cum rubris, ut par erat.*

Mulieres quibus profusiva alba sunt, tunc admodum patiunt. Nam ipsam vteri affectio, aut concipere, aut retinere prohibet. Fieri tamen potest, vt hæc quinque aliquando patiant, euacuata iam bona copia, & vtero emendato, aut omnino, aut partim. Velut & venter à lien-teris nonnunquam venit ad probam, & retentionem, & concoctionem. Legitimam verò &

A frequens est parere in rubris, hæc est, quibus rubræ fluxiones singulis mensibus sunt. Proinde dicit quendam peperisse foemellam cum albis, aliam rubris, vt par erat. Verum rationi consentaneum fuit, eam quæ cum albis peperit, filiam peperisse. Quæ enim excrementosiores cum sint concipiunt, filias concipiunt potius.

B *Horore concutiebantur aegri, anxij erant, cibum auersabantur, recidivam patiebantur, biliosi, sanguinem fundebant, lienis affectibus aliquantum torquebantur, plurimisque etiam sinistra partes dolebant.*

Dixerat nuper in hoc ipso libro, eodem tempore, horridi, vementes, & post iudicationem cibum auersantes, biliosi, & splenes magni, dolidolentes, & sanguinis eruptiones: & rursum paulo post dixit, ante pleiadum occasum, febres statim reuerrentes breuibus interuallis, & cibum auersantes, & excocti, & anxii, & cardialgici: & rursum addit, & rigore affecti, & pluries etiam in hoc ipso libro, quo toto agit de morbis, qui quodam autumno contigerunt, hæc eadem repetit sparsim inter multas historias singulares. Hæc ergo eadem sunt, quæ nunc repetit. Nimirum familiaris est autumno, illi maxime qui sunt insalubres, debilitas ventriculi, inarcescente naturali calore, ac proinde horrores, aut rigores, anxietates, cibi fastidia, cardialgie frequentes erant. Familiares sunt etiam morbi acuti & difficiles iudicationis. Ac proinde biliosi, & recidivæ patientes, & abscessus multi, præcipue ad lienes, quia ea pars colligit sanguinis lacem, quæ eo tempore redundat. Quare plerisque ægrotis quibus febres eo tempore producuntur, si attollerentur, sentiuntur sinistra hypochondriorum partes dolere. Quibus verò lien est affectus vt in hoc ipso libro Hipp. dixit, sanguis fluit ex sinistra nare, si est eleusus, sin velut extensus ad dextra, per infernas partes.

A *Pemanti uxori oculus distortus est dexter. Ad aliam autem partem ile.*

Vt raram abscessuum complicationem videretur mihi Hippoc. narrare hanc, simul enim ad dextrum oculum, & sinistram ile decubuit humor, partes duplici ratione contrarias, alteram. n. supernam & dextram, alteram infernam & sinistram. Verum etsi abscessus multos simul ioriti, aut alios ex aliis in partes eiusdem lateris, & mutuum reitudinem habentes, plerumque fieri contingat, tamen non mirum est, contrarios etiam complicari, vt oque affectiones primariz & directæ semper adueniunt. Si forte eorum hemitranea dextra, & lienis tumore simul laborabat, quid habebit admirationis, in dextrum oculum simul & sinistram ile abscessisse.

A *Risrophantis filia tertia, & quinta febricitauit. Sicca permanebat plerumque, venter quidem turbatus est huic, difficilem habuit indicationē & supra triginta cessauit.*

Hæc febris continua haud dubiè febricitauit post partum, quæ tertijs diebus exacerbabatur, vt solent biliosæ. Mirum enim esset si tam simpliciter, vt tertiana intermittebat, febricitaret ex partu, præcipue quæ sicca plerumque, hoc est, sine vlla expurgatione manifesta per os vteri, permaneret. Accidit huic quod alijs multis crasis, pro muliebri fluxu fluxualui. Non potest autem cui id euenit (tametsi non raro à morte liberat) non indicari difficile, quia non est huic morbo ea regio conueniens. Producta ergo est huic mulieri febris, quæ iuxta suam acutem esset quatuordecim, vltra triginta dies. Nesciuit arbitror Hippocrat. quoto die febris cessaret. Certe multis morborum muliebrium ex partu sunt quadraginta dierum, & aliqui etiam qui decidunt ex acutis, vnde non mirum si fuerit hæc indicata circiter quadagesimum. Verum non omnibus qui similiter affecti sunt, totidem exactè diebus morbi finirent. Quia etiam quædam causæ communes sunt multis, certè firmæ ac statæ, vt quæ in coelimo, et si quæ alia est huiusmodi (vt dicunt) numeri, aut menses: tamen ex ipsa materis dispositione est differentia indefinita.

R *igor famula post Heronem habitanti accipit.*

Malè hæc sententia, intra quandam aliam longiorem, & multò plus frugis continentem, coniecta est. Proinde ego eam excepi, mox reliqua, quæ desumpta non bene possent enarrari, interpretatus. Hoc verò rene quiddam est, quod continet: famule cuidam post Heronem habitanti factum esse rigorem. Non arbitror laborauit hæc febre tertiana intermittebat, vt fuerit in ipsa febris figura rigor, quorum enim notaret? Sed quod est rarius, aut continua febris inceperit à rigore, aut ardenti contineretur rigor superueniret. Poruit verò tunc quoque die bono superuenire, accum reliquis bonæ indicationis conditionibus, & febrem soluere: aut sexto aliove die tali, sine solentia, & conferentia mortem inferre. Vtrum sit factum, nihil refert scire, modò scias quæ fieri soleant.

P *uivale quidem ex lassitudinibus non valde magnis perveniunt usque ad septimam, subleuata: alba autem magna, nec sunt ipsæ admodum bonæ, in agris catochis correptis, & somnolentis, & in ijs qui non concidunt, hisque retrahitur, & quum non concidunt, siue alius humida sit siue dura.*

Quidam seu quædam dicuntur papule seu ampullæ, quæ in combustis oriri solent, & in ijs qui insoliti exerceantur, aut quàm sint soliti vehementius: velut agentibus iter fieri solent

A in plantis pedum ex afflicto: sed & in alijs partibus ob seruentem sanguinis, velut proscod in seruente olla sunt multæ bullæ ad operculum. Has dicit ex lassitudinibus (non spontaneis scilicet, sed ex labore) non valde magnis, solere fieri subleuatas (quales scilicet in collis partibus aut verberatis sunt, sanguinis parte aliqua cum sero effusa. Videmus verò sanguinem extra vasa ad cutem effusum, mox liuorem quandam comparare (vt in fugillanis) & tales durare vsque ad septimam, moxque arescere, & solui. Sed cur dicit non valde magnis? Nonne id maiores facient potius? Quis arbitror, si ex maxima lassitudine oriuntur, non tam citò soluentur: sed in vlcera, & tæta scabiei genera abibunt, aut certe non sicut pustule: sed multo grauiora mala. Itaque lassitudo tales ampullæ fieri consueverunt. Aliæ vero sunt albæ & magnæ, quæ etsi ob colorem simplices esse videntur, neque ipsæ tamen sunt valde bonæ (vt signa scilicet) nam sunt ob crudorem succorum redundantiam: atque etsi aliquando accidunt nullo graui morbo occupatis, non raro tamen etiam accidunt valde letalibus morbis. Nam sunt *pernicioses* (dicuntur tales non solum qui actu deprehensi sunt, sed qui deprehendi solent, & in modis in hoc genere sūt lethargici & caro pressi, & non *spontaneæ* & *pernicioses*, id est, & in ijs etiam qui non concidunt, id est non laborare illis caducis morbis, sunt tales pustule, ob hoc solum, quod bilis retineatur. i. quod cum sint cacochymi, malus fucus non desiciatur. Consuevit enim Hippocr. vocare bilem omnem putridum succum. Addit, atque siue humida sit, siue sicca (alius scilicet) *siue spontaneæ* quasi diceret, atque adeo quidam habeant dictas pustulas, qui concidentes non sint, idque siue alius sit lubrica, siue sicca. Itaque etsi neque caduco morbo teneantur neque bilis retineatur, sed solam quoque abundant succis crudis. Nimirum aliquando citra magna mala sunt: sed quis nonnunquam sunt grauissimè affectis, dixit neque ipsæ valde bonæ. Non dixit valde malæ, quia non semper sunt tales: sed neque valde bonæ, quia aliquando pessimarum affectionum sunt comites.

B in plantis pedum ex afflicto: sed & in alijs partibus ob seruentem sanguinis, velut proscod in seruente olla sunt multæ bullæ ad operculum. Has dicit ex lassitudinibus (non spontaneis scilicet, sed ex labore) non valde magnis, solere fieri subleuatas (quales scilicet in collis partibus aut verberatis sunt, sanguinis parte aliqua cum sero effusa. Videmus verò sanguinem extra vasa ad cutem effusum, mox liuorem quandam comparare (vt in fugillanis) & tales durare vsque ad septimam, moxque arescere, & solui. Sed cur dicit non valde magnis? Nonne id maiores facient potius? Quis arbitror, si ex maxima lassitudine oriuntur, non tam citò soluentur: sed in vlcera, & tæta scabiei genera abibunt, aut certe non sicut pustule: sed multo grauiora mala. Itaque lassitudo tales ampullæ fieri consueverunt. Aliæ vero sunt albæ & magnæ, quæ etsi ob colorem simplices esse videntur, neque ipsæ tamen sunt valde bonæ (vt signa scilicet) nam sunt ob crudorem succorum redundantiam: atque etsi aliquando accidunt nullo graui morbo occupatis, non raro tamen etiam accidunt valde letalibus morbis. Nam sunt *pernicioses* (dicuntur tales non solum qui actu deprehensi sunt, sed qui deprehendi solent, & in modis in hoc genere sūt lethargici & caro pressi, & non *spontaneæ* & *pernicioses*, id est, & in ijs etiam qui non concidunt, id est non laborare illis caducis morbis, sunt tales pustule, ob hoc solum, quod bilis retineatur. i. quod cum sint cacochymi, malus fucus non desiciatur. Consuevit enim Hippocr. vocare bilem omnem putridum succum. Addit, atque siue humida sit, siue sicca (alius scilicet) *siue spontaneæ* quasi diceret, atque adeo quidam habeant dictas pustulas, qui concidentes non sint, idque siue alius sit lubrica, siue sicca. Itaque etsi neque caduco morbo teneantur neque bilis retineatur, sed solam quoque abundant succis crudis. Nimirum aliquando citra magna mala sunt: sed quis nonnunquam sunt grauissimè affectis, dixit neque ipsæ valde bonæ. Non dixit valde malæ, quia non semper sunt tales: sed neque valde bonæ, quia aliquando pessimarum affectionum sunt comites.

C in plantis pedum ex afflicto: sed & in alijs partibus ob seruentem sanguinis, velut proscod in seruente olla sunt multæ bullæ ad operculum. Has dicit ex lassitudinibus (non spontaneis scilicet, sed ex labore) non valde magnis, solere fieri subleuatas (quales scilicet in collis partibus aut verberatis sunt, sanguinis parte aliqua cum sero effusa. Videmus verò sanguinem extra vasa ad cutem effusum, mox liuorem quandam comparare (vt in fugillanis) & tales durare vsque ad septimam, moxque arescere, & solui. Sed cur dicit non valde magnis? Nonne id maiores facient potius? Quis arbitror, si ex maxima lassitudine oriuntur, non tam citò soluentur: sed in vlcera, & tæta scabiei genera abibunt, aut certe non sicut pustule: sed multo grauiora mala. Itaque lassitudo tales ampullæ fieri consueverunt. Aliæ vero sunt albæ & magnæ, quæ etsi ob colorem simplices esse videntur, neque ipsæ tamen sunt valde bonæ (vt signa scilicet) nam sunt ob crudorem succorum redundantiam: atque etsi aliquando accidunt nullo graui morbo occupatis, non raro tamen etiam accidunt valde letalibus morbis. Nam sunt *pernicioses* (dicuntur tales non solum qui actu deprehensi sunt, sed qui deprehendi solent, & in modis in hoc genere sūt lethargici & caro pressi, & non *spontaneæ* & *pernicioses*, id est, & in ijs etiam qui non concidunt, id est non laborare illis caducis morbis, sunt tales pustule, ob hoc solum, quod bilis retineatur. i. quod cum sint cacochymi, malus fucus non desiciatur. Consuevit enim Hippocr. vocare bilem omnem putridum succum. Addit, atque siue humida sit, siue sicca (alius scilicet) *siue spontaneæ* quasi diceret, atque adeo quidam habeant dictas pustulas, qui concidentes non sint, idque siue alius sit lubrica, siue sicca. Itaque etsi neque caduco morbo teneantur neque bilis retineatur, sed solam quoque abundant succis crudis. Nimirum aliquando citra magna mala sunt: sed quis nonnunquam sunt grauissimè affectis, dixit neque ipsæ valde bonæ. Non dixit valde malæ, quia non semper sunt tales: sed neque valde bonæ, quia aliquando pessimarum affectionum sunt comites.

D in plantis pedum ex afflicto: sed & in alijs partibus ob seruentem sanguinis, velut proscod in seruente olla sunt multæ bullæ ad operculum. Has dicit ex lassitudinibus (non spontaneis scilicet, sed ex labore) non valde magnis, solere fieri subleuatas (quales scilicet in collis partibus aut verberatis sunt, sanguinis parte aliqua cum sero effusa. Videmus verò sanguinem extra vasa ad cutem effusum, mox liuorem quandam comparare (vt in fugillanis) & tales durare vsque ad septimam, moxque arescere, & solui. Sed cur dicit non valde magnis? Nonne id maiores facient potius? Quis arbitror, si ex maxima lassitudine oriuntur, non tam citò soluentur: sed in vlcera, & tæta scabiei genera abibunt, aut certe non sicut pustule: sed multo grauiora mala. Itaque lassitudo tales ampullæ fieri consueverunt. Aliæ vero sunt albæ & magnæ, quæ etsi ob colorem simplices esse videntur, neque ipsæ tamen sunt valde bonæ (vt signa scilicet) nam sunt ob crudorem succorum redundantiam: atque etsi aliquando accidunt nullo graui morbo occupatis, non raro tamen etiam accidunt valde letalibus morbis. Nam sunt *pernicioses* (dicuntur tales non solum qui actu deprehensi sunt, sed qui deprehendi solent, & in modis in hoc genere sūt lethargici & caro pressi, & non *spontaneæ* & *pernicioses*, id est, & in ijs etiam qui non concidunt, id est non laborare illis caducis morbis, sunt tales pustule, ob hoc solum, quod bilis retineatur. i. quod cum sint cacochymi, malus fucus non desiciatur. Consuevit enim Hippocr. vocare bilem omnem putridum succum. Addit, atque siue humida sit, siue sicca (alius scilicet) *siue spontaneæ* quasi diceret, atque adeo quidam habeant dictas pustulas, qui concidentes non sint, idque siue alius sit lubrica, siue sicca. Itaque etsi neque caduco morbo teneantur neque bilis retineatur, sed solam quoque abundant succis crudis. Nimirum aliquando citra magna mala sunt: sed quis nonnunquam sunt grauissimè affectis, dixit neque ipsæ valde bonæ. Non dixit valde malæ, quia non semper sunt tales: sed neque valde bonæ, quia aliquando pessimarum affectionum sunt comites.

E in plantis pedum ex afflicto: sed & in alijs partibus ob seruentem sanguinis, velut proscod in seruente olla sunt multæ bullæ ad operculum. Has dicit ex lassitudinibus (non spontaneis scilicet, sed ex labore) non valde magnis, solere fieri subleuatas (quales scilicet in collis partibus aut verberatis sunt, sanguinis parte aliqua cum sero effusa. Videmus verò sanguinem extra vasa ad cutem effusum, mox liuorem quandam comparare (vt in fugillanis) & tales durare vsque ad septimam, moxque arescere, & solui. Sed cur dicit non valde magnis? Nonne id maiores facient potius? Quis arbitror, si ex maxima lassitudine oriuntur, non tam citò soluentur: sed in vlcera, & tæta scabiei genera abibunt, aut certe non sicut pustule: sed multo grauiora mala. Itaque lassitudo tales ampullæ fieri consueverunt. Aliæ vero sunt albæ & magnæ, quæ etsi ob colorem simplices esse videntur, neque ipsæ tamen sunt valde bonæ (vt signa scilicet) nam sunt ob crudorem succorum redundantiam: atque etsi aliquando accidunt nullo graui morbo occupatis, non raro tamen etiam accidunt valde letalibus morbis. Nam sunt *pernicioses* (dicuntur tales non solum qui actu deprehensi sunt, sed qui deprehendi solent, & in modis in hoc genere sūt lethargici & caro pressi, & non *spontaneæ* & *pernicioses*, id est, & in ijs etiam qui non concidunt, id est non laborare illis caducis morbis, sunt tales pustule, ob hoc solum, quod bilis retineatur. i. quod cum sint cacochymi, malus fucus non desiciatur. Consuevit enim Hippocr. vocare bilem omnem putridum succum. Addit, atque siue humida sit, siue sicca (alius scilicet) *siue spontaneæ* quasi diceret, atque adeo quidam habeant dictas pustulas, qui concidentes non sint, idque siue alius sit lubrica, siue sicca. Itaque etsi neque caduco morbo teneantur neque bilis retineatur, sed solam quoque abundant succis crudis. Nimirum aliquando citra magna mala sunt: sed quis nonnunquam sunt grauissimè affectis, dixit neque ipsæ valde bonæ. Non dixit valde malæ, quia non semper sunt tales: sed neque valde bonæ, quia aliquando pessimarum affectionum sunt comites.

F *Zoilus fabro tremuli pulsus, tardi. Vrina & alui excrementum mediocriter decoloratum fuit, ventris imi contentio utrinque in directam usque ad umbilicum perveniens cum acuta febre. Cibum non capiebat, siticulosus erat.*

Locus hic satis apertè indicat, Hippocratem pulsus non aliter hac posteriores illo medicos in ægrotis rationem habuisse, quamquam camæris partem omnium minime excoluit. Tremuli pulsus nulli probabilius dicuntur, quàm ijs qui tremens arteria pulsant. Tremere verò non dicitur arteria, quæ loco consistens dilaturatur, & constringitur, aliquando omnis arteria tremat: sed quomodo secundum se totam loco mouetur, velut concussa: vt. i. cordis tremor dicitur is motus, quo velut concussum locum mutat. In hoc genere

sunt vibratus, & conuulsus. Vibratus verò ob arteriæ duritiem & auctum vsum, cum quodam robore sit: quare qui imbecilles patiter ac tremuli dicantur, conuulsui potius erunt, qui inflammationes in duntaxat ac nervosis partibus consistentes, cum debili facultate merito sequentur. Fuisse verò huius hominis præcipuam affectionem, cum febre maligna inflammationem in hypogastrio, à pube inquam vsque ad vmbilicam, in musculis rectis, qua parte sese tangunt, & in duntaxat ea parte peritonæi, quæ in rectum sub ipsis musculis protenditur, condescens tendonum musculorum transversorum & obliquoꝝ cum ipso peritonæo facta, consistat ex ventris imi distentione in rectum vtrinque vsque ad vmbilicam. Fuisse enim non aliud tumoris genus quàm inflammationem, febris acuta & tales pulsus iubent coniectare: malignam verò fuisse etiam febrem, quòd pulsus mox debiles essent, & cibum non caperet, & singulosus esset: Tamen hoc peculiarem quandam causam habuisse videtur, in affectione partium imi ventris cum quo facillimè patitur ventriculus. Quòd vrina, & alui excrementum mediocriter decoloratum fuerit, id est, paulò infra naturalem mediocritatem consistens, & remissioni colore quàm per bonam valetudinem solet, indicat rationem morbi generandi. Duplici enim ratione sunt morbi ex excrementis, aut quod ea reddunt supra copiam quam ferre potest sanitas, aut quòd non expurgentur, quæ secundum naturam solent eliminari. Aliquando vtrumque euenit. Constat, cum non expurgatur bilis facis per aluum & vrinam, aut ob viarum incommoditatem aliquam, aut facultatum naturalium debilitatem, (vt huic contigit) necesse esse, vt in ipso hepate detenta morbum faciat: aut si id non fiat, in quampiam aliam partem præter naturam tradatur, aut in venis & arteriis abundet, vnde febres, & partium inflammationes, auctorem alterum fiat. Tale ergo quiddam huic contigisse videtur, cum pariter febrem acutam, & inflammationem, vrinæque, ac feces decolores habuerit. Quod, n. non erysipelas, herpes in cute factus fuerit, sed phlegmon, nihil obstat. Nam biliosus sanguis male in ira venas consistens, sæpe facit inflammationem, erit vero ea erysipellatodes. Nam & acuta febre laborabat homo, & erat singulosus.

Filia edilis apud Tecomanum, cum vterum gestare sine signo cepisset, secundo mense vomitus pituitosus, aliquando autem biliosus erupit. Difficiliter peperit, perfecte purgata est. Vomitus similis vsque ad triginta dies perseverauit, deinde aluus turbata est, & vomitus sedatus. Lienteria accidit. Multebria non fluxerunt, duobus annis per hyemem hæmorrhoidam profluvium passa est.

Consentaneum est hanc mulierem vnam eorum esse, quibus non rectè neque suis temporibus fluunt menstrua. Hæc enim solent maxime sine signo concipere, ac crebro in magna sunt hæmorrhoea. Quibus .n. certo ordine fuit, horum ipso-

Arum retentio fit maximum conceptionis signum. Licet etiam id suspicari ex eo quod euenit. Morbosæ enim mulieres solent eius euacuationis inetrmissionem pati, quas si contingit concipere, difficiles habent & prægnationes & partus. Falsidium plurimum recens prægnantibus fieri solet. Et vt apboris. 61. quintæ particule dicitur, ipsius conceptionis est signum. Quibusdam etiam sunt vocatæ Picæ, quæ malorum succorum abundantiam significant, multo vero magis, cum multæ etiam vomitiones & varix sunt, vt huic, cacochymia indicatur. Solent hæc omnia ventriculi mala secundo mense, cum scilicet primum menstrua iam suppressa lædunt, incipere, duratque vsque ad quartum: iam enim trahente versus vterum multum fœtu, solet ventriculus liberari: quod si diutius durant longiam maior cacochymia indicatur. Velut huic durauit varius vomitus vsque ad partum, atque amplius triginta dies. Nam, inquit, difficulter peperit, & vomitus similis vsque ad triginta dies perseverauit, similis scilicet ei quem passa est antequam pareret. Sed quo pacto potuit id fieri, muliere perfecte purgata? Aut quo pacto potuit perfecte purgari, quæ difficulter peperit? Certe purgatam perfecte dici suspicor, non quòd purgata sit quantum sui corporis dispositio, & excrementorum multitudo postulabat, sed quòd quantum alix mulieres solent, ac fortasse etiam quantum ea ferre potuit. Non enim semper expedit, quantum mali succi in corpore est effundere. Peperit ergo difficulter, & magnis cum cruciatibus, accurrentibus ad vterum multis excrementis, quorum effusa est magna pars, quanta alteri esset satis, nihilominus multum in viis hæsit, & eis obturatis, in partes alias rapum est, & vomitum per triginta dies, deinde diarrhœam fecit, fluxione in contrarium deriuata: lienteriam postea, debilitatis iam per longam ventris passionem concoctrice & repercentrice facultatibus. Multebria non fluxerunt duobus annis: sed natura viam aliam querente, habebat mulier hæmorrhoidas hyeme, quia (arbitror) reliquo anno infensibili euacuatione sanguis dissipabatur.

Dvo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, aliquantulum faculenta, & eduliorum ex sanguine confectorum colorem referentia, deinde ex merè biliosis & spumantibus cum pallore virescebant.

His ab initio morbi prodibant nigra similia sanguini nigro, qui repetiri solet in sarciminibus sanguinis. Deinde valde biliosa & spumosa: ab his prædicta. Quas omnes deiectionis species in lethalius esse, in prognostico dicitur ab eodem Hippocrate, & in aphorismis. Nam vt 21. sectionis 4. dicitur, deiectiones nigrae similis sanguini nigro, spontè procedentes, & cum febre & sine febre pellunt. Talia verò omnia tanto sunt deteriora, quanto citius à morbi principio, & aneuacuationis tempus sunt, iuxta illud etiam quod mox sequenti aphorismo dicitur. Morbis quibuslibet incipientibus, si arrabiles supra, aut infra exierit, lethale. Nigra ergo deiectiones ab initio his fieri graue erat: sed & quæ subsequuta sunt. Nam

& bilioſe vituperantur aphoriſm. 47. eiſdem particulis, aut eadem æquæ ac ſpumeſcunt & *χρ. νεγι* vituperantur in prognſtico. Ergo quod ad deiectiones pertinebat, quas contigit his ægrotis eſſe dignas mentione, lethaliſer eorum procedebat aſſectio. Quid quæque talium deiectionum ſignificarent, ſuperfluum eſt hoc loco dicere, cùm in commentariis locorum quæ citauimus ſatis ſit dictum.

Qui aſinum ex pacto ſuſtulit, febricitauit ſtatim, tertia die ſanguinem fuſit, quarta, & quinta, & ſextima, & octaua: indicatus eſt cum aluo humida.

Non ſatis poſſis ex ipſa diſtione intelligere, an octaua indicatum dicat, cùm tertia, quarta, quinta, & ſextima ſanguinem fuſiſſet, an ſanguinem etiam octaua fuſiſſe, & indicatum deinde, non nominato die: neque an dicat indicatum eſſe forte ipſa ſanguinis fuſione, & deinde multo tempore habuiſſe aluum humidam. Nam cum in plerique, nullis grammaticæ regulis ſit adſtrictus Hippocrates: ſed velne ſolutis vocibus utatur, omnia hæc poteſt ferre ſu a pluralis, atque adeo omnia poſſent contingere. Sed quia octaua non eſt valde indicatota, neque morbo per quem ſanguis aded fundebatur, deiectione ex aluo erat ſatis congruens iudicio, omnium maximè conſentaneum eſt, hominem ex nimio nixu & labore, cùm aſinum ex pacto ſuſtuliffet, febre correptum eſſe, & raptum ei ſanguinem fuiſſe ad ſuperma, & ac proinde copioſe fuſum eſſe per nates, atque tandem indicatum eſſe [nona forteſſe aut vndecima] ſuperfuſiſſeque huic conualeſcenti iam ex morbo humidam aluum: quia ut dicitur in aphor. 17. ſectiõis 4. Quibus per febres ſanguinis vndeunque eruperit copia, ſis quam reſiciuntur, Ventres humectantur.

Vir metallicus hypocondrii dextrũ habuit contentum. Lien magnus erat, & venter diſtens, ſubdurus, anhelus fuit & decolor. Huic in genu ſiniſtrum abſceſſus factus eſt, recidina accidiſ, perfectè indicatus eſt.

Quibus hypocondria diſtenta ſunt, ac multo magis quibus aluus tota, ſunt *σπασμωδία*, id eſt, diſtictiſſe ſpirantes ob compreſſionem ſepi tranſuerſi. Hi iſdem ſunt decolors ob hepatis debilitatem, ut quibus lien ſolus tumer, hi ſolent colorem quendam ſubnigrum contrahere, ob atræ bilis in eorum habitum diſtributionem. Hic ergo cum febricitaret, & iam iam hydropticus fieret ob utrumque hypocondrium, præcipue verò ob dextrum, abſceſſu in ſiniſtrum genu liberatus eſt à febre. Tamen quia exiguus erat abſceſſus pro ratione morbi recidiuum habuit: ſed tandem omnino indicatus eſt, partim febre ipſa abſumentè, partim per abſceſſus.

A

Filius Temenæi aliquam patiebatur ſpirandi difficultatem, aded ut ex viridi pal-leſceret, qui color in dorſo & in manibus apparebat.

B

Inſuper apud Hippocratem ſignificat reſpirationem, hic verò non quamcunque, ſed eam quæ præter naturam eſt, & quæ vocatur diſpœna: reſpirationem enim omnino omnes habent quando viuunt. Quare cum dicat hunc ægrotum habuiſſe & *σπ. σπασμωδία*, quaſi neque omnes homines immo & quaſi neque omnes ægroti habeant, intelligi debet difficultas. Itaque dicit hunc habuiſſe reſpirationem non nihil difficilem: Quæ autem addit ut *σπασμωδία* eſt vicia, & *σπασμωδία* non poſſunt coniungi cum prioribus. Quid enim habet *σπασμωδία* commune cum reſpiratione? Aut quid etiam manus? Chlorum enim dictum iam ſæpe eſt, ſpeciem eſſe coloris inter flauum & viridem conſiſtentis. Manus verò neque ſunt ex instrumentis reſpirationis, neque ex iſis quæ mouentur cum illis. Nihil ergo hæc alius ſignificant, quàm huic ægroti illum colorem in dorſo, & in manibus apparuiſſe.

C

Conſideranda eſt Hippocratis diligentia, & imitanda, animaduertentis colorem ægroti, non in facie ſolum, ut ſolet, ſed & in manibus, neque ſolum in his in quibus etiam eſt plurius, ſed & in dorſo. Veriſimile autem eſt eum, qui in dorſo vitioſum colorem inuenit, toto corpore quæſuiſſe, vſque adeo Hippocrates nihil omittebat eorum, quæ aut curationes modum indicare poterant, aut ſignificationem aliquam præſtare, ſive bonam, ſive malam. Velut hic color, qui proſectò peſſimam ſignificationem præſtabat. Nam in prognſtico vituperat colorem *σπασμωδία* faciei, ſerè vtiuidum & nigrum, quaſi extinctionem naturalis coloris etiam ſignificantem, vt illos. Ergo & in reliquis etiam partibus perinde ſignificat.

D

Solent verò hi colores aliquando fieri, æqualiter per totam cutem colore mutato: aliquando quibuſdam maculis exiguis & frequentibus ſubortis, quas quidem ſemper ſignificare malum per febres acutas nondum inclinantes conſtat: cum omnis interpeſtius abſceſſus à mala qualitate ſuccorum uſcatur. Verùm maximam diſſerentiam malignitatis aut benignitatis habere ex colore rationi conſentaneum eſt: cum colores eſſe omnium maximè poſſint indicare, quales in corpore ſint ſucci. Sed experimento eſt proximis annis confirmatiſſimum. Graſſa enim ſunt, neque adhuc extincta cum febribus acutis; & malignis, hæc exanthemata, quæ niſi cum rubra ſunt, nunquam non lethaliſer ſiunt. Solent verò incipere plurimis à manibus, cernuic, & dorſo, vt pote partibus à viſceribus faciliè recipiendis, ab hepate præcipue & corde. Hic forte tale quiddam habuit. Vtrumque verò, ſiut inquam cum exanthematis, ſine ſine illis, certè morbo maligno renebatur. Nam reſpiratio magnà habet vim in acutis morbis ad ſalutem, aut morrem: prona ergo mortem portendebat: color verò cutis *σπασμωδία* eſt malignorum ſuccorum & caloris debilis nota, vt in prognſtico indicatum eſt.

E

F

G

Perpera maritus qui prope Sitodochi ades habitabat, ictericus erat, ad quem septima die veni, occisus mortuus est, neque urinam neque alia excrementa emittens. Hypochondria magna erant & dura, & spiratio crebra. Hic moriens ne frontem quidem pro labore madefecit.

Quandoquidem dicit septimo die se venisse ad ictericum, insinuat eum ante septimum factum esse talem. Merito ergo mortuus est ex eo signo, quandoquidem, ut in apborismo dicitur, malum est. Solet vero icterus talibus (cum inquam lethargice sit, ut Gal. in commentario illius apborismi dicit) fieri ob hepatis inflammationem. Id etsi non sit perpetuum, ut non possit aliter fieri, eandem tamen ob causam ut plurimum accidit. Certè hic habuit inflammationem, eamque maximam, non hepar solum sed omnia hypochondria occupantem. Quo factum est, ut non solum moreretur, sed ut etiam citissime. Maximam verò ac omnia hypochondria occupantem esse, omnia certè quæ narrat significauerunt. Magna enim fuisse & dura hypochondria, ex propria essentia inflammationis significabar rectius, sed & urinas, & deiectiones, atque alias omnes euacuationes suppressas (id enim insinuat exaggerans quod circa sudorem enitit mox) maximæ inflammationis signum erat, succis irruentibus enim in vnam aliquam partem, quæ maxima fluxione occupatur, euenit euacuationum confuetarum suppressio, quæ ab inflammatione fit, & ipsam postea augeat. Iam verò spiratio crebra si magna est, ardorem ingentem, sin minus, affectum dolorificum in instrumentis respiratoriis aut paribus proximis significat. Vtrumque verò est inflammationis magnæ signum, magnus inquam calor & dolor. Probabile est autem hunc spiritum crebrum & exiguum ob dolorem fuisse, & ob impedimentum quod hypochondria faciebant, quo minus sepius satis dilataretur. Cum enim essent magna & dura, quomodo possent non obistere? Hunc visque adeo succis illa ad viscera confusio succorum, & vehemens inde à magna inflammatione transitio, ut ne frontem quidem humectaret moriens, vel ex labore, ut scilicet morientes solent. Frigidum enim secundum frontem sudare solere, in prognostico dicitur. Causa certè esse soler exolutio, cum calido innato quod expirat exire parte aliqua succi, & ob illius exolutionem refrigerata: in alijs etiam accidit (quod hic Hipp. insinuat) ex labore, ut solent qui anxij sunt, aut vehementius aliquid nuntiant. In hoc tamen tanta vis fuit reuocationis ad interna, ut neque ex labore tantillum per frontem sodaret, sed cohibitis interius omnibus excrementis mortuus fuerit; suffocato calido potius quam expirante.

A verò febre spirandi difficultas non est soluta, sed intus preoccupant dolor in manibus & brachium.

B In hac muliere apparuit satis vis septimi, utque vis eius non solum in diebus, sed & in mensibus, atque adeo in quadragenariis notetur: & quod est secundo libro rantopere celebratum, esse quosdam menses partui decretorios, ut acutis morbis dies. Hæc ergo septimo mense prægnationis correpta est morbo, & septima die morbi fecit abortum. Quamquam, ut secundo libro dictum est, mensis septimus non omni ratione est septimus: si enim quadragenarii numerentur, est quintus: verum in numero lunarium circuitionum est septima. Quod dicit apparuit quarta, indicat, quod sæpe etiam ab eodem autore dictum est, quartam diem esse primum morborum impetum, & esse indicem secundi, qui septima absoluitur. Velut ergo in prægnatione motus qui nono mense plerumque perficitur, septimo tentatur, ita in morbis acutissimis, qui fuerunt est septima; solet tentari quarta, atque futuram indicationem septima, indicat quarta, ex concoctione manifesta, ut forte nabeula rubra, quæ autem iudicatio futura sit, ex motu qui tentatur, idque siue bona siue mala sit futura. Velut sanguinis stillæ quarta die minantur phrenitidem in septima, si verò simul appareat concoctio manifesta, & alia virtutis signa, forsasse indicationem per fluxum sanguinis & ntribus indicabunt. Hinc itaque, quantum suspicor, quarta die dolores acciderunt, ut putaretur abortum velle facere, quem septima fecit. Neque tamen cum abortu omnino liberata est, etiam si febris soluta, sed cum à principio tenetetur dolore pedum, desinente febre (die arbitror septima) *ἡ νόσος ἐξ ἡμῶν*, id est, non rediit ad facilem respirationem, ut par erat, degravato iam vtero & soluta febre, sed perseveravit respiratio difficilis ut quom gerebat vtero, ac forsasse etiam ut cum febricitabat, quod significabat, humorem qui partes imas tenebat, sursum raptum spiritalis partes occupasse. Id verò is factum esse multo magis indicant, quod cum à principio tenetetur pedum tantum dolore, deinde cum scilicet soluta febre difficilis respiratio perseveraret, eam

C *ἡ νόσος ἀπὸ τοῦ ἐν ἡμῶν*, id est, ex interna causa, citraque ullam externam febris solutionem antequam dolor manuum & brachiorum. Manus Hippocrati significat totum brachium, nam quam vulgo manum vocamus, ille vocat extremam manum. Brachium illi significat primam partem vulgo dicti brachij, eam inquam quæ est inter humerum & cubitum. Ergo dicens in manibus & brachium significat non in extremas solum manus, sed in totas manus, & in brachia. Id verò constat factum, quia cum antea tota humorum copia, natura coherente & abortum parante, deorsum reperi, atque proinde pedum dolorem faceret, qui ut etiam rumor, gerentibus vtero quod rectitudinem pedum cum vtero familiaris esse solet: cumque abortus eam humeris partem euacuasset quæ febre tollere poterat, non tamen corpus purgaret, reliquit se in superiores partes collectum, atque occupavit thoracem, respirationem difficilem produxerunt, & redundantes in brachia,

F *ἡ νόσος ἀπὸ τοῦ ἐν ἡμῶν*, id est, ex interna causa, citraque ullam externam febris solutionem antequam dolor manuum & brachiorum. Manus Hippocrati significat totum brachium, nam quam vulgo manum vocamus, ille vocat extremam manum. Brachium illi significat primam partem vulgo dicti brachij, eam inquam quæ est inter humerum & cubitum. Ergo dicens in manibus & brachium significat non in extremas solum manus, sed in totas manus, & in brachia. Id verò constat factum, quia cum antea tota humorum copia, natura coherente & abortum parante, deorsum reperi, atque proinde pedum dolorem faceret, qui ut etiam rumor, gerentibus vtero quod rectitudinem pedum cum vtero familiaris esse solet: cumque abortus eam humeris partem euacuasset quæ febre tollere poterat, non tamen corpus purgaret, reliquit se in superiores partes collectum, atque occupavit thoracem, respirationem difficilem produxerunt, & redundantes in brachia,

G *ἡ νόσος ἀπὸ τοῦ ἐν ἡμῶν*, id est, ex interna causa, citraque ullam externam febris solutionem antequam dolor manuum & brachiorum. Manus Hippocrati significat totum brachium, nam quam vulgo manum vocamus, ille vocat extremam manum. Brachium illi significat primam partem vulgo dicti brachij, eam inquam quæ est inter humerum & cubitum. Ergo dicens in manibus & brachium significat non in extremas solum manus, sed in totas manus, & in brachia. Id verò constat factum, quia cum antea tota humorum copia, natura coherente & abortum parante, deorsum reperi, atque proinde pedum dolorem faceret, qui ut etiam rumor, gerentibus vtero quod rectitudinem pedum cum vtero familiaris esse solet: cumque abortus eam humeris partem euacuasset quæ febre tollere poterat, non tamen corpus purgaret, reliquit se in superiores partes collectum, atque occupavit thoracem, respirationem difficilem produxerunt, & redundantes in brachia,

H *ἡ νόσος ἀπὸ τοῦ ἐν ἡμῶν*, id est, ex interna causa, citraque ullam externam febris solutionem antequam dolor manuum & brachiorum. Manus Hippocrati significat totum brachium, nam quam vulgo manum vocamus, ille vocat extremam manum. Brachium illi significat primam partem vulgo dicti brachij, eam inquam quæ est inter humerum & cubitum. Ergo dicens in manibus & brachium significat non in extremas solum manus, sed in totas manus, & in brachia. Id verò constat factum, quia cum antea tota humorum copia, natura coherente & abortum parante, deorsum reperi, atque proinde pedum dolorem faceret, qui ut etiam rumor, gerentibus vtero quod rectitudinem pedum cum vtero familiaris esse solet: cumque abortus eam humeris partem euacuasset quæ febre tollere poterat, non tamen corpus purgaret, reliquit se in superiores partes collectum, atque occupavit thoracem, respirationem difficilem produxerunt, & redundantes in brachia,

eorum dolores intulerunt. Recte ergo narrat hæc simul, spirandi difficultatem non esse salutem, & factum esse dolorem brachiorum, utpote signa annuentia sibi mutuo, & eandem significationem tribuentia.

Recidiva per longissimum corripiebat, quibus urina ante indicationem supprimebatur.

Nullam certius inditium esse potest futura recidivæ, quam febris solui citra evacuationes manifestas, nec multitudinem excrementorum respondentes. Atqui in quocunque tempore sunt expectandæ, præcipueq; evacuationes, quas in quam plurimis observamus, & eorum suppressionem timere debemus, ob eamque præcipue timere recidivam, si mediocriter quidem suppressa sit, minorem breuioremque: sin autem plurimam, longiorem. Quoriam ergo dicit recidiva per longissimum corripiebat, quibus urina ante indicationem supprimebatur, oportet intelligere, morbos eo tempestate solitos iudicari per urinam, ac proinde quibus id non accidit, accidisse recidivam, & quibus, & ante indicationem, & in ipsa indicatione omnino supprimebantur, accidisse longissimam. Nam posse quosdam morbos solui sine evacuationibus, insidere tamen, & quibusdam morbis esse familiares quasdam evacuationes, atque adeo quibusdam tempestatibus, dictum antea sæpe iam est.

Soror qua erat apud Timenem cum rigore indicata est. Soluto autem colore ex viridi pallido manus & humeri doluerunt, his autem solutis caput: oculorum autem superiores palpebra instruxerunt & lachrymas profuderunt, non novi reliqua. Indicata est circa septimam primum.

Nihil refert, fuerit hæc soror Timenæ, an aliquis alterius apud Timenem habitantis: neque an fuerit hic idem Timenens cuius filij morbus nuper narratus est, an alius. Videtur sanè consentaneum eundem fuisse, quia morbi sunt valde similes, habentq; commune illud *χαρπύς* circa ea humeros, dorsum, & manus, & reliquum corpus. Malignæ autem illæ maculæ cum febribus solent in multis simul quibusdam tempestatibus incidere, præcipue cohabitantes in eadem domo, aut quod contagiosi habeant aliquid, aut quod qui in eadem domo degunt, præterque eodem viantur, vitæ. Habuit ergo hæc febre acutissimam, & malignam acutissimam quidem, quia septima indicata est; malignam, quia habuit maculas ex viridi pallidas, quibus etiam illud malignitatis accessit, quod celeriter solvitur sine, citius scilicet quam sperare posses, & antequam febris indinaret. Quod sanè ut in omnibus hæc temeribus, siue doloribus, siue maculis malum est, ita pessimum in malignis. Non tamen ex omni parte omnino evanescunt, sed ex

A reliquo corpore evanescētes, circa manus & humeros apparuerunt, & his solutis, superuenerunt alij capitis, quod etiam habuit malis, abscessum scilicet intus ire, cum ad inferiora descendere magis deberet. Non potuit ergo non male affici cerebrum. Malæ autem illius affectionis significationem præstiterunt palpebrarum superiorum renuissio sursum facta, & involuntariæ lachrymæ. Ambo enim hæc vituperantur in prognostico, quasi male affectum cerebrum significantia. Non tamen semper lethali ter accidit, sed cum aliorum signorum concursu ut in consualitatis, esse solent etiam hæc decretoria, consualio inquam circa oculos & involuntariæ lachrymæ. Nam ut antea dixisse me memini, in secretionem succorum contingit quasdam particulas corripri consensione, quæ mox succedente indicatione cessat. Lachrymæ etiam possunt ob eandem causam accidere, ac indicationem præmonstrare.

B Dices vero, solent hæc quum maximè decretoria sunt, indicare fluxum sanguinis ex naribus, non rigorem. Ita sane est, verum & fundentibus sanguinem biliosum ex naribus, solet indicatio fieri cum rigore, ut accidisse sermo in extrema capiona de cumbæ tinn per narravit. Si ergo fundenti biliosum sanguine ex naribus accidit, certe & parato fundere poterit accidere. Itaque evenit huic, ut cum his signis indicaretur septima die cum rigore. De qua indicationis specie sæpiam est dictum. Dicit vero indicatum esse circa septimam primum, non quod certò sciat alia postea indicatione fuisse opus, sed quod ignoret, an deinde habuerit aliam, successeritque recidiva. Dicit enim, Non novi reliqua. Indicata est circa septimam primum.

C

D

Menandri vinitor eodem modo se habuit, præterquam quod venter circa principia tenuis reddidit, deinde restitit & urina excretionem indicatus est. Non rigit septima die, quia venter antea turbatus fuerat.

E

Reliqua habuit hic ut soror Timenæ, præterquam quod fluctant illi à principio tenuis ex aluo, & proinde citra rigorem indicatus est. Itaque profuerunt ei deiectiones rennes intempestive ad acrioris bilis evacuationem. Nam alioqui non subsistissent rigorem. Id vero in tali morbo optandum non est, nam minimè est tali morbo (febris ardenti dico cum cutis maculis) congruens evacuatio per ventrem, tametsi aliquando etiam profuit. Vidimus certe nonnullos ita affectorum alui fluxione liberatos, tamen multo melius tutiusque liberantur sudore, quia avertuntur à visceribus fucci maligni. Deiectiones verb ita affectis multo sæpius vidimus prodesse citatas pharmaco, quam sponte fluentes. Neque immerito.

G Quia in talibus natura extorsitum nititur, incoarctat ergo ire sponte succos, magnæ signi est debilitatis. Trahi vero pharmaco, non ita. Quia quod à causa externa signò debet importari affectionis. Exspargere ergo inter initia plurimos horum iunxit, atque adeo per totum morbum procurare, ne alius adititiasis, quia nulla ratione melius præcausatur symptoma, à quibus omnes ferè huiusmodi penduntur. Ta-

men cum spontaneis deiectionibus ingruere hunc morbum, aut per alui fluxioem indicari periculosum esse, & deiectione, & plus satis iam longo experimento didicimus. In sudore eorum contrarium. Quia qui sponte fit, & tempestiue illos optime liberat, qui vero arte elicitur, plerumque auget febres, & virtutem aliquando minuit, nisi forte inebriatorem iam a natura adiuues. Quapropter cum das alexipharmaca, quorum in his morbis magnus usus est, deorsum valde calida, si febris magna est. Ac neque com dederis mediocria, tegumentis plurimum preme: sed tempestiuam sudandi tempus expecta, & serua spontaneos. Vbi dicitur deinde restitit, dicit Hippocrates, *Immo ita qd si sup exple* quod quidem duobus modis legi potest, aut ita, deinde restitit (alios scilicet) & vrinae excretionem indicatus est: aut ita, deinde restitit etiam vrina, indicatus est. Nam certe dicere vrinam indicatam esse, noua phrasis est apud Hippocratem, indicari enim dicitur morbus aut egrotos, non vrina. Sed si hoc oon videatur durum, atque vrinam indicari vis, intellige vrinam quae antea suppressa fluxisse copiose, & sic satis idoneus sensus redditur. Nimirum dum veoter fluxbat, vrinam modice fluxisse (ita enim fit) suppressa autem aluo cepisse fluere, & ita citra rigorem febrem indicaram esse die septima, habuit ita hoc boni egrotus, quod non sine euacuatione sit indicatus. Sin autem durior videtur phrasis, dicte sit cum deiectionibus etiam vrinam, & indicatum esse hominem septima citra rigorem. Sed cum qua euacuatione fuit indicatus. Fortasse cum fluxu bilioso ex naribus, etsi id Hippocratestaceat. Fortasse etiam cum nulla sensibili. Inde vero nihil eueit absurdi, aut quod non possit fieri, sed solam non fuisse satisfactam indicationem. Quid tum postea.

Filius Potamonis cui aluus non fluxbat septima, ante indicationem per duas dies non riguit, propterea neque vrina suppressa bat.

Hic etiam simili morbo occupatus septima est indicatus est. Sed per dies ante indicationem non egressus ex aluo, qui certe videbatur hanc ob causam rigore indicandus. Nam si uinitor Menandri non riguit, quia aluus fluxerat, oportebat hunc rigere, cui non fluxerat. Nunc tamen (inquit) riguit ob hoc. Sed quae fuit causa? Neque vrina (inquit) suppressa est: quasi diceret, quia vrina nunc est suppressa ut aluus, sed fluxit. Et quod uisioni praestiterit liquidae deiectiones, hoc filio Potamonis praestitit vrina copiosa. Neque mitum, analoge enim admodum causae sunt, & altera alterius vicem facile supplet.

Hegeſtrato, cui suppuratio iuxta oculum adnenerat, dens etiam suppuratus est iuxta extremum, & rursum sanatus est oculus, & secundum nares pus descendit crassum: iuxta gingiuam caruncula parua rotunda abscesserunt. Hinc iuxta tertium dentem videbatur

A suppuratio futura, deinde intro reuertebatur, repente autem maxilla & oculi intumuerunt. Hegeſtrato duo dentes extremi corrodébatur, quae sese mutuo resſiciunt, extremus habebat supra gingiuam duas nodos, vnum quidem iuxta corroſionem, alterum vero ex altera parte. Qua vero parte erant duo nodi, ibi radices latae ſimiles ex duobus coincidebant. In alia vna medietas rotunda.

Cum duo ambo Hegeſtrati dentium corroſione laboraret, ambo, & id Hippocr. non aperuerit dicens, alter qui etiam Hegeſtratos vocabatur, aut tale aliquid. Quod si forte id ita euenit, nihil laeditur doctrina his omnibus, quae ad dentium corruptionem pertinent, simul enarratis, siue eidem homini omnia, siue duobus acciderint. Ac fortasse etiam fuisse satis haec cum illis buius ipsius libri quarti verbis coniungere, quae ad dentium & formationem & morbos pertinebant, quia ex illis pendet horum eoratio. Ita enim dixit Hippocrates, iuxta tertium dentem suppuraciones accidunt plures, quam iuxta alios omnes; & quae ex oaribus crasse fluxiones, & a temporibus dolores, ex hoc maxime sunt. Exeditur hic maxime. Hoc idem euenit Hegeſtrato, cui ex suppuracione circa oculum facta est suppuratio ad extremam radicem dentis, & secundum nares descendit pus crassum. Videbatur vero suppuratio futura ad tertium dentem (ad caninum scilicet, ut solet) abcessu a regione illius primam facta, deinde intro reuertebatur, colligebatur videlicet pus versus alium, aut secundum incisorem, aut molarem primum. Cui ex doloribus temporum suppuraciones magis fiant ad dictum dentem quam alios, & cur descendat crassum etiam ex naribus in tali abcessu, illo loco dictum est. Constat vero eandem esse rectitudinem densibus cum oculis, & cum temporibus. Merito ergo huic ex morbo circa oculum abcessus hic factus est: & excipientibus pus naribus & dentibus sanatus est oculus a suppuracione. Nihilominus ex deprimi dolore, ut fieri solet, repente intumuerunt maxilla & oculi. Neque sane leuiter laborauerunt partes oris dentibus proximae. Nam praeter dicta, pus descendens erexit frustula carois, quae ex gingiua eius lateris abscesserunt: & praeterea duo dentes extremi, postremi scilicet molares (consentaneum est id factum esse in eodem latere) quae sese mutuo tangunt corrodébantur, & extremus ac ultimis omnium, habebat supra gingiuam quasi duos nodos, vnum iuxta corroſionem, iuxta eam .i. partem qua tangebatur alium, alterum in aliam partem, in extremitatem scilicet qua finiiebantur dentes. Reddi causam ob quam id eueit ex ipsa ossis figura. Quae (inquit) parte erant duo (nodi scilicet) hoc est, a facie hac anteriori qua dentes teguntur labijs, erant dentis radices duae latae, quae reflexae in sese coinci-

debant, similes ex duobus, hoc est, similes illis radicem paribus, de quibus loco citato dixit, qui quintus ab anterioribus numeratur, quatuor habet radices vnicuique viduorum dentium veluti connexas, omnes quidem reflexas ad internam partem. Nimirum illic dictum est, quosdam dentium molarium habere quatuor radices, secundum paria reflexas ad sese, alterum par à facie anteriori & exteriore, alterum à posteriori & interiori, quosdam habere tantum tres, in facie anteriori duas, & tertiam in posteriori à medio ortam. Nunc dicit deum illum postremum habuisse à parte anteriori, quæ est gingivæ facies, duas radices similes ex duobus, id est, illis radicem paribus quas esse antea diximus: in alia parte, vocam medietatem rotundam, hoc est, vnicuique radicem rotundam à medio productam. Quanquam certe hæc cum esset vltima molaris, atque vltimior superioris maxillæ (his enim est maior relictus cum oculis & temporibus) quatuor habere solet, sed ut diximus magnam differentiam recipiunt dentium figure. Sed quid hæc ad nodos? Certe supra duas illas radices facti sunt duo abscessus duriculi, quos vocat nodos. Nam ut dictum illic est, per radices recipiuntur dentes abscessus.

Quibus ad oculos abscessus accidunt in febribus ardentibus, illi maxillas habent valde rubras, & sanguinem à naribus fundunt: sed & quibus ad aures tumores nascuntur. Fortasse autem & abscessus ad articulos potius colliguntur, nec istud quidem manifestè novi.

Quibus per febres ardentes rubent valde maxillæ, & sanguinem à naribus fundunt crebrè, & oculorum abscessus patiuntur, ut rubores oculorum, seu ophthalmias, aut auri vel dolores in eis persistentes, certe hi maleo sanguine pleni sunt. His (inquit) foasse solent ad articulos colligi abscessus potius quàm aliis qui febribus ardentibus laborant. Sed explicans eui dicit fortasse addit, nec istud quidem manifestè novi. Nimirum diximus in initio huius operis, hoc opus scriptum esse captando potius experimenta, quàm docendo quæ iam essent satis confirmata. Vide ergo quam fidem debeas Hippocrati qui quid aliqd affirmat, quia cum hæc scriberet, nondum fortasse hoc habebat experimentis confirmatissimum, non affirmat, sed aperit tantum quam habet de re, seu opinionem, seu tantum suspitionem. Sed dices videri quod docet apb. 74. sect. quartæ ei quod modo dicit longe contrarium. Nam inquit, quibus spes est abscessus fore ad articulos, liberat ab abscessu vrina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. Tam longè ergo sistit, ut sanguis ex naribus fluens significet abscessus ad articulos, ut etiam aliqui futuros fieri protubeat. Certè non sunt contraria hæc duo, sed ad eandem sententiam pertinent. Si enim sanguis copiosè fluens liberat ab abscessu ad articulos, certè abscessus ad articulos nati sunt fieri in sanguine morbus. Sanguinem enim morbus solet solvere fluxus sanguinis, sanguinem verò esse morbum

A nihil potest melius significare, quàm crebrè tentatus fluxus sanguinis. Ergo eadem ratio potest fluxus sanguinis futuros abscessus significare, quæ & ab eis liberat. Exiguus scilicet & creber significare, copiosus tollere solet.

Rigores tremulis aderant, hypocondry contentio, muliebria apparuerunt, decima septima perpetuo indicabantur. Quæ quidem si non ita mansissent intus, indicabantur tertia; quadam quinta, quadam septima indicata est.

Mulieres plurimas quadam tempestate dicit febricitasse acutè ex menstruum retentione, hæcque habuisse per febres rigores citra vllum ordinem, & fuisse tremulas, hypocondriumque eis contentum fuisse. Has verò superuenientibus mensibus iudicari solitas decima septimâ. Si verò alix ea tempestate febricitassent, quibus non ita mansissent intus, hoc est, diu suppetisse non fuissent menstrua euacuationes, eas tertiâ die iudicari, præter vnam quandam quæ quinta, aliam quæ septima indicata fuit. Quam familiare sit mulieribus ex hac occasione egrotare, non est quod moneam, medicumque debere menstrua euacuationis curam studiose suscipere, quàm ad curandas mulieres accersitur. Fere enim omnes muliebres morbi hinc nascuntur. Qui enim aliunde, non mulierum proprii sed communes cum viris sunt, nisi forte per pauci quidam ex lacte in mammis. Nam & vocatos mammillarum caneros, & morbos ex feminis retentione omnes, in viris etiam vidimus. Fere itaque omnes muliebres sunt ex menstruum defectu. Iam vero menstruum sanguis non tam lædit quàm natura non tentat eum pellere (quamquam ita quoque redditur importum corpus) quàm cum confluit versus uteros velut effluxurus, & aut ob viarum stricturam, aut suam crassitiem, aut vitiumque non effluit, ut dicitur libello de morbis virginum. Tunc enim secretus ab habitu corporis confluit in maiores venas deorsum, coercitur vero regurgitat per maiores & communes ad hypocondrium (ita vocatur ea regio in qua sunt hepares & lien) distenditque illud. Porro venas quæ sunt circa artus, ut brachia aut ora, et circa autem præcipue distendens, comprimit vicinos nervulos, & priuat subiectas partes facultate animalis, ut quum compressione stupor inducitur. Hinc necesse est tremulos fieri artus. In secretionem vero, & ea velut re pressione, necesse est excrementa agitari, unde mox fiunt rigores. Merito ergo illa omnia fiebant mulieribus, ea occasione febricitantibus. Merito etiam febres erant longiusculæ, cum ex multis succis crassissimæ penderent, ac proinde non indicabantur nisi menstruis fluctantibus (necesse enim erat prius eam, quæ febris esset causa, tolli, ut ea indicaretur) oeq̃ ante decimam septimam, aliqui acuto morbo laborantes. Eas vero quæ citra eam occasionem febricitabant, non mirum indicari tertiâ, quinta, aut septimâ. Nimirum contigit ea tempestate febricitare acutissime, ac proinde intra fines acutissimorum indicari, quibus multitudo & crassities non esset impedimento.

Mulier cui sanguis ex naribus fluxit quinta & sexta, septima indicata est. Valde rubra.

Hanc arbitror fuisse mulierem de qua loquentur dixi, alia sepsima. Hanc dixi non ex menstruatorum suppressione febricitasse, ob id ergo, & ob ea quae contingere constat, non tam eam laborasse multo & crasso, quam tenui & valde calido, non molto. Nimirum erat rubicunda maxillis, quia sanguis utpote tenuis sursum efferebatur. Fuit vero satis ad perfectam indicationem in septima, ut sanguis quinta & sexta fluere, quod sane non fuisset, si aut omnino molius aut crassius esset: autem proclata febris esset, aut fortasse essent facti abscessos ad articulos, ut ipse met nuper dicebat.

Mulieri vehementi capitis gravitate laboranti indicatio facta est circa vigesimam diem. Vigesima aspuerunt hypochondria, septima non multum sanguinis ex naribus fluxit deiectiones tennes erant, in oculum dextrum circa octavam decubuit.

An huic mulieri menstrua suppressa fuerint non explicat, verisimile autem est ita accidisse, quia quibus non manifestentur intus, ut dicebat non per, brevissime indicabatur ea tempore, aut tertia, aut quinta, aut septima, Quoniam autem hae non decima septima indicata est, ut eadem tempore plerumque alia, constat ex multo actissimo & ex angustis locis impacto sanguine malum processisse. Sed & doloris species hoc indicavit, nam vehementi capitis gravitate laboravit. Id vero fit cum multus sanguis crassus praecipue in capite redundat, maxime autem quum is replet sinus, & vala membrarum cerebri. Hanc ergo ob causam malum ad vigesimam pervenit, quia indicata est astutans hypochondria: qui astus non indicabat phlegmonem eius loci, alioquin non simul eadem die cepisset ac finitus esset, sed deteriorius erat. Nimirum cum fucci calidi qui maxime ea regione abundant fecerentur expellendi, & fluantur hypochondria. Qua ratione indicata sit non dicit, fortasse autem fluxu sanguinis ex naribus, is enim fuerat insinuat us per morbum, cum septima fluere, etiam non multos, astutans etiam hypochondria nullam evacuationem habent magis accommodatam. Per magnas enim venas inde sursum latas facile sanguis ascendit. Fortasse etiam fuerunt deiectiones biliosae, hae enim etiam ex hepate facile per mesenterium deponuntur, & fuerunt etiam per morbum insinuate, fuerunt, n. deiectiones tennes. Redundasse autem calidos succos in dextris partibus magis, atque ita hepate magis quam liene, indicant ille, decubuit quem fecit in oculum dextrum circa octavam, Neque quidem obstat sopernas partes fuisse praecipue affectas. Hae enim saepe per inferos evacuationes liberantur, ut si dextras alui fluxione cessat, cum praecipue suprens

A ab inferis partibus receperint, ut in hac muliere caput a partibus circa uterum. Fluxio ergo ex alio, etiam recipienti parti contraria foret, cum mirante habuere consuetudinem, fuitque illi reuulsio, huic derivatio. Fuit etiam indicatio valde congruens muliebri fluxui.

Viro eadem contigerunt, praeterquam quod septima indicatus est, liene in sinistris aliquantulum intumescere. Huic vigesima octava & disturniores oculi affectus acciderunt, fortasse quod post indicationem, & quod multo contigissent.

Eadem quae dixit mulieri, acciderunt eius viro, praeterquam quod indicatus est septima, quia scilicet non ex menstruatorum suppressione laborare cepit, ut illa, & erat subsplenicus, ac proinde fortasse fluxu sanguinis ex sinistra nare est indicatus. Nam tamen eodemque tempore mulierem fluxu sanguinis esse indicatam, & hae eadem accidisse dicit, consentaneum est huic quoque ita esse indicatum, ac proinde illud etiam significat, significat fluxum in sinistram narem incidisse: & illud etiam confiteretur simul affectionem & indicationis causam, quasi diceret, erat subsplenicus, ac proinde in sinistra inclinatus indicatio: quia ut in hoc ipso libro dixerat, quibus splenis elevatio, is sanguis ex sinistra nare fluebat. Fortasse etiam illa verba, subsplenicus in sinistra, nihil aliud significant, quam fuisse subsplenicum, dicitque in sinistra per pleonasmum, quia liene ad sinistra pertinet. Cum huic eadem acciderint quae uxori, accidit etiam in oculum dextrum decubitus trilli (contigit enim cum oculum habere debilem) verum non tam cito, sed vigesima octava, & disturnior (tempus scilicet vigesima octava, & lente ad dies alios processit) reddidit Hippocrat. causam, quae coniuncta tanto tardius huic esse factum ac non octavo ut uxori. Forte (inquit) quod post indicationem, & quod multo contigissent, hoc est, quia indicatio praevenerit diem octavam ac proinde eius diei decubitus sustulit, qui dilatas in tantum tempus est, quia etiam indicatus perfecte non est (veniam enim habuisset nullum) tam evanescata sunt multa per indicationem, ac proinde factus est tardior motus, & minor abscessus.

D Eadem quae dixit mulieri, acciderunt eius viro, praeterquam quod indicatus est septima, quia scilicet non ex menstruatorum suppressione laborare cepit, ut illa, & erat subsplenicus, ac proinde fortasse fluxu sanguinis ex sinistra nare est indicatus. Nam tamen eodemque tempore mulierem fluxu sanguinis esse indicatam, & hae eadem accidisse dicit, consentaneum est huic quoque ita esse indicatum, ac proinde illud etiam significat, significat fluxum in sinistram narem incidisse: & illud etiam confiteretur simul affectionem & indicationis causam, quasi diceret, erat subsplenicus, ac proinde in sinistra inclinatus indicatio: quia ut in hoc ipso libro dixerat, quibus splenis elevatio, is sanguis ex sinistra nare fluebat. Fortasse etiam illa verba, subsplenicus in sinistra, nihil aliud significant, quam fuisse subsplenicum, dicitque in sinistra per pleonasmum, quia liene ad sinistra pertinet. Cum huic eadem acciderint quae uxori, accidit etiam in oculum dextrum decubitus trilli (contigit enim cum oculum habere debilem) verum non tam cito, sed vigesima octava, & disturnior (tempus scilicet vigesima octava, & lente ad dies alios processit) reddidit Hippocrat. causam, quae coniuncta tanto tardius huic esse factum ac non octavo ut uxori. Forte (inquit) quod post indicationem, & quod multo contigissent, hoc est, quia indicatio praevenerit diem octavam ac proinde eius diei decubitus sustulit, qui dilatas in tantum tempus est, quia etiam indicatus perfecte non est (veniam enim habuisset nullum) tam evanescata sunt multa per indicationem, ac proinde factus est tardior motus, & minor abscessus.

E Eadem quae dixit mulieri, acciderunt eius viro, praeterquam quod indicatus est septima, quia scilicet non ex menstruatorum suppressione laborare cepit, ut illa, & erat subsplenicus, ac proinde fortasse fluxu sanguinis ex sinistra nare est indicatus. Nam tamen eodemque tempore mulierem fluxu sanguinis esse indicatam, & hae eadem accidisse dicit, consentaneum est huic quoque ita esse indicatum, ac proinde illud etiam significat, significat fluxum in sinistram narem incidisse: & illud etiam confiteretur simul affectionem & indicationis causam, quasi diceret, erat subsplenicus, ac proinde in sinistra inclinatus indicatio: quia ut in hoc ipso libro dixerat, quibus splenis elevatio, is sanguis ex sinistra nare fluebat. Fortasse etiam illa verba, subsplenicus in sinistra, nihil aliud significant, quam fuisse subsplenicum, dicitque in sinistra per pleonasmum, quia liene ad sinistra pertinet. Cum huic eadem acciderint quae uxori, accidit etiam in oculum dextrum decubitus trilli (contigit enim cum oculum habere debilem) verum non tam cito, sed vigesima octava, & disturnior (tempus scilicet vigesima octava, & lente ad dies alios processit) reddidit Hippocrat. causam, quae coniuncta tanto tardius huic esse factum ac non octavo ut uxori. Forte (inquit) quod post indicationem, & quod multo contigissent, hoc est, quia indicatio praevenerit diem octavam ac proinde eius diei decubitus sustulit, qui dilatas in tantum tempus est, quia etiam indicatus perfecte non est (veniam enim habuisset nullum) tam evanescata sunt multa per indicationem, ac proinde factus est tardior motus, & minor abscessus.

F Eadem quae dixit mulieri, acciderunt eius viro, praeterquam quod indicatus est septima, quia scilicet non ex menstruatorum suppressione laborare cepit, ut illa, & erat subsplenicus, ac proinde fortasse fluxu sanguinis ex sinistra nare est indicatus. Nam tamen eodemque tempore mulierem fluxu sanguinis esse indicatam, & hae eadem accidisse dicit, consentaneum est huic quoque ita esse indicatum, ac proinde illud etiam significat, significat fluxum in sinistram narem incidisse: & illud etiam confiteretur simul affectionem & indicationis causam, quasi diceret, erat subsplenicus, ac proinde in sinistra inclinatus indicatio: quia ut in hoc ipso libro dixerat, quibus splenis elevatio, is sanguis ex sinistra nare fluebat. Fortasse etiam illa verba, subsplenicus in sinistra, nihil aliud significant, quam fuisse subsplenicum, dicitque in sinistra per pleonasmum, quia liene ad sinistra pertinet. Cum huic eadem acciderint quae uxori, accidit etiam in oculum dextrum decubitus trilli (contigit enim cum oculum habere debilem) verum non tam cito, sed vigesima octava, & disturnior (tempus scilicet vigesima octava, & lente ad dies alios processit) reddidit Hippocrat. causam, quae coniuncta tanto tardius huic esse factum ac non octavo ut uxori. Forte (inquit) quod post indicationem, & quod multo contigissent, hoc est, quia indicatio praevenerit diem octavam ac proinde eius diei decubitus sustulit, qui dilatas in tantum tempus est, quia etiam indicatus perfecte non est (veniam enim habuisset nullum) tam evanescata sunt multa per indicationem, ac proinde factus est tardior motus, & minor abscessus.

H I mens soror disscalter spirabat, & distenta hypochondria apparuerunt per aliquod tempus, an vero viro cessaret non novit. Alius primo suppressa est, & tunc vomebat, postea non amplius. Alius enim multa viscosa & biliosa egressi, nec hypochondrium impendebat. Undecima die ad magnum dextrae manus digitum orta est phlegmone, alui peremptio confertim facta est & procedebat superius, ex quo meli se habuit. Et enim cataphora & febres minores erant, & quodammodo melius spirabat, quod supra praenuntiavit quoddam cno-

*ingerat. Decima sexta exiguus & crebra accidit
spiratio & febris. Mortua est. Hac febricitauit
ante abscessum, septima post abscessum per-
ruit. Et at etiam haec valde rubicunda.*

Ece aliam quandam, quae ex menstruorum sup-
pressione egrotauit, ut alix multae illa tempestate.
Nam nisi fuissent suppressa, non dubitaret Hippo-
crates an vtero gereret. Sed & ex ijs quae habuit,
agnoscitur, erat enim (inquit) etiam haec *crebra
spiratio* hoc est vultu perubro, qualis erat multis
temporis laborantibus. Nam & de quada-
m alia nuperimè dicebatur, valde rubra, & paulo
ante, quibus abscessus ad oculos, in febris ar-
dentibus, valde rubra secundum maxillas. Habuit
etiam intrenta hypochondria, quod sanguine multo
sursum regurgitante, eadem tempestate factum esse
in multis, nuper dicebatur. In hac ergo primum om-
niū confueta euacuacionis defectus fecit difficilem
respirationē, & tentionem hypochondriorum: id-
que non quum iam febricitaret, sed *ante* per
multos saltem dies ante, ut videretur vtero gerere,
ac fortasse etiam gerebat. Nam quid prohibet simul
vtero gerere, & morbo lethali corripi? Certè tam
difficile est aliquid discernere, an gerat vtero quae
egrotat, an solum teneatur morbo, quem suppressio
menstruorum fecerit, ut io hac, quae multos ante
dies habuit ventris tumorem, & respirationem diffi-
cilem, & decem ac septem dies postea febricitauit,
confiteatur Hippocrates se non nouisse, an vtero
gereret. Cum igitur mulier ea dubitatione ob ducta
accidentia teneretur, correpta est febre acuta cum
cataphora, ut solent quibus multus ad caput sanguis
effertur, praecipue si is est pituitosus, quales esse huic
videbatur ex alui deiectionibus. Nam imprimis al-
uius suppressa est, & tunc sursum repentinus excre-
mentis vomebat pituitosa, & biliosa arbitror, quia
deinde, hoc est, postquam aluius suppressa esse de-
cessit, & non amplius vomebat, aluius multa deiecit
viscosa & biliosa, quae, quia viscosa, magnam pi-
tuitae mixtionem habere agnoscebantur. Addit, hy-
pochondrium non prohibebat, quod non video
quid aliud possit significare, quam non prohibebat
vomere, aut deicere. Scilicet non erat admodum
dolens, etsi inuentum. Non tamen hoc admodum
placet, rarius enim solet ea intentio prohibere de-
iectionem & mictum, quam ut debeat id Hippo-
crates admonere. Quare suspicari cogor, quum legi-
tur *et ingratum* legendum fuisse *et antium* hoc
est, non demittebat, aut soluebatur, quasi deceret
aluius multa viscosa & biliosa egerebat, hypochon-
drium tamen non dimittebat ea, à quibus intende-
batur sed nihilominus tenebat. Ita enim accidit iis
quibus lethalis morbi exitus portenditur. Nihil
excernitur à partibus praecipue affectis, & reliquis
inutiliter euacuatis vires dissoluuntur. Vndecima
die in magnum digitum manus dextrae incidit phleg-
mone. Quia non raro tentatur abscessus in morbis
pendentibus ex multo sanguine. Manus autem dex-
tra maxime nata est ab hepate recipere, & hoc est
maxime natum sanguine redundare. Addit, *et al-
ius* hoc est, per id etiam tem-
pus erat humorum fluxio per vomitum. Cum au-
tem hoc fieret, id est cum vomeret, melius habebat,
remittebatur enim & cataphora, & febris. Et al-
quando etiam euenit fieri melius spirantem, quod

A supra vomerat vomitum prauum. Constat per
pleonasmum dici *ante* non enim per inferiora vomit-
us. Sed eandem ob quā tātopere subleuabatur vo-
mitibus, cum esset lethalius affecta, fatius est con-
siderate. Videtur enim petitis illud imprimis ef-
se proprium, ut nullis euacuacionibus magnopere
iuuentur. Certè quae vterinis morbis tenentur, aut
ex suppressione menstruorum ortis, magnopere so-
lent iuuari vomitibus, quia cum vtero magnopere
consentit ventriculus, & eius passiones grauissima
symptomata afferre solent, anxietates eodem & de-
liquia animi, & capitis grauitatem & vertiginem,
& morus conuulsivos, & praefocationem. Quae
eadem symptomata morbis illis sunt familiaria. Do-
positis ergo quae ventriculū premunt, cessat eius
consensio, & ea cessante magna ex parte remit-
tuntur accidentia. Eadem ratione in hac euenie-
bat, ut vomitibus subleuaretur, non sane quod ita
morbus praecipuus minueretur: alioqui fuisset li-
berara, sed quod deconarto ventriculo symptoma-
ta manerentur, & illa videretur potius sese me-
lius habere quam reuera haberet. Nam ita proce-
dente morbo, decimaseptima spiratio facta est eni-
gma & crebra, & febris iuxta, est quod quidem in-
flammationem magnam in spiritalibus instru-
mentis ortam significabat, aut (si id circa dolorem
maximè contigit) ardor ingentem ob maximam
facultatis debilitatem tandem mortua est, non sane
eadem die, sed decimaseptima. Nam inquit, haec fe-
bricitauit ante abscessum (nam vndecima die fe-
bris habuit abscessum) & septima post abscessum
petiit. Est verò septima ab vndecima, decimasep-
tima. Nec immerito id euenit. Quae enim eodem
modo & ex eadem occasione egrotantes serua-
bantur in hac tempestate, iudicabantur decimasep-
tima. Eisdem autem diebus moriuntur homines,
quibus salui sunt, ut Hipp. ipse autor est.

E *Illius mulieris illius quae erat Apemanti
soror tumida habuit hypochondria & sple-
nem, difficulter spirabat, alui excrementa
erant viscosa, biliosa, & stercoribus aliquo
pacto admixta. Defesso ex operibus vige-
sima in pedes abscessus accidit, eaque indica-
tio lassitudinem patientibus in articulos, non
in oculum solet contingere. Hypochondria au-
tem dissenta erant, atque etiam tussicula
quaedam sicca continua diuexabat.*

F Puer hic maiori aliquo, quam pro suis viri-
bus, labore defessus, cepit febricitare cum hypo-
condriorum tumore, praecipue lenis, ac cum diffi-
cili respiratione: ac proinde abscessus factus est
huic in pedes (non io oculum ut aliis de quibus
dictum est, qui eodem tempore egrotarunt) & in
pedem articulos, idque merito, quia, ut in apho-
rismo quatuor particulae dicunt, lassitudinem pa-
tientibus per febres, in articulos, & circa maxil-
las potissimum abscessus fuerit. Hic ergo quando-
quidem in pedem factus est articulos, videtur ierit
agendo defatigatus esse. Si enim esset aliter, forte
factus esset ad maxillas, cum maxime iuxta tem-
poris conditionem esset futurus in oculum. Sed
pueri & debiles cum pedes agunt iter, solent ex

ea defanigatione inflammatioem visceris contrahere. Quæ excrementis ex toto corpore tractis, ea in tumorem eleuatur, dextrum, aut sinistrum, aut verumque, vt sunt dextra, aut sinistra, aut veraque parte debiles. Ita accidit huic, cui ambo hypocondria, benè verò præcipuè intumuit, & difficulter spirabat, & ob compressionem quam afferebant hypocondria thoraci: & quia talis respiratio lassitudinem ipsi est familiaris. Ob redundantiam verò excrementorum multiplicium, quæ ibi collecta sunt, fiebat deiectione lenta, biliosa, & stercoreosa, ex pituita scilicet & bile cum stercore admixtis. Vigesima die dictam ob causam abscessum habuit in pedum articulos. Atque ita iudicatus est, imperfectè tamen. Nam & post factum abscessum, hypocondria intumescunt. Er tussicula etiam quædam sicca continua, hærentibus adhuc multis excrementis in paribus, & resudante parte aliqua in thoracem tenuissima, vt solet in hydropicis. Vnde facile constat hunc non fuisse bene liberatum, sed obnoxium reciduis, quod vt insinuet, addit hæc quæ sequuntur.

Quæ relinquuntur post indicationem, recidivas faciunt, & quæ in ipsis morbis excreuntur, sputum præmaturum, venter, intemperies, & huiusmodi.

In multis locis scriptam inuenies apud Hippocratem hanc sententiam. Quæ relinquuntur in morbis post indicationem recidivas faciunt. Nam vel in hoc ipso opere enata iam est lib. 2. sectione 3. & rursum lib. 6. occurret. Itaque quoad primam partem attinet huius contextus, non est quod moremur: quod verò addit, & quæ in ipsis morbis excreuntur, sputum præmaturum, venter intemperies, & huiusmodi, aliquantè est difficilis. Nam si quæ relinquuntur recidivas faciunt, non facient quæ excreuntur. Contraria enim sunt excocti & renoueri. Iam verò concoctiones omnes securitatem iudicii significare 2. lib. dictum est, quo posito ergo præmaturum sputum significabit separatæ iudicii contrarium, hoc est recidiuam. Venter non videtur hic posse significare aliud, quàm deiectiones. Intemperies videntur pertinere magis ad ipsum effectum, quàm ad causam: illud verò quæ relinquuntur, dicitur de causa morbi, & malis succis. Quid ergo est quod dicit Hippocrates? Certè non quæ satis copiose excreuntur, & vsque ad corporis perpurgationem, faciunt recidivas: sed quæ imperfectè excrementa retinentur, & quæ sexto libro sectione 2. dicit his verbis. Siquidem ex effusis intus relinquatur, patata est recidiva. Hoc est, si aliquid eorum quæ effundi ceperunt, retineantur, vt effusio non perfecta facta sit, paratus est homo ad recidiuam. Hoc idem nunc dicit, & quæ in ipsis morbis excreuntur. Perbellè autem dicit, & quæ in ipsis morbis excreuntur. Nam excreni non in ipso iudicationis tempore, & extrema morbi parte: sed in ipsis morbis, id est, per ipsos totos morbos, dyscrasias, seu difficiles iudicationes indicat, ac proinde recidivas, vt dicebatur libro 2. sectio. 1. Ergo per mor-

A bos intelligit intemperies factas excretiones, siue aliunde siue ex ventre quæ significant futurum morbum difficilius iudicij, atque ob id iudicandis difficilem, & habiturum recidiuam. Quod ergo addit, venter, hoc idem potest significare, paræ deiectiones imperfectas, aut etiam fortasse ventrem tumentem, quasi dicat ventris tumorem ex morbo relictum, significare intrus remanere aliquid quod minatur recidiuam. Ad hunc sensum fert puer ægrotus, cuius causa videtur Hippocrates hæc dixisse. Nam dixerat, post iudicationem hypocondria illa distenta fuisse. Quod dicit sputum præmaturum & intemperies, simile est ei quod dicitur. 6. Epid. Sitis intus relicta. Nimium cum morbi, acuti præcipuè, causa perfectè euacuata est, facillimè ac citissimè redit corpus ad temperiem, cum ergo non redit, quod ex siti aut crassato spuro cognoscitur, timeri debet ne aliquid interius relictum sit, quod recidiuam affert. Sputum ergo præmaturum hoc loco videtur mihi dici, non quod bene maturatum facile excreatur, sed salua crassior facta, ac præcalida intemperie exulta. Quoniam enim sputum quum coquitur crassescit, ob accidentis similitudinem quod vitumque calore crassescit, licet vocare præcoctum. Hæc ergo & huiusmodi, hoc est, quæcumque intemperiem significant aut succos deiectiones, vt sitis, amaritudo oris, & fastidium, recidivas prænuntiant.

A pementum dolores torquebant in sede, & dextre partis inanitate, atque iuxta umbilicum paulò infra oriebantur, & ex dextra parte ante dolorem mingeat cruentum. Tertia die desit. Et faber in altera parte ex eadem rectitudine dolorem sensit, hieciatium prius mingeat cruentum. Quod cum desisset, ambo subsidens quoddam in urinis habebant, idque tertia die. Fovebatur autem plurimum Apementus, quod alter non sentiret nisi in sinistra parte. Nicastro etiam accidit aliquid in extremis partibus dextris, paulò infra quàm quibus in sinistris. Oblongum verò quoddam ex ventris inanitate ad umbilicum usque utrisque extendebatur.

Aliquando dolores renum ac viarum vrinæ, tam similes sunt doloribus intestinorum, vt primis diebus omninò discerni non possint, quod scilicet in utroque cooringat, & vrinam & deiectionem cohiberi, & ægrotum nauseare: & doloris species in eodem loco eadem sit. Non discernuntur ergo donec incipiant vrinæ & deiectiones exire. Tunc enim earum forma indicat, renes an intestina laborent, ex renibus enim mictu, ex intestinis deiectione reijciuntur ea quæ affectionem indicent. Cum ergo dolorem subito inuadentem comaturus, aut antecedit insigniter mutata vrinæ species, facile

diagnoscantur vel in ipsa prima invasione. Nam & timerebatur antequam fiant. Velat accidit Apemanto & fabro: quorum Apemantus, dextri renis & venter secundum dextrum ile: fabrum, sinistri, & venter etiam sinistram dolore laborasse certum est. Nam uterque ante dolorem mingebat cruentum, per debilitatem arbitror renis, laxatis quæ in eum finiuntur venis, quam anastomosim vocant, aut laxatis meatibus, qui à primo in secundum sinum sunt, ac ita male peracta secretionem. Ea verò vrina cum incepisset ante dolorem, cessavit in utroque die tertia. Non explicat an tertia à doloris initio, an ab ea quæ cepit cruentum mingere, utrumque sanè fieri potuit. Vtrumvis autem factum sit, rene debilitato per interperiem, ac ob debilitatem colligente excrementa quæ obturatur, & suppressionem sanguinis fecerunt, hæc ipsa excrementa cruentum mistum tollentia dolorem auxerunt. Verùm etsi crure tincta vrina reddi desit, non tamen proinde omnino exiit pura. Nam ex illis ipsos excrementis quæ obturatur, decia sunt fabulosa quedam, quæ subsident in tenui vrina, quod nunc vocat subsidientias. Ergo dicit: Apemanto dolores in sede (non quidem arbitror in ipso podice sed iuxta in interfemineo, per illud enim præterlabitur tortuose vesicæ cœuix ad extremum caulem) & in ili dextro iuxta umbilicum, paulo iosta illum (quæ scilicet venter descendit ex rene dextro in vesicam) & ex dextro (rene scilicet) ante dolorem mingebat cruentum. Desit tertia die (doloris arbitror) & faber in altera parte (hoc est sinistras partes habuit dolorem incumbens) ex eadem rectitudine, id est, secundum eandem rectitudinem productio dolore à rene sinistro, per ille sinistram ad caulem. Et hic etiam mingebat prius (quàm scilicet doleret) cruentum, desinente verò (cruento misto) ambo (Apemantus scilicet & faber) habebant in vrina subsidientias (atenosæ scilicet, aut crassas, sedentariasque, quales renales esse solent) & hoc tertia die euenit utrique. Fovebatur autem plurimum Apemantus, alter non sentiebat nisi in sinistra. Hoc est Apemanto extendebatur dolor ad partes plures, ut multis sit proximis partibus consentientibus, aut secundario occupatis, ac proinde fovebatur plurimis partibus: faber verò paucioribus, quia non sentiebat dolorem nisi in sinistra parte. Obiter insinuat (quod est verissimum) maximum visum esse fomentorum in huiusmodi doloribus, anodynorum scilicet, & laxantium. Nicotistratus, qui tertius est in præscripta narratione ægrotus, videretur habuisse dolorem intestinorum, quia non minxit cruentum ut illi, & dolorem habuit non secundum illius rectitudinem, sed ad anteriorem partem inclinantem in dextra parte. Quoniam verò comparans hunc cum fabro, qui in sinistra parte habuit dolorem, dicit, in extremitatibus dextris-partibus, inferius quàm quibus (legendum arbitror cui) in sinistris, & mox addit, vsque ad umbilicum utrique, fabro scilicet & Nicotistrato: constat fabrum, etsi dextrum sit secundum eandem rectitudinem doluisse sinistra parte, velut Apemantus dextram, habuisse tamen dolorem non æque humilem: sed secundum rectitudinem illius, superiorem verò, nam attingit umbilicum, &

A non attingit interfemineum: nam si hoc attingisset non potuisset dolor Nicotistrati inferius descendere. Ergo faber habuit ab umbilico descendentem per sinistram ile, non vsque ad pubem: Nicotistratus verò ab umbilico ante ile vsque ad pubem: qui locus infestiorum potius quàm viarum vrinæ esse videtur.

B *E* A anus quæ iuxta Sosisilem Leucophlegmate laborabat. Tibia duris tumoribus, candidis, mollibus turgebat pedesque, quamvis minus. Illi etiam ad inferiorem femorum partem extendebantur. Multis autem hoc difficilem exitum portendit. Quinetiam lumbi tumeant & venter tensus erat, hypochondria submollia, nec admodum diffculter spirabat. Desinentibus autem plurimis alia incumbere cura, quod oculi facti essent cassi. Hæc autem oculorum cura paulo quidem misior erat. Coxa autem & cruris dolores ab vtero oriri videbantur. Apposito medicamento bene olente ex farina, & vnguento contigit statim discuti & finiiri. Tempus eius qui in oculos factus est abscessus, annum fuit.

Hæc anus laboravit ea hydropis specie, quæ leucophlegmatia vocatur ob pituitam toto corpore redundantem, & colorem quem cuti tribuit. Est is affectus, ut Galen. dicit, in toto corpore aut multis partibus idem, qui œdema dicitur in vna quadam particula. Vocant enim medici iam pridem œdema tumorem mollem sine dolore. Talis verò etiam est candidus, quamquam Hippocrati & venustissimis œdema sine adcocto, non hunc autem illud, sed tumorem simpliciter significabat. Proinde dicit, hæc leucophlegmatia laboravit, mox describens affectionem per symptomata, addit tibiæ *dilatantur*, id est, tumoribus albis, & *quæstus*, id est, mollibus, seu laxis, & folliculorum similibus turgebat. Sed quo pacto fieri poterant, ut esset etià duris (dicit. n. etiam *exaltum*) si erant *quæstus*: oportebat verò mollia esse, si œdemata: Certe quod Hippocrates insinuat his verbis, est quod in leucophlegmaticis sæpe videmus: in quibus carnes adeo intumescunt, ut distendantur cutis, ac proinde durefcere videntur. Tamen si quis comprimat foveat sit, quasi sub distenta eute non durum quidpiam, sed molle aut inane sit, ut in inflatis folliculis. Hæc omnia significans dicit, duris, albis, & *quæstus*. Erant, inquit, hæc etiam in pedibus, sed minùs: erant autem & in iis quæ sunt infra femora, ad genus scilicet. Exagerans obiter mali huius periculum, dicit, Plurimis autem est hoc *quæstus*, id est, difficilis exitus. Hoc est, habet autem in plurimis hic morbus difficilem exitum. Nam ut lib. 2. de morbis dicitur, morbus hic maximè à nullo discedit, Verùm quæ hic addit, parùm videntur congruere cum iis quæ illi scripta sunt. Dicitur enim ibi, tumet totum corpus tumore albo, & venter crassus ad contactum. Hic verò & lumbi, & *quæstus*, id est, tensus

F *E* quod Hippocrates insinuat his verbis, est quod in leucophlegmaticis sæpe videmus: in quibus carnes adeo intumescunt, ut distendantur cutis, ac proinde durefcere videntur. Tamen si quis comprimat foveat sit, quasi sub distenta eute non durum quidpiam, sed molle aut inane sit, ut in inflatis folliculis. Hæc omnia significans dicit, duris, albis, & *quæstus*. Erant, inquit, hæc etiam in pedibus, sed minùs: erant autem & in iis quæ sunt infra femora, ad genus scilicet. Exagerans obiter mali huius periculum, dicit, Plurimis autem est hoc *quæstus*, id est, difficilis exitus. Hoc est, habet autem in plurimis hic morbus difficilem exitum. Nam ut lib. 2. de morbis dicitur, morbus hic maximè à nullo discedit, Verùm quæ hic addit, parùm videntur congruere cum iis quæ illi scripta sunt. Dicitur enim ibi, tumet totum corpus tumore albo, & venter crassus ad contactum. Hic verò & lumbi, & *quæstus*, id est, tensus

IN hippolochi villa puer erat, cui aliquid cōtinebatur in utroque hypocondrio, quod durum erat, & in inferiori parte habebat fulgorem aliquem, similem ei qui in muliere fabri ferrarii hydropica aderat, istud tenuia alui excrementa prodeuntia aliqua ex parte emolliuerūt. Erat autem & hoc ipsum in dextro quodammodo planum, & supra ea qua circumferentiam habebant, eleuatum. Huic umbilicus ab ortu denigratus fuit, & vlcus profundum factum est, neque umbilicus cicatricem ferē contraxit, & pudendum extrema parte denudatum erat, cum tale statim non extitisset, neque congenitum esset, & postea magis feret. Hic pleraque vomebat, febris aderat, & cibi fastidium, sanatus est. Circa septimiam autem diem à decubitu (antea enim laborabat multam aquam bibens & fortasse sibi negligentius prospiciens) iactabatur & aliquantulum conuellebatur; desinente autem conuulsione latenter mortuus est. Antea autem mixxit conseritum, & status prodierunt cum crepitu, nec superiores partes ullo modo sunt emollite. Verum statim ubi defecit, & illa valde sunt emollite & reliqua rubefacta sunt, veluti totum corpus verberibus casum fuisset, præter eam partem in qua maxime tumor erat, & calidus per multum tempus erat.

Hic puer à suæ generationis p̄ticipio erat melancholicus, quod nigrities umbilici apertè declarabat. Tales enim apparent in partibus colores, quales sūt succi quibus nuttiuntur. Ea vero nigrities non successit postea, sed ab ipsa generatione facta est, & hac ipsa causa merito potius in umbilico, quam alia vlla parte contracta est. Nam eū capitur per vmbilicum primordiale alimenrum, & illud ipsum esset melancholicum, ipsam viam qua recipiebatur, & circa eam consistentes particulas primum maximeque tingebat. Fortasse etiam non est inde recens nato satis expressum ab obfiterice. Sed & morbus quem contraxit, hanc esse illius naturam indicauit. Nam vitiose nature in morbos similes sunt admodum prone. Constat vero hunc morbum grauiissimum natum esse ex multa melancholia collecta in hypocondriis. Induruerunt enim ambo, & intumuerunt; fastique sunt in eis scirrhosi tumores, quos à crassis succis fieri necesse est: eos verò in principio melancholicos fuisse potius quam pituitosos, indicauerunt vlcera ægrè sanabilia circa vmbilicum orta, & effusio illa fugioris sanguinis quæ mortuo est facta, qua totum corpus velut vibicibus est rubefactum. Sed quo pacto factus est etiam hydropicus? Factum enim etiam fuisse talem, indicabat ille fulgor qui in distenta ventris cute apparebat, & illa nuditas extreme partis pudendi. Illa n. ambo hydropicus fieri videmus, vtrunque quidem distenta cute à subiecta pituita & aqua. Nam mem-

A hanc omnes distentæ comparant secundum superficiem læuitatem (deponunt, n. rugas) læuitas verò facit plurimum ad fulgendum, quia ex superficie vna melius totus fulgor repercutitur, & nullæ neque sensiles neque insensiles vmbre sunt. Hanc ergo ob causā tenuio cutis fulgorem illum facit in hydropicis: nuditatem verò pudendi, quia distenta cutis vtrius contrahit cutem, qua ea pars tegitur. Cū ergo hydropis materia sit ferū, aut piruita, aut flarus, pituitosum potius quam melancholicum malū fuisse videtur. Certè redundantia crassioris ac nigrioris sanguinis, occupans hypocondria ac præcipue hepar, obruit calorem naturalem & debilitauit. Eo debilitato hydrops successit. Ita cum laboraret & febricula quadam, vt hydropici solent, sed nondum decumbens, neque sane bono vtens victu, sed (quod ita affecto erat aduerfissimum) multam aquam bibens, & alia etiā aduerfa faciens, exusta ac proinde acriori attrahibile facta, cepit acutè ac malignè febricitare, à quo septima die, præter spectatum opinionem, mortuus est, eadem prorius post mortem habens, quæ qui moriuntur ex veneno. Nimirum attrahibilis ad eò nonnunquam exandescit, vt sit quasi venenum intra corpore genitum. Sed enarremus singula verba, atque si quid historici omissemus, adiciamus. In Hippolochi villa puer erat cui aliquid cōtinebatur in hypocondriis (umor scilicet) quod durum erat, vt alius fortasse ea tempestate contigit, & in parte inferiori (versus medium scilicet ventrem) habebat fulgorem aliquem, similem ei qui in muliere fabri ferrarii hydropica aderat, obiter dicit quid hydropicæ illi euenerit. Istud tenuia alui excrementa prodeuntia, & hoc æquos deiectiones aliqua ex parte emolliuerunt, partem scilicet quæ venter tumebat. Nimirum vt aphoristica, particula sextæ dicitur: Ab hydropice detento ubi aqua & venis in ventrem confluit, solatio fit. Rediit ad puerum dicens, erat autem & hoc ipsum, hoc est, tumor durus, et si ad ambo hypocondria pertineret, ramen erat in dextro quodammodo planum, & eleuatum supra ea quæ circumferentiam habebant, id est, supra alias partes quæ circumcirca tumorem eum erant. Multò itaque maiorem tumorem contraxit hepar, & magis affectum est quam lien. Constat vero quod nunc didimus planum, pro læui accipiendum esse, læuitatem enim habuisse fulgor declarauit, tumores verò hepatis rotundi apparere solent, non plani. Itaque nunc dicimus planum vt contrarium aspero, non vt rotundo. Atque hoc idem significat verbum quo vsus est Hippocrates (μαλακ., id est æquale. Nam quod asperum est inæquale est secundum extremitatis partes. Huic & γογγε erat vmbilicus niger, hoc est, ab ipsa generatione, & vlcus profundum fiebat, quasi diceret, & ob hanc causam, quia scilicet ea pars præuotebatur succo, vlcus profundum fiebat in vmbilico, & non facile contrahabat cicatricem.

G Nimirum à corrodentibus succis, qualis maxime est atra bilis, exarsa carne sunt vlcera caua, & ob eandem causam dyspeptologica, id est, ægrè ad cicatricem venientia. Videntur verò hæc verba duo posse significare, aut hoc tempore quo tumore illo ventris laborabat puer, vlcus vmbilici esse ei obortum profundum & contumax, aut non eo tempore solum, sed solum eum aliquoties habere id vlcus. Nam illud verbum

in tempus indefinitum significat. Vtrumque autem rationi erat consonum. Nam duplex est rebellis vicerum genus, alterum quod sæpe cicatrice obductum sæpe redit: alterum quod vix cicatrice obducitur. Quod ergo sæpe rediret, & egre semper sanesceret, faciebat cacochymia eius partis, præsentem autem hoc malo accedebat etiam alia difficilis sanationis causa. quod vt apbor. 8. sectionis sextæ dicitur, hydropicis exorta in corpore vlcera non facile sanantur. Pendendum extrema parte, denudatum est, cum tale statim non existisset. (explicans quid dicat statim addit) neque congenitum, hoc est, non ex ipso statim ortu factum tale, vt umbilicus niger, sed ex hoc morbo, & adhuc magis fiebat, idest, & in dies crescebat hoc accidens. Hic vomebat pleniusque ob debilitatem, arbitror, ventriculi: & febris eum tenebat (febricula scilicet, qualis in hydropicis fieri solet quum putret iam aqua) & fastidium ob viscosos succos in ventriculo imbibitos: post hæc occurrit *ἐπέκρη* idest sanatus est. Sed non video quomodo sanari potuerit, qui septima die à decubitu est mortuus, vt mox dicit. Proinde suspitor, non *ἐπέκρη* sed *ἐπέκρη* antequam, idest, sanus legendum esse. Sanus autem videtur dici, non quod nullo morbo omnino teneretur, cum vomitu, febricula, & fastidio laboraret, sed quod non ita vt cogeretur decumbere. Quasi diceret multo tempore antea vomebat crebro, & laborabat febre, & fastidio, nondum tamen decumbens, deinde corpi acutè ægrotate, & coactus est decumbere, & circa septimam à decubitu iactabatur huc & illic in lecto præ anxietate, & conuulsiebantur. Eueniebant verò ambo hæc, patientibus corde & cerebro à maligna atque bilis qualitate. Cordis enim anxietas, cerebri conuulsio est. Reddens interim causam ob quam dicit à decubitu, & aperiens occasiones tam graniter ægrotandi quæ antecesserunt, dicit, antea enim ægrotabat (antea scilicet quam decumberet) neque sane bono viens cibo, sed (quod hydrope iam tensus erat aduersissimum) multam aquam bibens, & fortasse sibi negligentius prospiciebat, idest, & fortasse aliter etiam peccabat patui pendens morbum. Euenit itaque hinc tam grani malo corripit, vt septima die à decubitu moreretur. Sed quomodo, audiamus. Desinente conuulsione latenter mortuus est, hoc est, cessauit conuulsio, & cum hac causa melius habere fortasse videretur, inopinato mortuus est. Nimirum sæpe in proximis iam morti, pereunte partium sensu, & cessante facultatum actione miscere videntur symptomata, & hoc ipsum est mori. Antè hoc autem, hoc est, antequam moreretur, minxit conseritum, & flans prodierunt cum crepitu, tamen superne partes (hoc est hypochondria) nullo modo emollitæ sunt: quia arbitror, nihil crassioris fucci quo hypochondria rubeant, & qui hydropis ciendæ causa fuerat, euacuabatur, sed aqua & flatu. Hæc vero manente priori ac deteriori morbi causa leuare non poterant, poterant verò debilitate spirituum effusione, atque ita mortem properare, velut profecto in omnibus hydropicis euenit, quibus aut alia maligna affectio in corpore est, aut iam est partium temperies radicitus

Anterior, vt euacuatio aquæ suæ sponte sine arte facta, primum quidem videbantur ianari, deinde vero multo debiliores redditi citius moriantur. Statim verò (inquit) ac ille defecit, & illæ partes (hypochondria inquam) sunt valde emollitæ, & reliquæ rubræ factæ sunt, dissolutes scilicet iam sanguine illo exsist, vt per inanimas canales. Et totum corpus maculatum est, veluti verberibus cæsum fuisset, præter eam partem in quam maxime tumor erat, quia scilicet inde effluebat. Neque sane mox refrigeratus, vt solent cadavera, sed multum tempus post mortem erat calidus. Hoc putredinalis caloris est (non enim naturalis) ubi maligna putrefacta suppurum suberat. Atque viscidibus per totum corpus à morte maculatis, & atrociter mori, cum anxietate (inquam) & iactatione, & conuulsionibus, mortem veneno illatam significabat, vt Galenus ultimo de locis affectis dicit. Verum ibidem etiam dicit, sæpe in tantam malitiam veniunt succos, vt sint quasi venena in nobis sponte genita.

Illæ autem qui Abdera degebat, per inferiorem affluxit.

DIn tam concisa oratione non possumus plandè dicere quod contineatur. Fortasse autem & hic erat hydropicus, meliusque cum eo factum est, quam cum proximo ægrotato, quod aqua infernè per sedem ex aluo efflueret, hunc enim esse solere bonum hydropis exitum, ab Hippocrate ipso dicitur in aphorismo 14. sextæ sectionis.

E*Vidam autem in anteriori parte intumescere sine febre, tumor autem ad contactum similis erat suppurato.*

FHic quoque fiebat hydropicus: nam in anteriori ventris parte tumorem contrahens peritumescens & serosum, ac proinde fiebat sine febre, quia scilicet ex frigidis nondum putrefactis, & ob hanc eandem causam tumor erat molli, & tangenti videbatur aliquid sub digitis exundare, vt in suppuratis.

Anhelosa famula, tunc cum vasa sanguinem funderent, in mensuris autem fiebat, anhelationes illa cessabant. Febris exorta est. Mamma sinistra pars superior suppurata est, & a principio etiam auris.

Anhelosa famula, tunc cum vasa sanguinem funderent (fiebat autem id per menses vocatas)

evacuaciones, anhelationes illæ cessabant. Addit
 Num ergo tunc etiam exorta est, quum vasa sanguinem fundebant? At non videtur consentaneum ea euacuatio fieri febrem, quæ anhelationes cessabant. Proinde cœso deesse huic dictioni verba hæc, cum autem non fundetent, vt tota dictio sit hæc Anhelosæ famulæ, cum vasa sanguinem fundebant, anhelationes cessabant, cum autem non fundebant, febris fiebat. Mamma sinistra superne suppurata est, & à principio etiam auris. Cum scilicet aliquando non fluere, facta est febris vt solebat, & mamma sinistra superne est suppurata, à principio autem, id est, prius, ante etiam quam mamma inflammationem coarctaret, ex aure etiam erumpebat pus: quod anhelationes mensuris fluentibus soluerentur, causa est communio illa vocalium cum genitalibus, quam libro secundo tam insignem esse dixi: quod cessantibus, mamma vsque ad suppuratorem inflammaretur, communio mammarum cum vterio per venas secundum rectos abdominis musculos productas. Auris suppuratio excrementosum significat cerebrum, quibus vero tale est, facile repletur, cessantibus aliis euacuacionibus & eius repletio facile finitur in anhelatione. Facile enim decumbant spiritus excrementa in pulmonem. Non ergo ratione caret (quod ego etiam ipse obseruavi) quibus pus ex aure fuit, anhelosæ fieri. Siue cerebro primario laborante, & sua excrementa refundente in pulmonem, siue eo etiam aliunde recipiente.

Olympiodori famula sanguis fluxit ex dextra nare. Et iudicata est ad vigesimam, qualia etiam febri citantibus contingunt, & deiectiones quales etiam astate populariter factæ sunt, & qualia Hipponacti contigerunt.

Speciem iudicationis, & quæ ad eam spectant narrat Hippocrates potius quam morbi ipsius speciem, aut figuram. Iudicatum esse dicit fluxu sanguinis ex dextra nare circa vigesimam diem. Quod dicit *ad vigesimam*, id est, quasi ad vigesimam, seu ad vigesimam, ac non potius simpliciter *etiam* vt solet, dubitantis arbitror est, ac non tenentis exactè, an ipsa vigesima. Itaque fluxit ei sanguis: aut ipsa vigesima, aut ad vigesimam. Addit *etiam* & *etiam* in *superiori* tam, id est, qualia in febricitantibus acutè fieri consueverunt, ac fortasse etiam ea tempestate fiebant. Nimirum biliosæ febres quales plerumque sunt, quæ acutè ob hepatis intemperiem fieri solent. Cum hepate vero magnam rectitudinem habet dextra naris, & io acutis febribus sanguinis oaribus fluxus accommodatissima euacuatio est. Iam verò dies vigesima iotta fides acutorum, cum non exactè, est decretoria. Deiectiones etiam dicit fuisse, quales astate populariter factæ sunt. Biliosæ arbitror, tales enim fuerunt, si astate conditionem secuta sunt. Adiunxit verò, memorie gratiâ, alium cui hæc similiter euenior, dicens, & qualia Hipponacti contigerunt.

A

Et Hyle famula Aristida, octaua die in medicamentorum purgatione, deorsum signa exhibuit, qualia facile ferentibus contingunt. Vt si præter rationem non debilitent, neque spumosa, neque subcruenta excernantur, sed onis similia, velut Heraclide uxori contigerunt, quæ multum purgata est & facile tulit.

B

C

D

E

F

G

Hyle famula Aristidi purgata est die octaua, quæ dies in multis est ad purgationem idonea, quibus scilicet septima est iudicatoria. Semper enim Hippocrates elabi sinebat diem decretorium, atque si is non iudicabat morbos, moripse purgabat. Nam & libello de medicamentis expurgantibus ita scriptum ab eo est. Quicumque à febribus fortibus corripitur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris: si minus, saltem non intra quatuordecim dies. Hæc illo loco. Coostat verò quod in quibusdam morbis dies decretorius est decimus quartus, in aliis verò septimus. Proinde vt in illis non ante decimum quintum, ita in his non expurgant Hippocrates ante octauum. Atque suspicor sanè attentè admodum, & vt hoc insinuat, narrasse octauo die expurgationem esse factam. Tam longè absunt ab Hippocratis sententia medicis vulgares, qui omnes fere ægros die sexta expurgant, rimantes vt ipsi dicunt, ne non possint impurgari diei septimi violentiam sustinere. Euenit tamen aliter, aut vt motu pharmaci debilitari, naturalem diei morum ooo possior sustinere, aut vt iudicatio imminens impediatur. Bene cessit huius purgatio, quia euacuata fuor qualia oportebat & cum bona tolerantia: hæc autem cum adsunt non potest non accedere conferentia, vt in aphorismo dicitur. Sed quibus verbis hæc dicit, est operæ precium considerare. Deorsum (inquit) signa exhibuit, qualia facile ferentibus contingunt, hoc est, deiectiones tales erant, & talia signa præ se ferebant, qualia solent ex, quas ægri facile ferunt. Desinens tales euacuaciones addit, vt si præter rationem non debilitent, id est debilitent quidem, sed non præter rationem, hoc est, non magis quam pro euacuacionis multitudine. Nimirum bonæ tolerantie euacuaciones esse dicuntur, quæ non debilitant, non tamen ita est intelligendum, quasi nihil debilitent (Oculi enim sunt edii quam maxime naturales quæ non debilitent aliquid, sed quasi non præter rationem, id est, non plusquam pro euacuacionis multitudine. Esse talia qualia euacuari oportuit significat describens deiectionum speciem. Neque (inquit) spumosa, neque subcruenta excernuntur, sed onis similia. Nimirum euacuantur qualia oportet, cum euacuatur ipsi fucci qui morbos faciunt, huiusmodi sunt in biliosis febribus deiectiones biliosæ. Est vero vna quidem bilis species, quæ refert virescos ouorum. Quæ autem spumosa aut cruenta fuor, colligationem aut exulcerationem aut affectionem huiusmodi significant. Erant itaque qualia oportebat euacuari, velut (inquit) Heraclide (subaudi uxori) contigerunt, quæ

purgata est multum, & ferebat facile. mirum non tantum momenti est, quomodo exornat quis, quanti est, an facile ferat. Quia deiectiones non multitudine sunt existimanda [sed neque magnitudine] sed si talia coeuerunt, qualia euacuari oportet, & iter facile toleret.

Qua in Balagora villa depurgata est cepit febricitare ex splene (qui autem dextrum habent hypocondrium, non quidem sublimi sed distantum, hi etiam aliquando magis rubicundi sunt) hac cum perurba existeret, aluum habuit ab initio perturbatam, expellabatur in oculum abscessus. Hinc septima die falsa, & mordax lachryma ex oculis prodit, & secundum nasum, & secundum fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore, non indicabatur ante rigorem, valde ex virore palluit, & faciei circumscriptio accidit & contractio. Auris secundum rectitudinem splenis & lateris dolebat.

Non satis potes intelligere, an hac mulier quia purgata est cepit febricitare ex splene, atque ut causam procatartidicam egrotandi narrans dixerit, quae depurgata est cepit febricitare, an verò quod hac quidem per hunc morbum purgata sit, dixerit illud memorie gratia, insinuans. I. quam mulierem dicat, aut etiam forsasse declarans quid ipse circa egrotant egerit, dicat, quia in Balagora villa depurgata est. Nihil enim horum rationi dissonum est. Nam saepe expurgationes quae extremis commouent, nec satis euacuant, tumores in hypocondriis pariunt. Iam verò hanc, morbo per quem tanta mali succi redundancia erat, quantum tam multi dolores, tam multae tentatae euacuationes, color ex viridi pallidus, & rigor, & falsa ac mordax excretio significabant, laborantem procul dubio purgatione indiguille per ventrem, cum praecipue laboranti spleni ea euacuatio sit accommodatissima. Vitumque ergo hoc habuerit, explicemus quo mulier morbo sine purgatione laesa, siue aliter egrotare incipiens laborauerit. Febricitare cepit ex splene. Non solum dicit febricitare cepisse cum splenis aliquo affectu, quasi duplici affectu forte laborauerit, sed ex splene, significans causam fuisse splenis affectionem. Constat ergo fuisse phlegmonosum affectum. Quod etiam reliqua quae habuit significauerunt. Nam fuit perurba secundum faciem, & superueniunt multa lachryma ex oculis falsa & mordax, & secundum nasum & secundum fauces finis eiusmodi, & dolor auris sinistrae, quae omnia calidiorum succorum redundancia secundum rectitudinem leiois quasi inde regurgitantium indicant. Quod vt interpretaretur, scripsit in fine historiae, aoris secundum rectitudinem splenis & lateris dolebat. Fuit etiam multitudinis signum non minus quam ante dicta omnis, habere aluum in principis perturbatam. Euacuationes enim omnes mox apparentes, debilitatis, aut multitudinis, aut malignae qualitatis signa sunt. Sed cur expectabat abscessum in oculum. Certe quia horum plurima

ad oculos solent abscessus facere. Nam lib. 6. sect. 2. ita occurrit scriptum: E directo & laterum & hypocondrii distentiones, & splenis eleuationes, & sanguinis ex naribus eruptiones contingere solent, & aures afficiuntur è directo & horum plurima etiam in oculis apparent. Non est omino deceptus expectatione. Nam etsi fortasse opthalmium sinistri oculi expectabat, contigit tamen iam quidam in oculos decubitos. Nam septima die falsa ex oculis & mordax lachryma prodit. Decima quinta die colore ex viridi pallido respersa est, qui color lienosis est congruus. Falsa est etiam *hypocritae* *metuans*, & *clivus* *trunc*, quibus omnibus significatur quadam repentina extenuatio, quae iis qui linquantur animo, aut moribundis solet fieri ob defectum innati calidi, aut etiam quibus rigor immior ob eundem innati calidi fugam, vt certe esset huic, cui mox accidit rigor & cum rigore sudor. Quae indicatio quamquam solet febres acutas tollere, hanc tamen non indicabat, hoc est, non tollebat febrem. Constat verò hoc fuisse signum difficilius indicationis. Nam ita scriptum est aphor. 36. sect. 4. febricitanti sudor oborietur, febre non remittente malus, moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. Sed & ob diei decimae quintae naturam qua id contigit, erat hoc dyscriticum. Nam aphor. 36. eiusdem sectionis, ita habetur, Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & undecima, & decima quarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos indicant, qui verò non sic sunt, dolorem significant, & longitudinem morbi, & recidivas. Constat ergo coexistentem esse, productum esse multo plus morbum, neque solum postea sine recidivis & abscessibus, nisi postea quam Hippocrates illam debili mortua sit. Si enim ex hac die decima quinta debilis super esset facultas, mors erat expectanda, sin autem robusta, difficile iudicium post morbi longitudinem.

Pueri alui turbabantur & tussis sicca aderant, ad humerum aliquando suppuratio facta est in tussibus; posterioribus.

Familiares morbos esse poeris turbationes alui & tussis constat ex his, quae de morbis starum sectione tertia aphorismorum scripta ab Hipp. sunt. Sicque verò rursus dicuntur, cum oihili excreatur, quod ob maximam causae cruditatem, aut tenuitatem evenit, aut quod ex sola intemperie pendant. In his circa materiam fieri non est consensus. Nam alui turbatae & abscessus qui eas terminabant fucorum abundantiam declarant. Neque verò extreme tenuis materia fuit, quia talis non est nata in pus mutari. Superest ergo fuisse morbum valde eruditum, talis vero solent fieri longi, & difficili indicationis. Merito ergo cum abscessus solutus fuit multa tussis, & is quidem fuit, non ad testes, vt solere fieri sectione prima libri secundi dixit, aut ad partem aliam humilem, sed ad humerum. Dicitur enim ibidem ab Hippocrate. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sapit, non similiter perfectè liberant. Addit vero, in posterioribus, quod Ianus Cotarnus de diebus intelligi vult, vertit enim posteriori-

bus diebus. Mihi vero videtur referendum ad ruf-
fes, vt sensus sit in tussibus posterioribus, id est,
quæ in vicinis iam ægrotis, ac in fine tempestatis
acciderunt. Cùm enim dixisset aliquando suppara-
tio fiebat, significat non in omnibus, sed in qui-
busdam tussibus fieri; explicans deinde in quibus,
addit in posterioribus, hoc est, in fine tempestatis
illius magis quàm antea. Non caret autem hoc ra-
tiooe, nam circa fines tempestatum solent moueri
fucci crassiores, tenuibus antea consumptis, & in-
salubres temporum causæ solent debilitari; atque
ob hoc euadunt: ob illud non sine abscessibus: qui
etiam morbi exitus cum puerili ætate quadrabat.
Tali enim familiares sunt abscessus in suppura-
tione abeuntes, ob succorû crassitiem & fortem fa-
cultatem. Merito ergo & hi morbi, & hi abscessus
facti sunt pueris magis quàm adultis, & postero-
ribus ægrotis, quàm prioribus.

*Ælli collum & caput doluerunt, septima
manus obtorpuit, nona crux fuit stupidum,
tussis cessauit.*

Fere est hæc historia enarrata libri secundi sectio-
ne prima, vbi Hippocrates dixit, abscessus sunt aut
per venas, aut per ossa, aut per tonos. Sed quæ il-
lic obiter attingimus, nunc apertius explicemus. Ful-
lo hic caput & collum habuit malè affectum & do-
lens: vnde destillante succo verisimile est tussim
excitari. Nam & cum abscedente de capite &
collo humore, in alterum ceruicis latus, quæ ex spi-
nali medulla procedunt nervi mouentes manum
(scilicet verò id sit à quarta vertebra cœuicis vsque ad
primam dorsii) resoluta manus est (nam stupor est
iniuriæ resolutionis) & postmodum, reliquis eiusdem
materiei deorsum repentinis in postremas lum-
borum vertebrae (secundum idem arbitror latus,
ita enim sit) crux resoluta est. Facto abscessu per
nervos, & secundum spinalem medullam, (vt illic
dicebatur) tussis cessauit.

*Quæ malam habuit distractam quinto gra-
uiditatis mense, distractam habuit ad si-
nistram partem.*

Nihil aliud hic dicitur, quàm mulieri euidem v-
tero gerenti, mense quinto prægnationis, distractam
fuisse malam ad sinistram partem. Sanè etsi ad sini-
stram partem distracta esset, nondum inde constare
poterat, essetne pars sinistra affecta, an dextra.
Si enim conuulsione tortura fiebat, sinistra; sin au-
tem resolutione, dextra pars erat affecta. Id verò ex
aliis signis, præcipuè autè ex prægressis, fluxione &
dolore licebat agnoscere. Euenire id gerenti vtero
admodum fuit rationi consonum. Quia quæ vtero
gerunt multa excrementa congerunt ob defectum
menstruæ euacuationis. Qui enim sanguis for-
tem nutrit est bonus, ac pro eo destinatur intra corpus
malos, alioqui singulis mensibus effluxurus, ac
proinde quanto in prægnatione plus est progres-
sum, tanto cacoehymia est maior, quia tanto plu-
res defecit euacuatio consuetæ. Merito ergo etiam

A mense iam quinto hoc euenit potius quàm priori-
bus. Neque mirum oon persequi tasse mulierem diu-
tius sine morbo, vt posterioribus mensibus pri-
mus fieret. Nam quæret iam defecisse illam adeo
necessariam euacuationem, admodum graue mali
est, & vt Hippocra: 1. de morbis muliebribus dicit.
Quibus menstrua defecerunt vsque ad quartum
mensem curari possunt, quinto vero iam difficilli-
mè curantur, & sexto sunt incurabiles.

B *IN Cranone Lycino Grammatico febre bi-
liosa correpto ex splene, capitis grauitas ac-
cidit, stridebat secundum lientem, in vtrisque
labiis vlcuscula interius rotunda & parua
aderant. Deinde etiam exiguum aliquod san-
guinis fluxit ex nare quæ erat è directo.*

Fortasse febrem biliosam vocat, vt solet puti-
dam, non exatè indicans succi speciem, fortasse

C etiam erat ex bile. Vt quæ hoc habear (nihil enim
prohibet bile putrescente intra venas febrem ex-
citari, quamuis lien melancholiam congestisset
consentaneum fuit, vt ei cui capitis grauitas
aderat splenis vitio, per febrem fluxus san-
guinis ex nare sinistra succederet. Nam cùm lien
abundaret sanguine melancholico, febris superne-
nientis calor hunc in caput extulit: is itaque elatus
capitis gravitatem fecit, elatus vero iam in caput ex
liene, quæ melius quàm per sinistram narè em-
peret Laborabant itaque iam lien & caput mul-
titudine mali succi. Affectionem lienis præter alia
significabat rugitus secundum lientem, nam quia id
viciis statuofum est valde, mox eo loco sita intelli-
na strident capitis verò, vlcuscula in vtrisque
labiis interius orta. Nam quia caput excipie-
bat à liene multum & malum succum, multum
faciebat grauantem dolorem, malignitas vlcera

D Nam quæ esse indicabat forma eor-
um, quæ cum magna non essent, erant tamen to-
runda & profunda. Quæ duo in vlc. eribus ma-
ximè viruperantur. Porro labia sæpe ob hypoco-
ndriorum affectus patiuntur, quia ascendenti sur-
sum eorum excrementa, tanquam in via interci-
piunt.

E Nam quæ esse indicabat forma eor-
um, quæ cum magna non essent, erant tamen to-
runda & profunda. Quæ duo in vlc. eribus ma-
ximè viruperantur. Porro labia sæpe ob hypoco-
ndriorum affectus patiuntur, quia ascendenti sur-
sum eorum excrementa, tanquam in via interci-
piunt.

F *Amula quam nuper emptam vidi, durities
magna erat in dextra parte, non valde
dolore afficiens, & venter magnus erat & cir-
cumcensus, a qua repleto non similis, cæterum
crassa erat, nec admodum difficulter spirans,
sed decolor. Muliebria à septem annis non
prodierant, intestinorû difficultate premeba-
tur, verû sine tencismo. Tunc quod in dextris
erat dolorem inferebat, & febres lente detine-
bant, sed non vltra septem dies, & alius tur-
bata est, electio similia, subuiscosa & multa
deticiens. Diebus aliquot sanata est, Et postea
muliebria fluxerunt, & venter mollis factus
est, & corpus bonum colorem & crassitiem
adipiscatur.*

Aetatis sanis prouectae erat serua haec. Nam quoniam dicit septem annis muliebris non prodixisse, constat prodixisse antea aliquoties, ac deinde septem annis defuisse. Defuerant ergo huic septem iam annis, cum erumpit esset nouissimè. Dysenteria primum & febrisque correpta est, cui successit mox diarrhoea pituitosa, per quam ita sanata est, vt ei rursus menses fluxerint, & bonus habitus corporis, bonusque color ei restitutus sit. Verum totus hic morbus qui superuenit, indicatio fuit diurnarum affectionum, quas ex menstruorum defectu contraxerat, vt sanè saepe euenit. Contraxerat enim haec scirrhum magnum in hepate (nam duriciem habebat in dextrâ parte magnam, non valdè dolorosam) & tumorem in ventre, & tensionem. Erat verò ei venter aquâ repleto non similis. Nimirum non sentiebatur subesse aqua vt in ascite, sed erat solidus, vt refertus crassis & pituitosis fucis, atque adeò & per totum corpus erat huiusmodi, velut leucoplegmatica. Nam & in aliis partibus erat crassa & decolor, albidâ scilicet. Neque verò præter rationem euenit, vt retentione sanguinis scirrhus affectus, & pituitosorum redundantia fieret. Haerent enim circa hypochondria crassae sanguinis partes, & suffocatur calor, & ita frigidae passionis oriuntur. Minor verò refrigeratio hepatis facit leucoplegmaticam potius quam ascitem, aut tympanitem. Itaque elanguit in hac, non tamen adeò vt non potuerit indicari. Ergo agitare incipientem naturam excrementa, quæ in ventre inculcata erant, primum commoueri ceperunt tenuia acria, si quæ erant, & tenuia etiam aliquid salsumque pituita. Quo factum est, vt dysenteria tentaretur alius, & tumor hepatis dolere ceperit, irritato à calidis viscere, & scirrhus phlegmonosus quid contrahente. Et *μεινὸν πυρετὸν*, hoc est, exiguae febris & submissae, quas ex succis subiecto frigidis, putrescentibus tamen, fieri solent. Verum non durauit hæc dysenteria multum, ac proinde non est factus, vt solet, ex ea tenesmus. Non enim durauit ultra septem dies, & successit mox diarrhoea. Alius enim turbata est, & factus est secessus copiosus electro similis, subuiscosus, multus, qui durauit in dies aliquot. Erat igitur secessus lentus, crassus, albus, particeps cuiusdam exigui palloris. Tale enim est electrum, seu succinum. Constat verò talem secessum esse ex pituita crassa, quæ colorem illum comparauerit, aut putrescentia, aut modicæ bilis admixtione. Nimirum etsi naturalis calor debilius esset mediocri, tamen aderat calor præter naturam, si qui quidem aderat putrescentia, & febris. Quoniam ergo copiosè euacuata sunt, qualia euacuaria oportuit, sanata est, & subtilis obstructionibus, ac per distractionem succi obruentis roboratio naturali calore, muliebris denuo fluxerunt, & venter mollis factus est, & corpus bonum colorem, & crassitiem adhibebatur. Nam hæc non fuerat extenuata per morbum, sed crassa, nutrebatque multa pituita. Pituita verò roborato calore facillè emendatur, abique in sanguinem, atque ita quæ crassa & decolorata sunt, possunt etsi crassa mancane, colorem & habitum in meliorem mutare. In graecis codicibus occurrit scriptum *χρῆμα ὑγρὸν*, id est, color boni coloris, constat verò legendum esse *χρῆμα ὑγιανόν*, id est, corpus boni coloris. Nam præterquam quod illa est dura locutio, addit Hippoc. *ἡμεῖς*

A id est, & crassum, constat verò crassum non posse dici de colore sed de corpore.

Minois uxor post sectionem compressa phacelum contraxit: humore in pulmonem insidente, breui significationem præbuit, diebus quibus superfuit, etiam aliud quid interius delituisse.

Per insinuationem dicit hanc Minois, seu uxorem, seu filiam, seu ancillam, mortuam esse breui, & causâ, ob quâ mortua est, aperit. Ea fuit, quod cum ei pars aliqua externa secaretur (quid prius perpessa secaretur, non dicit) & chirurgi plusquam oporteret partem secandam premerent, tractarent, & affligerent, conrigit vt ex sectione phacelum contraheret. Deinde verò insidente in pulmonem prauo succo, qui in corpore redundabat (non enim euenire solent hæc nisi cacochymis) tabuit, & mortua est breui, neque id admodum lauit. Nam post phacelum breui significationem præbuit malum, quotquot diebus superfuit (his verbis indicat superfuisse paucos dies) aliud aliquid interius delituisse, præter id scilicet malum, quod in externa parte conspiciendum se exhibebat. Hic admonentur imprimis chirurgi, ne partem quampiam vlceratam circa quam aliquid molitur, plusquam necesse sit premant, aut attrectent: sed quoad fieri possit, leuiter ac suspensa manu quiduis agant, nam mortificationis, quam *ἐμύρωσις* [quasi dicas syderationem] graeci vocant, periculum in nimia attrectatione esse, quotidie nos admonent carnes, quæ ad cibos parantur, quæ parte eas manu quis tenuerit, facilius citiusque quam alius putrescentes. Porro hic obseruare licet ab externarum partium non aliter ac internarum affectionibus homines mori, & ab externis ad internas transfundi, velut hic ad pulmonem. Iam verb ex pulmonis malis ardescere corpora, res est notissima, idque tanrò citius fore, quamrò deterior succus in eum incubuerit, est consentaneum: neque minus notum est tanto citius significationem sui morbum quemcumque præstiturum, quamrò citius sit percuraturus ad summum: crescens enim cum passione quacunque pathognomonica vocata symptomata. Quoniam ergo in hac malignus succus pulmonem obledit, breui fecit tabescere, & breui sui significationem malum præbuit.

Qua naribus induntur medicamenta, si febricitauerint, nec soluantur dolor, crassa per nasum effluunt, sin autem neque dolor, neque febris cesset, tenuia & fortasse feruida, quale quid tenue Hegeippo effluxit, cum per noctem aliquid indidisset, crassum autem erat ei qui in Corintho similis eunucho, & Celenus filius erat.

Redundantiæ excrementorum in cerebro nulla euacuatio propior, atque magis accommodata est, quam per nares. Cietur verò ea, cum spocit

non succedit latis. Cietur indicis in nares medicamentis aliquibus acerbis, aut solum aperientibus & extergentibus: vel forma liquida vel solida, quæ vocantur erythra. Non est autem ea molienda in principio: sed cum cuncti iam sunt sncci, velut in aliis omnibus morbis siue totius corporis, siue partis cuiuspiam, peadentibus ex succis concoctilibus. Ita & in grauedine capitis expectanda concoctio est materię proprię. Nam si ante hanc sternumenta moueas, aut acris medicamenta naribus haurias, enacuatione parum iuuabis, quia passio cruda non cedit, & irritatione capitis grauitatem augebis. Signum autem concoctionis in hoc, vt in aliis etiam, est crassities eids, quod educitur, crassities hęc quæ sine lentore. Porro in coryza, vt & in inflammatione, febres & dolores accidunt magis quam coquitur materia, quàm coctione iam perfecta. Quoniam autem non omnes coryza laborantes corripuntur febre: sed nonnulli sine ea transigunt, constat in eis qui febricitant, maiorem excrementorum crassitiem debere expectari. Febris enim siccat, cogit, & crassiora reddit, quia & coquit excrementa, cum horum concoctio non sit perfecta qualis alimenterum: sed imperfecta, & vitionis aut putrescentię cuiusdam particeps, qualis puris, aut eius, quod in vrinis febrilibus putridis laborantium subidet. Ergo dicit, quæ induntur in nares, id est, cum induntur aliqua medicamenta in nares (idem autem euenit si non induntur, sed sponte effluant excrementa, dicit verò hoc inuens obiter rationem purgandi per nares) si febricitauerint, si solutus sit dolor, crassa per nasum effluunt, quia febrem & dolorem antecessisse, & solum iam esse dolorem, significat antecessisse concoctionem, & perfectam iam esse, sin autem neque dolor neque febris (soluta scilicet sint, sed adhuc maneat) tenuis, & fortasse feruida effluunt, huiusmodi enim sunt quæ coquuntur, cocta autem non sunt: calore enim feruent, crassitiem verò nondam comparauerunt. Velut ergo ex inflammatione adhuc dolente multum, & ardente, nemo exprimet nisi tenue & feruidum, ita ne que in coryza ex naribus, cum adhuc febris & dolor virgeat. Quale quid inquit) tenue effluxit Hecippus cum ad noctem quid indidisset, quod scilicet nondum concoxisset morbum; crassum autem alteri, Celeuris seu filio, seu seruo, eunuchos simili, qui erat in Corintho. Hęc omnia dicit memorię gratia, propolusque duo exempla, alterum tenuis, alterum crassie emunctionis.

Maturi in morbis abscessus an indicent, signum exhibent, si cum feruidi sint, febrem non accendant, & cum difficilis sint tolerantia, facile ferantur, qualia Charioni in sede contigerunt.

Martos abscessus arbitror illum dicere eos qui suppurantur, quia suppuratio, vt 4. libro meteorum Aristoteles dixit, maturitas quædam est. Tales verò abscessus sunt febriculosi, id est, nari febres facere. Sunt præterea difficilis tolerantia, & dolorosi, quia quam pus conficitur, dolores & fe-

A bres sunt. Velut ergo in omni indicatione nullam præstantius signum est, quàm conferentia & tolerantia, ita & in omni abscessu. Conferentia verò est, ne affectiones morbosas augeat, aut si fieri potest, etiam tollat: tolerantia facilis, ne facultates plurquam pro ratione debilitentur, & ne symptomata admodum vexent. Ergo maturi abscessus an indicent, id est, turd ac perfecti à prioribus morbis libetent, ex hoc signo agnosces. Si cum alioqui feruidi sint (sunt verò tales omnes suppurationes non exigua) non faciant febres, & cum sint difficilis tolerantia non difficile ferantur. Vt quæ Charioni in sede, cui fortè suppuratio aliqua magna circa sedem facta est ex alio morbo, citra nouam febrem, & citra magnos dolores: sed facile, & agro leu-tiente leuati, & à febre, & ab omni alio morbo. Verum notandum hic est, etsi omni febre carete & labore, perfectè indicantis abscessus signum sit, non tamen cum qui perfectè indicaturus sit, abscessum necessario sine febre fieri. Nam nihil prohibet ob suppurationem ipsam in magno abscessu excitari febrem; & nihilominus priorem febrem per eum abscessum solui. Verum nunc quoque ea febris erit, aut diaria solum, qualis solet esse ex bubonibus, aut si putridæ aliquid habens, tamen simplex omnino, & breuis. Nullo verò melioris abscessus, & perfectius indicantis signi est nullam omnino afferre, quia perfectæ expurgationis internarum partium argumentum est, suppurationem non exiguam, nullam posse febrem excitare. nam quando corpora sunt putiora, tantò minus ab exterioris causis febricitant.

Lambio verò cum intestinum exulceratum esse videretur, medicamentis quæ in dysenteria solent, adhibitis, humerus & sedes exulcerata sunt in parte sinistra citra febrem.

F Aliud exemplum est hoc abscessum sine febre, cum essent febriculosi, ac proinde rectè iudicatum. Nimirum hinc ex dysenteria magna adeo vt intestinum exulceratum videretur, facta sunt duæ suppurationes, altera in humero, altera in sede: ambæ in sinistra parte, atque ad exulcerationes processerunt citra febrem, atque ita est liberatus. Nam ramentis id nunc non dicat, ex nuper dictis liceet intelligere, cum dixerit, Abscessus an indicent, signum exhibent, si cum feruidi sint, febrem non accendant. Sed quo pacto dicimus dysenteria teneri, ita vt videretur intestinum esse ei exulceratum, si dysenteria ipsa exulceratio intestinorum est? Certè dysenteria est corrosio intestinorum; quæ ad exulcerationem procedit, non est autem vt magnum aliquod ac insigne intestinorum vlcus. Si cui enim intestina laborant vlcusculis ac excoriationibus, dysenteria dicimus cum teneri; si verò vlcere aliquo magno, dicimus potius exulceratum esse ei intestinum, neque ab vilo symptomate nomen ei marbo damus: sed ab essentia, dicentes esse intestini vlcus. Proinde diximus hunc teneri tanta dysenteria, vt exulceratum intestinum esse videretur. Sed quia magis consentaneum est

maiores affectione ex minimis, quam contrā pro-
cessibus, arque adeo vlcus à dysenteria, non dysen-
teriam ab vlcere, constat quod dicit, Leambio cum
intestinum vlceratū esse videretur, medicamentis
quæ in dysenteria solent adhibitis, humerus & se-
des exulcerata sunt in sinistra parte citra febrem, ita
legendum esse, humerus & sedes exulcerata sunt
in sinistra citra febrem. Leambio, adhibitis quæ
in dysenteria solent medicamentis, cum vlceratū
intestinum esse videretur: intelligendumque quia
in dysenteria est curatus pharmacō, id est, expurga-
tus (nam *φαρμακω* Hippocrati significat expur-
gare) eo mali peruenisse, vt vlceratū esse intesti-
num videretur, ac postea superuenisse ei dictos ab-
cessus. Significat ergo obiter, quā sit temerarium
expurgante medicamento curare dysenteriam, cum
enim ad ipsa exulcerata cæpta intestina, excremen-
ta mordacia trahantur, apertum periculum est, ne
manifestè exulcerentur. Non tamen proinde nega-
uerim aliquando nulla ratione melius curari dysen-
teriam, verū quæ occasio ea sit breui dicam.

Aur in dysenterico est cum cacochymia magna
exulceratio nondum magna: aut cum exulceratio-
ne magna, cacochymia exigua: aut vtraque caco-
chymia dico & exulceratio exigua: aut vtraque ma-
gna. Si primum, expurgari debet: si secundum mi-
nimè, sed vinas, & fiodores, & vomitus prouo-
candum, & instandum localibus: interius & exte-
rius pro vlcere curando. Si tertium, ne tunc quid-
dem opus est putgatione: neque localibus admo-
dum: sed bono victu, & facili ad alias euacuatio-
nes deriuatione: si quartum, insanabilis est, facies
aut nihil aut omnia tentandi gratiā, velut in re des-
perata. Tales enim etiam curationes aliquando
proficiunt, neque mihi semper displicet illud Cel-
si. Sæpe quos ratio non lauat, temeritas adiuvat.
Sed est consideratio dignum, quā rectitudi-
nem habuerit cum intestinis humerus, vt dysen-
teriam finiret. Sedes enim habet rectitudinem ma-
nifestam. Verū scire oportet, partem, quā euacu-
atio spontè aut arte, aut etiam abscessus sit, re-
ctitudinem seruare posse, aut cum parte recipien-
te, aut cum ea quæ mittit, ac nihilominus vilem
esse rectitudinem cum mittente: sed viliorem
etiam, si fluxio nondum cessauerit. Sedes ergo ha-
buit rectitudinem cum ipsa affecta, & recipien-
te parte, putā cum intestinis: humerus vero for-
tasse cum mittente. Fuit enim sæpe dysenteria toto
corpore mittente acia aut falsa in intestina, non ra-
rò etiam ex capite catarrho salso desistente. Huic si
ex capite fluxisset, nulla pars potiore rectitudi-
nem cum mittente parte haberet quā humerus:
verum etiam si ex toto corpore: nam partes me-
diæ respiciunt totum.

A à febre & dolore liberatus erat sufficienter.
Hoc dico.

Hoc iam est tertium exemplum abscessus fe-
briculosi, & tolerati difficilis sine febre & sine
dolore, vt antea dicebatur. Nimirum ex morbo
partis inanis, hoc est, ilis, inflammata huic est fe-
des satis sine febre & dolore. Quod sanè, vel ob
partem ipsam erat mirabile, est enim ea acriter
sentiens. Tumebat, etatque cleuatus huic venter
statibus, præcipuè autem in inani parte, quam vo-
camus ile, secundum quam etiam habebat dolo-
rem quendam. Quoniam verò, dicit, *ὀνίλιν*, quod
vos vertimus, subdolebat, aut habebat dolorem
quendam: constat extenuatione esse eum vsum, in-
uenientem dolorem minorem fuisse timore, hoc est,
dolorem minorem fuisse, quā pro tumoris ma-
gnitudine. Quod quidem fit, cum flatus non tam
est qualitate, quā copia noxius. Est enim ma-
gna etiam in ipsis statibus qualitas differentia,
quæ ex differentia succorum, qui illis materiam
suggerunt, ortum habent. Nonnunquam enim
flatus est valde frigidus & crassus, qui sanè vehē-
mentem dolorem infert in intestinis, nonnun-
quam etiam acer & fumosus qui mordendo etiam
infert; aliquando etiam est simplex & æquis: seu
qualitatis expertus, distentione tantum dolorem
faciens. Fuisse autem huic talem, rationi est con-
sentaneum. Nam succus qui intestinis hæret, &
non erat admodum lenis, & virescens, siquidem
puri similis, candidus scilicet, & sine multo leni-
tore extensus est. Neque verò dicit excreuissē
pus, vt suppurationem aliquam internam fuisse
torgis suspicari: sed puri simile, quod minoris
cruditis succorum fuisse autuma. Sed & à iuan-
tibus & nocetibus constat, hanc fuisse eius pas-
sionem. Læsus est enim lactis meracioris potu, &
admotā fatina crassiori, in eraticula tosta, aut con-
fractio scilicet & tosto hordeo, aut rosis fursuri-
bus in sacculo admodis, & ipsa farina crassiori to-
sta in cibo accepta, iuuatus est ita scilicet vt fit in
dolore partis inanis ex flatu, & cludis succis. Di-
cit igitur huic cum lac multum & meracius bibis-
set, & insuper dormiisset, statim nausea & calor
contigit. Ex hoc loco constat crebriorem vsum la-
cis fuisse antiquis, quā nunc est, consueuisseque
eos vi in potu lacte, aut mero, aut mixto cum aqua,
aut etiam cum vino. Nam quasi diluto solerent
potare, dicit bibisse meracius. Quin etiam ipse-
mer lib. 1. Epidem. ad quādam vlcera iussit pro
potu dare lac & vinum pari aquæ mensura. Insinuat
ergo fortasse, quod non tam grauit læsus fuisse;
si cum aliqua parte vini bibisset lac, verū quia
merum bibi flatus creuerunt, & inde comuni-
cata ventriculo passione, vt fit in dolore ilis, nau-
sea accidit, & lac ipsum corruptionem recepit, vn-
de & febris orta est. Somnus quidem hæc mala
non fecit per se, sed potui multo lactis necessariò
superuenit, & ex somno cum nausea & febre ex-
citatus est homo, non valente somno præbe-
re eam præcipuè passionem tantum læs coquere, ac
proinde flatus gignente, & præstare initium al-
terationis, quæ per impotentiam facultatis decidit
in corruptionem. Deinde inquit (cum; arboris,
sentiret fetali viciā lædi, mutatū consilio] admo-

Quia à statibus distendebatur, ei pars in-
ani intumuit, & quodammodo doluit.
Huic cum multum lac & meracius bibisset
& insuper dormiisset, statim nausea & ca-
lor contigit, deinde cum admoisset, & pro-
cibus farinam crassiorem in craticula coctam
comedisset, substitit venter, & puri simile
quiddam egressit. Sede autem inflammata,

G

uenti Iustus Cornarius vertit in cœdendignem. Nam Græcè habetur *ἐνδύειν*, quæ vox significat, & accendendi, & admoventi. Cum verò significet vtrūque, videtur mihi hoc multò magis quadrare. Nam ignem accendere quis vlli ægroto vnumquam præcepit ad dolorem illis? Admosus verò frumentatibus seminibus, contractis & tostis, in faculis est virilissimum vti. Siccant enim & discentiunt flatus. Significat verò mihi hic quodcumque tale, aut etiam fursures tostos, nomen farinae crassioris admoventis. Sed addit, cum pro cibis farinam crassiorem in craticulâ coctam comedisset. Hoc est, quod far, seu vulgari nomine nunc sartum dicimus. Patetur enim contractis & tostis granis hordei. Hoc verò ficatione, & extensione iurare poterat. Et ita evenit. Substitit venter. Sterilis autem aut substituisse ventrem hic dici intelligo, non quod aliis locis (nullis enim fluxionis alui mentio facta est) sed substituisse, aut tumorem deposuisse. Egestis quiddam puri simile, ut dictum est, & sedes est indammata, non tamen ob id febrem habuit, aut dolorem, sed sine febre, & sine dolore erat sufficiens. Quoniam verò dicit sufficiens, videtur innuere non omnino sine febre & dolore fuisse (alioqui dixisset simpliciter, sine febre, & sine dolore erat) sed sufficeret, satis scilicet, ut febre & dolore carente diceretur, quod omnino habet exigua, & quæ medicus posset negligere. Et quia hoc quidem ratum est & notatu dignum, narrationi veluti subscribens, addidit, hoc dico.

Senex qui in lapideis vestibulis degebat, lumborum & vtriusque cruris dolore afficiebatur, qui vtriusque in femora descendebat, & quandoque in tibias, & quandoque in genua. Quo plurimum perseverante multa recursiones factæ fuerunt. Tumor erat in pedibus, lumbis, tibia, & parvi bubones. Venter durus & contentio totius miventris cum dolore. Plerumque reperta est vesica dura & articuli dolore affecti, & postea doluit iuxta aures, idem in multis (vel eadem collectio, adenem non tangens, os non suppurans, hoc sensim evanuit, & tunc statim febricitavit.

Senex qui habitabat in vestibulis lapideis (vico quodam ita fortè nuncupato) magna succorum crassorum redundantia laborabat secundum humiles corporis partes. Tales autem sunt renes, & quæ circa illos, aut sub illis sunt, ut vterus, vesica, & crassa intestina, in internis: femora, genua, & tibias, & pedes, in externis. Nullam ergo humilium partium videtur mihi hic senex habuisse crassius succis liberam. Nam dolores, tumores, & tensiones eas partes, aut singulas, aut alternis vicibus obsidebat. Omnium autem maximè videtur laborasse vesicam. Nam plerumque repertus est habere vesicam duram, & dolorosam. Sed & contentio interseminis pertinebat ad vesicam, quia eius cœteris illac procedit tortuosa. Dicit verò contentio interseminis (est ea pars, quæ inter podicem & testes) to-

Ata (id est totius interseminis) & dolorosa. Si cum febre acuta, duritie, & dolore ea regio laboraret, phlegmon vesicæ, & eius ceruicis esse putaretur, verum quia ea non dicitur fuisse, consentaneum est dolorem ex ipsa tensione natum (dolent enim non solum quæ inflammata, sed & quæ distenta valde sunt partes) tensionem verò ex ipsis succis in fibras imbibitis. Sed & renes laborasse constat ex lumborum dolore, præcipuè ad femora descendente, sed & ex affectione vesicæ quæ subsecuta est. **V**t enim à vesica in eam ceruicem, ita à renibus in eam descendisse est consentaneum. Sed & alie omnes, quæ dictæ sunt partes, laborabant. Nam aliquando dolebant genua, aliquando tibias. Aliquando verò dicit, non quòd aliquot diebus doluerit, ac deinde citra dolorem perseverantia: sed quòd alternatè septè dolor harum partium, & cessauerit, & redierit. Nam durante plurimum motibus, multæ horum dolorum recursiones factæ sunt. **T**umor etiam in pedibus, & tibia, & lumbis (tumor arbitror œdematosus, qualis in his locis ex pituita septè conspicitur) & bubones parvi, tumores scilicet in adenosus inguinum partibus, qui ex crassissima pituita duri & exigui, ut scutuli quidam fieri solent. Et venter durus, quia partibus omnibus ibi crassius succis repletis, necesse erat eam regionem esse distentam, ac proinde cum duritie quadam tactui occurrere, certè, ut vesicam dicit plerumque occurrisse. Verba reliqua, quæ fini dictionis huius adiecit, hæc scilicet, & articuli dolore affecti, & postea doluit iuxta aures, idem tumultus adenem non tangens, os non suppurans, hoc evanuit, & tunc statim febricitavit. Hæc inquam verba, post multa alia eorum, quæ sequuntur scripta occurrunt in omnibus codicibus: sed quia cum illis non aptè hærent, neque idoneum sensum reddunt, censui inde excipienda & transferenda huc, & ita restituendam lectionem, ut hæc seorsum scriberentur, quæ ad historiam singularem videntur pertinere, moxque proxima dictione, quæ hanc sequetur, quæ in commune dicuntur, de iis quibus cognoscimus quæ circa ægrotos sunt. Ita ergo restitutam orationem enarremus. Plerumque, inquit, reperta est vesica dura, & dolore affecti articuli, nam ut dictum est genua, & pedes, & femora, & lumbi dolebant. Et postea doluit iuxta aures, in ea scilicet parte, quæ est os pettosam. Dolorem hunc constat fuisse vehementem admodum, ex iis quæ addit. Nam inquit, tumultus idem (vocat *ἀστυπία* nos tumultum veritatis, passionem hanc, quòd graviter argeret, & tumultuati eoget) adenem non tangens, os non suppurans, id est, fuit dolor vehemens, tamen non fecit tumorem in adenibus, neque res venit ad ossis corruptionem, ut solet. Sed hoc evanuit, & tunc cepit febricitare, cum non febricitaret antea. Hoc non intelligit, nisi qui ex ipsis operibus cognoverit, solet maximos dolores circa ossa diu durantes, per quos præcipuè nullus tumor in carne ossi incumbens sentitur, in corruptionem membranæ quæ periostum vocatur primū, deinde & ipsius ossis, finiti, atque adeo hos dolores, & has corruptiones ossium, sepe fieri citra febrem, veluti in externam partem, & ignobilem putrescentiā incumbens, atque nonnunquam has externas affectiones cessare cum magno ægrotantium malo, veluti eadem.

eadem putrescentiâ in interna reconditâ. Vbi vertimus utrumque descendebat ad femora, reperimus in græco codice *ἄνω*, id est, alterum. Sed si alterum tantum descendebat, quo pacto alterum descendebat in femora? Ac non potius in femorâ? Præterea, si alterum tantum in femur, quo pacto dolebantambo crura? nam femur suprema & prima pars cruris est: crus ergo, cui in femur non descendebat, non dolebat. Proinde constat legendum fuisse *ἐν αὐτοῖς*, id est, utrumque ut nos legimus. Porro ubi legimus, parui bubones, habetur græcè *ὀφθαλμοὶ βουβωνες*, vertuntque breues bubones, qui autem dicantur breues, nisi qui exigui, non succurrit. Proinde cum *ὀφθαλμοί* significet, & quod breue, & quod exiguum, magis placet legi, parui bubones.

ET germinationes & calores oportet considerare, quod oculis, auribus, naribus, manu indicationes fiant, & alia etiam quibus cognoscimus, an agrotus sudet, an tangat, an olfecerit, angustauerit. Alia autem cognoscenda, pili, color, cutis, vena, nervi, masculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & quæ à sanguine viscera, venter, bilis, & alij succi. Pulsus, tremores, convulsiones, singultus, circumspiratio, secessus ex quibus cognoscimus.

Hic voluit Hippocrates in vnum caput colligere omnia quibus vimur ad cognitionem. Ea medicinæ pars, ad quam hæc pertinent, dicitur diagnostica. Triplicem rerum facit mentionem, non sinit admodum distinctè & artificiosè distributam. Hoc verò vetustati est condonandum, & à nobis, quod ordini & distinctioni deest addendum. Triplicia illa sunt: Quibus potentius, seu organis, ad hanc medicinæ partem probè exequendam, vimur: Quæ signa captemus: Quorum partium consideramus affectiones. Atqui quæ ut signa consideramus sunt duplicia, quædam antecesserunt, quædam comitantur. Organa quibus vimur sunt oculi, nares, aures, & manus, visus enim, auditus, odoratus; & tactus sunt hæc organa. Gustu verò nullus vimur medicus ad medicinalem diagnosin, quia excrementa aliqua, siue sudorem, siue urinam, siue quidvis aliud degustare absurdum, & minimè necessarium est. Proinde Hippocrates à tali ratione diagnosticos semper abstinet, neque scio an saporis excrementorum vnquam meminerit, nisi fortè dulcedinis sordium auris, section 5. l. 6. huius operis, proinde neque hoc loco linguæ meminit, tamen odoris multis in locis fecit mentionem, scitatum scilicet, & urinam, & deiectionem, & quàm minimè fastidi putis, atque hoc loco etiam narium. Quibus itaque dignoscimus, quatuor hæc sunt. Signa quæ ut prægesta consideramus, an sudauerit, an tetigerit, admodumve ei fuerit aliquid noxium, an olfecerit, gustauerit, & aliquid à quo poterit lædi, ac denique omnia alia, quæ agrotus facere, patire poterit: ut an vigilauerit homo, aut laborauerit, aut incediam sustinuerit, aut alius copiosè fluxerit, aut denique aliud qu-

Antecesserit. Nam huiusmodi omnia, quæ præcatardicæ causæ medicis vocantur, considerare consulit Hippocrates initio prognostici, aut ex aliis coniecturam facientes, aut nihil fieri poterit, interrogantes. Nam quæ consideramus ut præsentia, non eodem modo semper indicant, sed plus aut minus bona aut mala sunt, ut illæ quæ vocamus prægressa, antecesserunt, aut noxi. Nam quæ considerantur ut comitantia affectionem, sunt germinationes, seu quæ exterius per cutem germinant, quo in genere sunt, quæ exanthemata vocantur, maculæ scilicet & papulæ, & tubercula exigua: præterea & vlcerum omnia, & tumores præter naturam externi (omnia enim hæc per cutem germinant, & significationem aliquam præbent) & calores qui totum corpus, aut quasdam partes præcipuè tenent: & color in toto corpore, præcipuè verò in vultu, & lingua; & pulsus (ut hincetiam constat Hippocratem consuevisse tan-gere egrotantium artenas. Nam *σπασμὸς* non significat palpitationem, aut motum alium quàm dilatationem arteriarum) & tremores, convulsiones, singultus, circumspiratio, & secessus, & alia, quibus agnoscimus, ut decubitus, palpitationes, extenuationes partium, manuum gestulationes, vomitiones, & vrinæ: & spura. Circumspirationis nomine intelligo ego hoc loco spitationis diffilis omnes differentias. Ex illis enim omnibus significatio aliqua capitur in morbis, peculiariter ramen quam dyspnoeam significet, non possum cer-tò affirmare. Non enim memini me vnquam hoc nomen *ἀσπύρνωσις*, seu circumspiratio, apud Galenum, aut vllum alium autorem legisse. Neque sanè Gal. in libro de antiquitatis vocibus Hippocra-tilius mentitur. Proinde omni auxilio destitutus, hacin re sola possum coniectura vti, ea verò ducit in respirationem sublimem: sublimis enim viderur posse circumspiratio vocari, quod non tantum septum transversum, & thorax per eam moueantur, sed & partes quæ circumstant thoracem, superi-nè quidem claviculæ, infernè ilia. Nam re verà cum angere debilitas, quando hæc quæ circumstant thoracem mouentur emenduntur, tantò thorax videtur moveri minus, vsque adeò ut cum ad extre-mam debilitatem iam ventum est, non respirare, sed circumspirare videatur animal. Atque ita nisi me coniectura fallit; pessima omnium specierum dys-pnoæ, nomine circumspirationis significatur. Di-ctum itaque est dictis organis, aut facultatibus dicta signa considerari. Id quod facile constat, nam oculis cognoscimus germinationes, & colores, tum in partibus, tum in secessibus, & aliis excrementis, atque adeò modos substantiæ in his ipsis. Auribus, quasdam dispositionis species, ut cum feruet plenus in gutture pulmo, & excretiones flatuosas, Naribus, odores in viceribus partibus, & in excrementis. Manibus, calores & refrigerationes, & partium durities, aut mollietates. Porro tremores, convulsiones, & dyspnoæ pleræque species, & decubitus partium oculis, partim manibus videntur sentiri posse: ut & singultus partim oculis, partim auribus. Porro dictum est, hæc significationem mutare ob ea quæ antecesserunt, aut non antecesserunt. Quod etiam constare poterit singula perpendendi. *Βουβωνες* certe in febrium iniuis malignitatem humoris indicant, nisi tamen exsudationes vi, aut

atactis, & afflicte alicuius medicaminis calidioris, aut longioris moræ in Sole, aut potu vini meracioris, & esu rerum acrim eruperint: tunc enim non maligne, vt quæ *sabardello*, sed simplices, vt quæ *serpillo* Hispanis vocantur, fuerint germinationes. Calores itidem mordaces & maximæ ardentes febres indicant, aliquando verò esu, aut potu rei calidioris, aut inedia excreuerunt, & extra grauem vllum affectum apparent. Pulsus etiam nonnulli ob perturbationes animi sunt, qui citra eas pericula non exigua portenderent. Iam tremores metu defatigatis aut inedia, aut vigilia, aut dolore aliquo, qui aliqui extremæ debilitatis essent: convulsiones, & singulus, qui convulsionibus analogi sunt, ex vino, aut gustu, odorarive nimio rei acrioris, cum minoris sunt periculo ex expurgatione per pharmacum, aut nimia sanguinis effusione, aut etiam nimia exudatione cum maioribus, quam sine eis. Circumspiratio ex vehementi cursu aliquando fit sine magno malo, aliqui omnium permittiosissimum signum. Secesus nigri, virides, liquidi, & impensè flauī pessimi sunt, si verò deuorato pharmaco fiant, minus erunt mali, atque si ingestis copiosis cibis eiusmodi, multò minus mali. Perinde etiam euenit in aliis omnibus, quæ circa ægrotos considerantur: quæcunque enim eorum quæ comitantur, quibusdam antecedentibus, grauiora: quibusdam leuiora sunt. Quare indicia non tantum ex eorum quæ adsunt consideratione procedunt, sed eorum etiam quæ antecedunt. Partes quarum considerare debemus affectiones, sunt pili, cutes, venæ, nervi, musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & quæ à sanguine viscera, venter, bilis, & alii succi. Enumeratio est hæc partium omnium. Nam duplices partes sunt. Quædam quæ propriè sunt partes, & in toto viuunt: quædam quæ non propriè, sed quia aut in nostris corporibus naturaliter semper sunt, cuiusmodi quatuor succi, & ossium medulla, & proprii partium rotes: aut quia innascuntur nobis, vt pili, & cutis non vera, & extremi ungues. Quæ propriè sunt partes, quædam sunt simplices & homogeneæ, quædam organice: simplices sunt carnes & ossa (in carnibus verò sunt rubre, & pingues, & laxæ, & cuique parti propriæ) & medulla spinæ, & cerebri. Organa sunt duplicia, quædam organa prima, & prioribus organis communiter seruientia, vt venæ (in his sunt & arteriæ) & nervi, & musculi: quædam organa præcipua, vt venter, (& hic superior aut inferior) & uterus, & vesica (hi enim etiam sunt ventres) & cerebrum, & viscera quæ à sanguine, id est partes quæ ex sanguine coactæ sunt (cerebrum enim & venter ex semine) vt cor, hepar, lien, & renes. Omnium ergo curam habere iubet Hippocrates, vt rectè possimus de ægrotantium affectionibus indicia ferre, non solum partium, sed & eorum quæ in nobis naturaliter innascuntur. Porro hæc vt sese habeant agnoscimus, ex dictis antea signis, & ex horum affectionibus notas alias accipimus, vnde in grauiori, aut minus graui statu esse ægrotorum constitutum agnoscimus: Nam ventris affectiones agnoscimus ex secibus aut vomitibus, velut velicæ & renum ex vrinis: hepatis & cutis, ex germinationibus, & calore, & colore. Cordis & venarum, ex his ipsis, & pulsu: & medullæ, & nervorum, &

A cerebri, & musculorum, ex tremoribus, & convulsionibus horum ipsorum: Et ventriculi, ex singultu: bilis & aliorum succorum, ex excrementis, secibus inquam, & vrinis, sudoribus, & spuitis, & vomitibus: ossium, ex quibusdam germinationibus, ex vlcibus enim diuturnis. Porro pilorum decidentia malignas cacochymias, aut extremam tabescentium periculum indicant. Repentina & intempestiva canities frigiditatem, & humiditatem cutaneorum capitis partium. Cutis distentiō & ariditas, siccationem corporis, venæ tumores, redundantias. Indicant arteriarum motus multiplices, multiplices affectus: nervi & musculi affecti faciunt partium quarundam perturbationes, quæ & ipsæ in acutis morbis significationem habent insignem. Carnes emolliationes quasdam, aut durities præ se ferunt, malum statum utraque ratione indicantes, vt in leucoplagmaticis, & tabescentibus. Hi quibus ossium corruptio imminet, dolores quasdam solent pati horrendos: medulla spinæ affecta resolutiones parit: cerebrum affectum, deliria: cor, deliqua animi: hepar, & venter, incoctiones: bilis & alii succi, fastidia, oris amaritudinem, aut saluginem, & alia multa. In quæ continet hæc Hippocratis dictio, quam satius, arbitror, facit rursus enarrando repetere. Et germinationes (inquit) & calores (supple) considerari oportet, eò quod oculis, auribus, naribus, & manu fiant indicationes: id est, indicamus, quæ circa ægrotum sunt. Neque verò duo illa tantum consideranda, sed & alia quibus agnoscimus, id est, quibus inuantur ad necessariam circa ægrotos diagnosin, vt an sudet, aut tangat. id est, an sudor aliquis nimis, aut tactus aliquis noxius antecesserit, an olfecerit aliquid insigniter lædens, an gustauerit cibum, porum, aut pharmacum. Alia autem cognoscenda, id est etiam alia omnia quæ antecedere possunt debes curare vt cognoscas, aut per te ipsum, aut interrogando.

E Porro quæ considerari debent sunt pili (color dicit, sed satius sic hic excipi, & eum signis posterius poni) cutes, venæ, nervi, musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & quæ à sanguine viscera, venter, bilis, alii succi. Porro reliqua signa quæ consideranda sunt, præter germinationes & calores, sunt color, pulsus, tremores, convulsiones, singultus, circumspiratio, secus, quibus agnoscimus, id est, & alia, quibus ad diagnosin utimur.

F

Suppuratis oculis, si rumpantur, magna vlcera sunt: si secantur, profunda, utroque modo oculi exulcerantur.

G

Suppurationes sunt aliquando in oculis, collecto sub cornea tunica pure. A quo quantum periculi visui impendeat, vel hinc constat, quod si exspectes vt ipsum erumpat sponte, sunt vlcera magna [quia non aliter erumpere potest, quam corrodo tunicas ipsas, atque ita magnum vlcus faciendo] si feces, facies vlcus profundum (quia non satis est, nisi totam ipsam corneam disseces) & exulcerantur.

oculi, ita vt initium amittant. Quid ergo remedium superest? certe quod Galen 4. de comp. secund. loc. cap. 3. consulit, diffusioris collyrii tentare pus absumere.

Aristeas ex Amphilocho pago quarta delirantis, alius ex viridi aliquantum palida egerat, & somni salubres aderant, colore candidus erat.

Species quædam mihi videntur esse hæc hominis phrenitici in lethargicum abeuntis. Nam notas habebat vtriusque faciei, bilis dico, & pituitæ. Nam biliosas deiectiones habebat, & colorem album, quorum illud bilem, hoc pituitam indicare poterat. Nam duo sunt hi loci, à quibus redundantium succorum capiuntur argumenta, ab exeuntibus, & à colore egrosantis. Albus enim pituitam, flauus bilem, ruber sanguinem, niger atram bilem indicat. Videbatur verò nunc moueri bilis, quia alius egerat biliosus, & delirabat, quare cum notæ pituitæ simul apparerent, qui est frequentissimus transitus in delirium ex pituita cum febre (nam malum erat acutum) sese insinuant in lethargum ergo. Multo verò magis, cum simul essent somni salubres. Nam duorum alterum videtur posse significare, dicens somni salubres, aut somnos viles ac conferentes, aut quietos, & similes us qui per sanitatem fieri solent. Vtrumque hoc interpretaris, constat hunc non teneri magno periculo, vt phreniticorum plerique solent, sed dormire. Certe somni phrenitici omnibus viles sunt, vt periculum noxium si tamen nulli, aut proflus exigui somni boni fuissent, non diuisset somni salubres: sed quod solet, somni nulli, aut non dormiebat. Dicit itaque huic somnos fuisse, vel similes benevolentium, aut viles, aut forte vtrumque. Nam alterum ex altero fit. Si enim phrenitico somni placidi, certe & viles: atque si viles certe non valde implacidi, neque inquieti. Nam qui omnino tales sunt, laborem faciunt, & deliria, & conuulsiones augent, quare & lædunt. Qui ergo inuani, sunt similes somni benevolentium. Tales ergo erant huic somni, vtraque ratione salubres. Tales verò attestabantur color faciei, ac indicabant in cerebro non valde sinceram esse bilem: sed pituitæ satis admixtam. Quare cum bilis per alium efflueret, consentaneum erat futurum, vt passio abiret in pituitosam.

Quibusdam ab initio & digitis veluti tremebant & labia quum loquebantur, & alia partes, & celeriori lingua præditi præterne loquebatur. His facies præcipue rubescebat, hi vinum bibebant meracius, aut vomitu conuulsus intumescebant.

Qui vehementer vomere coguntur, cum alioqui non sint ad vomendum faciles, neque ad vomendum parulam effusa: aut corpore pleno, & capite infimo sunt, lædi solent æque ac qui vi no plurimo, meraciori præcipue, vtantur. Numirum

vomentes solent, non aliter ac ebrii, tremere manibus & labiis, & balbotire, læsi nernis ob consensum cum ore ventriculi, & ruborem, tumoremque in facie contrahere, & oculos tumidos, exortos, & humidos habere, raptis in caput humoribus. Cum ergo aliqui per morbos incipientes hæc habent symptomata, considerare oportet, an aliqua harum causarum adfit. Si enim adfit, melius sperare potes de ægroto: plerumque enim cocto vino, aut quiescente à vomina corpore, symptomata hæc cessant: si autem neurum affuerit, periculosa constitutio est. Nam apoplecticam aliquam passionem minatur. Hoc ergo nunc nos hac historia Hippo. docet, dicens multos per initia morborum habuisse digitos subtremitulos, & labia cum loqui incipientes, & alia huiusmodi, & fuisse ceteri lingua. Hoc idem epiteton lib. 1. sect. 6. dedit balbutientibus: sed addit nunc proterne, quod sanè non omnibus balbutientibus est commune, sed peculiare ebriis. Nam loquacem balbutientem, & petulantiam præstat ebrius. Hoc ergo faciei præcipue, etiam dicit fuisse his: verum hæc non citra occasionem facta, sed quod tales ægrotare coepissent, aut ex ebrietate, aut nimio vomitu. Verum non omnia æque accidunt ebriis, & vomitentibus. Nam petulantia est ebriis maior, & tumor faciei vomitentibus. Proinde dicit prius (quod ad bibentes vinum magis refertur) *scilicet, non magis ægrotantes, & postea addit, balbutientes. Scilicet dubitabis, cur dicat ægrotantes, balbutientes. Nisi enim minus vomitus sit, non videtur tam noxius futurus, sin autem nimis, qui sit vultus? Certe qui vomunt, aut vomunt naturali quadam vi coacti, non potentes retinere, aut sponte id faciunt aluius utilitatis gratia, vt qui vomitorium pharvacum accipiunt, aut digitis, intinctis ve oleo pennis, sibi ipsis vomitum eiciunt. Hi verò, aut nimis sese ad vomitum cogunt, & in ea re modum non tenentes, dicitas sibi noxas faciunt, aut fortasse intempestiue vomere tentantes. Velut enim quidam utilitatis gratia sese expurgare tentauerunt, & à pharmacis vehementer læsi sunt, superpurigatione correpti, aut commota citra euscuationem bile, aut distemperati, aut aliter vitæ multi, sanitatis causa vomentes, læsi sunt, rapti aliquo vase, aut grauius capite, aut debilitata ventriculi retentrice, aut aliter. De his dicit, vtiliter vomentes intumescebant, id est, utilitatis gratia vomentes, & vt ab alijs affectionibus liberarentur, ac fortasse etiam utilitates alias inde capientes, hæc noxas incurrerunt, intumescebant scilicet secundum faciem, & oculos, & tremebant digitis, & labiis, & balbutiebant cum rubore faciei, impetu quodam actis in caput humoribus (quæ eadem ratione solet quibusdam, nimio & crebro vomitu vrenibus, vitiis acies debescere) & ore ventriculi læso, ab accurrentibus excrementis, incuius consensum pertracto neruoso genere tremores & concussiones partium accidunt.*

Qui iuxta Medosade vicum decumbebat, tenuis, nulla bile tincta, adiposa, multa deieciebat. Hypochondrium habebat læui cedens & gibbum, comatosus fallus est, circa decimam quartam maxime cum

ad indicationem progredietur, rigor sine tremore accidit, dissolutio, langor, contractio, eadem alui deiectiones, comatosus erat, negligens ex somno, non insanit. Indicatus est circa decimam quartam. Nullum indicantium fuit contrarium.

Obediens, id est, obediens hypochondrium vocat hic per metaphoram, quod molle est & cedit digitantibus: gibbum verò quod durum. Nam tumens & elatum hypochondrium rotunditatem quandam comparat. Dicit ergo nunc obediens, & gibbum hypochondrium, quod vocare solet contentum & molle. Rigor sine tremore est horror, aut quod solum vocatur frigus. Nam dempta concussione, rigor, fit horror. Vnde constat rigoris nomen apud Hippocratem latius patere quàm apud Galenum, & significare omnem extremorum refrigerationem, aut, saltem horrorem & rigorem. Alioquin non posset esse rigor sine concussione partium. Constat etiam, vt & in aliis multis locis huius operis indicauimus, tremorem non dici ab Hippoc. vt Galeno eam solum partium instabilitatem, quæ ex pondere & debilitate nascitur, sed omnem partium sine voluntate concussionem, qua partes loco mouentur. Nam aliter quorsum diceret rigor sine tremore? Peculiariter enim vocatum tremorem à Galeno, vix vnquam habet rigor adiunctum. Notauit ergo rigorem sine tremore fuisse, quasi carentem eo tremore quem solet habere, ea verò est concussio partium ab expultrice facultate procedens. Accipiuntur ergo hic nomina rigoris & tremoris, vt dictum est, estque rigor sine tremore, horror. Dissolutio & langor eandem rem fortè significant, nisi fortè *σπασμός* (dissolutionem vertimus) sit motus partium debilitas, & *μεινός*, (debilitatem vertimus) sit animi deliquium, & vitalis contentionis remissio. Vellem sane Galenum libro antiquarum Hippocratis vocum, harum meminisse, verum quando quidem non fecit, licet nobis quod videtur congruentissimum, coniectare. Addit deinde *σπασμός* id est *σπασμός* nomen verò *σπασμός* non est facile diiudicare quid hoc loco significet. Nam nomen ipsum significare potest multa, quorum hoc loco vix vllum quadrare videtur. Significat enim concursum, seu congressum, & compressionem, & contractionem, & calamitatem, & accidens, seu symptoma. Quod autem horum dicas magis quadrare? Quid enim sit congressus, aut compressio quæ excurrit? Nam illud quæ excurrit, idem est ac si diceret, quæ excurrit *σπασμός* id est *σπασμός*, id est, *σπασμός* & *σπασμός*, itaque sensus sit, excurrit etiam compressio, aut concursus, aut calamitas, aut accidens. Compressionem legi non est consentaneum. Quia quid aliud significaretur, quàm compelli excurrit, seu fisti? Quo pacto autem qui antea fluxissent, eundi in indicationem supprimerentur, aut quo pacto si supprimerentur circa decimam quartam mox circa eandem diem indicatus esset? Sed neque symptoma commodum sit legi. Cur enim in ipsa indicatione dicerentur euacuationes esse symptoma? Legere calamitatem? Vt dictio sit calamitas, quæ excurrit, id est, calamitas excurrit? Id verò si-

A gnificet, dictam dissolutionem & languorem vt deni euacuatione angeri, itaque euacuationes videri non cum satis multa conferentis ac tolerantia prodite, fed angi, & debilitari deiectionibus. Non quadrat, cum addat mox, indicatus est circa decimam quartam, nullum indicantium contrarium, quid.n. magis aduersum in indicantibus, hoc est, in euacuationibus decretoris excogitari potest, quam sine conferentia, aut tolerantia, denique calamitatem esse? Supra est ergo concussionem eo nomine significari, vt dictio sit quam præscripsi, concursus quæ excurrit, hoc est, concursus excurrit. Quid verò significare possit ea dictio? Certè præcipitatum & frequentem fuisse deiectionem in indicatione, adeo vt viderentur deiectiones ecurrere. Quæ sane nimia deiectionum frequentia, casus virtutis periculum asserere potest, ac proinde vituperantur in prognostico. Quia, inquit, si acerratum & sæpè egerit, periculum est ne in animi deliquium incidat. Verum si hoc absit, & bona tolerantia est in indicationibus, nihil deterruit est abundanter & crebrò deicere. Vt ergo diceret hoc malum omen non fuisse, sed bene tulisse ægrotum tam copiosam euacuationem, addidit, nullum indicantium contrarium. Vnum adhuc nomen interpretatione indiget, vt pote non satis vñratum *σπασμός* id est *σπασμός*, quod quidem ego verti, negligens ex somno. Nam vt *σπασμός* est despiciere, seu res non videre, fed præterire, ita *σπασμός* præterferri, non considerare, negligere, & *σπασμός* qui res non considerat, sed quasi non videat quæ videt, neque audiat quæ audit, negligit. Cum ergo esset comatosus, erat etiam ex somno, hoc est, cum excitabatur, negligens, vt obliuiosus aut stupidus. His nominibus, quæ certè omnia inasfrata sunt, explicatis, historiam aggrediamur. Hic haud dubie laborauit morbo acuto ex pituitosis & aquosis, hisque satis synceris. Omnia enim signa talium humorum semper fuisse (vt hinc constat non omnes aëtos morbos esse ex bile, sed frigide etiam subiecto matre, posse celerem alterationem accidere) nam habebat multam deiectionem per totum morbum (quod multitudinis est) tenuium. Quoniam verò duplicia excrementa sunt in nobis tenuia, biliosa, & serosa, addit, & *σπασμός*, id est, minimè biliosa, sed *σπασμός*, id est, aquosa. Hypochondrium erat rariū cedens & gibbum, id est, molle, & distensum, quod etiam agnosce (cum statuta fortè) imatris redundantiā significabat. Comatosus fiebat, procedentibus scilicet aquosis excretionibus, pituita purior fiebat, vnde fiebat comatosus. Circa decimam quartam maximè cum ad indicationem progredietur, accidit rigor sine tremore, hoc est, frigus aut horror, quod etiam frigidum esse succum indicabat, aliqui accidit rigor verus. Accidit & dissolutio & langor (hæc refrigeratio illa asserit) & tunc temporis multo abundantius cepit deicere, adeo vt concursus quidam esset excurrit, & tunc fiebat magis comatosus, & si quando excitaretur, erat ex somno negligens, hoc est, nihil considerans eorum quæ sese offerbant, sed velut mente alienatus. Nihilominus non insanit aperte. Vnde constat non fuisse legitimum lethargum, sed eam solum. Tandem per ram cumulatam deiectionem indicatus est exitum, mox enim

circa decimam quartam; & bene sanè: nullum enim indicantium (hoc est signorum decretoriorum) fuit contrarium, hoc est improsperrum, & aduersum. Nam in die decretoria, & optima, cum euacuatione congruente & copiosa, cum conscientia & roborantia solutus est morbus. Vnde consentaneum est, nullam recidivam superuenisse.

Simili modo alter in principio subuiscosa alui excrementa deiecit, ex quibus quæ crassa erant, indicatoria fuerunt. Insomnis erat. Postea subuiscida, aliquantum biliosa, matura biliosa, non tenuia demisit. Postquam autem ceperunt esse compacta, celeres fuerunt indicationes. Hypochondrium apparuit in venarum morem distentum circa sextam, deinde dormiuit septimâ, indicatus est circa nonam.

Cùm plurima eorum quæ hoc opere continentur, videantur citra ordinem ab aliquo collecta, aut ab ipso autore tumultuarie scripta, multo centè magis quæ hoc quarto libro, quàm quæ prioribus, quod ex multis aliis diætionibus iam constat, sed & ex hac constare potest, in qua quædam dicuntur pertinentia ad historiam singularem, quædam interponuntur pertinentia ad communem doctrinam. Multæ etiam in hoc libro sunt inusitatæ voces. Simili modo alter (inquit) in principio deiecit alui excrementa subuiscosa. Dicitur *εμελες*, quod hic etiam ut qui ante hunc scriptus est, habuerit copiosas deiectiones, tamen si profectò non fuerint, qualitate similes. Prior enim habuit tenues, non biliosas, quæ quidem tales cum essent, longè aberant à viscosis: hic verò habuit subuiscosas, hoc est, aliquantulum viscosas. Nam illud, sub, minuit significationem. His dictis, quæ pertinent ad narrationem, apposuit illud, *εξ αὐτοῦ τὸ τυχὸν κρινομένην*: quod sanè non de hoc ægroto, sed in communem dictum putari debet. Nimirum deiectiones crassæ concoctiones præ se ferunt, & proinde indicatoriæ sunt. Hoc verò non est deiectioni proprium, sed commune excrementis omnibus, nam in suo quodque genere quod coctum crassum est. Concoctio enim omnia facit crassiora. Verum non ut crassa quæ cocta, ita lenta sunt, imò verò sine lentore crassa. Lentor enim in excrementis, ex interno frigore & cruditate nascitur. Cum ergo dicitur ex quibus quæ crassa indicatoria, non est intelligendum ex quibus subuiscosis deiectionibus, quæ crassa indicatoria. Nam in lentis quantò crassior, tantò crudior deiectio est: sed ex quibus, ex deiectionibus scilicet. Itaque hæc verba nihil aliud continent, quàm quod in prognostico dicitur his verbis, Inspicere oportet deiectionem morbo ad indicationem eunte. Erat insomnis. Hoc sanè non procedebat ex viscosis deiectionibus, sed bilem potius significabat. Quid ergo intelliges aliud quàm pituitosa in inferna repere, & bilem in supernis partibus abundare? quod & euentus declarant. Nam post hæc, elapsis scilicet duobus aut tribus diebus principi, paulatim ceperunt deiectiones bilis, & paulatim ceperunt deiectiones

bilis speciem ostendere, & hypochondria exceperunt calidos humores, donec recedente à capite bile dorminerit septimâ, & nonâ indicatus sit. Itaque, inquit, post hæc deiecit subuiscosa, aliquantum biliosa, matura, id est, crassa biliosa non tenuia, sed ex crassa bile cuiusmodi est vitellina. Non sanè omnes hæc deiectiones habuit simul (nam qui posset?) sed alias post alias, procedente verò bilis ad inferna destructione, abierunt à subuiscosis ad biliosas: interim prodiebant alique stercoreosæ, seu ex fecibus crassæ, quas coctas vocat. Acqui ex eo tempore, quo ceperunt compactæ esse, celeres indicationes expectabatur, quia ut dictum est primo huius operis. Concoctiones celerem indicationem, & securitatem significant. Hypochondrium distentum apparuit quædam circa sextam. Scilicet à sexta ad nonam est quaternarius, semper autem primus dies ultimi quaternarii, & qui in indicationem finitur, solet perturbationem asserere. Itaque sextus novum indicat. Sed quid est venoso modo distentum esse hypochondrium? noua certè pituitosa. Phlegmonosum affectum puto venosum modum vocari, quod tumefactis primùm ac repletis venis solet in phlegmonosi affectus excitari. Fortasse etiam (quod magis placet) legendum fuit non *εμελες τρέπον*, sed *εμελες τρέπον*. Itaque distentum erat hypochondrium cum calore & dolore, quod significabat eam regionem succos calidos copiose imbibisse, cumque mox sequenti die dormiuerit, constat ex supernis partibus eos descendisse. Indicatus est circa nonam, procedente arbitror eo biliosorum descensu, ac hypochondrii redundancia deiectionibus biliosis enata. Cùm enim Hippoc. non dicat sterisse ante hos ultimos dies deiectiones, ego intelligo ad finem usque morbi processisse. Itaque manifestum hoc, alioquin acutissimum, ex vtriusque excrementis, pituitosis inquit & biliosis pependit, fuitque biliosior multo quàm qui ante hunc enarratus est.

Albi coloris, non rufi uterque erat.

Ambos duos ægrotos qui dicti sunt, & eum qui iuxta Medosadæ vicum habitabat, & hunc alium qui similiter ægrotauit, dicit esse *λευκοχρεῖς*, id est, colore candidos, non rufos. Vbi considera Hippoc. non contemnere in morbis, qualis natura sit ægrotantium, imò hæc in præcipuis considerare, atque ob hæc notas omnes ex corporis habitu, colore, capillis, & reliquis omnibus quæ ad eam cognitionem iuuare possunt. Albi colore plerumque rufi sunt plus aut minus, ut Germani, quidam autem etiam sunt colore faciei satis albi, capillis vero & barba nigri Qui albi & rufi sunt, siquidem in vigente iam ætate sunt tales, frigidi sunt. Qui albi & nigri capillis contrarias notas habere videntur, aliam quidem frigoris, aliam caloris. Verum quia contraria non possunt eadem simul inesse, necesse est ambo hæc signa simul iuncta, aliud significare præter alterutrum significationem. Quoniam ergo color capillorum aliquando sequitur conditionem causæ efficientis, aliquando materialis, necesse est, quando duo dicta signa non possunt attestari efficienti, quia essent contraria & simul, autam-

bo aut alterum sequantur conditionem materiz. Merito ergo coniectemus eum, qui simul est cute sibilis & capillis niger, duplici succo abundare, pituitoso & melancholico. Non enim equè repugnat duos hos succos abundare, atque calidum frigidumque simul esse corpus. Ambo enim sunt frigidi senci, atque melancholica viscerum natura, ob substantiz proprietatem gignit nigros succos, atque adeo nigras fulgines, ob incoctiones verb etiam ex pituitosis edulius multam pituitam, qua molliores corporis partes nutriuntur. Sunt verò in melancholicis multæ incoctiones, quia eorum debilis est naturalis calor. Itaque illi erant pituitosi, & melancholici, & uterque sanè morbus fuit magna ex parte congruens tali naturæ (nam melancholici feroci etiam sunt, pituitosi verò lentis abundant) non tamen omnino. Nam satis etiam biliosus morbus fuit. huic postremo, posse verò & congruentes, & omnino non congruentes, & partim congruentes morbos hominibus accidere, ob multas causarum concuriones, non opus est vdicam. Illud solum addamus oportet, cum Hippocrates non dicat qui fuerit illis pilorum color, sed solum non fuisse rufos, vnde coniectabimur fuisse nigros. Certè quia albi magna ex parte sunt rufi plus aut minus, quasi notatu dignum notauit fuisse albos, nullatenus rufos, tales verò sunt, qui nigri. Rubri enim aut virides pili humani esse non consueverunt, neque sanè albißimi, nisi raris quibusdam. Tales autem si essent, pat erat vt rem ratissimam apertioribus verbis significaret, cur enim quia non erant flauis, suspiceris fuisse quales rarissimi esse solent, ac non potius quales sæpe fiunt, putà candidos colore, & nigros capillis? Constat verò iuxta hanc enarrationem, *σιππῶ* seu rufum latius accipi, vt & *ὑπόριον*, seu pallidum, atque adeo ipsum *ἑσθὴν*, seu flauum pro omni pallore, vt non rufi dicantur, qui nullatenus rufi, hoc est, omnino absunt à pallidiorum genere. Nimirum dicta tria nomina, etsi differentiam quandam palloris secundum maius & minus pterunque continent, nonnunquam etiam promiscue sumuntur, seu pro omni palloris genere quodcumque eorum accipitur.

Diectiones aquosa cum sub dio exposita essent, supernè lenas & tennes, valde similes erant bili isatodi, infernè verò subsidentiam habuerunt.

Istis graecis dicitur ea herba quæ latinis glaſtum, cuius succo vtuntur tinctores ad cæruleum colorem præstandum, eo enim colore est is succus. Herba ipsa viridior, non omnino viridis, hinc species quædam bilis, vt Galenus docet lib. de atra bile, *ἰσάτις*, hoc est, isatidem colore referens vocatur: ea est inter viridem & cæruleum, si vt omnis alia viridis bilis species visione, nisi cum sequitur conditionem ciborum, vt in ventriculo aliquando. Ergo dicit diectiones aquosas multas, cum sub dio expositæ manerent, habuisse supernè tenues & lenes, simile flori qui in vinis solet innatare, colore simile isatodi bili: infernè verò subsidentiam ex parte graßiori. Nimirum vt in vinis repositis separatur

A infernè subsidentia, & supernè quiddam tenuissimè relæ araneorum simile, lenæ & tennes, ita in plerisque diectionibus aquosis. Refert verò quod separatur id quod in eis latitabat. Significabat ergo hoc tennes, & lenæ isatidi simile bilem cum aqua descendere. Vnde manifestum fit, hoc Hippocratem non dicere de diectionibus aquosis, quæ erant in ægroto, qui iuxta Medosadæ ædes habitabat, ille enim dieiciebat tenuia *ἄχρη*, id est, bilis expertia, hæc verò diectiones erant biliosæ, & isatodes: sed potius banc fuisse differentiam aliam aquosarum, illis contrariam, quam in aliis ægrotis eadem fortasse tempestate notauit. Tu interim considera Hippocr. diligentiam, qui diectiones & recentes & repositas contemplabatur, quod in aliis etiam autem animaduertimus.

C *Quibus in dextra parte aliquantum molliis distentio adest, phrenitici euadunt, nisi soluantur febre desinente. Quibus verò sub molitudine ventris in hac ipsa aliquid velut circumcolligitur, aut cum duritie dolet, & valde malignum non vult deffundi, fortasse ex talibus quidam suppurantur. In dextra autem parte sublatis tumores, quales quidem ut plurimum molles sunt, si aliquo multum ac maxime premente submurmurauerint, non valde maligni censendi sunt. Quale quid in dextra parte accidit ei qui ex Amphilocho pago aduenerat, & ei qui iuxta Medosada vicum decumbebat. Illi sopore premebantur, & somno grauiore corripiebantur.*

E Quantum referat in acutis morbis, & iis qui ex acutis decidunt, attrahere hypochondria, & ventris inferni regionem, intelliges facile ex iis, quæ de ea re in prognostico Hippocrates reliquit scripta, ad quod sanè etis pertinet hæc tota dictio, quam enarrare aggredimur. Dicitur est ab Hippocrate illic, tumores hypochondrii dextri deteriores esse quàm sinistri, quod sanè ob hepatis dignitatem, quæ ex communis alimenti generandi facultate procedit, verissimum est, vsque adeo vt phlegmones hepatis lethales sint, & inueterati tumores cum duritie insaniabiles. Hanc ob causam tumores in dextris partibus ventris præcipue petsequitur, eorum differentias quasdam insignes & significationes proponens. Prima est, distentio submolliis in dextris, quam diximus iam sæpe fieri ob flatum eo loco collectos, si enim ex tumore phlegmonoso aut scirrholoso nasceretur, esset dura: si ex ordinate, non admodum esset distensa pars, sed laxior: si ex aqua collecta inter peritonæum & intestina, deflueret per totum ventrem, neque distenderet solum dextrum hypochondrium. Flatus verò eam solum partem, in qua contingit gigni, nonnunquam distendit, sursum perit, neque versus alias diffunditur. Ita quibusdam ex flatu distenditur solum hypochondrium dextrum, aliis plurius sinistrum, aliis etiam totus venter, vel quòd plurius sit, & vix toto ventre capiat, aut quòd

in omnibus ventris partibus gignatur, aut à lumbis, vtro, aut parte alia interna signi corperit. Tales quidem tumores diffinitionis plurimum habent, nam status velut ad summam elatus, membranas tendit. Duritiam verò propriè dictam non habent, & equam tactus à tensione diuersam esse non sentiat. Est ergo diffentio submollis, cuius quum per febres continuas apparet, duplex exitus expediti potest: alter, bonus, vt scilicet sensum status à febre dissipetur, simulque tentio & febris desinant: alter malus, vt scilicet phrenitici fiant. Scimus enim status per venas & arterias redundantiam semper esse capiti periculosam, & significare morbos eius, qui adsunt aut aderunt, prout indicant vrine turbare, quales sunt tumentorum. Ergo dicit, diffentio submollis in dextris futuram phrenitidem timere iubet, nisi soluarur desuente febre. Si enim febre perseuerante tentio ipsa perseueret, quasi febrilis calor nihil eius absumat, aut ipsa soluarur febre non desuente, vtroque modo timeri debet phrenitis. Illud enim significat maximam indissolubilis status redundantiā, hoc fortasse ratum ad caput. Quia si febris non definit merito censibus desisse tensionem, causa aliam in partem abesse potius quam consumpta. Quod si febre desuente tentio non soluarur, non sanè est quod timeas phrenitidem, non enim ea sit sine febre, tamen hoc per febres acutas ratum est, tales enim conseruere statuofos morbos finire, aut in alios per cause transmissum mutare. Quia ergo hoc ratum est dicit, si non soluarur tentio febre desuente phrenitici fieri egrotos. Omnino enim necesse est quatuor horum aliquid euenire, aut tolli ambo, tensionem dico, & febrem, quod est maximè expectandum: aut ambo perseuerare: aut febre manente tolli tensionem, que duo phrenitidem minantur: aut solui febrem, & tensionem manere. Cum ergo hoc vltimum adeo ratum sit, uti primum fiat, rationi consonum est ob secundam aut tertiam phrenitidem timere. Apponit mox aliam tumoris in ventre diffentiam, dicens, quibus verò sub mollitudine ventris in hac ipsa, velut circum colligitur, aut cum duritie dolet, & valde malignum non vult diffundi, fortasse ex talibus quidam suppurantur. Multas etiam notas scripsit in prognostico internæ in alio inflammationis in suppurationis abeuntis, quod sanè etiam posse cognoscere plurimum refert, estque hæc vna earum rerum, quibus periti medici impetris maximè præstant. Nam multi ex internis inflammationibus ad suppurationes mutatis moriuntur lentè, cum putaretur iam esse à morbis liberati, atque à medicis dimissi. Cum enim facta iam pure dolores & febres magnopere remittantur, putantur multi ad maximam morbi remissionem, & securitatem peruenisse, quibus pus interius vomica aliqua collectum subest. Quorum quidam beneficio ipsius nature fortis, rupta vomica, & excreto pure liberantur: quidam pure malignis putrescente, & computrescente partes internas, aut assidua febricula, quam putridæ ex loco in cor delatæ fulgines fouent, tabescentes intereunt: aut vomica rupta, sed tardius, & cum iam debilitata virtus est magis quam vt possit ipsam puris excretionem sustinere. Multum ergo refert scire notas internæ inflammationis in suppurationem abeuntis. Ac multi quidem has ignorant, quia

A ne ipsas quidem internas inflammationes dignoscere sciunt, & latentium affectionum cura deposita nihil ferè considerant, præter ea quæ sensibus comprehenduntur citra ratiocinationem vllam, & vulgaribus etiam sunt nota. Oportet verò inflammationes, & affectus partes nosse, posseque eas ab aliis dolorosis affectibus dignoscere, & magnas ab exiguis. An enim facturi sint abscessum, seu suppurationem, agnosce ex tribus, loco, magnitudine, & modo inflammationum ipsarum. Nam inflammationes partium calidiorum, nisi anticipetur resolutio, magis suppurantur quam frigidiorum, ac proinde vt dicitur in prognostico. Tumores in ventre minus faciunt abscessus quam qui in hypochondriis, minimè verò qui infra vmbilicum sunt. Porro exigue inflammationes pleræque resoluuntur, præcipue si in locis calidis sint, magis in calidis quidem locis suppurant, in frigidis manent crude & inuidæ. Quod ad modum attinet, quæ sunt rotundæ & eminentes & proprio loco circumscriptæ, & in vnum collectæ, futuræ suppurationis significationem præbent, quæ verò extensæ, & late, effusæ, non admodum suppurant: sed si exigue sint aut ex materia tenui, resoluuntur: si magna, aut ex crassiore, indicationem subeant fluxu sanguinis, aut alia euacuatione, si modò bonum exitum habeant. Hæc continent illa verba. Quibus verò sub mollitudine ventris in hac ipsa velut circumcolligitur, aut cum duritie dolet, & valde malignum non vult diffundi, fortasse ex talibus quidam suppurantur. Mollitudinem alui vocat ipsum abdomen, & sub ventris mollitudine apparet durum, est ipsum abdomen extrema in parte molle esse, interius autem sub ea mollitudine durum quidam reconditum esse, hoc ergo significat tuberculum internum. Quia verò dicit aliquid cum duritie dolere in hac ipsa, hoc est in febre, seu cum febre continua. significat id tuberculum inflammationem esse. Hæc, inquit, si circum colligatur, & valde maligna non diffundi, hoc est, & nolit in partes circum sitas effundi & extendi, neque compressa neque aliter, sed vno quodam loco durities & dolor hæteant, & velut in circumscriptam certamque particulam sese colligant, quod quidem est signum malignæ inflammationis (nam quæ se effundit non est tam firmata in parte) fortasse, inquit, ex talibus quidam suppurantur, hoc est, fortasse in iis qui hæc habent, expectari debent suppurationes internæ. Merito sanè. Nam tales sunt inflammationes malignæ (& obestentiam propriam, quia in alto cum sunt sentiuntur manifestè, & propter cacochiam quia dolent malignè, & nolunt diffundi) & in loco calido: quia sub mollitudine alui, & non sunt bene resolubiles, quod indicat durities. Quid ergo aliud expectes quam suppurationem? Dicit verò fortasse ob conditionem huius operis, quæ non ita docere, quam observationes & experientia, prout occurrebant, tradere institutum est. Dicit ergo fortasse ex talibus quidam suppurantur, quasi non definiat modò, sed asserat in talibus se obseruasse suppurationes fieri. Tu verò iam hiæc, quandoquidem ego experimento idoneam rationem adiunxi, vtere vt signò satis bono. Apponit deinde aliam diffentiam tumoris in ventre, quam non esse sanè dicit, adiungens duo exempla. In dextera, inquit, parte subian tumores, quales quidem vt

plurimum molles sunt, si aliquo multum ac maxime ptemente submurmurauerint, non valde maligni consendi sunt. Constat has eleuationes ex iis esse, quæ non admodum circumscriptæ sunt: sed diffunduntur, quas diximus indicatione aliqua seu abscessu aliquo eorum qui per effluxionem sunt, ut sanguinis fluxu ex naribus, aut deiectione copiosa, aut tali aliqua solui. Quæ euacuatio expectanda sit, ex iis quæ tensioni accedunt agnosces. Quibus enim hypochondria velut retracta sursum & distenta sunt, fluxus sanguinis immipet: quibus murmurant, fluxus alui. Si ergo multum murmurant cum quis premit, constat non esse humores admodum firmatos in parte, & ad inferna vergere per alium non diffucile excutendos, ut nihil prohibeat mox aliquid expurgantis medicamenti dare. Non est igitur hæc maligna affectio. Talis, inquit, tensio fuit in dextris ei, qui ab Amphilocho, & ei qui iuxta Madofadæ vicum decumbebat, ei. s. de quo nuperimè scriptum est. Ambo dicti ægroti sopore ptemebantur & somno grauiore cortipiebantur (constat illud, & esse declaratiuè) quod etsi graue videretur, ramen nihil illis euenit mali. Certè de eo qui iuxta Medofadæ vicum decumbebat, ita est dictum. Circa decimam quartam indicatus est, nullum indicantium contrarium.

Constitutiones ærui, quales sint & quibus temporibus & regionibus magis aut minus accidant, consideranda. Quo etiam tempore morbi vigeant, ad indicationem oportet cognoscere. & quod quotidie accidit, & quod citius aut serius, tertid quartane periodo: & quibus in periodis qua indicant intumescent, sanguinem fundant, aut non.

Quanti faciat Hippocrates sententiam duodecimam primæ particule aphorismorum, qua dicitur, paroxysmos & constitutiones indicari ab ipsis morbis, temporibus anni, & circuituum incrementis: & ita quæ mox apparent, inde intelligis, quod multis suorum operum locis sparsim eam repetierit, parum quidem eandem rem omnino dicens, partim aliquid quod ad eandem sententiam facit addicens. Sanè vel in hoc ipso quarto epidemiorum lib. bonam partem eius aphorismi scripserat, quem hic repetit, quædam etiam vñlia adiciens, quædam etiam detrahens non ingrua, ut videatur mihi hæc sententia (quod & antea dixi) si vñdique colligatur, perfecta euasura, & totam doctrinam de crisi bus conuenientia. Hic non meminit signorum concoctionis in excrementis, quæ in aphorismo vocauit mox apparentia, quæ sanè maximam præsentationis in morbis partem continent, tamen adiecit, habendam esse rationem circuituum quibus indicationes aut abscessus fiant, quod etiam ipsum ad fidam aut in eadem indicationem habere magnum momentum. Constitutiones dixit in aphorismo indicari præcipue ab ipsis anni temporibus. Ut autem ab anni temporibus, ita & à regionibus, & aliis congeneribus causis indicari est intelligendum. Quia scilicet quædam regiones & anni tempora nunc has nunc illas

A sponte solent afferre morborum constitutiones. Quia calida tempora æuiiores, frigida longiores morbos, alioqui eosdem specie faciunt. Ergo ut possis hæc præsentendi ratione uti rectè nunc monere dicens, scire oportet quales constitutiones in quibusdam temporibus & regionibus magis & minus fiant. Nimirum breues constitutiones in calidis, & temporibus & regionibus magis, in frigidis minus fieri, longas contrà. Sed quid refert considerare constitutiones morborum? Certè ut præsentias quo tempore vigeant morbi, id est, ut præsentias quando habiturus sit morbus vigorem, & quantum ad vigorem vsque transigendum sit. Quorsum id? Et ad indicationem, inquit, quis dicat, quia indicationes morborum sunt in ipsis morborum vigoribus: Ergo & ad præsentendum tempus indicationis, oportet præsentire vigorem, & ad hunc, constitutionem. Neque verò solum hanc præsentationem præstant anni tempora, & regiones: sed & circuituum inuicem collata incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue ex longiori intervallo fiant, ut in aphorismis dixit. Quod idem nunc explicat, dicens, & quod quotidie accidit, & quod citius & quod serius, hoc est, an anticipent an tardent paroxysmi (inde enim nascitur circuituum ad sese incrementum, aut decrementum) & quod quotidie, tertid, & quarta periodo, hoc est, siue quotidie, siue alternis diebus, siue quatto quoque die repetat paroxysmus. Non meminit autem longiorum circuituum, quia quintani, septimani, & longiores rarissimi sunt, & in acutis nunquam fiunt. Itaque hæc verba idem omnino significant: quod verba illa aphorismi. Quæ ratione autem cognoscatur constitutio morbi ex circuituum inter se collatione, in commentario aphorismi dictum est. Addit, & quibus in periodis quæ indicant intumescent, sanguinem fundunt, aut non. Tæ xpirota Hippocrates vbi que vocat euacuationes, velut cum dixit, si xpirota pui aotog tæ xpirota, & rursus si xpirota pui xpirota, id est, euacuationes quæ non tollunt morbos. Porò bæcipia aliquando vocat abscessus, distinguens abscessus in abscessus cum euacuatione & sine ea, vocansque abscessus cum euacuatione xapirota, ut sudores, fluxus sanguinis, & deiectiones. Ergo dicit nunc, non solum constitutionem esse notandam, sed etiam habendam rationem circuituum in quibus apparent tæ xpirota (id est, euacuationes) aut xapirota, id est, tumores præter naturam, siue sint xapirota, id est, tumores ex affluentia sanguine, & phlegmones, siue non, sed qualia ordemata, aut scitibi. Non enim hoc parum refert, si quæ viset dierum decreteriorum, ac nisi frustra est scriptum ab Hippocrate in aphorismo. Sudores febricitantium si ceperint, boni sunt tertidie, quinta, & septima, & nona, & vñdecima, & decimaquarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbum indicant: qui verò non sic fiunt, dolorem significant, & longitudinem morbi, & recidivas.

Abscessus quibus recidiva contingunt.

Multa dicta sunt antea in hoc ipso opere de abscessibus, præcipue sectione prima libri secundi, ubi diximus morbos difficiles indicationis esse eos, qui per abscessus sine excretionibus, aut cum recidivis, aut cum vtriusque finiuntur. Hoc idem est quod Hippocras. hoc loco docet. Nimirum abscessus & recidivas eisdem morbis esse familiares, ut scilicet qui imperfectè indicati sunt: & abscessus solere fieri, quibus & recidiva. Nimirum utraque sunt ex iis quæ relinquantur in morbis post indicationes, aut ob acutias, suas indicationum defectus. Nam qui contra indicantur perfectè, perpergantur, ac proinde tuto sineque villo malo alio fruantur sanitate.

Vena temporum & coincidentia, & colorum mutationes contingunt ante indicationem, & iis quibus nulla accidit indicatio, atque etiam anxietates, circumtensiones, colorum mutationes ex rubro in pallidum. Nisi indicatio contingat, & cusu circumtensiones sine indicatione, & collapsus oculi. Corporis durities sicca.

Hæc oratione complectitur Hippocras signa corporis tendentis ad ariditatem seu marcorem. Quia enim siccitate extrema, & quam confirmatam vocant, sunt partes omnes corporis duriores, unde & talibus contingit durum pulsum, & totius corporis habitus duritiem habere: vocat eam corporis affectionem, corporis duritiem siccam, hoc est, duritiem corporis factam, non ob concretionem à frigore, sed ob siccitatem & naturalis corporis humiditatis consumptionem. Quæ quidem affectio, ut ex igneo calore procedit, sic cum naturalis debilitate fieri consuevit. Quæ ratione multi ex febribus putridis tales manent, cum præcipue illæ sunt ardentissimæ, aut mali moris, aut cum interna aliqua inflammatione, præcipue visceris alicuius calidioris, aut cordi proximi; ut pulmonis, hepatis, aut ventriculi. Talis affectionis futuræ signa sunt hæc, quæ hic recensuit. *Quæque ætatem vocat manifestas in temporibus pulsationes.* Nam venas vocabant antiquissimi genus vtrumque, & pulsantes, & non pulsantes: ut cum dicit, venarum pulsationes. Velut ergo pulsus solet Hippocras vocare, non qualemque arteriarum motus: sed insignes & conspicuos, ita vocat venas, non ipsos sanguinis canales: hæ enim non sunt in ægrotis, quibus in partibus non erant, quæ bene valebant, sed venas manifestè & plus solito pulsantes. Coincidentias temporum vocat, quæ in prognostico collapsa tempora, ut & collapsum oculi, quod illic dicit oculos cautos. Ferè ergo sunt, hæc signa, quæ in principio prognostici scripta sunt, quæque vulgus medicorum vocat Hippocraticam faciem. Nam sunt oculi caui, & collapsa tempora, & cutis frontis circumtensiones, & colorum mutationes in pallidum. Addit hic pulsus in tem-

Aporibus, & anxietates. Sed quæ ratione hæc tamen indicent, exphicemus. Hæc ex magna consumptione carniæ & vitalium spirituum procedunt. Aut ergo primis diebus apparent, atque mox ac homo incipit egrotare, aut procedente morbo paulatim fiunt. Atque utrovis tempore, aut ex summa festu aliqua occasione, aut citra villam, velut in initio morbi, quia vigilavit homo, aut alius soluta est, aut ieiunavit: vel procedente morbo, quod encucario aliqua insignis inperitum antecesserit, aut adhuc fiat vel citra omnem talem occasionem. Hoc si fit, imputandum est morbi magnitudini, aut magnitudini. Quæ quidem si mox inter initia citra omnem occasionem hæc facit, non magnus solum, sed malignus est, neque sine maxima naturalis caloris debilitate, ac proinde nihil aliud significatur quam mors: si verò postquam dies multos vrens febris corpus confecti, hæc incipiat apparere, minus est mirandum, & minore malignitate indicat. Significat verò tunc quoque carnes exsuccatas, quod certe si ob copiosam aliquam succi profusionem factum est, easdem habet manifestam, si verò citra illam, significat febris vi corpora sicari. Merito ergo sunt hæc initia marcoris imminenti, in iis quibus pulsant venæ temporum. Nam sunt hæc ob curis extensionem & igneat fulgines, quæ per arterias deferuntur, adeo ut venæ pullare cessant, ubi sentiri non solent. Sed & anxietates, nam quicquid afficiantur, præ debilitate habent anxietates indicibiles. His etiam perit vitalis color & dæcem, fit verò quibusdam in partibus rubor insolitus, ut in genis, ob calidam arteriarum intemperiem, aliis color pallidus ob effusam bilem, aut spirituum penuriam. Itaque dicit. Quibus venæ temporum, & coincidentia eorundem temporum, & colorum mutationes, hæc scilicet quæ dictæ sunt ante indicationes, & quibus indicationes non fiunt, hoc est, non accidentes post aliquam insignem evacuationem, aut quæ adhuc fit, & anxietates, & circumtensiones (cutis scilicet frontis, & antrum, & partium huiusmodi, in quibus præcipue hæc apparent) & colorum mutationes ex rubro in pallidum, si non indicent. Hoc, *ut præcipue*, dicitur de sola mutatione ex rubro in pallidum. Nam talis mutatio aliquando fit decretorie, ut & morbus regius: aliquando symptomatice, significatque tunc sanguinem per totas carnes bilis cere, atque euenit tunc carnes ab ipsa bile quæ imbuitur sicari, ut solent eæ quæ habentur ab ipso sale. Talis ergo mutatio, nisi indicatio fiat, signum & causa est ariditatis corporum. Et ceteris, inquit, circumtensiones, sine indicatione; hoc est, quæ non ob evacuationem aliquam magnam fiunt (hæc repetitio non est admodum utilis, cum dictum antea fuerit circumtensiones. Verum in tam antiquis codicibus non potest non esse aliqua corruptio, & vnius voculæ inutilis repetitio, levis corruptio est) & collapsus oculi, hæc est oculi cavitatis. Corporis durities sicca. Hoc est, dicta si adsint, corporis durities sicca significatur.

Illis qui volentes illachrymant nullum imminet malum, quibus verò involuntaria effluunt lachrymæ, malum;

In prognostico non longè à principio libri dixit Hipp. nolentes illachrymare in malis & exitialibus esse. Cuius rei reddita à me causa in eius loci commentatione est, explicarumque quibus in morbis, & quibus exceptis intelligi debeat: nimirum in acutis, præter causas externas, & peculiares affectiones oculorum. Itaque alietta ex parte non indiget præscripta oratio noua enarratione, id verò quod dicit. Volentes illachrymare non malum, & quod in aphorif. 2. sect. 4. qui idem est cum hac sententia adiecit, perpendendum est. Num significet solum volentes illachrymare non esse malum, vt nolentes, an aliud aliquid: ita scilicet, vt quemadmodum inuoluntariè lachrymate malum est, ita lachrymare voluntariè, bonam aliquam significationem præbeat. Certe si quicumque inuoluntariè lachrymat, potest voluntariè etiam lachrymare, nihil boni potest se significare voluntariè lachrymare: sed est minus malum quàm inuoluntariè id facere. Si verò qui in eo statu iam constitutus est, vt inuoluntariè lachrymet, non potest voluntariè flere, certe voluntariè flere posse, minus malè dispositionis, aut etiam melioris signum est. Videtur autem ita habere. Nam & experimento cognitum est eis qui moriundis hominibus assistent, nulla ex causa eos flere posse. Neque ratio quidem non subscribit epilogistica, quia naturalis tristitiæ significatio est fletus: eis ergo qui plurimum extra naturam acti sunt, consentaneum est talem iam significationem non adesse. Nimirum vt nihil secundum naturam iam agere possunt, ita neque ridere, neque flere. Sed & analogistica ratio accedit. Vt enim cum naturalis partium firmitudo iam labascit, humores inuoluntariè excidunt: ita non possunt voluntariè exprimi, quia ob eandem facultatis remissionem, ob quam non retinentur, neque etiam exprimuntur. Maiori enim constitutione sit expulso, quàm retentio. Excidere ergo possunt inuoluntariè, voluntariè pelli non possunt, quibus facultas quæ regit corpora corrupta est.

Quibus in dentibus circum circa viscosa fiunt, malum est subhiare.

Vbi verti subhiare, dicit Hipp. *ὑμῶν*, significat verò *dentis* apertis, aut infixis oculis aspiciere. Quare *ὑμῶν* est subaperire os, aut suspicere infixis oculis. Accidit verò vitiumque horum hianibus, & iis qui laqueo, aut nimio æstu strangulantur. Apetiri enim ora, & inconniuentibus oculis intuentur. Hoc verò malum esse quibus circum circa dentes viscosa fiunt, constat. Si quidem aphorismo dicitur, quibus circa dentes in febribus viscosa fiunt, iis fortiores fiunt febres: nunc in eandem sententiam addit signum aliud, quod vt ex eadem causa ortum, illi annuendo plurimum valet. Nimirum lentiores circa dentes fiunt vi caloris febrilis, si tamen simul qui eos habet, hier, multò iam manifestius est eos esse ex igne. Nam lentiores fœtasse ob piruitosam fluxionem ex cerebro aut ventre, cum calore etiam exiguo fieri possunt, vt ij materiam potius quàm efficientem causam indicent: si verò per febres iam id sit, ac multò magis hianse homine, iam ab annuentibus signis

A distinguitur ea ambiguitas, & consensu signorum agnoscitur ignis. Qua ratione ergo in aphorismo dicit in febribus, hic adiecit, subhiare. Nam hoc ipsum subhiare, febris fortis est signum. Idem ergo est dictum, febricitantes lentiores fieri malum: aut cui lentiores fiunt hianse, malum.

Qui in tibia vlcus habebat, & Attico vsus est, huic exanthemata eleuata sunt rubra, magna. Hoc pro tussi quæ postea accessit, antea enim non tussit.

Tibia dicitur ea pars cutis, quæ inter genam est & pedem. Nomen accipiens à duorum ossium quæ ibidem sunt, maximo, & crassissimo, quod femori coarticulatur. Atticum, cum simpliciter dicitur, nomen est medicamenti compositi, antiquis familiaris, & ad curanda vlcerata compatiati. An eius compositio alicubi iam extet an solum nomen relictum sit, non satisfaci. Parum refert. Non enim arbitror, quia cum vlcus haberet in tibia, Attico vsus est, superuenerunt huic homini exanthemata, vt neque quia vlcus in tibia habuit: sed euenit, vt huic ea parte vlcerato & eo medicamine vrenti exanthemata superuenerint. Fortasse (nam hoc consentaneum est) quod cum id fieri vlcus maxime postularet, non est euacuatum, & expurgatum satis. Plenis enim & maligna cacochymia laborantibus, fieri solent exanthemata. Facta ergo huic sunt eleuata, rubra & magna, eas scilicet quæ variolæ ob varorum similitudinem vulgò vocantur. Sunt verò multæ inflammatione malignæ. Hoc, inquit, pro tussi quæ postea accessit, antea enim non tussit. Semper solent exanthemata huiusmodi, variolæ inquam & morbilli, tussi quadam prægressa præmonitari, incipientibus, arbitror, eruptionibus secundum internas membrantarum facies in ventribus, & cauius corporis partibus, locis præcipue calidissimis, vrinthorace fieri. Quæ passione procedente, ventriculi efferationes, & dysenteriae satis periculosæ fieri solent. Itaque, huic factum est, vt solum. Cum antea vlceret solum tibiam teneretur, neque tussiret, postea tussit. Deinde pro tussi, hoc est ex tussi, seu post tussim (quasi tussis in malum hoc aliud abire videretur) facta sunt exanthemata, eleuata, magna, rubra.

In Aeno horrore concutiebantur quicunque capitis vulneribus laborabant, malignè sese habebant, & pus colligebant. Post tensesum ex itinere pedum dolor, aderat, & in perturbationibus lassitudines. Ex quibus Clinia cibos fastidiebat, contabescebat, & purulentum quid deticiebat, aliquando sanguine pauco conspersum, aliquando merè purulentum intumescebat.

Dictura est lib. 2. huius opetis sectione 4. fuisse in oppido Aeno tempestatem quandam morbosam, quæ ex fame processit, ita vt sit, vrentibus multis & viris & mulieribus leguminibus in tri-

fici penuria. Non dixit autem Hipp. eo loco qualis fuerit species malignorum morborum, qui ea tempestate grassati sunt: sed solum exitum quemdam notata dignum, quem multi habuerunt, quibus curam impotentia, & genus dolor facta sunt, & vique ad vitæ finem durarunt. Hic narrat quædam eorum quæ à principio, & procedente morbo acciderunt, vnius mulierculæ, Clinie domine, quæ fortè, vt multi alii tunc, ægrotauit, mentione facta. Horrores & rigores intempessivi, & sine febribus & per febres sinot ex redundancia crudorum succorum. Proinde & iis qui putrescentibus multis & crudis febricitant, febres horridæ sunt. Nullus autem victus magis patatis est febres tales facere, aut etiam sine febribus horrores, quàm esus leguminum. Hæc. n. omnia sunt mali succi, & flatulosa, & coctui difficilia. Vnde crudis & malis succis, flatuque replent. Febres ergo faciunt meritis malignas, vt pote ex putrescentia malignorum: horridas aut etiam sine febribus horrores, ob cruda & flatu. Cum viceribus mali moris, & suppuratoriis, hoc est, dyspneis, accurata difficultibus, & pus multum fundentibus. Nam ex crassis & crudis multis copiosum pus prouenit. Nimirum ipsum pus simile est crudis succis. Maligni autem succi faciunt vlcera rebellia. Fiebant verò hæc tempestate in capite vulnera dicta, flatu effertente in illud actus malignorum succorum partes, & cerebro, vt pote parte nobili & forti, extrudente à se malignos succos. Patiebantur etiam simul crurum impotentiam crassis succorum patibus (vt lib. 2. dictum est) deorsum repentibus. Hanc ob causam, habebat post tenesmum extirpare pedum dolorem, hoc est, si iter agebant, aut ambulando tantillum defatigabantur, motu crurum deorsum trahente, tentabantur. tenesmo deinde dolore pedum corripiebantur. Et in turbationibus, inquit, lassitudines, hoc est, turbationes, ac lassitudines *τὸν πότον*, hoc est turbationes vocat Hippoc. humorum commotiones, atque ita corpora turbata dicit, agitari humores, vt id nauigatoribus accidit, aut iis qui pharmaco commouentur, aut vehementi aliquo corporis motu. Et alii turbationem, deiectiones copiosas subsequi, quæ commotis humoribus & alio soluta sunt. Itaque *τὸν πότον* hæc turbatio est. Nam turbationem animi, & timorem vehementem vocare solet *τὸν πότον* vt in prognostico, vbi dicit significare turbationem, aut delirium. Hic ergo turbationes alui videntur intelligi. Nam et si corporis intelligi dicas, in idem tendit. Quia corpora turbata dicuntur, cum commoti humores effunduntur vomitu, aut deiectione, aut vtroque modo simul. Cum ergo horum multi tenesmo & dolore genium & pedum, & eorumdem tenerentur, congenere etiam his reliquis passionibus fuisse coelectandum est, turbationes scilicet alui, & reliquorum etiam articulorum designationes, & lassitudines. Nam flatulosi, & prauis, crassique succi cibi, ambo hæc facere admodum nati sunt. Flatus enim tormina intestinorum, & prauis succi inordinatas excreciones, crassi verò articulares passionibus, impotentie verò articulorum & oernorum mor faciunt lassitudines. Lassantur enim ita affectis corpora vel sua ipsorum mole. Itaque habebat vitus tempestatum ægroti lassitudines articulorum, & alui

turbationes. Inter quos Clinia desicibat & eorum purulentum quiddam, & aliquando parum purulentum, & subcruentum, aliquando purulentum subcruentum, hoc est, inslarum & spumosum. Etat verò interim cibum auersans, & colliquescens. Tres deiectionum species describit, purulentam, & partim purulentam partim cruentam, & purulentam spumosam (quid enim aliud potest tumentem deiectionem reddere?) Porro purulenta dici videtur posse, vel quòd sit puri similis, vel quòd aliquid veri puris in se contineat. Velut etiam cruenta dicitur, quæ cruentis aliquid habet. Puri similes deiectiones sunt, quæ crassæ, & albæ, talesque, vt intuentis dubites, sintne reuera pus, an aliquis alius succus. Tales verò sunt quæ piogues. Nam ex liquata pioguedine, cum aliquo alio succo permixta, fit succus quidam buisimodi. Hæc verò sunt corporibus colliquescentibus. Quomam ergo dicit Hippocrates hanc fuisse fastidiosam, & colliquescentem, in hanc nos ducit coniecturam, vt suspicemus deiectiones fuisse pingues, puri similes, ob colliquescentiam factas: interim tamen aliquando ob hepatis debilitatem sanguinis aliquid cum eis descendisse: interim vias ipsas exisse spumosas ob eandem sane causam. Nam spuma, vt Gal. dicit in prognostico, flatum, aut calorem igneum ac colliquescentem indicat. Hæc verò omnia accidunt mulieri illi non immerito, ob statum morbi qui illo tempore grassabatur, & conditionem prauis victus, quòd homines tunc vti esse dicuntur. Nam per putrescentiam prauorum succorum & flatus redundanciam, quæ ambo ex leguminum esu colliginecece est, fiebat hepatis debilitas, colliquescentia, & spuma. Si verò illud *τὸν πότον*, seu purulentum significat quod in se habet puris admixtionem, constat significari, mulierem illam habuisse vlcera aliqua interiora, ex quibus nunc pus solum, nunc pus & cruor exometentur, non dissimilis iis quæ in externis partibus, ac præcipue in capite multis tunc fiebant maligna & suppuratoria. Colliquescente autem corpora ob hæc ipsa vlcera, & internas partes supparari, multis euecit. Fastidium verò prauorum succorum redundanciam, & igneo calori familiare admodum est. Quare qui vifibrium colliquescentiam tabescunt, cibos auersantur.

F *Mulier Hippei Hydropica, quæ etiam per tres annos vere incipiente tæstis, diutius suppurata est. Circa hyemem aquosa est facta. Illis autem pharmacis purgata, firmata est. Mortua est ancilla.*

G Dubitare possis, an in hac oratione continetur duæ historię, altera mulieris illius Hippei suppuratæ & hydropicæ, altera ancillæ illius, siue ipsiusmet Hippei, siue alterius quæ mortua est, an non, sed eadem fuerit mulier illa, & ancilla. Nam et si Ianus Cornarius legat, vxor Hippei, vt alia fuerit vxor ab ancilla, tamen Hippo. dicit *τὴν κούρην*, id est illa Hippei, mulier scilicet, siue vxor, siue filia, siue familiaris, siue ancilla. Videtur tamen consensum, non vnicæ sed duarum mulierum historiarum hic narrari. Nam altera confirmata fuit pharmacorum usu, altera mortua, quæ duo non viden-

tur posse bene de eadem dici. Sed cum Hippocrates scriberet hæc, observando quos exitus morbi haberent, & scripta historia mulieris quæ ab eo morbo pharmacia est liberata, recordaretur cuiusdam ancillæ quæ ex eodem morbo mortua est, gratia fuit observationis adiecit, mortua est ancilla. Sed hoc non multum refert, naturam morbi contemplerur. Suppurati dicuntur, qui pus excreant, horum quidam breui ex inflammatione in suppurationem mutata tales evadunt, ut ex peripneumonia, aut pleuritis: alij non ita: sed diutino pulmonis, aut thoracis morbo detenti tandem pus excreant. Huiusmodi sunt qui ex assiduis in pulmonem destillatione, aut succorum paulatim congectione, aut crudorum lateribus hærentium putrescentia, illud incipiunt ex tussire: quorum plerique evadunt pthysici. Tale quiddam passus est hæc mulier, quæ per tres annos vere incipiente tussi vexata est. Nimirum succorum redundantia vere maxime uocetur, & huic ob naturalem earum partium infirmitatem, autem fortasse etiam structuram, occupabant spiritus vias, & coquebant tussire. Siue id ex capite deflueret: siue ex toto corpore conflueret: quod, ob ea quæ dicam, verius puto. Congesto tandem succo pluri quam extulsioretur, contigit alteri, ac fieri pus. Neque tamen hic constitit noxa: sed exactis his, ineunte hyeme aquosa est facta, vel pulmone trabente ad compassionem hepar, vel calore naturali iam debilitato ob incipientem pthysim: vel quia mulier (ut fieri solet) ad solvendam spiritus angustiam nimio utebatur poro, & aeris frigus ex anni tempore accedebat. Addis, illis autem pharmacia curata, firmata est. Non dicitur quibus. Pures pharmacia hydragogis, hoc est, aquam vacuantibus [his enim curatur hydrops] sed quo pacto his liberaretur a puris excretionibus? Aut quo pacto ab hac non liberata, firmitudinem, hoc est, firmam salutem compararet, ac non potius tabesceret? Ego proinde suspicor hæc pharmacia nomen, non de solo expurgante per ventrem dici, ut aliquando solet: sed aut pro omni medicamine, ut solet etiam, aut pro omni medicata portione, atque voce, illis, referre medicamentum aliqua, quorum antea facta sit mentio, et si ex hoc volumine intercedere: aut dici figurate, ut ea vocula significetur insignia, & ad eam rem magna iudicamenta: ea vero esse momenta mensuræ purgationes. Nam perraro mulieres morbi hunc decursum tenent, nisi ob menstruum suppressionem, ob hæc vero sepe spissimè is qui detentus est præter naturam sanguis occupat primum vias spiritus in thorace, deinde naturalem in hepate calorem suffocat. At qui has passiones, cum eo usque progressæ sunt, nunquam videmus curari, nisi superueniente illa evacuatione, quæ ut cum maximo periculo detinetur, ita cum tanta utilitate erumpit, ut ea mulieres multæ curatæ sint, quæ videbantur insanabiles, ut nonnunquam res sit miraculo similis. An hoc innuit dicens, *multis de passiones morbi*.

A hoc patiebantur iussientes. *Qui autem æquitarunt aut iter fecerunt, ijs in lumbos & femora decubuit. Sicæ autem erant ut plurimum tusses, sin minus violentæ.*

Tusses sicæ sunt, per quas in vanum laboramus & omnino excreatur nihil. Violentæ, per quas excreatur quidem aliquid, sed exiguum & cum magno labore. Fluit verò tades, vel ob intemperiam nudam instrumentorum respirationis, vel ob maximam materiam cruditatem. Intemperiam nudam fuisse causam horum morborum, non est consentaneum, siquidem tam insignes habebant abscessus. Patiebantur enim paralyticis iussientes, quamquam non eandem omnes partium, sed quibus earum quibus maxime laborasset. Nam quidam qui laborabant manibus, ut puer qui sarmenta torquebat, & puer alius Amyntæ, qui etiam laborabat manibus, liberati sunt ambo à tussi, resoluta dextra, ea nimirum manuum parte resoluta, qua maxime laboratur, præcipue verò ab iis qui sarmenta torquent: qui verò æquitarunt, aut iter egerant pedibus, lumborum, aut femotis resolutionem patiebantur. Nimirum iter agentes lumbis, æquitates femoribus, & utrique utrique partibus maxime laborant. Didum verò ab Hipp. est. 4. aph. Quibuscumque resurgentibus ex morbis, si quid laboraverit, hic sunt abscessus. Dicitur verò in aph. nomen laboris, & de dolore, & de vehementi motu: ut & lassitudinis nomen in 31. de spontanea & non spontanea.

Vxor Emmyris cum morbo affecta non appareret, sine febre stupida esse videbatur. Deinde in tremorem totius corporis collapsa est, & colliquistionem, & cibi sustinere & sitim, & frigida erat.

Hæc mulier primum videbatur esse fatua si bre, *et ipse in videret*, sed ut esse videretur fatua, ut quædam alia quæ naturaliter tales sunt. Deinde correpta tremore incidit in febrem malignam, colliquantem, & generis ea rum quæ dicuntur lypyria, per quas exteriora frigeret, & interiora uruntur, & sitim habent: fatuitas ob abundantiam piruitosorum in cerebro perle, aut per consensum fit. Constat igitur mulieris & crudis restagnasse huius mulieris vel corpus totum, vel solum caput, aut ventriculum, utrumque: aut pulmonem, aliamque partem quæ caput in sympathiam trahebat. Verum quoniam ad totius corporis tremorem res venit, totis muscularis debilitatis ex aggravatione (intelligo enim hoc nomen tremoris proprie, pro eo qui ex animalis facultatis impotentia procedit, accipi) constat totius corporis fuisse illam cacochymiam, maxime autem cum successisset (putrescentibus maligne excrementis in proximis cordi locis, aut magna & maligna intestini inflammatione oborta) febris lypyria. Nam si ea redundantia ad solum cerebrum pertinuisset, omnino factus esset lethargus, aut passio aliqua apoplectica. Consentaneum ergo est, ob redundantiam totius corporis, occupatum imprimis el-

Ex iussientibus qui manibus laborabant, velat puer qui sarmenta torquebat, & Amyntæ filius, ambo cum sola dextra esset resoluta, cessante tussi, quandoquidem

fe ei caput, factamque fatuitatem, crescentemque aggregatione instrumentorum motus, factum tremorem, mox verò humorum copia (vt fieri solet) degenerante in putredinem, & magnam aliquam inflammationem internam, factam esse febrem perpetuam. Non mitum autem ex frigidis & crudis, qualis fatuitas significabat, factam esse febrem colliquantem, & lypthyam. Nam liquare, & naturalem calorem trahendo consumere, non cerui cuiusdam succi est, sed malignæ putrescentiæ, quæ cuius in loco potest accidere, cui putrescentia. Nam & in veris inflammationibus, & ardematis, & scirrhis, & omnibus ad hæc genera pertinentibus tumoribus, videmus nunc fieri simplices, nunc malignas putrescentias. Itaque ergo potest in febribus euenire, nam ex succo subiecto frigido potest vrens febris fieri, ob modum putrescendi. Accedit quoddam euenit aliquando multiplicem fieri cacochymiam, quoddam dæpntesve species; excrementorum simul redundent, aut etiam aliam in vna aliam in alia parte esse. Vt si bile mulieri pituitæ & bilis fuerit redandantia, & pituita in cerebro, bilis in hepate, aliaque parte, & illa prioræ, hæc posterio-rem passionem fecerit. An simplex fuerit cacochymia, & modus alterationis tantam passionum differentiam fecerit, an multiplex, ex aliis signis oportuit agnoscere, præcipue ex exanthemibus, adiunctis hominis naturæ, & anni tempore, & antea-cto victu.

Nythalopæ autem, qui plurimum minge-
bant, posset exiguum quiddam. Iis vi-
rò cum tussissent & insuper febricitassent,
tumoræ prope aures erumpébant circa septi-
mam aut etiam octauam diem.

Nythalopia est visus imbecillitas, per quam no-
ctua nihil, & in crepusculo exiguum videtur, tamen
si interdiu videtur bene. Constat esse eum affectum
acui oculorum hebetudinem, aut spirituum tras-
fieri, & exiguum fulgorem. Si quidem indiget ma-
gno fulgore actus, vt possit recipere visibilibus spe-
cies: passio contraria ei, per quam interdiu exi-
guum, & noctu aliquantulo plus videtur: quod sa-
nè fit oculis & spiritibus terfis, tenuibus, & ful-
gentibus, cuiusmodi videmus esse nocturnus. Talibus
enim diei fulgor emittit tanto fulgore interno cõiu-
ctus sit nimis, & nocturnus est satis. Ergo vel
hæc ratione constat nythalopiam ei passioni con-
trariam in contraria affectione habere essentiam,
essetque trasfieri ac opacitate, aut spirituum
aut verorumque. Constat verò nisi in natura mem-
brarum, succorumque oculi, aut spirituum sit,
ex redundantia excrementorum plerumque pitui-
torum ex cerebro in eum locum confluendum
produci. Quibus excrementa in cerebro sunt, non-
nunquam sunt spontaneæ reuersiones in inferna,
ventrem inquam aut vix vias, & ita, si euacuatio
satis producat, contingit liberari, velut sorditas
fluente alio cessat: nonnunquam detractiones que-
dam ad vicina, & harum quædam sunt per conse-
nientes regiones, vt eruptiones ad glandulas que
post aures, aut in ceruice sunt: quedam per non
conuenientes, vt defillationes in pulmonem, aut

A ventriculum: nonnunquam etia detractiones per pro-
pria emunctoria, vt per nares, aures, & palatum.
Cum ergo essent quadam tempestate multi, capiti-
bus excrementosi, quod nythalopia indicabat, pri-
mum incipiente copiose mingere, pituitosi & a-
quosius descendentes. Verum hæc per vnam ex-
purgatio non satis producebatur, sed ea cohibita
intempestinè, eueniebat deinde exiguum quiddam
mingere, minus etiam quam alio qui soletent, quod
recurrit humorum in superna declarabat. Eo ergo
defluxu intercepto, neque cerebro degravato,
necesse erat aliquid alia via erumpere, ciebat ergo
defillatio in pulmonem, quare cessante copio-
sa mitione tussiculosi fiebant. Verum cum pro
magnitudine prioris: exigua euacuatio dā esset,
quæ inculcata erat: in cerebro, multitudine pu-
trescente, febris superueniebat, à qua, cerebri fa-
cultate expultrice abscessum faciente, septima,
aut etiam quibusdam octaua febris die, post au-
res tubercula, nascebantur. Non dicit quid deinde
factum, merito tamen credas, quoddam libe-
ratos à cerebri passione & à nythalopia, quoddam
non, aut non omnino. Nam vt euacuationum
decretorium, ita abscessum est dispar conditio.
C Ij præcipue liberauerunt qui septima eruperant,
illi minus qui octaua. Non enim solum in eu-
acuationibus interit multum quo die fiat, sed &
in abscessibus. Nam vt nuper ab ipsomet Hippo-
crate dictum est, habenda ratio est circumstanti-
um, in quibus iudicantia, tuncenda, etuenda, & non.

Emyris filius febricitabat & purulen-
tum quid exfluxit ex aure: an circa octa-
nam diem non scio manifestè.

Inflammatione potiùs auditorij censendum est
puerum hunc laborasse, cui coniuncta est conti-
nua febris, simul etiam habuit eius partis dolo-
rem (fortasse autem habuit, & doloris non me-
minit Hippocrates quod puer infans esset, & do-
lorem non posset declarare) in talibus enim ex
febre continua & magna, cui puris eruptio su-
peruenit, intelligimus affectionem esse auris: in-
flammationem. Est verò morbus puens satis fre-
quens, & qui in illis plurimum latet, quia neque
qua parte dolant possunt dicere, neque si deli-
rent, vt quibus magna est ea inflammatio agno-
scere possit. Atqui ego multos infanum, qui
post acutam febrem conualluntur, hoc malo pe-
rire suspicor, coniectans id ex iis qui euadunt,
post febrem eiusmodi pure ex aure effuso. Ij
enim ipsi, nisi ad suppurationem res venisset in-
cognita affectione perissent. Proinde intel ea
que puerulis febricitantibus acutè, tentando a-
genda sunt, consilium purò, aliquid mitigato-
Frium, & concoctorium auribus infundere, vt
primum quidem rosaceum, deinde verò chama-
mælinum, aut ex dulcibus amygdalis. Quid enim
mali inde fiet? Euenit (si res ita habuit) huic pu-
ero, iuxta id quod caput. 19. prognostici dicitur,
ubi ita scriptum est. Aures acuto dolore affici cum
febre continua & vehementi, græue est: periculum
enim ne homo desipiat & moriatur. Cum ergo
fallax hic locus sit, celenter oportet animum ad-

uertere omnibus signis à primo die. Moriantur verò ex tali morbo iniiores homines septimo die, aut citius, seniores verò multò rardius. Febres enim & deliria minus ipsis accidunt, atque ideo aures possunt suppurari. Verùm his ætatibus recidivæ morbi accidentes plurimos interimunt. Iniiores verò antequam aures suppurent moriuntur. Si aurem fluit pus album iuniori ex aure, spes est eum superviviturum; si aliud etiam opimum signum ipsis accidat. Hæc Hippocrates, ex quibus constat, ut in commentario eius loci explicuimus, iunioribus periculosum adeo esse hunc morbum, ut sæpe moriantur ante tempus suppurandi, aliquando tamen etiam suppurare: idque cum fit, intra septimum fieri, & salubriter, si pus fiat album. Hic filius Emmyris exemplum exhibet iuniorum quibus suppuratio fit, quandoquidem aurem contigit Hippocrati videre id die octava febris, & raxum est ultra septimum in iuniori produci pus ex aere eruptionem, mitatus est: & quia fieri potuit, ut, etsi id Hippocrates non animadvertent, die septima cæperit, deit, effluxit purulentum quid, an circa octavam diem, non scio manifestè, scilicet, an tunc primum, an antea cæperit. Sen autem nullus aures dolor huic puero fuit (fieri verò etiam ita potuit) coniectandum est, febrem ex putrescentibus in capite succis pependisse, & evacuationem hanc circa diem octavam, aut fortasse etiam septimam (non enim satis certus Hippocrates est) tenuisse naturam, ut per emundatorium non parum capiti familiare. Itaque fuit non suppuratio in aure ipsa facta, sed abscessus ex capite, eius generis, de quo aph. io. part. 6. ita est scriptum. Caput dolet & circum dolenti pus, aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut os, aut aures soluit morbum. Velut quibusdam aliis in dētes factos fuisse mox dicit.

Quibusdam autem etiam dens fuit corrosus, præcipue tertium ex supernis. Præ omnibus autem hic reperiebatur corrosus, in hunc dolor, & quibusdam etiam circa ipsum pus colligebatur: Quibus autem circa aures, hi vehementer tussiebant, & magis quam illi.

Didum antea est in hoc ipso quattolibro, quod parte prima huius orationis dicitur, putà tertium dentem superiorum, omnium maxime solere pati dolorem, corrosionem, & supurationem, diutiusque est eius reicausa. Nunc quod addit oportet explicemus. Cur scilicet i quibus in aures puris abscessus fit, solent fortiter tussire, magis quam illi quibus in dentes. Mihi sane videntur aures maiorem resistuntinem habere cum partibus internis cerebri quam dentes, & hos cum externis quam aures. Internæ autem cerebri redundantiæ videntur in laryngem & asperam arteriam, atque adeo pulmonem incumbere, externa autem in maxillas, dentes, & buccas potius. Ergo autem supurationes, seu pus puris per aures eruptiones internæ cerebri redundantiæ signa sunt, velut corrosio aut dolor dentium, aut buccarum tumores, externæ. Quare magis tussis movebitur, quibus aures pus effunditur, quam quibus dentes laborabunt. Unde etiam licet colligere detrioris gravitatis ca:

A pitis esse rursus ob destillationem, quàm secundum maxillas, buccas, dentes, aut etiam nares patialiquid.

Quibus autem tumor vertitur in supurationem cum febribus, hi liberantur septima.

Cum acutis febribus intelligit, dicens ut *myrta*. Quibus ergo ad supurationem, id est, pariter aures excretionem venit, laborantibus acuta febre, eos *amara* dicitur. Nam cum acuta febre pus generati inflammationem significat, inflammationem autem in quavis parte capitis cum acuta febre coniuncta constitutio longissima protergetur usque ad septimam, præcipue verò in iunioribus natu, ut Hippoc. in cognoscendo nuper citato dicebat. Merito ergo quibus febribus acuta res venit ad supurationem, iis septima die erumpit pus, & soluitur febris. Adeo ut cum Emmyris filio circa octavam videretur pus fluere, non satis id crederet Hipp. fed suspectus à septimo corpore dixerit, an circa octavam non scio manifestè.

Postquam exacerbatus est hypochondry tumor, non est solutus: alio autem emollita inerat exigua, subviscida, compacta, non bona. Urina erat sanguinei coloris. Spuebat spumofum.

Hæc verba haud dubie aliunde decisa sunt, non continent integram narrationem, sed egroti cuiusdam (cuius fortasse nomen hinc vetustas sustulit) contigisse inter alia quiddam narratur, quod sciri dignum est, putà exacerbatus esse ei hypochondriacum morbum, hoc est duritie, & dolore correptum, & ex quo exacerbatus est, non esse hominem solum, hoc est, suppressas esse ei evacuationes consuetas, donec emollito rursus hypochondrio cepit deiecere ex alio exigua subviscosa, compacta, non bona: & urina facta est *alveopurida* & spuebat spumofum. Hic eventus haud dubie significat sanguineos & pituitosos succos esse ob morbi vim, & partium debilitatem in hypochondrio collegisse, indeque rursus remittentè malo, & facultatis pæne dimissa, hæc & illa cæpisse effluere. Est verò per acutas febres gravissimum, exacerbato hypochondrii tumore evacuationes consuetas fisti, quia significatur humores omnes eo vi inflammationis trahi: rursus cum totum hypochondrium, aut altera eius pars tumet, evacuationibus plus solito exantibus, hypochondrium emolli bonum est. Nam ut Hippoc. in aphorismo dicit, splenis dysenteria accedens bonum. Eadem autem ratione iecoris deiectione, & mictu prodest. Illa enim caua, hæc gibba eius partem vacuat: spiritum etiam spumofum fieri potest, regurgitantibus in pulmonem, quæ ex hypochondrio erumpunt. Verum ea evacuatio non est probanda, ut priores, non enim per convenientem regionem, ut illæ, agitur. Sed quales deiectiones habuerit, oportet explicemus. Exigua, inquit, subviscosa, compacta. Constat hæc deiectiones fuisse ex crudis, crassis, & lentis, quæ ab oppilationibus erant: quod ut inuenerit, addit, non bona: id est non per concoctionem, ut solent compactæ, sed, quod ex crassis

crudisque essent, & pituitosis. Sanguis etiam crudior, qui impaetus hæret, corpus loco solutus, in vrinæ vias derivatur, & vrina coloris sanguinis fit, & regurgitante etiam sursum humore atque car-nem pulmonis occupante, cepit spumolus spui.

Ille ad quem Cynicus me deduxit, septima exacerbatus est, circa decimam quartam autem indicatus est hordeacea prava expectoravit, vel sensim evanescentia portendebant mala) cum puras haberet fauces, panca, lata, & concocta expuit; paucus è naribus stil-lavit sanguis. Huic capitis grauitas, & ma-nuum & crurum dissolutio accidit. Alius soluta profuit, pedes semper caluerunt, huic somni aderant, nec quicquam innoxia aures accidit, quod concocta expuisset.

Hunc laborasse febre acuta, vel dies qua indica-tus est, indicat. Acuti .n. quatuordecim diebus iu-dicantur, exacerbatus verò est illi morbus die septima, iuxta legem constitutionis legitimæ, iux-ta quam dimidio totius constitutionis tempo-re, solent incipere morborum incrementa. In hoc præcipit, laborabat caput succorum putrescen-tium multitudine. Nam ob hanc capitis grauitas accidit, & paucus sanguis, è naribus destillauit. Et somni ei aderant, quod non solum indicat ca-pitis passionem, sed & facci speciem. Non enim is erat fumus biliosus, alioqui delirium ac peruig-iliam fecisset potius quam grauitatem, & somnos. Erat ergo biliosus nouum (nam ab hac specie un-quam omnino absunt acutæ febres) cum sanguine crassiori & pituinosiori. Cum ergo multas ac mal-tiformis in capite redundaret, factum est, vt fluxio in partes cum eo consuetudinem habentes derivaretur, in pectus scilicet & spinalem medullam: unde euenit vt ex thorace prava primum, deinde cocta spuerentur, & ob medullam spinæ mapus & crura resoluuerentur. Sanguis è naribus fluens non potuit hominem liberare, quia fluxit paucus. Quare vt si-gnum quidem prauus fuit, vt causa verò, inutilis. Profuit verò alius soluta, eadem scilicet ratione, quæ solet solvere sordidatam. Expectabatur tuber-culum huic secundum aures, quia vt in febribus laboriosis, & quas lassitudo comitatur, expectan-tur abscessus ad articulos: ita & in febribus tantibus cum capitis grauitate expectantur tubercula ad au-res, à quibus præteruare poterat fluxus copiosus ex naribus: verum quia huic factus fuerat exiguus, ex-pectabatur merito tuberculum à quod non est fa-ctum, quia spuit concocta. Per morbi decursum, portione parata ex hordeacea farina, excretauit pra-ua, hoc est, excrementa prauis & vitiis, colore & substantia prædita, quæ circa fauces hærebant. Deinde verò paritiam faucibus, ex pulmone extulit pauca, lata, concocta hoc est, crassa, nam quæ verò concocta sunt, non sunt lata, aut rotunda, sed crassa sine lentore, neque tam compacta. Rotunda verò, aut laxa (quæ etiam ob crassitudinem cocta aliquando Hipp. vocat) sunt vi febris flocatis ex-crementis. Verum quando excretauit concoctiorum & liberauit cum alui fluxione à febre, & præserua-uit ab abscessu, suspicor post dicta, ad morbi finem

A bene concocta & multa spuisse. Multitudinem ergo fluxiliorum per alnum decit, crassa verò, & quæ non longè à parte potuerunt fluere, excreant. Ad quam rem accommodatissimæ sunt portiones, & e-clegmata, quæ parantur ex hordeacea. Exergerit enim optimè, & spiritum cognit, quæ per febres sanè omnibus quæ ex melle parantur, merito præ-feruntur, ob frigidam & humidam naturam. Pedes calidos semper fuisse, febrem assidnam, & quæ ne-que rigore, neque infestatione interrumpere-tur, significat. Porro cum qui Hipp. deduxit, Cy-nicum proprio nomine vocari intellige, non ex pro-fessione, quia nondum nata erat Cynicorum scho-la. Catarrum pro apertum .i. farinæ hordeacea, vt perperam legisse videtur Valesius, legendum præparatum, vel præparatum, vt sensus sit, tumores pau-latim marcescentes ægro malum portendisse.

Demarati vxor pedes etiam in horribis calidos habuit, siue in suppurationem tenderet, siue non, mortua est.

C Oculæ suppurationis suspicionem habuit Hip-poc: in hac ægrotâ, non tamen certò cognouit. Oculam suppurationem voco internam, ea verò est, vt ipsemet libro de morbis dicit, in superiori ventre, hoc est, in thorace, ad quem pertinet pulmo, & ipsa latéra (cor enim non sustinet eam passionem) aut in inferiori, ad quem pertinent om-nia quæ sub pectore transverso sunt inter iungula & alas. Finit verò hæc ex timonibus præter naturam, vt ex pleuritide, aut inflammatione intestini, renis, aut vteri: vel ex vlcere, vt ex hæmo poica passio-ne, aut etiam nonnunquam, citra hæc, ex pituita non expurgata, ac propterea putrescente, velot ex catarrhis aliquando, non quidem prius facta pbleg-mone, aut exulcerato pulmone (tametsi id quoque fieri solet) sed aliquando hærente solum ea quæ destillat pituita lateribus, & ibi putrescente, vt Hipp. loco citato auctor est. Vt cumque, vbi pus continetur, putredinalis calor partes corrigit, qui etiam per totum corpus deducitur, atteritis fuligin-es putridas recipientibus, & ob hunc tam fixum, vt quis dicat, calorem, colliquefunt carnes & cor-pora tabescunt. Fientis suppurationis signa scribit Hippoc: in prognostico, dicens, considerate au-tem oportet principium suppurationis futuræ, fa-cta suppuratione à die quo primum homo febricitauit, aut quo primum illi rigor præhendit, etsi dixerit pro dolore pòdus ipsi fieri, in loco quo do-lebat. Hæc enim in principis suppurationum sunt. Suppuratorum iam signa scribens, mox subiungit. Suppuratos omnes agnosce oportet his signis, primum quidem si febris non intermittit, sed per diem minus est, per noctem maior, & sudores mul-ti superueniunt, & tussis fortis fit, & excreant ni-hil mentione dignum, & oculi caui fiunt, & maxillæ sunt rubentes, & vngues manuum curuantur, di-giti anrem, calenti: & maxime extremi. Dicta à me est in commentatione huius loci causa, quia digiti extremi calent suppuratis, ea est quam paulò ap-te retigit. Deserunt scilicet venæ & arteriæ fuligin-es putridas, quæ extremis artibus expirant. Cum ergo hæc mulier per longam tempus laboraret

& habet assiduum calorem pedum, etiam in horribus, suspicatus est Hipp. in suppurationem abire, quia horribus inordinati ad suppurationem ire morbum indicant & calor extremorum pedum purarationem factam. Verum cum fortasse alia signa viderentur desiderari, insuspicionem coniectas est, & suspicionis causam insinuans dicit, pedes etiam in horribus habuit calidos, siue in suppurationem tenderet sine non, mortuus est. Meritis autem dubitavit, nisi alia multa adfuerint signa. Nam non suppurationis solum, sed alius etiam solet hoc accidere morituris, his scilicet quibus malignus venenatusve humor intra corpus collectus est, aut venenum etiam haustum. Talibus enim etiam mortuus calor putredinalis solet per extremas corporis partes expirare. Itaque constat, aut ex suppuratione, aut maligna febre quam mali moris vocant, mortuam esse hanc mulierem.

Senex qui mortuus est egrotabat simul cum sua uxore languida, cui oculum maniacum quid inerat. Postquam autem exinisset lumbricus sabcrassus, & paucus cibus, statim melius habuit, & dormiuit, & sanis erat hic senex. Et cutis corporis circumtensio aderat, extrema frigida, mollis erat, & ab initio tremulus & labilis, & manibus, & voce. Motus est mente moderatè, hiebat, non valde difficulter spirabat, diebus nescio quot ultra viginti mortuus est.

Egrotans, id est teneri, & si spuri seu detentus, solet dicere Hipp. eam qui morbo teneretur non leuiter, velut in aphorismo dicit *ἀνδρῶν τῶν ἀσθενῶν* id est, ei quid febre teneretur, & rursus *ἐν τῷ αὐτῷ τῷ ἀσθενῶν*, id est, à febre ardege occupato. Ita nunc dicit *ἄρῃ τῶν ἀσθενῶν*, id est, tenebatur senex, quasi dicat, tenebatur morbo & grauiter egrotabat. Hic senex vt ex ipsa narratione constat, habebat uxorem quandam debilem, & nonnullam maniacam, etsi non adeo vt manifestum id esset, sed vt multis euenit, quod dissimulari poterat, ac celari. Contigit hunc senem simul cum sua uxore egrotare ac mori, qui euenus vix potest rarus memorie haberi, quo factum est, vt Hipp. quæ seni acutè egrotanti eueniunt volens narrare, hæc præscripserit. Senex qui mortuus est simul cum uxore sua debili, languida, cui oculum maniacum quid inerat: ille loquam senex tenebatur, id est grauiter egrotabat. Persequitur his dictis narrationem morbi, in qua bapd dubiè quædam desiderantur. Nam intermissam esse dictionem, & quædam verba sublata esse constat legenti. Dicit enim postquam egrotasset exinisset lumbricum sabcrassum & paucum cibum, statim sedatū esse morbum, & dormiuisse senem, & sanum factum esse. Videtur autem nimis ex abrupto dixisse illud, postquam exinisset lumbricus. Cum non dixerit antea quo morbo egrotaret, an febricitaret, an non, an parte aliqua doleret, siti aut fastidio vigeretur, an peruiigilio, aut tali aliquo, vt narrare solet. Sed cum tantum dixisset *ἄρῃ* adiecit modum quo sedatus est. Sed permittamus vt illo verbo *ἄρῃ* significetur graui morbo teneti, & febre magis, & in-

A quietum vigilemque esse dici per insinuationem, quia adiecit, melius habuit & dormiuit. Verum illud ferendum non videtur vt dicat, sanus erat senex hic, & corporis cutis circumtensio aderat, extrema frigida, mollis, tremulus. An simul sanus erat, & habebat hæc? Non sanè fieri potest. Sed constat hunc exeunte lumbrico cum paucio cibo quiescisse, dormiuisse, & liberatum esse à febre, ant omni modo, aut ita sanè vt sanus factus esse videretur, deinde vero post dies aliquos (nō enim dicit quot) factam esse ei recidnam priori morbo longe grauiorem, à qua mortuus est cum bis signis quæ apponit, cutis inquam circumtensione, extremorum frigore, extenuatione, tremoribus, mentis alienatione, hiatu, & difficili respiratione. Hæc enim omnia in febribus continuis lethalia esse, pluries in prognostico, & a phorismis, & alibi dicit Hipp. haud dubiè ergo vetustas sustulit verba aliquot inter illa, sanus erat senex hic, & illa, & corporis cutis circumtensio, quibus significatur factam esse recidnam. Quasi ita diceret, dormiuit & sanus erat senex hic, deinde rursus febricitauit, acciditque ei inquietudo, peruiigilium; & corporis cutis circumtensio. Hæc inquam aut alia his similia defunt. Quæ enim ea fuerint non possumus diuinare. Sed in tota hac narratione hæc duo sunt notatu digna, liberatum esse hunc ægrotum à tanto malo, primum exeunte solum lumbrico crassiusculo cum paucio cibo, hoc est, cum paucis facibus cibi non satis coctis (ita enim solemus vulgò dicere, modicum cibum excrementum esse) deinde mortuum esse cum his quæ narrantur symptomatis. Nam si liberatus hic est primum, iuxta id quod in prognostico dicitur, expedit etiam lumbricos rotundos descendere cum excretionem, morbo eunte in indicationem, quomodo potuit deinde intra fines acuti morbi mori? Si enim habet iam malum in indicationem, & cum concoctionis signis, celeritatem iudicii, & securitatem significationi oportebat. Non poterat ergo ex eodem morbo tam cito mori. Quod si non ibi iam malum in indicationem, certè symptomata vermis & fecis excretio fuit, symptomata verò & exigna non poterat tantè vilitatis esse, vt inde diceretur hominem melius habuisse, & videri factum sanum. Quid ergo est quod ex hac narratione videtur probabilissimè colligi posse? Certè senem hunc laborasse à principio morbo ætati suæ parum congruente (puerili enim) febre acuta ex crudorum putrescentia, atque proinde habuisse eam febre in suis symptomatis, vt longè grauissimum, multum vermium prouentum. Nam si rectè perpendas, & auctores omnes de hac re consulas, videbis plura quæ symptomata quæ narrantur ea esse quæ vermium in ventre abundantiam sequi solent. Paulus c. 37. lib. 4. ita de vermium signis scripsit. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & ventris, riles exiguæ cum siccitate irritantes: oonnullos comitatur singultus quoque, & sonans cum palpitacione, sique siue ratione expergiscuntur; oonnulli & cum clamore expergiscunt, & iterum sopiuntur: pulsus inæquales, & febres augescunt inordinatè, quæ cum extremorum perfrictione, tertiam, interdum quartam die vel nocte accessionem sine ratione habent. Insanes autem etiam mandunt linguâ inaniter exerta, & dentibus strident, oculis continent, vo-

lunque conuiescere, excitantibus ipsos indignantur, oculi cani apparent, genæque rubore suffunduntur, ac turis liuent: atque hæc breui & ex interuallis fiunt. Quibusdam nausæ & roboris causæ stomaço peculiare creantur, atque ægri cibum respuunt, compulsi autem ad assumpsum reuocantur, plethique verò aliud descendit corruptos cibos egerent, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque fame neque euacuatione immoderata suboritur. Atqui non in omnibus omnia quæ iam commemorauimus signa inquirere oportet, sed nonnulla quæ præpollent, aliquando etiam plurima. Hæc Paulus, qui etiam multa signa amplexus sit, quædam tamen omisit, quæ alij addunt. Aetius dictis signis ferè ex Diocle recensitis hæc addit. Alij instar declarantium aliena loquuntur in somnijs. Alij decubium transmutant continuè dormientes, angoreque vexantur, ex locoque ad locum sese vicilim proieciunt. Verùm paucos omnino ex ipsis morbum consistere constat. Pletique enim in mentis inopia ac taciturnitate degunt. Porro quia torandis lumbicis infestantur, etiam cibum auerlantur, & si quid acceperint, reuomitur: aut nauseabundi vix deglutire possunt: febres in eos cum vehementi extremitate partium refertur generatione irruunt. Hæc Aetius, tamen igitur huic seni multa signa eorum quæ vermium esse dicuntur non adfuerint, si tamen omnia quæ adfuerint vermes significare poterant, cum accessisset illud quod in hocum cognitione maximi momenti est, puta vermem relictum esse, merito coniectabimus toto morbo vermium vexatum esse. Nam ut dicebat Paulus, non omnia hæc omnibus ita affectis adesse necesse est: sed aut quædam præcipua, aut pleraque. Nosse verò etiam oportet, cum his signis intelligi debere, etiam quæ cum illis ob eandem ipsam causam coniungi possunt. Si enim vehemens adsit morbus ventriculi, imminet periculum deliqui animi, & consualuorum motuum ob naturalem consensum cerebri & cordis cum ventriculi ore: si magna nausæ adsit, etiam huiusmodi oculis adsit necesse est: ac ob eandem causam difficultas aliqua respiracionis, nam hiant ore non facile mouetur thorax. Iam verò vomitum instantem tremor inferioris labij portendere solet, & ob eandem causam tremula vox. Si tabescent, sient graciles ætenuent, & cutis fiet circumtensa. Frigus verò extremorum ad deliquium animi pertinet. Delirium in signis vermium ponebatur, scilicet per compassionem cerebri. Quamquam ego non omnia signa vermium dicitur hic habuisse, vermes tamen illi innatos fuisse ob dictam causam suspicio. Neque fane mirum ex hoc morbo mortuum esse, cuius etati esset iam aduerfus, cum plurimi moriantur pueri, quorum ætati est congruens. Cum igitur vermes qui in homine quopiam generantur inæquali magnitudine sine, neque eam qua sunt eodem tempore conquirit, sed alij ante alios auferant, & qui maiores sunt seniores afferant symptomata, pusilli verò exigui, fieri potuit, ut huic homini vnus quidam vermis plurimum præ alijs auctus anxietatem & inquietudinem afferret, adeo ut eo expulso sedatus dormiret, factisque sanis videretur, donec auctus reliquis grauiora mala excitata sint, ex

quibus etiam est mortuus. Itaque lumbicus ille, etiam eius excretio tanroperè inuasse videtur, non ut concoctionis signum, neque decretorii, sed symptomatici excretus est, iuxta tamen magnopere dictam ob causam, neque in morbo tali, re veluti diximus se habente, excretio vnus non exigui vermis exigua debet censeri.

Quibus hypochondria & alius deiciunt compacta & tepida sine murmure, ut in Abderis, lacerta formam referentia.

Deiectiones duræ & compactæ raro exiunt cum crepitu, nam calor qui crassitudinem eis præbet, statim insensibiliter absorbitur. Porro dices compactæ, quæ sine summa siccitate sunt (siccitas enim in exigua frustula comminuit) longe sunt, & ipsorum intestinorum quibus sunt densata signum referunt. Proinde quæ compacta, longa, & crassa sunt, in crassis intestinis compassionem recipisse significant: quæ compacta, longa, & gracilia, multa ab intestinis retribuit compacta veniunt.

Non solent autem fæces soliditatem autem intestina crassa recipere, nisi cum aliquando maior solito toto vegante calor est, non tamen si maior sit multo, hanc eandem formam recipiant, sed exigua, dura, sterens capra imitantia sient. Quæ ergo compacta hinc crepitu lacertæ formam referentia deiciuntur, ob intestinis gracilibus veniunt & alia, id est conferta aut cæda, aut calorem mediocri paulo maiorem indicant. Quia ergo ab intestinis gracilibus hæc veniunt, dicit. Hipp. quibus hypochondria & alius deiciunt compacta, alioqui enim foret tantum dicere, quibus alius deicit. Verum hypochondrium est suprema alui pars, in qua gracilia intestina sita sunt.

Quod primum accidit in antecedenti die decretorium, considerandum.

Dies decretorii decurrunt per quaternarios intra fines acutorum. Nam ut in prognostico dicitur. Primus impetus ad quartum definit, secundus ad septimum producit, tertius ad undecimum, quartus ad decimum quartum, quintus ad decimum septimum, sextus ad vigesimum. Hi ipsi dies sunt morborum indicatorii, & aliorum indices. Nam in aphorismo dicitur, septimi quatuor est index. Itaque eisdem diebus sunt indicationes & indicationes, etiam non simul, neque eorundem morborum. Sed indicatio antecedit indicationem. Primum itaque in indicationibus est indicatio, posterum ipsa indicatio. Indicatio verò fit in antecedenti die, computatione facta per quaternarios, ut diximus, quatuor enim septimum, hic vigesimum, hic decimum quartum, hic decimum septimum, hic postremo vigesimum indicat. Merito ergo dicit Hippoc. considerandum esse quod primum accidit id est indicationem, quæ fit in antecedenti die decretorium, hoc est in die qui præcedit eam in quo agitur indicatio. Quæ ratione indicatur indicationes aliis locis dictum est satis.

ET mala & bona signa contingunt diebus, quibus morbidius turniores habent exacerbationes, & quibus desipientes tardius inuadunt.

Eisdem diebus fiant obseruanturque in ægrois signa bona & mala, nam & moriuntur eisdem diebus quibus salui fiunt, vt in prognostico dicitur, diebus nempe decretorijs vocatis: atque aded bona signa in his meliora, mala deteriora sunt quam in alijs diebus. Omnes itaque mutationes morborum diebus decretorijs potius quam alijs præsentiri possunt, siue huius finiendi, siue in longum producendi, siue bonum siue malum exitum habituri sint. In hanc sententiam dicit nunc Hippocrates & mala & bona signa fiant diebus *ἐν ἐμπεδωμένοις καὶ ὑποκρίναι, ὡς καὶ ἀγνοῦντες βραδύτητα*. Sed videtur idem esse morbos produci & remorari, *ὑποκρίναι* & *βραδύτητα*. Quo pacto autem si idem est *ἐμπεδωμένοις*, id est super exacerbati, & *ἀγνοῦντες* hoc est desinentes aut cessantes, utrique producuntur, aut remorantur? Nam *ἀγνοῦντες* contrarij esse videntur *ἐμπεδωμένοις*, quo pacto autem à contrarijs significantur. Atqui fortasse non vtrumque horum, sed neutrum potius videtur significare morbi productionē. Nam desinentes seu cessantes potius videntur finire quam remorari: exacerbati verò diebus decretorijs non faciunt ad productionē, sed ad contractionē morbi. Nam exacerbationes crebre celeritatem motus significant, celeritas verò ceteris patibus contrahit cuiusque motus tempus. Neutrum ergo horum significat productionem morbi; tam longè abest vt vtrumque. Sed animaduertendum est Hipp. non dixisse *ἐμπεδωμένοις* id est exacerbati: sed *ἐμπεδωμένοις* id est superexacerbati. Exacerbationes autem sunt, quæ legitimam naturalemque rationem durant secundum cuiusque morbi naturam & sua bona remittuntur, superexacerbationes autem quæ producuntur aded, vt occupent etiam id tempus quo iam erant desitura, velut & superpurgationes vocantur ab Hippoc. quæ procedunt vitrà quam par est. Exacerbationes ergo crebras fieri, & nullum diem decretorium intermittere, quo non aliquid natura circa morbum molitur, celeritatem indicat, ac proinde contrahit morbum: has non fieri, sed desinere, non etiam febre desinere, lenrum morbum & tardius finiendum significat. Quia quod lentè mouetur, tardius quiescit. Verum non item superexacerbationes significant morbum futurum breuem. Nam significant maximam faccorum multitudinem, hæc verò cum debili facultate significat mortem: cum forti, morbi longitudinem. Salutares ergo morbos fore chronicos significant superexacerbationes. Euenit ergo quod Hipp. hoc loco animaduertit, & superexacerbationes, & exacerbationes desinentes (quamquam sint longè contrariæ) significare eandem rem, potè morbi longitudinem, non eodem modo: sed alterum ob materię multitudinem, alterum ob motus raretatem.

ET quæ non fideliter alleuant, & ea quæ per se ipsa exacerbantur.

Tæ *ἀμείνωσι* *παύονται* hand dubitè dicuntur ea quibus non oportet fidere, ea verò sunt, vt aph. 27. sectionis secundæ dicitur, quæ non secundum rationem leuant. Secundum rationem verò leuant, quæ cum signis concoctionis, & per indicatoriam euacuationem humoris iustitiam respondentem. Cur autem fidendum non sit iis quæ leuant aliter, ipsemet dicit eodem aphorismo dicens, pleuraque enim talium inconstantia sunt, & non valde permanere solent. Itaque non fideliter alleuant ea quibus postea accidunt recidivæ, quæ plerumque primis morbis sunt grauiorcs. Quod sunt ægroti eius tempestatis, quæ hæc scripta sunt, accidit se sequentibus insinuat. Et ea quæ per se ipsa exacerbantur, scilicet priora exacerbantur, non per se ipsa, sed per recidivas. Itaque dicit Hippocrates, quædam non fideliter alleuant, quia succedentibus grauioribus recidivis exacerbantur, & quædam exacerbantur per se ipsa, hoc est, sine vllis alleuationibus à principio ad finem vsque.

Sputa peripneumonicijs quibusdam sunt biliosa, cum desinere vult morbus, valde flava breuem significant. Quæ si qualia in principijs erant, talia appareant, hæc non valde concoqui puto, sed indicare, vt illi contigit, qui iuxta præceptorem erat, & vt alias quoque vidi.

Scripto mandabat Hipp. quædam vt frequentia & legitima, quædam etiam vt rara & illegitima, in hoc præcipue opere, quod non selectissimis regulis, & ratione multique experimentis confirmatis dicatum est, vt liber aphorismorum, sed obseruationibus. Experimenta verò captantibus non solum mos est notare legitima, sed etiam, atque aded nonnunquam multò magis, iis contraria & rara, velut nunc facit. Nam legitimum est morbos solui concoctis excrementis, deiectionibus inquam, vrinis, aut spuris, quibusuis horum indicentur (nam eadem ratio est) euenit verò nonnunquam, vt materia non coquat; soluitur tamen morbus, beneficio facultatis expultricis. Neque mirum est facultatem ad expulsionem eius conuerti quod non potest coquere, nam & cum legitime operatur, pellet ob irritationem. Verum est hæc solutiones non esse solèrè tutas, & ab eis recidivas meritis timeri,

E fieri tamen aliquando potest, vt sine recidivis accendant. Neque enim tatione contraria probatur necessarium aliquid, sed vt consuetum naturæ & frequens. Itaque et si indicationes optimæ post concocta excrementa fiant, & his non coctis exigua fides indicationibus esse possit, tamen nonnullis euenit iudicari circa concoctionem. Vt fortè euenit illi qui iuxta præceptorem habitabat, & alijs quoque aliquando factum vidit Hipp. Sed cur incipimus ab enarratione vltimæ partis huius dictionis?

Certe quia tota hæc oratio ad eandem scientiam pertinet, eam scilicet quam diximus. Ut vixit & alii deiectiones in febribus putridis considerari debent, ita in peripneumonia, pleuritide, & aliis pariter circa thoracem morbis spura. Nam illa in illis, hæc in his propriam morborum materiam indicant. Spura biliosa in crudis, valde flava etiam in pessimis poni censuit Hipp. in prognostico. Quæ secundam communem morborum rationem, longe abest ut hæc appareant peripneumonicis, quum definire vult morbus, tunc enim cocta esse oportet, alba scilicet leuata, crassa sine lentore, & quæ facile excreantur. Verum quia aliquibus id factum vidit, scripsit biliosa quibusdam peripneumonicis, quum definire vult morbus. Sane eadem ratione potes expectare deiectiones aut vitiosas biliosas in febribus, quum definire voluit. Constat verò hæc non esse concocta, quia à talibus solent biliosi morbi incipere: quæ verò apparent qualia in principis morborum erant, constat ea non valde coqui, sed aut nihil aut omnino exiguum. Nam principium morbi tempus cruditatis est, ex crudis autem ut cocta fiant, necesse est substantiæ modum mutent. Hæc ergo cum apparent qualia à principio ceperant, non coquitur morbus, atque si quo modo solueret, certe eueniret indicari, ut ille qui iuxta præceptorem erat, sine signis scilicet concoctionis.

Nec mirum, nam velut curationum quæ arte fiunt, quædam sunt legitime, quædam illegitime, ita etiam, eorum quæ sponte contingunt. Sponte factas morborum curationes voco, concoctiones & iudicati ones, ut arte factas, missiones sanguinis, & expurgationes, & quotundam admotiones. Ut ergo artifice aliquando quibusdam occasionibus, regulis & methodo excedere licet, ita natura quibusdam causis familiari ordine cogituri desistere. Interiecit illa verba Hippocrates, *ἡ νόσος ἐστὶν ἀκατάστατος*, quæ quia sententiam aliorum nonnihil deficiunt transsumimus, nosse necesse est ad ea reuertamur. Biliosa sunt quæcumque flava sunt (is enim est bilis color) verum ea ampliam habent eius coloris differentiam. Nam & quæ pallida, & quæ rufa, & quæ peculiariter flava, & quæcumque aut remissa aut intense talia sunt, in flavis ponuntur. Hippocrates enim, ut antea etiam me dixisse memini, omnibus his nominibus vitæ generatim: intentionem verò coloris oratione explicat. Cum ergo dixisset biliosa spura fieri quibusdam peripneumonicis, quum definire vult morbus, dixit valde flava breuium morbum significare, quasi diceret, inter biliosa breuissimi morbi signa esse ea quæ admodum flava sunt. Non dixit autem optima, sed breuissima. Nam deteriora sunt, vel hoc ipso nomine quod cum sint, lethalia, sunt breuissima. Nam ut saluta: ita rursus meliora quanto breuiora: ita lethalia tanquam peiora. Ergo valde flava lethalia sunt, quia sincera: breuia autem, quia acerrima & tenuissimi succi fofoles. Non dicit hic quem exitum potuerant valde biliosa: sed tantum breuia esse quemcumque habitura sint. Atque ita est profecto, aut moriuntur citò ex peripneumonia, aut tabescent. Citò, atque ita etiam moriuntur satis breui, quia pessima talis tabescentia est. A ut si forte talia biliosa coctiora, alquando cum iam solidiorum morbi (quamquam hoc sit longe rarissimum) soluerent etiam breui, bile affatim vacuata.

Nicippus in febribus semen effudit somnians, nec quicquam in deterius processit, & hoc ipsi sæpe contingit, & nullo modo laesus est. Ille prædictum est istud cessaturum: quum febris indicata essent, & ita accidit.

Sexto epidemiorum parte quinta cont. 23. dicitur ab ipso Hippocrate, ventrem morbis putridis mederi, causa est ut Gal. dicit in commentario, quia siccæ partes, atque ita bumida excrementa absorbunt. Constat verò eadem ratione posse ita affectos iuvari seminis effusione, etsi cum mulieribus non congregiatur. Porro possunt citra congressum fundere volentes, ut Diogenes, aut nolentes, idque aut excitari, quod laboraret gonorrhœa, aut dormientes. Vigilantes exercebunt præter voluntatem, maiorem noxam significat, quum dormientes: hos enim sæpe insigant insomnia. Vtrisque verò id euenit: aut ob redundantiæ, aut ob prauam seminis qualitatē, aut ob debilitatem reteritricis diuturnitate morbi comparatam. Quibus ob debilitatem fir, nulla ratione potest esse ea excretio vilis, exanimæ enim & tabescit, verum quibus ob redundantiæ, non raro est vilis, & curandum illud solum est, ne plus satis durer, & ne pariter affida rufescentia, arteriarum ora pateant, ne plurimum etiam spiritus effundatur. Ita enim fieri potest, ut cum tedandanti femine abeat spiritus necessarius, fiatque inde plus mali quam boni: alioqui excretio multa seminis aut vitiosi vilis est. Quia eius succi suppressio adeo est noxia, ut cum tenuissimi symptomatis craciet, viscera omnia viciet, melancholicas passiones pariat, aliquid etiam repentini mortem, velut ex epoto veneno. Quum etiam eum morbum quem gallicum hoc seculo vocant, si quid habet proprium, & quo alii malignis cacochyiniis discrepet, id certe est, ex maligna seminis putrescentia nasci. Computrescit enim mox cum semine per corpus totum proprium solidarum partium alimentum, quod semen ebetism, est infecundum. Hinc tot solidarum partium corruptiones, hinc illa penitissimè lateus cacochyma, raro nisi vehementissimè exudationi & excretionibus cedens. Argumento est, hoc illis esse principium, quod vis vnam nisi ex congressu cum sordida muliere nascitur. Tamen ex multo etiam congressu cum oon sordidis nasci posse existimo. Si igitur tantarum nozarum causa est feminis redundantiæ aut viciu, metirò fir, ut multi agroti venere iuueat. Præterquam quod, ut dictum est, ipsa venus humiditate alios siccis morbos ex bumidis sanat. Ut non putem ratione caret, quod de gallico morbo laborantibus nonnulli astrictant, fieri aliquando ut congressu cum mulieribus non sordidis, qui ita affecti sunt sanescant, & illæ inficiantur. Nimirum illi deponunt propriam morbi materiam, illæ recipiunt inquinamenti principium. Itaque venere causam salutarem aliquando esse, etsi Epicurci aliter putarent, ex eo loco colligimus. Quid si cippo enenent perpeadimus, nunquid Nicippus febicitabat ex semine? Non arbitror. Fortasse enim is succus febreum non parit nisi bellicam, eius verò febris in-

dicatio citò expectabatur futura. Febricitabar ergo ex alia causa (vt fortassis ex pituita) exercebaturque simul semen redundans. Cur ergo prædicebatur ei fore, vt cum febris indicaretur, cessaret ea excretio? Si enim ex diuersis succis passionibus pendebant, quid prohibebat manere vtamuis altera sublata? Certè quia antequàm febricitaret, nihil tale patiebatur, coniecit aut Hippocrates fore vt quò febricitare desineret, cessaret excretio: videlicet non ob solam multitudinem, aut corruptelam feminie fieri, sed quòd calore febrili calidius, acutus, & mordacius fieret. Necesse ergo erat, cum virtus illi constaret, interim prodelle, excreto redundante & mordaci succo, pariterque corpore ficcato; desinere verò, cum febris solueretur. Et factum est ita.

Critias in febribus ab insomniis vexabatur, à quibus quidem quinquinis liberatus est etiam hic simul cum crisi.

Libello de insomniis multa ad hunc locum pertinentia scripta reperies. Ex quibus facillè intelliges, insomnia multa & perturbantia, magnæ perturbationis in corpore, præcipuè verb in capite, aut per se, aut per consensum cum toto corpore significationem præstare. Cum enim agitis succis & vaporibus agnoscantur animales spiritus, & cum eis concepit ærum species, sunt varia multaque spectra, vnde insomnia, aut allegorica quæpiam ratione morbum, affectum locum, aut internam causam, aut ægrotandi occasionem indicantia: aut morbi exitum præmonstrantia (vt alibi dixi) aut nihil certum: sed perturbatæ multa continentia, ipsa solum perturbatione perturbationem humorum indicantia. Hinc fit, vt plus solito somnare, præcipuè cum tumultu ac perturbatione, in sanis prænotuerit morbos, in ægrotis rapum humorum in capite timere iubeat, aut indicationem expectare. Rapum sanè, quia agitati facillè efferuntur: indicationem verò, quia deceptorum euacuationem antecedere consuevit agitatio. Ergo de insomniis perturbatis per febres, vt de multis aliis censendum est. Si indicationum indicatio antecessit, & opportunitas instat, deceptorum haberi debet, putandumque fore, vt desinat simul cum febre, vt Critias euenit; sin minus, præniticum est, capiti ergo prospiciendum.

Aleippus hæmorrhoidibus laborans prohibebatur curari. Curatus insania correptus est, quæ febre acuta superueniente cessauit.

Tantoperè reformidat Hippocrates hæmorrhoidum curationem, vt dicat aphor. 12. sectionis sextæ, ab hæmorrhoidibus diuturnis curato, nisi vna seruat fuerit, periculum est hydropem aut talem accedere. Et sanè merito timeret. Nam in omni euacuatione consuevit supprimenda, periculum est redundantiæ eius quod solebat euacuari: hæc verò solet euacuari detritissimus & sæculentus sanguis, maximum ergo periculum erit, vt pote ex pessimæ

metæ detentione. Prohibebatur idcirco Aleippus curari, ille verò morbi medio compellus curari se fecit, curatus verò non in hydropem aut talem, vt alii solent, incidit; sed mania correptus est. Quod merito etiam est factum. Illa enim mala cuiusque causæ euacuationis suppressione nata sunt fieri, à quibus ea euacuatio liberabat. Dicitur autem aphor. 21. eiusdem sectionis, Maniaci si varices, aut hæmorrhoides superuenerint, in sanis solutio fit. Hanc itaque ob causam maniacus est factus qui, febre acuta superueniente, à mania est liberatus. Duplici ratione fit, vt morbus acutus superueniens à diuturnis liberet, aut ipso igneo calore absumente excrementa, aut crassius excrementis simul cum materia propria acuti morbi in eius indicatione radicatus euacuatis. Illud fit in passionibus pituitosis, & crudis, vt resolutione, & conuulsione, & lentis febribus, & catarrhis: hoc in melancholicis. Aquea enim igne absumuntur, terrea non item: sed crassescunt exulta. Aleippo ergo secundo modo consentaneum est solutam esse maniam. Nam mihi etiam ita aduentissima illa febris cum agerem vigesimum octauum ætatis annum, conspexit passiones melancholicas.

In acutis febribus stitulosi, à medicis vexati in potu, aut etiam sua sponte abstinentes, videntur posse bibere multum. Aqua frigida data, vt vomant, prodest, biliosa enim aderunt.

D Multis differit Galenus de potu aquæ frigide in febribus, lib. 9. meth. cap. 5. vbi proximum missioni sanguinis auxilium in continentibus febribus esse dicit: sed & in omni maxima febre, intelliges ex his quæ ibi dicit, magnum remedium esse, si tempestiuè allegi exhibeatur, quia habitus corporis refrigeratur, & hinc euenit facultatem recreari, & alium solui superne aut inferne, aut sudorem copiosius et tempore, & ita febres solui. Vnum horum est, quod Hippoc. nunc iubet procurari aqua frigida data, nimirum vt vomant. Ergo, inquit, qui in acutis febribus (acutam febrem vocat Hippoc. exurentem calorem) stitulosi sunt, & à medicis priuantur potu, aut ipsi per sese abstinent, videntur posse bibere multum, id est, multum bibere poterunt siquis offerat (nisi forte sint præputati, qui cum delirio sunt) adedò vt videantur sibi, neque congio satis recreandi. Illis ergo frigida potum vomitum mouere vtile est. Nam cum tam multum sibi bibere posse videantur, audissimè capient quantum voles, bibentesque visque ad vomitionem, plus scilicet quàm ventriculus possit continere, vnde fiet vt vomant (nam valde libenti, si frigida modicum des, non vomet) bilis verò aderit præstilo, vt vomatur. Nam fortis ille æstus ac sitis significabat redundantiæ bilis circa viscera. Ceteri ergo poterit biliosus vomitus frigida potu in ita affectis, etiamque vtilissimus, quia pariter eodem auxilio materia euacuabitur, & intemperies exinguetur. Ad sententiam hanc explicandam hæc erant satis, verum ipsius rei gratia, & ne quem verba Hippocratis decipiant, opus est explicare, quæ sit oppositio

rimas frigidam exhibendi. Nam ut est auxilium optimum & iucundissimum, ita etiam & periculosissimum, & maximè posuit in occasione. Non enim utramque febris utat, & ægrotus sitiat, ac multum sibi posse bibere videatur, offerenda est frigida. Multis enim hæc habentibus oblata, primum quidem innare visa est ob inemperiem quam extinguit, deinde verò causa fuit ut denò excitaretur alia febris, & maior & cõsumaciòs priori, quod oblata quum adhuc materia morbi erat cruda, eius & concoctionem, & discussionem prohibuèrit aliis etiam incurabiles passionibus, & pro inflammationibus ut eni resoluendis, indissolubiles tumores manere fecit. Alios vna aliqua parte laesos, reliquum vitæ fecit miserè transigere. quosdam etiam vitæ repente peritauit, naturali simul cum igneo calore extincto. Neque igitur phlegmone quampiam interuam habentibus, neque nisi cocta materia, neque nisi robustis, & secundum partes omnes internas, præcipuè nobiles abundantibus naturali calore, offerenda est. Ego proinde raro febriçantes ad copiosum frigidæ potum cogor: sed cruda adhuc materiâ, aut phlegmone viscera obidente abstinere inbeo, quantum circa peticulum rabescitque possunt: materiâ verò concoctâ, aut phlegmone inclinate, eius potus quo per morbum vitatur quantitatè sensim augeo; si frigidam pro decocto (si decocto fortè vitur) efflagitat, audio concedere; interim, cum vitetur sit, porciones medicatas, ut stillas aquas, aut serapia valde diluta affari offero. Sunt enim horum quædam à quibus attemperatorem expectare possis, & incommoda frigidæ aquæ non nocere. Nihilominus non nego, quod Hippo. Galenusque dicunt vtilissimum esse: sed cautè admodum fieri fudeo.

Quod nervi ipsi in seipso contrahantur signum est. Siquidem ipsi nervi in superna manus parte fuerint præsi, deorsum nuntabis manu tracta à nervis qui infra sunt: si verò contrâ, aliter eueniet.

Superiorem manus partem vocat hic haud dubie, quàm nos dicemus externam: infernam verò quam internam, eam scilicet versus quam flectitur. Nam si secundum longitudinem brachij intelligat superiorem, & infernam manus partem, falsum est manum deorsum nutare, quod nervi in superna parte sint præsi, aut contrâ: non enim ita oppositi sunt nervi motori, sed secundum moruum naturalium differentiam, interni externis, & dextri sinistris. Et manus, seu eleuatio, seu exporctio aliquibus horum fit. Itaque, dicit ueruos motus in seipso trahere, partes scilicet quas mouent. Sed quo pacto? Certè contrahentes ipsi sese in seipso. Ita enim sit, ut eorum contractiones partes quibus inferri sunt sequantur. Hoc quod hæc diuincula Hippoc. insinuat, est argumentum totius operis, quod de motu musculorum scripsit Gal. verum Gale. exactius rem tractauit, proprium voluntarij motus instrumentum distinctis indicans. Nam re vera instrumenta eius motus non sunt uerui: sed musculi, verum mouendi facultate


tem accipiunt à cerebro per nervos. Hi verò partim subeunt in musculos coalescentes cum ligamentis, scilicet tendones, rursum emergunt ex musculis per eorum caudas: partim impermissi prætereunt. Hi facultatem præstant, non tamen etiam alligant musculos ossibus, & distenduntur contrahunturque cum illis, atque tensionem eis præbent illi verò, præterquam quod & facultatem aliquam deferunt, quâ uerui sunt participes, per sese etiam firmant & alligant musculos ossibus, & iis qui circa, & iis quæ vitæ articulos sunt. Vtriusque ergo nervi, sine inquam h, qui tantum sunt nerui, facultatem verò mouendi deferunt, sine qui vocantur tendones præscindantur, atque siue ante capita, siue post caudas musculorum, necesse est musculos ipsos motu priuari, & membrum in contrariam partem cadere. Quia deest musculo virtus, aut partium firmitudo, & confirmatio. Verum si & hæc & alia omnia necessaria testè habent, mouentur partes hæc & illæ, multis musculis vicissitudine operantibus, singulis verò habentibus vnicum motum, contractionis scilicet in sese, siue versus suam radicem, siue versus suum ventrem dixeris, nihil refert (quamquam voluit contrahendi: Galeno ansam inde Vesalius accipere) nam si illi sese in suos ventres contrahunt, necesse est membra quæ ab eis mouentur versus eorum radices enerti, ac cum eis ipsos musculos. Laborare, si ergo in in suos ventres sese contrahant, an versus suas radices, inane est, nam utrumque euenit. Atqui à contractione versus suos ventres rem incipere Galenus optimè intellexit, qui musculorum motus explicans sexto meth. dicit, necesse est ubi figura mutatur, alios musculorum tendi, ac velut contractos respondari. Constat enim musculos non aliter rotundari posse, quàm in ventres suos contractos. Res ergo ita habet. Musculi ipsi in se ipsos trahunt. Hippoc. verò dicit nervos, intelligens tendones, quia hi musculorum ipsorum partes sunt. Constant enim musculi propria carne & tendonum fibris, quæ in eam insistantur.

Ubi sicca vexantur qui testes habent affectos, & ex tussibus in testem fit solutio scilicet venâ, & phlegmone laborantibus tussibus, & febribus ortis ex inguinum tumoribus tusses succedunt.

Nihil ferè noui continet sententiola hæc. Nam lib. 2. parte prima dixit, tusses diuturnæ ubi testes intumescunt cessant, & testis tumor à tussi cessat. Et paulò post dixit, in testes aliquando ex tussi, & testis ipse à se ipso. Rursum parte quinta eiusdem libri dixit, quibus tusses sicca est, his non soluitur nisi dolor foris ad coras, aut ad crura, aut ad testem irruat. Hoc idem dicit modo: nimirum tusses sicca fieri à testiculorum tumoribus, & à siccis tussibus tumores testiculorum, ob comminationem scilicet vniuersi cum generalibus, ut primo loco ex citatis dixit. Certè quid sicca tusses eo modo terminentur potius quàm humida, causa est, quia hæc soluantur per se excreatione. Sed cur ex tumoribus testium fient sicæ & rariæ tusses? Certè & humide fieri poterunt, verum illæ etiam incipiunt à

ficcis. Non enim excreantur antequam coqui incipiant succi, quare excretiones anteceder tempus cruditaris, & sicca rursus. Sed quod hoc loco addit, sectâ venâ, est consideratione dignum. Videtur enim dicere, rursus desinere in riuorem rectum non sponte: sed quam. secatur vena, locis verò citatis nulla sectionis venæ mentio facta est. Fieri sanè potest, ut citra vixor sectionem hunc abscessum natura moliat, sæpè tamen etiam fier, vt quem

A multitudine circa partem affectam obruta non poterat facere, deonerata sectione venæ faciat. Non solum autem cum testibus ipsi dicit partes spiritales habere hanc communione. sed & cum partibus omnibus genitalibus, & adenis qui illas circumstant. Quapropter & ob phlegmonas inguinum dicit corripit tusti quosdam, quibus febricitantibus ex inbonibus rursus superueniant, ob dictam scilicet communione.



LIBER QVINTVS

EPIDEMIORVM

P R O O E M I V M.



AMETSI Gale. q. de difficultate respirationis, & in initio ptimi commentarij libelli de humoribus dicat, quintum & septimum libros Epidemiorum indignos esse Hippocra; auctore; adeo vt neque Thesallo, aut Polybio, aut alicui è probatissimis Hippocr. discipulis adscribendos pater, ac proinde sine commentariis eos reliquerit, mihi tamen non ita placet facere: sed integritatis gratiâ, totum opus hoc quod septem libris constat, commentariis prosequi, neque curare cuiusquam censuram: sed res singulas perpendere, & ex quibus aliquid fructus capi poterit animaduocare, si quid verò prorsus inutile reperiatur aut indignum, monere & hoc ipsum indicare. Interim lectores, si quæ in libro hoc continentur, nolint tanquam ab Hip. scripta accipere, tamen quæ dicuntur in commentariis, accipiant vt mea. Hoc etiam consilio quantum sum commentatus librum, quamquam & de eo dubitauere veteres, an Hippoc. esset, tamen scio non pauca scitu dignissima eius commentarium continuisse. Itaque & hunc quintum percurrâmus. Habet enim illud peculiare, quod in aliis multi desiderant, historias ferè omnes continere modos quibus curati ægroti sunt, vt hac ratione fieri possit, vt vtilior quàm alij omnes euadat hic liber, quia practicæ medicinæ habet multò plus.

IN Helide Olitoris uxorem corripuit febris continua, nec medicamentis epotis quicquam iuuabatur. In ventre autem infra umbilicum quiddam erat durum & altero sublimius, & dolores inferebat vehementes. Hoc cum fortiter tractatum & compressum esset manibus oleo innunctis, & postea sanguis plurius deorsum processisset, & sanata est & vixit.

Rarè solet Hippoc. dicere, quæ erga ægrotum acta sunt, sed ea solum quæ pariebatur, tuoc. verò quæ pariebatur, & quæ acta sunt, & quæ inde eueniunt: non certè ea dicens vt imitanda, quasi res acta sunt: sed vt rectum discernatur ab errore. Nam temeraria prorsus curatio erat, inflammatum limbum ventrem pharmacis expurgantibus (hæc e-

nim vocat pharmaca) lacessere, morque his nihil iuuantibus partem inflammatam fortiter attrectare, ac velut affuso oleo tentare emolliendam. Nam laborasse hanc mulierem inflammatione in hypogastrio constat, siquidem habebat ea in parte tumorem satis magnum præ reliquo ventre, & dolores fortes cum febre continua. Non expedit autem quam hypochondria aut venter inflammatus est, pharmacis expurgantibus vti, saltem non sunt vsuanda ante inclinationem, neque tunc quidem nisi leuibus, quia alioqui excrementa conuocantur ad affectam partem, & per ventrem laborantem adstricta passione (talis enim est inflammatio) male demittuntur. Merito ergo factum est, vt ex epotis medicamentis iuuaretur nihil: sed oequè digitis fortiter comprimendo subigere iubet ars, sed blandius fouere, ne irritatione crescat inflammatio. Verum huic ex temeraria hac curatione vtile quiddam enegit, vt solueretur inflammatio iudicatione per fluxum sanguinis frequentem ex aluo. Suspicio in-

flammationem hanc pertinuisse præcipue ad venas mesenterij, quæ ea in parte sunt, nam quia naturaliter plenas sunt sanguine crudiori, quem ipsæ met gignant ex chylo quem ex alio deducunt in hepar, & aliquando etiam, ex eodem hepate recipiunt sanguinem coctiorem, qui in eo redundat, sit ut cum copiosas in eas sanguis infunditur, inflammatio in tunicis & carum osculis oritur, & sibi ipsi exitum obturans illas plurimum distendat, & ut inflammatio sanguinem cohibeat, & is cohibitus inflammationem foueat. Quamvis ergo durius illa palpatio inflammationem ipsam nihil leniret, potuit tamen vix & vi sanguinem exprimere, à quo deonerari cæpex venæ potuerunt reliquum sanguinem eicere, illis laxatis facile discutitur inflammatio. Oleum verò quo incincti digiti compressionem faciebant, ad discussionem valere potuit. Sed si hæc ratio entationis non est imitanda, quid his mulieribus agendum fuisset? Certe mittendus sanguis ex mallois, & laxantia blandè admonenda: expurgandum verò non ante mali remissionem.

In Helide Timocrates plurimum potauit, insanienti autem ab atra bile bibis pharmacum. Hic purgatus est. Purgatio multam pituitam & bilem nigram tota die egessit, & circa vesperam cessant purgatio: in purgatione autem multum laboris passus est, & cum potentiam bibisset, somnus ipsum corripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno autem non videbatur iis qui aderant respirare quicquam, sed mortuus esse, nec quicquam percipiebat quod diceretur aut fieret, extento autem erat corpore & rigido, verum vixit & excitatus est.

Hic Timocrates à largo vini potu (non enim profectò aquæ) insaniam correptus est, ob quam purgatus, cum in media purgatione cibum accepisset, & ad somnum se conuertisset, pro somno apoplexia illi facta est, à qua fortè alioqui liberatus est, ob expurgatam (arbitror) magnam copie partem. Sed hoc esse quod præscripta verba contineant, & singulorum causas explicemus. In Helide (inquit) Timocrates plurimum bibit. Si hinc hydrops, aut passio aliqua huic similis esset facta, suspicaremur aquæ bibisse multum, at verò quia exustis succis fecit maniam, constat eum potum fuisse vini, & etus meracioris. Visisse verò potum sucoos, genuisseque multum atræ bilis non obdurre insinuat, siquidem narrata causa procacitè ægrotandi subiungit, insanienti ab atra bile. Sed quid fecit? bibit (inquit) pharmacum. tempè melanchologorum. Hic (inquit) purgatus est. Hoc videtur dixisse ob vxorem Oltoris, de qua dixerat, pharmacum bibens nihil inuadit. Quasi nunc diceret, hic purgatus est, non ut vxor Oltoris, quæ cum acciperet pharmaca non expurgabatur. Itaque et si proxima historia non explicuisset cur non iuuaretur mulier illa, nunc licet intelligere illud accidisse, quòd non expurgaretur, et si pharmaca bi-

beret. Sed quo pacto sit hic expurgatus audiamus. Tota die (accepit pharmacum danculo, ut fieri consuegit) egessit multam pituitam, & bilem nigram. Bene sane, nam hæc erant qualia emacuari oportebat, nam in melancholicis duplo hæc hunc succum euacuat maxime optamus, nigrum quidem ut propriam morbi materiam, crudum verò, ut per debilitatem naturalis caloris congestum. Sed quid mali habuit? Non est perfectò purgatio, quia cum egeret (quod imperfectam actionem significat) repente ad vesperam cessauit à purgatione. Sed neque per ipsam expurgationem, conferentiam præ se ferebat res. Non enim facile fiebat, & citra eticiam, sed in purgatione multum laboris passus est, qui certe labor malignitatem humorum, & copiam maiorem quam pro magnitudine euacuationis indicauit. Cum ergo videretur iam cessare purgatio, ea tamen esset imperfecta, potentiam bibet, & ad somnum se conuertit. Facta verò est pro somno apoplexia fortis, quæ durauit per totam noctem, & orto iam Sole est soluta. Nam non videbatur iis qui aderant respirare, sed mortuus esse, neque sentiebat quicquam, quod diceretur, aut fieret: sed extento erat corpore, & rigido. Necessè est fuisse hanc passionem apoplecticam: quæ autem fuerit, non est dictu facile. Nam carus non sustulisset respirationem, catoccho laborantes solent videre, & audire ea quæ fiunt & dicuntur, & aperti esse oculis: apoplectici non solent habere corpora rigida, sed demissa, & resoluta: accedit quòd apoplexia fortis videtur non posse solui, catochus verò solui potest. Quòd ergo habuit corpus rigidum & excitatus est, nec adducit ut catochum fuisse dicam: quod verò neque videbat, neque audiebat quicquam, ut apoplexiam. Proinde apoplecticam passionem, ex apoplexia & catoccho mixtam (miserentur enim sepe) fuisse suspicor. Facta quidem fuit hæc passio excrementis se se colligentibus in caput, ob debilitatem quam ei attulit vinum. Quòd verò per noctem aduenerit post tam copiosam crassiorum euacuationem, admirationem parit, & me quidem suspicari res cogit, medico inscio cum ea nocte post potentiam rursum bibisse vinum. Nam ille erat eius cupidus, ex cuiusque verò moribus sæpe iubent Hippo. & Gale. morborum causas suspicari. Et euentus hanc suspicionem augeat. Nam repente obmutuit, & vox requæ quæ crapula solui solent. Atqui si hoc factum est, tollitur admiratio. Nam apoplexia ex vino quantumuis fortis crebro soluitur cum ipsa crapula: tamen hæc quoque non raro interimit, præcipue tenes, & eos qui diuinitè ebrietate cerebrum excrementis impleuerunt: sin autem non bibit ea nocte vinum, certè quia imperfecta fuit euacuatio, & commota non vacuata excrementa fuerunt in caput rapta: sed ob bonam copie partem succorum effusam potuit malum alioqui insuperabile solui. Interim tamen iuvat considerare modum cibi exhibendi, quo in purgationibus veteres utebantur, ob omnes ferè nostri seculi medicos, quibus persuadere non possum, ne purgatione in media contra Hippoc. præceptum & rationem cibos dent, sed potius abstinere faciant, donec euacuatio conquiescat: nisi fortè ægrotus si sit, qui sustinere inedia non possit, vel in ipsa purgatione insipere debuit intercurrat. Tota die (inquit) multum egessit, circa

vesperam cessauit purgatio, & cum potentiam bi-
bisset somnus illum corripuit. Itaque non ante-
quam cessaret purgatio cibum accepit, tuncque
non cessauit potentiam. Quod certe Hippocraticum
esse constat, ex iis quæ de ratione victus in acutis
scriptis. Non autem cur tam timidi hoc sæculo
omnes medici sint, ut nullum ægrotum putent
posse sine cibo solidum totam diem transigere,
cum multi me id videant facere in omnibus fe-
re, quibus expurgans medicamentum do. Con-
cedo certe ad meridiem portionem iusculi, ac qui-
busdam etiam prima, ne id quidem facturum, ni-
si ob inueteratam iam Hispanorum consuetudi-
nem qui prandent lautius quam conant, contra
antiquorum morem: dare ergo aliquid cibi le-
uissimi ad meridiem etiam non perfecta purgatio-
ne propter consuetudinem hominum non est præ-
ter artem, si quidem maxima est indicatio consue-
tudinis: dare verò cibos crassos in purgatione me-
dia magnopere noxium est.

Scrophulus in Oeniadis pleuritide correpius mortuus est septima die delirans. Pharmacum autem bibit deorsum purgans, ipso ante purgationem die mentis erat compos, nec multum purgatus est, in ipsa autem purgatione deliravit.

Hunc mortuum esse, & septimâ die id esse factum ex pleuritide non mirum est, quandoquidem morbus est & lethalissimæ generis & semper acutus, non raro autem etiam acutissimus, præcipue quum error aliquis in curatione committitur. Sed reliqua perpendamus. Ex pleuritide non admodum solent homines delirare, neque earte cum pleurâ habet cerebrum magnam consensionem; sed plerique ex pleuritide obeuntes ad extremum vique sapiunt, quinquam ex sola pleuritide. Nam ij quibus seprum transfusum inflammatum est semper delirant, & peripneumonici crebro superuenit delirium, pleuritis verò sæpe parit peripneumoniam, ac nonnunquam etiam septi inflammationem, quia ea quæ in membrana lætis est serpit in partes proximas. Huic fortasse horum quippiam factum est, si minus succi malignitas, & debilitas cerebri fuerunt in causa, vt per consensum in pleuritide deliraret. Dicit purgatum esse hanc pharmaco deorsum deliciente, & cum antea non deliraret, purgatum delirasse. Non dicit purgationem attulisse delirium, verum narrat quod actum est, vt ipse conicias an attulerit. Videtur suspacionem hanc augere, quod purgatus est non multum. Nam à pharmacis non omnino leuibus, quum expurgatio non procedit, merum timetur, ne commota excrementa nec vacuata in partem aliquam nobilem ferantur, vbi deteriorum aliquam passionem faciant. Certè in pleuritide non est multum vsus expurgatio: nam vel in iis quæ pertinent ad inferiores costas, & ad hypochondrium finiuntur, in quibus Hippocrat. secundum de ratione victus in acutis iubet pharmaco vti, videtur Gal. id esse petulicis malis plenum, ac proinde quoad fieri potest, agendum sola sanguina

A milione. Non tamen proinde nunquam est expurgandum. Nam in inclinatione, remittente iam inflammatione, quum corpus totum malo aliquo facco abundat, magnus est expurgationis thoracis compendium affert expurgatio totius corporis. Sed & antequam fluxio in parte firmata sit aliquando (et si rarius) ob dictas inflammationes, vtile est resurgere vi expurgatione. Id quod ne temere facias, sed cum febris non est omnino magna, & missus est sanguis satis, & succi à sanguinis natura degenerant, & nihilominus facultas fortis est ad ferendam alui fluxionem, & ad inflammationis tempus legitimum transigendum, & naturæ propria hominis non repugnat, sed is est qui facili expurgetur. Tantæ difficultatis est pleuriticum nondum inclinate morbo expurgare. Exduntur enim mille modis, aut aucta febre & inflammatione ab ipsis medicamentis, aut debilitata virtute & morbo nihil minuto, quod non euacuetur quod oportet, neque vnde oportet; aut quod commoveatur multa, euacuentur verò pauciora, velut haec euemisse est probabile; qui, quantum suspicor, nisi accepisset pharmacum, aut non obdisset, aut non tam citò, sed, vnde citiâ, aut decima quarta, tuncque fortasse sine delirio, aut delirium multo posterius accideret.

IN Oeniadis Phœnici & Andrea fratribus altera gena intumuit, & labrum quod est ante genam & oculum, & neque interius speculanti quicquam apparebat, neque forinsecus suppurabat, sed intumescens marcescebat arida putredine, & mortuus est. Et alter eadem perpeffus est. Mortuus est autem hic septimâ die, & bibit pharmacum, & nihil profuit. Phœnici verò putredo in circulum exsecta est, & vlcus purgatum est magna ex parte aequam moreretur. Mortuus autem etiam hic, cum diutius vitam protraxisset.

E Putredinem aridam appellat partis cuiuspiam putrescentiam citra resolutionem in succum viliū, vt putrescentia humida sit suppuratio, per quam & partes rumentes, & succi quo replete rument, mutantur in eum succum quem pus vocamus. Itaque arida putrescentia est, vt quum vlcetis labia fœcent ac liuent, & pars quæcunque gangrena corripitur, aut vlceretur, id est, corrolimo. Ergo hi duo fratres inflammatione secundum alteram genam correpti sunt, & secundum labium superius eiusdem lateris (hoc enim significat dicens *τὸ ἄνω καὶ τὸ ὑποστῆναι τὸ ἐξ ὀφθαλμοῦ*) nimirum superius quod sub eadem gena: & neque intro spectabat tumor, neque externis suppurabat, sed in gangrenam abibat vtrique. Sed quod in hac historia est notatu dignissimum, eodem modo affecti, non eodem modo curati, non sunt mortui rocidem diebus, sed etiam ambo sunt mortui, qui purgatus est non vltra septimum diem vixit: sed is cui *ἐξ ὀφθαλμοῦ κίρκος συνέβη*, id est, in circulum exsecta est pars emortua, & vlcus maxima ex parte expurgatum, diutius superfuit. Vt hinc intelligas, si superabile fuisse hoc malum, hunc potius seruandam fuisse quam illum. Quod quidem nos moner non obsecr, in

go citius poterat huic homini malum tollere, quàm eò usque sanguinem mittere. Verùm qui curationem aliquantò tardiorē, sed aliquantò turriorem optaret, mitteret sanguinem aliquantò parcius, & cibaret crassis & lentis cibis, & vteretur potu gelido, & balneo subfrigido.

E Polemo in Oeniadis dolebat coxa dextra, & inguen; & inuoluta coxa proxima, qua est ab inguine & anteriore coxe parte. Huic sanguis detractus est à malleolo, admodum multus, & niger & crassus, & cum medicamentum elaterium haussisset, multum purgatus est, & aliquatenus quidem melius habuit. Dolores autem non desinebant, sed suppuratam habebat & coxam & coxa ad sedem commissuram, partisque inguini proximas, quae magis etiam dolebant. Pus autem circa os magis quàm circa carnem in profundo generabatur, & aliquandiu latuit quòd ita se haberet, donec debilis admodum factus esset. Postea iniusta sunt crusta valde multa, quae magna factae sunt & sibiipsis propinqua, tum pus multum & crassum effluxit & paucis post diebus mortuus est, tum propter ulcerum magnitudinem & multitudinem, tum propter corporis debilitatem. Hic sanè videbatur, si scelus fuisset vnicà & amplà incisione, per quam pus facile effluxisset, aut si secundum necessitatem altera incisio & amplà facta fuisset, hac si in tempore facta fuissent, videbatur, inquam, posse sanitati resistere.

Coxa dicitur, & articulus ille omnium maximus, quo os femoris coarticularur, & os illud magnum, cum quo coarticularur. Quod os dicitur, aut coxa, aut os coxae est magnum, varias prominenas habens, & perforationes. Quod quidem cum osse sacro coniungitur per symphyum. Huius suprema pars quae à lateribus tendit in partem anteriorem, & est superior pudendis, ea in regione quae dicitur ile, vocatur os illum: pars media, & quae habet magnam excavationem, qua recipit ossis femoris caput, dicitur coxa, aut coxae os peculiariter: quod quidem à regione pudendorum est, & per partem internam & imam habet processum acuminatum, tendentem sub pudendis, quasi vtrinque venientes productiones sint in interfemineo congressurae: propius autem accedunt ad sese in viris, quàm in foeminis, in neutris verò vniuntur. Ab utriusque ossis suprema parte producit in anteriorem corporis partem supra pudenda os, quod in medio vnitur cum processu alterius partis, cartilagine, & mox deorsum redit à latere pudendi in imam partem coxae, & finit ita per forationem satis magnam, quam hoc os habet, vocatur hac ossis produ-

A ctio, os pubis. Itaque os ilium, & coxae, & pubis, idem os est, verum prægrande, & quod tribus in partibus tria nomina accipere potuit. Hoc os coarticularur cum femore, atque ita in eo voluuntur crura: coalescensque cum osse sacro, & dictam magnitudinem, figuram, & posum habens, simul cum osse coccygis munit, & commodum locum parat pudendis & podici. Nam pudenda erumpunt inter os pubis, & internus illos processus coxae, & podex inter hos processus & os coccygis. Sæpè tentatur dolore, & articulus ille magnus, & ipsum coxae os, & illi haerentes carnes: articulus quidem, quia maximus profundissimusque est, & asperitatem etiam quandam habet, & internus quasi in centro ligamentum quoddam, quod imbibit fluxionem, quam ob magnitudinem articulus recipit. Os verò ipsum (ut ossa dolere possunt) & caro, ac reliquae partes, quae illi haerent, quia posita sunt in ipso sordium confluxu. Nam per id os, & vrinæ, & faecum viz decurrunt, & genitales: & illi proximæ sunt venae haemorrhoidales, præter venas & arterias satis magnas, quae in crura deferuntur. Has ob causas solet hæc pars recipere multas variasque fluxiones, & ab omni fluxionis genere cruciari, nunc in articulo, nunc etiam extrà iuxta os, aut ad anteriorem partem versus inguen, aut ad imam ad interfemineum, aut ad posticam ad nates: læpæque fluxio ipsa in pus abit, quod nisi tempestivè educatur, spontè erumpens extrà, fistulas eo loci facit, aut interius manens acerbis cruciat. Suppurationes, quæ à cute non absunt plurimum, facillè deprehenduntur, vel ipso chirurgi tactu, quum verò in alto latent, maiori arte opus est ad cognoscendum. Eas quæ in thorace, aut magno alio ventre sunt suppurationes, aut parte cordi vicinâ, necessariò febres antecedunt, eæque quum pus conficitur crescent, fiuntque horridæ, & quum rumpuntur novos rigorescunt, & iam inde faciunt pro dolore pondus, atque adeo fluctuationes in confectionibus, duratque deinde febricitans remissiones, sed ex quibus, nisi citò liberentur, tabescunt homines. Verum accidunt suppurationes quibusdam in locis, in quibus non potes hæc expectare. Nam in brachio, aut parte alia longè sita à corde, potest adesse pus in alto latens iuxta ipsum os citra febrem: non quidem erit mukum, neque ex inflammatione magna sed exiguum, & ex cortosione particularem iuxta os aut etiam ossis tunicam factum. Sed & quibusdam in partibus inter inguina, & alas fieri potest, ut pus lateat, cum neque febris maxima antecesserit, neque sensus ponderis, neque fluctuatio subsensata sit: febris quidem magna, quod longè etiam sit pars à corde, & non ex magna aliqua inflammatione in suppurationem affatum abeunte processerit malum, sed ex fluxione aliqua paulatim putrescente & corrodeute: fluctuatio, aut pondus, quod non habeat pars ventrem, aut vomitum insignem, sed inter musculos & periossium, aut hoc & ossa interfluit, velut imbibitum parvis pus. Velut huic factum est pus in coxa, inter os ipsum & periossium, periossio ipso, ut arbitror, cortoso. Quæ ergo signa in talibus expectanda sunt? Certè febricitula non potest habesse, vbi cumque pus notatu dignum (quod sectione dico, aut vili-

ne extrahi sit necesse collectum sit inter inguina & alas, non sub cute, sed in interioribus moram faciens. Nam ubicunq; ita sit, aut tener arterias aliquas magnas, aut illis proximum est pus, per eas autem necesse est fulgines putridas in cor transmitti. Quo fit, ut quibus incautus interna aliqua suppuratio est, lente, ignarique quid patientur, tabescant cum quibuscumque febriculis, quas neque an febres vocent, satis certo sciunt vulgares medici. Et hoc quidem commune est omnibus internis suppurationibus, magis vero accidit illis quæ sunt in ventribus, in quibus quidem dolor tunc cessat, quom pns erupit, & pro eo fit solum pondus: in illis vero quæ iuxta ossa, aut inter ipsa carnēque proximam factæ sunt, febris non adeo apparet, sed quando pus generatio magis procedit, tunc magis dolores ipsi ingruunt, qui tanto magis procedit periosij, & partium aliarum sentientium corruptio & exesio. Cum ergo os aliquod aut partes illi hærentes dolore afficiuntur, & vacuo expurgatoque corpore, & adhibitis idoneis medicamentis, quamquam reliquo corpore videatur ager sese habere melius, & secundum ipsam adeo partem iuuantur, ac si quid tumoris carni, aut inflammationis sublatum sit, dolores tamen durant, ac rursus anguntur, & corpus debilitatur, quod vel ob diuam causam cum febricula fiet, vel etiam sine ea (ut erit pars): ob assiduū dolorem metitō chirurgus suspicabitur corruptionem subesse & pus, paratque auxilia ad eam affectionem necessaria. Ea porro, ut ex Hippocrate innumeris in locis accepimus, præcipue libello de internis affectionibus, sunt duo, visio & sectio. Nam medicamenta solaxat sunt in his sanis. Visio præterea est duplex, aut enim est penetrans usque ad ipsum pus, ut simul sit visio & sectio, velut si cultello aut stilo ferreo ignito pungas aut seces: aut est inuisio, hoc est, visio vulperans superpositam cutem, & crustam gignens, non penetrans tamen. Priori visione non minus quam sectione educitur afflicti pus, inuisione non ita, sed vlcuscula sunt, ut per ea natura demittat ea quæ ad internam partem colligebantur, aut etiam quæ collecta erant, paulatim erudat interna expurgans. Pro sunt etiam inuisiones secundo, ac firmando partes, quom sunt humidæ & laxæ, ac intercludendo viam fluxionibus, nimirum cicatrice duratur constriungunturque partes. Hinc fit, ut cum educere pus quod in alio est volumus, sectione vi debeamus: si pus malignum non sit, nec pars putredini opportuna, solo inesorio: si autem sit, terro candente, quis ignis cohibet & extirpat putrescentiam: inuisione vero vii tunc solum debeamus, quom fluxio nondum in pus mutata subest, aut mucores adsunt & laxitates partium, velut ligamentorum in dolore coxæ, & alius articularibus, aut nisi forte quom sectionem non audemus facere, est alioqui eam perat moribus. Velut suppuratis intra thoracem iuber Hippocrates dicto libello sectionem facere penetrantem quā pus effluat (nimirum id consulens, quod morbus petit) alij tamen inuisionibus in spatii intercostalibus contenti sunt, qui scilicet magnitudinem auxilij, & difficultatem in debili iam ægrotō reformidant. Hinc igitur Eupolemo dolebat coxa, os scilicet coxæ, & inguen (inguen dicitur si flexura locus, quo suprema femoris pars adducitur ad puden-

da, qua parte sunt glandule copiosæ) quare quom addit *ἡ τὴν ἰσχυρὰν ἐκποδὴν τὴν ἐν τῇ ἰσχυρᾷ* in *ἰσχυρᾷ*, illud *ἡ τὴν* est declaratiuum: *ἰσχυρὰν* enim vocat illam commissuram, quæ est ab inguine ad coxam, aut locum quō adducitur coxa, quæ est articulata cum supremo femore ad inguen. Dedatæ etiam quæ coxæ pars doleat, addit & coxæ partem anteriorem. Itaque laborabat dolore partis anterioris coxæ: quā spectat ad inguen, & ipsius in guinis. Huic sanguis detractus est ex talo. Certe vnde maxime educi debuit iuxta legem restitutiōnis, quam in mittendo sanguine, quoad fieri potest semper feruare oportet. Nam si partes hypochondriacæ humiliores afficiantur, ex crure eisdem lateris euacuari oportet, velut si superiores è brachio. Itaque & ob nephritidem & ob ischiadem, & ob infirmatas hæmorrhoidas, & bubonum tumores, oportet ex crure affecti lateris sanguine mittere. Exijt verò etiā quantum & quale oportuit, nā valde multus, & niger, & crassus: multum. n. exiger magnitudo affectus, nigrum & crassum conditio loci. Nam ad has humiles partes semper repit sanguis melancholicus, proindeque post missionem sanguinis pharmacum etiam desiderat, datūque huic est pharmacum Elaterium. Ita vocat Hippocrates familiare sibi pharmacum ex succo cucumeris sylvestris paratum. Docet modum parandi Dioscorides libro 4. Commendat illud Melus insigniter ad ischiadicis dolores. Sed & Hippocrates libro his iam citato de internis affectionibus. Huic (inquit) qui sic habuerit [loquitur de ischiadicis] elaterium bibendum dato. Itaque venæ sectio, & expurgatio recte acta sunt, & purgatus est multum, & melius habuit. Dolores autem non desinebant, quia non pendebat malum ex sola redudantia succi cuiuspiam circa eam partem, sed supputam iuxta habebat, & coxam, & coxarum ad sedem commissuram (*ωχλὴν* vocant Græci eam partem, quā in interfemineo, iuter pudenda inquam & podicem ferè coniunguntur, in vicijs præcipue duo illic coxarum processus, quos diximus) & partes inguini proximæ, quæ (inquit) magis etiam dolebant. Sed dices, si dolebant hæ partes etiam plus quā antea, quo pacto dicitur habuisse melius? Nam dolor harum partium erat præcipuum malum, quo homo laborabat: Certe recens missio sanguis, & facta expurgatione, necesse fuit laxatis circa partem venis dolores minui, verū cū in parte pus maneret, necesse etiam erit crescere de nouo succrescente putrescentia, & in maiotes etiam abire quā essent prius. Pus verò fiebat non iuxta cutem, sed in profundo versus os magis quā circa carnem. Quod quidem duplicis mali erat causa, & quod dolores essent grauiorē, & quod multo magis dolerēt, neque cognosceretur affectio. Ut sanè factum est. Nam non intelligens quid mali haberet, per tempus satis multum (*ἡ δὲ νόσος ἔκτατο*, hoc est, quamvis ita se haberet, non magni facebat, neque se curandum medicis tradebat, putans se leniori aliqua de causa dolere, & expectans, ita vt fit, auxilium temporis, donec valde debilis factus esset. Tunc tandem intellexit curatione aliqua maiori esse opus, & inuise sunt crustæ valde multæ, & illæ quidem excrementis escharis, vt in combustis fieri solet, factæ sunt magnæ, & proximæ innicem. Quæ in curatione duo-

bus modis peccatum est, & quia seorsum est adhibita quum æger præ debilitate non posset ferre & quid maior quàm pro facultate adeo debili. Nam multæ maiores & propinquiores inuicem factæ sunt, non arbitror quàm morbus peteret, sed quàm facultas ferre posset. Non est autem faciendum quantum morbus petit, nisi etiam facultas permittat. Ita factum est, ut pus liberet multum & crassum, morbo scilicet tantam curationem postulante, homo tamen moreretur, magnitudinem & multitudinem vicerum facultate præ imbecillitate non sustinente. Si igitur huic non fuisset adhibita curatio tardæ, sed opportune (ante scilicet quàm debilitaretur) factum esset quod expediret, verisimile est seruati potuisset, quandoquidem cœperat sibiluati euacuationibus vniuersalibus, & alioqui affectio non est incurabilis. Atque tunc non opus fuisset inuentionibus, neque sectionibus tam multis. Nam cum pars non admodum expulset putrefecere, neque virus malignum, sed pus bonum esset, non oportebat ignito instrumento secare, sed incisio solùm. Nam ut in quibusdam aphorismis reperitur scriptum. Ignis sanare debet quos non potest ferrum, & hoc, quos non potest medicamentum. Frustrâ verò atque adeo male tentatur auxilium manus, ubi minus potest conferre. Porro cum pars nondum esset diuturnitate facta admodum sinuosa, non opus erat tam multis viceribus, sed sufficiebat una aut altera scissio bene fluens; *ἡ γὰρ ὥσπερ*, id est, sectionem facillè fluentem vocat Hipp. non solùm ampliam, ut Cornarius intelligit, sed accommodatissimam ad expurgationem sinus. Talis est quæ alta aut æmula est quantum oportet, & deductus ita scilicet facta, ut spontè pus effluat, si fieri potest, sin minus, saltem ut minimo negotio extrahatur. Ergo duplici ratione expedire posses hunc seruati potuisse, si tempestiue esset curatus, & quia minus auxilium fuisset satis, & quia quodcumque facultas tulisset melius. Proinde dicere, videri si seruati hunc potuisse, si tempestiue passus esset vnam aut alteram sectionem *ἡ γὰρ*. Vtilissima profectò est hæc lectio, quæ quis sit illius author, quàm non tamidi narratur quid factum sit, sed quid faciendum fuerit docetur.

Licon in Oeniadi in reliquis quidem eadem passus est, dolores tamen in crus non valde procedebant, nec parulenta factus est, sed longo tempore sanitati restitutus. Medicamenta autem bibebat & cucurbitulas admovebat, & vena sectione utebatur, & cum hac pateretur, melius se habere videbatur.

Licon laborabat etiam ischiade ut Eupolemus, erat verò huc magis circumscriptus dolor in coxæ articulo, neque carnes proximæ adeo occupans, neq; ad crus se effundens, quæ coxæ dolorem plerumque solus Paulus animaduertit. Proinde non est suppuratus ut prior, ut pote carnibus non tentatis phlegmone, sed humore occupante articulum. Erant dolores magni, & ob profunditatem articuli non nisi multo tempore sinus est factus. Darius enim

A est hic morbus, præcipue quum pituitosus est, & senioribus accidit. Tunc enim ut libro 2. prædictionum dicitur, non solet finire ante annum, & veris æstatisque opem expectat, sed & cum iunioribus fit estque breuissimus, non ante quadragesimum diē soluitur. Ac plerumque quidem non soluitur tunc perfectè, sed misceant dolores, & qui præcoci obliuiscunt non sicut diutius durant, quin etiâ per vicissitudines prout accidunt mutationes aut ætatis, aut victus, aliquando exacerbantur, aliquando misceant, & ita etiam curantur. Primis enim quadragesimæ diebus cum malum virget, instatur euacuationibus & aliis auxiliis magnis. Deinde leui aliqua agitur curatione, & quæ diutius possit ferre egrotus, aliquandoque ex quibusdam intervallis, ut malum exacerbatur, aut corpus repletur, aut ob aliam occasionem videtur medico, reditur ad maiora auxilia. Sed quæ sunt ea? Venæ sectio in crure, & expurgatio, siue per elastium, siue per quodvis aliud efficax, & crassos succos extrahens medicamentum, & cucurbitularum super ipsa coxâ admotio, siue cum scarificatione, siue etiam sine ea, & inuersiones. His nam quæ auxiliis genitibus, præcipue ad hanc affectionem utebatur Hippoc. missione quidem sanguinis, ad vacuandum & corpus totum, & proximæ venas affectæ parti. Atqui ut proximæ venæ vacuentur, redditus venæ secanda facit, quæ quidem dicta in vena maximè est: expurgatione autem ad expurgandum totum corpus, ac non nihil etiam extrahendum ex affectæ parte. Maximè autem extrahent ex ipsissimo articulo in extremam eum cucurbitulæ, quæ profectò maximi sunt usus in omni profundo dolore, in hoc verò præcipue. Nam quæ ratione (ut medicamentorum etiam memoriam) vitari iubet Gale. 10. de compos. med. sec. loc. cap. 2. in hac affectione repercutientia, & uti in incens solis anodynus, deinceps ex alto trahentibus eadem adducuntur, ut cucurbitulas crebrius quàm in alia affectione articuli utamur. Nam quid aliud est cucurbitula, quàm potenter extrahens auxilium? Si igitur admotæ cucurbitulæ curæ valde rubram reddiderit, scarificabimus, sin minus, scarificatione dimissa supra carnem quam cucurbitula traxerit, medicamentum trahens imponemus. Inuersiones quibus libro de internis affectionibus vitatur (mirabiles quidam visionis modos reperies apud Aetium ex Archigene 1. cap. 12. libri) partim hac ipsa ratione profunt, partim quod, ut in historia proxima dicebatur, succum mucosum, qui sunt in ligamentis articulorum, & firmant partes. Quod Hippocra. vltimus sexæ partis aphorismus aperte docet. Memò ergo hoc ex missione sanguinis, expurgatione, & cucurbitulis melius se habebat, & his reperitis persanari potuit. Quandoquidem dicit pharmaca bibebat, adhibebat cucurbitulas, sectione venæ utebatur, præteriti imperfecti verbis viens, innuit non semel eum vsum his esse, neque vno aliquo tempore circa intermissionem, sed aliquoties ex intervallis. Quibusdam fortasse non probabatur quod diximus, missionem sanguinis debere fieri ex crure, quia 6. epid. sect. 3. dicit, in fluxionibus ad coxam venas post aures secato. Et Gale. loco citato ex 2. de comp. med. dicit a cubito primam sanguinis dextractionem facierdam, ac venterioris vtendam, cui subscitum Paulus & Aetius propriis capitibus de ischiade. Penò quid in alijs ex-

C

D

E

F

gunt, vt dicamus, non tantum in crute secandam esse venam, sed & quæ vena, quæ in interna, an quæ in externa parte tali. Verum his vtriusque respondet Gal. in com. aphor. 36. particulæ sextæ dicens: affirmare venas in cubito secandas esse ob ischiadem, neque verum esse neque consentaneum Hippo: vellem autem ipsas malleoli venas distinguere esse inane. Videmus liquidum (inquit) ipsum in omnibus libris suis, in partibus quæ supra hepar sunt, è manibus sanguinem mittere; in inferioribus verò venas quæ in poplite vel malleolo sunt, secari iubere. Siquis verò de his (hoc est, de venis malleoli) ipsum dixisse arbitretur, secare autem interiores, hoc dictum paruam vim habet. Ab vna enim ambobus nascitur, quæ in poplite trifariam diuiditur. Quoniam & vna vena ad hoc pertinet membrum, non sicuti ad manum dux. Hæc Gal. quibus assenti- mat in malleolo nihil interesse, quæ venas fecerit: verum secandas esse in cubito ob ischiadem falsum esse & minimè Hippocraticum. Quod verò Gal. alibi hoc faciendum dicit, quod hæc dicit esse falsum, intellige non eodem modo esse vtriusque dictum, sed in aphorismo curari firmatam iam in parte ischiadem, in aliis locis imminuentem, & iam iam partim minuantem, quo etiam tempore vomitiones quàm deæctioris purgationes meliores sunt, contra: verò iam firmato malo. Sed de hac re à me scriptum satis est in controuersis capi. de reductura. De sectione venarum post autem, & de distinctione venarum in crute iterum suo loco dicetur.

Athenis homo quidam laborabat pruritu totius corporis, præcipuè verò testinum & frontis: cruciabaturn autem admodum vehementer, & cutis crassa erat per totum corpus, & qualis in lepra videri solet, nec cutis præ crassitie vlla ex parte apprehendi poterat. Hunc nemo iunare potuit. Melum autem profectus, ubi sunt calida balnea, à pruritu quidem & cutis crassitie liberatus est, hydrope tamen laborans mortuus est.

Hic affectus ortum habuit non tam ex bile adusta (qualis est ea quæ lepram gignit) quàm ex pituita falsa, quia erat admodum vehementer pruriens. Verum constat melancholiam etiam admixtionem habuisse, quandoquidem erat aspectu velut lepram habens. Atqui profectus erat lepræ proximum malum, & vt ego dixerim, lepra quædam. Erat ex melancholia & falsa pituita, fiebat pruritus ex falso & acido, vt siquis scalpiti dilaniatæ cutis afficeret salem cum aceto. Erat verò durata ac velut crustosa curis congestionem crassiorum & siccantium excrementorum. Hic cum medicamentis parum iunaretur, confugit ad balnea aquæ dulcis & calidæ. Verisimile est autem hunc expertum iam morbi consummationem, qui nullis medicamentis cessisset, vsum fuisse immoderatissimè balneis, quibus merito à pituita, & cutis crassitie liberatus est, balneo dulcedinem affertente salis & acidis, & resoluente succos, & emolliente eutemiam: non ob immoderatum vsum factus est hydropicus. Nam vt Gal. docet cap. 8. primi de simpl. med. facult. Balneum calidum refrigerat cor-

Apora, quia corpus rarefactum, transpirante immoderatus calore nario, frigidius efficitur. Admodum itaque hæc historia, ne balneis calidis immoderatus vti sinamus, etiam si quis ex iis vtilitatem videatur percipere, in iisdem affectionibus propter quas ille ad ea profectus est.

Athenis virum cholera corripuit. Vomebatque, & deorsum deiebat, & dolebat, & neque vomitur, neque deiectio sisti poterat. Et vox deserebat, & moueri ex lecto non poterat, & oculi caliginosi & cauerant. Et conuulsionem detinebant ab aluo & intestino profecta, & singultus. Deiectio autem multo maior erat, quàm vomitus. Hic bibit elleborum in lentium succo, & superbibit lentium aluin succum, quantum potuit, & postquam vomuit ambo coacta sunt & subsisterant, frigidus verò factus est, & lanatus est multa valde calida à prudens infernè, donec superiores partes incalescerent, & vixit. Postridie autem tenuem polentam bibit.

Cholera, vñ mēs χολή, hoc est à bile, vt multi volant, aut vñ mēs χολαίον, hoc est, ab intestino, vt vult Trallianus; morbus est acutissimus patitur & periculosissimus. Plerumque primo quaternario finitur, rarissime superat septimanam, ac fortasse nunquam, si legitimus morbus is sit. Est morbus per quem simul eueritur supernas & infernas venter, neque continere se possunt ægroti, quin simul deiciant & vomant. Constat ergo hoc symptoma peruenire ad retenticiem, & expultricem, esseque alterius motum nimium, alterius impotentiam. Hæc fit, aut in essentia debilitate facultate retentice, per in-temperiem propriam ventris, aut ob malignam qualitatem, redundantiæque immodicæ aluius excrementi, plurimum irritata expultrice, aut, (quod plerumque fit, multarum enim causarum congestum debetant effectus grandiores) his omnibus simul accidentibus, debiliare inquam retentricis, & magna copia maligni excrementi. Hinc fit, vt magnus præceptus lapsus virum hunc morbum cito sequatur, ac proinde vocis defectus, mouendi impotentia, caligo & excantatio oculorum, & frigus extremorum. Quia. I. nō robore, sed impotentia facultatis agitur euacuatio, quæ æquè funditur spiritibus & excrementis. Accedit loci natura, otis inquam ventriculi, eum quo cor & cerebrum facillimè patiuntur, ac per hanc copiosissimè conuulsionem tentatur, etiam quam procedit malū: singultu verò, quia est ventriculi conuulsus motus. In morbis huiusmodi, quibus euacuationes præter naturam coniunctæ sunt, frustra neq; sine magno periculo tentatur adstrictio, antequam copia excrementi vacuata sit. Quum ergo euacuationes videntur pro-cessisse satis copiose, & neque virtus adhuc labascit plurimum (ferendæ enim sunt aliquæ debilitatis notæ propter symptomata) esse cohibendum, neque prouocandum est, sed occutrendum solum alijs symptomatis: si autem iam videtur processisse plusquam pro excrementorum in corpore abundantiæ, aut plusquam pro virtutis facultatis, sicut

E

F

dam mox: sin autem irritatio, dolor, & anxietas sit maior quam pro magnitudine euacuationis, & euacuatio minor quam pro multitudine excrementorum, expurgandum est, vt copiam affatam vacuata valeas occurrere symptomati, quod in nimia expulsionem est. Quæ regula est in cholera; & in dysenteria pariter obseruanda est. Verum quia symptoma vel à principio vrget, & irritatio nunquam per hunc morbum omnino tollitur, neque eam expurgamus symptoma negligere, neque eam colubemus, irritantis succi obliuisci debemus, sed expurgantibus debemus admiscere aliquid adstringens, & adstringentibus aliquid extergens, aut aliquid mordacitatem beberans, aut alternatim eis vti. Hanc ob causam dedit helleborum in succo lentis, & superbibit lentium alium succum quantum potuit. Vt uti quum post medicamentum expurgans exhibitum, consulto secundo de ratione victus in acutis, ptilianam protinus dare sordendam non insigniter minore quam consueta est quantitate: ita huic superbibendum dedit succum lentium: intelligendum autem est succum expressum cum iure bis coctarum. Talis enim, vt Dioscoridi & Galeo placet, adstringendi vim habet, & ad cholera & dysenteriam utilis est. Itaque miscuit helleborum cum succo lentium, vt expurgans adstringentium faceret: eodem consilio quo hodie in his passionibus dantur myrobalani tosti, aut etiam tostum rhabarbarum, aut aloë, non sanè, vt mihi videtur, præter rationem, sed iuxta hanc quam securus Hippocritus. Sed cur dedit helleborum, quo ad supernas purgationes solebat vti, vt ex aphor. 4. particula constet, potius quam deiectionum aliquid? Certè quia deiectione multò maior erat quam vomitus. Cum enim intestina magis afficta essent quam ventriculus, vomitoria expurgantioris præstant: vt totius corporis euacuatio, & à parte præcipue affecta renulso fieret. Id enim est quod in ventris affectionibus maxime timemus, non posse expurgari corpus, nisi per affectam partem, vitandum ergo est id quam maxime potest, atque si ventris partes non aequè laborant, per eam mouendum quam laborat maris. Multò ergo magis in dysenteria (vt hoc dicitur obiter) vomitorius vitandum est. Itaque accepit dictum pharvacum & euomuit, & ita (euacuato scilicet succo qui irritabat) coacta sunt, & subsisterunt ei ambo. Frigidus verò factus est, debilitatus ob effusos spiritus calore naturali, & eo qui supererat intra cor ob dolores, & anxietatem recepto, donec his solutis reuocaretur, reuocatusque sese in totam corpus effunderet, & liberaretur à suffocatione, quæ coactus conspatusque periclitabatur. Vtius proinde est aqua calida infernè valde multa, faciens ægrotum in eam descendere vsque ad pudenda, manere quælibet, donec caleficeret totus. Fieri etiam potest hæc caloris reuocatio lintheolis calidis ad motus brachius, & cruribus. Deinde cibatus est polenta renui ex aqua, cibo sanè tenui, vt à debilitati facultate commutari posset, & leno, & dulci, vt leniore bereret, retinereturque, & alia retineri faceret, & si quid reclusum aut excoriatum maneret, obtutaret, & oblimiret: dulcedine verò si quid superet esset irritans, obtunderet. In hunc usum nos vitum amylo ex iure puli aut gallinæ. Considera hic antiquorum prudentiam circa victum debilitatorum, qui recens expurgans,

A aut alioqui spontè exhaustis, tennis cibi exiguum exhibebant, adeò vt hic autor polentam ex aqua non nisi tennem, hoc est, cottistantem pauca farina dare ausus sit. Contra ac vulgares medici faciunt, tribuentes multos bene crassos cibos cum vino. Quasi quod multis diebus exhaustum est, vnà sint reposituri. Non esset præter rem huic ægrotò cataplasmata secundum totum ventrem adinouere, citra insignem calorem aut frigus robocantia, & ventri naturaliter grata. Cuiusmodi sunt quæ parantur ex carne cydoniorum aut palmularum, cum idoneis oleis, aut vino, aut aliis succis, & farinis, aut aliis huiusmodi. Verum Hippocrati non erat institutum dicere omnia quæ agi possent, sed quæ acta sunt, neque meum sanè omnia sanè ostendere, sed sunt præcipua. Cælius Aurelianus libro 3. acutorum morborum cap. 21. carpit Hippocratem, quòd vomitum curauit vomitu, cum colubere potius opus esset. Verum erat Methodicus, & in solam adstrictionem aut laxitatem oculos inuadens, & eorum quæ ex accidenti sunt ignarus. Nos verò vomitum vomitu solui. 6. libro docebit ipse met Hippocrates.

I N larissa vxori Gorgia menses suppressi erant per annos quatuor, præter valde paucos, in vtero autem quoquo versus conuertebatur pulsus exhibebant & pondus. Hæc mulier concepit, & peperit, & puella vna nono mense edita est, vlcus habens in coxa, & secunda consequta sunt, & copiosus admodum sanguinis fluxus superuenit, & postmodum, & tertia die, & quarta etiam grumi sanguinis concreti, & febris eam tenuit decem primis diebus, & effluxit deinceps illi sanguis ruber, & intumescere facies vehementer, & tibia, & ambo pedes, & alterum femur, & cibi non capiebat, sitim autem habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat, vinum autem nullo modo. At venter post primum satum modice emoluitus est, omnino autem non concidit, sed durior erat. Dolor verò non aderat. Quadragesima autem die à prima excidit superfetatio, caro quadam, & venter concidit, omnesque tumores, & fluxio tenuis & sanguis olens prodit, & conualuit.

Hæc Gorgia vxor habebat vterum scirrhusum, quod significabant pondus & pulsatio, quæ sentiebantur in quatuorunque partem mulier conuertebatur. Duratus enim vterus, velut alienum pondus, feruè quocunque conuertitur corpus, & arteriæ quæ comprimuntur, nitentes sese esse, sentiantur pulsare. Hic affectus genitus fuit ob suppressionem mestrui, & rursum ob hunc affectionem non fluxerunt. Ita suppressi erant menses per annos quatuor, præter valde paucos menses, qui illis quatuor annis fluxerant. Nihilominus concepit, & superfetauit. Vnde constat dactyliem non

occupasse vterum vsque ad os eius, alioqui non posset concipere. Concepit vero foemellam, & cum iam instaret tempus partus superfectus. Causam superfectandi dicit Hippocrates libello de superfectione esse, quod os vteri exadè clausum non sit. Verisimile ergo est affectionem illam diuturnam, etsi omnino prohibere non potuit oris adductionem; prohibuisse tamen exactam, vt concipere quidem potuerit, sed & superfectauerit. Aut fortasse non ob affectionem pristinam, sed ob instantem iam partum superfectioni congruit. Incipit enim natura eo tempore os vteri iam recludere: ac proinde maior periculum superfectionis est prope partum; quam superiori prægratione. Factam autem esse iuxta partum constat, quia abortus contigit quadragesima die à partu; & caro informis edida. Si enim vel viginti dies ante partum esset concepta, plus aliquid ac melius formarum editum esset quam carnea moles. Porro constat superfectionem etiam conceptam esse foemellam, masculis enim quadragesima dies sufficiens adfigurationem, neque vnoquam videntur carni similes. Non mirum est autem impurum matris corpus concepissem feminas. Et cum secunda secutura adeo exigua esset, non potuit expellere priorem, ipsa verò corrupta est prioris partu intra quadraginta dies. Et partus quidem cepit, abortus autem succedens perfecti iudicationem morbi veteris, ita scilicet vt solet. Cum eodem per partum tam copiosa enatio fiat, euenit multos muliebrium morborum partu iudicari. Itaque inquit, mulier concepit & peperit, hoc est concipere potuit, & ad perfectionem partum perducere; & puella vix nono mense edita est, non tamen sana, sed vlcus habens in coxa, quod accidit ob paruum (arbitror) alimentum quo in vtero vtebatur. Et secundæ consequentæ sunt exeuntem partum (vt oportuit) & sanguinis fluxus superuenit admodum copiosus (statim scilicet in ipso loco, in quo sequicorylam oportere etuacuari Hipp. dicit) sed & postredie etiam & tertia die & quarta exierunt grana sanguinis concreti. Non tamen sine febre transiit (vt quædam solent) neque quarta die eam reliquit (vt pleasque earum quæ ritè purgantur solet) sed febris tam tenuit vehemens decem primis diebus. Scilicet euacuatio primi quaternarii cessauit, ac proinde producta febris est vsque ad decem dies, quibus exire cepit sanguis ruber. Non enim oportet cessare. Ita enim dicit Hipp. 1. de morbis muliebus. Si verò purgatio purperij primis tribus aut quatuor diebus processerit, vterum postea repente euauerit, easdem affectiones patur quæ prior. Itaque post decem dies cessauit febris fluente sanguine rubro, cepit verò motus magnitudine fortè diuisa putrescere secunda secutura, & proinde mulier habere ea quæ Hippocrates initio de superfectione familiaris esse huic affectioni dicit his verbis. Nisi vero statim secedat superfectario (stans inquam ac deciditur aut putrescere incipit) dolores excitat, & fluxum frigidum, ac febrem & facies, tibiæ ac pedes intumescent, atque si dissoluatur, orbem auersatur mulier donec exciderit. Quandoquidem ergo superfectatio cum rumpi incipit, febrem solet facere, consentaneum est hanc non fuisse omnino sine febre à decima ad quadragesimam diem, sed sine acuta & vehementi. Omnino autem fuisse ali-

quam, sitis illa vehemens quam habuit indicant. Sed quam ob causam his intumescant, facies, pedes & tibiæ, atque huic alterum femur? Certe quod per compassionem cum vtero debilitetur hepar, ac signat sanguinem ferosiorum, qui in corpus distribuitur. Cur ergo hæc potu aquæ frigidissimæ inuabatur; & vini nequam? Certe ob scirrhus vteri, qui cum tunc esset phlegmonosus, vino exacerbabatur, frigidissimæ autem occursum, attemperatio quædam & solatium sentiebatur. Non tamen potus frigidissimæ potest persanare affectionem, neque persanata esset, nisi alia eaque magna superuenisset euacuatio ex abortu. Primus enim partus affectiones vteris minuit, secundus sustulit. Nam venter (inquit) post primum partum modicè emollitus est. omnino autem non concidit, sed durior erat. Sed quo pacto durior erat, si emollitus est? Certe scirrhusi tumores minores facti sunt, atque ita venter ea regione quæ sitis est vterus, durities habebat minores prioribus, quam ob causam emollitus dicitur, non tamen adeo minores vt non satis sentirent, atque vix dicitur non omnino concidisse, sed esse durior, non quam antea sed quam pro natura. Ita etiam dicit, dolor non aderat, non arbitror quod omnino nullus adesset, si quidem superfectionis corruptiones dolores excitare dicit Hippocrates libello de superfectione, sed non quibus antea. Numerum phlegmonosum modum deposuerant magna ex parte scirrhi, quadragesima autem die (inquit) à prima (ea scilicet quæ peperit) excidit superfectatio, caro, Et venter concidit & omnes tumores, & fluxio tenuis, & sanguis olens prodit, quæ scilicet congesta erant putrescentia superfectionis.

Phæris mulier diuturno capitis dolore laborabat, nec ullus quicquam innare poterat, nedum purgato capite. Melius autem se habebat, quum menses illi facile prodibant. Hæc quum caput circumdolebat, pennis bene olentibus ad vterum appositis innabatur, & paucum quiddam expurgabatur, & cum concepisset, capitis dolores desierunt.

Cum caput doleret ob suppressionem menstruum, metuo fiebat vt non ubi fluentibus illis facile, aut in vtero concipiente muliere tolleretur dolor. Nam perinde est quod ad quantitatem attinet, vtero gerere & menses fluere, quis factus attrahit ad se sanguinem, & in suam nutritionem absumit. Hanc ob causam prægratio soluitur dolores, qui ex suppressione menstruum suot: quoniam quibusdam etiam prægratio hos ipsos dolores affert, quibus antea non erant. Quæ quibus menstrua bene ac facile fluunt, prægratione detinentur iotra vterum. Minus autem dolere possunt partes ex vtero facile fluentibus menstruis, quam ad vterum tractas, sicut etiam minus ad vterum tractas, quam neque tractas neque exeuntes. Proinde prægratio dolores tales habentibus tollit, non habentibus affert. Porro suppositoria odorata, aut suffusus vterum laxare, & vias eius aperire & fluxibiles facere, ac proinde veteras passio-

nes solute, quæ ex adstrictione aut suppressione sunt, Hippocrati est celeberrimum, & vulgo notissimum. Causa verò est in tenuitate & calore vaporum. Quod verò hæc ipsa naribus hæsit præfociones vteri augent, quod etiam mulieribus est experimento cognitum, causa est incunditas, quam cerebrum recipit, & proinde otium agens descendit à concussione quæ vterum iuvare solet, & præfocionem discere non aliter ac epilepsiam.

Mulier Larissæ prægnans decimo mense sanguinem multum quatuordecim diebus demisit, plurimum verò tribus ante pueri corruptionem. Decimaquarta vtero excidit puer mortuus, habens dextrum brachium adhaerens lateri, & tertia die eadem noctis horâ quâ puer, secundina & alba purgamenta prodierunt: deinde tribus diebus & noctibus multa moderatè prodierunt. Postea autem febris corripuit duabus diebus & duabus noctibus, totiusque ventris & coxarum, præcipue verò imi ventris dolor infestavit.

Quali prægnatio affectus sit decem mensium, dicit decimo mense sanguis exiit illi multus quatuordecim diebus, cum tamen dictum sit. 2. huius operis sectione 3. novem mensium græcorum esse. Neque sanè ad id quod modò dicitur, satis est quod eo loco notauimus, putà novem menses græcos continere partem decimi mensis lunaris, atque ita naturales & communes partus fieri novem mensibus græcis, & decem lunaribus: neque quod ex libro de carnibus diximus, novem mensibus græcis & decem diebus legitimum partum fieri. Non inquam satis est putare hic intelligi menses lunares. Nam dicit decimo mense exiit illi multus sanguis quatuordecim diebus, ac verò novem menses græci capiunt tantum novem dies de cimi lunaris, aut quā minimum plūs aut minūs, quo pacto ergo novem decemque diebus exierit sanguis diebus quatuordecim? Certè non potuit, sed intelligere necesse est, hinc productam esse prægnationem ultra novem græcos (multas enim decem græcis perfectis parere, illo loco diximus, confirmamurque testimonio Hippocratis & Aristotelis) videtur sanè imperfecta esse narratio. in qua de re non adeo frequent, quasi frequens sit agitur, neque id ipsum narratur, oportuit enim primum omnium dici, huic productum esse partum ultra ducentos septuaginta dies, quibus novem menses græci constant. Non tamen hoc mirum est, imperfectam enim esse hanc narrationem, atque adeo ut ego suspicor, veritate mîlratam, alia ex parte intelliges. Nam cum peperisset partu omni ratione præter naturam, tempore scilicet, quia neque novem neque decem perfectis mensibus, & causâ, quia ob fluxum sanguinis præter naturam (præter naturam enim fuit in paru ante forum editum) & ipso fetu, quia monstruosus aliquatenus erat, cum haberet brachium adhaerens lateri, cum inquit adeo præter naturam peperisset, vt necesse esset multos dies post partum laborare, & multum periclitari, tamen

A narratio solidum continet, quæ primis septem diebus à partu passâ est: neque de exitu morbi quicquam dicitur, imperfecta itaque est narratio. Nos tamen notemus quæ acta sunt, ne fieri ita posse nos lateat. Itaque hæc cum prægnans excessisset novem menses græcos, iam de cimi ingressa cepit fluxu sanguinis laborare, qui fluxit diebus quatuordecim, maxime autem ultimo illorum quaternario: nam tribus diebus ante corruptionem fetus: corruptio verò conigit decima quarta, quæ excidit vtero puer mortuus, habens brachium adhaerens lateri. Itaque ab undecima ad quartamdecimam (qui ultimus quaternarius est) copiosus fluxit sanguis. Decima quarta nocte excidit puer mortuus, tertia die eadem noctis horâ quâ puer exciderat, exciderunt secundinæ & alba excrementa. Expletis ergo à partu horâ duobus diebus naturalibus excidit secundina. Quod etiam difficile partum indicavit, in naturalibus enim & facilibus secundina mox subsequitur exentem fetum. Post hæc tribus diebus & noctibus multa prodierunt moderatè, erant itaque insumpti iam quinque dies naturales, mox apprehendit eam febris duos dies & duas noctes, & totius ventris & coxarum, præcipue verò imi ventris dolor infestavit. Non est contentanem his septem diebus finitum esse morbum, sed mutilam hic narrationem.

Larissæ Hippostenes medicus videbatur peripneumonia laborare, falsò tamen. Principio quidem luctans cecidit sapiens in duro loco, & illi superincidit adversarius, & frigidâ lanatus est, canavit, & gravior sibi videbatur. Postridie autem febricitavit, nunquam tussis sicior & frequens spiratio tenuis. Quinta die cruentum excreavit non multum & delirare cepit, quum tussiebat tunc dolens pectoris partes & dorsum, sexta autem post sternutamentum cotyla circiter quatuor sanguinis ex naribus efflaxerant. Circa vesperam neque loquebatur, neque quid fieret aut diceretur percipiebat. Undecima autem mortuus est. Quinque autem diebus nunc mente constabat, nunc non, febre etiam carebat. Sputum autem nullum excreavit, neque stertorem habuit, quia nullam aderat sputum.

Hippostenes mortuus est ex casu, videbatur verò medicis quibusdam pulmonis inflammationem contraxisse, quia febricitabat cum tussi & denso spiritu: tamen reuera non contraxerat, quod exitus aperte indicavit, cum ad extremum vique neque excreaverit, neque stertorem habuerit. Sed qua ratione fuerit læsus, ex his quæ narratur oportet coniectare. Principidiosis in duro loco, cecidit in occiput & dorsum, & adversarius insiluit in pedes illius. Cumque oporteret mox sanguinem mittere, & frigida potum offerre, & pannus inuoluere, ne sanguis ad contusas partes afflaret accurreret, & vt is qui conturbatus effususque erat, ex-

tennatus discuteretur: nihil tale fecit sed hñit sese frigida, & dormiuit, itaque cutem densauit, & sanguinem interd repulit, eò etiam sponte ob somnum conuulsiuentem: quam ob causam merito grauari videbatur. Et sequenti die febricitauit, putrescente iam succo in partibus quibus erat inculcat^{us}, & cussis siccior tenuit ipsum, & *tristitia mori*: ob multos affectus phlegmonosos instrumentorum respirationis in thorace. Constat verò talem spirationem fuisse etiam patuum, cum cerebrum & patuum faciant affectus dolorosi, earum partium. Quinta die excreauit cruentum non malum, ruptis iam (arbitror) Jin lateribus venulis, & cepit delirare. Poterat sane hoc fieri ob affectum phlegmonosum septi transuersi, verum ob raptum sanguinis qui contrabatos ferebatur in caput, factum esse indicauerunt quæ subsequuta sunt. Nam sexta die stertuauit, & mox sanguis effluit ex naribus ad quatuor ferè corylas. Circa vespertam eadem die neque loquebatur, neque quid fieret aut diceretur percipiebat. Quod aut ob euacuationis magnitudinem inueniente animo, aut occupato toto cerebro apoplethico modo fieri poterat. Non videtur autem tantum fuisse sanguinis effusus, vt ob hoc animi liqueretur, nisi forte homo esset per sese debilissimus proinde in alteram coniecturam magis fetor, vel ob quinque sequentes dies, quibus nunc mente constabat, nunc delirabat, & aliquando etiam febre carebat. Nam quia delirabat, videtur cerebrum fuisse affectum, quia verò aliquando & delirio & febre liberabatur, constat non phlegmonem, sed obstructione laborasse. Sæpè enim vidimus apoplethicos per quendam intervalla ad sese redire, loqui, & sapere, vt videantur circumstantibus liberati, ac deinde corripri, idque bis aut ter, donec quam non possunt reuocari, tandem moriantur. Quod coniectauimus fieri ex pulcritis facultatis ceteri operi. Hæc enim si valida est longè pellit, & hominem liberat, si debilis admodum, ne mouet quidem. & rursus vno perpetuo paroxysmo moritur homo: sin autem est inter hæc mediocriter debilis, non pellit longè, facit tamen succos abscedere, cum verò non satis tenitur pars quæ expulit, irruunt in ipsam rursus. Velut in hoc homine qui cum sexto die apoplethicus esset factus, & per quinque dies qui sunt a sexto ad vndecimum denud correptus, mortuus est. Quod verò per intervalla nunc delirauit, nunc non, succus etiam ille qui cerebrum obsidebat fuit in causa. Eius enim agitato nunc plus minus cerebrum perturbauit, atque ob eandem causam eor nunc plus nunc minus in compassione, trahabatur, & angebatur, ac proinde homo nunc febricitabat, nunc non. Spiritum nullum excreauit quia scilicet nihil eorum est in pulmone, neque habuit stertorem: vocat stertorem sonitum illum qui fit cum feruet succos aliquis in gutture. Nam addit, quia nullum aderat spiritum, hoc est non erat succus in aspera arteria, qui eum sonitum faceret, vt in multis moribundis solet. Verum hæc historia nos non met, ne casus aut ictus fortis contemnamus, sed vt cum diligenter admiraremur ea quæ nuper buie iussit facienda diximus, & multos dies in bono viro homines contineamus.

A

B

C

D

E

F

*L*arisa Scamander coxa spæculum habuit, & os diu luxatum. Hinc magna incisio facta est etiam ad os vsque, & postea vltus est. Tunc die duodecimâ post incisionem incepit conuulsio, quæ multum deuiniuit. Conuellebatur autem crux hoc vsque ad latera, transliebat etiam in alteram partem conuulsio; contrabebatur autem crux & extendebatur, & alia membra mouebat, & maxilla adducebantur. Hic mortuus est conuulsus octaua post inuasionem conuulsionis. Contrabatur verò totum corpus tepefactis vitriculis, & fomentis ex crux, & infusus est chyster, & nonnihil veteris stercoreis deiecit. Medicamentum merambilem purgans hñsit, aliudque iterum absorpsit, & deiecit quidem, sed nihil ab epoto medicamentum inuatus est. Et venit exiguus somnus, cumque rursus sub vespertam bibisset medicamentum sinceram bilem vehementer purgans, circa Solis ortum mortuus est. Videbatur autem diutius morbum sustinere potuisse nisi vis medicamenti obstruisset.

Exemplum est hoc eorum qui non curati diutius vixissent, & curati citius moriuntur. Mortuum enim esse hunc non ex veteri morbo, sed ex curatione constat, quia vigesima die à sectione est mortuus. Pater etiam ex modo moriendi, mortuus enim est conuulsus, vt solent scilicet qui moriuntur ex vulneribus circa articulos. Certè he non poterat alia ratione curati quam sectione & vitione, cum corruptionem iam ossis pateretur, satius tamen fuisset omnino non curare. Nihil enim refert curare vt morbus posset, nisi eam ipsam curationem homo possit sustinere. Cæpit conuelli die duodecimâ post sectionem & vitionem non leuiter, sed conuulsionem magnam quæ illum malum tenuit, hoc est, continenter afflixit. Contrabebatur enim crux vsque ad costas, per musculos scilicet mouentes femora, qui veniunt a lumbis iuxta finem costarum. Non mirum autem, inde etiam ad ipsas costas dolorem effundi per communes sarciculos netulorum. Et aliquando etiam in alteram partem conuulsio velut transliebat, itaque alterum crux præcipue ac maxime conuellebatur, sed nonnunquam etiam vtrumque, atque alternatè hoc & illud. Non erat autem conuulsio facta iam, per quam contractum crux esset extra distensionem vltam, sed conuulsus motus per quem contrabebatur, & extendebatur. Et alia etiam membra mouebat homo, conuulsio modo, brachia videlicet & caput, ac denique partes alias quæ liberum motum habent. Laborabant præcipue maxilla, quæ per conuulsionem musculorum claudens iam os adducebatur, vt non possent separari. Cum ad oboneret conuulsio, non mirum mortuum esse hunc octaua die post conuulsionem, quæ erat vigesima à sectione. Terminatus enim est morbus intra fines acutorum, & mouebatur per partes. Sed cur hic qui in u-

rationem in deterius accepit duodecimā, mortuus est octauā ab ea mutatione, ac non potius vigesimā quartā saltem expectauit, cum iuxta legem constitutionis legitimæ tæpium temporis oporteat superesse ab exacto principio quantum antecesserit? Ob id fortasse, ac etiam ob vires quas satis constare animaduersit, dicit Hippocrates videri sibi hunc potuisse diutius morbum sustinere, si nihil in curatione esset peccatum. Verum procerat admodum expurgatus, adeo ut solis octo diebus his aut aut ter pharmacum *κρυπτικόν* accepit, vi pharmaci extinctus est. Quia in re multis nominibus peccauit medicus, primum quod conuulsio nem ex vulnere pharmaco vehemēti curare tentauerit, deinde quod cum renitasset, & nihil proficeret, insecutus à purgatione desistere, quin potius lædi ægrotum non intelligens his aut etiam ter dederit. Certe conuulsiones, quæ citra phlegmonem vllum internum aut vlcus ex redundantia focorum sunt, pharmaci solui possunt, verum quæ post ardentem febrem, aut phrenitidem, aut euacuationem vllam copiosam, aut inflammationem internam, aut ex vlcibus sunt, nullæ magis læduntur: nam euacuatione focat nervos, & mala qualitate irritat pharmacum. Ex febre autem ardente aut euacuatione sunt siccæ nervi, à vulneribus qui conuulsiones sunt velut phlegmone tumentes. Phlegmones autem crudæ læduntur ea agitatione, quam pharmaca ciunt, & euacuationibus non cedunt. Memini certè eulsdam, qui cum à phrenitide cōuulsus, iam motibus tentaretur, me inuito, suauis alterius pharmacum accepit, & pauld post nulla subsecuta euacuatione mortuus est. Sed multo grauius peccauit hic, quod iam vidisset ægrotum pharmaco non iuari. Necessè est autem ut magna si non inuenit, lædant. Biber autem ægrotus pharmacum *κρυπτικόν*, hoc est, admodum lineoceram bilem extrahens, & superbibit. Quod duobus modis videtur posse intelligi, aut superbibit pharmacum ideam, aut simpliciter superbibit. Est autem superbibere pharmacum, antequam morus quem ciuit sedatus sit, rursum idem pharmacum bibere. Superbibere autem simpliciter est quidvis post pharmacum bibere. Solebant autem antiqui, ut ex Hippocrate 2. de rat. vict. in acue accepimus, mox ab accepto pharmaco pristinam dare sorbendam, aut forte aliud quippiam huiusmodi. Aut ergo huic ægrotō datum est pharmacum valde biliosum eadem die bis, aut datum quidem seorsim legitime, & iuxta consuetudinem accepta à pharmaco potione. Quam propinquant pharmacia lenia aut etiam mediocria, nonnunquam vtiliter superbibitur pharmacum, gratia acendi se genem morum: verum quam valde biliosa, nunquam licet id facere. Sed utcumque huic actum sit, constare facile poterat pharmaci hominem lædi, quare abstinendum fuisse ab æterius exhibitione, nam deiecit quidem, nihil autem inuenit est à potione, & somnus exiguus venit. Euacuationes verò quæ conferentia & tolerantia carent malæ sunt. Non mirum ergo iterum accepti valde biliosi pharmaci potione mortuum hominem esse.

A oculum dextrum ab equo, nec videbatur os mox carere & paucum sanguis ex ipso exiiebat. Hic multum scelus est usque ad di. ploem, & curabatur os in eo statu, quod etiā statim os antea peperit. Circa vigesimam diem tumor iuxta aurem incepit, & febris & rigor, & interdum magis crescebat & dolebat tumor. Et febricitare incepit à rigore, & oculi tumeant & frons & tota facies. **B** Patiebatur autem hac in dextris precipue capitis partibus, ad sinistras verò perueniebat tumor, nihil tamen hic læsit. Tandem febris continua corripuit, hac minora erant usque ad diem octauam. Vixit autem post vllionem & purgationem per catapotium & medicamentum tumori illitum: vlcus autem nullo modo malorum causa erat.

C Quandoquidem percussus est hic ab equo, videtur consentaneum fuisse verè immatur, id est, equorum cultorem. Hi enim ab equis frequenter solent percuti, sed quia vndecim annorum erat, vix possum adduci ut credam, curam equi esse ei demandatam, sed fuisse hunc Palamedis filium aut sit vnum fortè vocatum hippocomum, & ab equo percussum esse, ut narratur. Hoc habet utcumque nihil esset, modò eorum quæ ad rem faciunt nihil omitteretur. Hæc sunt, fuisse vndecim annorum, & ab equo percussum fuisse, & in fronte, & reliqua quæ narrantur, partim pertinentia ad vlcis magnitudinem, partim ad ea quæ eueniunt. Quod enim conferat scire an puer sit qui vulneratus est, constat ex eodem Hippocrate libro de vulneribus capitis vbi dicit. At verò puerorum ossa & tenuiora & molliora sunt ea de causa, quod & plus sanguinis illis est, & cava sunt, & neque purifica, neque densa, neque solida. Quin si ab æqualibus telis & debilioribus similiter & minus fuerit vulnerati, iunioris pueri quam senioris vulnus & magis & citius suppurat, & minori spatio, & si alioqui ex vulnere moriendum sit, iunior seniore citius perit. Porro à quo percussus quis sit, & quo telo interrogare iubet Hippocrates in initio eiusdem libri dicens. Primum igitur capite vulnerato interrogare oportet, per quid vulneratum sit. Itaque & ab equo vulneratum fuisse, dicere conferebat. Sed & in fronte fuisse, nam dictis mox addit. Postea quia parte vulnus infictum sit. Et non multo post addit. Cerebrum enim citissime & maxime iuxta sinapsum sentit mala, quæ in carne & in osse sunt, sub tenuissimo enim osse ac modicâ carne cerebrum est hæc pax. Ceterum ex reliquis ossibus, id quod circa tempora est, debilissimum est. **F** Omni verò capitis osse robustius est os verticis, & quod est post aures robustius est quam rotum quod in anteriori parte est, & sanè his ita se habentibus, siquis & vulneribus & telis, omnibus æqualibus ac similibus, & maioribus, ac minoribus similiter sit vulneratus, & magis: hæc capitis parte os minus rumpitur, & contuditur, & si homo alius moriturus est ex vulnere, si in posteriori capitis parte vulnus habet, ferius morietur. Itaque graue fuit vulnerari ab equo, fortiter enim

Larisse Equis Palamedis vndecim annos natus, percussus est in fronte supra

contingit equus calcitrans. Graue etiam vulnera in fronte, quamquam grauius fuisset in temporibus aut sinapite. Fuisse verò puerum qui vulneraretur periculum minuebat, facilius enim sanaretur eorum vlcera. Sed viciuimus ad ipsum vulnera. Rupta est cutis frontis, & carnosae membrana quae illi subternitur, & detectum os. Quinetiam os ipsum videbatur non esse sanum. Nam exiiebat ex ipso osse exiguum sanguis, quod sanum non fieret, nisi fissuram haberet. Quid ergo adum est illi? Certè quod Hippocrates ipse coosulit libro citato his verbis, verum ubi os carne nudatum fuerit, animi intentione adhibita conandum est ut digressas, si minus id licet oculis videre & cognoscere, num os fissum sit & collisum, an collisum intactum, vel num ad reli vestigium collisio vel rima, vel vtrumque accesserit. Ac si quid horum senserit, per exiguum terebram perforato osse sanguis est detrahendus. Et paulo post dicitur, mori aegrotos quibus os fractum, ruptum, aut contusum, nisi quis raserit aut perforauerit. Ita factum est huic, quia habebat fracturam in prima lamina, sectus est multum vsque ad diploem, seu secundam laminam, terebro scilicet, aut cyclo. Et curabatur os in eo statu, detectum scilicet, & detasum satis, ac leuigatum. Et bene sanè res processit. Nam os statim peperit os anterius in viginti. hoc est, intra viginti dies producta est anterius ossis pars, & quae cyclo angit terebra exiit erat. Ad hanc rem plurimum contulerat etas. In pueris enim aedè vigentioribus facultas, ut ossium etiam partes faciliè pulluleat. Quamquam ne in hoc quidem autumo mox fuisse verum os quod producebatur, sed callum ab osse quàm minimam diuersum, ob facultatis commutatricis robur. Itaque haec bene actum est cum puer. Nihilominus vigesima tumor iuxta aurem incepit, & febris, & rigor, & oculi tumebant, & frons & tota facies, etiam si non aequaliter secundum totam faciem, sed in dextris praecipue capitis partibus haec pateretur, quamquam perueniebat etiam ad sinistra tumor. Hoc sanè factum est ex fluxione, quae vndique in exulceratam partem perueniebat, quaeque proinde, cum supra oculum dextrum vulnus esset, dexteras partes capitis secundum rectitudinem scilicet lateris occupauit. Et sanè molè munda periculosum fuit hoc, quàm si occupasset sinistram. Nam ut ab Hippoc. lib. citato dicitur bis, Notam esse morituri, si ex vulnere in dextra capitis parte, sinistra: & ex vulnere in sinistra, dextra conuellantur. Eadem ratione & dolore & corripit in contraria parte periculosus est, quàm eadem, vel hac solum causa, quod magis praeter rationem est. Nam quamquam Vidouidius putat hoc falsum esse, & omni ratione catere (quod ipse nullam assequatur) tamen reuera non caret, sed eadem ratione quod dicitur in aphorismo 66. sectionis quintae, si in vulneribus magnis ac prauis tumor non appareat, magnum malum eadem prorsus si non appareat tumor in eo latere in quo est vlcus, sed contrario, magnum malum est. Nam illud quidem fit fluxione ad vlcus conuersa, retrocedente verò aliorum, eò quod à vulnerata non recipiatur. Est verò magnum periculum in boerhaauio motu retrocedendi, & ipsa causa ob quam non recipitur grauis est. Nam et si Gal. id dicat fieri, quod medici repercutiunt nimis vtantur, ego

& citra hanc occasionem fieri puto, cum partis facultas emoritur, & alimentum non recipit. Contrahitur enim, ac proinde redundantem succum non potest recipere. Itaque contraria parte conuelli, ac dolore & dolore affici graue erat, eadem verò parte non admodum. Nam ut alio aphorismo dicto proximo dicitur. Quibus tumores in vlcerebus apparent, ij non admodum conuellantur, neque insaniunt. Proinde factum est, ut nihil hoc laederet, id est, nihil homo ab hoc periclitaretur. Sed resistentes sermones dicamus, qualis fuerit haec mala. Tumor post aurem incepit, & febris & rigor. Febricitare scilicet incepit à rigore. Constat itaque cum febre laborasse intermittente, nam quibus quotidie rigores sunt, quotidie febres soluantur. Tumebant etiam oculi, & frons, & tota facies. Ambo haec & tumor & febris fiebat à fluxione, quae versus vlceratam partem mouebatur. Constat verò hanc moueri non continenter & toto tempore aequaliter, sed per partes ex quibusdam intervallis. Nam & febris fiebat intermittens, & tumor & dolor quotidie, interdum magis crescebat, & noctu haec remittebantur. Nimirum pars recipiens erat pars ea capitis & faciei: recipiebat verò quotidie denud, & quotidie in ea resolvebatur quod veniebat. Quare constare poterat, febrem etiam interdum quotidie crescere. Itaque tota fluxio erat quotidiana, ac proinde & intumescencia, & febris. Sed si quotidiana accessio, & pituitosa etiam esset fluxionis materia, quo pacto ergo à rigore incipiebat, biliosarum enim est hoc? Praeterea quid fieri poterat, ut febris intermitteret, cum tumor, etiam incrementa alternatè recipere, nunquam solueretur? Certè fluxionem illam sanguineam bilis & pituita participem fuisse non marum, imò verò consentaneum, cum non ob suae alicuius redundantiam, sed ob vlcus exarsit sit. Habuit ergo pituita quendam, ut motum: quendam etiam bilis, ut rigorem. Febris verò intermisit, quod non posset à tumore foveri, nisi cum esset tantus, ut tamen et si perpetuo esset, non perpetuo tantus. Neque sanè febris intermittens ad extremum vsque fuit, sed tandem continua febris tenuit. Quo die ab accepto vulnere haec fieri coeperint non dicit exactè, sed minora, inquit, erant haec vsque ad octauam diem, scilicet septimo ceperunt dolor & tumor, & octauo iam fuerunt conspicua. Non dicit quando durauerint, fortasse quia medicamentorum magis quàm naturae vi extirpata sunt. Vixit enim vltus, & purgatus per cataplasma, & cataplasma idoneo tumori imposito. Quamvis vsus fuerit Hippocra. vltio, sepe iam animaduertimus. Ego quoque in patridibus quae ex morbis aliis non leuibus fluat, citò vel nulla expectat à suppuratione, vltione vtor in ipso tumore. Nulla enim ratione melius prouidetur oe tumor recurrat, quàm si materia per ipsum vlcus quod iostigitur expurgeretur. Sed quo pacto concludit narrationem dicens, vlcus autem malorum causa nullo modo erat? Nunquid si hic vulneratus non esse, tumorem eum contraxisset? Non arbitror, neque febrem. Nam vel rectè quoniam tumor cum vlcere seruauit, & dies quo conuixit, qui erat septimus ab vlcere, id indicant. Sed dicitur nullo modo malorum causam fuisse vlcus, id est, nullam malignam causam: seu vlcus ea mala non attulisse, quod malignum esset (non enim erat) sed

ob corporis apparatus. Velor scilicet mortuo iam homine inranat ehirurgi, non interisse cum ex vlcere, qui tamen si non fuisset vlcera non interisset. Id verò dicunt significantes, vlcus per se non fuisse lethale. Ita quidē huic vlcus nullo modo causa malorum fuit, id enim salutaris speciem præ se ferebat & quoad carnem non ita malè, & quoad os bene se habebat: tumores verò hi superuenierunt ob redundantiam succorum in corpore, aut fortasse, quod recenter vulneratus non satis vacuatus fuerit. Merito ergo huic vtilissimum fuit medicamentum expurgans deorsum, iuxta id quod lib. septe iam citato scriptū est his verbis. Cūm verò in vulnere in capite homine rebello perforato, aut non perforato esse aurē deoudaro, tumor rubicundus erysipelatosus accesserit in facie, & io oculis vtriusq; aut altero, & siquis tumorē contingat, doleat: & febris corripiat ac rigōe, & vlcus ipsūm tum quod ad carnem attinet, tum quod ad os bene habeat ad aspectū, & ambientes vlcus partes bene habeant, excepto tumore, qui in facie existit: & aliud peccatum nullum tumor habeat, quod ad reliquum vlcus rationem attinet, huius infernam aliam deorsum purgare oportet, medicamento quod bilem ducit, & vbi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, & tumor sedatur & sanus evadat. Constat hunc locum maxime congruere cum iis quæ facta sunt Hippocomo.

Larissa Theophrasti filio vesica feda scabie laborabat, & viscosam mingeat urinam, & in initio & sine missionis dolore afficiebatur, & partem anteriorem confricabat. Hic cum vehemens diureticum hausisset, in vesicam quidem nihil processit, sed puri simile quid & bilem confertim vomuit, & per anum alia huiusmodi deiecit, & ventris dolore torquebatur & interiores partes vrebatur, reliquo verò corpore refrigerabatur, & totus exolebatur, nec quicquam affingere volebat. Huic vehementer exulcerata est alvus à nimia medicamenti violentia, tertia autem die post illud eorum mortuus est.

Nunquam est agendum diureticis, præcipue vehementibus, in passionibus renum aut vesicæ ex multo succo pendentibus, antequam purgatum totum corpus sit, reuulsūque vomita quoad possit, & ad intestina deriuatum, idque faciendum pharmacis mitibus, & malignæ qualitatis expertibus (non eatenus ut tractoris oihil habeant) quia quæ vehementer expurgantia sunt, urinam etiam mouent, & mensuratas purgationes, & vel hac ratione abortus faciunt, ut mentio videbatur Auerrois. Nam si pleno adhuc corpore malis succis diureticum detur, idque debile, aut moderatum sit, certe confluere faciet in affectus vias excrementa, & congeri oppilarique, ac proinde minus exire. Sin autem detur vehemens, ut hanc etiam oppilationem possit disrumpere, habebit etiam hoc facultatem exulcerandi, quæ ventriculū & intestina exulcerabit, antequam affectum locum attigat, irritabitque ita

superum infernumque ventrem pariter, & dolore excrementa ad ventrem conuocabit, accidetque ut quod tanquam diureticum dabatur, per accidens vomitorij & delectorij vices gerat: sed cum magno hominis malo, cum non facultate tractorij purget, sed exulceratoriū corrumpat. Quid ergo agendum? Certè vacuandum totum corpus prius, reuulsūque & deriuandum, medicocribus & vomitoriis & delectoris vtendum, deinde medicamentis quæ peculiariter respiciant vesicam. Hæc verò erunt qualia passio desiderabit. Si enim affectus sit ardor aut vlcus, nunquam diureticis est opus, nisi exiguis, quæ cum aliis medicamentis deducendi ea solum causā admisceantur. Vlcera enim petunt siccantia; ardor, temperantia; vtraque verò horum deducuntur à quibusdam diureticis. Si verò morbus sit cacochymia earum partium citra dicta duo mala, aut inflammatioem nondum inclinantem, diureticis est agendum. Præferenda verò sunt mioria exulcerantibus, vacuato iam expurgatoque corpore. Huic igitur vesicam laborare scabie ob cacochymiam partim pituitosam & saliam, partim biliosam & acrem, indicant symptomata, & excreta. Scabiem enim indicabant, pruritus qui ad podendam quoque pertingebat, & dolor quem sentiebat cum inciperet & cum desineret mingere: fuisse verò causam pituitam saliam, quod viscosam urinam mingeret, & puri simile quid eomuerit. Quod sanè pus non fuisse constat (quæ enim suppuratio in ventre rumpetur?) sed crudum succum candore & crassitie puri similem. Itaque pituita erat, hanc saliam esse ipsa urinæ putrefactia fecit, indicant verò mordicatio quæ etiam bilem referebat, præterquam quod copiosius etiam vomitu est reiecta. Doloze verò incipiente & desinente mictu, omni exulcerationi aut corrosioni vtriusque urinæ commune est. Dolores enim non cident, cum sentientes partes succo mordente plene sunt, sed cum primum perfunduntur, ut incipiente mictu, neque quum quietæ sunt, sed quum moventur, ut desinente mictu, quia sese expriment. Vtrumque enim dolendi occasio est, primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione. Hic, cum quidvis agendum esset potius, datum est diureticum vehemens (cantharides arbitror, aut aliud hippicam tale) unde euenit ob medicamenti malignam vim, & corporis magnam cacochymiam ut exulceraretur venter maligno vlcere & vterore, ac proinde viribus dissolutis, & toto corpore refrigerato, & cum nullum cibum neque potum (hoc enim euenit ita affectis, etiamsi vrantur) assumere vellet, moreretur.

Superum infernumque ventrem pariter, & dolore excrementa ad ventrem conuocabit, accidetque ut quod tanquam diureticum dabatur, per accidens vomitorij & delectorij vices gerat: sed cum magno hominis malo, cum non facultate tractorij purget, sed exulceratoriū corrumpat. Quid ergo agendum? Certè vacuandum totum corpus prius, reuulsūque & deriuandum, medicocribus & vomitoriis & delectoris vtendum, deinde medicamentis quæ peculiariter respiciant vesicam. Hæc verò erunt qualia passio desiderabit. Si enim affectus sit ardor aut vlcus, nunquam diureticis est opus, nisi exiguis, quæ cum aliis medicamentis deducendi ea solum causā admisceantur. Vlcera enim petunt siccantia; ardor, temperantia; vtraque verò horum deducuntur à quibusdam diureticis. Si verò morbus sit cacochymia earum partium citra dicta duo mala, aut inflammatioem nondum inclinantem, diureticis est agendum. Præferenda verò sunt mioria exulcerantibus, vacuato iam expurgatoque corpore. Huic igitur vesicam laborare scabie ob cacochymiam partim pituitosam & saliam, partim biliosam & acrem, indicant symptomata, & excreta. Scabiem enim indicabant, pruritus qui ad podendam quoque pertingebat, & dolor quem sentiebat cum inciperet & cum desineret mingere: fuisse verò causam pituitam saliam, quod viscosam urinam mingeret, & puri simile quid eomuerit. Quod sanè pus non fuisse constat (quæ enim suppuratio in ventre rumpetur?) sed crudum succum candore & crassitie puri similem. Itaque pituita erat, hanc saliam esse ipsa urinæ putrefactia fecit, indicant verò mordicatio quæ etiam bilem referebat, præterquam quod copiosius etiam vomitu est reiecta. Doloze verò incipiente & desinente mictu, omni exulcerationi aut corrosioni vtriusque urinæ commune est. Dolores enim non cident, cum sentientes partes succo mordente plene sunt, sed cum primum perfunduntur, ut incipiente mictu, neque quum quietæ sunt, sed quum moventur, ut desinente mictu, quia sese expriment. Vtrumque enim dolendi occasio est, primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione. Hic, cum quidvis agendum esset potius, datum est diureticum vehemens (cantharides arbitror, aut aliud hippicam tale) unde euenit ob medicamenti malignam vim, & corporis magnam cacochymiam ut exulceraretur venter maligno vlcere & vterore, ac proinde viribus dissolutis, & toto corpore refrigerato, & cum nullum cibum neque potum (hoc enim euenit ita affectis, etiamsi vrantur) assumere vellet, moreretur.

Superum infernumque ventrem pariter, & dolore excrementa ad ventrem conuocabit, accidetque ut quod tanquam diureticum dabatur, per accidens vomitorij & delectorij vices gerat: sed cum magno hominis malo, cum non facultate tractorij purget, sed exulceratoriū corrumpat. Quid ergo agendum? Certè vacuandum totum corpus prius, reuulsūque & deriuandum, medicocribus & vomitoriis & delectoris vtendum, deinde medicamentis quæ peculiariter respiciant vesicam. Hæc verò erunt qualia passio desiderabit. Si enim affectus sit ardor aut vlcus, nunquam diureticis est opus, nisi exiguis, quæ cum aliis medicamentis deducendi ea solum causā admisceantur. Vlcera enim petunt siccantia; ardor, temperantia; vtraque verò horum deducuntur à quibusdam diureticis. Si verò morbus sit cacochymia earum partium citra dicta duo mala, aut inflammatioem nondum inclinantem, diureticis est agendum. Præferenda verò sunt mioria exulcerantibus, vacuato iam expurgatoque corpore. Huic igitur vesicam laborare scabie ob cacochymiam partim pituitosam & saliam, partim biliosam & acrem, indicant symptomata, & excreta. Scabiem enim indicabant, pruritus qui ad podendam quoque pertingebat, & dolor quem sentiebat cum inciperet & cum desineret mingere: fuisse verò causam pituitam saliam, quod viscosam urinam mingeret, & puri simile quid eomuerit. Quod sanè pus non fuisse constat (quæ enim suppuratio in ventre rumpetur?) sed crudum succum candore & crassitie puri similem. Itaque pituita erat, hanc saliam esse ipsa urinæ putrefactia fecit, indicant verò mordicatio quæ etiam bilem referebat, præterquam quod copiosius etiam vomitu est reiecta. Doloze verò incipiente & desinente mictu, omni exulcerationi aut corrosioni vtriusque urinæ commune est. Dolores enim non cident, cum sentientes partes succo mordente plene sunt, sed cum primum perfunduntur, ut incipiente mictu, neque quum quietæ sunt, sed quum moventur, ut desinente mictu, quia sese expriment. Vtrumque enim dolendi occasio est, primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione. Hic, cum quidvis agendum esset potius, datum est diureticum vehemens (cantharides arbitror, aut aliud hippicam tale) unde euenit ob medicamenti malignam vim, & corporis magnam cacochymiam ut exulceraretur venter maligno vlcere & vterore, ac proinde viribus dissolutis, & toto corpore refrigerato, & cum nullum cibum neque potum (hoc enim euenit ita affectis, etiamsi vrantur) assumere vellet, moreretur.

Superum infernumque ventrem pariter, & dolore excrementa ad ventrem conuocabit, accidetque ut quod tanquam diureticum dabatur, per accidens vomitorij & delectorij vices gerat: sed cum magno hominis malo, cum non facultate tractorij purget, sed exulceratoriū corrumpat. Quid ergo agendum? Certè vacuandum totum corpus prius, reuulsūque & deriuandum, medicocribus & vomitoriis & delectoris vtendum, deinde medicamentis quæ peculiariter respiciant vesicam. Hæc verò erunt qualia passio desiderabit. Si enim affectus sit ardor aut vlcus, nunquam diureticis est opus, nisi exiguis, quæ cum aliis medicamentis deducendi ea solum causā admisceantur. Vlcera enim petunt siccantia; ardor, temperantia; vtraque verò horum deducuntur à quibusdam diureticis. Si verò morbus sit cacochymia earum partium citra dicta duo mala, aut inflammatioem nondum inclinantem, diureticis est agendum. Præferenda verò sunt mioria exulcerantibus, vacuato iam expurgatoque corpore. Huic igitur vesicam laborare scabie ob cacochymiam partim pituitosam & saliam, partim biliosam & acrem, indicant symptomata, & excreta. Scabiem enim indicabant, pruritus qui ad podendam quoque pertingebat, & dolor quem sentiebat cum inciperet & cum desineret mingere: fuisse verò causam pituitam saliam, quod viscosam urinam mingeret, & puri simile quid eomuerit. Quod sanè pus non fuisse constat (quæ enim suppuratio in ventre rumpetur?) sed crudum succum candore & crassitie puri similem. Itaque pituita erat, hanc saliam esse ipsa urinæ putrefactia fecit, indicant verò mordicatio quæ etiam bilem referebat, præterquam quod copiosius etiam vomitu est reiecta. Doloze verò incipiente & desinente mictu, omni exulcerationi aut corrosioni vtriusque urinæ commune est. Dolores enim non cident, cum sentientes partes succo mordente plene sunt, sed cum primum perfunduntur, ut incipiente mictu, neque quum quietæ sunt, sed quum moventur, ut desinente mictu, quia sese expriment. Vtrumque enim dolendi occasio est, primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione. Hic, cum quidvis agendum esset potius, datum est diureticum vehemens (cantharides arbitror, aut aliud hippicam tale) unde euenit ob medicamenti malignam vim, & corporis magnam cacochymiam ut exulceraretur venter maligno vlcere & vterore, ac proinde viribus dissolutis, & toto corpore refrigerato, & cum nullum cibum neque potum (hoc enim euenit ita affectis, etiamsi vrantur) assumere vellet, moreretur.

Superum infernumque ventrem pariter, & dolore excrementa ad ventrem conuocabit, accidetque ut quod tanquam diureticum dabatur, per accidens vomitorij & delectorij vices gerat: sed cum magno hominis malo, cum non facultate tractorij purget, sed exulceratoriū corrumpat. Quid ergo agendum? Certè vacuandum totum corpus prius, reuulsūque & deriuandum, medicocribus & vomitoriis & delectoris vtendum, deinde medicamentis quæ peculiariter respiciant vesicam. Hæc verò erunt qualia passio desiderabit. Si enim affectus sit ardor aut vlcus, nunquam diureticis est opus, nisi exiguis, quæ cum aliis medicamentis deducendi ea solum causā admisceantur. Vlcera enim petunt siccantia; ardor, temperantia; vtraque verò horum deducuntur à quibusdam diureticis. Si verò morbus sit cacochymia earum partium citra dicta duo mala, aut inflammatioem nondum inclinantem, diureticis est agendum. Præferenda verò sunt mioria exulcerantibus, vacuato iam expurgatoque corpore. Huic igitur vesicam laborare scabie ob cacochymiam partim pituitosam & saliam, partim biliosam & acrem, indicant symptomata, & excreta. Scabiem enim indicabant, pruritus qui ad podendam quoque pertingebat, & dolor quem sentiebat cum inciperet & cum desineret mingere: fuisse verò causam pituitam saliam, quod viscosam urinam mingeret, & puri simile quid eomuerit. Quod sanè pus non fuisse constat (quæ enim suppuratio in ventre rumpetur?) sed crudum succum candore & crassitie puri similem. Itaque pituita erat, hanc saliam esse ipsa urinæ putrefactia fecit, indicant verò mordicatio quæ etiam bilem referebat, præterquam quod copiosius etiam vomitu est reiecta. Doloze verò incipiente & desinente mictu, omni exulcerationi aut corrosioni vtriusque urinæ commune est. Dolores enim non cident, cum sentientes partes succo mordente plene sunt, sed cum primum perfunduntur, ut incipiente mictu, neque quum quietæ sunt, sed quum moventur, ut desinente mictu, quia sese expriment. Vtrumque enim dolendi occasio est, primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione. Hic, cum quidvis agendum esset potius, datum est diureticum vehemens (cantharides arbitror, aut aliud hippicam tale) unde euenit ob medicamenti malignam vim, & corporis magnam cacochymiam ut exulceraretur venter maligno vlcere & vterore, ac proinde viribus dissolutis, & toto corpore refrigerato, & cum nullum cibum neque potum (hoc enim euenit ita affectis, etiamsi vrantur) assumere vellet, moreretur.

Vxor Antimachi Larissa vterum gestabat quinquaginta circiter diebus, & reliquo tempore præ fastidio à cibo abstinerebat, & septem diebus vteri & oris ventriculi dolore afficiebatur, & febris eam corripuit, ex quo tempore nihil deiecit. Huic propinatum est medicamentum purgans vehemensius quam oportuit, & euomit bilem adusam propter cibi abstinentiam & febrem, neque enim vlcere vtebatur potu, paucam autem & violenter vomuit.

*vomuit & grumofam. Ac poftquam commota
eft, eam deiciebat, & debilitata videbatur,
nec epotâ aquâ voluit euomere. Poftea autem
ventrem inferiorem debemens dolor corripie-
bat, exulceratus enim fuerat à medicamento,
& ftatim poft sterces fubruentum quid vame-
to fimile deiecit. Semper autem augebatur &
debilitas & anxietas, & ufque ad quinque
cotylas expurgata erat. Subftitit autem alius
multâ aquâ ventri affufa, nihil quippe aliud
poterat admitttere. Mortua eft circa mediam
noctem. Vinere autem poſſe videbatur, ſi po-
uiſſet aquam bibere, & ftatim ante medica-
mentum epotum vomere,*

Mulier hæc cum vtero gereret ferè iam dies quin-
quaginta, correpta eſt dolore vteri & oris ventri-
culi (nam hanc partem vocabant veteres cor, &
hæc plurimum ad compaſſionem cum vtero trahit-
ur) & febrem, quæ ſeptem diebus ipſam tenebant.
Erant verò illi hæc ſymptomata, præ ſtudio vix
quicquam capere poterat (quod non illis ſolum
ſeptem diebus, ſed reliquo etiam prægnationis tem-
pore contigit) & eo tempore (quo febricitabat
ſcilicet) non deiciebat. Huic datum eſt pharmacū
expurgans vehementius quam oportebat. Octauā
aſtrictor die. Nam mortua eſt mulier eadem die
qua accepit pharmacum, egrotauit autem ſeptem
diebus. Aut ergo ſeptima ipſa accepto pharmaco
morta eſt, aut quod eſt magis conſentaneum, ex-
actis ſeptem diebus febris, datum eſt pharmacum o-
ctauā. Nam non erat rationi conſonum, ipſā ſep-
timā, non expectata mutatione, ſi quam dies affer-
ret, pharmacum dare. Datum ergo eſt die octauā,
& euenit, vt euomeret bilem combuſtam. Combu-
ſta enim fuerat & præ cibi abſtinentia, & à febre.
Non mirum autem adeo exuſtam eſſe. Nam non ſo-
lum abſtinebat à cibo, ſed neq; potu utebatur vilo.
Quoniam autem cibus & potus bilis feruorem rem-
perant, conſtat eorum abſtinentiā ex acriorioremq;
fieri, præcipue accedente febre. Vt hinc coſtiter, non
admodum arceſcos ab aqua eſſe, eos qui ex ſincera
bile febricitant. Eius enim ſucci, ut alio loco in oſ-
trauimus, alteratio, vſtio eſt potius quam putref-
centia. Quare cum concoctio cōtrariatione ſit vſtio-
ni, vt putrefcentiæ, in talibus ab attemperatiōe ex-
pectandum aut inuſum eſt potius quam à cōcoctiōe:
quare aqua largiſ vtiendum. Hæc ergo mulier cum
neque potu vteretur vilo, non mirum exuſtam illi
fuiſſe bilem. Euomit ergo violenter paucam bilem,
& in grumos coactam (cræſſeſcit enim vſtione etiam
bilis, ſicut vitellus quoruſ ſimilis) deinde verò (hoc
eſt, poſt difficilem illam paucæ bilis vomitionem)
commota eſt iterum, & conuulſa, & emiſit ip-
ſam copioſius. Non tamen ſubleuata eſt, neque me-
lius habere cepit, ſed videbatur debilitata. Et cum
daretur ei aqua tepida, vt facilius euomeret, & ſi
quid malignum aut medicamentum, aut humoris ven-
triculo hæteret, reiiceret, nolebat accipere, quia
arbitror non poterat ob magnam ventriculi & gu-
læ corruptionem. Deinde deſcendente pharmaco
corripuit illam dolor alui vehemens, exulcerata e-
nim eſt à pharmaco, vt par erat: exulceratis intelli-
nis, deiecit poſt ſterces (hoc n. omnium primum

A exir in purgationib⁹) ſubiectionem, & tamen ſolum,
ex froſtulis ſcilicet inſteſtinorum, quæ excideban-
tur. Creſcebat verò malum, & ſemper augebatur
dolor ſcilicet maior & delirias, & anxietas. Non
quidem hæc ob magnitudinem vacuationis, erant
enim expurgatioſis præter ſterces quinque cotyle,
ſed ob ingentem vſtione, & magnam malignam-
que exulcerationem. Quod quidem à iuuantibus
& nocentibus cognoscī poterat, nam ſiſtebatur a-
lius, & mitiſcebat dolores aquâ multâ affuſa
ventri, & nihil aliud poterat admitttere. Nimirum
conquieſcebat feruor occuſu aquæ frigidæ, non
potuit tamen aſſectionem ipſam curare, neq; mor-
tiſeram pharmaci vim extingueret, ſed mortua eſt
circa mediam noctem. Mirum ſane eſt hanc non a-
bortuiſſe dato pharmaco vehemente, cum ne expur-
gans quidem vllum, niſi in maximo diſcrimine dari
debeat ſecundo prægnationis menſe. Sed id fortai-
ſe factum eſt, quia præuenit mors, alioquin non po-
tuiſſet non corrumpere ſectum. Videbatur, inquit,
poſſe viuere, ſi potuiſſet bibere aquam & vomere,
antequam deglutiſſet, non quidem antequam vilo
modo deglutiſſet. Nam qui poſſet vomere, quod non
eſſet deglutitum? Sed antequam aqua in fundo ven-
triculi reſideſſet. Maximū profecto remedium vbi
vehementius quam oportet à medicamento datum
eſſe ſentitur. Id non fieri debet in hac atq; adeo in
alijs omnibus, antequam pharmacum ad inſteſtina
deſcenderet, poſtea enim clyſteribus attemperanti-
bus & extergentibus inſtandum fuiſſet potius, vt in
dysenteria, atq; interim effuſione aquæ frigidæ. Sed
conſidera Hippoc. non dicere videri poſſe viuere, ſi
bibuſſet aquam & vomuſſet, ſed ſi potuiſſet bibere.
Nam etiam ſi coacta arte quapiam aquam in ven-
trem recepuiſſet, atque ita vomuſſet, non potuiſſet,
quantum ſuſpicor, ſantopete iam reſo ventriculo;
liber. Verum ſi potuiſſet bibere, ventriculus
multo minus læſus eſſet, atque ita potuiſſet viuere.
Itaque aquam bibere, & vomere remedio fuiſſet,
poſſe bibere fuiſſet minoris noxæ ſignum, vt non
poſſe fuit pernicioſum.

E Lariſſe Onefidemi famula exulceratus eſt
venter & inſteſtinum à bile ſponte commo-
ta, & bilis ſanguisque furſum & deorſum pro-
diit; febrisque detinebat. Huic debili datum
eſt in potu medicamentum deorſum purgans,
debile, aquoſum, & paucum, ex quo multum
vomuit, & plura prodierunt per inferna, &
veſperi redierunt. Poſtridiè verò febris ade-
rat, ſed debilis. Venter autem exulcerabatur,
eademque adhuc egerebat. Tertiâ autem die
morta eſt ſub veſperam, febre admodum ve-
hementi correpta. Hæc autem videbatur omni-
no moritura, minime verò quando epotâ aquâ
frigidâ vomitus detinuit. Poſtquam autem
refrigeratus eſt venter ſuperior, & aquâ per-
purgatus, ſuccus frigidiſ propinatus eſt,
idemque per clyſterem inſuſus.

Mira morbi celeritas, & mira etiam diligentiâ mo-
dicorū, quiritibus dieb⁹ tam multa circa egrotatem
fecere. Qui etſi morbum ſuperare non poterint,
quodis eſſet omnino inſuperabilis, tamē hæc cauſa

commendandi sunt, quod morbi impetum agnoscere, pari celeritate propiciantur auxilium instare. Passa est hæc citra ullam externam occasionem, quod postremis diebus vxor Antimachi à pharmaco. Nimirum bile perniciofa commota sponte, & influente in ventriculum & intestina, ea omnia explotata sunt adeo, vt sursum ac deorsum prodirent bilis & sanguis. Fuit itaque hic cholera morbus, verum cum febre, eaque tertiana continua. Solis enim tribus diebus licet eam figuram animaduertere, cum prima die febris ipsam remiserit, quæ posttridie debilis facta est, tertia autem rursus corripuit admodum vehemens. Figura febris sequens est eodemmodum conditionem bilis, fed exulceratio tanta repente facta est ob illius qualitatem deletariam. Estque hoc magnum quoddam exemplum venenorum, quæ in nostris corporibus sponte gignuntur. Sed quæ acta sunt consideremus, vt cum raræ vehementiæ fuit morbus, ita raro quodam medelæ genere est curatus. Huic mox in ipsa prima die datum est pharmacum deorsum purgans, non sanè vehemens, vt vxori Antimachi, sed debile, quia & ipsa erat debilis. Datum verò non solidum, ne forte partibushæreret, sed portabile & aquosum, hoc est, in aqua dissolutum, vt facile elaboretur. Paucum autem, quod multum non videretur posse sustinere. Vomuit ab eo multum, & plura prodierunt per inferna, proindeque, vt fieri solet, cessauit prior aliquantisper vacuatio. Quoniam verò exulcerata fuerant interne partes, non potuit cessare fluxio, atque ob id vesperti eadem die redijt vomitus, & deiectio. Posttridie febris aderat, sed debilis, venter antem adhuc vlcerebatur, & egerebat eadem, putā bilem & sanguinem. Tertia die febris ipsam corripuit valde fortis, à qua ea die mortuus est. Hæc (inquit) videbatur omnino mortua. Hoc est nulla ratione videtur seruati potuisse, sed fuisse morbum omnino insuperabilem. Minime verò quod aquam frigidam bibisset, hoc est, minime vero videbatur moritura, quod aquam frigidam bibisset, atque omnino refrigerantibus vsa esset. Imò verò si seruati potuisset, hæc maxime ratione esset seruata, quia fuit curatio accommodatissima in tanto bilisferuore, curatio adeò refrigerante vti. Continere igitur hic modus dicendi commendationem curationis, & hanc argumentationem. Morbus hic erat insuperabilis, quia non est mortua ægra ob curationem quæ adhibita est, imò verò hæc fuit seruata, si seruati potuisset. Sed quæ fuerit hæc curationis ratio explicemus. Datus est illi potus copiosissimus aquæ frigide, adeo vt non bene ventriculo caperetur, & ob id euomeretur, & postquam ita est refrigeratus superior venter, & per aquam purgatus, rursus quantitate minori datus est, vt retineretur succus frigidus, vt gelida aqua, aut succus aliquis refrigerans, vt plantaginis, aut rosarum, aut vix acerbæ. Et eodem succus per clysterem infusus est. Hæc omnia meritis fiebant, vt, si fieri posset, ram adenti bili æquali refrigerare timeo occurreretur. Acta verò fuerunt hæc secunda & tertia die, prima enim non potuerunt simul cum expurgatione. Curatum ergo imprimis est succi copiam minuire, mox occurrere eius qualitati. Verum fecit humor morbum incurabilem, anrequam possent medici arte repugnare. Vide quidam diuersa fuerit ratio curandi hanc famulam

A Onchidemi, & virum illum quem Arbenis cholera corripuit, cum eodem laborarent morbo. Vt intelligas quando melius doceatur medica praxis per exempla, quam per capita morborum.

L Arissa Eudemus hemorrhoidibus torquebatur admodum vehementibus & disturnis, cum exanguis esset, bilis commota est, ex corpore tamen mitius se habebat, & alius deorsum turbata excernebat biliosa, & hemorrhoides intumescebant. Cum medicamentum deorsum purgans haussisset, purgatus est egregie statimque prisana succum superbibit, & adhuc conturbabatur, dolorque circa hypocondria consisibat. Illius hemorrhoidibus manus admoa est, cum alius quodammodo male afficeretur, sed curatione indigeret, quin etiam vomuit: deinde verò accedente cancro febris corripuit nec dimisit donec moreretur. Quandoque etiam cum rigor subripiebat dimisisset, febris accessit, & bilis detectæ, & statim partim prodibat, partim inus remanebat, & venter dolebat. Hemorrhoides verò extraximus prominebant, quæ alio tempore à purgationibus inceperant, & statim per ipsas prodibat, cuius principium à sternamento oriebatur.

D Hic mortuus est ab hemorrhoidibus Intempestiue curans per chirurgiam. Quia cum bilis in corpore alioqui cacochymo agitata, esset, primum sponte ac per se, deinde etiam pharmaco deorsum expurgante, & non esset perfecta purgatio, sed adhuc alius curatione indigeret, tentata est curatio chirurgica hemorrhoidum, cum oporteret prius perpurigare corpus, & bilis motum sedare, & alius liberare à noxa, si quam bilis inuulerat. Enenit ergo, vt excisæ hemorrhoides, aut vix cancro tentarentur. Cum illæ non essent intra ipsum intestinum, sed in podice exterioris, vt quædam etiam solent, tamen fistulis per exiguis cum intestino communicabant. Quo factum est, vt statim per ipsas hemorrhoides exiret. Quod quidem primum sentiebatur sternutando (quia commouentur conuulsiunturque sternutatione omnia) deinde verò etiam circa hanc motum. Ex cancro eius partis excitata est febris, ac febre & corruptione procedentibus, mortuus homo est. Hippocrates libello de hemorrhoidibus docuit duas rationes chirurgicas curandi hemorrhoides, alteram quidem vitione non violenta, sed ita vt sustineri possit siccante, scilicet candente non tangente hemorrhoides, sed prope posito: alteram excisione. Hic non dicit quæ harum vix Eudemus sit, neutra sanè vti debuit, antequam reliqua ventris mala, & bilis purgatio conquiescerent, verisimilibus autem est, sectione esse curatum, quia vix quam scissa minus sentantur cancro. Accedit quod erant hemorrhoides externæ, & quæ facile poterant curari ferro, vt non esset igne opus. Verum præsentis historia admonens, ne remere permittamus hemorrhoides curari (periculosè enim tractantur ferro aut

igne) ac nunquam prius non perpurcato corpore. Sed enarremus literam. Eundem Larissæ hæmorrhoidas patiebatur admodum vehementes & diuturnas (non sicut cæcas sed fluentes multum, siquidem exanguinem ipsum fecerant) cum exanguis esset, bilis commota est. Hæc verba plurimum videntur spectare ad illud quod Avicenna dicit, sanguinem esse frangum bilis, siquidem velut causam reddens dicit, cum exanguis esset bilis commota est. Quod ceterò hæcenus verum est, quod cum sanguis sit succorū moderatissimus, alios omnes temperet, atque in illius penuria, alij omnes sinceri fiant, & ob exorbitantes qualitates naturæ magis molesti. Velut in boe, quia erat hæmorrhoidibus factus exanguis, bilis molesta esse cepit naturæ partium, ac proinde commota est. Sed ex corpore tamen mirius se habebat, hoc est, reliquum corpus parum læsit, sed in aluum decubuit, atque ira aluus inferior turbata est, & excreuit biliosa, & hæmorrhoides qualitate bilis excreuit exacerbata sunt, & naturæ nixu intumescerebant. Cum hausisset *quædam* id est, expurgans per inferna (ponitur enim comparatio pro positivo) purgatus est egregie. Et mox superbibit succum. Non dicit quæ succum. Suspicio huic datum esse, cum putaretur iam bene expurgatus, succum aliquem frigidum, ut fieri solet, atque ut famulæ. Obvident factum est, artemperandi gratiā (is fuerit cremor pituitæ) & magis perturbatus est, ut pote non perpurgatus. Et dolores consistebat circa hypochondria, quod minus succos in medio fluxu consistisse, atque hæsisse circa hypochondria significabat. Huic manus admodum est hæmorrhoidibus, hoc est, chirurgica curatio hæmorrhoidum adhibita est, cum videretur aluus bene se haberet, sed adhuc indigeret curatione corporis totius & alui. Et vomit, in ipsa arbitror chirurgica curatione, præ anxietate & perturbatione. Quod iam hinc significabat difficultatem eius curationis, & malam tolerantiam, atque adeo intestina læsa esse per consensum cum podice, & ventriculū per consensum cum illis. Quæ sicut omnia inde nata sunt, quod alius adhuc malè habente, curatio illa laboriosa tentata sit. Sed quod omnium fuit gravissimum, deinde accedente cancro in parte qua excisæ sunt hæmorrhoides, febris hominem corripuit, & non dimisit donec occideret. Quod factum est bile atra & maligna, quæ in corpore adhuc cacochymo abundabat, ob dolorem & exulcerationem, eo accurrente, & faciente vlcus cancerosum, & proximas partes exedente. Sunt verò ibi partes, quarum exesioe citò quis mori possit. Nam intestinum, & vesicæ cernix. Non tamen hæc tam cito exesa sunt, neque homo tam brevi mortuus, quin aliquot dies duraret cum febre & cancro. Quibus diebus etiam renatur dolor ventris, ex bile & flatu, quæ partim exibant, partim intus manebant, vtriusque ratione cruciantia. Bilis verò ob cacochymiam corporis infusebat in intestina, flatus ob debilitatem naturalis caloris gignebatur, quandoque verò, hoc est, aliquibus diebus inordinatè intercurrere rigor, & eo cessante febris veniebat velut paroxysmi febrium erraticarum per febrem continuam intercurrentes. Cuius causa, & in bile esse poterat, & in cancro in bile quidem, cum inordinatè aliqua eius portio maior solido & acior moveretur, quæ mordicatione

primum fecit rigorem, putrescentia deinde febrem. In cancro verò, cum contingeret particulam aliquam acrioris sensus exedi. Dicit deinde quales essent hæmorrhoides, & quæ ex causis fieri illi homini inceperant, & quousque essent progressæ. Accidit hæmorrhoidibus esse magnis, aut parvis, multis, aut paucis, recentibus, aut inveteratis, internis aut externis, cæcis aut fluentibus. Tot cum sint hæmorrhoidum, differreotie, has dixit iam fuisse magnas, & diuturnas, & fluentes, nunc dicit fuisse extra intestinum rectum. Quod fuerint non dicit, non tamen adeo refert scire. Constat fuisse plures vna. Alioqui dixisset hæmorrhoidem. Dicit has alio tempore à purgationibus inceperant, hoc est, causam procatartecam à qua ceperunt fuisse, quod quondam ob alias affectiones purgationibus assiduis, aut clysteribus, aut glandibus viresceret. Ut scias merito multos horum usum refugere, meto hæmorrhoidum. Parum quidem igitur ex hac occasione inceperunt, deinde verò verustis factis evenit, quod multis solet, ex hæmorrhoidibus ad intestinum fistulas fieri, quod inde constare poterat, quod status per ipsas prodiret. Constat verò fuisse fistulas tenuissimas, & ut evenire solet, invisibiles, quia flatos tantum prodibat (alioquin exivissent etiam faeces) ac multo magis in principio, hoc est cum primum fistulae fieri ceperunt. Tunc enim non nisi per sternutamentum prodibat, iuvante flatu impulsam illa conconfusio. Postea verò etiam sine sternutamento, fistulas scilicet factis aliquantulum maioribus.

Larissa vir quidam cominus, hasta lata vulneratus est à tergo, & macro infra umbilicum penetravit, & cum liore & tumore multum percurrit spatium. Postquam autem vulneratus est, dolor vehemens primarias partes occupavit, & venter intumuit. Cum huic propinatum esset medicamentum deorsum purgans suberventum quid paucum egesit, & mortuus est. Huius intestina non esse sana, & venter sanguine repleti videbatur.

Ceterò luce clarius erat, huic homini transfixa esse intestina, ac venas multas disrumpas, effusumque interius sanguinem, & ex loco quo transiitum est, & ex reli magnitudine, & ex liore & tumore qui sub umbilico per bonam partem hypogastrii decurrens conspicebatur, & ex dolore ingenti, & venter tumore. Quia propter ille merito mortuus est postmodum, & expurgatio remedi tentata est, cum fuisset potius nihil agendum, ut in manifestè mortuo homine. Ego verò, vix inno batus libri quinti dixi, nihilominus puto, non omnia quæ hic narratur facta, Hip. fecisse, sed quædam ipsum, quædam alios, cum verò omnia, quæ in eius obitum perueniunt, experimenti causâ notasse, & rerum euentos.

Appellens Larissæ annos natus fere triginta aut paulo minus morbo destinebatur, quo nocte magis per somnum quam in-

terdin corripiebatur & annos fere duos ante mortem agrotabat. Vomebat autem bilem rufam aliquando quam exitabatur, vomebat etiam nigram. Hic cum purgatione capitis admodum vehementi usus & per multum tempus purgatus effet, & medicamentum bis bibisset, sex menses transegit. Erat autem edax, & corpus habebat biliosum, postquam nullum lactasset; magnopere riguit, & febris corripuit, morbusque noctu inuasis. Postea rursusque altera die sanus esse videbatur: sequenti vero nocte cum exisset a primo somno morbus inuasis, tenuisque per noctem & diem usque ad horam cecidit. Mortuus est antequam mentis compos esset. Primo conuuliebantur dextra partes & facies & reliquum corpus, deinde sinistra; cum quiesse videretur, comate & stertore detinebatur, rursusque morbus succedebat.

Hic iuuenilem ætatem agens, morbo comitiali ex bile & melancholia, per consensum arbitror cum ventriculo, correptus est, quo per duos annos agrotauit, donec mortuus sit. Nimirum morbus comitialis inter alios familiaris est iuuenili ætati, ut in aphorismo tertie particulæ dicitur, præcipue vero qui ex bile vltæ est. Non enim quia non conuuliebatur mox totum corpus, sed dextra partes primum, & facies & reliquum corpus (secundum idem scilicet latus) deinde etiam sinistra, putandum est non fuisse morbum comitalem. Qui enim alius esset, cum esset passio apoplectica cum tanta partium conuulsione? Certe sæpe occurrunt multi tam pusilli, tum grandiores, quos epilepsia laborare medici omnes dicunt, quid secundum alterum latus, aut secundum partes quædam, non autem toto corpore conuellantur. Neque immerito, ut enim febris quodcumque genus, & alius quicumque morbus potest esse exquisitus, aut non exquisitus, ita passio quæcumque apoplectica, tunc dicitur esse exquisita, quum eius definitio exacte ei congruat: cum verò aliquid desit, non exquisita: ea tamen esse dicitur, cuius rationem maxime assequitur. Velut si quis sine sensu & motu libero cadit, toto corpore concutitur, exquisita epilepsia laborat: si verò altero tantum latere conuulsiuit, epilepsia etiam laborat, non tamen exquisita. Dicitur tamē merito epilepsia, quod sit apoplectica passio cum conuulsione. Atqui fortasse, ut omni epilepsia congrueret, esset potior definitio hæc, passio apoplectica cum conuulsione, quum conuulsio vniuersalis. Eneniebatur huic quod in multis epilepticis fieri vidimus, conuulsiuam motum non esse perpetuum roto paroxysmo, sed interrumpi quadam quiete, nihilo meliori ipso concussione motu. Iacent enim plurimi illorum ut mortui sine sensu & motu, & ex quibusdam intervalis concutiantur, ut quodammodo vnus paroxysmus sit, quodammodo multo & repetentes. Nam obstructio ita incensus soluta non est, alioqui rediret ad sensum, conuulsiuntur autem ex internalis. Huic ita eueniebat. Corripiebatur autem magis in somno noctu, quam diu & vigilans. Quod sane lenioris passionis

erat, quam si contra fieret. Nam cum somnus sit obstructio quadam cerebri, & apoplectica omnes passionis maiores obstructions illius sint, certe ipse somnus, alioqui paruos, ad ipsas passionis potest trahere, usque adeo. n. cum illis habet analogiam naturam, ut ipse somnus factus profundior, & solutus difficilior, in apoplecticam passionem degeneret, & incubus à catacho hoc solūm discipet, quod dormientiū solūm sit. Quæcumque ergo apoplectica passio innadit vigilantes, vehementior ob hanc causam est, quæ quæ dormientes. Hic igitur cum ad cerebri obstructions paratus esset, somno profundo capiebatur, & ob hanc causam conuulsione, quæ cum interquiescebat, somnus profundus cum stertore supererat, qui & ipse erat apoplectica passio ab exquisita apoplexia quam minimū distans, & rursus redibat conuulsio. Fuisse hunc morbum per consensum cum ore ventriculi, & ex bile vltæ, illud declarat, quod cum excitaretur, simulque liberaretur à morbo, vomebat, aliquando bilem rufam, aliquando etiam nigram. Hic purgatione capitis admodum vehementi usus est & per multum tempus, & medicamentum bis accepit. Hoc est, purgans est bis medicamentum admodum vehementi, & ex capite peculiariter educens, & purgatio durauit per aliquot dies, ut fieri solet cum vehementius pharmacum est acceptum, & his actis, & his actis, & hoc est, sex mensibus non esse correptus à morbo, cum superioribus decem & octo mensibus crebro corriperebatur. Dices, quorsum datū est pharmacum cephalicum homini per consensum cum ventriculo laboranti? Aut rursus dices, non laborasse per consensum cum ventriculo, quandoquidē pharmacum cephalicum adeo adiutus est. Sed scire oportet, partes quæ grauiter per consensum cum aliis laborant ob succum aliquem aut vaporem qui transmittitur, per sese non esse sanas (nam alioqui non comparerentur) sed habere in sese morbosum apparatus ob quem facile in eam passionē trahuntur: præcipue autem quum morbus illi inueneratur. Omnis enim sympathia diuturnitate transit in idiosyncrasiam. Ob hanc ergo causam capitis expurgatio huic profuauit. Verum cum prima morbi radix non esset extrirpata, recurrit malignius. Fuisse verò morbum hunc in cerebro per consensum cum ventriculo, & in hoc per consensum cum toto corpore, constat ex illa quæ subdit, narrans causas quibus morbus lethaliter rediit dicens, erat autem edax, & habebat corpus biliosum, postquam multum lactasset magnopere riguit. Itaque quia erat edax ventriculus afficiebatur, & quia erat corpus valde biliosum, conuulsiuit in illum bilis, & cum ob voracitatem, & ob malam corporis naturam multa excrementa collegisset, post luctum vehementem, rigore & post eum febre correptus est, agitatione & putrescentia excrementorum, & morbus comitialis rediit in noctem. Sequenti autem die & rursus altera die, videbatur sanus esse & sine febre, sequenti verò nocte comauit laure, & inuasis eum post cenam morbus, terna, & nocte ut erat biliosus post primum somnum, & tenuit eum viginti quatuor horas, noctem & diem, usque ad horam cenæ, & mortuus est antequam ad se rediret, hoc est, cum expectaretur fore ut tunc mentis compos fieret, ut solent quæ ab apoplecticis passionibus euanescunt, mortuus est. Hic certe ab exercitatione, & ab intermissis comis, laesus magnopere est.

A

E Vmelo Larissæ rignerunt crura, & manus & maxilla nec poterat extendere aut flectere, nisi alius flecteret aut extenderet, neque maxillas diducere, nisi alius diduceret. Nec quicquam aliud dolebas, neque comedeat nisi mazam, & mulsam bibebat. Vigesima die sedens cecidit supinus, & caput vehementer ad lapidem allicit. Et ipsi caligo affusa est. Et paulo post resurgens sanus erat, & soluta sunt omnia, præterquam quod post somnum, quum excitabatur, aliquantum colligati erant articuli. Annos autem natus erat duodecim aut tredecim, ægrotavit autem tres aut quatuor menses.

Sæpiissimè euenit ut passioes quorundam tardæ, & solutu difficiles, superueniente aliqua alia acuta & graui soluantur, sique acuta passio tardam indicat, citò scilicet insuperata materia, quæ antea lentè molesta erat, & ooxia. Velut huic puero euenit, qui cum res iam ant quatuor menses malè haberet secundum articulos, & difficile moueretur, postremò cepit malum ingrauescere, adeò ut haberet crura rigida, & manus, & maxillas, ita scilicet ut non posset extendere aut contrahere, nisi alius contraheret, aut extenderet, neque posset os aperire aut manducare diducens maxillas, nisi alius diduceret, ac proinde vteretur solum maza, pulticula scilicet ex polenta & aqua, & mulsam biberet. Vigesima die ex quo cepit rigidas habere partes, cum sederet, caligo ipsi offusa est, vaporibus crassis qui distentos tendones musculorum in artibus & maxillis tenebant, caput occupantibus, & cecidit in occiput, & caput vehementes ad lapidem allicit. Et sine sensu, ac motu, vertigine propè accedente ad apoplecticas passiones, tantillum fuit, sed mox cerebro, ut est membrum nobile & proinde forte, disculiente status, surrexit, & sanus erat: hoc est mox sanum se sensit, non solum ab hoc paroxysmo, sed & à priori malo. Soluta enim sunt omnia, præterquam quoddè deinceps recens excitatus à somno, aliquantulum videbantur esse articuli ligati. Nimirum contraxerat huius articuli debilitatem, somnus verò vaporum effluvia cohibet, quos imbibentes ligamenta faciebant ut articuli videretur colligati, donec vigilia vapores absorberet, & articulos laxaret. Tristis sanè abcessus est, qui in membrum adeò princeps sit, sit tamen etiam hic sæpe vultit. Atque adeò in omnium morborum paroxysmis, eorum materia copiosius absorbitur. Nam & in febribus nox quæ paroxysmum antecedit grauis est, quæ verò subsequitur magna ex parte leuior existit, & epilepticos etiam vixi sæpe, aliquot diebus antequam paroxysmo corripissentur, ex granitate quadam corporis, & dispendentia suum malum præsentire, sequeoribus verò hilatione esse, ac velut ab incumbente poodere liberatos. Hoc idem euenit huic ægroto, qui cum duodecim annorum esset, puellitas adhuc morbis erat opporitur, in quibus sunt omnes qui ad cerebrum ipsèst, qui in adolescentia solui solent ætatis mutatione.

Larissæ virgo cum paucum sanguinem euomisset, purulenta facta est, à febribus superuenientibus non est liberata, donec desierit, mortua est tertio mense. Ante mortem autem obsurdauerunt aures, nec audiebat, nisi quis valde exclamasset. Verum ante sanguinis vomitum debilis erat.

Aphorismo. 37. sectionis septimæ ita est scriptum. Quicunque euomit sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si verò cum febre, malum. Galen. in commemoratione dicit, febres cum sanguinis vomitu significare inflammationem ventriculi, non qualemcunque, sed magnam & semper angelicentem: scimus verò inflammationes maximas sopurati solere, maxime quæ in suprema parte ventris consistunt. Nam utio prognostico dicitur. Tomores qui in hypocondrio sunt magis faciunt abscessum, quam qui in ventre, minime verò qui infra vmbilicum. Quia ut sexto huius operis dicitur. Suppurationum vmbilicus est terminus. Hæc sanè virgo sine febre cepit sanguinem vomere, & vomuit non multum, ac febris superuenit continus, quod aperte indicat, etsi inflammatus ventriculus non esset, cum inciperet vomitus, tamen mox accurrente pluri quodam euacuetur sanguine, superuenisse inflammationem magnam vetriculi, ex quâ dictas ob eas causas facta est purulenta. Merito ergo non liberabatur à febre, neque sanè liberata est donec tertio mense obierit, hæc autem arbitror facta, ut solent qui purulenti moriuntur. Nam primum quod suppurationis accidit, ut in prognostico dicitur, est, febrem non dimittere. Ante mortem obsurdauerunt bædæ aures, quod humoris in caput raptum significat, estque lethale, quum uoo indicat instantem fluxum sanguinis ex naribus, aut parorydes. Hæc verò siue cum facultas est robusta, qualis sanè huius fuit, quia etiam longè ante sanguinis vomitum erat debilis. Atqui fortasse ob hanc ipsam causam ex suppuratione in ventriculo mortua est, cum alioqui solent qui bona ætate sunt, vomitione puris & subduotione liberari.

Larissæ famula dyseridis adhuc inuentula, cum venere vteretur, vehementi circumcirca dolore afficiebatur, alias verò indolens erat, nec unquam concepit. Sexaginta autem annos nata post meridiem dolebat vehementer velut paritura. Cum autem ante meridiem multum comedisset porrum, & dolor omnium præteritorum vehementissimus ipsam corripuisset, exurgens asperum quiddam in vteri ore contraxit. Deinde cum iam animo linqueretur, aliam mulier immissit manus extraxit lapidem asperum, fusi verticulum aquantem, & statim sana facta est, posteaque permansit.

Optimum exemplum eorum quæ in nostris corporibus generantur præter naturam, miraculis similia. Gigni enim in renibus, aut vesica; lapidem non est rarum, ut pote morbus eorum naturæ congruens, adeo ut Gal. primo de locis affectis dicat ab his quæ præter naturam in partibus generantur argumentum sumens, si lapis est, affectionem pertinere ad renes aut vesicam, quasi in nulla alia parte possit generari: verum generari in utero rarum est, non tamen impossibile, siquidem & in colo gigni alij affirmant, & ex recto intestino magnum lapidem se extaxisse, mihi quidam narravit. Atqui profectò in solis urinae viis gigni posse nulla evidenter ratione monstrari potest. Quare licet mulier in utero gigni potuisse non negaverim. Miror multò magis pondus hoc alienum tandiu eius partis naturam sustinuisse, ac post modum mulierem iam senescentem potuisse pellere. Verum quæ rara sunt non admodum communes rationes sequi possunt. Huic ut aliis solet in vesica, sic in utero congestione crassorum succorum genitus lapis est. Qui, cum iuencula adhuc venere vteretur, motu impulsus que vteri in cervicem trudebatur, & magnum dolore in circumcirca os vteri faciebat, vterò enim turgescente, & lapide duritie & asperitate partes internas cervicis collidente, necesse erat in ambitu, & partibus cum quibus alligatur, dolores sentire. Alioqui verò lapide in interno laxoque vteri spatio existente, sine dolore erat mulier. Nam & illi qui in vesica habent lapidem perinde euenit: Dolore cruciantur inter mingendum, alioqui sine dolore sunt, nisi lapis sit magnus, atque tunc quoque ponderis solum habent sensum. Huic verò iuenculae adhuc non fuit lapis magnus, postea enim tam multis annis magna ei secretio fuit facta. Hæc nunquam concepit, neque immeridit. Nam ille lapis inciens in os, semen in vterum recipi prohibebat, & si quid receptum esset pellebat, velut si quid præter naturam in ventriculo est, cibos potusque naturales vomit pellit. Cum itaque adhuc esset iuencula, sine dolore erat, nisi quæ venere vteretur, facta autem sexaginta annorum dolebat quotidie post meridiem *ut dicitur in iugis*, quasi scilicet paritura. Neque certe abstinere erat. Fiebant enim illi dolores haud dubie, vrin parientibus, nixu facultatis expultricis vteri, ad extrudendum lapidem. Causa verò huius nouitix fuit magnitudo, & durities lapidis noua, & debilitas maior retentrix, & vteri ariditas ac constrictio, quæ semetipsum consequitur. Nam vterus corrugatus minus iam capere, & debilis minus retinere potest. Constat verò debilitatem retentrix, & maiorem quam antea molestiam, maioris motus expultricis esse causam. Fieri autem potest, ut facultas debilior (debilior enim etiam erit expultrix) cum maiori conatu plas efficiat, quam fortior cum minori. Accessit medicamentosa porri vis. Cum enim quadam die ante meridiem multrum porrum comederit, post meridiem cum ingenti dolore, omnibusque qui antecesserant maioribus, excreuit lapidem, sine calu, siue medico quopiam ita consulente porrum comedit, certe non præter porri facultatem fuit, quod subsecutum est. Nam Dioscorides, de porro hæc dicit, vrinam citius, menses pellit, venerem stimulat. Ob hæc omnia, vim iunandi facultatem vteri habet. Cum igitur (inquit) dolor omnium præteritorum ve-

A hementissimus ipsam corripuisset, qualis scilicet esse solet quum iam fetus erumpit, exurgens præ dolore asperum quoddam reperit, id est, tunc primum sensit in ore vteri, & cum animo linqueretur præ dolore, & ipsa iaceret, alia mulier manu extraxit lapidem asperum, magnitudinis ventriculi eius quem extremo fusi quo uent mulieres affigunt ad firmandum motum fusi, & ut quiētius circumuoluatur. Res est notæ. Magnitudo eius quanta nucis, figura rotunda & plana. Mihi quidem hoc non contigit videre, certior tamen factus sum, nou multis ante annis, idem duabus mulieribus accidisse, altera erat virgo monachalis: altera, ut accepi vidua, quæ quia venere non utebatur, habebant antea solum dolorem grauante ut ex lapide in renibus. Excreuerunt verò postea haud dubie ex vtero, si vera narrata sunt, ut famulae Dyferidis.

M aliensem currus onustus protrinit circa costas, & confregit costas, & aliquandiu infra costas pus ipsi subsistit, sub splenem vstus est & penicillis adhibitis ad decem menses peruenit. Resecta verò cute foramen apparuit ad omentum utrinque penetrans, & ad renem usque & ossa perueniebat putredo. Huc corporis habitu biliosum esse latuit, & multam in corpore esse siccam omenti & aliarum carniū putredinem, quas statim oportebat proicere, si fieri posset medicamento siccò, dum rubor aliquod homo habebat. Nam ab humidis non inuabatur sed putrescebat, à limentis autem inditis represso humore rigor corripiebat & febris, magisque putrescebat. Affluēbat autem istuc putridum quiddam subnigrum, graneolens. Priusquam autem curationem aggredieremur singulis ferè diebus multum foras pertransibat, quod facile non fnebat. Cognitum est morbi naturam præcèdè à cute remotam esse. Quid si omnia rectè administrata fuissent, tamen liberari posse non videbatur, etiamsi ipsum ventris profundum corripuisset.

Multa huiusmodi consentaneum est accidere iis, qui cum ex alto ceciderint, aut re aliqua dura aut graui incidente collisi fuerint, primum quidem pus colligitur, deinde exactis multis diebus tabescunt, aut etiam sine tabe inopinatò moriuntur. Nimirum sepe rupturæ aut collisiones manent interiùs sub sana cute, latentque supurationes, unde etiam malignæ partium putrescentiæ sunt, vnde multis post diebus euenit mori. Vellat huius Malienis, in quem cum onustus currus incidisset supra costas, neque omnino contriussisset, & exanimasset (mirum profectò hoc est, euenit autem nonnunquam ob rapidam celeremque currus transgressionem) sed costas confregisset, & mor (ut est verisimile) fracturæ curatæ, factæque repositione, & agglutinatione, ut solet, ad decem peruenit menses ab eo tempore quo collisus est, & iis exactis oblit. Quid tamen interim actum sit, & ut

malum processerit est notatu dignum. Post aliquot dies ex quo laesus homo est, pus sentiebatur ipsi subsistere, & interiori latere, non intra thoracem, sed infra costas, ad huius scilicet regionem, inter septum transversum & coram in sinistro latere. Non est autem mirum alia in partem esse receptum, & alia esse pus collectum, cum precipue ad quæ pus recipit, cum ea quæ laesa est, habeat rectitudinem, & accommodatum positum ad recipiendum inde. Quare consentaneum est huic in sinistro latere fractas esse costas, inde enim succus qui ad dolentem partem confluerebat, non magnâ naturæ operâ, detruhebatur in inferiorem & debiliorem & secundum rectitudinem positam partem. Cum hanc ad causam puris collectio e regione sentiretur, sub splenem vltus est, non quidem altè impressis, quantum intelligi, sed inusitatus, vt ex paululis paulatim expurgaretur pus. Et conseruabat vltus quod inuisionibus fecerat, linteis & ligaturis. Atque cum diu ita permanisset, & res procedere in deterius videretur, tandem senius quam oportuit, ad resectionem altam cutis chirurgi perueniunt. Quâ resectâ cauetnosam & putridam vltus; excessum putrescentisque interioris multis partibus; apparuit. Precipue verò apparuit ab vlticis orâ duplex caeuerna, per vtamque partem penetrans musculos abdominis, & peritonæum, & pertinens omentum. Neque certè in omento consistebat caeuerna, sed demisso per campispecillo perueniebatur vsque ad renem, & vsque ad ossa coxæ aut etiam spinæ. Peruenit hic homo ad tantam corruptionem, quia latuit eius corporis habitum esse biliosum, & cum id medici non intellexissent, neglexerunt primis diebus expurgatione vti. Cacoehymia ergo effecit tantam putrescentiam, vt esset intra corpus multa putredo sicca omenti, & aliam carnium, musculosum scilicet abdominis. Putredinem siccam diximus iam antè vocari ab Hippo. putrescentiam partium ipsarum, non resoluturam in saniem, sed liuescentiam, & fortentiam. Eas ergo partes oportebat; si fieri potuisset statim medicamento sicco proijcere, antequam scilicet tantopere processisset malum, & dum adhuc homo roboret aliquod habebat, nam quam seclus homo est, nullus curationi locus iam fuit, & ob morbi magnitudinē, & ob debilitatem vitium. Nam ab humidis nihil remittebat malum, sed putrescebant magis partes. Hic ergo intelligo vocari siccam pharmacum ferrum aut ignem, aut causticum. Quibus enim aliis fit partium proiectio? Humida verò vocari non oleum solum aut pinguedinem (quis enim his in tanta putredine vteretur?) sed pulcritudinis omnes, & cataplasma, & cerata, quæ etsi sicca facultate essent, vehemenissime id facere non possent. Nullo autem ita sicco vsi sunt, neque putrescentium partium proiectione, sed ceratis, aut pulcritudinis humidis, & linamentis ad siccam partem, exurgendumque pēs. Ab humidis verò magis putrescebant. A linamentis verò inditis represso humore, hoc est, cum vtebantur linamentis ad siccam saniem rigor corripiebatur, & febris, & putrescebant magis partes. Rigor sanè quia particule aliquæ sentientes irritabantur: febris, quia calidum rigore in cor fugatur, emergere volens, corpus totum inflammatur (ita enim fit sepe vt febris succedat rigori, etsi rigor non à succis putrescenti-

bus, sed quacunque occasione experit) calor vero præter naturam auctus putrescentie maioris causa fiebat. Itaque omnibus quæ fiebant videbatur malum ingrauescere. Assidue autem circa ora vlticis putridus quidam succus, subniger, graneolens, significans scilicet malignam putrescentiam. Dices fortasse, quomodo ergo erat sicca putrescentia, si sanies affluere? Certè in alto erat omenti sicca putrescentia, circa ora erat sanies ex carniū alimentum genita. Et ob id ante curationis aggressiōnem, hoc est, antequam inciperet chirurgi curare, quotidie exibat multum eius saniei, quia scilicet vltus valde humidum erat, & longe aberat à sano, vt dicitur, hoc est, non habebat figuram idoneam neque accommodatam ad saniei expurgationem. Et cognitum (inquit) est, naturam morbi procul esse à curatione. Naturam morbi non video quid aliud significare possit, quam ipsum vlticis principium & causam, ac velut fundamentum, quo morbus ipse nascitur & fuleitur. Velut si quis ob crutis imbecillitatem, aut vehementem motum, aut calorem in eo exulceretur aut phlegmonem contrahat, eius certè vlticis aut phlegmonis natura, seu ortus principium in ipsomet crute est: si verò crute nihil dictorum habente insigniter in sese, ob heparis vitium id malum fiat, diceretur meritis habere alibi quam in crute naturam. Itaque quod nunc dicitur est, id vltus altius habere causam & principium quo fiet, & setuaretur, quam in ipsa cute discissa: nimirum in toto corporis habitu qui erat biliosus. Ac proinde nulla cura, quæ circa solum ipsam vltus adhiberetur curari poterat, sed opus fuisse ab initio corpus expurgare satis, ac deinceps partes quæ putrescere cōpissent, tempestiue abscdere. Verum (inquit) quæ dicitur de pte mæ, hoc est, etiam si omnia rectè ac secundum artem circa ægrotum essent acta, tamen non videbatur liberari posse, etiam si ipsum diarrheæ corripuisset. His verbis insinuat, vltus fibræ esse morbum adeo insuperabilem, & ob vlticis corporis habitum, & ob vlticis malignitatem, vt etsi omnia rectè essent acta à medico, atque etiam diarrheæ, quæ maxime videbatur posse cacoehymiam tollere, superuenisset, superari non posset. Nimirum quidem morbi sunt per se insuperabiles, quamvis medicus arte repugnet.

Antoninus in Omilo ex capitis vulnere mortuus est decima sexta die, cum assidue media cominus lapide fuisset percussus: secundum futuram in medio sincipite: Et ut me latuit eum sectione indigere, deceperunt autem me futura in seipsis iaculis lesionem continentes; postea enim manifestum fuit. Primum qui dem ad clauiculam, postea autem ad latus dolor admodum vehemens exortus est, & conuulsio vtramque manum occupauit. In medio enim capitis & sincipitis habebat vltus. Sectus autem est decima quinta die, nec multum pus prodit, Menynx autem sine putredine apparebat.

Recte quidem Hippocrates animaduertit quæ parte, & quo telo percussus homo sit. Nam secus

dum commissuras in medio sinepiti, loco omnium quæ in capite sunt periculosissimo, & alijs. Consideranda eorum esse hæc, monet lib. de vulneribus capitis quo etiam libro docet, ubi percussio capitis, os fractum esse suspitio est, secunda esse cutem, dilataodumque vlcus, & nudandum os, ut quo modo id habeat se, liquidò constet. Suspiciamus verò fractum os esse, præter alia multa signa, quum demisso per vlcus specillo vlcusque ad illud, asperum esse sentimus. Hinc fit, ut aliquando nos commissuræ decipiant, ut nunc Hippocratem. Cum enim Autonomus haberet secundam commissuras lesionem à iaculo, id est à ictu lapide, putauit Hippocrates asperitatem quam fractum os faciebat, naturalem esse commissuram. Qui quidem dolus postea patuit, cum Hippocrates symptomatum seruit compulsum, serò iam secuit. Nam quinta decima secuit eum, qui decima sexta mortuus est. Satiùs arbitror, iam fuisset insectum relinquere, ne sectionis labore citius moreretur. Hic magnitudine inflammationis cerebri & membranarum potius quàm putrescentia mortuus est. Nam mortuus est conuulsio, & coanulsiõe ex repletione nervorum. Membrana verò quæ decima quinta, vlcere secto, & exemptis comminatis ossiculis comparuit, imputrida esse videbatur, & pus prodixit exiguum, velut ex inflammatis partibus reatendans, non tamen ut ex putrefactis assiluerit exiens. Conuulsio verò venit in ambas manus æquè, quia in medio capitis & sinepitis habebat vlcus homo. Alioqui si in altero latere haberet, in contrario passus fuisset conuulsionem, ut fieri solet antequam dictum est quarto libro in historia pueri Metrophanii. Antecesserunt conuulsionem ut par erat, notæ repletionis, dolor scilicet fortis primum ad clauiculam, postea ad latus vtrunque, aut alterum, quodcumque contigit esse debilius. Non enim explicat. Hi dolores haud dubie, multo succo sursum è visceribus ad caput ascendente, facti sunt, qui caput iam occupans conuulsionem attulit, & conuulsione ac inflammationis magnitudine febrem quoque. Commendat Celsus 4. lib. 8. candorem & simplicitatem Hippoc. qui suum errorem tam aperte confitetur, coacti ac imperiti, qui nihil se fatentur ignorare. Sunt verò eius hæc verba. A futuris se deceptum esse Hippocrates memoris prodidit, morte scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnatū rerum habengium. Nam leuius ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multumque nihilominus habituro, conuenit etiam mixtæ veritatis confessio, præcipue quæ in eo ministerio, quod vilitatis causâ posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, quâ quis ante deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris, uti interpoceamus, efficit. Dictis bis explicat Celsus quæ ratione soleat futura fallere, & quæ ratione cauere oporteat oc fallamur, dicens. Potest autem futura eo nomine fallere, quæ æquè aspera est, ut aliquis hanc esse, etiam si rima est, exultimer eo loco, quo subesse haec verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed os aperire tutissimum est. Nam neque vtriusque certa sedes, ut supra posui, futuraturum est, & potest eadem & naturaliter commissum, & ictu fissum esse, iuxta vè aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementer

A tior, quamvis specillo nihil inuenitur, tamen aperite commodius est. Hæc Celsus, & multò plura ad hanc rem pertinentia eo capite docet, quæ licet cuius inde petere. Ioterim tamè animaduerte Celsum non dubitasse, librum hunc quierum Hippocratem esse. Quod si illo seculo ipsius esse putabatur, eum nunc tantò posterius vertatur in dubium? Quin & Galen. ipse, qui omissio quo coofilio alicubi negat, sæpe alibi sub Hippoc. nomine multa ex his libris citat.

B *Amula in Omilo duodecim circiter annes nata ex capitis vulnere moritur æstate media decima quarta die. Iannam quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat, futura verò in vulnere erant. Istud equidem imotuit eam sectione indigere, secta est autem non ut oportuit, sed quantum in ipso relictum est, in pus conuersum est. Octaua rigor, febris inuasit, habebat autem se non ut oportebat sed quantum etiam prioribus diebus, quando febris non tenebat. Non verò die reliquum excretum est, & pus admodum paucum cum sanguine subtus apparuit, & membrana cerebri pura erat: & somnus quidem eam corripuit, febris autem deinceps non dimisit. Conuulsio autem manum sinistram corripiebat, nam in dextra magis parte habebat vlcus.*

D Hic casus proximo serè similis est, præterquam quòd muliercula erat duodecim aenorum (quod vt in liberandis facit ad citiorem salutem, ita & in morituris ad citiorem mortem, præcipue io ætate media) quodque huic in dextram capitis partem vlcus magis inclinabat, proinde sinistra solùm manu conuulsa est, & quòd hæc tempestiue est secta. Tamen si eam ad futuras etiam hæc fuerit vulnerata, rectè tamen cognitum est sectione opus habere. Curauit autem fortasse Chirurghi prius Autocoomum, & successu admoniti intellexerunt. Sed neque in hæc bene ætum est quod oportuit, secta enim est tempestiue, non tamen velut oportebat, angustius eam est aperta cutis, quàm vt quicquid læsum erat io conspectum veniret, ut fieri oportere Celsus citatò capite docet. Fortè enim, cum iamque impulsu petculsa sit, læso latè patuit. Quantum ergo relictum sub cute est, computruit, & pus contraxit, generatio verò putis (ita vt solet) octaua rigorem fecit & febrem. Habebat autem ea die non minus quidè puris, ut oportebat, cum pus febre absisteret, sed quantum prioribus diebus, cum non febreret. Calore scilicet præter naturam tantum putrefaciete, quantum absuebat, proinde nona die, quod ex prima sectione fuerat reliquum, sectum est. Bece sanè fecerunt, quod primo deliquit, emendantes, fecissent tamen multò melius, quantum oporteret, prima sectione detegentes. Valdè paucum pus cum sanguine subtus apparuit, & membrana cerebri pura erat, internis, ut in Autonomo, affectis, præterquam quod som-

nus eam semper occupabat (febrem enim continuam Antonomum etiam postremis diebus habuisse certo certius est) quod duplicem causam habere poterat, aut pituitæ enim sanguine mixtionem aut cari aliquid cum conuulsione, ob conuulsione quæ cerebrum receperat ab impulsu ianua primum, deinde etiam fortasse à chirurgicis instrumentis. Videndum. n. chirurgis etiam est, ne duris ferramentis trahentes cerebrum, aut multum concutiant, aut comprimant, earum aliqui sola hæc causa facturis.

Crenius in Omilo cum suppuratus esset factus, in inferiori ventre usus est triginta diebus, tardius quam oportuit, & moderate se habebat & refectum fuit prius in ventre. Verum in calidissimo tempore cum edisset fructus Autumnales, & alios cibos non conferentes, à febre & diarrhæa correptus & mortuus est.

Ad omnes suppuratos, sine in thorace, sine in alui regione pus colligissent, utebatur Mipp. vltione. Atque cum inuisiones non erant taris, ad sectionem penetrantem veniebat. Et sane mihi persuasum, hanc curationem futuram multis vtilissimam, si tæpèstinè administraretur: nunc verò paucis, aut vix vllis est auxilio, quia aut non fit, aut omnino tardius multo quam oportet, partim quia ipsi medici quasi magna hæc sint reformidant, partim quia ægroti nolunt obedire, nisi cum se mori apertèiam vident, runc verò serò obediunt. Tempestivus verò usus horum est, cum adhuc sunt ægroto vires, quæ ferant. Inuisiones ergo fieri debent mox ac sentis suppurationis se exhibent signa: sectio autem mox ac effusum pus sentis inundare. Quid enimiam expectes, vbi hæc adiunt? An ut debilitentur vires? Huic ægroto vltio facta est triginta diebus, postea quam medici suppurationem fieri ex signis agnouerunt. Non quidem fortasse triginta, ab eo die quo fieri cepit, non enim tam exactè agnosceretur, sed ab eo quo peritus medicus cepit agnoscere. Proinde, etsi iuuarus, non persuasus est, quamquam fuisset hic quoque fortasse, si multo tempore (ita scilicet ut oportet eos qui ex longo & difficili morbo enadunt) se in bono vultu continuasset. At verò non fecit, sed fructibus horariis aut Autumnalibus, intemperanter usus, & cibis aliis prauis, ut fortasse oletibus, & leguminibus, correptus febre & diarrhæa mortuus est. Dicit verò et tñ *hypocritæ dñi tñon tñdpor* quasi grauius sit in calidissimo tempore quam in alio edere. Quod rectè dici non videret. Nam horatii fructus sunt, fugaces illi fructus qui in æstate proueniunt ut cetula, pruna, mora, duraci, ficus, vux, & eiusmodi qui assensuari citra corruptionem non possunt, aut passi (quo sanè modo nihil minus sunt quam horatii) quare neque in alio edit tempore, quam quo proueniunt, puti in æstate. Præterea cum hi fructus crudos & aquosos gignant succos, & facillè corrumpantur, hæcque causa noxius eorum usus, nisi satis moderatus, esse censetur, si tamen viles esse possint, certè ad

A sedandam scim & appetentiam ciborum concinandam, & laxandam aluum, atque iter bilem per sedem deponendam: qui sanè usus nullo magis tempore concedi potest, quam calidissimo, quo fastidio, siti, & ardore, ac bile laborant. Atqui profectò nihil probabilius quam eo tempore esse viles quo maturescunt, cum præcipue in aliud tales seruari non possint, siquidem natura est in causis quæ aluius gratia operantur, & finis in bono semper est. Igitur multos fructus borarios in calidissimo tempore edere, nihilo deterius erat. At qui profectò ego ita censeo. Inui verò quiddam aliud illis verbis, usum scilicet esse illum multis fructibus horariis, ut intemperanter ita negligenter in calidissimo tempore, hoc est, in æstate media, atque in meridie, atque quoniam negligenter eo tempore se petebat, usum esse fructibus calidissimis, quales solent domanè foris illis horis deportantur, quo nihil est in vultu nocentius. Nam cum fructus viles sint ad attemperandum æstium feruorem, ut dictum est, noxij verò & periculosi ob facilem corruptionem, accipi debent refrigerati, quantum fieri potest, quia cum corruptio agatur ab externo calore, refrigerati citra putrescentiam persistent donec commutentur, & attemperant multo magis: calidi contra attemperantem nullam præstabunt & in pituitam saliam, aut ferofam quandam bilem facillè abibunt. Quo fit, ut qui æstis vranne fructibus, omnes ferè in tertianas aut grauioribus aliis febribus incidunt, ac non pauci in eboleras morbos, multi verò ob refrigeratos fructus à febribus liberentur, etsi aliqui negotijs & exercitationibus sint implicati.

B Omnes igitur, ut arbitror, poterunt magnopere commendare consuetudinem refrigerandi fructus horarios admodò nunc, nam si quis ex fructuum frigore noxam sentit in ventriculo, is certò sciat se illis non indigere, neque consulendam illi est ut vtiatur calidis, sed ut paucissimis, aut nullis. Potus alia ratio est, multo enim leduntur frigido, qui nihilominus vti debent gelido. Vnde constat, multo magis esse necessariam idem ob horarios fructus, quam ob potum, tameris ob hunc quoque per æstatem & bonam autumnum partem plenèque vtilis sit, aliis temporibus nulli nisi iucunda, multis verò noxia. Quapropter ego vellem, nixi vsum cum horariis fructibus incipere ac desinere, atque interim fructus refrigerati quam plurimum, & accipere quemcumque quantum indiget iuxta naturam tum totius hominis, tum solius ventris, quæ vel calida, frigida, sicca, humida est vel ali qua inter has media, & iuxta consuetudinem, & experientiam quam quisque habeat proprii corporis. Potus verò non omnibus æque conuenit, sed suo cuique modo secundum eisdem scopos facta consideratione, sic enim multa essent vilia, quæ nunc plurimi vituperant.

C Hic verò cuius narratur historia, cum debilis ex suppuratione nondum sanata esset, comedit multos fructus borarios negligenter, atque adeo actus calidos, quales in calidissimo tempore sunt, & insuper alios cibos mali succi, vnde enenit ut febre & diarrhæa correptus moreretur. Neque mirum, quid enim periculosus alui profluuium in suppu-

D ratore.

E

F

Hecafon in Omilo velut ille etiam alter serius vssus est, huic autem pariter excrucatus est venter paucos excepto. Dysenteria autem correptus est, ex qua cum euassisset, quiduis comedebat, donec totus intumuit; ipsique per inferiores partes effluxit, & diarrhæa sublatas est. Hecafoni in Omilo ex corporis impuritate & laboriosa purgatione acutus in coxam decubuit dolor, quo quidem summoto febris cum corripuerunt, & diu in lecto decubuit; neque bibens quicquam, neque sitiens, debilis autem erat, & horrores patiebatur. Huic quidem commode, vt conueniebat, morbus sublatas est. Inuabatur autem corpus ab iis quæ offerebantur. Tandem morbus erupit per inferiora, & totus secessit cum multa bile, & mente motus, & mortuus est: videbatur autem morbum euassisse.

Dubitari hoc loco potest, an duo hi ægroti, casu eodem fuerint nomine, & in eodem oppido, an errore librariorum fictum sit, vt alterius in alterum nomen transferretur, an idem ægrotus sit, atque in Hippocrate chartis duplex narratio eiusdem morbi inueniretur, & qui compilauerunt ne quid detraherent, ambas simul scripserint. Atqui ego in hanc vitiam suspicionem feror, quia germana esse quæ narratur utrobique, & in eundem hominem rectè incidere posse videntur. Est tamen secunda narratio amplior, & magis ab initio rem attingens, quamquam non omnino ab initio, non enim à primo morbo, sed ab abscessu. Nimium hic ægrotat morbo purri, quicunque is fuerit, & cum neque natura neque arte rectè expurgaretur, abscessum habuit ad coxam, dolorem scilicet acutum. Hic dolor euauit, neque dissipata, neque euacuata materia: atque proinde febris ipsum corripuerunt: ob quas diu in lecto decubuit, laborans abundantia pituitæ. Nam siti omnino carebat, & debilis erat, & rigoribus inordinatis tentabatur: quæ quidem euenerunt ipso suppurationem contrahente in aluo. Nam in febribus quæ prorogantur languescente homine, & quosdam tales habent tetigores, internam puris generationem fieri, suspicari oportet: quæ quidem ex interna aliqua inflammatione procedat, aliquando autem & ex aliis tuberculis non adeo calidis: quin & citra tumores præter naturam fieri potest, ex succis crassis parti alii hærentibus, ibique putrefactis. Ita cognitum est hunc pus collegisse: sed fortasse cognitum est serius, quod inflammationis notæ non antecessissent, atque ob id vssus etiam serius est, quam oportuit, vt Cyrenius. Similiter etiam vi illi excrucatus est venter, vt totum pus præter exiguum quiddam consumptum fuerit: & corripuit ipsum dysenteria, & liberatus ab ea est: & morbus commode sublatas, vt oportebat, videbaturque iam sanus. Nam inuabatur corpus ab iis quæ offerebantur, & resiciebatur. Quo factum est, vt ille negligentius viveret, & nondum satis roboratus come-

A dir quiduis, & denno ægrotare cepit, grauiusque quam prius, intumuitque totus. debilitato certe hepate à prauis, multisque cibis, & potibus. Tamen (inquit) *dispepsa m' vñ opus erat*, erupitque illi pus & multa bilis deorsum & *εξ οπισθεν τῆς κοιλίας*: hoc est, adeo multum bilis cum pure secessit, vt tota morbi materia secessisse rectè putaretur: tamen sustinere homo iam debilissimus non potuit, & mente motus mortuus est præ diarrhææ magnitudine. Mente sanè moueri hos qui moriuntur exhausti eneruit paulò ante mortem, vacillante mente ob debilitatem. Vides hæc omnia eidem ægrotò rectè congruere, eiusdemque morbi historiam referri. Cætera sanè narrationis huius, in aliis ante hæc explicauimus. Illud vnum velim modo consideres, quanto pere sibi cauere debeant conualescentes, etiam si rectè solui esse morbi videantur, quia debiles cum sint, à lenibus erroribus grauissimè nonnunquam offendantur. Id verò præcipue timeri debet in iis, qui ob internas aliquas affectiones periclitati sunt habitualibus intemperiebus corripì. Quo in genere sunt omnes qui internam habent puris collectionem, & qui ob inflammationes, aut erysipelata interna ceperunt marcescere. Cum enim horum debilitas esset in essentia, non potest eorum facultas nisi diuturno tempore reparari. Sæpe ergo, quibusdam quæ vigeant inter secentibus, incipiunt velut resuscitare. Cum verò eorum virtus non potuerit confirmari breui, ob erratum aliquod, etiam non grauiussum, denud præcipitantur. Itaque hi lentè resiciantur, & diu sibi caueant, atque adeo omnes quibus ob malignitatem morbi, aut affectus partis naturam, facultas videtur esse corrupta magis quam præ morbi longitudine, plurimum tempore resiciantur, quam externati sint. Respicendum enim est non quanto tempore, sed quantum sint debilitati quaque in essentia.

Qui Salamine in anchoram delapsus, in ventre vulneratus est, & circumdolebat. Haussam autem medicamentum neque per alium desecit, neque enomuit.

Totum hoc opus observationis gratiæ, & captandi experimenta potius quam docendi, scriptum esse, dictum à me iam sæpe est. Atqui quoniam non vnum, sed plurima sunt, quæ à medicis debent observari: nam & signa vana quæ superuenire solent in morbos: & variæ exitus: & vires dierum decretionum: & auxiliorum medicinalium utilitates aut noxæ, ac denique vires ægtotantium: cumque pharmaci, expurgantis vsus tam sit insignis in hac arte, ac peculiariter ei fuerit tam familiaris: merito illius vires peculiariter obseruauit Hippoc. Quod quidem idem pharmacum quosdam à morbo liberat, quosdam euacuatione lædit, quosdam ne mouet quidem: idque ob dispensum cuiusque apparatus, vel naturale vel præter naturam. Id ipsum voluit Hippoc. obseruare, atque quasdam historias videtur scripsisse, vt animaduerteret ægtotos lætos esse expurgatione, alios verò adiutos: quosdam etiam in hoc solùm, vt animaduerteret dato pharmaco, nullam esse subsecutam purgationem.

sem : atque id quidem aliquando narrat simpliciter : aliquando infinitam causam ; ob quam quis purgari non potuerit : aliquando narrat exitum , quem ea res habuit . Nimirum eorum , qui à phar-
maco non purgantur , quidam non leduntur mul-
titudine , quibus scilicet nihil aliud adum est , quam
quod pharmacum , aut multum confectum cum
alimento est distributum , & in nutrimento cessit :
aut non satis ad adum deductum , deorsum exiit :
quidam leduntur valde , ut quibus excrementa ad
partem aliquam interioris affectam praesta sunt , aut
toto corpore commota , conrurbataque . Hic non
narrat qui fuerit morbi exitus , quia ex causa autem
non fuerit expurgatus homo , probabiliter potes
ex his quae narratur coniectare . Nam cum in ven-
tre percussus sit cunicula , partem percussam dole-
ret , consentaneum est conuocatum ed esse sangui-
nem , & factam inflammationem : cum vero inflam-
matio partem aliquam ventris teneret , nihil est magis
periculosum quam pharmacum , quia nihil sunt in-
flammationi euacuari , sed quicquid à pharmaco mo-
uetur , ad sese alliciens , mirum in modum augetur .
Nihil ergo delicere hunc à pharmaco , neque reuo-
care , lethalis affectionis timorem perito medico
faceret .

*Mulier quae se ipsam ingulauit , suffocaba-
tur , & data est ipsi multo post potio deor-
sum purgans , exiit ipsi .*

Obscura sane narratio est . Vix enim intelligas , an
se , postquam haec omnia acta sunt , mulier ingula-
uerit , antea autem quam daretur pharmacum , suf-
focatione solum laboraret , an malum conperit à in-
gulatione , dictaturque se ingulasse , non quod se
repetit inguli seditione interfecerit , sed quod sibi
vulnus infixit , quod deinde medici curare ten-
tauerint , & vulneri succederet suffocatio , ob cam-
que pharmacum datum sit . Porro illud ingulari
græcè *ἐπιβουλέ* , quamuis præcipue dicatur de coli-
ci scissione , atque ea pars dicatur ingulum , trans-
fertur tamen & ad omne genus necis , & se ingulasse
dici possit , etiam si in ventre sibi vulnus infixit ,
quin etiam si circa vulnus sibi alia ratione mortem
consecuerit . Porro ubi nos veritatem exiit ipsi , Hip-
pocrates dicit , *ἐξήρπασεν αὐτῇ* . Ianus Cornetius
vertit , per scellum ipsi exiit . Aliis videtur , si id
Hippocrates velle , dicturus *ἐκπαρῆκεν* , ut solet ,
aut vt in proxima historia dixerat *ἀνέβηκεν αὐτῇ* , ac
proinde intelligit illud *ἐξήρπασεν* energiam quan-
dam aliam habere , ac significare , inde exire , ex
vulnere , scilicet atque ita vertunt , exiit ipsi ex vul-
nere , quasi scilicet ille dicit *ἐξήρπασεν* de *τῇ ἐλπί* ,
ἢ ἐκ τῆς ἐλπίδος . Certè primo modo leue quiddam
est quod narratur . Nimirum huc non esse frustra
datum pharmacum ; vt mulieri Selamine , sed sub-
sequens esse expurgationem : secundo verò ma-
ius quiddam , & admiratione dignius narratur , sci-
licet pharmacum , multo postquam mulier vulne-
rata est , datum eripisse per ipsum vulnus . Nisi
enim decisa erant , gula , ventriculus , aut intestinum ,
quomodo poterat per vulnus exire , quod per os
ingestum ? Sin autem exire , quomodo factum
est , vt a uteo , neque cibis , neque potus exiret ?

A Certè decisa fuisse dictarum partium aliquam ,
atque adeo gulam , si modo secundum ceruicem se
vulnerauerat , constat : iussisse autem antea , quod
exigua scissio eam attigisset , & runc demum vi phar-
maci irritata vehementius expultrice , exiguum
alioqui scissorem esse prodicam , ac fortasse etiam
vehementi motu partem laceratam amplius . Haec
mulier mortua est sane . Nam haec partes decise : vt
in aphorismo dicitur , non coalescunt , & quia nisi
fuisse mortuam , ingulatam fuisse non diceret .

A *Adolescens ex Enbaa adueniens cum post
multas infernas purgationes intermisset ,
& quiescisset , febricitauit . Deinde cum vi-
deretur purgatione per superna indigere , bi-
bit debilem radicem deorsum purgantem &
quarta post potionem die mortuus est . cum ni-
hil purgatus fuisset , sed somno correptus est ,
nec poterat sitis sedari .*

C Huic post purgationem primam , quam precau-
tionis gratia , antequam aperire febricitaret , susce-
ptam esse coniecto ; conigit febricitare , quia arbi-
tror , etsi multum expurgatus est per inferna , non
tamen satis perurgatus . Proinde intermissa pur-
gatione , *μεταβληθεὶς* , id est , non deiciens iam febrici-
tauit . Deinde visus est per superna indigere pur-
gatione , & res pessime successit . Quid medicos de-
ceperit iudicantes eum tali purgatione indigere ,
non possumus diuinare , cum Hippocrates non nar-
ret quā causā visum eisisa sit , tamen non recte ef-
fectuata eam expurgationem , euenus ipse in-
dicauit : nam mortuus est ex morbo , qui non vi-
debatur aliqui lethali . Mortuum verò esse ob
pharmacum , constat , quia mortuus est quarto die
à pharmaco . & ab eo suscepto somnus grauis ipsum
renauit , & sitis non poterat exingui , quasi ab eo
ceperit homo laborate acutissime , & lethaliter .
Merito autem duo haec symptomata consecuta
sunt pharmaci potionem , à qua nihil est expurga-
tum . Nam nihil experimento magis cognitum , quā
solere à pharmaco homines somno premi , donec
euacuatio incipiat procedere , agitatorum excre-
mentorum vaporibus vndique in caput ascenden-
tibus , donec cum ipsa excrementis per aluum detru-
dantur . Cum ergo agitata quidem , euacuata au-
tem nunquam sint , merito id symptoma perseue-
rauit . Sitis verò maxima exoritur , quando me-
dicamentum non tempestine descendit cum excre-
mentis quae traxit , & ab iis gula & os ventriculi
exuruntur . Vnde constat , nulli nullus possit esse sa-
tis purgatus , donec sitis , sepe tamen à pharmaco
suum pessimam esse . Vbi Hippocrates dicit radicem ,
quidam volunt intelligi veratri , quod eius radice
esset ei crebrior visus , nescio tamen qua ratione ve-
tratri radix possit esse debilis . Fortasse debilem di-
cens , innuit aliam quam veratri : nisi forte radicem
debilem vocauit , quasi debilem potionem ex radi-
ce , fueritque ex radice non debili parata potio de-
bilis , ob exiguum quantitatem , & multarum re-
rum , à quibus eas vis deprimeretur , mixturam .
Vtrumque hoc habere , ad considerationem dignum ,
aut fieri potuisset , vt hic qui à potione debili exin-

A
Aus est, potioriem vehementiorem hauriens liberaretur. Fortasse enim si ea quæ commota sunt excrementa, fuissent etiam euacuata, euasisset. Neque à pharmaci vehementia adeo periclitans esset, quàm ab agitatis retentisque excrementis, vñ cum ipso pharmaco non exeunte.

S
Erna cui à medicamento hausto per superiora quidem prodibant pauca, & suffocabant, per inferiora autem multa demittebantur, nocte mortua est. Erat autem barbara.

Catapotia vocari ab Hippocrate, quæ accipiuntur deglutendo citra masticationem, anrea dictum est. Unde datum est id nomen pilulis, quia deglutuntur, vt quæ potantur non commantia. Exemplum quoddam aliud sibi ipsi scripserat Hippoc. hæc mandans memoriz, prout exitus expurgationis. Quoniam verò neque affectionis speciem, nec dandi occasionem narrat, nihil hic possumus accipere illud, quod nobis ex vñ sit, quam non esse nobis temerè purgationes tentandas, quasi non sint periculosissimæ, sed potius circumspicendum esse, cui homini, quo morbo affecto, & qua occasione detur. Rectè enim Plato dixisse videtur, medicam purgationem, quæ pharmaco agitatur, runc solum esse vtilem, quum summa vrget necessitas: aliter autem nullo modo sanæ mentis homini suscipiendam. Sed illud, Erat autem barbara, nunquid memoriz gratia solum adiectum est? An illis etiam verbis aliquid quod sit vtile indicatur? Mihi sanè videtur. Scimus enim barbaros, & eos qui longe aliunde, siue in Græciam, siue in Italiam, siue etiam Hispaniam translati sunt, ob magnam soli & patriæ temperiæ mutationem, debiles fieri, & curationes vehementes minus sustinere posse. Quod ego in Æthiopibus expertus sum. Fortasse ergo ea serua ex expurgatione, per superiora quidem difficili, quia exstant pauca, & suffocabatur: per inferiora copiosa, mortua est, quia barbara, alioqui melius toleratura. Quare nos oportet Æthiopes, & Indos, ac denique Barbaros omnes, qui longissime asportantur, curare cautiùs, & magnis euacuationibus nunquam vñ, mediocribus rariùs, plerumque inedia pro euacuationibus esse contentos, quia hanc melius sustinent, quàm nostrates.

H
omo Eubæus, cum bibisset pharmacum expurgans, tribus diebus purgatus, & mortuus est. Habebat verò manum suppuratam usque ad cubitum.

Hic euacuationis magnitudine mortuus est. Oportet ergo vitium rationem habere, cum datur pharmacum, & si quid ei in re peccatum sit, tempestiue occurrere. Occurreret verò cibo, quiete, clysteribus, & somniferis medicamentis: atque omnium optime, tberiacæ recentis. Ea si desit, antiqua cum tertia parte Philonii. Plurisque do tberiacæ scrupulum vnum, Philonii scrupulum semis:

S
Timachi filius à bile suffocabatur noctu quum dormiebat, & febris ipsum tenebat. Pharmacum autem haustum non continuit, neque purgatus est diebus sex, neque antequam moreretur.

Hic mihi videtur ob nimiam bilis redundanciam, & in superiora lationem purgati non potuisse, & banc ipsam fuisse mortis causam, quod scilicet caput, & cor bilis affatim occupauerit, & locustro-medio non fuerit. Sed quæ fieri possit, vt redundancia expurgationem impediat: nimias enim euacuationes videtur nata facere. Certè prohibens pharmacum retineri. Cum hic igitur multitudine bilis dormiens suffocaretur (quod multum in caput ferri indicabat, & in supernis partibus quæ circa thoracem caputque sunt redundare) & pharmacum haustum non retinuerit, ac ne purgatus quidem sit, consentaneum est putare, bilis redundanciam in superna ventriculi parte, quæ supra septum transversum est, medicamentum retineri prohibuisse: sublata verò retentione & tractione, expurgationem sublatam esse. Quid ergo hoc casu agendum fuerit medico? Non certè sciendum vni fotti pharmaco, sed paulatim vacuandum, crebro repetita vomitione.

Q
ui apud Dromum habitabat, cum nocte sanguinem vomisset, postridie mortuus est, sanguinem vomens multum & suffocatus. Circa splenem verò & infra cruentum quid multum prodijt.

Hic ex vomitu sanguinis nimio mortuus est, postridie ac vomere cepit. Suffocauit autem illum ipsa concretio iam in ventriculo sanguinis copia. Incepit illi malum à lienis redundantis. Vt enim splenis eleuatio eruptiones è naribus solet facere (dictum est hoc libro 2. huius operis pluries) ita huic fecit sanguinis eruptionem per ventriculum, disrupta aliqua in eo vena earum quæ ex liene procedunt. Hanc autem fuisse partem quæ miserit, indicat illud aliud, quod euenit: quod scilicet cruentum illi exiit multum circa splenem, & infra. Nam bicillud verbum *infra* non significat, vt in historia mulieris, quæ se iugauerat, è corpore euacuari (nam qui posset per splenem? aut quæ ibi via est?) Sed ad eum exire, atque apparere, seu efflorescere, & cruentum multum significat cruenta exanthemata. Quare hoc, cruentum exire, est quod alijs locis vocat *exanthema*, seu sanguinem manifestum. Exierunt itaque illi exanthemata per vicia multa, aut vibices, aut denique masculæ ad lienem & infra, in inani parte eiusdem lateris secundum rectitudinem, quæ baud dubiè redundanciam sanguinis in subiecto viscere significabant. Cum igitur ibi sanguinis redundanciam esse eo signo agnosceretur, consentaneum est inde in ventriculum regurgitasse. Nulla enim potior esse potest causa sanguinis mittendi in aliam partem.

partem, quam redundancia. Oportuit ergo huius enationem aggredi scilicet venâ lenis, aut internâ in cubito sinistro, & refrigerantibus, & adstringentibus potionibus uti; ut in apborismo dicitur,

Per cum in ventrem & hepar à mulo percussus esset, mortuus est die quartâ: spirationem autem densam habebat, nec mente constabat, ipsumque febris detinebat.

Periculosissimus sanè locus est inter hepar & ventriculum, ut vehementer percutiatur. Ibi enim si vena cava disrumpatur, effuso toto sanguine, siue extrorsum, si vulnus homo acceperit, siue in rorsum sub peritoneo, si contusa pars circa cutis vulnus sit, velutiugulatus mox moritur homo: si minus, ob sanguinis abundantiam, quæ eo loco est maxima, inflammatio magna mox oritur, & in hepate, & in ventriculo, atque mirum est, nisi etiam in tanta vicinia occupet septum transversum. Quod malum, quancumque earum partium scorum teneat, erit acutissimum; nedum omnes afficiens. Tale quiddam huic factum est: qui quarto die est mortuus, ut ab acutissimo exactè morbo, ingenti scilicet inflammatione partium internarum. Habuit verò utique morbum, quia habebat affectionem dolorificam partium, quæ cum thorace mouentur. Spiritus enim densus, ut dicitur in prognostico, significat dolorem. Tenebat etiam ipsum febris, quæ ab interna inflammatione non poterat abesse. Non intelligebat, quia etat, arbitror, mente alienatus (non enim tenebatur apoplectica passione), quod septi transversi simul cum alijs inflammatis significationem præbebat. Quamquam & per se, ventriculi & hepatis inflammatio, si maxima est, aut maligna, desipientiam solet facere: multò ergo magis, si omnia tenebantur. Atque ita etiam magis spiritus esset densus, quia septum transversum præcipuum respirationis instrumentum est. Curari ergo oportebat, ut inflammatione earum partium occupatum. Alioqui nullus erat remedio locus.

Hermophili filius agrotavit undecim diebus, febris autem tenebat ipsum, & non descendebant cibi, & primum quidem deliravit, nocte verò cessavit: sequenti autem die sine voce iacebat stertens, distortus habens oculos, febricitans. Pennâ verò immisâ vomuit bilem atram, & clystere immisso, stercus multum subijt.

Puerilis morbus est hic, creberrimisque eorum qui pueros solent affligere: quamquam aliquando etiam natu grandiores fatiget: nimium est ventris satietas, & à qua febricitare eos evenit acutè, ob cibos computrescentes in alio, & putridas fuligines copiose in cor delatas. Eueniunt etiam deliria, & convulsiones, & apoplectice passionēs, per compassionem cerebri cum ventriculo, à quibus aliquando intereunt: nonnunquam verò eum

A magna expectantione admiratione liberantur, evacuatis copiose ex ventre fecibus crassis, aut lentis, & ex superiori ventriculo, succis corruptis. Inflammantur inque plurimum vomitibus & deiectionibus; & dum hæc non sunt, ingrandescunt eis mala. Quod verò immisâ penna bilem atram vomuerit, ne miseris, corruptione enim prauâ ciborum in ventre multi pessimi que colores fiunt, ac nonnunquam, quum multitudine corrupti cibi laborare incipit ventriculus, irruunt in illum succi prauis, in quacunque parte corporis sint, & inde ob partis naturam grauissima cient mala, & cor & cerebrum in magnas compassionēs trahunt. Ad hanc curationem accurrunt gregatim medicæ, atque ut sunt officiose sepe conferunt, manibus oleo intinctis ventrem subigentes, admoventes cataplasmatallaxantia, & ventres crebros clysteribus, & grandulis, deglutire cogentes semen botmini, aut psyllij, quæ curatio non est noxia, nisi prout datur (quod illis nonnunquam faciunt) ad venenosâ, ut haustam cerasam, aut argentum viuum. Hæc videt medicus, simulque capiti & neruis moderatis insunctionibus, & idoneis fustibus prospiciat.

Aristionis serua pes spontè sphacelatus est secundum medium pedis interius ex obliquo, & ossa putrida abscesserunt, & paulatim exibant fistulosa, & diarrhœa successit, mortua est.

Sphacelus est osium corruptio, a *sphacelo*, hoc est, sine occasione aliqua externa significat in corpore pessimum apparatus. Talem ergo cum hæc mulier haberet, mortua est: non sanè ob pedis corruptionem (facilis enim est, vel totius pedis tædura) sed diarrhœa facta est, malignis succis ad internâ conuersis: ac fortassis etiam huic diarrhœæ ex malignis succis dysenteria successit, quæ ab atrâ bile lethalis est.

Mulier sana & crassa, cum medicamentum concipiendi gratiâ haurisset, ventris dolore & intestinorum torminibus afficiebatur, & intumuit. Spirandi difficultas aderat & perplexitas cum dolore, & sanguinem non multum vomuit, & exanimata est quingites, ut mortua esse videretur, nec vomitu ex aquâ frigida factò dolor præsens aut spirandi difficultas remittebat. Aqua verò frigida amphiora circiter triginta corpori affuse sunt, & hoc solum conferre sanè videbatur, & postea bilis copiosa deorsum prodijt: urgente autem dolore nihil poterat secedere, & vixit.

Quæ crassæ sunt nimis, esset solent ad conceptum ineptæ, ut dicitur apborismo 46. quintæ, quia omentum illis os vteri comprimit. Mulier ergo hæc, de qua historia narratur, talis cum esset, cu-

rationem suæ sterilitatis requirebat, atque cum extenuante victus ratione vii deberet, vt gracile fecerit, medicamentum expurgans accepit, quasi ob cacochymiam concipere non posset, atque ita non potuit res bene cedere. Tamen non mortua est. Cum enim sana simul esset & crassa, difficulter tulit purgationem, quia sana quidem, iuxta aphorismum 36. & 37. secundæ sectionis: quia crassa, multo magis. Crassa enim admodum corpora non possunt esse fluida. Vtque etgo causa euenit difficilis expurgatio. Solent verò vt dictis aphorismis dicitur, talia corpora collescere, & ob id extenuari, angi, ac debilitari, & tormina intestinorum pati, ipsi medicamentis, & praua bile, quæ collescentia gignitur, mordentibus intestina. Hæc eueniunt huic, ac præterea ob angustiam viarum circa vterum, & compressionem oris eius, maxima strangulatio ex vtero, accurrentibus succis ad partes circa vterum, & tumefacientibus ibi consistentia vasa. Unde accidit tumor, & spirandi difficultas, tum ab ipsis succis liquidis neque facile exeuntibus, tum vel maximè à flazibus, qui vterinam affectionem mox sequuntur. Et perplexitas cum dolore (hanc enim perplexitatem patit anxietas, & anxietatem debilitas) & exanimata est quinquies, vt mortua esse videretur, vt scilicet solem sæpe mulieres ex vtero. Accidit etiam sanguinem vomere: quod sanè corpori sano pharmacum expurgans accipienti non sine causa euenit. Nam, vt Galenus dicit in commentario eius aphorismi, cuius his facta iam mentio est, medicamentum proprium succum trahere appetens, bilem nempe flauam, vel atram, vel pituitam, vel aquosam superfluitatem, quia isti non adsunt, sanguinem colligat, colligatur verò non potest quin calfaciat, commoueat, & exagitet. Hinc ergo euenit epuim, aut per alium rei: nam & in superpurgationibus solet post alios succos excerni. Purgatio verò in corpore sano à principio est quasi superpurgatio, cum inutiles succi non adsint. Passio ergo hæc difficillima has habebat causas. Curatio verò etiam fuit notata dignissima. Data est ei aqua (ita vt sit cum deuorato pharmaco timemus) ad vomendum. Hippocrates fane dabat in hunc vsum frigidam, sed plurimam vt vix toto ventrè capi posset: nos tutius putamus dare pauciores, sed tepidam. Vomebat ergo ab aqua, sed neque remittebat dolor præsens, id est qui instanter vrgebat, neque spiratio: hoc est, difficilis respiratio. Non (arbitror) quod vomitus non esset utilis (tam quidni?) sed quod esset minus debiliusque auxilium quam pro tanto malo. Corpori autem effusæ sunt aquæ frigide amphoræ circiter triginta. Res mirabiles, & quæ nisi à generosissimo medico tentata nunquam fuisset, capit enim amphora congijs octo, & congijs sextariis sex, sextarius vncias viginti. Tantam ergo aquæ copiam in præfocatum ex vtero, quis nisi Hippocrates, aut alius nobilissimus medicus, affudisset? lauit, arbitror, medici ausus, quid hoc solum prodesse videretur. Sed dices, quo pacto prodesse poterat, cum vterina præfocatio passio frigida sit, Galeno auctore non de compositione secundum genera? Certè eandem ob causam, ob quam febres nonnunquam calida auxilijs causam tollentibus curantur. Quamquam ergo vteri præfocatio calorem naturalem extinguat, aliquando ta-

men à nimio aestu succos colliquante incipit, fluxione scilicet ita in vterum, vt in partes alias solet, concitatur. Ita vidimus plurimas in ætate media vi æstus præfocacionem vteri pati ex colliquatione succorum, vt coniectamus. Ita huic ex colliquatione, caloris vi factum est malum. Talibus verò constat refrigeratione succurrendum esse. Calidior enim colliquescentiam auget, atque ita & præfocacionem, vnde consistat non vnicum esse rationem succurrendi hystericiis, neque indistinctè calidioris esse succurrendum eis, vt vulgaris praxis fert, sed adhiberi debere in considerationem causæ speciem, vt in alijs omnibus affectionibus, quæ ex succis pendunt. Hinc itaque commodè affundebatur frigida, & ad prohibendam colliquescentiam. & ad renouandum animum (vt solet ijs qui animo linquantur) & ad sustinendum sanguinis motum. Ita enim innare solet eos qui fluxu sanguinis vnde cumque laborant. Res ergo optimè successit, refrigeratione est recreata facultas, & alius soluta, & bilis quæ vagabatur in aluum collecta, & inde excreta facilè (nam vrgente dolore nihil poterat secedere, & quis dolor trahens ad sese detinebat, & quia partes refugientes dolorem non sese contringebant satis, vt expellerent) sedatus ergo dolor, & expulsa bilis est & vixit. Quam periculosa fuerit expurgatio hæc, satis indicat dicens, *3. libro, 1. vixit*, dicit enim velut insperatam quiddam. Quapropter admonendæ acriter mulieres sunt, ne delidendo probris quidvis facientes se ipsas perdant, aut morientes cib, quæ fortasse postea peperissent, aut acris plurimis morbis miscere vuant. Est enim hæc plurimarum petnitias. Neque tamen proinde vego, esse talium idoneam aliquam curationem (dicauit enim ei Hippocrates opus proprium, cui de sterilibus titulus est) sed ne quidpiam faciant sine consilio docti cuiuspiam medici & viri boni consulo. Quæ res profecto ab animi moderatione debet incipere, vt scilicet illæ ita se comparent, vt parere non plus satis exoptent, sed intra rectæ rationis finem Medicus causarum, quæ multæ ac variz sunt, facta diligenti dignotione, nihil consulat, nisi quod magno perit non possit obesse. Hæc verò requirat ab Hippocrat. Sed & ego alibi in hoc ipso opere, de causis & curatione sterilitatis egi compendariè.

Angander ex medicamento deglutito in ceteris sanus erat, verum circa vesicam dolore quodam affici videbatur, quæ celeriter multo recremento expurgata est, & à meridie dolor admodum vehemens tenebat, & in posteram diem strangulatio, & perplexitas, & iactatio & vomebat & nihile gerebat & noctu mas se habebat nec somnum accedebat. Postridie verò multum egerebat, postremo sanguinem, & mortuus est.

Ecce aliud exemplum purgationis difficilis, non parum priori simile. Verum hæc mortuus est, quia colliquatio ad ipsas vsque partes citissime processit, & ita inemendabiliter læsæ sunt plurimæ par-

tium internarum, primum quidem vesica, deinde ventriculus, tandem totus venter, quin etiam fortasse hepar. Euenit verò illud pessimum in hac expurgatione, quod nihil fecit tardius, quam illud cuius gratia susceperat. Nimirum primum mouit vrinam, deinde vomitum, postremo deiectionem, cum contrà oportuisset. Finit verò huiusmodi præpostera opera, cum natura non vitaret medicamentis, sed ipsa, quia corrumpuntur, contra naturam operantur. Antander ergo ab accepta potione purgatoria, cætera nihil mali sentiebat, circa vesicam verò videbatur habere dolorem. B Purgata mox illi est vesica, & magna purgatione: hoc est, excreuit indemoluit quiddam & crassum, quod haud dubie erat ramentum vesicæ, quod aperte indicabat in partes ipsas procedere colliquescentiam, & à meridie dolor magnus ipsum tenebat, secundum exulceratam scilicet vesicam, & in postera diem strangulatio, & perplectitas, & iactatio ob anxietatem, & vomebat, & nihil egerbat. Quoniam verò vomebat, & nihil egerbat, constat strangulationem, & anxietatem ex ventriculo esse. Et nocte male se habebat, & somnus non accedebat. Nam quomodo potuisset dormire cum tanto dolore, debilitate, & anxietate? Postridie iam egebat multum, procedente malo in intestina, & postea sanguinem etiam, hepate arbor iam debilitatò, & deponente sanguinem. Vitiatis ergo iam tam multis internarum partium, mortuus est.

Athenade puero masculo phagadena laboranti, doluit à sinistris dens infernus, à dextris supernus: huius auris dextera supparata est, cum iam non doleret:

Non narrat qua parte haberet puer hic phagadenam, hoc est, vlcus exedens: quacunquē autem parte haberet, prauo succo vti inde significabatur. Qui verò ira affecti sunt, facile multis inflammationibus laborant, & multis partibus dolent. Hic doluit dentibus, superno à dextra parte, & inferno à sinistra, liberatus est deinde à dolore, permutatione facta humoris in aurem dextram, quā suppuraui, cum iam cessasset dolor dentium. Certe à dentibus ad aurem, & ab aure ad dentes cerebrum permutationem, & facilem compassionem esse experimento quotidiano constat: causam esse suspicor in communibus nervis. Porro enim quinta coniugationis, eorum qui ex cerebro oriuntur, quæ in porum auditorium se inserit, miscetur quā maxilla dearticulatur cum portione tertiæ coniugationis, quæ inseritur in radices dentium & gingiuas. Finit autem abscessus, ut dicebatur libro secundo, sessione prima, per venas, aut ossa, aut nervos. Quod autem in sola dextra aure facta sit suppuratio, significat dolorem dentis dexteri & superni ex maiori fluxione pependisse, quàm sinistri & inferni: & hunc discessionem, illum non sine abscessu solui potuisse.

Stor in Pyrio solca veteramentaria sua supugit seipsum supra gens in femur, & subulam ferme ad viginti longitudinem immergit. Huic nullus quidem sanguis effluxit, verum vlcus cito coinit: femur autem totum in tumorem eleuabatur, & tumor extendebatur usque ad inguen & inanem partem. Hic tertia die mortuus est.

Vlcera omnia iuxta articulos præcipue grandiores, ut genu, & cubitum sunt periculosa, & vlcus omnium punctura maximè, & ex quibus recentibus sanguis non effluit. Quæ omnia misero huic homini accidere. Afferunt verò hæc omnia idem periculum, conuulsionis scilicet, quia ad articulos multi nervi & tendines sunt, qui vulnerantur. Et punctura ipsi facilius infirmantur, & minùs expurgantur, quàm isti aliter. Et quum sanguis non effluit ex vlcere, cum necessario ad vlceratam partem conuocetur, necesse est phlegmonem fieri. Hæc verò verum occupantia mox afferunt conuulsionem: præcipue cum nervus aliquis insignis magnitudinis pungitur alius. Tunc enim per continuatas, fibras necesse est, inflammationem, & tentationem produci vique ad nervi exitum, indeque & vique ad cerebrum: unde communis corporis totius conuulsio, & per conuulsionem cito mors venit. Velut huic, cui nervus alius fuit punctus, cum ferme ad digiti longitudinem immergeret in crus acum. Sunt verò illic pluri nervi, insignis magnitudinis omnes, præcipue is qui ab anatomicis dicitur quartus moventium crura, qui maximus est omnium nostri corporis, & conflatus ex quatuor serie procedentibus, vigesimo quarto, sexto, & septimo, & octavo eorum qui ex medulla spinæ nascuntur. Hic decurrit iuxta genus inclinans ad partem posteriorem. Hic potuit pungi, & sanè alie satis. Quod factum esse, & ob dolorem phlegmonosum alie affectum nervum usque ad eius radicem, dolor ille declaravit, qui totum femur, & inguen, & inanem partem attingit vique ad spinalem medullam: unde malo translatò ad cerebrum, contigit conuulsam mori tertia die: miraberis, quod tam cito, tamen & tetanum esse morbum quatuor dierum Hippocrates docet. Hic habuit magnam apparatus morbosum, quem maximam mali causam fuisse suspicor. Videns nullo sanguine exente puncturæ osculum mox obstruati, vulgaris homo contempsit, neque venam mox fecit, neque vlcus dilatare sibi poposcit, ut oportuisset.

Quidam iuxta inguen sagitta percussus, quem nos vidimus, maximè præter opinionem servatus est. Neque enim cuspi, expta est (erat enim admodum in profundo) neque hamorrhagia vlla fiebat mentione digna: neque phlegmone aderat, neque claudicavit. Nos

autem cuspidem inuenientes exemitus, cum sex iam essent anni, ex quo percussus erat. Suspicio autem erat hac, inter nervos occultatam fuisse cuspidem, nullamque venam aut arteriam dissecatam esse.

Res est certe hæc admiratione digna, & in qua naturæ vim maximè possis laudare, quæ cuspidem sagittæ, aut sphetula plumbea in alto manente, vlcus obducit cicatrice ad cutem, & circum circa ipsam cuspidem, aut spherulam facit etiam carnem sanescere, ut sine cortosione, aut putrescentia, aut plegmone, multis etiam annis, ac totam vitam petriisset. Tamen non est tam ratum ac mirabile, sæpè enim evenit. Causam verò quo admirationem deponas, Hippocrat. reddit dicens, fieri id, quum evenit inter nervos, & venas, & arterias delatescere, ut nihil illorum disrumpat. Cato enim sola decissa facile sanescit. Profecto multò minus inopinabile est, telo aliquo tali interitus concluso, sanescere vlcus, quàm si quid olei aut pinguedinis, aut quæ sordidit maneret. Illa enim sic facta sunt, & putrescere inepta, ac proinde neque curationem admodum impediunt, neque computrescunt. Neque tamen solet natura alienum illud pondus contemnere, sed semper pellex extorsum, ad curam facit paulatim abscedere, hancque procedente tempore tantopete extenuat, ut minimo negotio excidatur, extrahaturque ita cuspidis, aut spherula. Quin etiam fortasse si dimittatur, ipsa sibi cutem exulcerabit, ac exhibet ut factum sæpe videmus, quum quid decissi ossis sub sana cute relictum est. Habet hic euentus peculiaris admirationem, quodd alius iuxta inguen percussus sit homo. Est enim proximus articulus maximus, & magnus congressus venarum, arteriarum, & nervorum in crus subeuntium, ut satis peritus videatur futurus dissector, qui manu, illis omnibus illigis, cuspidem in alto collocaverit. Verum nonnunquam affert casus, quæ vix afferte posset providentia. In spatula sanè aut medio femore, aut clune, aut etiam medio brachio supra cubitum expectare quis posset hanc felicitatem, verum in cervice aut inguine rarissimè, ac proinde maximè præter opinionem non solum vulgarium, sed & medicorum. An Hippoc. hunc viderit recens percussum; ipsumque etiam ut alios chirurgos latuerit cuspidis, quam ipsemet post sex onnos exemitit, an solum cum multo iam tempore cuspidem interius continuisset, ipse accesserit, non satis constat ex narratione. Suspicio cum dixisse, quem nos vidimus, ut iniquaret se plurima huiusmodi audisse, vidisse hoc solum. Omnibus enim nobis ita evenit, atque ita est naturæ comparatum, vtharum rerum, quæ admirationis granià narrantur, audiantur plurimæ, videantur paucæ.

A in posteriora tractus, velut si qui posteriore corporis parte convelluntur, & maxillæ confictæ erant, atque si quid humidiore reciperet, idque deglutire conaretur, rursus relidabatur in nates: statimque reliqua exacerbantur & secunda die mortuus est.

Hic percussus est inter spatulas, paulò infra cervicem, iuxta ipsam spinam. Constat ergo transfixus esse in suo exortu duos, eosque maximos musculos, moventes caput retrosum. Otuntur enim illi à quinque primis vertebis dorſi, & duabus ultimis cervicis, & implantantur in occiput. Merito ergo illi telo acuto transfixi, convulsi sunt, si, ut est verisimile, corpus erat plenum, & immunum: atque illis convulsis, necesse fuit caput & cervicem retrosum trahi, fierique hominem opisthotonicum secundum eas partes: convulsione verò serpente in partes proximæ, confictæ sunt maxillæ, ut non possent aperiri, convulsis muscularis claudentibus maxillam inferiorem (superior enim immobilis est per se) reflexa verò retrosum cervice cum capite, necesse erat impediri deglutionem. Comprimatur enim eo modo gula. Vnde fiebat (velut quibuscunque impedita est deglutio) ut siquid conaretur bibere, relideretur in nates, & ob eum laborem, reliqua omnia exacerbarentur: homine scilicet hinc strangulationis periculum subeunte, & sanguine in caput magis occurrente. Hic verò die secunda ab ulcere mortuus est. Neque immerito, cum valde lethalia signa prima die acciderint. Velut enim si quæta fierent, septima timeremus agrotò: ita cùm prima sunt, altera, aut etiam eadem die merito timeamus. Nam supervenientia signa, siue salutaria siue lethalia, si citò apparent, morbum contrahunt: si tardius, producunt. Itaque dicens non multo tempore post extracto telo distendebatur, eadem die intelligit. Neque verò quod extractum est relapsum, convulsus est homo, sed quia percussus. Neque enim vulnus erat, ex quo sanguinis, aut spiritus copiosum aliquod profluvium fieri posset, & ipsomet telo, quod infixum esset, cohiberetur. Non enim vulnus in profundum, & in ventrem aliquem penetrabat, sed exiguum erat, & externum. Factum est autem adeò lethale ob locum, & apparatus, quem in corpore esse contigit.

A Doleſcens qui pro viam asperam properaverat, caloris dolore affectus est, maxime parte inferiore. Abscessum autem nullum recepit pars affecta, velut humorem connoceans, sed quartà die tota demigrata est, usque ad tali os quod Astragalus dicitur; & canitatem quæ est sub planta pedis, nec quod demigratum erat disruptum est, sed prius interiit. Post cursum autem vixit diebus omnino viginti.

Qv i iaculo acuto percussus est in posteriorem partem paulò infra cervicem, vulnus quidem accepit aspectu nulla mentione dignum, non enim in profundum penetrabat, paulò autem post extracto telo distendebatur

Quam periculosus sit malus corporis apparatus, & cacochymia in corpore latitans, hinc discas apertissime. Vnde enim, qui mediocritatem bonorum succorum haberet, nihil contraxisset mali, præter exiguum fortasse dolorem (sola quiete solvendum, qui verò multitudinem bonorum, aut etiam non omnino malorum, podagricum aliquem dolorem, aut timorem non malignum: hic quod malignos succos congefisset (neque enim poterat aliter fieri) contraxit mortificationem, die quarta à cursu (quod magis mirere) nullo prægresso tumore, ut videretur succus ad partem conuocatus. Vnde quid coniectes aliud, quàm hominem non tam multitudine, quàm maligna qualitate laborasse? Habuissetque interius intra viscera latitans virus aliquod veneno proximum, quod in eam particulam (dolore præstante motus iustium) depositum est: Non expulsum autem inde, veneficam vim in cor refluxit intra viginti dies. Hoc quoque est evidenti argumento (quod Galenus vltimo de locis affectus multis confirmat) posse, atque ad eò solere, intra nostra corpora gigni veneno similia excrementa, atque posse aliqui multo tempore latere, donec aliquis occasione commota, repentinò afferant casus. Vnde qui sapit maximè cauebit prauis succi cibis uti, neque confidet, quòd nihil mox sibi sentiat mali accidere. Si enim venenum latere potest, quòd magis succus aliquis prauus? Quin potius à talibus solent homines oculis lædi. Quæ enim sunt coctu difficilia, aut tardè descendentia, aut statuosa, aut impensè calida aut frigida, hæc statim lædunt, quæ verò citra hæc omnia sunt mali succi, statim nihil vitiosum faciunt, paulatim verò malis replent, & in periculoso statu corpora constituunt. Dierum decretiorum vires etiam in hoc ægrotò obseruari possunt, siquidem quarto cepit denigratio, & mors vigesima. Verùm perpeòde vigesimum notasse Hippocratem à cursu, quia quòdunque malum ab externa aliqua, & vehementi causa incipit, inde accipere principium motus est consentaneum, & inde computatio debet incipere, ut à partu ab ulcere, à casu, à dolore. Quod si vtriusque computationis rationem haberi vis, mortuus est vigesima à cursu, decima septima à denigratione.

Quæ circa oculum percussus est, in palpebra quidem vulneratus est, cuspis autem altè penetraverat: Gena verò tinnibat: scdâ palpebrâ sublata sunt omnia, nihil vitiatum est oculus enim permansit & celeriter conuulsus: sanguis autem secundum plenitudinem copiosè profluxit.

Puncturæ profundæ nulla ratione melius curari possunt, quam discussa parte, ut pro punctura vitæ longum, patensque fiat. Porro in viceribus recentibus nihil magis est ex usu, quàm ut sanguis effluat sanguine enim fluente, ut lib. de viceribus dicitur, gracilescunt, ac minores, hoc est, minus inflammantur, & citius sanescunt. Hæc punctura fuit haud dubie in palpebra inferiori deorsum, cuius causâ gena è regione puncturæ intumuit. Verùm oculus ipse nulla parte ictus est, sed extrorsum, ac

A deorsum punctura decurrit, & curatus est, ut oportuit, scdâ secundum longitudinem puncturæ palpebrâ, & ex sectione, ac fortasse ex recens acceptâ puncturâ sanguis exiit largiter, ac multum. Quæ tum verò momentum habeat hoc ad salutem. Inde intelliges, quod hic oculo altè punctus faciliè sanitari restitutus est. Sutor verò soleas veteramentarias ligens, qui se ipsum pupugerat supra genâ, cui nullus sanguis effluxit, mortuus est die tertia. Cæterum variant interpretes in explicatione horum verborum *si diu, non moritur*. Quidam enim pro *si diu* legunt *si diu* quod significat extremam sagittæ cuspidem, quæ altè subintrinemat. Qui *si diu* legunt auctore Helychio vertunt ignem & inflammationem, ut sensus sit partem inflammatam ad eò inueniuisse, ut superemineret. Quo sensu Vallesius de genæ tumore interpretatur, rem potius quàm exactam verborum significationem scdâsus.

C *Virgo illa pulchra Nerei filia, annos quidem viginti nata, à muliercula amica ludente larâ manu percussa est secundum sinuiput, & tunc quidem vertigine tenebrosa correpta est, & respiratione priuata, & cum in domum venisset, statim febris eam vehemèns corripuit cum capitis dolore & faciei rubore. Septimâ autem die per dextram autem prius prodiit fetidum, subrubrum, cyathò amplius: & melius se habere videbatur & subleuata est. Rursus intendebatur febris, & in somnum deferrebat, nec loqui poterat, & faciei pars dextra traheretur, difficulter spirabat, & cum tremore conuellebatur, & lingua cohibebatur, & oculus stupidus erat. Nonâ mortua est.*

E Debilissimam partem capitis esse sinuiput, Hippocrates dicit libello de vulneribus capitis, cerebrum inquit & cutissimè, & maximè iusta sinuiput sentit mala, quæ & in carne & in osse sunt, sub tenuissimo enim osse, ac modica carne cerebrum est hac parte, & plurimum cerebrum sub sinuipute iacet. Exemplo certè evidenti est hæc virgo, quæ nonâ die obiit ex ictu quem larâ manu accepit secundum sinuiput. Porro euenit quibusdam plus, quibusdam minus esse hanc partem debilem. Hanc certè putandum est fuisse uarâ debilissimam. Concussam enim & compressum est cerebrum. Vnde compressione coniungente nervos opticos, qui sub lobis anterioribus cerebri perreptant, & concussione ventriculos cerebri, repetitè priuata est visu cum cerebri perturbatione (quam vertiginem tenebrosam appellant) & ob spirituum in cerebri ventriculis interceptionem, respiratione priuata est, velut carochia correpta, non tamen ea passio diu durauit, sed (ut fieri solet) ad se reuersa, domum iuit. Quo cum venisset, statim febre correpta est cum capitis dolore, & faciei rubore, quæ signa erant inflammationis in capite. Quam suspicionem euentus veram esse indicauit. Siquidem suppuratio tanta

subsequuta est, ut septima die exierit per aures dextram puris plus cyarbo (hoc est, sanguinis) nam dolorem, quem ictus fecit, conuocasse multum sanguinis rubor faciei declarabat: subsequuta vero est suppuratio, neque ea quidem bona, sed maligna, si quidem exie fortitum, & sabruram, quale est quod aphorismo 44 sectionis septimæ vituperatur, & fieri solet partibus, quæ contusæ aut inflammatae sunt, simul cum humore malignè putrescentibus. Exeunte vero pure, visa sibi est virgo melius se habere, depolita scilicet ea materiè malignè putrescentis portione. Verùm partes non manebant integræ, neque naturaliter dispositæ, sed putrescentes, & dolentes; & conuocantes fluxionem novam. Vnde meritis cunctis, ut citò febris intenderetur denique, & longè grauiora symptomata quàm prius, ut morti iam proximæ superuenirent, nimirum delatio in somnum, & conuulsio dextræ partis faciei, & tremores (hoc est, motus conuulsui) & apbonia, & dispnoea, & oculi etiam dextri stupor, seu immobilitas, seu rigor, utrumque lubet dicere. Certè hoc etiam erat eius oculi conuulsio. Hæc omnia pessimè iam affectum cerebrum, & ægotam esse moribundam indicabant ei, qui vel tantillum prognosticam artem calluerit. Conuulsionem superuenisse morienti ex ea cerebræ affectione, admodum erat consentaneum; etenim cerebrum radix sit ueruorum. Delationem illam in somnum ego quidem in tam extremo constitutus, per facultatis impotentiam fieri iam suspicor. Quem enim pituitæ motum prætexere poterimus, cum somnus remissio quædam sit actio, nam cerebrum, cuius virtus iam labat? Linguam quoque cohiberi indicabat conuulsio: dyspnœa hanc etiam & debilitatem. Facultate enim debili, & instrumentis veluti alligatis, aut reuulsis, necesse erat difficultatem magnam oriri, ac necessitate cogente vix vi respirare. Quod conuulsio retinuerit dextram partem, ex affecta parte ortum est. Nam dextram partem capitis huic præcipuè affectam esse, & doluisse, exiens etiam indicauit à dextra aure pus. Id accidit, quòd casu percipientis manus in dextram partem grauius incubuerit, vel quòd eam partem mulier habuerit paratior. Sed mirabitur quispiam meritis quo pacto fieri potuerit, ut hæc non deliraret: aut si deliraret, cur id Hippocrates tacuerit. Ego sanè non possum mihi persuadere, cum iam in extremis constituta esset, eam virginem mente consensisse: Verùm fortasse id lauit per delationem in somnum, & apboniam. Primitus vero diebus etsi teneretur inflammatione cerebri, & partium circum circa consistentium, existimo fieri posse, ut non deliraret. Nam quamquam phrenitidis essentia à Galeno in cerebri & membranarum eius inflammatione ponatur, atque adeo plurius phrenitidem in membranas rejiciant magis, scimus tamen non semper delirari his inflammatis. Vidimus enim in capitis fracturis membranas, præcipuè duram inflammari conspicuè, atque adeo suppurari, postea & frustratim extrahi, homine non delirante. Vnde mihi persuasi, non quancumque cerebri, aut membranarum inflammationem esse phrenitidem, sed eam per quam penitusque partes cerebri in quibus mens sedes est, in utrumque succumbat. Ut hec nobis hic, Hippocraticam phrasim vsurpantes dicere, foccos etiam facientes phlegmonas in cerebro, vergere nunc ad corpus, nunc ad animam: ad cor-

A pus quidem, quum exteriores potius tumet partes: ad animam, quum interiores sunt imbutæ. Huc respiciens Paulus seorsum scribit de phrenitide, & de cerebri inflammatione. Quasi hæc siue phrenitide fieri possit tanta, ut cerebri tumor faciat debilitate commissuras. Hæc itaque virgo vix eam erit, quibus ad corpus vergit malum, ac proinde conuulsiones, quæ corporalia sūt symptomata, habuit potius quàm deliria, quæ animalia sunt, vitia dicuntur. Quid fuerit huic factum, non narrat. Timeo ne non fuerit missus sanguis quantum oportuit.

B

*C*leomenis puer hyeme cibos fastidire cepit, sine febre emaciabatur, & vomebat cibos & pituitam: duobus mensibus fastidium persequerantur.

Non videtur hæc narratio perfecta, sed lacera, & mutila. Neque vilo modo suppleri potest quod deest. Proinde id solum superest ut videamus quam habuerit causam. Certè & à pueri, & ab hyemis natura satis alienum est fastidium, quin & à pituitosa dispositione. Hæc enim cibi capiendi necessitatem, cupiditatem verò non solet tollere. Quin potius solent pituitosa dispositiones facere, ut appetatur plurius coqui possit. Et fames quædam canina ira fieri consuevit, refrigeratò ventriculo. Cæterum etsi horum singula, puerilis scilicet natura, quæ vorax est, & hyems per quam plurimum solet capi alimenti, & morbus pituitosus ventriculi, augere soleant appetitum, omnia simul eandem augentia intemperiem, merito ipsum etiam appetitum corrumperunt. Omnis enim immoderantia nimia tollere potest actionem quancumque. Nam ex ipsa nimia fame, credente eadem affectione, fit hūmilia, per quam iam ne appetitur quidem. Pueri etsi natura calidi sint, tamen ob humiditatem naturalem, & ob voracitatem, sunt passionibus pituitosis opportuni. Hyems augere solet calorem ventris, frigidis vero valde, siue naturaliter, siue præter naturam, auget frigus. Verisimile est ergo, hanc naturam non admodum calidam, victu prauo factam esse frigidam & ab hyeme auctam eatenus esse passionem frigidam, ut non solum retinere, sed neque appetere posset. Fuit verò puero ipsummet symptoma morbi curatio. Nimirum euacuata per vomitum multa pituita, moderatior est facta intemperies, & cepit appetere.

D

*E*ssus panis, à balneis abstinere, & fricari leniter, fouerique non cum multo fomento, sed mansuete.

F

*C*oco in spina gibbositas ex phrenitide facta est. Huic nulla potio pharmaci conferebat. Vinum autem nigrum profuit, & esus panis, à balneis abstinere, & fricari leniter, fouerique non cum multo fomento, sed mansuete.

Gibbositates sunt ex quibusvis morbis acutis, abscessu factò in ligamenta vertebrarum spinæ, ut scilicet in alios articulos fieri solent: ex phrenitide autem fieri, peculiarem habet quandam causam: quia spina rectitudinem habet cum capite, cuius

phrenitis est morbus. Itaque ex phrenitide gibbositatem superfluisse non habet magnam admirationem: aliquando autem maiorem habere videtur ratio curandi, quam Hippoc. docet. Si enim verum est, ut Galen. docet c. 7. 4. de locis affectis, gibbositates laxatione vertebrarum fieri: laxationis vero earum tantum duos esse causas, idem, casumve (denique causam externam) aut tubercula in eorum ligamentis orta: cum huic citra causam externam sit facta gibbositus, erit sane ex tuberculis. Hæc verò cur iuuatur vinò nigro, & esu panis, cibis sanè crassis nocet: cur reculantur balnea, & copiosa fomenta? Certè mihi videntur gibbositates non eas solum causas habere posse, quas Gal. dixit, sed omnes quas laxationes. Corstar verò aliorum ossium laxationes fieri, non solum eaulis è suis locis ossibus ob contractionem ligamentorum, sed etiam ipsis articulis factis laxipulis, ligamentorum emolliatione: Velut enim succus, qui in nervos incidit, nunc cognulionem facit, nunc paralytism, ira qui in ligamenta, nunc contrahit, nunc laxat. Alterum quidem auellit, alterum facit loco exidere ossa. Vtrumvis horum fiat in ligamentis vertebrarum, necesse est gibbositates superuenire. Hunc curatio indicat laborasse mollietie, & laxitate ligamentorum, adiutus enim est victu solidiori pane scilicet & vino nigro moderatè sumptis) & curatione sicciori, frictione scilicet sine balneo, & fomento non copioso: nec copia molliet, sed qualitate resolueret, ac siccat. Panis certè est: cibus qualitate omnium moderatissimus, si ex optimo sit tritico, tamen firmus & solidus, ac proinde non resoluens. Vinum quoque nigrum nutrit solidius, & nervos tentat minus, ut potè minus penetrans, & fluxiones minus ciet, ut minus teneat. Quod verò dicunt vulgo, esse humidius, falsum est, si cum albo tenui oligophoroque conferatur, ac nisi cum acri: verum est, solere esse minus siticulosum quod nigrum, quam quod album: Id verò fit, quia est crassius, & eius humor magis manet. Velut præsana sicim magis sedat, etsi humidior quam aqua non sit. Itaque ubi partes adstringere, & formare opus est, nigrum quam album est commodius. Nam & laxam aliam firmari ab eo sentimus. Frictio resoluit, siccat etiam partes: balneum resoluit succos non minus, ipsas tamen interiorum partes emollit. Proinde huic optimè consilium est frictione sine balneo. Fomentum quoque, quod resoluendi succos gratia, & laxandi partes admouetur, copiosum sit: tamen quod gratiè siccandi, facultate possit plus quam copia: Sed dices præter rationem esse, ut pharmacum nulla potio conferret, cum id vitium ex præuo succo ligamenta occupante penderet. Non quia Hipp. dicit hunc nulla pharmaci potione adiutum esse, oportet intelligere, ad has passionem inutilia esse pharmaca: non enim hoc dicit Hippoc. sed narrat hunc non esse adiutum, quamquam iuuati alij quam plurimi ita affecti soleant. Considerari ergo oportet, cur quidam non iuuentur, cum soleat pharmacum in ea affectione esse velle. Qui morbis quorundam partium ex materia vitiosa pendebus laborant, iuuantur pharmacis, tunc maximè quum cacochymia totius corporis fouet affectiones, quæ sunt in parte: cum vero iam succi in parte firmati sunt, & reliquum corpus purum, particularibus auxilijs, & bono victu, & temporis beneficio fidendum potius est. Cor-

A pota enim talium, vitiose sana, malè ferunt purgationes. Quod impactum in parte est, non cedit: quo fit, ut multi horum lædantur pharmacis, quod facultas debilitetur, & morbus non remittat. Tale quiddam est consentaneum huic Caco accidisset cum laborasset phrenitide, & ut in ea dispositione solet, corpus missione sanguinis, & expurgatione, aut iudicatorijs excretionibus vacuatum esset, & ita reddidit purum; reliquis vitiosis succi sola ligamenta vertebrarum occupasse, & factum esse gibbosum, ac proinde tulisse malè expurgationes tantum verò fuisse corpus nutrire pane & vino, quod corpus non simul exgroceret, sed, ut est verisimile excretiones fierent similes sanis. Hæc eadem historia repetitur lib. 7. & ubi hic dicitur fricari leniter, dicitur illic, inurgi, & inunctum fricari. Ego eandem rem censo vtrobique dici. Quia inunctio facit frictionem lenem: sicca enim aspera etiam est. Ne igitur asperitas frictionis fluxiones viles commoneret, satius fuit fricari lenem, atque ut lenis fieret, prætere inunctionem.

C Vidam quæ vigesimum ætatis annum agebat, & pharmacum corruptorium biberat, contigit dolor, & vomitus biliosorum multorum, pallidum, & porraceorum. Quum bibisset, consilio corripiebat, linguam mandebat. Cum circa quartam aduenissem, ipsi lingua erat magna & nigra, oculorum verò album rubescebat, insomnis erat. Quarta die mortua est sub noctem.

D Incurando adstringebat Hippoc. suos discipulos, ne cui darent medicamentum subditiuum ad perendum factum. Longè cum maiori periculo dabitur pharmacum. Proinde quæ qualiave sint hæc, dicere non licet, si quidem neque eis vquam vi. Illud vnum dicam, (quod deertere potius quam allicere potest) omnia quæ verè ac propriè sunt corruptius, venenosa esse, vtrumque autem factum ejiciant, esse vehementissima & periculosissima: quo potius corporis apparatus, non dicam, ne incautè modum utendi talibus doceam. Quantum periculi in eis sit, vel hæc puella indicat, quæ cum viginti esse annorum, sustinere non potuit, sed quartà die cum symptomatis quasi accepti veneni periiit. Libro septimo narratur rursum hæc eadem historia, & est illic aliquantò copiosior narratio, quia narratur vomuisse cum poraret, non solum poracea, sed etiam nigra. Narratur etiam consilio non die tertia accidisse. Sed variat in eo quod hic legitur *ἐπεὶ δὲ ἐλατὴν τῆς ἀνίας ὑπερῆκεν*, illic verò *ἡ ὑπερῆκεν τῆς ἀνίας*, ut significet vel trigesimo ætatis anno hantum fuisse medicamentum factum corruptens, vel trigesimo conceptionis die. In quibusdam codicibus post hanc historiam scripta occurrunt hæc verba: *ορίαντων ποτὺν οὐκ ἴσθαι*, & denticibus: in quibusdam verò nihil est tale. Quare constat, aut ab aliquo esse præter rem interiectum, aut ab alijs quasi huius loci non sit, expunctum. Vtrumque hoc habeat, si quis expunxerit, rectè mihi videtur fecisse. Nam neque verum est quod dicitur, neque si esset, haberet hic locum. Repetitur occurrere libro septimo.

PUella quæ à rupe ceciderat voce est priuata, tacebat sese: & vomuit sub noctem multum sanguinis, qui copiosior effluxit à parte sinistra in quam ceciderat. Melicrætum difficulter bibebat: Stertor, spiratio frequens erat veluti moribundis. Vena circa faciem distenta erat, Jopina decumbebat, pedes tepescebant. Febris aderat remissa, & vocis interceptio. Septimâ vox erupit, leniter incalcescebat, superstes fuit.

Rarum quiddam & miraculo simile est, hanc euasisse puellam. Quia symptomata, quæ subsequuta fuere casum, læta esse membra, partim præcipua, partim ad vitam necessaria, videbantur indicare. Si quidem vocis interceptio repetita post casum, & à casu & vocis interceptione vomitus, lesionem insignem cerebri videbantur indicare. Copiosus sanguinis ex naribus, & ex ea parte in quam ceciderat copiosior fluxus, rupturam aliquam venarum: difficultas deglutitio & steror, tuberculum aliquod obortum ad gulam, & laryngem, quod strangularet. Vena circa faciem distenta, inflammationem firmam in capite: spiratio veluti moribundis; decubitus supinus, pedes tepidi, & febris debilis, quid aliud quam debilitatem extremam, aut maximam viscerum inflammationem significare poterant? Si quidem igitur mortuam dixisset, neque miraretur, neque causam inuestigantes laboraremus, sed cum dicat fuisse superstitem, cur fieri potuerit, oportet dicamus. Si hæc symptomata citra ullam causam manifestam apparuissent, merito medicus de salute desperaret, quamquam ne sic quidem valde confidete poterat, in tanto grauissimorum symptomatum concursu, nisi forte quia non est convulsionem passa. Hoc enim solum videtur mihi deuisse ad certissimum mortis præsensoem. Verum si ob solum internam causam, ut sanguinis raptum in caput spõrè factum voce priuaretur, & sterteret, neque posset deglutire, & vena circa faciem haberet distentam, quis non aliquam apoplecticarum passionum renere mulierem iudicaret? Atqui apoplexiam fortem, quæ citrà causam externam accidat, curari non posse inter medicos omnes conuenit. Galenus verò in fortibus poior eam, quæ aphoniâ habet cum stertore. Apoplexiam verò, quæ sit, ob externam causam, etiam in cæteris videtur esse fortis, solui aliquando posse indicat aphoniâ ex ebrietate, quæ si symptomata spectes, grauissima videatur apoplexia, soluitur tamen nonnunquam, qua hora solent solui crapulæ. Nimirum quod pender ex causa exteriori, soluitur cum ipsius exterioris causæ motus solui solet. Ut quæ ex ebrietate pendet, quæ solent solui crapulæ, sic hæc quæ ex casu, quæ solent solui, aut remittere labores ex plagis, aut contusionibus: plerumque, vocis septimanâ. Itaque consentaneum est coelere, huic nullam partium præcipuarum neque necessarium disruptam, aut laceratam, concussas plurimas, & sanguinem icm & dolore exiguam, magis verò secundum sinistram partem, secundum quam magnificata est, affatum sese sursum collegisse: quos mul-

Atinuam exiit à naribus copiosè, & ex sinistra magnis. Solutis verò doloribus & tensionibus partium ita laborantium, septimâ die loqui cœpisse, & melius spirare, ac cætera melius exequi. Ut si ob pedis contusionem incesu priuata, tunc remittere labore incedere inciperet, miraretur quidem minus affectionem, ut porè externam intruci, esset ratio eadem. Verum satius erit singulorum causas coniunctando percurrere. Repente quidem priuata fuit voce ex casu, ob concussionem cerebri interceptis animalibus spiritibus, & ob contusionem vocalium instrumentorum, ut musculorum lingue, aut neruorum recurrentium, aut utrorumque: & hæc omnia fuit auxilique redundancia sanguinis in partibus, tumidas eas & malè flexiles faciens: vomitus copiosus, & conuulsio ventriculo: steror & difficultas deglutitio, ob angustiam œsophagi, & viarum spiritus (quæ ob tumidas etiam venas accedunt) & motum difficilem musculorum gulæ, & eorum, qui descendunt in thoracem: decubitus supinus ob debilitatem, non in facilius essentia, sed quod facultatis animalis esset exiguus distributio in partes. Ita & frigus pedum, & febris debilis, quod sanguis non æquè effusus in partes, sed sursum collectus esset affatum. Laxatis intra septem dies partibus & lassitudine, ut ita dicam, remittere, septimâ (inquit) vox erupit, quod non sine magnâ conditionis energiâ dieti: quâvis enim modo aliquo constringerentur instrumenta, aut vinculis quibusdam nixu facultatis ruptis loqui cœperit, dicit vocem erupisse. At si quis (inquit) *ἀπὸ τοῦ τοῦ*, ne intellige leniores quàm prius (erant enim antea pedes tepidi, & febris remissa) sed calores leniores, id est, leues, quasi diceret, iam inde febribus laborabat manifestis, oendum tamen magnis. Et superstes fuit. Nimirum solutis laboribus supernarum partium, & calore ac sanguine æquè effusus, calore cœpit corpus, & ob obstructions non potuerunt inuegi perdurare facci, quare putruerunt, & febres acciderunt, ac febris quidem non omnino magna (maxima enim per se fuisse periculosa) inuit quia ipsa suam causam coofecit, ac ita superstes fuit. Puto autem quod nunquam superstes euasisset, nisi fluxisset ex sanguine tam copiosè, & solum melicrætum deglutisset: atque (ut fieri sæpe solet) ea fuit mulieri salutis causâ, ex quâ vulgares qui aderant maxime tranquillarent.

B

C

D

E

Pythocles agrotantibus lac multâ quâ permixtum concedebat. Ut perniciões dissolui, sepefacere oportet pedes hoc modo, præcipue calefacere igne & aqua. Oculis admodum noxia sunt, lent, fructus Autumnales, dulcia, & olera. Dolores lumborum, crurum, & coxæ ex laboribus abortis, aquâ marinâ & aceto calidis aspergere oportet, & sporigram imbutam, admanere: lanis verò succidatis & agnui pelles deligare.

Hæc quoque videtur interiecta, & nullo ordine posita: tamen non prætereunda cœsui, quia si omnibus codicibus scripta reperi. Neque sanè est quod admodum requiras ordinem in hoc libro, quo

perpaucæ præceptiones, sed observationes vroe-
currant Hippoc. scriptæ sunt. Quamquam videtur
ex loquendi modo, illud solum quod dediluto
lacte dicitur esse Pythochis, cætera dici ex Hippoc.
sententia, ego quidem suspicor, omnes has cura-
tiones esse Pythochis. Fere enim pleraque consue-
uerunt græci, præcipue qui breuiloquio student,
verbis infinitum narrare. Itaque perinde intelligo ac
si diceret, dissoluebat, tepesciebat, calcificiebat,
aspergebat; admovebat, deligabat. Non dicit qui-
bus ægrotantibus dabat Pythoches lac multâ aquâ
dilutum, insinare videtur crebrum eius vsum
homini fuisse in plerisque morbis. Fortasse vteba-
tur hoc pro victu: Nam libro septimo repetuntur
hæ curationes Pythochis, ibique ita legitur lac mul-
ta aqua mixtum dabat, & renouabatur. Quibus ver-
bis insinuat, pro alimento dari: tamen si ab Hip-
poc. didiceris notas lactis, quas fere vno aphorismo
collegit sexagesimo quarto quinquæ sectionis, vi-
debis peripateticis morbis congruere posse. Nam vel
tabescensibus, ad quos maxime commendatur,
non conuenit valde dilutum, sed aliter præpara-
tum, vt minus aliquid moueat, & minus acefcac.
Ego de lacte diluto non habeo aliud quod dicam,
quàm meo vni solere ad gargarismata, & oris col-
lutiones in febribus, ijs præcipue quæ fauces sic-
cant, & exasperant. Peritiones cutis refrigeratione
& denatatione fiunt, proinde calcificatione & laxa-
tione curantur. Nulla refacilius calefieri possunt ma-
nus aut pedes, quam igne. Verumignis calor non
adeo laxat, quin potius, si plurimum quis ignem
sustineat, vt exini incipiat cutis, eriem corrugatur
& adstringitur. Proinde meritis Pythoches cal-
cificiebat alternatè igne & aquâ calidâ. Calida enim
aqua laxat simul & bumediat. Quare igne calefa-
cientè, & aquâ laxantè ac vñsionem prohibentè,
dissoluetur, marena, laxabitur entis, & tempera-
bitur pars. Nec sanè sola aqua tepida agitur com-
modius (quamquam ea videatur vtriusque præ-
stare posse) quia cum ea valde molliat, nisi emol-
liti ignis siccitate corrigatur, manebit pars noxæ
ab ambiente aëre peropportuna, & occurfus illius
mox finditur, & afficietur grauius: quin & vñti
alternatè aqua & igne, etsi minus, non nihil peri-
culi inde est, ac propterea qui curatur nunquam
debet pannis duplicibus & mollioribus pedes exue-
re. Itaque peritionem curatio hæc mihi valde pro-
bat. Oculis noxia esse lentem, fructus Autum-
nales vel horarios, dulcia, olera, consonam etiam
est rationi: siquidem omnium horum sunt vapores
crassi, & soluti difficiles. Dulcia enim crassarum
partium sunt: olera verò ex aqua & terra leui
permixtione consistantiam habent. Lenticulam a-
ciem visus obtundere Dioscorides affirmat proprio
capite, crassam enim & stansam substantiam ha-
bet, vt alia fere omnia legumina, & plus etiam
quàm illorum plurima. Curare verò dolorem lum-
borum, crurum, & coxæ & vñs, hoc est, quum
dolor ex labore ac defatigatione ortus est, asper-
sione aque marine & acetii, & admodum spongiâ il-
lis imbuta, ac deligatis lanis succidis & agnibus pel-
libus, non semper probat, sed tunc solum, quum
frigida humiditasque intemperies cum succo est: aut
etsi ea intemperies in parte non sit, talis humor in
partem influxit. Nam marina calefacit & siccac, la-
næ etiam succidæ, & pelles agnium calcificant & di-

gerunt, acetum siccac, & facit marinas penetrare.
Qua facultate ad coxam præcipue, maxime est op-
us. Itaque est hoc vñum quoddam eorum auxilio-
rum, quæ ad dolorem coxæ, lumborum, ac crurum
commendari meritis possunt, nullum tamen
est omnino, quod ei curando vñicum possit esse sa-
tis, nam neque cuiuslibet nisi adhibeatur distinctio
causæ, & naturæ hominis.

B *Pythochi inguinum tumores exorti sunt
duri & sine dolore, & circa pubem & in
collo magnitudine similes. Febrys quidem præ-
cesserat lenta per tres menses, quarto venter
distensus est. Calores superueniunt. Lingua
sicca erat, sitis, deiectiones alui moleste. Mor-
tuis est.*

C *Plie ob prauum fortasse victum congestis mul-
tis succos frigidis, quorum redundancia debilita-
ta naturali calore factus est hydropicus, & ex hy-
dropice interijt. Frigidorum redundantiam facile in-
diciunt multi scirrhi, & magni in partibus adeno-
is totius corporis, vñ inguinibus, in pube, in
cervice exorti: sunt enim aut à melancholia, aut à
crassa pituita: quod est duplex genus frigidorum &
crassarum. His præfentibus, primum quidem
tertio mense facta est febris lenta, quales scilicet ex
crassis & frigidis fieri solent: mense quarto venter
iam distensus est, & lingua reddita sicca, & facta ma-
gnafitis, vt scilicet in hydropicis fieri consuevit.*

D *Calores etiam superueniebant, id est, præter eam
febriculam, quæ hydropicis comitatur cum sic-
citate lingue & siti, superueniebant aliquando era-
tione modo febres, aut oberratum in victu, aut ob
fortuito exagitatas aliquas crassarum succorū par-
tes. Accedit difficultas egerendi, quæ hydropicis
quidem superueniens, malum signum est: signifi-
cat enim humiditas omnes potius cibique partes, in
venis illam cauitatem aut in venas arterialesque
transfusi, & ob id fices arefcere. Quod cum fit, ne-
cessè est hydropem augeri, donec septi transuersi
prohibeat motum, aut calorem in toto corpore ex-
tinguat: velut contra, cum hydropicis superuenit
alui profluuium, aqua à venis in ventrem consuen-
te, solutio fit, vt dicitur 14. aphorism. sectionis 6.
Ob id igitur hic mortuus est. Quæ historia nos ad-
monet, vt cum multa sparsim per corpus tubercu-
la (magna præcipue) videmus oriri, cacochymiam
circo conemur emendare. Nam hæc quæ in pullu-
lant, in internis latere humorum magnam vitium
significant. Quæ cacochymia nisi maturè enacue-
tur, maioris alicuius morbi causa erit.*

F *Cyri caput lapide percussus est à Macedone,
cecidit. Tertiâ die vox defecit, anxietas
aderat, febris parua, non admodum pulsabant
tempora, nihil omnino audiebat nec sapiebat,
nec sine tremore erat, sed quatuor monebatur.
Circa frontem, sub naso, & vñque ad mentum
madidus erat, & mortuus est.*

Non dicit qua parte capitis percussus fuerit. Quod (vt in historia virginis Nerei diximus) non parum refert ad magnitudinem periculi. Verum nulla parte capitis contemnendum vulnus est. nisi sola cantis sit cuspide incisa, nedum cum lapide est confusa, & dissecta. Mox ac accepit vulnus, cepit lethalia signa habere hic, nam cecidit quo verò ponit Hippec. lib. de vulnerib. capitis in signis fracti crani, & lésionis quæ interna capitis attingit. Itaque hæud dubie huic confusum cranium est ad interna vsque. Vnde inflammatio in internis cerebri contracta est. Manifestè autem non statim, sed tertiâ die, aut quartâ, vt dicitur lib. de fracturis, vulnera pleraque ingranescunt, vt quæ ad inflammationem procedunt, & quæ ad febres. Tunc ergo cepit hic esse sine voce, & nihil audiebat omnino, nec sapiebat: scilicet, et siloqui non posset. ex nutibus constabat nihil audire, neque intelligere: nec sine tremore erat, sed quartâ (quâ etiam mortuus est) mouebatur, consulsuè scilicet. Dicitur enim sæpe à me iam est, apud Hippo. nomen tremoris significare omnem motum tremoris similem: quare & consulsuam. Hæc inflammationem magnam in alto cerebro ortam indicabant: per tantam verò affectionem tam principis membri, necesse erat anxietatem fieri: nam & cor ad magnam compassionem traheretur: atque (etsi id non dicit) difficilis fiebat respiratio. Febres verò apparebat leuiss, & pulsus in temporibus non valde inerat, quod affectio interna esset, & per internas arterias & venas potius quam per externas fluxio reciperetur, contra ac in virgine Nerei factum esse dicebantur. Quod huic iam exhalanti animam sudor exiguus, ac guttatum, quem humiditatem vocat, factus sit per faciem, à fronte ad mentum, consensum est eis, quæ de sudore in prognostico dixit Hippocrates, quorum causas ego in eius loci commentarijs reddidi:

E Niatens quidam proprio iaculo percussus à tergo secundum sinistram lateris partem, vulnus quidem non dolebat. Tertiâ verò die gravis dolor ventris exortus est, non externebat. Iniecit autem clystere sub noctem sterces prodix, non intermisit dolor, sedes ad testes eminebat. Quartâ verò pubem & ventrem dolor detinebat. Viniens sine tremore esse non poterat. Biliosa vomebat sincera, oculi huius animo languentur similes: post quinque dies mortuus est. Calor quidem tinnis inerat.

Sive hic se suo iaculo sponte traiecit, siue casu in illud incidit, siue ab alio quopiam suo ipsius iaculo percussus est, nihil refert. Qua parte, & quousque videatur fuisse lésus, oportet dicamus. Latere finitro à tergo est percussus. Non narrat an ad costas supernas, quas & legitimas vocant, an ad infernas, quas nothas: verum quoniam lésio præcipue videtur pertinuisse ad ventrem infernum, vel vsque ad pubem & scrotum, constat non esse illarum vulnus superna thoracis parte. Si enim inde descendisset iaculum in imam, disrupisset pulmonem & septum transuerfum, ac mirum si attingisset cor, aut

A aortam arteriam: quare repente cecidisset mortuus: superest fuisse vulnus postremâ & imâ parte thoracis, iuxta septum transuerfum, inferius tamen. Inde verò iaculum deorsum versus intestina, non sursum versus thoracem consedisse, eadem ratio declarat. Cæterum quia primum quidem non exercebat, deinde verò tertiâ die ablutus clystere, merum sterces sine crnore aut sanguine eiecit, constat non penetrasse vulnus in interna intestina, eorum tunics laceratis, sed constitisse inter ea & peritonæum: præcipue cum labor, seu gravis dolor, seu velut ponderis sensus (nam hæc significat *et*) ad scrotum descenderit, quod quidem fit ex ipsiusmet peritonæi productione quadam. His ita statutis, quo pacto accidisse hæc omnia sit consensaneum, enartemus. Iaculo quomodo, & qua parte traiectus fuerit diximus, vulnus quidem non dolebat, quia inflammationem non valde contaxerat, ob magnam fortasse sanguinis effusionem, quam, quia factam non narrat, inspicor factam introsum, sanguine in ventrem effuso: quem cum necesse esset corrumpi, & malignas qualitates contrahere, factum est, vt tertiâ die dolor gravis ventris fieret, copiâ grumorum sanguinis grauantem, & premientem, & qualitate malignâ mordente extinlocus intestina. Tamen non exercebat, quia mordentis & maligni nihil erat intra intestina. Et cum ob hanc molestiam, & excernendi difficultatem clystere esset ablutus, excreuit exiguum stercois, ob cuius excrétionem labor non intermittebat (neque enim inde nascebatur) sed cum non intermitteret, sedes ad testes emanebat, grumis sanguinis ebi iam pondere delapsis. Quartâ iam die autem copiâ & malignitate, morsum patientibus testiculorum ligamentis, & cernicæ vesicæ, & quocunque eo loco sita sunt, & totis intestinis, pubem & alium, dolor tenebat: donec mortuus sit, sine tremore esse non poterat: quem tremorem consentaneum est fuisse rigorem ob mordicariorem intestinorum, & ventriculi. Tamen enim telum ventriculum non attingit, venerosus tamen qualitas grumorum putrescentium eò vsque transmissa est. Accesserunt etiam rigori consulsuuius motus, per consensum nervosi generis cum ore ventriculi, & ob vtrumque non potuit esse sine tremore, hoc est, sine vitioso partium motu, & præter naturam. Vomitus sincera bilis ob compassionem ventriculi cum ventre infesto accidebat. Oculi errant postremis iam digibus, veluti eorum qui ante mori inquantur, excauati scilicet, tristes, ac velut marcidis, & sine fulgore. Tales enim sunt ipsos quos iam deficit virtus vitalis. Post quinque dies, extrema scilicet quintæ parte, aut sextâ die finit vitam. *Et ipse* (inquit) *ad hunc usque*, id est febrem habebat exiguum. Quales scilicet apparere solent quæ sunt malignæ, velut hæc malignæ putrescentiæ grumorum succedebat.

B

C

D

E

F

Illi cui hepar percussum est iaculo, statim color mortuus similis affusus est, oculi concaui, anxietas, & difficilis tolerantia: mortuus est antequam concio solueretur, cum ipse diluculo sanciatu fuisse.

Quanto cum periculo hepar vulneretur, Gal. docet comm. 18. scilicet particulis aphorismorum, quia funderit inde missus sanguis, & hominem exanimat, & curationem prohibet. Quam ob causam negati censere eos qui assument, vel ab alio heparis vlceri, vel abscesso heparis lobo sanatum esse quemquam. Quia scilicet nisi ad extremitatem vultus consisterit, non possunt non dirumpi venæ, & quibus sanguis effundatur. Vnde manifestum sit, si exulceratio venam canam laet et in exortu, necesse esse ut homo moriatur repente, utpote iugulatus: ut huic evenit, qui cum iaculo esset vulneratus, merito, ab ipso rebo coniectura accepta, putatur accepisse alium vultus. Vnde sanguine effuso repente mortuus est. Repente enim moridices eum, qui quatuor aut quinque horis exhalavit animam. Constat verò in moriente homine colorem mortuis similem, excavationem oculorum, anxietatem indicibilem, & difficilem tolerantiam merito accidere. Hic mihi videtur iaculi extractione citius moriturnus, utpote cui iaculum ipsum posset vlceri obturare, & sanguinis fluxum cohibere. An extractum mox fuerit, non narrat.

*V*Xori Polemarchi hyeme angina laboranti tumor sub gurgure exortus est cum magna febris: secta est ei vena, cessante fauce tum suffocatio, febris persueverat. Circa quintam diem sinistri genu dolor & tumor exortus est, & ipsi circa cor aliquod colligi videbatur, & respirabat velut i qui ex submersione respirant, & ex pectore substrepebat, sicut mulieres ventris loque dicta; huic simile quid accidebat. Circa septimam autem aut nonam sub noctem venter affatus demisit humida multa, quæ mala existimabantur. Ea verò voce destituta mortua est.

Βρυση vocat. laryngem, seu caput asperæ arteriæ, quæ constat cartilaginibus, quæ in tota aspera arteria appellantur bronchia. Ortus itaque est huic laboranti anginâ tumor infra laryngem, externus quidem (conspicua enim narrat) qui quidem per se malum signum non erat (nam ut in aphorismo dicitur, in angina tumorem apparere bonum est) verum quia pendebat malum ex multis & crassis, qualia hyeme colliguntur, non fuit id satis ad salutem. Nimirum tumor externus non tam factus est humore extra conuerso, quam interius & externis redundante: Accidit igitur ipsi, qui ab angina liberati nihilominus moriuntur, id quod in aphorismo. 10. sect. 5. dicitur his verbis, qui anginam effugiunt his ad pulmonem vertitur, & septem diebus moriuntur; si verò hos effugerint, fiant suppurati. Hæc manifesta signa habuit delapsus succotum in pulmonem, cuius affectionibus, ut & totius thoracis, alii delectiones inutiliter, ac nonnumquam exitraliter succedunt. Mortua itaque est hæc breui, quia post decubitu in pulmonem alui fluxu successit: quæ si non successisset, incidisset in suppurationem. Cùm itaque anginâ & simul tumore sub larynge suffocaretur, & esset multa febris, ut ple-

*A*rumque in angina solet, vena ei secta est, & cessavit suffocatio ex faucibus (addidit ex faucibus, quia ex pulmone & asperæ arteriæ inferna parte parum abest quin fuerit suffocata (febris tamen non est soluta, quod scilicet non tam soluto, quam permutato morbo fuerit solorio suffocationis). *Μελιχολος* *πυρετος* *αλγωνα*, *ιθινα* *τι* *αερισθη*. Videtur his verbis significari, dextrum genu fuisse dolorem, & sinistri tumorem, ut alterum genu dolore sine tumore, alterum tumore sine dolore laboraret. Potest autem etiam intelligi utrumque doluisse, alterum solum intumuisse. Vtrumque hoc habuerit, significatur humores deorsum descendisse, & quidem hic abscessus bonus fuisse (nam deorsum in ignobilis partes, & longè à primario affectu) verum non fuit satis pro tanto morbo, neque adeo multum suavi ed' derivatum est, sed maxima pars constitit in thorace. Nam circa cor videbatur ipsi aliquid colligi: nimirum pulmo repletus comprimebat pericardium. Et respirabat ut qui ex submersione respirant, ut scilicet qui periclitantur suffocari ex longa spiritus cohabitione, & ex pectore substrepebat, ut qui vocantur *εσπυρεσμενοι*. Gale. lib. de obsoletis Hippocrat. vocibus dicit ita vocat eos, qui clauso ore loquuntur *εστ* *δ* *δωρι* *εσ* *τις* *καρπη* *εστ* *ισ* *α*, quod ex ventre loqui videantur. Hoc significatio oportet nos nunc hoc nomē accipere: quamquam aliter eo vultur. In decretis canonicis dicuntur hoc nomine quidam, qui ex pelui vel alio vasis genere vaticinantur, à nomine *καρπη* quod est vasis quoddam genus. Sed qui loquerentur ex ventre non satis scio, qui essent. Cælius Rodgimus dicit ita appellatos quosdam, quibus in ventro demon esset aliquis, interrogantibus responsa tribuens, qui dicebantur Pythonem habere in ventre. Fortasse sine demone ope sit ut quidam mugitu quem clauso ore reddunt, voces quasdam non sane distinctas imitentur: utrumque hoc habet, quod hic dicitur est, strepitum quendam in huius mulieris ventre sentiri, quod quidem fecit aer, qui intra asperas artetias ab humore coerebatur. Hæc cùm ita haberet, circa septimam aut nonam sub noctem alius affatus excreuit multa humida, qualia quæ putantur esse mala: ut hac ratione viderentur exire qualia oportebat: mulier verò tam longè abest ut habuerit se melius, ut etiam priuata voce mortua sit. Nimirum evenit, quod in pectoris & pulmonis morbis plerumque solet, ut tenuia transcoleantur in ventrem, crassa intra thoracem bareant, & facultate soluta, morbo non soluto, mors accidat. Quia à thorace in ventrem expedita via non est, & ea pars debilitatem omnium minimè potest sustinere, quia indiget motu vehementi: & ob alterum non purgatur, ob alterum facultate citò destituitur. Dicit circa septimam aut nonam, ut qui non satis recordaretur qui die. Septima solere fieri dicitur in aphorismo, non mirum tamen quod septimā fieri solet, usque ad nonam produci. Non enim sunt hi fines adeo inevitabiles.

*V*Entres in morbis oportet per inferiora purgare, inferiores quidem, quum concocti sunt, humoresque confidentes videbis. Signum est, si agri neque anxietate neque capitis gra-

mitate laborent, & quum calores fuerint mitissimi, aut quum post paroxysmos desierint. Superiores autem in paroxysmis, tunc enim humores sua sponte eleuantur, quum agri anxietate, capitis gravitate, & corporis iactatione conflantur.

Imaginarum, id est subpurgare videtur significare purgationem exiguam, aut deorsum factam. Hec enim significat *id est* in compositione. Hic vero neutrum horum significat, sed idem quod *imaginarum*, purgare scilicet utrumque: addit enim, *Quum* videtur, *id est* *id est*. Docet itaque hęc sententia, qui sunt purgandi, & quā viā. Purgare, inquit, oportet in morbis cum concocti fuerint; nimirum, vt in aphorismo dicitur, non sunt mouenda cruda, nisi turgent, qualia sanē sunt per parca. Qui verō expurgandi, alios quidem deorsum expurgare oportet diectione, alios sursum vomitu, vt scilicet humores ipsi sua sponte sursum aut deorsum vergunt, quia quod vergit natura per loca conferentia, eo oportet ducere. Signa verō quę indicant confedisse humores, quod anxietas & capitis granitas cessauit, & calores mitissimi sunt, aut cessauerint post paroxysmos, hoc est cum sint febres mites, & paroxysmis carentes, nisi forte exiguis: aut si habuerint paroxysmos minimē mites, tamen cessauerint iam. Alios autem oportet purgare sursum, quum sunt in paroxysmis, quū agri puri anxij, capite grauati, & loco consistere non possunt. Rēddidit horum causam dicens, tunc enim sua sponte eleuantur humores. Hoc est, quum morbos fertur difficillimē, & anxij, inquieti, ac grauati capite sunt, significatur succorū nec sursum latio: quum nihil tale est, aut cessauerint hęc omnia, significatur succorū non esse elatos, aut subfuisse. Sed videri possunt hęc *id est* *id est* dicta, & hęc definitiones inerte. Nam dicere grauatos capite non esse expurgandos per inferna, videtur falsum, cum in vertigine, cephalæa, cephalalgia, epilepsia, & aliis omnibus morbis capitis, nullus sit qui non consulat pharmaco diectionis vti. Galenus cēte hieram ex colocynthide mox exhibet. Quin potius in capitis gravitate, videtur merito vitanda vomitio, ne laborare cogatur pars affecta, & sursum versus commotio fiat. Præterea præter artem videtur, in ipsis paroxysmis viā purgatione vti. Quia, vt in aphorismo dicitur, cum morbi vigent, & ea quę sunt præter naturam sunt fortiora, melius est quietem agere. Accedit quod anxietas, inquietudo, & capitis granitas, sepe sunt decretoria prænuntianda vomitum, aut fluxum sanguinis ex naribus percipit, sed & alias euacuationes aliquando imminente autem crisi, nulla vacatio tentanda est, quia quę indicantur aut indicata sunt, neque mouere, neque nouare oportet, sed sinere. Certe Hippocritas, non has, quasi exatas, & quę solę sufficiant, definitiones expurgationum superiorum & inferiorum, scribit, sed vt viles quidam consideraciones, quibus alie omnes artes sunt adiungendę. Nec dicit, nullos qui sunt capite grauati, expurgandos esse deorsum: sed eos quibus succi sunt cocti, & alioqui nihil obstat expurgari, si neque anxij fuerint, nec capite granati, neque febres in exacerbatione, expurgandos esse per inferna: quia significatur succos deorsum

A confedisse: cum enim sursum feruntur, ventriculum superiorem, thoracem, & caput molestias facientes augent febres, patiunt anxietates, inquietudines, & grauitates capitis. Hęc ergo si adfuerint omnia, tamen expurgandum sit, expurgandum erit per superna, quia succi non confidunt. Tamen, et si hęc adfuerint, si aliud aliquid sit quod purgare corpus prohibeat, vt si indicatio imminet, aut sit, aut febris est vehementissima, purgandum omnino non est, neque id Hippocritas dicit. Sed si purgandum, sursum faciendum. Capitis verō grauitatem solum non dicit prohibere expurgationem per inferna, sed cum reliquis. Quapropter in cephalæa, & alijs capitis morbis, non prohibet dare diectionem: sed in his ipsis vitatur vomitione, quum ventriculus sentitur male habere, aut quod caput laboret ex ventriculo, aut ventriculus ex capite: utrumque scilicet circa ventriculum redundent excrementa, quod cognoscimus anxietate, qualem patit ventriculi morbus, aut nauseabunda laxitas. In paroxysmis, hoc est, febrium exacerbationibus, quantum expectatur citò futura inclinatio, expurgatio totius corporis non tentatur tunc. Satiū est enim expectare remissionem, ne duobus modis laborans facultas succumbat: verū si exacerbatio ipsa vergeat, neque alia ratione remissio expectetur, & nihil maioris momenti prohibeat, vomitione est expurgandum: quia expurgandum est omnino, & indicatur talibus, succos non subfuisse. Quæ eadem ratione in paroxysmis intermittentium febrium solent vomitus esse vtilissimi, adeo vt folis bis soleant tertianæ curari, & quartanę febres miscere.

Uidam ex casu in cubitum vulnerato, post spaciolum cubitus suppuratur, purē iam maturiscentē viscosa sanies exprimitur; qualis etiam Cleogenis & Demarcho Aglaotolis filio: similiter autem & valde ex eisdem pus nullam effluxit, velut Æschili filio contigit.

E Spbacelus est corruptio & mortificatio paruum solidatum, occupans etiam ipsa ossa. Hęc corruptiones aliquando sunt humide, aliquando sicce. Siccas putrescentias vocari ab Hippocritas, quę morientibus ipsis particulis, citra succi collectionem, aut redundantiam sunt, non semel iam antea diximus: humide ergo sunt, cum partes putrescentes in sanie aliquam resoluuntur. Sōntq; quædam suppuraciones tantū deficientes à bonis, quantum à benigna inflammatione, aut conuulsione differunt ipsa mortificatio. Nihilō benignior est mortificatio sicca quā humida, sed, vt ego existimo, etiam malignior, quia extinctio mera videtur esse hæc in calidi: illa velut colligescencia à febrili, quamquam in tam malignis, non est quod eligas. Illud certum est, in corruptionibus humidis non posse esse pus bonum, vt in bonis suppuracionibus: quia hæc calorem à naturali non valde deficientem indicant, illę corruptionem. Proinde vt in his sit pus crassum sine lentore, ita in illis contrarium, tenuis scilicet vt ichor, & cum lentore. Quamquam ne hoc quidem talibus multum ducat, sed citò supprimatur,

331
mirur, sique postremo vltis siccam, vt repetens
haec ipsam sententiam dicit Hipp. in septimo libro.
Itaque dicit, quibusdam, qui cubito percussi cum
essent, ex casu corruptionem cubiti incurrerent,
duobus quidem exiisse ichores lentos, alteri nullos
pus, atque vtrumque fieri solere. Neque sane io
cubito solo, sed & in tibis, & brachio & quauis
alia parte simili perinde accidit. Verum hæc forte
contingant, quæ memorie & obseruationis gra-
tia notauit. Cõstat verò vetustissimam p̄talem
sapere, quod corruptum iam & resolutum in
pus cubitum, maturatum vocat. Nam & in libro
de alimento vocauit cibos coctus faciles, facile pu-
rescentes.

*Suppuratis autem plurimis horror & fe-
bris superueniebat.*

Hæc eadem verba (vt etiam superiora) occur-
rent iterum in libro septimo. Illic verò dicitur, fe-
bres superueniebant. Non multum interest. Sed si
verbo præteriti imperfecti vitur, de aliquâ tem-
pestate, quâ multi fuerunt supputati, loqui vide-
tur: forte de ea ipsa tempestate, qua coegit ex casu
vulnerari cubito Cleogeniscum, & Demarebum, &
Æschili filium: sed autem verbo præteriti, docet ri-
gores incertos, & noua febrium incrementa, sientis
suppurationis esse signa: quod in prognostico etiam
dicitur ab eodem Hip. his verbis. Considerate sup-
purationis principium oportet, suppuratione fa-
ctarab ea die, qua primò homo febricitauit, aut
si forte primùm ipsum rigor apprehenderit. Cui-
sam in commentatione eius loci reddidimus.

*Parmenisci puero surditas accidit, con-
tulinon abluere, lana autem solum expur-
gare, & infundere oleum aut neporum, tubere
ut ambularet, mane surgeret, & vinum al-
bum biberet.*

Netopi nomen occurrit apud Hippocratem
scriptum sæpe, præcipuè in libris de morbis mu-
lierum. Quid possit significare, etsi de ea re
lexica multa, & viros doctos, & græci hogan per-
itissimos consuluerim, reperire non potui. Quod
me cogit suspicari, viatium esse codicem, legen-
dumque esse *parmenis*. Est enim facilis lapsus, cum
sint voces adeò similes, aut Hippocratis seculo
votarum esse *parmenis*, quod postea *residua*. Nam
parmenis legi congruit plurimum cum instructo. Si-
gnificatur enim ea voce quod dicimus alio nomine
galbanum, & vnguentum quoddam in Ægypto pa-
rari solitum, quod describit Dioscorides libro pri-
mo, recipiens galbanum, à quo & nomeo accepit.
Accedit ad coniecturam, quod vbi meminit Hip-
pocrates nepotij, recenset illud inter resios, &
pinguedines, & olei genera, denique inter res e-
mollicotes cum quadam resolutione, cuiusmodi
est galbanum, & vnguentum illud. Vnde ego citra
dubium colligo; aut esse id quod dixi: aut aliquid
ei facultate simile, quale styraz, bellium, myrba;

aurthos, aut soccus silpij. Quamquam nihil hor-
um, quæ modò nominati esse constat, quia hoc-
cis citatis inier ea refertor ab Hippocrate, quasi di-
uersum quiddam. Dico autem esse facultate eius-
modi aliquid, magis autem adducor vt suspicer esse
quod dixi. Nam præter dicta, est illud vnguen-
tum, atque adeò ipsum galbanum cum aceto &
melle seruatiuum, vtile ad gramem audiatum. &
surditatem, vt licet videtur apud Galenum lib. 3. de
compositione medicamentorum secundum locos
cap. 1. quo etiam in loco Galenus commendat ad
eam passionem, deambulationem, & frictionem
capitis, & corporis, ac denique totum victum sic-
cum & attenuantem. Quia ex passio à succis mul-
tis & crassis in capite reduodandus sit. Quare &
ambulare, erit etiam vtile, mane surgere, ne som-
nus multus afferat capitis granitatem, & vt ex-
ercitatio tempessue agatur (non enim à cibo erit vi-
tilis) & vinum bibere album, quia tenuius & mi-
nus r. plens quàm nigrum, & purgare aures lina
(ipsi enim expurgatio dicitur). & infundere oleum;
aut, quod est multò efficacius (oleum enim nisi sit
verum, aut seruatiuum, aut quod vocatur elychthio-
rum, leue auxilium est) galbanum ex aceto & melle:
itaque lauare erit noxium: quia homestabit;
nisi tamen laues balneo aliquo medicamentoso, vt
vino io qua amarus, aut fronsas, aut abacis-
modi incocta sunt, tunc enim iuuare poteris: si ta-
meo prius, & corpus totum, & caput vacuaueris
per hieram diacolocynthis, aut tale aliquod me-
dicamentum, præmissa (si ea etiam sit opus) mis-
sione sanguinis ex venâ cephalicâ. Expurgationem
verò in hac passione princeps esse auxilium; con-
sentaneum est, siquidem Hippocrates ipse dicit,
surditatem fluente alio solerte cessare. Post maio-
res autem euacuationes, erubim, & gargazaru,
sen etiam masticatorijs, ad extrahendam pitui-
tam vticonfert. Cibi autem sint siccis & pauci, &
concoctiois facilis & caput minimè replentes. Ob
id Hippocrates libro 7. huius operis, vbi bistortiam
hanc reperit, & quædam præterea addit pertinen-
tia ad victum, iussit abstineri ab oleribus (vt hu-
midis, vaporosis, & grauantibus caput / nam & le-
thuca, quæ inter olera tenet primas, hæc habet vi-
tia) & vesici pane, & piscibus saxatilibus. Tales
enim concocti faciles, neque mah succi sunt, eorum
verò humiditas paco emendatur. Pisces saxatiles
dicit Galenus esse scarum, ærularum, turdum, iu-
liam, fucam, percam, quod in petrosi promon-
torijs, & vbi sunt saxa delitescant. Ego verò his ad-
dam multos alios pisciculos, qui in cenosis & la-
custribus gignuntur nunquam, sed limpidis aquis,
& per petras decurrentibus, veluti silaras, si forte
ita vocatæ sunt quæ nobis *truchas*, & vtrunque ve-
teribus appellarentur, quæ nobis vocantur *ver-
meinas*. Omnibus enim eiusmodi piscibus est ea
laus, quam Hippocrates tribuit saxatilibus, non so-
lùm illis marinis. Dabuntur verò in hac affectioe
piscis frini potius quâ elizati. De vino dubitari al-
iquis, an vtile sit. Videtur enim tentare caput &
fluxiones in illud commouere. Ego quidem non in-
telligo præferri hoc loco vinum album aquæ, aut a-
lij porioni aqoose, sed vino nigro. Sanius autem
fuerit ob paris indicationem vitæ aqua, nisi tamen
inueterata iam passio sit, & hominis consuetudo,
aut etiam natura plurionum repago: Tuuc

enim, vt & in alio quouis morbo, faciendum erit. satis indicationi maiori.

Vxori *Aspasij* dentis dolor accidit vehemens & maxilla (suppleri debet tumor) cum castoreo & pipere collueretur & ore contineret, inuabatur, & stillicidium urinae ipsi sedatum est calido farina cum oleo rosaceo fofu.

Dentes parati sunt dolore, quia fluxionibus valde oportuni. Quibus enim eorum cum maxillae offe facit velut quandam articulum, quo, non, vt in reliquis articulis, alligantur ossa ligamentis durioribus, & sensus expertibus: sed neruulis quos per radices accipiunt, pendunt, & velut clauis infixi sunt, compitentes & compressi. Accipiunt praeterea & venulas & arteriolas, quia ob attritionem necessarium, indigerunt alimento copioso, & assiduus: quod etiam ipsos facit fluxionibus opportunos. Eisdem enim vijs recipiunt partes succos redundantes, quibus & nutriuntur. Itaque ob haec solent dolere dentes, non tamen semper dolent ab eadem causa, sed nunc ab intemperie calida aut frigida dolor incipiens. conuocat fluxionem, à qua deinde seruat & augetur, nunc fluxio prima dolendi causa est. Atqui ipsa fluxio, siue dolore antecedar siue sequatur, nunc est calida & acris, nunc frigida, nunc etiam flatuosa. Atqui nonnunquam dolor incipit à gingiuis, & coarctat dentes, nonnunquam à dentibus & resunditur in gingiuas. Et tumor gingiuarum aliquando crescit cum ipso dolore, quod vtrumque simul fluxio faciat, aliquando tumescitibus gingiuis dolor sedatur, quod fluxio conuertatur ad externa. Nimis, vt & in alijs omnibus articulorum doloribus solet accidere: qui enim siue tumore ceperunt, superueniente tumore solent mitescere. Ex his quibus intelligit, nullum esse medicamentum, quo omni dentium dolori aequè occurratur, sed pro dolendi causa, alijs aut alijs esse opus. Horum triplex genus esse video. Quendam enim adstringentia parantur, ad arctandas fluxiones, & firmandos dentes: quaedam resoluentia, ad absumendum fluxiones & status: quaedam stupefacientia, ad tollendum dolorem cum sensu. Componuntur haec multis modis, cum ab eodem medicamento volumus multa praestari. Est verò commune omnibus quae pro dentibus parantur, indigere aliquo quod in alium deducatur, alioqui nihil praestabunt neruorum radicibus, quae intra ipsa officula sunt. Proinde vino geotoso, aut aceto acerrimo plerumque incoquantur. Atqui profectus efficaciora sunt in aceto incocta, quia vinum elixatione deponit vires. Cum igitur haec castoreo & pipere, medicamentis calidis & siccis, & tenuium partium inuaretur, consentaneum est, ex fluxione frigida, aut flatu crasso dolere cepisse. Collutio verò facta est ex aceto. Haec eadem historia repetitur libro 7. et si non omnino eisdem verbis, & quiddam aliud additur, ad eandem pertinens agrotantem. Ita enim ibi legitur. Vxori *Aspasij* deo- tus dolor accidit vehemens, & maxilla (suppleri debet tumor) cum castoreo & pipere collueretur,

A & ore contineret, inuabatur, & stillicidium urinae ipsi sedatum est calido farina cum oleo rosaceo fofu. His verbis intelligi potest stranguriosam passionem mulieris huius solutam esse castoreo & pipere potis ex aqua, & cataplasmate ex farina & rosaceo calido: aut hanc curationem solo cataplasmate peractam esse. Vtrumvis intelligas, statuitur cura nonem stranguriae calidiorum vsu agi, quod quidem non de omni stranguria verum est, sed de quadam. Ea enim quae ardore urinae aut obstructione fit, aut vlcere, alia poscit auxilia. Quae ex frigore pendet aut flatu, ea poscit calidas potiones & fomenta.

B

Callimedis pueri contulit ad tuberculum in ceruice abortum, durum, magnum, crudum, & dolore afficiens, vena sectio in brachio, & lini semen cataplasmate imponere subactum vino albo, & oleo imbutum, deligare autem valde coctum: aut cum melicrato farina fannu graeci aut hordei aut tritici coquatur.

Tuberculum durum, crudum, & dolens baud dubie est inflammatio scirrhusa. Nam tumor durus & dolens est inflammatio. Dicens autem durum & crudum duritiem quandam solido maiorem insinuat, quae inflammationem indicat scirrhusam. Metu ergo inuabatur cataplasmatibus emollientibus, & resoluentibus. Haec enim vtrique desiderat talis affectio, aut simul, aut alternatè. Eruum & hordeum sicquado resoluunt. Lini semen & oleum resoluunt minis, molliunt tamen, vt & triticum, quod & suppurandi vim habet, si in suppurationem vergeret inflammatio. Vinum resoluentibus cataplasmatibus est liquor idoneus. Vbi dicit *deligare autem valde coctum*: videtur aliquibus significare recessum, decessumque sanguinis, hoc est, missionem sanguinis ex brachio. Videri tamen potest dura interpretatio: occurrit enim apud Hippoc. & Galenum *deligare autem valde coctum* idem quod *deligare* seu abscessum, & vbi significet sanguinis detractionem, non occurrit. Quamquam Galen. lib. antiquarum vocum dicit *deligare* significare apud Hippocratem *deligare* & *deligare* significatione communi est idem quod *deligare*. Et si, vt significetur abscessus, Hippocraticam phrasim non adeo sapienter *deligare* & *deligare* ac si diceret *deligare*: videtur tamen non adeo esse durum interpretari, abscessum brachij, id est qui in brachium, atque in alienam significationem nomen transferre, si modo ea alioquin est, etiam apud Hippocratem. Verum est si rem ipsam species optimum esse auxilium ad inflammationem in ceruice consistentem, sanguinem mittere ex brachij vena exteora, è latere in quod malum inclinat. Ceterum, siue id antea factum fuerat, siue fecus, poterat etiam abscessus in brachium factus spontè liberare. Vt scilicet alia quamplurima ex succis pendencia abscessu soluantur. Est autem abscessus, humorum in partem aliam ab ea quam primo afficiebant, inclinatio, quae tumore, aut dolore, aut vtriusque significatur. Itaque vtrumvis hoc loco significet *deligare* siue secundum consumum vsum abscessum siue missionem sanguinis, vt apud Hippocrat. *deligare*: secundum rationem

E

F

conuenit, vt ægrotus ab inflammatione cervicis subleuaretur, ac proinde, in vtram interpretationem potius inclinem, dubito.

Melissæ adde cum gingiua cresceret, doleat, & multum intumesceret, vene scissio brachij profuit. Alamen in principio impetum humoris reprimerebat.

Hic inceperunt processeruntque simul dolor & tumor gingiue, inde & dentes condebant. Magnus tumor indicabat copiosam fluxionem. Quare nihil magis conferebat, quam sanguinem ex brachio detrabere, quæ eadem ratione, si quis in brachium secundam rectitudinem abscissus exortus esset, conuulisset necessarii. Vtrumuis ergo horum, huic quoque nomen a sinistrali significet, non caret euentus ratione. Aluminis communis est vsus in his, ad oris partium fluxiones, & plurimis stomaticorum medicamentorum vilissimè miscetur. Nam adstringens siemat dentes: siccans, resoluit succos: extergens, curat, si quæ sunt vt solent, putria vlcuscula. Verùm quia magnam facit adstrictionem, vnde & græcum nomen accepit *στυπία*, postquam iam partes plurimum intumuerunt, vtile non est. Quia adstrictio resolutioni obstat: & magna adstrictio partes humidas velut contemnit, pressius comprimendo. Merito ergo huic alumen lingua in ore versatum, aut ex alumine & vino aut aceto collotio conferebat in principio, antequam vehementer intumisset, postea enim saturus esset cum laxantibus & resoluentibus commutare.

Hydropicum oportet laboribus fatigari, sudare, panem calidum oleo inbutum comedere, nec multum bibere, lauari & caput tepidè: vinum autem album & tenue, & somnus auxiliatur.

Hydropicis omnibus commune est frigidis & crudis redundare, seu pirità, seu sero, seu statu, seu omnibus, aut horum quibusdam, ob naturalis caloris debilitatē in hepate, quæ aut ab ipso inceperit, aut ab alia parte. Indigent ergo omnes curatione, & vicia sicco & calfaciente, plus aut minus, vt febribus adest, aut non. Ita enim & materia præter naturam collecta consumitur, & in temperies, quæ eius causa est, tollitur. Merito ergo iubet Hipp. vt hydropicus defatigetur, hoc est, exercetur plurimum, & laboret. Nihil enim strenuius quam exercitatio naturalem calorem excitat, & succos absument. Verùm cum modo quodam accipi hoc oportet, vt ne magis quam ferre possint, debilitentur: sunt enim etiam valde debiles, & animo linguæ parati exerceant etiam horā idoneā, quæ præcipue est mane ante cibum. Nam post cibum exercitatio contraria est propterea: augeat enim obstructions, & cruditates. Proinde Hipp. libro de internis affectionibus hydropicum victum prescribens, iubet, vt quotidie debulet, & mane exurgat, post cenam verò & serotino tempore dormiat. Nam etiam hic dicit somnum auxiliari. Nam et si somnus in causis humidis sit, at-

Aque succandi gratiā vigilandum quam plurimum foret, verùm, vt diximus, mouendum non est semper, ne ægrotus deficiat, sed quiescendum etiam virtutis gratiā, itaque vigilandum, sed dormiendum etiam, non solum ob virtutem, sed & ob concoctionem, nam laborat tumore ob concoctionem. Procuranda est ergo concoctio & siccatio, hæc mori, illa somno agendum ergo vtrumque suo tempore. Somno hora idonea est post cibum, motui ante eum. Sudare etiam dicit vtile esse. His erit sanè vtilissimum, si robore facultatis, ac non potius dissolutione accedat. Nam per sudorem ichores leuosi, qualibus præcipue abundat hydropicus, euacuantur, & vrinæ defectum optimè supplet exsudatio. Verum per sudorem syncope, dissipatur facultas. Sudores igitur toleranti discernes, ac nisi syncopestes sint, viles esse certo scias. Panem consilii comedere calidum imbutum oleo, non quidem calidum & recentem (talis enim dolorem facit capitis, & est magis siticulosus, & venierem grauat, & tardius descendit, & alioqui corporis habitum minus siccit, vt 2. de ratione victus in acuris dictum est), sed, vt ipsemet loco citato ex lib. de internis affectionibus interpretatur, panem antiquum & calidum, quod est, quia iam vetustate duruerit, & restum. Hic enim calcascit, & siccabit magis, & recentis noxas non habebit. Iubet vero etiam illo loco, vt sit quem vocant *διαιτημα*, ex quo nihil fursum decesserit. Nam talis, præter quam quod siccabit adhuc magis, etiam facilius descendet. Quo respiciens etiam hoc loco iubet dari panem in oleo, hoc est, oleo intinctum. Iuuabit etiam oleum panis descensum. Bibere inquit non multum. Hoc sanè videtur remissè dictum. Oportet enim accipere potus quàm minimum, & quantum potest sitim tolerare, vt humores aquosi cōsumantur. Potus autem ne sit aqua, nisi forte teneatur febris maiusculā atque ne tunc quidem sit cruda, sed alterata medicatis. Vinum verò bibere iubet Hipp. & hic, & illo loco: non tamen vtrouique idem, sed hic album & tenue causa mouendi vrinam, hic nigrum crassissimum, reficiendi, arbitror, causā, & replendi concocto sanguine. Curationem illic suscipit eius qui ex colliquecentia fuerit factus hydropicus, hic vero eius qui aliter, vt ex refrigeratione antecedente, atque ita vtrunque rectè dicitur. Si enim hominem curas, qui potu aut cibo frigidis, aut otio, aut obstructionibus factus sit hydropicus, dare debes vinum album & tenue, vt facilius in omnes corporis partes sese infundat: si vero aliquem qui ex febre colloquante cum extrema extenuatione, melius prescribes nigrum crassissimum, & maxime austerum.

E Crassum enim debes huic corpori procurare, & euacuationes ex alio maxime pmere. Verùm hic complicatio iam affectionum esse videtur. Secundum indicationes hydropis per se, rectius dicitur album & tenue desiderari ad hydropas. Quod dicit, lauari & caput tepidè, non tam videtur mihi esse præcipiens vt lauet, quàm prohibentis ne multum calidè aut frigidè lauet: ne caput quidem solum, nedum totum corpus. Nam balneum haud dubie per se aduersum est hydropi. Erat vero hominibus eius tempestatis consuetissimum, cum secundum totum corpus, tum vel maxime secundum caput. Proinde occurrens consuetudini hydropicis futuræ noxiæ, dicit, lauari etiam caput tepidè. Ego quidem, si liceret, vellem acis

F Z ij

pi illud *ὑποπνέω*, id est, tepidè, metaphorice, pro modicè ac parom. Sed proprietas non videtur id ferre, sed significari, vt neque calidam neque frigidam balneum sit. Calidum enim dissoluit vires, frigidum auget cruditates, & frigidas fluxiones. Itaque si lauandum sit, tepidum sit balneum. Ego verò mallem esse nullum. Præter hæc enim, multa & magna auxilia scripta sunt ad hydropicos, ab omnium sectarum auctoribus.

B *Iansi pugili, cum natura esset vorax, euenit incidere in choleram morbum ex carnis esu, maximè verò porcinarum cruentarum, & ebrietate vini odorati, & placentis, & dulcarijs, & cucumere, pepone, & lacte, & potentia recentis. Æstate autem cholera morbus, & febres intermittentes grassantur.*

Ex ebrietate vini odorati (quod & calidum est necessarib.) & placentis & dulcarijs ex mellè, consentaneum est hominem calidum & exercitatum & *ὑποπνέω* incidisse: verum ex esu carnis porcinarum fluentium sanguine, quales scilicet sunt quæ crudiores, & ex cucumere, & pepone, & lacte, & potentia recentis, in morbos ex crudis succis videbatur potius casurus: proinde duorum aliter interpretor. Aut passionis choleriacæ vocati hic choleram morbum, aut morbos omnes seu febres putidas. Febres enim ex bile, aut biliosas vocare solet Hippocras. quæ ex quocunque succo putri generantur, interprete Galenò commentario aphorismi 42. septimæ. Atqui fortasse utrumque passum fuisse Biantem iohsuare voluit, verbis illis victimis, æstate autem *ὑποπνέω*, & febres intermittentes grassantur. Fortasse enim passus est biliosas, & vomitiones, & diæctiones, & febres putidas intermittentes, multiformes. Nimirum voracitas adeo multorum & diversorum intemperis ac citra ordinem ingestorum, non poterat non, & ventriculum vitare corruptione multa chyli, & debilitare vim in eo concoquendi, & retinendi, atque rotom corpus vitiosis succis & longè diuersis replere. Quorum illud, cholera morbum, hoc febres putidas inconstantes, natum est facere.

T *Timochari hyeme catarrhus accidit maximè in nares. Vienti venere siccata sunt omnia, lassitudo, calor superuenit: caput grauebatur, sudor à capite multus manans. Erat autem etiam per sanitatem sudare solitus. Tertia die conuulsus.*

Exemplum hoc est Timochares eius quod sexto epid. dicitur, ubi ita est scriptum, coitus morbis à pituita vultu. Nam hic oon habuisset malus à catarrho hyeme, tam breui, nisi Venere esset vsus. Quamquam profectò non enasit facile, sed difficulti & periculosa curatio. Nam superueniente febre cum grauitate capitis, & lassitudine, à quibus multò magis periclitatus est, quàm à catarrho. Hic enim tardior, sed minus periculosus est, si quis bono vultu se continens, liberetur à permutationib. in

A alios morbos acutos, vt pleuritidem, aut peripneumoniam: aut loquos, vt phthisim. Atqui per se ipsa per se curatio pituitolom passionum per Venere non haud est tuta, vt proprio loco indicabimus. Nam debilitat facultatem, & exhaurit spiritus: vnde ex acciderit crudis succis replere, & deliqua antit accrescere magis solet. Laborat etiam per Venere, repn & cerebrum, & totum netuorum geous, vnde enervationes, & paralyses, & vertigines, & cephalæ, & capitis grauitates fieri solent. Commouentur exagitanturque succi totò corpore, vnde lassitudines, & variz multas in partibus fluxiones, & obstructions. Calefcunt labore omnia: vnde putrescentiz, & febres fiunt. Hæc plus aut minus, vt cuique est appatatos, hoc est, vt cuique est naturale robur, corpus laxum, aut obstructionibus opportunum, bonus habitus, aut malus. Nam quibus firmum per sese est totum corpus, & habitus alioqui non malus, si qua pituita onne abundant, possunt Venere moderatè liberari, siccata & dissipata pituita. Quibus verò hæc bona non adeo insunt, si Venere vntur, grauius afficiuntur, atque diutius perisue ægrotant: aut si bonus ille quem descripsimus apparatus, neque valde adit, neque omnino desit, permutatione in acutum aliquod & graue facta, simul à recenti & veteri passione, breui liberabuntur. Potest enim esse hæc, etsi non tota, compendiarie tameo & brevis curatio, vt Timochari accidit. Quem sanè constat, neque infirmum admodum, neque admodum malè paratum fuisse, siquidem à lassitudine & febre tribus diebus se media hyeme expediuit. Æstate enim aut diariam habuisset solùm, aut fortasse nullam. Sed hæc præfati morbi decursum explicemus. Hyeme habuit catarrhum, maximè in nares, qualem scilicet solet vocare coryzam, sed quia addit, maximè, constat aliquid etiam fluxisse in palatum & fauces, vt plerumque in magnis catarrhis fieri solet. Morbus sanè fuit rempori satis congruens, vsus est Venere ita se habens, & siccata sunt omnia. Ne intellige siccata esse partes, & consumpta excrementa. Notum enim febris accidisset cum grauitate capitis, quæ sudore multo à capite soluta est. Nā ubi sudor ibimorbus, in capite ergo mansit morbos. Sed cum ob reododantiam aliquid prius incoctum ex ore & narisbus euacuaretur, siccata sunt emunctoria omnia, morbusque factus denud crudior. Nam labore caput repletum denud est, & calida etiam allexit cum crudis quæ continebat. Vnde velut affectum quandam phlegmonosum contraxit, atque ita siccaturum deono est cum capitis grauitate & febre: velut quum vltus quod medicocriter expurgabatur occasione aliqua inflammatur, expurgari desinit, ac sæpe febrem facit. Lassitudines febrib. ex catarrhis sunt familiarissimæ, quod per neruos aliqua pituita defluxio fiat. Huic superuenit copiosus sudor à capite, & adeo contulit, vt febrem insulserit, & caput degrauaueit. Itaque liberatus est homo à febre, & à catarrho magnopere subleuatus, tertià die à qua cœpit febricitare, quæ eadem Venere esset vsus. Non enim profectò tertià die à catarrho, quia eius constitutio non est adeo brevis. Sed ille quidem pro more producebatur, & intercurrente febre triduanà contractus est.

C aut si bonus ille quem descripsimus apparatus, neque valde adit, neque omnino desit, permutatione in acutum aliquod & graue facta, simul à recenti & veteri passione, breui liberabuntur. Potest enim esse hæc, etsi non tota, compendiarie tameo & brevis curatio, vt Timochari accidit. Quem sanè constat, neque infirmum admodum, neque admodum malè paratum fuisse, siquidem à lassitudine & febre tribus diebus se media hyeme expediuit. Æstate enim aut diariam habuisset solùm, aut fortasse nullam. Sed hæc præfati morbi decursum explicemus. Hyeme habuit catarrhum, maximè in nares, qualem scilicet solet vocare coryzam, sed quia addit, maximè, constat aliquid etiam fluxisse in palatum & fauces, vt plerumque in magnis catarrhis fieri solet. Morbus sanè fuit rempori satis congruens, vsus est Venere ita se habens, & siccata sunt omnia. Ne intellige siccata esse partes, & consumpta excrementa. Notum enim febris accidisset cum grauitate capitis, quæ sudore multo à capite soluta est. Nā ubi sudor ibimorbus, in capite ergo mansit morbos. Sed cum ob reododantiam aliquid prius incoctum ex ore & narisbus euacuaretur, siccata sunt emunctoria omnia, morbusque factus denud crudior. Nam labore caput repletum denud est, & calida etiam allexit cum crudis quæ continebat. Vnde velut affectum quandam phlegmonosum contraxit, atque ita siccaturum deono est cum capitis grauitate & febre: velut quum vltus quod medicocriter expurgabatur occasione aliqua inflammatur, expurgari desinit, ac sæpe febrem facit. Lassitudines febrib. ex catarrhis sunt familiarissimæ, quod per neruos aliqua pituita defluxio fiat. Huic superuenit copiosus sudor à capite, & adeo contulit, vt febrem insulserit, & caput degrauaueit. Itaque liberatus est homo à febre, & à catarrho magnopere subleuatus, tertià die à qua cœpit febricitare, quæ eadem Venere esset vsus. Non enim profectò tertià die à catarrho, quia eius constitutio non est adeo brevis. Sed ille quidem pro more producebatur, & intercurrente febre triduanà contractus est.

D aut si bonus ille quem descripsimus apparatus, neque valde adit, neque omnino desit, permutatione in acutum aliquod & graue facta, simul à recenti & veteri passione, breui liberabuntur. Potest enim esse hæc, etsi non tota, compendiarie tameo & brevis curatio, vt Timochari accidit. Quem sanè constat, neque infirmum admodum, neque admodum malè paratum fuisse, siquidem à lassitudine & febre tribus diebus se media hyeme expediuit. Æstate enim aut diariam habuisset solùm, aut fortasse nullam. Sed hæc præfati morbi decursum explicemus. Hyeme habuit catarrhum, maximè in nares, qualem scilicet solet vocare coryzam, sed quia addit, maximè, constat aliquid etiam fluxisse in palatum & fauces, vt plerumque in magnis catarrhis fieri solet. Morbus sanè fuit rempori satis congruens, vsus est Venere ita se habens, & siccata sunt omnia. Ne intellige siccata esse partes, & consumpta excrementa. Notum enim febris accidisset cum grauitate capitis, quæ sudore multo à capite soluta est. Nā ubi sudor ibimorbus, in capite ergo mansit morbos. Sed cum ob reododantiam aliquid prius incoctum ex ore & narisbus euacuaretur, siccata sunt emunctoria omnia, morbusque factus denud crudior. Nam labore caput repletum denud est, & calida etiam allexit cum crudis quæ continebat. Vnde velut affectum quandam phlegmonosum contraxit, atque ita siccaturum deono est cum capitis grauitate & febre: velut quum vltus quod medicocriter expurgabatur occasione aliqua inflammatur, expurgari desinit, ac sæpe febrem facit. Lassitudines febrib. ex catarrhis sunt familiarissimæ, quod per neruos aliqua pituita defluxio fiat. Huic superuenit copiosus sudor à capite, & adeo contulit, vt febrem insulserit, & caput degrauaueit. Itaque liberatus est homo à febre, & à catarrho magnopere subleuatus, tertià die à qua cœpit febricitare, quæ eadem Venere esset vsus. Non enim profectò tertià die à catarrho, quia eius constitutio non est adeo brevis. Sed ille quidem pro more producebatur, & intercurrente febre triduanà contractus est.

E aut si bonus ille quem descripsimus apparatus, neque valde adit, neque omnino desit, permutatione in acutum aliquod & graue facta, simul à recenti & veteri passione, breui liberabuntur. Potest enim esse hæc, etsi non tota, compendiarie tameo & brevis curatio, vt Timochari accidit. Quem sanè constat, neque infirmum admodum, neque admodum malè paratum fuisse, siquidem à lassitudine & febre tribus diebus se media hyeme expediuit. Æstate enim aut diariam habuisset solùm, aut fortasse nullam. Sed hæc præfati morbi decursum explicemus. Hyeme habuit catarrhum, maximè in nares, qualem scilicet solet vocare coryzam, sed quia addit, maximè, constat aliquid etiam fluxisse in palatum & fauces, vt plerumque in magnis catarrhis fieri solet. Morbus sanè fuit rempori satis congruens, vsus est Venere ita se habens, & siccata sunt omnia. Ne intellige siccata esse partes, & consumpta excrementa. Notum enim febris accidisset cum grauitate capitis, quæ sudore multo à capite soluta est. Nā ubi sudor ibimorbus, in capite ergo mansit morbos. Sed cum ob reododantiam aliquid prius incoctum ex ore & narisbus euacuaretur, siccata sunt emunctoria omnia, morbusque factus denud crudior. Nam labore caput repletum denud est, & calida etiam allexit cum crudis quæ continebat. Vnde velut affectum quandam phlegmonosum contraxit, atque ita siccaturum deono est cum capitis grauitate & febre: velut quum vltus quod medicocriter expurgabatur occasione aliqua inflammatur, expurgari desinit, ac sæpe febrem facit. Lassitudines febrib. ex catarrhis sunt familiarissimæ, quod per neruos aliqua pituita defluxio fiat. Huic superuenit copiosus sudor à capite, & adeo contulit, vt febrem insulserit, & caput degrauaueit. Itaque liberatus est homo à febre, & à catarrho magnopere subleuatus, tertià die à qua cœpit febricitare, quæ eadem Venere esset vsus. Non enim profectò tertià die à catarrho, quia eius constitutio non est adeo brevis. Sed ille quidem pro more producebatur, & intercurrente febre triduanà contractus est.

F aut si bonus ille quem descripsimus apparatus, neque valde adit, neque omnino desit, permutatione in acutum aliquod & graue facta, simul à recenti & veteri passione, breui liberabuntur. Potest enim esse hæc, etsi non tota, compendiarie tameo & brevis curatio, vt Timochari accidit. Quem sanè constat, neque infirmum admodum, neque admodum malè paratum fuisse, siquidem à lassitudine & febre tribus diebus se media hyeme expediuit. Æstate enim aut diariam habuisset solùm, aut fortasse nullam. Sed hæc præfati morbi decursum explicemus. Hyeme habuit catarrhum, maximè in nares, qualem scilicet solet vocare coryzam, sed quia addit, maximè, constat aliquid etiam fluxisse in palatum & fauces, vt plerumque in magnis catarrhis fieri solet. Morbus sanè fuit rempori satis congruens, vsus est Venere ita se habens, & siccata sunt omnia. Ne intellige siccata esse partes, & consumpta excrementa. Notum enim febris accidisset cum grauitate capitis, quæ sudore multo à capite soluta est. Nā ubi sudor ibimorbus, in capite ergo mansit morbos. Sed cum ob reododantiam aliquid prius incoctum ex ore & narisbus euacuaretur, siccata sunt emunctoria omnia, morbusque factus denud crudior. Nam labore caput repletum denud est, & calida etiam allexit cum crudis quæ continebat. Vnde velut affectum quandam phlegmonosum contraxit, atque ita siccaturum deono est cum capitis grauitate & febre: velut quum vltus quod medicocriter expurgabatur occasione aliqua inflammatur, expurgari desinit, ac sæpe febrem facit. Lassitudines febrib. ex catarrhis sunt familiarissimæ, quod per neruos aliqua pituita defluxio fiat. Huic superuenit copiosus sudor à capite, & adeo contulit, vt febrem insulserit, & caput degrauaueit. Itaque liberatus est homo à febre, & à catarrho magnopere subleuatus, tertià die à qua cœpit febricitare, quæ eadem Venere esset vsus. Non enim profectò tertià die à catarrho, quia eius constitutio non est adeo brevis. Sed ille quidem pro more producebatur, & intercurrente febre triduanà contractus est.

& opetantur homines, illud est quod spectat ad inferna. Accedit, quod illud est longius alijs, & fractio magis opportunam, & sitam inter duos articulos maiores, vt vel ea causa facilius inde homo conuelleretur. Itaque fractus est huic digitus in dextera manus dextre in ipso digiti principio, iuxta metacarpium. Fortasse non est à principio rectè curatus, neque nudata sunt ossa quantum oportuit, neque ossiculorum fragmenta coalescere inepta, extraxerunt. Fortasse etiam, citra chitnegorum erratum vllum, ob malum corporis apparatus inflammationem successit, & sphacelus, hoc est, ossium corruptio, & febris. Per alium purgans est moderatè: non explicat satis, pharmaco, an sponte: suspicor tamen pharmaco, quia alio qui diceret, vt soler, alius soluta est moderatè. Accedit quod secundum artem fit, vt qui vulnera habent, quacunque ratione magna, aut maligna expurgentur. Erat verò hoc, ob partem articulus adeo proximam, magnum. Non occurrit hic scriptum quò die, tamen in libro septimo reperitur hæc eadem historia; ibique explicatur, quinto die à læsione fractum expurgationem esse. Neque mirum: infunderentur enim quatuor primi in missionem sanguinis, & sedandam inflammationem. Calores, hoc est, febres mites facti sunt, sed dolores, putrescentia tamen non cessauit, sed particulæ quedam digiti decidebant. Post septimum & exibat sanies moderata, non sanè qualitate, sed quantitate. Post hæc cepit non posse mouere linguam: prædictum est à medico fore ægrotum opisthotonicum. Iuabant hanc coniecturam buccæ quæ inter se erant conseretæ, & ad ceruicem retractæ, vt non posset homo os aperire. Nam lingua difficilis motus exit, guum iedrium erat opisthotoni. Conuulsiones quidem inditium erat mediocre, opisthotoni tamen perexiguum, nisi accederet menti & buccarum in cernicè adductio. Illud enim nihil erat aliud quam in posteriorem partem trahi. Tertiâ die qua linguam malè mouere cepit, conuelleratur iam totus in posteriora cum sudore. Sudor quidem fectus qui conuelleratur, ob anxietatem quam difficilis motus musculorum facit. Sextâ die à prædictione, hoc est, ab eâ die quâ cepit lingua malè moueri, mortuus est conuulsus. Comedio, quamquam Hippoc. non dicit a pertè, fuisse decimam quartam ab ea quâ est percussus: Nam post septimam, hoc est octauâ, decide quiddam è digito, & exiit sanies; post ea, hoc est nonâ, cepit linguam malè mouere; tertiâ ab hac, hoc est vndecimâ conuelleratur; & additis alijs tribus, facta est sexta à nonâ, & decima quarta à primâ, quâ mortuus est.

Harpali filius ex Telephane liberta luxationem infra magnum digitum accepit. Inflammatus est cum vehementi dolore, quæ cum essent remissa, in agrum profectus est, redeunt lumbi doluerunt, lauit, maxille sub noctem coharebant, & opisthotonus aderat. Spumosa salina vix per dentes foras prodibat. Tertiâ die mortuus est.

Quum dixit *extremum parvum digiti*, v. pollicem pedis intelligit. Hic eodem mortis genere obiit quo pro-

Aximus ægrotus, cum opisthotono scilicet, qui à confectione seu alligatione maxillarum incepit, ex occasionem non omnino eadem sed simili. Sunt ambo accommodatissima exempla, periculorum quæ ex articulis nascuntur. Alter enim ex fractu digiti manus, alter ex luxatione pedis, in opisthotonum incidunt. Quem morbum tertiâ die interimere scriptum est lib. 3. de morbis. Quod his duabus historijs rectè confirmatur. Ambo enim sunt mortui die tertiâ ab ea qua opisthotonici sunt facti. Hic haud dubiè læsus est quam plurimum, quod recens repositio digito, cum deberet quiescere, & si quid inflammationis superesset ex repositione, solute, profectus est in agrum. Ex labore enim excitato nouto dolore in pede, conuocata est fluxio noua, quæ, reititudinis gratia, læsit primum netuum radices in lumbis: sed secundum medullæ spinalis rectitudinem procedente compassione, conuulsio cepit à neruorum origine, & factus est opisthotonicus, maxillis aded constrictis (constringuntur enim maxillæ temporarijs qui neruos accipiunt à tercio & quinq. pari neruorum cerebri) vt vix exiret salina per dentes. Necessè autem erat exire spumofam ob æstum thoracis, quem difficilis respiratio faciebat, vt scilicet adesset spuma circa os ijs qui strangulantur.

Thyrinon Damonis filius vlcens circa tibie malleolum habebat. Cum iuxta neruum iam denudatum medicamento morderetur, opisthotono mori consigit.

DNetuum iam patum nudatumque medicamento mordaci tangere, non caret periculo conuulsionis, ob acrem enim sensum sustinere non potest, & trahit in compassionem neruorum originem, vt huic euenit. Innit satis locus. Nam iuxta malleolum prætereunt nerui satis multi, vnos præcipuè insignis magnitudinis, qui ex neruis vltimarum vertebrarum lumborum, & ex primis sacri ossis conflatus est, ex quo etiam alij, qui iuxta tibiam decurrunt, decedunt. Verum etiâ occasionem præstitit locus, & nerui nuditas, & medicamenti mordacitas, suspicor temporis constitutionem vehementer iuuissè, fiebant enim eo tempore multæ opisthotonici, Vt hinc intelligamus cauenda nobis semper esse ea, in quæ tempestatis conditio videatur inclinare. Leui enim causa itrea inciditur, & quæ salubribus tempestatibus nihil, aut leuiter hesissent, insalubribus faciliè eas quæ sponte grassantur, inducunt passionem. Velut hac tempestate, prior quiddam agnum exisset, alter vlti medicamenti actiois (quæ causæ insalubres quidem sunt, non tamen perniciose) opisthotonici sunt facti, & interierunt.

Certè in omnibus suppurationibus, & oculorum affectibus, sub noctem labores contingunt.

In prognostico ita scriptum est, omnes suppuratores ijs signis cognoscere oportet, primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem te-

nus est, noctu vero amplior. Hoc est quod nunc dicit, in omnibus suppurationibus sub nocte labores contingunt. Huius causam in commentario prognostici reddimus. Quod de oculi affectionibus nunc addit, oportet explorare. Oculus plerumque patitur recipiens ex cerebro: cerebrum vero malè affectum, & excrementis redundant, consentaneum est lædi somno. Siquidem somnus causa est similis cerebro, nam frigida & humida. Est etiam cerebri passio, sique eo obstruatur. Obstru-ctio vero, quod in illud per somnum humores accurrant. Cacoehymix ergo cerebri confluxu non accedente, necesse est illud lædi. Quod si somno læditur, & nocte necesse est lædari. Nam præter quàm quod noctu somni sunt, ipsa per se nox est analoga causa somno, humida enim est & frigida: & ut luce ac calore succi enocantur & dissipantur, ita tenebris reconduntur, & densantur. Itaque nocte etiam lædi cerebrum, aliqui malè affectum, & excrementis redundant, est consentaneum. Atque ita fit, ut capitis grauitas, & catarrhi, & conuulsi motus, quin & deliria nocte potius crescant. In quam sententiam 4. de ratione victus, ita habetur. Noctes autem plusquam dies delirii significationem præbent. Læso vero nocte cerebro, necesse est lædi quæ per compassiones cum eo laborant. Nam, ut apertius in re proposita dicatur, cum cerebrum mittat in oculos ob redundantiam, & nocte plus redundet, facta humorum accessione, tunc quoque plus mittet.

Tusses hyeme grassantur, præcipuè flante Austro. Cum crassa & multa alba excreascent, febres superueniunt & quinta die cessabant, tusses autem circa quadragesimam, velut Egesipoli contigit.

Non dicit tusses flante Austro vigere, docens eo tempore sæpius accidere, & magis flante Austro quàm Aquilone, (contrà enim hec res habet) sed narrat quod alicubi per hyemalem quandam constitutionem accidit. Nimirum hyems austrina, & corripiebantur multi rursi, quæ plerisque durabat quadragesima dies, ut morbus neque omnino diuturnus, neque acutus. Possunt enim homines rursi ob Aquilonem & ob Austrum, quod illum quidem, quia penetrat, mordet, & refrigerat spirituales partes, & si quid succi redundat in capite, velut exprimit: ob hanc vero, quia caput humectat & replet, unde fluere etiam evenit ob redundantiam. Hinc fit, ut tusses ex aquilone sicciores sint, ex austro humidiores, ac per quas plura excreantur & crassiora, quia scilicet flante Austro copiosior sit effluxus. Febres etiam natæ sunt magis fieri ex austrina tussi, vel ob hoc ipsum, quod ex maiori pendente excrementorum copia, vel quod ea ipsa quæ redundant calida & humida sunt, vel quod ipse aer valde fit putrefaciens. Sequenbantur ergo dictæ tusses conditionem temporis, febres vero erant tussis symptomatica (tussim voco eam affectionem capitis & pectoris, quæ tussim facit) quæ superueniebant redundantia: durabant vero minus quàm tusses, quia ipse suam causam consuebant. Tusses vero

A cum minore humorum copia persequerare poterant quàm febres.

Eutychidem ex cholera morbo dissentio nervorum in cruribus corripuit cum inferna alui deiectione. Bilem impensè coloratam, multam, & valde rubram per tres dies noctisque euomit, & impotens erat & anxius. **B** Nec quicquam ex potu aut cibo continere poterat, & urina multa aderat suppressio & meatus inferioris. Per vomitum fæx mollis prodijt, & deorsum erupit.

Cholera seu choleram morbum vocant medici malum quoddam acutum, in quo simul vomitione & deiectione laborant ægroti cum retinendi impotentia. Cur ergo vocat hæc cholericæ, si deiectionis per inferna erat suppressio? Porro si hæc suppressio aderat, quò pacto dicere deiectionem in nervorum dissentionem in cruribus cum inferna alui deiectione, & rursus mollem fæcem simul reiectam esse vomitu, & deorsum erupisse? Hæc solutio ex figurata loquutione pender, quam cum explicuero, narratio euadet apertissima. Imprimis nomen cholæræ ei præcipuè tribuitur morbo, per quem euomit simul & deieciunt deorsum ægroti, sed etiam cum sine his euacuationibus, à fluxu prauorum humorum, solis irritationibus cruciatur venter supernus, vocabatur cholera antiquissimis. Nam 4. de ratione victus in acutis dicitur Cholera sicca, per quam nihil euomitur, sed nauseatur tantum. Potiori ergo ratione hic affectus dicitur Cholera morbus, tametsi à sola vomitione inceperit, qui in utraque simul euacuationes processit? Sed narrationem iam exponamus. Eutychidem (inquit) ex cholera morbo dissentio nervorum in cruribus corripuit cum alui deiectione, hoc est, cum Eutychides cholera morbo laboraret, desijt malum in tetanos crurum, & in deiectiones. Hoc dicit per præoccupationem, narrans primum morbi exitum. Nimirum huius morbus in deiectiones & tetanos finitus est. Post hæc redit ad morbi initium, narratque totius figuram & decursum, dicens, per tres dies & noctes multam bilem impensè flauam & valde rubram euomit, & impotens erat & anxius. Nec quicquam ex potu aut cibo continere poterat, & interim multa aderat urinae suppressio, & meatus inferioris. Post hæc, quartæ scilicet die, successit vomitu liquidæ fecis, simulque cepit eadem fæx deorsum deijci, atque cum hac deiectione finitus est malum in crurum tetanos. Hæc est narratio. Porro autem dubitari, quò pacto vomeret bilem impensè flauam & impensè rubram: Si enim ambas simul, commixtasque, neutrum poterat esse summè. Quò pacto enim insint eidem rei duo colores impensè ambo? Si verò seorsim utramque, aut secundum diuersas partes utriusque, qui possit bilis vlla impensè rubra esse? Rubram enim est sanguinis solius, ne dum impensè rubrum. Si his omnibus rationibus & aliis rationibus diuersi colores significantur, haud dubie exibat deorsum rubrum & flauum, vel secundum diuersas partes malè permixtum. At illi quibus places

ferentia Auicennæ, speciem quoadmodum bilis rubræ esse dicentis, interpretabatur hanc esse quam homo hic enomuerit, vocari verò impensè rubram non simpliciter, neque ad rubrum sanguinem, sed ad bilem, ut quidam fuerit hæc, quam maximè bilis esse potest rubra, fuerit verò omnino subrubra. Sin autem nulla talis est bilis species, sed omnis color ruber ad sanguinem pertinet, fortasse nomen *εἰσπύλον* capitur improprie pro flauo, aut bilis rubra dicitur quæ cum sanguine mixta sit: atqui fortasse huic, ventriculi velicatione, venulæ aliquæ rupes sunt, & inter alias summe flauas, quædam etiam bilis partes, rubore sanguinis tinctæ exierunt. Primis igitur tribus diebus tantus factus est, bilis toto corpore redundantis impetus in superiore ventriculo, vt ob eam causam ventriculus nihil posset continere, & vrina ac reliquæ infernæ euacuationes essent suppressæ, nimirum succis suis sum latiss. Hæc autem cum fierent, necesse erat hominem esse impotentem & anxium, hoc est, debilem, nec potentem se vilo loco continere, sed lætare hac & illac. Nihil est enim quod adeo affligat, atque oris ventriculi laceratio. Bilis autem quæ in ventriculo effluerat, maxima parte iam euacuata, coepit pro bile fixa mollis euomî: remittente verò iam hac euacuatione, & naturæ vi in contraria per lumbos versus crura nitente, nervus qui maximè & ex multis confici, à lumborum vertebis & osse sacro oris, illac feruntur, occupauit humor, atque ita simul & alius faciem mollem copiose defecit, & crura rotato sunt correpta. Nimirum, vt libro 2. sectione prima dicebatur. Abscessus aut per venas, aut tonos, aut per ossa, aut nervos, aut cutem, aut alias conuersiones. Hæc eadem historia repetitur, vt multæ aliæ, libro septimo eisdem prorsus verbis, præter quàm quòd illic post illa verba, & valde rubram; interiecta sunt hæc (post vomitum bibi) quæ nihil adeo ocatu digram addunt, aut detrahunt sensui. Ego confecto ob vomitum eruentum datam esse ei potioem aliquam refrigerantem & adstringentem, iuxta aphorism. trigessimum septimum sectionis quintæ.

Androphani vocis, interceptio & delirium aderat, quibus solutis diu adhuc superstes fuit, & recidina contingebant. Lingua autem toto tempore sicca permanebat, ac nisi collueretur loqui non poterat, & plerumque erat admodum amara, aderat autem aliquando cordis dolor, quem vena scissio soluebat. Huic aqua aut multa potio contulit. Hellebotum nigrum bibit, nec quicquam bilis sum præter paucum prodixit. Tandem cum per hyemem decumberet, mentis compos non erat, & similibus lingua affectibus afficiebatur, calor aderat tenuis sine dolore, lingua decolor, vox qualis est Peripneumonici, à pectore vestes rejiciebat, & educi se iniebat, nihil autem poterat apertè. Sub noctem vitam finivit.

Huius ægroti morbus narratur aliquanto distinctius in septimo libro, additis oon paucis verbis,

A quæ hic defunt, quapropter lubet eis narrationem in eum locum differre. Occurret illic sub nomio. Androthali. statim post historiam Pherecydæ.

Nicanoris affectus talis erat, quum in conuiuium progrediebatur, tibi cina timorem incutebat, adeo vt statim ac inciperet tibia sonus, cuiusque in conuiuium audiret, præ timore turbaretur, vixque se sustinere posse affirmaret, quum nox esset; cum verò interdum audiret, nihil commoueretur. Talia illum diu commitantur.

Melancholia morbo tenebatur hic. Est enim eòs passionis proprium sine causa timere, & morere. Vix autè recenseri possunt differentie timoris, quibus tales corripiuntur. Quæ sapè ex differentia in sanis (semper enim infania quædam hos committitur, tametsi simpliciter infanire non dicantur, donec omnibus iam videantur apertè dementes) seu læsionis imaginationis nascuntur: nōo tamen poteris singularum proprias causas reddere. Velut nunc, cur timebat sonitum tibis potius quàm quippiam aliud? Porro quid habebat is sonitus cum pota commune, vt tunc timeret maximè & conturbaretur, cum eò potante tibia inciperet sonare? Certè ita erat vitata imaginatio, vt occurreret illi hæc vt terribilis quædam spectra. Quòd hæc eadem terrent potius nocte quàm iocerdium, facile intelligi potest causa. Ipsa enim nox terribilis est omnibus, qui non longè absunt à timore. Quæ ob hoc igitur timendi causa interna illis adsit, nocte maximè illi efficiet, præcipue si timoris eiusmodi causa in nigritiem succi, & velut internam spirituum animalium noctem rejiciatur. Itaque melancholicus erat hic, nam talia diu commitabatur illi. Metus verò & miseria sue causa, longo tempore perseverantes, melancholiam indicant. Horum summa curatio est, per inferna vehementius purgare, vt in aphorismo dicitur, idque medicamento nigra extrahere.

Damocles qui apud illum erat, cæcutire ac exsoluto corpore esse videbatur, nec ad præruptum locum accedere, nec super pontem aut minimam fossam altitudinem transire, sed per ipsam fossam transgredi poterat. Hoc aliquandiu illum detinuit.

Hic melancholicus simul erat & vertiginosus, eà vertiginis specie, quam quidam appellat tenebrosam, seu tenebrosam. Huius enim symptoma est, non tam videri omnia circumagi, quàm cæcutire. Hi etiam, & omnes vertiginosi, sentiunt quandam velut corporis dissolutionem, & præcipue timeant cadere, si in loco aliquo sublimi sint, aut rem fluentem despectent. Proinde caecum accedere ad precipitia, & aquam à pontibus spectare, & foveas transilire. Quæ species nigri humoris accedit, quod in his tenebrosis vertiginibus conuenit, accedit timor melancholicus, venique res iam ad aliquam spe-

ciem infamē, vt non solum sublimes pontes prætereire, sed neque exiguis omnino serobes, aut aque lauee riuulos transire audeant, sed per ipsos serobes, & medium lustrum procedant. Hos quoque oportet purgare vt priores, medicamento vero, quod præterquam quod sit melancholagogum, & vebemens, respiciat caput, veluti fortasse hiera diacolocynthidos Galeni, aut Archigenis, quibus ego vtor secundum syngraphas Aenij. Doque 3. iij. Interim continendi sunt in loco obscuro quieti, in victu vitanda cacochymia, flatuosa, & caput repletia. Mittitur etiam his aliquando sanguis vtiliter, vt & melancholicis, & eisdem distinctionibus adhibitis.

Talis erat Phœnicis affectus, ex oculo dextro plerumque velut fulgur elucere videbatur, cum autem aliquandiu continuisset, dolor in tempore dextro insisteret, & posteriorum vertebraarum contentio aderat, & circa dentes durities, quos distensus deducere tentabat. Vomitus si aliquando contigissent, prædictos dolores auertebant, aut mitiores faciebant. Verum vena sectio etiam conferebat, & bellebori potus eduxit omnis generis humores, maxima autem ex parte porraceos.

Hic laborabar hemictania, ex bile viti in atræ bilis naturam incipientem degenerare. Nam dolor oculi dextri, & temporis etiam dextri, & posteriorum vertebraarum contentio, & durities circa dentes (quod etiam non dicat; eiusdem lætæ intelligi debere, rationi esse consentaneum intelliges, mox ac causas singulorum appofuerimus) hemictanæ suæ evidentia inditæ. Causæ verò speciem indicabant exentia, nam exibant porracea, quæ, nisi in ventriculo ipso ob speciem edaliorum genita sint, ingentem vitionem significaret: exibant verò etiam omnis generis humores. Quod arbitror in aliquam nigritiem etiam vtendo processissent, aliqui etiam fortasse incoctissimal cum acribus euacuarentur, quamquam propriè materiæ morbificæ partem non componerent. Quoniam verò calidiorum succorum redundancia ad hepæ plerumque pertinet, vt frigidiorum ad ventriculolum, aut liegem; meritis in hoc quoque mittens pars, ac velut fons, origo quæ morbi putatur fuisse hepæ calidum, cum præcipue dolens lateris rectitudo in illud nos fectat. Itaque ferebantur biliosa affatim ab hepate sursum secundum dextrum latūs, per venas, à quibus refundebantur etiam in arterias. Prius verò replebantur arteriæ (ita vt sit ob assideam dilatationem, quam faciunt more solium) fumis biliosis, quos ob calidam naturam fumos potius, quàm flatus vocamus. Fumi igitur illi flauī, obuerfantes cum spiritibus visorij, speciem faciebant fulgoris. Cum autem homo oculum contingisset aliquantulum, ac conclusisset vitandi fulgoris gratia, accidebat vt sumi resisterent in venas & arterias proximi temporis (quæ pars ab huiusmodi causis crebèrè dolet, ob valorem, quæ ibi sunt, magnitudinem) aut in eas quæ maxime ac copiosissimæ sunt in ce-

A rebi basi, quæ exoritur spinalis medulla, & ita dolor insisteret, aut in tempore, aut iuxta spodylom, primum scilicet quo caput spinæ coarticularur, mox utique antrosum, & retrosum, aut etiam iuxta secundum, quod etiam dici solet ab Hippocrate densiforme ob figuram, quo caput circum ducitur. Accidebat etiam huic (dicit) *hæmian*, & durities circa dentes. Explicat verò mox, quid vocet contentionem & duritiem circa dentes, dicens, deducere tentabat distensus. Itaque ille deducere non facile poterat, sed hærebant infiores superiores, velut cum quadam partium tensione, & immobilitate, atque si vi deduceret dentes, velut distendi partes sentiebat. Hoc sanè videbatur necessariò futurum ob affectionem temporis. Cum enim musculus temporis sit primus maximusque masticatoriorum, & qui maxillam inferiorem adiecit ad superiorem, plenis vasibus temporis, musculus cum necesse erat tumere, ac inflammari, & ita contrahi, & inferiores dentes adduci, adduci autem violentur. Sed & sanatio indicat, restè de affectione & eius causis coniectarum esse. Nam conferebat venæ sectione, temperando (arbitror) bepar, & laxando vasa, & expurgatio per helleborum, quia euacuabentur qualia euacuari oportebat, omnis enim generis humores, & præcipue portacei. Interim si aliquando vomitus contingeret, dolores tollebantur: aut minores euadebant. Quia etiam dolor non accideret per consensum cum ventriculo, tamè quæcumque excrementorum copia in ventriculo collecta esset, non poterat tunc adaugeri capitis affectus crebrè enasporatione. Verum considerata non dicere Hippocret. sanatum fuisse hunc venæ sectione, & potu hellebori, sed missionem sanguinis & potum hellebori contulisse, significat scilicet ipsa phrasis, hæc non semel esse acta, sed pluries, ex quibusdam intervalis longis; ita vt sit, repetita.

B

C

Parmenisco etiam prius desperatio accidebat, & migrandi è vita cupiditas, interdum autem animi tranquillitate rursus fruebatur.

E

Post hæc verba, quæ in septimo libro, & aliis quàm plurimis reperuntur, adiecta est quedam hystoria morbi, quem in Olinrho passus est hic idem Parmeniscus, quam postquam hæc enarrauerō, ego hoc loco adscribam, & enarrabo, ne quis cogatur, eiusdem ægroti hystoriam in duobus locis querere. Mœstitia & desperatio melancholicis est familiaris, sed his ipsi accedat aliquando sine vlla occasione letitia suffundi & ridere. Nimirum cūm mentis non satis constet, solent ad insaniam vtrumque facere, nunc nulla de causa mœtere plurimum, nunc plurimum letari. Frustra verò videretur peti ratio insatiendi, cum nec contigat, vt ille dicat, cum ratione insanire. Sed in ipsa corporis affectione causam ego dixerim esse hæc, quod licet nullum est sterquilipom quod pati semper modo exhalat fetorem, sed maiorem modo agitur commoueturque: sic etiam & multo magis omnes morborum causas, quibusdam temporibus, aut certo quodam ordine, aut erratico modo agitentur necesse est, vt melancholici nigrit vaporibus mentis sedem occupantibus

moreteat, & aliquando copioſa effuſatione ceſſante, & ſucci nigri motu ſedato à meliſticia liberentur. Atque cum nulla letitiae maior cauſa ſit, quàm fugata meliſticia: vt & voluptuſus fugatus dolor: neceſſe eſt aliquando lateant ſine vlla externa cauſa plurimum, ſoluti à plurima meliſticia, quæ ſine externa cauſa inerat, iuxta id quod Socrates dicit in Phædone, cuius hæc ſunt verba. Quam mira videatur, o viti, hæc res eſſe, quam nominatim homines voluptatem, quamque miro naturaliter ſe habet modo ad dolorem ipſum, qui ei contrarius eſſe videtur. Quippe cum ſimul homini ad eſſe noſint, tamen ſi quis proſequitur capite alterum, ſemper ſecundè alterum quoque accipere cogitur, quali ex eodem vertice ſint ambo connexa. Poſt hæc in ſeptimo libro ita ſcriptum occurret. *In Olyntho autem aliquando Autumni tempore prinatus voce & quietus decubuit, vt vix paucum quiddam proloqui aggrediretur. Quin etiam ſi quid locutus eſſet, rursus voce prinabatur. Somni aderant, aliquando verò vigilie, & iactatio corporis cum ſilentio, atque anxietas, & manum hypochondrii quaſi dolorem patiens admovebat; aliquando verò avertſus & quietus decumbebat. Febris verò ſemper manebat, & facillè ſpirabat. Tandem ſe ingredientem cognoscere dixit: aliquando verò per totam quiddam diem & noctem potum etiam oblatum reſpuebat, aliquando verò vnuſ de repente arripit totam chibebat aquam. Vrina craſſa qualiſ eſt iumentorum, circa diem verò decimam quartam remiſiſit.*

Hic ſunt morbus acutus. Febris enim perpetua conſtitutionis dierum quatuordecim, ſuperueniens melancholiz duntaxat. Quo factum eſt, vt præter febreſcem; & eius accidentia propria, ad eſſent multæ accidentia melancholiz. Cuiusmodi illa. Nunc nimia quies & taciturnitas; nunc nimia iactatio & inquietudo. Nimia etiam & rapida potatio, & nimia potus auerſatio. Et alia omnia, quæ infaniz quondam ſpeciem præ ſe ferebant, melancholiz familiaritatem. Sed ſatiùs fuerit ſingula percurrere, & quas conieciari poſſimus cauſas, adicere. In Olyntho (inquit) aliquando autumni tempore (quo ſcilicet maximè vigere melancholici morbi ſolent) decubuit æque, *αὐτὸς ὁ αὐτός*, hoc eſt taciturnus neque ſe mouens in lecto. Explicat mox quàm eſſet taciturnus; dicens ita vt paucum quiddam vix proloqui conareretur: iam verò ſi quid eſſet locutus rursus prinabatur voce. Hiſ verbis ſignificatur, illum ita iacuiſſe taciturnum; vt parum quiddam loqueretur, atque id quantulumcumque, vix vt videretur poſſe loqui, aut loqui moleſtiſſimè ferret, & mox rursus conieſceret. Quod quidem non eſt referendum ad aliquod inſtrumentum vitium, ſed ad animi affectum. Non enim quod loqui non poſſet, ſed quod ob morem nolle, tacebat. Neque dicitur *ἡσυχία ὁ αὐτός*, quod lingue corporale aliquod eſſet impedimentum, ſed quia male obſequuntur inſtrumenta omnia, quum appetit renouit, ſequè taciturnitas illa, & requies nimia meliſticiam indicabat. Morem verò eſſe melancholicum acciſſens, ſatis conſtat. Somni (inquit) aderant, aliquando verò vigilie & iactatio cum ſilentio. Melancholiz familiares ſunt vigilie ob ſicciam intemperiem, tamen alia ratione etiam hi ſunt aliquando veluti comatoſi, ob meliſticiam ſcilicet. Vi-

A demus enim eos qui triſti & demifſo animo ſunt, in ſomnum inuitos ferri, qui quidem non tam eſt ſomnus, quàm vigilandi impotentia. Hic igitur, nunc ob ſucci naturam vigilabat, nunc concidentem animo dormiebat; & nunc vigilabat quieſcens, quum ſuccus minus movebatur: nunc iactabatur, cum ſuccus agitatus inſtigabat. Semper autem ſilēbat, quod ea incidiſſet infaniz ſpecies. Addit, *ἡ δὲ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ὡς καὶ ἡ φρενὸς ἐκείνης*, hoc quidem melancholicum etiam eſt. Plurimi enim melancholicorum ſunt hypochondriaci. Alijs nou raro conſentit ventriculus cum cerebro. Quapropter per paucorum ſunt, quibus non accedat etiam hypochondrijs anxietas, alijs quidem maior, alijs quidem minor. Id verò quum ſit, naturaliter videtur manus in eam partem ferri. Aliquando verò avertſus iacebat quietem agens. Dicitur eſſe eum aliquando iacuiſſe ſine motu: nunc dicit aliquando immobilitati & ſilentio adieciſſe avertſionem, vt non tantum alloqui nolle, ſed & videre reſuſcit, quod maius adhuc indicabat tardium. Febris verò (inquit) ſemper manebat & bene ſpirabat, melius ſcilicet quàm alij febricitantes ſolent. Cuius cauſa eſt, quod mala melancholicorum in cerebrum & hypochondria incumbunt magis, quàm in thoracis partes. Poſtea, inquit, dixit, cognoscere ſe eos qui ingrediebantur. Poſtquam ſcilicet conueſus à pariete eſt, interrogatus an agnoſceret, dixit ſe agnoſcere, ac fortasſe nominatim ſingulos. Quod ſane non eſt tantum dignum admiratione, ſepe enim euenit, & ad tempus mente conſtat huiusmodi homines. Atque poterat etiam agnoſcens omnes delirare, læſa ratione ſine imaginatione: habere verò (inquit) quandoque tota die & nocte nolebat, etiamſi tribuerent qui aderant, quandoque verò vnam repente arripens, aquam bibebat totam. Hoc quoque acciſſens vidimus ſæpe in infanientibus ex melancholia: vt quidem potum non petant, etſi vrantur febre, ſola mens alienatio ſoler facere, quia ij quibus mens agrotat dolores non ſentiunt. Tamen vt ne admodum quidem vltro oblātum velint accipere potum, ſemper ex infano aliquo timore procedit, velut plerumque imaginantur offerri ſibi in potum mortiferum aliquid, paratque ſibi ab offerentibus inſidias. Tali aliquo ſuſpicio de cauſa, hunc per diem & noctem potum reſuſcit. Quandoque verò euaneſcente ex imaginatione, & vrgente ſiti, repente arripit vnam, & tunc quoque ſine modo habere totam aquam. Cum morbus intra ſuam contributionem conſequutus eſſet concoctionem, iudicatus eſt homo per vnam. Nam proceſſit vrina craſſa qualiſ eſt iumentorum, & circa decimam quartam requiſit febris. Morbis melancholicis accommodatiſſimæ euacuationes ſunt, deieſtio & miſtio: illa quidem hypochondriaciſ magis, hæc reliquis; quia craſſa & ſæculenta multo melius euacuantur per has vias: quæ circa hypochondria hærent, per ventrem: quæ in venis totius corporis, per reſicam. Nam ſudoribus euacuantur ſeroſa: fluxu ſanguinis, ſanguis totus: vomitus non ſemper eſt euacuatione vniuerſi corporis.

Cononis serua ex incipiente capitis dolore fuit mente alienata, vociferatur aderas, eiulatio multa, rara quies, circa quadragesimam diem mortuus est. Decem autem diebus antequam moreretur, voce destituta & convulsa fuit.

Ratio quidem adstipulatur, sed & experimento cognoui, in ijs qui à dolore capitis delirare ceperint, vociferationem, clamores, & inquietudinem, imminentem convulsionem significare. Eueniunt enim ea ob nervorum passionem, in quorum radices imbibantur excrementa. Quum ergo caput ea recipit, eius dolor accidit: quum iam repletur, & putrescentia viriat cerebri temperiem (vr in phreniticis) aut nigrities obtenebrat sensuum internorum fulgorem (vr maniacis) laeditur mens. Postea quò non continent se humores in mètis cellulis, sed occupant nervorum iudices, fit corporalis passio, quæ vocatur convulsio. In ea succi in corpus (vr dicit Hipp.) conuersione, necesse est excitari dolores grauissimos, ob actum sensuum nervorum, atque ob id vociferari, & clamare, etsi ob insaniam, qua parte doleant narrare nesciant. Itaque malum à magno capitis dolore incepit, processit usque ad delirium, dumque in convulsionem abibat, vociferabatur, clamabat, & inquieta erat. Facta iam convulsione, voce destituta est, quod & vocales musculi tenerentur donec occupante iam (arbitror) omnia respirationis instrumenta convulsione, circa quadragesimam, quæ morborum non planè chronicorum finis est, mortua sit. Simile quoddam euenit infantibus epilepticis. Cum enim eos iam iam inuadunt paroxysmi, clamant miserè, sed convulsione iam occupati ne vocem quidè possunt emittere.

Adolescens quidam post multum meri potum in tentorio quodam supinus dormiebat. Huic in os serpens Arges irrepit, & cum sensisset nec posset loqui, stridit dentibus, & serpentem denouit, & vehementem dolore afflictebatur, & manus efferebat, vt qui strangularetur, & iacebat seipsam, & convulsus mortuus est.

Hæc historia mirabilis, admonet non esse rurum hianci ore sopitum iacere, supinumque in solo reptilibus pleno, vr solent rustici: idem enim accidere quod huic, qui vino mero plenus iacebat, quid prohibet? Quamquam qui lacte pleni (vr etiam fit) dormiunt, periculo sunt magis opportuni, quod lactis & odor & sapor reptilibus omnibus sit incandissimus. Vini etiam aestus, præcipue si cum alijs ingestum sit, sugantur potius. Arque hanc reor esse causam, quâ non adeo multi rusticorum hoc modo periculantur: convulsionem huic duplex causa asserere potuit, veneni vis, & quod vipera os ventriculi morderet.

Timocharis etiam seruum, qui inter melancholicos esse putabatur, & talibus tantisque affectus, eodem modo mortuus est circa eandem diem.

B Prope historiam serui Cononis esse hanc scriptam ab aurore, & eam quæ interest huic proxima, esse ab aliquo malè interiectam, ipsa verba indicant. Quid enim refert illud *iasus*, & illud *mihi* & *asus* *impus* aliud quàm mortuum etiam esse hunc voce priuatum, & convulsam circa diem quadragesimam. Nimirum hac ratione periclitantur melancholici breui moti, si fiant apoplectici, aut conuellantur, humore eo, qui animum perturbat, conuerso ad corpus. Fuisse verbò hunc melancholicum confirmat multorum & talium virorum, qui illi aderant, auctoritas. Quod scilicet illi ita putarent: fortasse quod ipse huic ægroto non adfuerit, sed rem aliorum relatu agnouerit; aut etiam fortasse, vt obiter doceat à medico, vt ipse alibi dicit, seu medici sententia, probabiliter affectionum argumentum capi.

Nicolai puero circa Solstitium ex potationibus horror accidit, circa noctem febris postera die vomitus biliosus, sincerus, paucus. Tertia die cum concio adhuc frequens esset, abortio totius corporis sudore cessauit.

Hæc narratio mutila est, desuntque plura verba, quàm hic scripta occurrunt, vt constare facile potest ex libro septimo circa medium, quo loco eadem ipsa repetitur. Primum ergo oportet, vt lecto restituantur, deinde enarretur. Ea habet hoc modo.

Nicolai puero circa Solstitium hyemale ex potationibus horror accidit, circa noctem febris, postera die vomitus biliosus, sincerus, paucus. Tertia die cum concio adhuc frequens esset, abortio totius corporis sudore cessauit, Rursusque citò incaluit. Circa medias noctes rigor & febris acuta accidebat, interdum verò eadem hora sudor, rursus citò recaluit, vomitus similis. Quarta ex decocto Mercurialis deiecit bene stercoreosa & liquida, substatida tamen & spongiosa, mercurialis decocto non dissimilia, vrina non admodum multa erat, sedimentum non habebat, sed paruum quid suspensum. Doloribus hypochondry sinistri & lumborum afflictebatur, putabatur ex vomitu superspirare & superspirabat duplicata aliquando respi-

ratione. Lingua alba erat, & habebas dextra, ex parte concretionem lupino similem: deinde parum erat siticulosus, insomnis, mente constabat. Sexta autem dexter oculus maior dum intueretur apparebat. Septima mortuus est. Attamen venter ante mortem intumorem subleuatus est, & mortuo posteriores partes robore suffusa sunt.

Narrat Hippocrates. ætatem ægroti, anni tempus, & ægrotandi occasionem, quia hæc omnia faciunt quamplurimum ad cognoscendum morbi speciem & periculum; atque ad rectè suscipiendam curationem, oportetque singula considerare seorsum, atque etiam cum alijs conferre, veluti nunc febrem hanc ardeorem factam esse mediâ brumâ periculum augeat, quia non congruit cum tempore. Periculosum etiam fuit puero larga vini portione vii (bas enim haud dubie vocat potationes) plurimum cum lædantur pueri à vino. Et ex potationibus &; ingluvie (simul enim consueverunt hæc fieri) merito nata est febris magna, & multiplex, magnam voco ob propriam essentiam, & ob malignitatem (fuit enim continua, & vehemens, & perniciosa) multiplicem, ob complicationem. Habuit enim homo à principio tertianam intermittentem, coniunctam cum perpetua. Nam incepit à rigore, & habuit deinceps tertiam quaque nocte rigorem, à quo increfcebat febris: & rursus tertiam quaque die, cum condo etat in foro frequens (ad meridiem scilicet) sudorem totius corporis. Quæ figura est haud dubie tertianæ intermittens. Non ramen quum cessabat sudor, cessabat etiam febris, sed citò rursus intalescebat, & magis febris, donec circa mediam sequentis noctis hotam rigor iterum rediret. Eam notam habuit hæc febris malignitatis à principio, quod cum ex bile satis sincerâ ortum duceret, tamen multum ultra tertianæ legitimam durationem produceret. Nam quibus paroxysmus durabat circiter triginta horas. Nam rigor factus est circa mediam noctem; & postidie febris durauit vsque ad diem tertiam, & die tertia circa mediam diei sudor totius corporis est factus, qui cessauit (manente nihilominus febre perpetua) vsque ad sequentis noctis medium. Quâ hora rediit similis omnino circuitus. Itaque paroxysmus erat triginta sex horarum, intervallum vero tertianæ intermittentis, quod continua occupabatur, solum duodecim. Vomitus, quia biliosus sincerus talem significabat causam: quia verò exiguus, malus erat, vt alia deæteroria imperfecta. Significabat vomitus talis idem quod paroxysmus productus, atque ambo simul, multo magis redundantiâ humoris, & facilitatis debilitatem. Nam nisi humor esset multus; neque paroxysmus esset tantus, nec vomitus tentaretur. Si autem facultas fuisset fortis, & citius sese à febre expediuisset, & abundantius vomuisset. Has ob causas medicis visum est multum vrgere, neque expectari posse legitimum iudicationis, vel expurgationis tempus, atque ideo die quarta mercurialem berbain contulerunt, à qua deiecit stercorosa, humida, sœda, & spongiosa, hoc est, stercus molle fecundum, & spumofum. V-

tina erat pauca, non dissimilis decocto mercurialis, scilicet subuiridis, hypostasi, catens, habens verò suspensum quid paruum. Hoc loco Hippoc. quomquam indistincte vii solet omnibus nubeculis, enæotematris, & hypostasi distincte est locutus, vocans hypostasin quod substat, appendiculum quod in vrinæ medio vehitur. Has deiectionum, & vrinæ species prauas esse constat. Nam vtræque habet concoctioni contrarias nntas. Nam in deiectione, quod fecidum est, & spumofum putrescentiæ malignæ signum est, & colluquescentiæ, vt etiam viride in vrina, vitionis. Ita factum est (vt scilicet talia poscebat signa) vt expurgatio male cederet, & morbus haberet pellimum exitum. Nam cum stercorosa solum exirent, à mercurialis bilis copia mota tantum est, & circa hypochondrium sinistrum, & renes collecta. Vnde euenit sinistrum hypochondrium inflammatum dolere, & lumbos, ac cum vrina bilem exire. Non quidem affatim, vt iudicationi sufficeret, sed vt tantum bilis decubitus inuilem indicaret. Quapropter facta est vrina pascua, & viridis. Superuenerunt postremo signa pessima, superparatio duplex, hoc est, vrina quod vocatur *xyxurros*. Et lingua alba habebat in dextrâ parte concretionem magnitudinis lupini, & erat parum siticulosus, insomnis, sed mente constabat, & tandem oculus alter altero factus est maior, spiritus offendens, & oculus alter altero maior, conuulsoria sunt, & in prognostico, & aphorismis plurimum vi reputantur. Lingua potuit albescere, retracta deorsum bile. Concretio verò malignus erit abscessus. Sublata si in ardente febre pluries vituperatur ab Hippocrate, neque quidem nunc plurimum leuat id signum linguae candor, quia oco poterit in tanta febre non esse falsa puerita, accedente præcipue perniciçio. Si enim superne partes abundassent puerita dulci, dormiuisset homo. Id solum aderat boni, quod constabat mentis. Verum signum simpliciter bonum, multis pessimis oppositum, leue est. Quare merito esse citò hominem ita affectum septimâ mortuum esse, quia lethalia incepturunt à fine primi quaternarij apparere. Euenit huic paulò ante mortem alium inuoluerere, bilem per retentis in potentiam effusâ, & in quatuor ampliora regurgitante. Mortuo iam posteriores partes corporis rubræ sunt factæ; iam effluere ob fluctuationem mortificationem etiam sanguine, & cum naturali calore expirante, sanguine extra vasa effuso. Hoc signum fieri solet in multis recens mortuis, ac nonnullis etiam moribundis, velot in ijs qui venenum acceperunt, aut internis, ijsque malignis inflammationibus erant affecti, aut malignos aliquos succos collegerant. Ego (si quidem hoc quoque diei non est inuile) dicam malè actum esse cum hoc ægrotò, quod non sit illi ante expurgationem missus sanguis: erat sanè mîrrosos die secunda vesperti, cum iam cessante sudore videretur febris manere. Nam ob vsque non mirum si medicus expectaret, an tempore quo solent diarriæ, soluerentur, cum febris ex causâ procatartica inuicem cepisset. Nam et incepta à rigore, quod quodammodo puridam indicat, tamen non omnino inde constare poterat, non esse diarriam, quia quæ ex sanitate aut ebrietate oritur diarria, maxime iuniorum putridarum figuram, ob redundantis cibi ac potus alterationem.

D *Diopithis sorori in febre semitertiana circa accessionem os ventriculi grauitur dolebat, & tota die perseuerabat, talisque oris ventriculi dolor aliis similiter contingeat. Verum sub Pleiadum occasum talia viris rariora euadebant.*

Simul hac dictione comprehendit singularem historiam eius morbi, qui euenit sorori Diopithis, & commune illius, qui quo dam autumno grassatus est: adde breuiter utramque, vt parum vilitatis videatur inde capi posse. Nam de sorore Diopithis nihil dicit aliud, quam laborasse semitertiana cum cardialgia, quæ in ipsa febris inuasionem apprehendebat, & durabat per totum diem. De communi illa tempestate dicit, multis etiam aliis, viris scilicet & mulieribus, etiam aliis febribus correptis, accidisse cardialgiam, verum sub pleiadis occasum, talia viris rariora euasisse. Non narrat autem qualis fuerit eius anni temperies, neque quo tempore cardialgie cepertit, neque quousque durauerint. Quare multa desunt ex quibus possemus aliquid ad artem velle aucupari. Verum dicemus, quæ ex eis quæ dicit, probabiliter possit quis coniectari. Semitertiana febris, quæ præcipue ita appellatur, est continua, acuta, & periculosa, & multiformis. Constat enim duplici typo; tertianæ & quotidianæ, & ex duplicis succi putrescentia oritur, bilis & pituitæ. Proinde hic morbus congruens est conditioni autumni, temporis aded varij & inconstantis, & ad multa variâque excrementa ingendum apti. Cardialgiam vocant veteres omnes medici dolorem oris ventriculi, qui fit ob humorem frigidum & statuosum, aut calidum & mordacem, qui ibi gignitur, aut in eam partem insuit. Plerumque verò frigidus ibi gignitur, & biliosus aliunde affluit. Quod euenit cum talis in corpore redundat succus, & os ventriculi est ex quacunque causa debile. Ita fit, vt hoc quoque malum autumno sæpe accidat per morbos, quia eo tempore, & languent ventres, & exusti sunt succi: utrumque ob antegressum æstum, qui naturalem calorem dissipant, succos verò exusti. Accedit alia causa dolendi non exigua, ex repentina in frigus mutatione, quæ multis horis in ea anni parte fit. Accedit etiam multus eius fructuum recentium, qui tunc abundat, & ventriculum laxant, & sua facili putrescentia viciant. Iam verò in semitertiana peculiaris quidam apparatus esse videtur ad hoc symptoma. Nam quia quotidiana est, non raro habet sociam ventriculi debilitatem; quia etiam est tertiana, habet biliosam cacochymiam. Itaque ob hæc, nisi quid aliud peculiare habuerit illius anni constitutio, facta est cardialgia. Diopithis sorori in semitertiana, & aliis quamplurimis, in aliis quibusvis morbis. Atqui quamquam semitertiana continua febris est, habet tamen inuasionem (velutadiens ad initia) altera die vnam, altera die duas. Cum his inuasionibus accidebat cardialgia gravissima, quæ quæ febris procedebat ad incrementum, remittebat: non ita tamen vt nõ duraret tota die: hoc est quod quidem

A mulieri huic contigit. Tempestatem verò illam, quæ cardialgia in multis grassata est, autumnum fuisse, inde nobis insinuat, quod addit *in multis diebus vitis talia rariora euasisse*: occasus verò pleiadum finit autumnum, & inchoat hyemem, primis diebus Nouembris. Dicit igitur ad finem iam autumni euasisse hæc rariora viris, quasi superiori tempore, hoc est, toto autumno, crebriora fuerint & fœminis & viris: Neque sanè quicquam horum ratione caret. Nam autumno fuerunt hæc crebra omnibus dictis de causis; incipiente autem iam hyeme, fuit mutata constitutio, quia mutationes temporum mutationes affecerunt morborum. Incepit verò eius mali remissio potius in viris, quodd minus excrementosi quam fœminæ sint.

V *Xor Epicharmi antiquam pareter dysenteria laborabat, vehemens dolor aderat, deiectiones sabruenta, mucosa. Vbi peperisset confestim sanata est.*

C Quæ vero gerunt malis replentur succis, quia retinentur iis menstris euacuationes, factus verò allicit ad sese sanguineum bohem. Hinc accidunt illis multa mala, quæ copiosa illa euacuatione, quæ per partum fit, solui solent. Hinc igitur regurgitante iam malo succo in intestina, facta est dysenteria, & reuocato ad vterum per partum, est soluta. Hæc eadem historia occurrit in lib. septimo, nihil ab hac euarians, quod sit momentali cuius.

D *Polemachi uxori Arthritide laboranti dolor quidam coxa vehemens superuenit, causa erat quodd muliebria non fluere. Tota nocte vsque ad meridiem vox suppressa est, audiebat tamen & mente constabat, & manu significabat dolorem esse circa coxam.*

Hæc quoque historia occurrit in libro septimo, & vbi hic legitur *ἡ ἄρτις ὁ δὲ πόλεμος*, illic, *ἡ ἄρτις ὁ δὲ πόλεμος*. Et præterea addidit deficiente menstrua, quodd betæ succum bibisset. Itaque coniunctis ambobus locis constat, huic factum esse dolorem coxæ grauem, & repente, quodd fluentibus mensibus potasset succum betæ, & earepente suppressa sint. Nimirum betæ succus terminia intestinorum facit. Quæcumque autem talia sunt, supprimunt menstrua, præcipuè si cum aceto bibantur, vt betæ succus aut cremor solet. Menstruorum euacuationum suppressio, huic scio an vllus morbus sit, cuius non possit esse causa: quodd enim facit, quodd sanguis statis temporibus, vt consuevit, in venas vteri insuit, ob earum autem obstructionem, aut eius crassitiam non exeat, aut quodd errore expultricis in alias partes refundatur, aut quodd ne moueatur quidem. Primo modo facit vteri retractiones, aut in partem alteram distortionem, & hinc præfocationes, & coxarum dolores, & conuulsiones per consensum, aut totius corporis (vt epilepsias) aut quarundam

partium, inter quas præcipue solet lingua apprehendi, & aphonia fieri: secundo modo solet facere dolores articulorum, & asthma, aut dysenterias, & innumera alia huiusmodi mala. Tertio modo febres putridas sine parte vlla peculiariter affectâ, & multa cutis vitia, efflorescentibus in cute multis aut maculis, aut papulis, aut vlcenibus, ob cacochymiam toto corpore dispersam. Huic igitur consecretaneum est, primum quidem membrum omnibus pellentibus, non quò oportuit factos esse dolores multorum articulorum, deinde decumbente multo sanguine in vterum, nec exiente ob sorbitionem succi betæ, contractum & distortum vterum esse, & ob distortionem incidisse in coxam, excitasseque ibi gravem dolorem & ob contractionem fecisse præfocationem vocatam ex vtero, & per compassionem etiâ aphoniam. Ex eorum vero neruorum, qui motum linguae deferunt, à postrema cerebri parte, seorsum ab aliis neruis cerebri, sit sepe, vt cerebro toto non læso, ea solum, particula impedita sit. Vidimusque sepe ita affectas (qualem hanc fuisse narrat Hippocrates) audire, & intelligere, & nubiis laborem suum significare, voce tamen destitui: huius curatio missione sanguinis ex malacolo, secundum dolentis coxæ reclinatorem perficitur breui, & post missionem vsu diuturno, quæ & ipsa mouent menstruas euacuationes.

E *Picharmo circa pleiadum occasum humeri dolor, & in brachium grauitas contingit, supor aderat, crebri vomitus, aqua potus.*

Hæc eadem historia narrabitur rursus libro septimo huius operis eisdem omnino verbis, præterquam quòd pro *supor*, idest, stupor, habetur illic *zoz*, idest, fastidium, aut anxietas. Fortasse habuit vtrunque, stuporem brachij, & in ventriculo fastidium. Neque mihi id videtur parum verisimile, quia humeri dolori, & brachij grauitati proximum suis accidens est eiusdem stupor, & crebris vomitibus fastidium. Dubium sanè est, quid sibi Hippocrates velit, quandoquidem non explicat, sine hic homo læsus aquæ potu, an verò curatus. Videtur enim potuisse vtrunque contingere, quia illa symptomata potuerunt à calore & à frigore proficisci. Si vero affectio fuit frigida, consentaneum est potum aquæ causam fuisse putare: si vero calida, curationem. Narrantur vero hic symptomata quibus loca affecta poteris cognoscere potius quàm affectionis specie. Ventriculi enim & brachij significatur passio: ventriculi quidem ob fastidium & vomitus crebros, quæ læSIONES sunt actionum eius: brachij vero ob dolorem, quia vbi dolor ibi morbus. Atque cum ita sit, consentaneum est primariam passionem esse in ventriculo, secundariam in humero & brachio: laborante ventriculo cruditate ob vitiosos humores in eo redundantes, atque ex corruptis cibis, ascendentibus vitiosis & crassis vaporibus ad neruos brachij, quò oriuntur, ex tribus vitiosis vertebribus cervicis. Illis enim occupatis, necesse erat primum quidem dolorem oriri, deinde & facultatem intercepti, ac propterea fieri

A grauitatem & stuporem. Dolorem quidem in humero iuxta neruorum principia, quòd ibi à vaporibus impeterentur: grauitas & stupor in brachio, quòd languida iam euaderet facultas. Ex his autem omnibus non constat, an esset frigida cruditas, vt quæ acida: an calida, vt quæ vocatur nidorosa. Nam quicunque vitiosi succi redissent, possunt oriri fastidium & crebri vomitus: Nam tametsi fastidium magis solet calidam intemperiem sequi quàm frigidam, tamen nomen *zoz* significat etiam anxietatem, quæ à frigidis etiam & acidis fieri solet. Quia & fastidium etiam fit aliquando à pituitosis putrescentibus, & anni tempus frigide affectioni attestatur magis quàm calide, nam occasus pleiadum est initium hyemis. Sed neque si ex aliis signis cognoscere esse frigidam cruditatem constare posset satis, an aquæ potus fuerit causa, an curatio, si verè testatur Trallianus, se aquæ potu curasse acida cruditate laborantes, qui vini portione lederentur. Itaque constat ex hac narratione, fuisse hanc affectionem ventriculi intemperiem, atque compassionem brachij: quæ autem intemperies fuerit, non satis constat, neque an aquæ potus causa, an curatio dicatur. Coniectura autem magis inclinat ob temporis conditionem, frigidam intemperiem orram esse cum humore propter vomitus: potum vero aquæ fuisse causam, nec quicquam de curatione dixisse.

E *Phranoru filio pustula eruperunt moribus culicium similes, verum non diu apparuerunt, postridie febricitauit.*

Huius quoque historię pars prima occurrit scripta in septimo, desunt vero illic verba ista: *phranor filius est phranor imperatoris*. Quare melius est enarrare hic perfectius est scripta. Ne intelligas hanc, cum habuisset exanthemata, postridie febricitasse exiguum tempus, sed cum habuisset exanthemata exiguum tempus, postridie febricitasse. Quia dictione aperte significatur, exanthemata eadem die esse oborta, & euanuisse, nam hæc morbis quidem succedentia significant malignitatem; ante morbos facta, magnos adesse ad morbos apparatus, atque adeo apparatus ad magnos morbos, & vtroque tempore deteriora sunt, quæ breui atque imperatò erant, neque, quàm si per morbos durent, donec cum ipsis febribus cessent: ante morbos vero tandiù durent, donec quod in curam emerferat, puretur merito per curam ipsam esse paulatim resolutam. Cum enim breui euanescent, constat non resolutum, sed reconditum potius in altum esse, atque illa interna grauitas affici. Vnde in egrotantibus moris, in nondum egrotantibus morbus timetur grauis. Quod huic euenit, qui hæc quadam die passus, postridie febricitauit, neque forte leuiter. Huic bene consuleri fuisset, si febre missione sanguinis antecurasset. Aut enim fuisset ab ea præseruitus, aut egrotasset minus grauius. Prohibet vero medicos, præcipue minoris notæ, vulgi letitias, multa huiusmodi facere, & merus calamitas. Quorum enim quisque, si ita esset factum non

imputaret febrem missioni sanguinis potius quam morboſo apparatu. Hanc ob cauſam dicere ſoleo, autoritatem medico ad recte curandam eſſe vtilem: quod etiam Hippocr. in initio prognosti- ci dixit.

*Singultus multi contingebant poſt Fauo-
nium uſque ad Equinoctium Autumna-
le. Sub Canem aſtus magni, venti calidi, fe-
bres ſudoriſica, tubercula circa aures multiſ
accidebant.*

Conſtat hæc verba non continere narrationem integram; ſed decifa eſſe ex aliqua alia, aut alia multa verba hinc eſſe veſtigate ſublata. Reſtitui debet locus hic ex alio libri ſepimi, vbi ita legi- tur. Siccitates accidebant viſque ad Equinoctium autumnale, ſub Canem aſtus graues, & venti calidi, & febres ſudatoriæ, & ruſus ſtatim ſub- caleſcebant. Tubercula vero iuxta aures multiſ ac- cidebant. Itaque pro *αἰσθητός*, id eſt, ſingultus, legi debet *αἰσθητός*, id eſt, ſiccitates. Et vbi legitur vox *αἰσθητός*, deſt vox *αἰσθητός*, & addi debent illa, *αἰσθητός* *τοῖς* *ὀφθαλμοῖς*, id eſt, & ruſus ſtatim ſub- caleſcebant. Sed quoniam illius loci lectio hac in parte probatur magis, in eâ quoque reſeruetur enar- ratio, vbi poti' enaretur, vbi melius ſcripta eſt.

*Tychon in obſidione circa Datum, vulnus
accepit in pectus catapulta, & paulo poſt
riſum aderat ipſi tumultuoſus; videbatur au-
tem mihi medicum qui lignum extrahabat, re-
liquiſſe aliquam ſpiculi partem circa ſeptum
tranſuerſum: cum autem ipſi videretur, circa
veſperam Clyſterem inſuſcit, & medicamentum
purgans deorſum exhibuit. Noctem pri-
mam diſſiciliter tranſegit, verum orſa die &
medico & aliis melius ſeſe habere videbatur.
Prædictum eſt ſuperueniente conuulſione cum
breui eſſe moriturum. Sequentem igitur no-
ctem moleſtam habuit & inſomnem, in ven-
trem plerumque decumbens; Tertiâ exoriente
die conuulſione correptus & tunc temporis mor-
tuis eſt.*

Datum nomen eſt oppidi, in cuius obſidione Tychon percuſſus eſt catapulta. Erat verò cata- pulta bellicum tormentum, quo lapides aut ſa- gittæ iaciebantur. Hunc ſagitta traiectum eſſe de- clarant ſequentiâ illa verba, videbatur medicus extrahens lignum, reliquiſſe aliquid ſpiculi circa ſeptum tranſuerſum. Quæ etiam verba de- clarant, percuſſum eſſe pectus, & ſeptum tran- ſuerſum. Ex hoc loco videtur Ariſtoteles accepif- ſe, quod tertio de partibus animalium cap. 10. dicit his verbis. Accidere etiam dicunt & in bel- lis per plagas circa ſeptum tranſuerſum riſum, ob calorem qui fit à plaga. Itaque Ariſtoteles pu- tat traiecto, aut percuſſo ſepto tranſuerſo fieri ri- ſum, ob calorem eius partis, velut à titilatione. Hanc enim etiam putat riſum mouere calore,

A quem ciet. Ego verò vt in controuerſiâ etiam di- xi, non arbitror hunc fuiſſe riſum, ſed conſul- ſum quendam morum ſepti tranſuerſi, riſui ſi- milis, quem Hippocrates velut comparatione uſus, vocauit riſum tumultuoſum. Cum igitur hic percuſſus eſſet ſagittâ, paulo poſt ſuperuenit quidam circa pectus conuulſio, velut quidam *αἰσθητός*, concutiente arbitror ſe ſepto tran- ſuerſo, vt excuteret. Nam viſus eſt chirurgus, qui extraxit lignum, reliquiſſe aliquid ſpiculi inter- rius circa ſeptum tranſuerſum. Fortaſſe hic ipſe riſui ſimilis motus, reliſcit interius partis ſpiculi ſignificationem Hippocrati præſtitit. Quamquam etiam ex ipſo telo cognoſci poterat, ex quo parti- culam aliquam decidiffe apparuiſſet. Et cum ipſi (inquir) videretur, ſcilicet ipſi medico, aliquid interius reliſcitum eſſe, aut videretur ita expedire, eadem die quæ percuſſus homo eſt, veſperi viſus eſt clyſtere, & pharmacum deorſum purgans de- diſt (tantopere feſtinandum eſt virgore malo) noctem eam, quæ primâ etiam fuit, tranſegit diſ- ſiciliter. Nec ſanè mirum, nam ex recenti vulnere, & agitatione pharmaci id accidit. Verum orſa ſta- tim die videbatur & medico, & aliis, melius ſeſe habere, ceſſante fortaiſe iam motu expurgationis, & partibus recentè deſtrauatis, & ob deſatigatio- nem antegreſſam requies aliqua ſubreplit. Verum cum teli pars adhuc eſſet infixâ, neque vlla eſſet ratio extrahendi, & pars læſa eſſet adeò opportu- na inflammationi & conuulſioni, merito prædi- ctum eſt, fore, vt ex vulnere inflammaretur, atque conuelleretur, atque cum id fieri inciperet, more- rerat breuiſſimè. Cum enim cõuulſio ab aliis parti- bus incipit, non enenit mori, donec petueniat ad reſpirationis inſtrumenta, cum verò huic ab ipſo ſepto tranſuerſo inciperet, ſine quo nulla reſpi- ratio agi poteſt, neceſſe erat vt mox ab incipiente conuulſione interiret. Nam vt in libro de coacis prænotionibus dicitur, conuulſiones omnes moleſte ſunt, verum diſſicillimæ circa thoracem, & maximè periculofæ. Euenit igitur vt ſequenti nocte, incipiente iam inflammatione, eſſet homo cum diſſicili tolerantia, & inſomnis, & in ven- trem decumbens. Quod, vt in prognostiſtico dicitur, delirium ſignificat, aut dolorem in partibus circa ventrem. Tertiâ die ſummo mane conuellebat- ur, & tunc moriens eſt in initio tertiæ diei, ex qua percuſſus eſt. nulla ratione potuit huic cõuul- ſione & morte liberari, nam ſepti tranſuerſi vul- nera multiſ, de cauſis atque adeò maniſeſtis lethali- ſia ſunt.

B

C

D

E

*Billo in dorſum vulnerato ſpiritus copio-
ſus per vulnus cum ſtrepitu prodiit, &
ſanguis effluxit: deligato autem medicamen-
to quod cruentis vulneribus imponitur cura-
tus eſt.*

F Hic accepit per dorſum inter coſtas vulnus, in Thoracem penetrans, atque ob id ſpiritus ſimul exibat cum ſanguine, atque ex ſpiritus cum ſan- guine miſtione fiebat ſtrepitus, vt in anguſtiâ longæq; ceruicis vaſis ex vitro cõſtat accidere con-

562
 facit. Hæc vulnera, cum neque septum transuerſum, neque cor, neque pulmo viſque ad arterias leſa ſint, curari plerumque ſolent, ſi recta curatio adhibita ſit. Quæ quidem poſt externos extractosque, ſi qui ſint, grumos ſanguinis, in uſu medicamentorum, quæ ad alia vlcera recentia & cruenta parantur, conſiſtit, & idonea alligazione. Mirantur atque adeo quidam dubitant, quomodo poſſint, qui hæc habent vulnera, per ea reſpirare. Nam ſi ær qui ore in pulmonem trahitur, per ipſammet os reſicitur. Quare non videtur poſſe reſci per vulnus. Quod ſi per vulnus reſicitur, aliud eſt, quàm qui ore trahitur & reſicitur; quare non videtur Thoracis vulneratio poſſe vocis materiam exhaurire. Experiſſimæ autem utrumque, & per penetrantia vulnera reſpirare homines, & cum id admodum ſit, loqui non poſſe, quaſi vocis materia per vulnus euacuetur. Res autem hoc modo euenit. Quod per vulnus reſicitur, non per os, ſed per ipſummet vulnus trahitur, cum verò pulmo proprium non habeat motum, ſed ſequatur Thoracem, ſit. ut cum Thorax, dum dilatatur, habeat quæ repleti poſſit, pulmo minus poſſit ſequi, atque ita animalia reſpiratione naturali priuentur, quamquam illius & huius, quæ per vulnus ſit, non eadem ſit materia.

Philis filium ex denudatione oſis in fronte, nona die febris corripuit, os linorem contraxit, mortuus eſt.

Exemplum eſt hoc accommodatiſſimum eius, quod Hippocrates initio libelli de vulneribus capitis dicit, nullam vulnus capitis eſſe contemnendum, etiam ſi ſola cutis videatur eſſe recifa. Nam nudationem dicens inſinuat nullam fuiſſe oſis fracturam, neque quicquam aliud, quàm quod recifa ſit cutis viſque ad ipſum os, idque ita nudatum ſit. Quod ſane eo præcipue loco, per ſeſe minime periculoſo, lethale non erat. Accidit autem nona die febris, & oſis linor, quod corruptionis ipſius & ſubiectionis partium erat inditium. Eueniant quæplurima huiusmodi, nunc ex medici errore, qui minus idoneis medicamentis vititur, aut etiam his vtens, minus eſtate vlcus tractat, ſed ab ambiente plus ſaris permittit alterari os, vel reliqua quæ ad totum corpus attinent, non rectè prouideri: nunc ob corporis apparatus peſſimum: nunc ob morboſe tempeſtatis conditionem, quæ aut intemperie manifeſta, aut inſolentia cuiuſpiam aſtri talis ſit. Scilicet non ſunt omnium cauſe conſpicuæ.

Et filio Phania, & filio Energetæ, linore obſiſſis oſibus, & abortis febris, abſceſſit cutis ab oſſe, & pus non apparuit.

Hanc narrationem mutilam eſſe conſtat ex libro 7. huius operis circa medium, ubi enim aliter ac ſuſiſſe ſcripta eſt. Oportet ergo primum lectionem reſtituere, tranſſetereque illinc quæ hic deſunt. Vbi hic legitur *mor & abortum* i. pus non apparuit, legitur illic *mor & abortum* i. pus ſubtus depalce-

A batur. Quod quidem, ut patebit conſulenti illum locum, multo magis congruit. Tota igitur oratio ita habet. Et filio Phania & filio Energetæ ſeu Energetæ, linore obſiſſis oſibus, & abortis febris, abſceſſit cutis ab oſſe & pus ſubtus depalcebatur. His cerebro percuſis, ex ipſo oſſe egreſſa eſt ſanies tenuis, ſeroſa, ſubpallida, graneſcens, lethalis. Accidit autem his ipſis & quædam ſuperuenire, & circa mortem conuulſiones, & quodaſi ſanæ vocem edere, & quodaſi impotentes fieri, & ſi in dextris vultus fuiſſet inſiſſimæ pars ſiniſtra afficiebatur: ſi verò in ſiniſtris, dextra. Idem prociſus eſſe videtur quod pueris his accidit, & quod filio Philis. Nam quod in illius hiſtoria dicitur, nudatione oſis facta hiſ, inquit, abſceſſit cutis ab oſſe, & vitæque verò dicitur accideſſe oſium linor. Quamquam enim hic tantum dicitur *maxillæ dextræ & ſuperiorem*, nullâ partis factâ mentionem: tamen conſtat & hiſ que adiciunt, in capite fuiſſe vulneratos, ſiquidem de his omnibus pueris agens dicit, contingit talibus vomitus ſuperuenire, & in fine conuulſiones, & clangoſas voces, & impotentias, hoc eſt, reſolutiones, ſi in dextris fuerit vulnus in ſiniſtra parte, ſi in ſiniſtris in dextra. Hæc verò eſſe, ſigna lethalia, peculiariter capitis vulneribus ſuperuenientia conſtare poteſt facile ex libro de vulneribus capitis, in cuius ſcæ, inſcriptum eſt. Quicumque verò ex vulneribus capitis moriturus eſt, & fieri non poteſt, ut ſanus fiat, & ſeruetur, ex hiſ ſignis hunc moriturum dignoſcere oportet, & quod futurum eſt prædicere. Paritur enim hæc, cum quis os fractum, aut ruptum, aut conuulſum, aut quocunque modo fractum eſſe intelligens, per errorem deſiquerit, nec reſerit, nec perforauerit, tanquam os non opus habeat, & velut os ſanum exiſtat: ante decimum quartum diem febris corripit ut plurimum in hyeme: in æſtate verò poſt ſeptimum diem febris corripit, & poſtquam hoc factum fuerit, vlcus colorem amittit, & ex ipſo ſanies pauca fluit, & quod inſanatum eſt ex ipſo emoritur, & viſcoſum ſit, & apparet velut falſamentum, colore ruſum, ſublimidum, & os tunc corrumpi incipit, & ſi valde nigrum leue exiſtens, poſtremo pallidum euadit, aut valde albu: quò verò iam ſuppuratū fuerit, in lingua puſtule oboriuntur, & deſipiens æger moritur, & conuulſio pleroſque corripit in altera corporis parte: ſiquidem in ſiniſtra parte capitis vlcus fuerit, in dextra corporis parte conuulſio corripit, ſi verò in dextra capitis parte vlcus fuerit, in ſiniſtra corporis parte conuulſio corripit. Quidam etiam aroniti hunt. Ecce ſigna, quæ pueris hiſ ſuperueniunt, eadem ſunt, quæ Hipp. lethaliſſis capitis vulneribus dicit ſuperuenire. Dicit etiam hiſ ſuperuenire vocem clangoſam, quod quidem eadem prociſus ſit ratione, quâ conuulſiones, & ſiderationes, nimium conuulſis muſculis aperitionibus, aut reſolutis claudentibus laryngem. Fit enim clangoſa vox per aperitiones ſpiritus vias aut per aridiores. Cur in capitis vulneribus contraria pars reſoluitur, aut conuellatur poſſus quàm conuulſa, dictum eſt à me in hoc ipſo lib. 5. in hiſtoria Hippocrati Palamedis. Iam verò maximam eſſe ſympſiam cerebri & oris ventriculi, atque ob eam, cerebri læſionem vomitu prædâ celebra-

tissimum est à medicis omnibus, necnon lethales esse puris differentias, sanien rennem, serosam, subpallidam, graueolentem, qualem his existisse dicit ex ipsius ossibus perforatis scilicet, malignè putrescentibus (quod & liuor indicabar) cum quibus & computruit cerebrum. Quare mortui sunt.

A *Rhippius sagittà in superiorem ventrem violentè & graniter vulneratus est, vehemens ventris dolor accidit, & celeriter ardebat, deorsum verò nihil deieciat, anxius erat. Et cum biliosa abunde colorata vomisset, melius se habere videbatur. Paulo post autem dolores vehementes rursus adven-
runt, & venter velut in voluulo affectus erat, calor & sitis aderat, & septem diebus mortuus est.*

Hic est transfixus sagittà, circa fundum ventriculi, & exortum intestinorum gracilium, ac citò ex vulnere eo loco inflammationem contexit, quæ anxietatem & vomitum biliosum faciebat, & febres, & sitim, & impediēbat deiectionem, nihil à supernis permittens in inferna transmittere, & feces exarens. Quod mox à vomitu subleuari videretur, rationi etiam est consonum, degrauiata interim non nihil parte. Inflammatione verò manente necesse erat nouam fluxionem mox conuocari, & denuo anxium fieri, & dolore grauiter. Quamuis autem dolorem grauem accidisse, & *αὐτὸν ἀποκτείναν* dicat, ne intellige id dici, quod dolores essent grauiantes, quales quos prementia pondera faciunt, sed quod essent magni, & toleratu difficiles. Nam dicitur illud non ob speciem doloris, sed ob magnitudinem. Dolor enim potius esset perforans, velut in voluulo. Quod mox explicuit Hipp. addens, *ἡ δὲ νόσος αὐτοῦ ἐκ τούτου*. Imò vero mihi videtur hæc ipsa affectio reuera, ac maxime propèd fuisse voluulus ex inflammatione, quamquam incepit à vulnere. Nam vna quidem, atq; ex præcipua voluuli causa statuitur, gracilium intestinorum inflammatio. Id igitur solum habuit peculiare voluulus hic, quod à vulnere velut à procaractica causà incepit. Non igitur mirum mortuum esse hominem septem diebus, cum alioqui soleat voluulus quatuor interire. Fortasse miraberis magis, quod tandiu durare potuerit. Sed neque id mirum. Quia affectiones quæ causam habent euidentem, cæteris paribus, cum minùs malo sunt corporis apparatu. Porro vulnus quo ventriculus aut intestina, præcipuè gracilia, dissecta sunt, in lethalibus ponunt Hippo. & Galeus.

N *Epapolis similiter percussus eadem passus est, cum esset usus clystere acri, aluus de fluxit. Colore diffusus est tenui, pallido, nigro. Oculis erat squalidis, splendidis, insus conuersis, & defixis. In Cardia.*

A Hic similiter percussus, eadem est passus, & eodem tempore mortuus, nisi forte citius: non tamen adeo eadem passus est, vt non habuerit quorundam symptomata diuersa, quæ hic narrat, id fluxione alui, & corporis mutato colore, & oculis, quin & doloris specie, quæ me adducunt vt suspicer, percussum esse in parte aliquanto superiori quam priorem. Hic scilicet in ipso ventriculo, ille in gracilibus intestinis. Nam in illo cum intestina inflammatione tentarentur, nihil deorsum effluebat: in hoc cum ipse ventriculus, patebant humorum confluxui magis intestina, atque ita deiecit, quamquam à clystere acri. Illi dixit fuisse dolores voluulorum, huic dixit fuisse à *καρδία*, quod nihil aliud significat, quam in cardialgia, hoc est, superioris ventriculi dolore. Sicur etiam illa duo symptomatum genera, coloris per totum corpus effusio, repente homine correpto velut regio morbo, partim pallido, partim nigro: & oculorum squalor, distortio & immobilitas, inflammationis magnæ ventriculi signa sunt magis quàm intestinorum. Ac mihi sanè effusio illa coloris suspicionem ingerit, infectam fuisse veneno sagittæ. Scimus in ingesti veneni symptoma esse, repentinam illam coloris toto corpore infectionem. Sed & citra venenum fieri potest ob magnitudinem, & malignitatem inflammationis. Id vero hepatis aut ventriculi inflammatio quam illius ingesti tanto magis facit, quanto magis ab his inficitorum corpus potest, ob commune ministeriū quod inde accipit. Iam vero constat oculos facilius trahi in compassionem ob ventriculalem, quam ob intestinalem, vt & totum cerebrum. Sed quædam verba huius dictionis consideratione indigent. Nam videtur teouem colorem, quasi differentiam quāpiam coloris dicere. Quis autem color tenuis sit, non facile dicere possis. Ego quum dicat *χρῆμα τὸ κατὰ τὸν αἵμα*, id est, colore suffusus est tenui, pallido, nigro, perinde accipio, ac si diceret, *αἷμα τὸ κατὰ τὸν αἵμα*, id est, tenuiter pallidus, niger, hoc est, subpallidus, aut subniger. Oculi squalidi aciditatem, & atrophiam emorients iam partis indicant: peruersi & defixi coouulsionem, in quam ob ventriculum facili trahi solent. Illud vero difficile esse videtur, quod dicit splendidis oculis hunc fuisse, quasi splendor vitium aliquod oculorum sit. Scire oportet multa esse, quæ per sese bona sunt, aliis autem accidentia augent mali significationem. Velut gracilem esse partem, & omni præter naturam rumore carere, bonum est per sese, cæterum in vlcere est malum. Talis est etiam oculorum splendor, per sese enim bona est, & significat eorum tunicas, & naturales humores nullis excrementis abundare. Verum si homo teneret, aut omnino non videret, deterius est splendidos esse oculos, quàm nubem quampiam, aut suffusionem habere. Significat enim affectionem interiorē, quæ minus multo patet curationi. Ita etiam in eo cui sunt peruersi & defixi, deterius est vt signum splendidos esse, quàm si excrementis vllis abundarent, quia quo minus affectio vlla propria esse apparet, eo maior cerebri affectio significatur.

Metrodori filio ex dentis dolore sphacellus maxillæ acclidit, & gingivarum hyperfarcosis, mediocriter suppuratus est, exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla.

Sphacelus est corruptio ossium. Hyperfarcosis carnis supercrefcentia. Itaq; huic ex dolore dentis adeo maligna fluxio conuocata est, vt corruptionem fecerit ossis genæ, & in gingiuis carnis supercrefcentiam. Non certe idem fucus, qui ossa contumpebat, natus erat carnem gingivarum ita nutrire, vt supercrefceret, sed ille quidem exulcerabat: exulcerata verò caro quæcunque, si alioquin malè temperata non est, ipsa sibi facit supercrefcentiam. Finitum hoc malum est, sphacello non amplius procedere, in mediocrem suppurationem maxillæ (superioris scilicet, cuius gena pars est) & cum ea dentium molarium casum. Vtque adeo non debent contemni dolores dentium in cacochymis corporibus, sed citò expurgandi tales sunt, satis copiose, mox ac ingruit dolor.

Mulieri cuidam Abdera carcinoma aderat circa pectus 3. & per papillam effluebat sanies subernuta: intercepta autem fluxione, mortua est.

Carcinoma seu cancer est tumor ex atra bile, qui quacunque corporis parte fieri potest, nunc cum vlcere, nunc sine eo: maximè autem fieri consuevit mulieribus, quin & viris etiam aliquando in mammis, quia præterquam quòd ibi est multa caro glandulosa; quæ solet excrementa excipere, emergunt etiam eam in partem ab interno corpore grandiores venæ & arteriæ, quàm in villam aliam externarum. Accedit, mulieribus peculiaris causa, communio mammarum & vteri per venas, in quas menstruus sanguis è toto corpore colligitur. Quibus igitur sanguis redundat atrabiliaris, neque satis copiose vacuatur, aut mulieribus per vterum, aut viris per hæmorrhoidas, facile colligitur in mammis, & facit cancerum. Quod sanè malum malè vincitur medicamentis, quia iniuria minora sunt quàm pro tanto malo, & vehementius irritatur. Suppuratio in tam maligno succo tendenda non est. Superest, quod & rusticissimum reor, solum bono victu, & repetitis crebdo vacuationibus, missione sanguinis secundum rectitudinem, & expurgatione accommodata vti, & dictas antea euacuationes mouere. Huic mulieri natura prospexerat ipsa sibi querens viam, & saniem emittens subernutam per mammillam. Verùm cum postea ex effluxu cessaret, vel sponte per facultatis naturalis impotentiam, vel inficinia medici ad id suppressendum aliquid machinantis, mortua est. Si autem ipsa mulier fortior, aut materia minus maligna fuisset, hæc mulier, ea vacuatione cessante, facta fuisset manica. Nam vt in aphorismo dicitur, mulieribus quibuscumque sanguis ad mamas conuertitur, maniam significat. Sed quia ea erat debilis, aut succo veneno similis, mortua est.

Ex catarrho secundum capitis dimidium quidam dolebant, & per nares humore fluenti febricitabant moderate, & intra quintam diem refrigerabantur.

Catarrho laborantes magno, comitari solent febricule quædam non adeo magnæ, sed quotidie vesperi ingrauescentes, quod somno & nocte crescat capitis repletio, vt nuper diximus. Datæ solent hæc diuini, quibus catarrhi lentè coquantur, neque euacuantur. Quibus verò euacuationes idoneæ cito superueniunt, morbum contrahunt, vt de lputis in pleuritide Hipp. dicit. Est accommodatissima euacuatio catarrho incumbenti in pectus excreatio copiosa: huic verò qui ineta ipsi caput retinebatur, & proinde faciebat hemiplegiam; effluxus humoris per nares. Nullum est enim tale emundatorium, & tantam cum cerebro habens rectitudinem Aures enim non sunt tanti vsus ad euacuandum. Ob id igitur fiebat meritò, vt tempestæ febres cito soluerentur. Quinta autem die solui solere febres ex catarrhis (quæ scilicet breues sunt, & celeres habent maturationes coniunctas) habes hoc testimonium, & aliud huic simile, quod non ita pridem in hocipso libro ita dicebatur. Tullis hyeme maximè in aëstivis, etasæ multa & alba cum excreassent, febres superueniebant, & quinta die cessabant. Quod illic dixit febres quinta die cessabant, dicit hic, intra quintam diem refrigerabantur. Constat ex ipsa phrasi narrationem hanc non esse integram, sed decimam esse ex historia tempestatis cuiuspiam morbose; hæc verba, vt sunt alia quæ plurima in hoc opere, diuulsa sunt. Enitendum tamen est, vt vndique quas poterimus fruges colligamus, vt nunc fecimus. In libro septimo, hoc idem quod nunc narrando scripsit, occurrit scriptum docendo:

EI qua in partu concessa est, dolor circa pectus exortus est, & latius, excreationes purulenta, tabes substitit, per sex dies febricitauit, rursus ventris profluvium accidit, cessat, febricitauit, aluus stricta est, & circa septimam diem mortua est.

Mulier hæc erat vxor cuiusdam Simonis, & vbi dicitur sex dies, legi oportet sex menses, quod facile intelliges, ex alia eiusdem historie narratione, quæ occurrit in septimo, vbi repetitur mutatis quibusdam verbis, vt alia quamplurima huius quinq. Ibi verò ita legitur. Vxor Simonis in partu concessa dolor circa pectus & latius exortus est, rursus, febres & excreationes purulenta aderant, phibis quæ etiam consistit, & per sex menses perseverant febris & ventris profluvium semper, tandem cessauit febris, aluus restitit, septima die post cessationem mortua est. Hæc lectio multo magis probatur, debentque loci præfens secundum illum emendari. Nam longè probabilius est, quæ ex pleuritide obijt per suppurationem, febricitasse sex menses, quàm sex dies.

F Mulier hæc erat vxor cuiusdam Simonis, & vbi dicitur sex dies, legi oportet sex menses, quod facile intelliges, ex alia eiusdem historie narratione, quæ occurrit in septimo, vbi repetitur mutatis quibusdam verbis, vt alia quamplurima huius quinq. Ibi verò ita legitur. Vxor Simonis in partu concessa dolor circa pectus & latius exortus est, rursus, febres & excreationes purulenta aderant, phibis quæ etiam consistit, & per sex menses perseverant febris & ventris profluvium semper, tandem cessauit febris, aluus restitit, septima die post cessationem mortua est. Hæc lectio multo magis probatur, debentque loci præfens secundum illum emendari. Nam longè probabilius est, quæ ex pleuritide obijt per suppurationem, febricitasse sex menses, quàm sex dies.

Quod vero ad morbi huius essentiam, & causas attinet, illud constat ex narratione (quod & nosse oportet) hanc mulierem cum difficili parit fore laboraret, fortiter, ut fieri solet, nonnunquam concussam esse, ut fortum excuteretur, & ob id pleuriticam esse factam, compressione arbitror pectoris, quam concutientes faciunt, sursum retracto sanguine, atque pleuritum fuisse adeo malam, ut breui per suppurationem abiret in tabem, quod multo & corrosius sanguine redundaret. Talis enim est reuera sanguis qui ob purgationes per nouem menses retentus, redundans in his quæ pariunt. Copia igitur sanguinis in pleuriticis suppurationem facit, nisi ob debilitatem mors ægros præueniat. Maligna qualitas & corrosiua facit, ut facile pulmonis caro computrescat, & tabidi breui fiant. Constat etiam superuenisse huic diarrhæam, quæ in tabescentibus & suppuratis nihil esse potest periculosius, ut ab Hipp. in aphotismo dicitur. Porro huic non ad extremum usque durauit semel inchoata diarrhæa, sed cum cessasset febris, aut prorsus esset exigua, & insensilis, etiam aluus restitit, & tunc post dies septem mortua est, retento iam (arbitror) intra Thoracem succo. In præsentis loci lectione insinuat, febres & diarrhæam inæqualiter superuenisse, cessasse enim, ac rursus repetisse. Et sanè utrarumque, deiectionum copiosarum, dico, & febrium interruptarum & inæquales imperius fieri consueuerunt in suppuratis. Nam per retentis debilitatem hæc excernunt, pene valde vacuati cessant excreta, donec rursus excreuant ea, quæ per debilitate concoctricis congesterant. Ita fit, ut paribus exiguum alimentum accedat, & spiritus assatum cum deiectionibus exhauriantur. Febres autem eisdem causis erratico modo succedunt, nunc putrescentia retentorum exardentes, nunc putridorum evacuatione sedantur. Præterquam quod fiene paræ incrementum, factis rursus subsident. Admonet hos hæc historia ut caueamus, ne mulieres quæ pariunt concutiantur incaute. Neque vero comprimantur secundum latera plus satis, ne in Thoracis regione vltus dolor excitetur. Cuius mali, si quæ vel exigua significatio nobis præfertur, præproperè reuocandum deorsum, fortibus citius frictionibus, & cucurbitis humilibus paribus affixis, & missione sanguinis ex talis.

Anginosa manus dextra & cruris dolore affecta est, febrem eam detinebat debilis: strangulatio, autem tertia die remissa, quarta conuulsa est & voce priuata, stertor aderat, dentium contritio, maxillarum rubor, mortuus est quinta aut sexta die. Signum circa manuum sublidum apparuit.

Rata est hæc permutatio ab angina in conuulsionem. Verum mali abscessus innumeris modis sunt, præ diuersa in singulis partibus debilitate. Dolor manus & cruris erat antecedens signum conuulsionis, accidebat scilicet abscedente iam humore in neruorum radices. Strangulationis etiam remissio, quæ tertia die facta est, & febris

A moderatio, erant inditia imminens permutatio. Ita enim fit, cum sit morbus ex morbo, ut remittente priori posterior succrescat. Quapropter cautus medicus cum morbum aliquem plus solito vider remittere, velut in hac strangulatio tertia die & febris remiserunt, timere incipit permutacionem. Quod si interim aliterius cuiuspiam partis superueniat dolor, et parti timet. Vbi dicit quarta conuulsa est, in quibusdam codicibus habetur *ipsius*, hoc est, septima. Constat vero esse manifestum erratum. Nam mortuus est quinta, aut sexta. Vocis priuatio & stertor reduntis suffocationis signa sunt: dentium contritio, hoc est, stridor, conuulsionis. Maxillarum rubor sanguine in caput accedente fiebat. Mortuum dicit quinta aut sexta, quod horam fortasse mortis non exactè agnouerit. Signum dicit circa manum sublidum apparuisse, hoc est colorem sublidum manus dextera prænam significationem præstisse. Nimirum liuos partium vitalis facultatis interuersionem significat, ut in prognostico dicitur, magis quam si omnino nigrescant. Quod signum ubi conspici videtur, certo scias in proximo iam esse mortem.

Et alia quedam ex palato stertebat, lingua exsiccabatur, Peripneumonia laborabat, mente capta mortua est.

Plerique legunt mente constans, quod fortasse habuerit in suis codicibus, sed *ipsius aut peripneumonia* non ita habeo in meo codice, sed *stertor* utrumque perfectio fieri potuit, & ut moreretur ex petipneumonia mente constans, & ut mente capta. Sæpe enim pulmo inflammatus in compassionem trahit cerebrum usque ad insaniam, sæpe etiam non eatenus. Proinde ego legi, ut reperi in meo codice scriptum. Cum præcipue ex signis, quæ accedebant huic peripneumonia, cõsiderata aliqua possit accipere cerebrum in sympathiam trahi. Nam erat lingua sicca, quod biliose peripneumonia signum esse solet, ex qua quæni pituitosa, facillius deliratur, quod acrioris fumi caput conscendat. Erat præterea *imè* ut *imè* *stertor* *stertor*, hoc est, stertens in ipso ore & palato, ut multi dormientiū solent, non in ipso guttore, aut apertis artetia, ut asthmatici, aut plurimi acutè febricitantiū, cum sunt morti proximi, quibus scilicet pulmo plenus fuerit in gutture. Et hoc sanè grauis stertoris genus est, quia significat suffocari hominem, occupatis iam visis spiritibus. Illud vero significat angustiam viarum, unde fit ut per nares trahatur spiritus. Ut illud igitur pertinet ad pulmonem & arteriarum arteriarum affectionem magis, ita hoc ad affectionem capitis. Quare hanc peripneumoniæ esse mortuam tum desipientia consentaneum est.

Et Olynthi hydropicus quidam repente voce destitutus est, per diem noctemque mente alienatus interijt.

Hoc desipientis genus fatuitatem potius fuisse arbitror (qualem asserere solet quidam cerebrum

resolutio ex pituita) quam delitium, quale solet asserere bulis in phreniticis. Nam illa permixtio hydropi congruens est. Redundat enim in hydro-picis aqua & pituita. Hæc igitur aliquando in neruorum principium collecta, cerebrum & eius propagines emollit, & laxat, atque resolutio-

A ne neruorum priuauit voce, & humida cerebri intemperie fecit fatuitatem, quæ durat per diem & noctem. Postremo resolutione occupante totum corpus (quæ apoplexia est) mortuus est. Fatuitatem verò quandoquidem sine voce erat homo, indicauerunt gestus & motus inconcinni.



LIBER SEXTVS

EPIDEMIORVM.

SECTIO PRIMA.

Quibuscumque ex corruptione circa uterum, & tumoribus, in capitis granitatem convertitur affectus, circa sinapsum dolores precipue accidunt, & quicumque alij ab utero oriuntur, ipsis in coxam octo aut decem mensibus desinunt.

Sæpe iam sum præfatus me nolle de singulis libris, aut sententiis huius operis censere, sint ne Hippocratis an alterius cuiuspiam. Quia de eare, etsi coniectura aliqua esse possit, & ex phrasi, quæ familiaris esse videtur Hippocrati, aut secus; & ex ipsa sententia, quæ digna aut indigna videtur esse, & consentanea aut dissentanea aliis quæ illius cetero esse creduntur, tamen adeo nihil certo constat, ut inter antiquiores etiam Gal. de singulis verbis essent innumere contrariæ quæ censuræ, nedum nunc cum tanto plura secula elapsa sint. Satius ergo & vtilius est, omnia considerare nulla vel vocula prætermissa, atque disquirere quid veri, & quod ad artem conferat, in his contineri possit, atque si quid videatur omnino improbandum rescire, siue Hippocratis fuerit, siue secus. Neque enim impium est putare, vel ab Hippocrate esse aliquid scriptum negligentius, præcipue cum ab antiquissimis illis seculis ad nos usque fluxerit opinio, non esse omnia sua opera ab Hippocrate perfecte elaborata. Itaque laborem hunc censendi de libris deponentes, respicias disquiramus diligenter. Atqui hic sextus liber à Galeno non habebatur in postremis, tamen si epim. minus genuinus putaretur quam primus & tertius, magis tamen legitimus censebatur quam quintus & septimus, secundo dignitate æqualis. Cum igitur quantum etiam sim prosecutus commentariis, & ut ego iudico, non inutilibus, & septimum dante Deo non sim omisissus, omnino æquum est, hunc quoque nunc interpretari, neque sane plura præfari opus est: sed dissonem primam aggredi, quæ de quibusdam vteri passio-

C bus agitur. Vterus pars est opportuna multis morbis, quia maximas plurimasque habet venas & arterias, per quas totius corporis excrementa recipere solet. Quæ si ut influunt, non exeant expedite, facile fiunt morborum cause. Lædunt verò hæc, aut putrescentia circa ipsum uterum detenta & incaluit, aut tumores præter naturam in ipso pariunt, aut ipsas venas & arterias distendunt. Hinc nascuntur febres maximæ & synocharum genere, aut putrescente solum sanguine in vasis, aut simul oboeto tumore phlegmonoso: aut sit vteri contractio, quam sequitur præfocatio, & non raro conuulsio, ob distentionem contractis vasis, ac cum eis vtero, atque ita compressis superioribus partibus usque ad septum transversum, aut distentis cum vtero neruis. Hanc vteri præfocacionem non solet comitari febris à principio, quia potius magnus frigoris sensus, refrigerato sanguine ob venarum interceptionem, & inde flatu multo, frigidoque sursum lato, qui aliquando cordi occurrens, etiam interimit veneni frigidi ritum: Causa qua conuulsio succedit sæpe vteri affectibus, in ipsis vteri est natura. Nam etsi in exiguis accipiat neruus, est tamen natura durus, & neruo similis: quæ verò talia sunt, facile tendunt fibras omnes, quibus partibus aliis alligantur, adeo ut artet in carpo manus tentio, differentiam partis internæ, quæ plegmone obfessa sit, indicet, an dura scilicet, an mollis sit. Multo ergo magis distenderentur nerui, qui solidiores sunt, & nullo succo interius madent ut yena & arterie, trachia consensum ab vtero, parte dura adeo, ut si dixi, neruo simili. Accedit vterum ipsum per se, nunc contra hunc, nunc dilari vehementer. Quare non mirum, si cum magna vi contrahitur, neruus quibus eorum principio alligatur, tendat vehementer. Ea verò est neruosi generis conditio, ut facile per totum corpus eius passio refundatur, & caput imprimis trahatur in eius compassiorem, velut nunc dicit Hipp. ex corruptione, hoc est, ex abortu & ex tumoribus etiam circa vterum, solet fieri capitis granitatem, & dolores circa sinapsum, hoc est dolorem grauiorem circa sinapsum. Audias tamen quotiæ mulieres omnes, quæcumque se ab vtero putant laborare, affirmantes dolere sibi per id malum posteriorem cervice, & occupat. quo d

D

E

F

Hippocrætes huic assertioni videtur tepnare. Res verò ita habet. Quæcumq; morbis calidis ex vtero laborant, vt febribus & inflammationibus; & ob id dolore capitis tenentur, secundum sinciput potius dolent, ob fumos calidos, qui per copiosas magnasq; artetias, quæ in vtero sunt, ascendunt, & per arterias carotidas transmittuntur in caput, quarum, vt etiam venarum iugularium, maiores portiones tendunt in sinciput, quam in posterioriorem partem. Sed quæ laborant morbis frigidis, vt præfocatione, hæc ob contractionem vteri, vehementer sentiunt dolorem sensum ad nervorum exitum, qui ad spinalem medullam, & posteriori cerebri partem spectat potius quam anteriore. Hipp. ergo non dicit omnem dolorem capitis, qui per consensum cum vtero fit esse grauantem, & pertinere ad sinciput, sed eum qui fit ex abortu, aut ex tumoribus circa vterum, & inflammationibus scilicet, aut scirrhis phlegmonosis. Alij enim non solent capitis dolorem inferre. Ex his verò causis solent febres magnæ fieri, ac denique sunt hi calidi affectus: Sed videntur huic enarrationi repugnare verba hæc quæ mox addit, & quicunque aliq; ab vtero. Videtur enim significare quoscunque alios dolores, qui ab vtero sunt, esse huiusmodi. Sed enarrandi hæc verba, duplex ratio est, vtræque idonea: vel alios omnes dolores ab vteris calido morbo occupatis esse huiusmodi, quia etiam si non, ob abortum aut phlegmonem, sed ob monstruosas euacuationes quacunque ex causa male fluentes abortu sint febres, dolores erunt grauates circa sinciput. Vel (verbis his non ad priora, sed ad posteriora relatis) alios erit omnes ab vtero morbos, solere octo aut decem mensibus finiri in dolores coxæ. Ex vteri morbis in coxæ fieri abscessus, non quidem necessarium, consentaneum tamen est, quia is est articulus maximus, & qui plurimarum partium solet excrementa recipere, & habet cum vtero maximam, & viciniam, & rectitudinem; adeo vt, quæ contorquetur, soleat in coxam incidere, vt in aphorismo dicitur. Cum igitur vteri morbus produciatur, rationi consonum est, in coxam facere abscessum: octo vero aut decem mensibus id fieri, plurimum toris veteres enarratores (vt Gal. narrat) causam inuestigantes: atque adeo cum nullæ eârû quas inueniunt, Gal. placerent, coactus est ille ab aurore recedere, atq; affirmare id dictum esse leuiter, quod aliquando casu euenerit. Nimirum hi omnes perinde intelligebant, ac si dixisset Hippo. hunc abscessum fieri octauo aut decimo, minime verò non; aut septimo, vnde move. Ego verò non ita intelligo, sed (quia omnino ab his morbis qui prorogantur, expectare abscessus oportet, certum verò & statum vltimæ tempus sciendi hunc abscessum his morbis non est) voluisse eum incertum ad certum quodammodo redigere (ita vt si fir) nominatis quibusdam finibus, vt ex eis, & quæ inter sunt, & quæ prope sunt intelligerentur, atq; denique quædam temporis latitudo (vt aiunt) potius designaretur quam certum tempus. Dicitur itaq; octo aut decem, quasi diceret ab octo ad decem, paulo citius aut tardius. Hos vero fines statuit ex iis quæ obseruauit in ipsis rebus, computationem vero mensium, consentaneum est incipere ab eo tempore quo mulier cepit ex vtero laborare,

A & insigni ob vterum capitis dolore affici Ab abortu quidem si inde videatur morbus sumpsisse exordium, si vero antea laborauerit vteri tumoribus, & capitis dolore, & hic ipse morbus abortum fecisse putetur, non ab abortu, sed ab antecedente eum morbo.

B *Orum qui acuminatum habent caput, quæ quidem firma sunt ceruice, & aliarum partium & osium robore præstant: qui verò capitis doloribus & aurium fluxionibus afficiuntur, huius palatum concavum est & dentes serrati committuntur.*

Capita acuta dicuntur, quæ sunt in sinciput, aut occiput, aut vtrumque talia. Duplices autem sunt, qui acuta habent capita, alij quidem fortes satis & robusti, alij debiles & insigni capite. Dignotio autem est ex adiunctis partibus, & ex turpi, aut concinna capitis formatione; tamen enim magna acutis capitis, sunt secundum alteram, siue secundum vtramque partem, deficit ab optima capitis formatione, quæ est veluti sphaera modicè secundum latera compressa, potest tamen ea esse siue reliquarum partium capitis vlla turpitudine, atque tum temporis censetur formæ rectis exiguis error, præcipue si accedat ceruix firma, quæ robustam formatricem, & materiem copiam indicabit. Si vero accedat deformitas aliarum capitis particularum, haud dubie illud est ex debilitate capitis ab initio formationis profectum. Deformitas autem, quæ turpiter acutis capite solet accidere, est concavitas superioris palati, & denticulæ superiorum ab inferioribus distractio, maxilla superior, antrotrorum plus satis producta, quæ canina formatio esse videtur. Merito igitur hi qui

D *estis & expugnati sunt, robusti censentur: loquaces & volubiles, etiam dicuntur, qui firmos habent motus voluntarios, quia vt firmamentis innituntur ossibus musculi. Aliis paribus robusti dei possunt, vel ob reliquas cerebri vires, eas inquam quæ ad imperios sensus spectant, vel etiam ob reliquas hominis virtutes, vt naturalem & vitalem. Atqui sanè probabile est, omnes eas virtutes intelligi. Nam non turpiter formatum caput, significat cerebrum non imbecille. Bene autem nutrium & formatum caput significat naturalis & vitalis firmitudinem. Sunt itaque tales robusti ossibus, & calis, vnde constat fore etiam hos bene sanos. Qui vero aliter se habebunt, infirmi erunt: & debiles capite: quod quidem cerebro eius dolore, & multa excrementorum collectione agnoscitur. Multa vero mali succi in capite redundancia, effluxionem saniei ex auribus solet facere. Qui igitur*

F *estis, & expugnati sunt, robusti censentur: loquaces & volubiles, etiam dicuntur, qui firmos habent motus voluntarios, quia vt firmamentis innituntur ossibus musculi. Aliis paribus robusti dei possunt, vel ob reliquas cerebri vires, eas inquam quæ ad imperios sensus spectant, vel etiam ob reliquas hominis virtutes, vt naturalem & vitalem. Atqui sanè probabile est, omnes eas virtutes intelligi. Nam non turpiter formatum caput, significat cerebrum non imbecille. Bene autem nutrium & formatum caput significat naturalis & vitalis firmitudinem. Sunt itaque tales robusti ossibus, & calis, vnde constat fore etiam hos bene sanos. Qui vero aliter se habebunt, infirmi erunt: & debiles capite: quod quidem cerebro eius dolore, & multa excrementorum collectione agnoscitur. Multa vero mali succi in capite redundancia, effluxionem saniei ex auribus solet facere. Qui igitur*

caput compressum esse quàm sinciput, non possum probare. Nam, inquit, idè esse deterius, quòd in occipite sit nobilissimus cerebri sinus, & medullæ cervicis exortus. Id verò est adèò falsum, ut in occipite, quod à capite medio futura lambdoyde distinguitur, nihil sit, nisi parencephalis, ex qua nulla productio est, neque medullæ, neque nervi: neque sinum vllum continet. Ego proinde deteriozem formationem, cum ad sensus & ingenium, tum ad reliqua existimo, sinciput esse compressum quam occiput.

Quibus os à palato discedit, huius medius subsidet nasus: quibus autem pars ex qua dentes prodeunt, extremus nasus sit finis.

Hæc eadem sententia eisdem ferè verbis scripta occurrît, & enarrata est libro quarto. Quare haud erit nunc opus longa repetitione vti. Similitatis naturalis causa esse potest vel in errore formationis, quæ eam partem, ut aliam quâcunque solet, vitiosè efformavit: vel in malo positi ossis maxillæ superioris, quibus innititur. Nimirum si ea ossa demissiora ac profundiora sint quàm deceat, demitri etiam ac subsidere necesse est nasum, & secundum eam partem præcipuè qua innititur officulo quod humilissimum situm est. Itaque si os quod ad medium palatum est intorsum sit velut detractum, simitas erit secundum medium nasum: si postremum superioris maxillæ, ex quo dentes nascuntur, erit simitas secundum nasum extremum. Nimirum hæc nasi partes, his maxillæ ossibus innituntur. Simitas præter naturam sit, ex eisdem causis præter naturam contingentibus. Figura enim vitari potest à re aliqua contudente, ut pugno, aut palo, aut casu. Ossa etiam illa possunt præter naturam à proximis ossibus decedere, quibus decedentibus, nasus subsidet, sicutque finis præter naturam. Hoc modo solent qui Elephantem vocato morbo laborant, ob ossium, aut eorum compaginum corruptionem fini evadere, usque ad magnam deformitatem.

In infantum (fulgores siue defectus, siue comprehensiones) simul cum pubertate in quibusdam mutationes habent, etiam alias: & in renem dolor gravis, cum impleatur cibo.

Scripti per parenthesis, fulgores, siue defectus siue comprehensiones, quia ut Gal: dicit varia admodum in diversis codicibus occurrit lectio, atque varias admodum lectiones veteres enarratores sequebantur. Quidam legebant, *defectus*, id est, fulgores, seu effulgescentiæ, alij *incomprehensio*, id est, defectus, alij *incomprehensio*, id est, comprehensiones. Atqui plerique hæc voces ed desidebant, ut illis omnibus epilepsiæ, seu comitiales morbi significarentur. Atqui certè facilissima ac verissima, ea ratione redditur sententia. Nimirum epilepsiæ infantium, hoc est, quæ non procedente iam ætate ob vitia

vitia succedunt, sed ab ipso ortu, ob naturale vitium ex primordiis contractum congnuntur, simul cum pubertate in quibusdam mutationes habent. Nimirum tales epilepsiæ, cum vitia positis naturalia sint, quàm morbi, curationem non admittunt, sed ut aliæ naturales intemperies mutationem ex ætate. Non quidem ineunte pubertate sed per totum pubertatis tempus, mutationem eam fieri intelligit, quod est à decimoquarto ad vigesimum quintum. Nam septimo apbotisim. sectionis quintæ dicitur. Quibus morbi comitiales sunt ante pubertatem mutationem accipiunt, quibusque autem vigesimo quinto, commoriantur. Hoc est, ante exactam pubertatem mutationem accipiunt, si verò vigesimo quinto, quo scilicet finitur, adhuc durent, commoriantur. Quoniam verò non in omnibus mutationem accipiunt: sed in quibusdam, vtpote quibus mutatio ætatis non est satis ad eius morbi curationem, commoriantur, non dicit simpliciter cum pubertate mutationes habent, sed in quibusdam. Porro est consideratione dignum utrobique, & hic inquam & in aphorismo, dici, non quidem solui, sed mutationem accipere. Quasi non soleant solui nullo sui vestigio derelicto, sed cum alio morbo commutari. Atque hoc videtur præsentī loco multò aptius innuere, non solum dicens mutationem habent, sed explicans quas mutationes habere debent. Et alias (inquit) & in renem dolor gravis cum impleatur cibo. Quasi dicat, mutari solere in renem dolorem, & in alios morbos, ut podagram, aut alium huiusmodi morbum. Et videtur sanè hoc rationi consentaneum. Nam morbi diuturni rard sunt bonæ indicationis, nec nisi per mutationibus solvantur, nedum qui congenerati: verum quia mutationem accipere morbum, utrumque potest significare, & solui, & permutari cum alio, ut testatur Galen. in commentario citati aphorismi, atque non rard etiam evanescent epilepsiæ paulatim ætate siccatæ cerebro, citra vllum alium morbum, poteris ita interpretari mutationem habent, & in renem dolorem, & alias mutationes, quales quidem sunt paulatina solutio, aut in alium etiam morbum mutatio, ita denique, ut vna quædam mutatio earum quas potest recipere, sit solutio integra. Quoniam autem dicit infantium epilepsiæ cum pubertate mutationes habent, ne intelligas infantiam usque ad adolescentiam produci (interest enim pueritia) sed in eius epilepsiæ esse expectandum ætatis beneficium, quæ veniunt ab infantia. Nam quæ postea supervenerunt, velut alij morbi, curandæ sunt medicis auxiliis. Cur dolorem renem significans, dicat & in renem dolor gravis cum impleatur cibo, mox intelliges, ex his quæ subiungit, eadem verba repetens.

In renem gravis dolor decumbit quum impleatur cibo, vomuntque pituitam, cum autem inualuerint dolores, aruginosa, & levis quidem se habent: solvantur autem dolores, quum à cibis vacuati fuerint, arenulaque rasa subsident, & cruentam emittunt.

In renem gravis dolor decumbit quum impleatur cibo, vomuntque pituitam, cum autem inualuerint dolores, aruginosa, & levis quidem se habent: solvantur autem dolores, quum à cibis vacuati fuerint, arenulaque rasa subsident, & cruentam emittunt.

In renem gravis dolor decumbit quum impleatur cibo, vomuntque pituitam, cum autem inualuerint dolores, aruginosa, & levis quidem se habent: solvantur autem dolores, quum à cibis vacuati fuerint, arenulaque rasa subsident, & cruentam emittunt.

In renem gravis dolor decumbit quum impleatur cibo, vomuntque pituitam, cum autem inualuerint dolores, aruginosa, & levis quidem se habent: solvantur autem dolores, quum à cibis vacuati fuerint, arenulaque rasa subsident, & cruentam emittunt.

In renem gravis dolor decumbit quum impleatur cibo, vomuntque pituitam, cum autem inualuerint dolores, aruginosa, & levis quidem se habent: solvantur autem dolores, quum à cibis vacuati fuerint, arenulaque rasa subsident, & cruentam emittunt.

urinam, femoris eius quod est è directo stupor sentitur. Quiescere non confert, sed exerceri, non repleri, iuuenes hellebro purgare, popliteum incidere, urinam monentibus purgare, attenuare, ac emollire.

Cum dixisset, vnum quiddam eorum in quæ mutari solet epilepsia, esse dolorem renum grauem, cum impletur cibo, explicat modò, qui morbus renum is sit. Et hinc arrepta occasione procedit ad syndromem omnium signorum quæ cum solent comitari, & ad curationem necessariam. Est verò hic morbus lithiasis, seu lapidum in renibus congestio, quæ quidem fit ex succis crassis, calore aut frigore intra renes duratis, & topiorum modo hærentibus, aut etiam ex sanguine ipso exusto, aut ex fordibus potus quotidiani. Dolent ergo renes, & cum tale quippiam in eis præter naturam colligitur, & multò grauius, cum geniti iam lapides deciduntur (decidio est enim reuera, quia sæpe lapides ipsi carni renum affixi hærent, vt topii aquæ ductibus, & cum per angustas vias permeant. Semper tamen dolor renis, vt ponderis sensum refert, ob exiguum eius partem sensum, nisi cum magnus aliquis lapis deciditur, tunc enim velut infixæ hastæ referre sensum videntur, quandoquidem difficile distinguitur à dolore colico, hoc verò, velut pyroxyfino quidè, elapsò, & antequam tam acerbis dolor ingruat, velut incumbens ponderis sensus est, qui dolor grauius appellatur, & crescit plurimum cum cibo implet fuerint, quia cibus multas replet intestina, ea verò repleta comprimunt, grauiusque renes, quiper peritonæum crasso intestino alligati sunt. Hinc fit, vt tanta sit sympathia intestinorum cum renibus, & renum cum intestinis, & vtriusque cum ventriculo, vt colicus dolor & nephriticus inter initia, communia videantur habere signa, & curationem. Nam vtrique accidit vomitus, & eo iuuatur vterque, vacuato scilicet ventre, & succorum reuulsione facta. Fit verò calculosis principio quidem vomitus pituitosus, quia talis succus naturaliter abundat in ventriculo, procedente autem dolore etiam æruginosus, concurrente iam vndique bile, quæ doloribus & vigilis exusta est. Solent verò solui ambo dicti morbi, cum à cibis vacui sunt homines, hoc est quum intestina vacuata sunt fecibus, & omnibus quæ continent: colicus quidem, quia ita tollitur eius causa nephriticus, quia cessat compressio. Verum reliqua solutio communis non est, quia colicus sola sui euacuatione est conceptus, quam verò nephriticus iam soluendus est, arenule rursus subsident, & cruentum mungunt. Nimirum in initio reteritis aut ærenis, aut crassis succis obstruuntur viæ, & ob id exequit renes & patet, rursum de multis iam quæ retinebantur, extræ incipiunt arenæ rursus, & vrina tingi, & quum morbus iam soluendus est, procedere mactio solet vique ad cruentam urinam, & plurimam arenarum subsidentiam. Velut autem quæ ex calculo vesicæ deciduntur, esse solent alba, in quæ ex renibus, rursus, seu subrabre. Habent præterea, quibus in aliquo renum talis affectio est, stuporem femoris regione affecti renis, propter ma-

gnæ venæ & arteriæ cum renibus & cruribus connectionem. Quo pacto autem venarum repletio stuporem inferat subiectatum partium, docet Hippocrates libello de morbis virginum. Nimirum tumidis venis & arteriis comprimentibus neruulos, qui iuxta deferuntur. His dictis de morbi notis apponit quæ ad curationem pertinent, dicens, quiescere non conducit, sed exerceri, non repleri, iuuenes verò purgare, popliteum incidere, urinam monentibus purgare, attenuare, ac emollire. Non exigua autem interpretationis pars sit, hæc eadem, eo ordine quo agenda sunt, dicere, ita scilicet, non repleri scilicet videri vti, popliteum incidere, cruris scilicet è regione positi, deinde si iuuenis sit, veratrum, aut alio medicamento expurgare vacuare, postea exerceri, & dieteticis medicamentis vti, & exteriùs apponere incidentia, & laxantia, quæ nunc vocat emollientia. Nimirum à victus institutione oportet curationes omnes, si fieri possit, inchoare, tenuis autem esse debet, quandoquidem ingruenscit dolor cum cibo repletur. Popliteum verò incidere, aut si id chirurgus non possit, omnino in cruræ venam secare bonum est, ad solvendum eam venarum tensionem, quæ vt facit cruris stuporem, facit etiam repletionem renis. Expurgatio verò duobus modis proderit, & materiæ detrahendo, & laxando intestina, quandoquidem soluuntur cum à cibis vacuati fuerint. Posthæc dieteticæ & exercitatio mto detrudent à renibus quicquid hæserit, præcipue si appositis, siue inunctionibus, siue irrigationibus, incendantur succi, & laxentur viæ.

D *Menstrua purgationes mulieribus aquosis diu perseverant, nisi autem celeriter procedant, inueniuntur.*

Aquosæ mulieres sunt, quibus aquosis & tenuis est toto corpore sanguis. Talibus solem mulieribus expurgationes diu perseverare, hoc est multos dies durare ob tenuitatem scilicet sanguinis, atque quia indigent adeò ei euacuatione, vt nisi celeriter etiam procedat, solent inuemescere, hoc est hypodixæ fieri ob aquæ redundanciam. Atque eadem erit ratio, siue celerius fieri intelligas, esse crebro repetere, siue copiose, dum durant, effluere. Quicquid sit eo res venit, indigere has multa euacuatione ex vtero, ac quæ multa hæc solent in hydropicis haberi.

E *Cranone inueterati dolores frigidi, recentiores verò calidi, ex sanguine autem plurimi febant, & qui à calida frigidi.*

Nihil vniuersale continent hæc verba, sed solum narrationem quorundam quæ in Cranone conigerunt, neque expostis morborum specie neque temporis constitutione, quare exigua est quod hinc capere possumus vilitatis. Fortasse decisa sunt hæc verba ex alia narratione longiori, aut scripserat hæc memoriæ gratia sibi ipsi, qui

reliqua nonerit. Nobis verò nihil aliud narrat, quàm veteres dolores fuisse frigidos, recentes calidos. Dolores calidi aut frigidi dicitur non possunt nisi ob causam, ob hanc verb rectè dicuntur. Nam doloris nomine aliquando apud Hip. pocrat. ipsa dolorifica affectio solet intelligi, vel ut in aphorismo dicitur. Qui dolentes dolorem non sentiunt, hoc est qui dolorificam habentes affectionem, eam non sentiunt: Sic quidem possunt esse dolores calidi & frigidi. Dicitur igitur affectiones recentes fuisse calidas, & veteres frigidas. Quando autem veteres omnes, antequam inueterasset, fuerant recentes, constat recentes hic vocari, eas quæ ad inueteratas nunquam perueniunt. Tales autem sunt quæ acutæ, ut veteres quæ chronice. Secundùm rationem igitur factum est, ut acuti calidi essent, & ex calidis succis pendentes morbi, chronici vero frigidi, & ex frigidis. Cùm autem calidi succi sint bilis & sanguis, ex sanguine inquit accidisse ut morbi ea rempeltate, maxima ex parte nascerentur. Et qui à coxæ (hoc est dolores coxæ) frigidi. Exemplum est hoc prius dictorum. Nam coxæ dolor vnus quidam est, eorum qui inueterasce solent.

Quæ morbi in validos tendunt rigores, non admodum mitigantur nisi prope vigorem.

In rigores fortes procedere dicuntur febres quæ rigores fortes habent: non miscere autem, de rigoribus ipsis dicitur aut de febribus secundum rigores. Nam secundum essentiam propriam, non solum quando prope statum sunt, sed neque donec status sit elapsus, miscant febres. Porro status nomine intelligi potest qui totius morbi est, aut qui cuiusque paroxysmi: & utroque modo redditur verus sensus. Nam in febribus quæ procedunt in rigores fortes, hoc est habent rigores solari difficiles & longos (nam cum rigores fortes dici possint, aut quod vehementes, licet breues, aut quod vehementes & producti, secundum hos videtur significare illud verbum (procedunt) non miscant cito rigores in ipso paroxysmi principio euanescentes, sed procedunt etiam per ipsum incrementum, neque miscant donec prope statum iam sint febres: atque ita etiam quum febres procedunt cum fortibus rigoribus, hoc est vehementibus (siue etiam longi sint, siue vehementes solam) non solent febres miscere, hoc est minores & miriolas habere rigores, donec prope statum iam sit morbus. Hoc in quartanis febribus maxime observari dicit Galen. in quibus prognosticum signum esse dicit appetentis iam status, cum à magnis rigoribus hac usque febres inciperent, iam miscere. Miscant vero tunc, ut diximus, secundum rigores, secundum essentiam propriam potius aucta, in inclinatione autem miscant secundum utrumque.

A

Ante rigorem urinarum suppressiones accidunt, si ex vtilibus processerint, & alius excreuerit, & somni adfuerint. Forasan autem & figura febris, forsan etiam quæ ex lassitudinibus contingunt, considerata sunt.

B

De rigore decretorio nunc loquitur, docetque rationem quandam satis artificiosam, talem rigorem prævidendi. Nimirum ex vrina suppressione, dicens ante rigorem suppressiones urinarum fieri solere. Nimirum rigori decretorio solet succedere sudor, sudoris vero & vrinae eadem materia, atque ita merito altera euacuatio alterius succedit suppressioni. Verùm quia vrinae suppressæ non vnica, sed multæ possunt esse causæ, multis aliis considerationibus est opus, ne præsentio nos fallat. Proinde addit reliqua, velut ita dicens. Considerandum tamen ut firmius euadat prognosticum, an ex vtilibus processerint, & alius excreuerit, & somni adfuerint. Forse autem & febris figura erit considerata, forte autem & quæ ex lassitudinibus. Nam si alius plurimum processerit, eam ob causam poterit vrina supprimi, nec rigor aut sudor instabit. Nimirum ut multo plurima exigua deiectione facit, ita deiectio plurima exigua mictionem. Si vero non processerit alius, & antecesserint signa optima, & quæ bonam indicationem promittant, velut in primis concoctionis notæ in vrinis (hæ enim celeres iudicationes & securitatem significant) proinde dicit, & de xpois iano, hoc est si vrinae, antequam supprimerentur, processerint viles, & concoctæ, & alius non excreuerit, constat causam esse quod euacuatio alia decretoria inferat, ea erit rigor & sudor, quæ ratione diximus. Quod vero addit, & somni adfuerint, Gale. intelligit dictum ut vnum quoddam exemplum vtilium signorum quasi dixerit, si ex vtilibus fuerint, hoc est si antecesserint signa vtilia & bona, velut somni boni ac placidi. Mihi vero videtur dictum si somni fuerint ex vtilibus, illud enim iano, significare videtur adesse somnos tunc cum expectatur iudicatio, quo tempore constat nihil minus esse debere, ut iudicatio indicetur, quam somnos placidos, potius n. debet antecedere anxietas, & inquietudo. Mihi proinde potius videtur significari somni difficiles, & cum inquietudine. Nimirum expectatur rigor & sudor vrinae suppressæ, cum alius non fluxerit, quod seorsum suum rapit, & in totum corpus distributum sit. Id quod factum esse, accedens cataphora indicat. Nam aqua sustinuit lata, & sanguine facto diluore, somnus ille vitiosus fit. Quod in aquis & humefcentibus experimur. Igitur somni ponuntur hic potius tanquam vnum quoddam exemplum signorum instantis crisis, quæ in antecedente nocte contingunt quum vtilium, quæ processerint. Si vero ut vñ calidum exemplum ponitur, reliqua etiam debent intelligi. Itaque dicit, si alius non processerit, & vrina supprimatur, & antecesserint signa concoctionis, & adint nunc signa laboris & instantis crisis, velut anxietas, & imprimis graues somni, rigor decretorius, ut cui sudor succedat,

C

D

E

F

succedat, expectari debet. Forè autem satius fuerit, & figuram febribus adiungere. Si enim ea sit è genere ardentium, firmius præsignium est. Quia ut in aphorismo dicitur. A febre ardente, rigore superueniente, solutio. Quod si ex lassitudine aut labore cepit febescere homo, maior coniectura est febrem esse ardentem, atque inde rigorem expectandum. Nam in initio quarti de ratione victus in acutus, agens de ardente febre ipsemet dicit, accidit autem magna ex parte ob longa itinera. Itaque ob febribus speciem considerari vult etiam externam causam an ob lassitudines. Dicit verò fortasse his repetens id aduerbium, quia satis multa videbantur dicta ad præsignij confirmationem, nec videbatur omnino necessarium, postrema hæc adtingere, vtile tamen etiam. Quasi diceret, satis quidem est considerasse quæ dicta sunt ad huius præsignij firmitudinem, forè autem vtile etiam est maioris claritatis gratiâ, adhibere etiam in considerationem, figuram febribus, & eius causam externam. Oportet verò considerare tam multa, quia sine his censerebatur vrina symptomaticè potius suppressa, vel ob obstructionem quampiam viz, aut resolutionem facultatis expultricis in vesica.

Abscessus non admodum contingunt ijs quibus rigores sunt.

Hæc quoque sententia pertinet ad prognosticam partem. Quod dicitur est, febres quas comitantur rigores, ut tertianas exquisitas, & quasdam quartanas, non admodum solere habere abscessus. Quia scilicet expurgantur venæ singulis rigoribus, cum fiant succis extra vasa missis. Quoniam verò hac ratione non monstratur fieri non posse abscessus, sed esse cur non crebrius fiant, dixit, non admodum. Illud tamen nosse oportet, tantò minus futuros abscessus, quantò rigores e-runt acutiores, & in suo genere exactiores, & magis exquisiti. Hoc est, quanto partes concutientur magis, quia eo longius pelluntur succi à vas, & eo magis discutuntur.

Cruentum effaminaiones veluti aut ante morbum, aut statim à morbo iser facienti contingunt i eadem forsam ratione quæ ex lassitudinibus in articulos aliquand abscedere solet, unde etiam cruentum effaminatio-nes accidunt.

Debilitatem & effaminationem cruentum, similem ei quam sentiunt, qui iam iam sunt parati in morbum incidere, aut qui statim à morbo, antequam corroborentur, deambulant, dicit quibusdam manere ex morbis, vel multum tempus, vel totam etiam vitam. Causam vero esse, quod cum essent febres illæ laboriosæ, & cum lassitudine coniunctæ, fecerint abscessus in articulos. Unde accidit, ut illi laxi superfuere & ligamenta molliora unde cruentum effaminaiones accidunt hoc est languor qualis mulieribus adest. Quem constat non in

A gracilitate, & extenuatione, sed in imbecillitate consistere. Dicitur autem hoc iuxta illud quod in aphorismo est. Lassitudinem habentibus in febribus, in articulos & circa maxillas potissimum abscessus sunt. Tamen hinc discit, abscessus adarticulos factos esse aliquando circa articulares dolores, & tumores, qui solis his effaminationibus, seu laxitatibus agnoscuntur.

Berberula extorsum intumescens, & acuminata, & fastigiata, & qua equaliter maturescunt, nec in ambitu dura, & deorsum vergentia, nec bifida, meliora sunt: contraria autem mala, & qua plurimam contraria, pessima.

Hæc eadem sententia scripta est primo prognostici eisdem fere verbis; Illic enim. Suppuratio inde proveniens ita considerata est, quæ enim foras veniit optima est, si parva est, maximèque egreditur, & in sublime resurgit i si vero magna est, & lata, minimèque in mucronem tendit pessima est. Addit hic, ut si opacitas suppuratio, & non inflatio, & non puer, & non puer, & non puer. Scilicet quæ equaliter secundum se tota tendunt in suppuratiorem, hæc sunt in ambitu dura, hoc est quadam parte incipientia suppurare, & circumcircata dura, ex materia pendente mitiori, & simpliciori: ut contra quæ inæqualiter suppurantur, quæ sunt in ambitu dura, aut etiam bifida (hoc est extuberantia in duo cacumina) pendentes ex materia diversâ, & inæqualiter contumaci. Commendat etiam deorsum vergentia tubercula, id est, quæ in declivem suppurantur. Nam siue à chirurgo secantur, siue sponte rumpantur, quum cæcis gravior facta est, ut solet, optimè expurgabuntur scissura in declivem spectante. Hæc igitur bona, contraria autem mala. Nimirum tubercula introfusa intumescens, ut cum tumor non eminet acutè: & lata, & quæ inæqualiter suppurari incipiunt, in ambitu dura, aut bifida, aut etiam multifida, & quibus incipiens suppuratio in sublime spectat. Quoniam vero possunt hæc magis aut minus inesse, dicit, & quæ valde contraria pessima.

Lymbrici Autumno generantur & oris ventriculi dolores, & horrores & atrabilis.

Per initia exacerbationes considerande sunt, & in omni morbo veluti sub vesperam exacerbationes contingunt, sic etiam quando inclinat annus, & Ascariides generantur.

Hæc duæ sententiæ enarratæ iam sunt in secundo libro huius operis, prope libri initium. Ilic enim scriptæ ab eodem Hippocrate sunt, atque adco

aperiunt. Nunquam enim enigmatica phasi videtur v-
sus. Idem tamen est quod dicitur & quod illic dixe-
rat: *Septuaginta* quid esse in morbis autumnis, horro-
resque & cardiacas, & melancholicas passiones.
Porro considerandum inter morborum initia, hoc
est, mox ab initio (addit nunc & in omni morbo)
an ita vigent ac efflorescant, ex circuibus &
paroxysmis. Porro exacerbationes plurimorum
morborum solere in vespertinum tempus incidere,
& ita etiam autumnis grassiosos morbos grassari &
eos qui antea orti sunt exacerbari, quod anni par-
tes cum diei partibus analogiam quandam habeant
& autumnus sit ut vespere anni. Porro ascarides au-
tumno magis quam villo alio tempore gigni, & vesp-
peri virgere, ut alia plerique mala, omnia hæc ex-
plicata, redditurque omnium causa fuerit, loco ci-
tato. Porro repetita sunt hæc eadem libro. 4. cir-
ca medium, præter id quod de ascaridibus dici-
tur.

In infantibus tussicula cum ventris turbatio-
ne, & febre continua, significat post cri-
sim bimestri, etiam tumores prorsus vicesimo
die ad articulos fore.

Singulare quiddam, & quod non ita necessario
accidat, neque adeo sæpe, docere videtur: puta
infantibus bimestribus, laborantibus tussicula,
cum turbatione ventris, & febre continua, solere
finiri malum in tumores articulosos, idque vige-
simodie morbi post citius, hoc est morbum hoc
modo indicari, puta per abscessum. Certe totam
hanc syndromen, & hunc exitum statim die, per
raro offendes. licet tamen nobis, quæ ita dicuntur
velut exempla accipere, & si quid vniuersalis
doctrinæ inde possit decerni, procurare. Dictum
est aphorismo 31. quartæ, lassitudinem habentibus
in febribus, in articulos, & circa maxillas potissi-
mam abscessus fieri. Huius causa est, quia lassitu-
do iohet multitudinem. Quam causam continet
aphorismus 45. eiusdem sectionis quo ita dicitur:
Quibus tubercula, vel io articulos labores fiunt,
ij pluribus videntur cibis. Pluribus cibis est mul-
titudinis causa, lassitudo signum. Dicit igitur omne
Hippocr. non adultis solum, sed infantibus etiam,
solere terminari morbos tumoribus ad articulos,
quoniam laborant cum multitudine. Velut autem in
adultis qui fariid possunt, multitudinis signum ac-
cipitur ex lassitudine, ita in infantibus qui non pos-
sunt, ex tussicula cum ventris turbatione, & febre
continua. Non mirum autem si vigesimo die id fiat,
cum sitis dies addo insignis. Istaque quod geera-
tim in aphorismo dictum est, hic de solis infantibus
dicitur. Illud verò est scitu dignissimum, quas no-
tas multitudinis debeat obseruare, in ijs qui non
possunt interrogationibus respondere, quæ eadem
quoniam in adultis etiam occurrunt, sæpe significant
multitudinem: tussicula (scilicet per febres) cum
alioqui non rursus homo, neque ad pleuritidis
aut morbus alius cuius sit propria, & ventris tur-
batio inter morbi initia. Ex quibus proinde absces-
sus ad articulos expectare iohet sectione prima-
libri secundi, & rursus sectione secunda huius sexti
libelli.

Si quidem è superioribus partibus delapsi,
infra vmbilicum in inferioribus articulis
confisterint, bonum: si autem in superioribus,
non eque morbum solunt, nisi ad suppu-
rationem veniant.

Secundo libro Epidemiorum dixit, abscessus èd
meliores esse, quod ad inferiores deuoluuntur sedes.
Hoc etiam in prognostico docuit, iubens in ijs qui
salubriter affecti sunt, cum tamen febres progren-
tur, expectare abscessus ad aliquem articulum, ma-
ximeque inferiorem. His consonum est quod nunc
dicit, si morbi partium superiorum abscessus fa-
ciunt, ad articulos qui sunt infra vmbilicum bonum
esse, sin autem abscessus in superioribus partibus
constiterint, non adeo bonum esse, nec similiter
soluere morbum. Addit nunc ad supputationem ve-
niant, omnes partes infra vmbilicum minime in su-
ppurationem vertuntur, ut dicitur in prognostico,
partes vero superne possunt supputatione perfe-
ctius interiores partes expurgari: neutri vero sup-
purantibus, perfectius liberant inferiorum abscessus.
Itaque ubi locis citatis præfert abscessus inferiores
superioribus, intelligi debet nisi supputatione fin-
iantur. Tunc enim inferiores soluantur morbus ter-
minus, quia aut omnino non suppurant, aut imper-
fectius & tardius.

Quæ in humeris supputationem faciunt
in tantulâ etate, breuiora & graciliora
brachia efficiunt.

Humerus vocatur os maximum brachij, quod
altera ex parte coarticulatur cum spaula, altera cum
cubito in ea flexura quæ in medio rotius brachij est,
& cubiti articulus vocatur. Itaque vltra humerum
cubitus est, & cum illo articulum facit. Didici-
mus vero ab Hippocr. tertio de articulis, ubi ossa
liquod vitium insignè passum est, ut luxationem
aut tororem, ossa proxima læsæ parti noo verè
in iustum incrementum, si pusillis & nondum
adultis ea vitia accidant. At (inquit) quibus dum
adhuc pueri sunt, prius quam corpus integrè ad-
oleuerit, spina in gibberum incuruat, ijs cor-
pus ad spinam augeri non licet, sed cum erunt &
brachia ad perfectam auctiorem veniant, illa exi-
liora euadunt. Quibuscumque etiam super septem
gibber contigit, ijs costæ in luitudinem augeri
non conseruerunt. Hæc Hippocrates quibus ap-
pertè inquit, ossa male affectis proxima, non au-
geri satis, si is qui laborat adhuc crescat, quia ut
Galenus in commentatione dicit, euenit necessario
ut quæ partibus prope positis alimentum deferant,
iuxta partem affectam aliquid patiantur, ut distor-
quentur, comprimantur, aut debilitentur, & languidior fiat
partis motus, & dolore aut iotemperie debiliten-
tur naturales facultates partium patienti proxi-
marum. Vnde necesse est minorem fieri nutritio-
nem, & ob id auctiorem. Similem prorsus cau-
sam habet, quod & hoc loco dicitur, nimirum
quibus tantum, hoc est pusillis, & adhuc crescen-
tibus in humero sit magna aliqua suppuratio, ne-
cessè est, dictum ob causam, partes vltra hume-

rum positis, breuiiores in reliquo vice manere. Sequitur autem proximè humerum cubitus, per hunc manus, sicut igitur hæc breuiora, non tamen manus aded ac cubitus, quia ex longius iam posita est. Velut quibus spina in giberum incuruat, coipus ad spinam non augetur, crura tamen & brachia non sunt ob id breuiora. solis. Nimirum hæc etiam procedunt à parte laxa, non tamen proximè, sed longius. Cubiti igitur soli sicut manifestè breuiiores, ijs quibus humeri in teoella ætate patiuntur suppuraciones.

Soluet quoque morbum vlcusculorum in inferiores partes eruptio, nisi rotunda sint & profunda, talia namque pueris aliqui perniciofa sunt.

Soluere morbum aliquando dicit Hippocrates quicquid morbum tollit, etiam hominem non persanet, sed permutacionem cum alio faciat, atque adeo, etiam si deficiente morbo homo intreat, ut quum in apothismo dicitur. Quibus in articulis febribus tremores sunt, insana soluitur. Constat tamen, ut in commentatione eius loci diximus, non satis propriè permutacionem talem, vocari solutionem, sed propriè duci solui morbum, quum homo nullo alio manente liberatur, ut cum dicitur ab aqua inter cutem, aqua è venis in ventrem fluente soluitur morbus. Secundo loco solutio, dicitur etiam ea permutatio, per quam homo à secundo etiam morbo liberatur & superuenit, ut quum dicitur. Quibus dolor circa hypochondrium siue phlegmone fit, iis febribus succedens soluit dolorem. Huc secundo significatio dicitur nunc vlcusculorum in inferiora eruptio, soluere febrem continquam infantium, cum tussicula, & alui turbatione (de illa enim adhuc loquimur) nisi ea vlcuscula sint rotunda, & profunda, talia enim non solvunt hoc secundo significato, quia ex ipsis intreat pueruli. Perniciofa enim sunt eius figure vlcera, & curatu difficilima, ut libello de vlcibus ipsemet Hippocrates testatur, adeo ut curari non possint, nisi duplici aut quadruplici sectione ex rotundis longa fiant. Maxime autem sunt perniciofa infantibus, quia dolores & difficultatem eius curationis ferre non possunt, nec curari, facile ob carnis molliem exduotur, curati dolore exanimantur, aut coeuntur. Tamen testari possum, me vidisse infantulam, aliqui iam ex morbo languidissimam, cum nescio quot vlcusculis rotundis, & valde profundis in naribus, non sine mea magna admiratione seruata, erat verò aonum iam nata integrum. Hippocrates ounc agit de bimembris.

Soluet etiam sanguis fluens, magis autem hoc apparet in ætate prouectioribus.

Fluxus sanguinis maxime solet præseruare ab abscessibus ad articulos, atque ita morbos, in quibus

articulorum tumores expectantur, sine eis soluere, ut dicitur in apothismo septuagesimo quarto quartæ. Verum is fluxus ætati perfectæ est familiaris, pusillus rard accidit, ut in prognostico dicitur his verbis. Sanguinis fluxum in iunioribus potius trigessimum quæntum annum ægeonibus expectare oportet. Intelligi autem debet, vique ad trigessimum quintum, nam postea suppuracionem expectabis, ut in prognostico etiam dicitur. Causam reddit Gal. dicens, etenim per hanc ætatem sanguis plurimus est, & item sacras fortior, & calor exuperans. Sed si indicatio hæc fieri non solet in pusillis, de quibus hucque Hipp. agebat, quorsum eius nunc meminit? Certè sermonis communione digressus ad eam euacuationem est, sermone verò de illis pusillorum morbo, hic finit.

Lachrymæ in acutis quam male se habent agri, spontanea quidem bona sunt, inuitæ autem malum portendunt. Quibus etiam palpebræ circumciduntur, malum. Malum quoque quum aliquid in oculis inarescit, ut spuma: eorum quoque obscuratio & squalor, malum significant, & qui intus corrugantur, quique concretæ sunt, & vix vertuntur, obortuque, & quicunque alia videntur.

Hæc pertinent ad rationem prædicendi in morbis acutis ex oculis & facie. Scripta autem eadem sunt in apothismo & in prognostico, atque utrobique à me enarrata. Lachrymæ acutè ægrotantium, non sponte fluentes malum significacionem præbere, locis citatis dixi, sponte autem fluentes non esse malas: nunc adijci etiam esse bonas. Atque id merito, sem enim præstant voluntaria ægrotantium lachrymæ, uo quidem vlcunque ægrotantium (quis enim cohereret ad qui diuturno conficitur morbo plorare) sed ægrotantium acutè. Neque horum quidem quocunque morbi tempore (nam primis diebus morbi quantumvis acuti lachrymari, nihil admirationis habet, neque vltimam significacionem præstat boni aut mali) sed in summo morbi vigore iam consistentium, in quo, qui morituri sunt, ne plorare quidem possunt ob oculorum squalorem, concretionem, & immobilitatem, quæ pessima & lethalia esse mox dicit. Lachrymari igitur sponte bonum est, quia nihil horum adesse significat, sed mediocrem partium humiditatem, & facultatis regentis constantiam, & abesse consulsionem. Reliqua ex prognostico facile intelliguntur. Nam ille vituperatur cuius frontis circumtenta & arida, cum qua circumtenditur supercilium, & sordes apparentes circa oculos, quas nunc vocat, inarescens, vispuma. Dicit enim *ἐμφανίζονται οὗτοι ὄφθαλμοι*, significat verò *ὄφθαλμοι* non qualemcunque spumam, sed exiguiam, & aspergins concretiscentis modo factam: nimirum minutissimas guttulas spumæ aridæ. Est itaque sordes apprensæ circa oculos squalidos. Squalorem etiam oculi, & obscuritatem vituperavit in prognostico. Corrugatio interius facta in oculo,

arescentiam significat, vt in extremis senibus. Est igitur signum corruptionis facultatis, & atrophie. Partis concretio, & inflexilitas oculi, & distortio, quam in prognostico pernerionem vocat, conuulsionem indicat. Hec igitur omnia mala sunt, & quæcunque alia omissa sunt, quæ scilicet in prognostico recensentur, vt alterum altero oculum apparere minorem, & candidum rubrum habere, auriluidas aut nigras venas, & alia huiusmodi.

Febrium quidem quædam manuum mordaces sunt, alie vero mites: quædam autem non mordaces quidem, sed postea auferentes: quædam acutæ quidem, sed quæ ad manum immittuntur; quædam statim exardescunt, alie autem semper debiles sunt: sicæ alie quidem sanguinolentæ sunt, alie vero ampullosæ (vel flatulenti) aspectu horrenda. Alie ad manum humida: alie etiam prærubræ, alie liuidæ: quædam valde pallidæ, & alie id genus.

Febrim partitiones continet hæc dictio, quam ego in commentariis libri primi de differentiis febrium abunde explicui. Quoniam vero obliuiscitis Hippocraticarum dictionum exposita est quam plurimis enarrationibus, satis fuerit eam nunc proferre, quæ mihi videatur maximè consentanea, & quæ plus frogis contineat, quam plurimas recensendo, aut etiam resutando, & de vocum significatione contendendo, replere chartas, & otio abuti: quæ enim inde doctrinæ accessio fiet? Videtur igitur tota hæc dictio, quatuor partitiones seorsum continere posse, primam quadrimembrem: secundam bimembrem: tertiam trimembrem: quartam multimembrem: Tres quidam primas: petitas ab ipsius caloris præter naturam (in quo febris, consistit essentia) modo, aut materia (modum dico quo tangente manum afficit mordendo aut non, & quo mouetur acutè aut tardius, materiam vero in qua factus firmatusque consistit) postremam ab externis, & per accidenstingentibus febri, vt à colore. Atqui mordere tactum aut non, ex ipsius materis natura nascitur. Quo fit, vt non sine magno artificio prima partitio & differentias febrium, & earum dignotionem contineat. Nimirum differentie contingunt secundum differentiam causarum internarum, dignoscuntur secundum alium & alium modum afficiendi tactum. Ea verb est hæc, febres quidem alie mordaces manui, hoc est semper & à principio mordentes manum: alie autem mites, hoc est, graui, mitem, minimè que mordentem calorem præferentes. Alie sunt non mordaces quidem primæ manui ad morione, sed postea immittuntur, hoc est paulatim mordacitatem comparantes: alie contra acutæ quidem primo occurru, hoc est acutè occurrentes tactui, & mordentes, sed paulò post immittunt, & paulatim vel vt à manu vincantur, mordacitatem deponentes. Consistit bis quatuor differentiis, quandoquidem ex modo afficiendi sensum accipiuntur, dignotionem etiam contineri. Continentur verò

A his quatuor differentiis, omnium ex succo pendendum febrium species, quin etiam quodammodo etiam febres omnes. Nam cum iuxta succorum differentiam quatuor sint, melancholica, sanguinea, biliosa, & pituitosa, calor bilis & melancholicæ mordax est ob materis ariditatem, sed bilis mordacitas vincitur à manu ob materis & vaporum tenuitatem: sanguinis & pituitæ ob humiditatem mordax non est calor mordax, tamèn à pituita non abest mordacitas, siquidem petrida fit, sed adest quædam, quæ etsi primo occurru non appareat, persistente manu insurgit. Itaque semper mordaces sunt melancholicæ; semper mites sanguinæ: non mordaces sed postea auferentes pituitosæ: acutæ sed imminutæ: biliosæ. Quibus quatuor generibus continentur omnes, quæ ex succis pendunt. Possunt autem contineri etiam alie omnes, hæc quidem in mordacibus cum melancholicis: diariz in mites cum sanguineis, tales enim sunt reuera. Hæc est partitio prima. Hic succedit hæc altera, febrium alie statim videntes, alie semper debiles. Hæc partitio accipitur à motu morbi, quasi diceret, quædam febres sunt acutæ, quædam chronice. Nam acuti morbi sunt qui statim vigent. Itaque acutæ sunt febres quæ statim vident, & sunt summe. Itæ etiam in essentia propria magni morbi sunt, qui acuti, quia magna aded mala nullus potest diu sustinere, sed breui soluantur aut intereant. Qui ergo chronici, sunt debiliores. Proinde febres non acutæ rectè vocantur semper debiles. Hæc itaque est secunda partitio. Tertia verò quæ mox sequitur, *Exposit, si de diarræidæ, si de petridæ, id est diarræidæ, si de petridæ, id est diarræidæ, id est diarræidæ*. His verbis videtur insinuari sollempnis illa partitio in heclicas, petridas, & diariz. Nam heclicæ sunt ficæ. Calor verò si ficæ est mordax, diciturque proinde falsus per metaphoram. Nam falsum proinde ad gustum, non ad tactum refertur, sed qualis est gustui mordacitas ex falsis, talis tactui ex aridis & exustis. Proinde ergo heclicæ febres dicuntur aridæ & falsæ. Ampullosæ febres dici non posse alias, quàm quas ampullæ quædam per corpus obortæ emittantur, satis constat ex ipso nomine, & quod mox addit, id multò apertius indicat, aspectu horrendum. Nimirum morbi in quibus per cutem ampullæ, vt ex cutis combustione, dispersæ sunt, aspectu graues & horrendi sunt. Consistit verò hæc in febribus malignam putrescentiam, aut exactionem succorum indicare. Quamquam ergo non omnibus petridis hoc accidit, sed si febres quibus hoc accidit omnes sunt petridæ, & triplex illud genus ad hanc partitionem reducendum est (vt est consentaneum) rectius petridæ ad hanc partem referentur, quàm ad primam, aut postremam. Velut nomine ad tactum humidum, rectè intelliguntur diariz, quia harum calor est vaporosus, & tactui humorem quendam repræsentat. Tamen ergo petridæ ex succis pendunt, ad tactum non sentiuntur aded humide. Quin potius, ille omnes sunt mordaces & acres, aut mox, aut postquam manus aliquandiu adhæserit, aut semper. Nam sanguinæ, quæ solæ exuruntur ex succis pendunt, sunt ad tactum humide, inter diariz potius censeri debent. Quia quæ in illis petridæ sunt, biliosæ etiam sunt, atque vt ad biliosas plus aut minus inclinant, ita à blando sensu, & humido tactu recedunt. Consistit ex hæc

B

C

D

E

F

enarratione, illam voculam, sicca, non referri ad antecedentia, vt quae semper debiles, dicantur etiam sicca (quamquam ita videtur) sed potius ad sequentia, vt eadem dicantur sicca & saluginosa. Superest postrema partitio, quae quidem inartificialis est, & ex ijs quae per accidens insunt, desumpta. Sed vt sepe in his commentariis, & abis in Hipp. scriptis diximus, antiquissimi medici multis morborum inartificialis differentis vsi sunt, quia non dum erat ars exacte constituta. Vnde igitur febres tubae, pallide, lauidae, virides, albae, aut alio quouis colore, ob eam hominis, siue ob excrementa dicantur, externae differentiae sunt, & nullas proprias species constituunt, sed tanto quouis febres esse agnosceret benignior aut malignior, quanto color siue faciei, siue excrementum mitiorem aut maligniorem causam praese fert, iuxta ea quae in prognostico, & abis openbus, de colorum significatione scripta sunt.

Diffensiones corporis & articularum durities malum denuntiant: & quum excoluitur, malum: & articularum fractiones mala sunt.

Hae sententia, vt & quae mox succedit, ad partem prognosticam pertinet. Diffensiones corporis & durities articularum sunt ob attum inflexibilitatem, ac veluti rigorem. Contrarium his est, dissolutum esse corpus, & confractos habere articulos, vt quum exporredis ac veluti a facultate demissis artibus quis iacet, & articulis laxis, & velut fractis. Constat vero articuli prope non esse fracturam, sed potius luxationem. Dicuntur vero qui laxi, & firmitudine carent, fracti per metaphoram. Nimirum quia fractio osse per firmitudo membri, quum articuli nihil flexurae resistunt, ob similitudinem fracti esse dicuntur. Vt truncae autem horum in morbis acutus malum est. Illud enim significat consulsionem, hoc fracturam, Vtrumque autem in prognostico ab eodem Hippocrat. scriptum est. Oportere enim agrotum manus, collum, & crura habere modice inflexa, & eorum corpus flexibile; malum vero esse si manus, collum, & crura distenta habeat.

Oculi audacia delirij signum est, & deiectio, & fractio malum portendunt.

Hic quoque deiectio & fractio oculi contrarium significant, ei quod vocatur audacia oculi. Accipitur vero etiam haec nomina metaphorice. Nam audacia proprie ad hominem spectat, aut ad cor: fractio ad ossa, & res huiusmodi. Sed vocatur audacia oculi si oculi positus, qui audaciam indicat. Est vero is, oculi intentio firma, & rectus intuitus, oculis non nudentibus. Nam vt in a. libro in calce sectionis quinquae dictum est. Oculi non nudentes iracundi sunt. Iracundia vero comes est audacie, quia timor itam cohibet. Igitur rectus intuitus oculis non nudentibus, audaciam indicat. Et hic ipse per morbos acutos,

A est signum delirij. Quia sine occasione aut vlla procatarractica causa tales animi motus sunt infamius soboles. Error enim imaginationis commouet animum, cum nihil sese offert, quod ita mouere naturae sit. Quod si recto illi & firmo intuitui, accedat palpebris non nudentibus oculorum crebra motuatio, indicatur enim furor, vt in prognostico dicitur. Contrarium audacie vocatur deiectio, & fractio oculi. Nimirum quidam oculi languor, vt non videantur quicquam posse recte intueri, ac ne videre omnino, & quicquid ob oculos ponitur omnino non aspiciunt, vt videantur his qui adsunt, non videre, id quidem in vltimis morbis pessimum signum, nam deficientis iam facultatis, soletque accidere moribundis, & vulgari phrasi, quae fortassis ab hac Hipp. dictioe fluxit, dicuntur tales oculi fracti iam esse, quod scilicet quasi disrupui essent, non videant, & languent, peritumque deiectionis iam sunt.

SECTIO SECVNDA.

Dilatate, constringere alia quidem oportet, alia autem non.

Magna pars huius sectionis secundae pertinet ad partem curatiuam, velut haec sententia, & quaedam mox sequentia. Qui vocari sunt methodici, quorum princeps fuit Theusalus hac vnica regula censebat contineri totam artem: omnes enim morbos astrictos esse, aut laxos, atque ita nihil agendum aliud, quam laxandum, aut adstringendum. Verum falsebantur. Multi enim sunt morbi, qui neque in astrictione neque laxitate essentiam habent, & multae curationes, quibus neque laxatur, neque astringitur, cuiusmodi est vacuare, reple, excremare, crassum inferre, exasperare, lenigare, & alia multa huiusmodi. Nimirum affectiones omnes contrariis alterationibus curantur. Sunt vero excessus praeter naturam multis alijs in rebus, quum in laxitate aut constringatione partium, nam in temperie, numero, magnitudine, positu, & alijs figurae differentiis. Agenda igitur haec sunt, dilatarandum, inquam, atque constringendum, quum res exigit, non tamen ea sola sunt agenda, sed alia quidem constringendo aut dilatarandum curanda sunt, alia autem non, sed aliter. Quod insinuans dicit, alia quidem, alia autem non. Quae dilatarandum aut constringendum curantur, sunt vitia, per quae patres aut astricti, aut laxi sunt nimis, vt cili ob astrictam & soca aluum, vrinis clysteribus humidis & laxantibus, & ob densam cutem, vtinur balneo aque tepidae, aut mollioris frictionibus cum inunctionibus olei, aut ob laxam aluum vrinis astringentibus clysteribus, aut cataplasmatibus: aut in ijs qui nimia euaporatione, aut profuso sudore exoluantur, vtinur aliquando percutitur totam astringentibus inunctionibus, & ad anastomoses vasorum, vt venularum in naribus, & aliquando in pulmone, atque omnino ad omnem laxatam partem, vt ad prociidentem vetricum aut anum. Haec vero omnes indicationes a morbis ipsis accipiuntur. Nonnquam vero & ipsa partis indicatio laxare iubet aut astringere: velut ob hypochondria astringendum

F

semper, aut omnino admiscendum astringentium aliquid: ob peccus laxandum, aut omnino admiscendum aliquid laxantium. Sed quia non hæc solum curationum differentia est, ad alias transit.

Svccos hos quidem expellere, hos autem scicare, alios autem apponere oportet, idque interdum quidem, interdum verò minime.

Vt in aphorismo dicitur, morbos ex repletione curat euacuatio, & ex inanitione repletio. Neque verò omnia mala curantur repletione aut inanitione, sed alia etiam aliter secundum contrarietatem, vt calida refrigerando, & frigida calefaciendo. Hoc idem dicitur his verbis, aliquando euacuandum, aliquando replendum: euacuandum verò aliquando euacuatione manifesta, vt per diuersionem, vrinam, aut sudorem: aliquando euacuatione insensibili & resolutione: illud vocat expellere, hoc scicare. Eodem modo vitur verbo scicare, in initio libri de humoribus. Repletio verò fiat apponendo succos, adiectione cibi & potus, bene, ac facile, & multum nutritis. Sed quoniam non hæc solum sunt curariorum indicationes, sed alia multæ, non semper agendum hoc, sed hac intentione agendum hoc, quum verò exsurgit alia intentio, non hoc agendum sed aliud aliquid.

Extenuare, incrassare oportet, vas, cutem, carnes, & alia: & hac quidem, hac autem non.

Accidit vt extenuemus aut incrassemus corpus, corporis partes, aut succum aliquem, & vtunque sepe est ex vsu. Nam & nimia crassities, & nimia tenuitas inutilis est, & noxia: in corpore partibus semper, in succis aliquando. Hic autem Hippocrates. solum de corpore & eius partibus agere videtur. Nisi vis (licet enim etiam) vbi dicit & alia, intelligamus succos. Nomine *τὸν* quod vertimus vas, intelligi vult Galen. totum corpus. Dicitur igitur extenuare, aut incrassare oportet vas, hoc est totum ipsam corpus. Significat enim vas aliquod totum, seu volumen aliquod integrum: ita corpus etiam totum: sicut solemus etiam vas vocare totam domum, aut familiam. Itaque dicit, oportet nunc extenuare, nunc incrassare totum corpus. Deinde enumerationem facit partium, cutem, dicens, carnes, & alia: vt nervos, & membranas omnes. Crassescunt enim crassesciente corpore hæc omnia, & gracilescent gracilescente. Quamquam non semper aequaliter, sed in ijs qui pinguescent, crassescit cutis magis quam partes alia: in ijs qui bene abundanterque nutriuntur, carnes & reliquæ partes magis quam cutis. Omnem autem nimiam extenuationem oportet vitare, quia tales ab externis quibuscumque causis læduntur: & nimiam crassitiem, quia si carnosæ sunt, acutis morbis sunt opportuni. ob succorum redundantiam & ventilationem difficilissimi pingues, ad frigidos morbos, & caloris extinctionem. Et omnis crassities, ob difficilem ventilationem, est ad venarum

A interceptiones, & repentinis casus opportuna. Hanc ob causam iussit Hippo. habitum athletarum, etsi aliqui videantur ad summum bonitatis attingisse, statim solvere. Modum extendendi crassos, & reficiendi extenuatos, docet Gal. decimo quarto methodi, capitibus, secundum vulgarem partitionem 15. & 16. licet (vt dixi) cum dicit alia, intelligere alia omnia, quæ in vase, hoc est corpore continentur, atque ita cum partibus humores etiam. Ad hos enim etiam extenuantibus vitur, cum corpora volumus extenuare, & incrassantibus, cum reficere. Sed & ad morbos qui ex faccorum vitio, aut redundantia nascuntur, vitur extenuatione plerumque, sed & contrario etiam aliquando, vt in tenuibus Thoracis distillationibus. Hæc igitur omnia, & quæcumque huiusmodi insinuat, dicens, *καταρτίζοντες*. Addit hic quoque, & hæc quidem, hæc autem non: quasi diceret, quædam, curantur hoc modo, quædam aliter.

Lenire, exasperare, indurare, mollire oportet. Hac quidem, hac autem non.

Quandoquidem in lætate & asperitate partium, morbi quoddam genus secundum figuram consistere, Gale. indicat, constat talium curationes in exasperatione, & lenigatione consistere. Porro indicatum etiam est a me in controuersijs, esse quasdam partes, quæ per se indigeant quadam duritie aut mollitie vt suas adiones exequantur, quibus proinde durities & mollities poterit per se esse morbus. Vnde fit, vt duritiem inferre aut molliorem, propria sit ratio qua tales morbi curantur. Lenimus quidem, vt in tussi, quam arteria asperitas parit, elegematis, & in dysenteria pinguis clysteribus, aut lenientibus cibis, & in andræ scabie inunctionibus: exasperamus in lætate intestinalium, quæ succellit dysenteria, emollimus duratos tendines, vt flecti possint, & duriores cicatrices eadem causâ: vt contrâ duriores facimus quæ sunt molliores. Ac si quando molliora ossa fieri contingerit, vt quidam narrat, hæc quoque duriora reddere, siccanum vsu, curabimus, vt firmetur. Itaque hæc quoque sunt curationes quædam morborum, quibus quidam morbi curantur, quidam non.

Excitare, stupescere: & alia quæcumque eiusmodi.

Hæc quoque sunt in morbis, quamquam non morborum sed symptomatum gratiâ, vt excitabimus eos qui soporâ quâpiam affectione tenentur, & stupescemus eos qui gravi dolore torquentur. Sed quia longum esset curationis omnes modos percurrere, addit, & quæcumque alia huiusmodi.

Derivare, cedentem reuellere statim, revertentem cedere.

Nunc agit de his quæ agêda sunt ob succos in partibus

rem quamquam præter naturam influentes. Hæc autem sunt derivatio, & reuulsio, & ob easque iam hæserunt parti, vocata euacuatio. Est autem reuulsio, retractio succorum in contrariam, vt derivatio in vicinam: vacuatio verò propriè vocatur, quæ ex ipsamet parte affecta agitur, aut omnino proximâ ente. De his euacuationis generibus libro de succis dicta sunt ab eodem Hippocrate plura, & in sequentibus dicentur à Galeno innumeris in locis, atque à me etiam in plurimis definita sunt. Quod nunc monet est notari dignissimum, de quo à me semper in congressibus apud ægrotos cum medicis, altercatum est. Convenit inter omnes, reuulsionem debere ante alias euacuationes agi, deinde derivationem, postremò euacuationem: atque adeò vacuandum esse corpus totum, antequam ad euacuationem partis veniatur: atque adeò ad vilam aliam contrarietatem, quæ localibus vocatis auxilijs peragatur. Hoc quia non observant vulgares empirici, & circulatores, multorum malorum solent esse autores. Sed multi medici contrâ, dum nimis methodici esse cupiunt, vix vllum invenire possunt tempus euacuationis idoneum, & antequam ad proprium morbi curationem accedant, mori ægrotos aut incurabiles fieri morbos sinunt sibi persuadentes nullam euacuationem licere facere, antequam reuulsio omnis & derivatio facta sit. Atque ita sunt qui in practica tractationibus assument, non esse in pleuritide utendum cucurbitula, antequam elapsus sit dies septimus, quid si sit homo inflammationis magnitudine septimo aut etiam quarto moriturus? Sane præceptiones prædictæ nunquam vniuersim accipienda sunt, sed temperanda videntur indicatione. Nam & illud quoque affirmat Gal. vacuandum esse corpus antequam ad auxilia topica accedamus. Nunquam tamen in pleuritide, aut inflammatione vlla alia periculosa abstinemus, donec omnes missiones sanguinis sint prægressæ, sed vna aut altera missione prægressâ, admodum incipimus quæ videntur expedire. Et quamquam totius corporis vacuatio præstat, non ita tamen, vt ad motum medicamentorum non subsequatur, antequam illa perfecta omnino sit. Ita etiam sæpe in ipsâ inflammationibus internis, cum reuulsioni non satis cederent, & timerent ne phlegmonis magnitudine anticiparent mori, alternatè vtriusque missionis secundum reditudinem, & scarificatione ad admotis parti cucurbitulis, plurimos mihi videt misisse mori cupisse, cum alij medici cunctati suberent, & methodum non semper vtilem observare. Hoc nunc Hippocrates præcipit, dicens, deriuandum quidem esse quando & quomodo expedit, reuellendumque: verum eum qui reuellit, non id debere nimis facere: sed statim, ac præpropere (vt scilicet reliquæ curationi incumbat) reuellere humorem, qui reuulsioni cedit facile, reuulsiorem verò cedere, hoc est, si verò reuulsi admodum videatur malum, neque soli reuulsioni cedere, neque ita mitui vt præbeat inducias expectandi, cedere te oportet, hoc est, à reuellendo desistere tantisper, & eius quod parti hæsit euacuationem interponere, rursum postea ad reuulsionem redire, atque id alternatè facere, quoties videbitur, & res exiget. Causam reddit Galenus in brevis loci commentatione optimam; nimirum etsi fluxio ab alijs causis ince-

A perit, vt fortasse partis debilitate, & totius corporis plenitudine, cum verò iam aliquid quoddam hæserit parti molestiam inferi, ea ipsa molestia fluxionem cessare prohibet, atque ita nisi interposita euacuatione molestia illa mitigetur, nulla reuulsio erit facis vt fluxio cesset: Alternatè igitur reuellendum, & euacuandum, cum in loco magna molestia sentitur, vt reuulsio faciat, quominus alie partes mittantur, & euacuatio, quominus pars affecta trahatur.

B Alium succum excurrentem educere non oportet, excurrentem verò simile effunderi: opus aliquod simile facere, vt quam dolor dolorem sedat: dissimile verò, vt si sublata sursum vergant, per inferiora soluere expedit, & contraria eodem modo, vt capitis purgatio, vena sectio, quando non temere detrahatur.

C *Ἄλλαν γὰρ*, inquit, *μὴ τὴν τῆς ἀγῆς*, hoc est, succum qui sua sponte satis exit, educere non oportet, sed alium, qui scilicet noxius cum sit, non exit sponte, aut non satis. Nam quæ iudicantur integrè, mouere non oportet. Verum quia quædam iudicantur per convenientem regionem esse vitiles, sed non integrè, quæ, eb quo vergunt ducere oportet, addit nunc quoque *ἢ ἡ τῆς ἐκκέντησιν*, hoc est, succus si excurrat vitiles, tardius autem quam velis, iuuare oportet eam quæ sponte sit euacuationem. Velut horum reddens causam, dicit *ἢ τῆς ἀγῆς* & *ἢ τῆς ἀγῆς*, quasi diceret, aliquando enim similia, aliquando dissimilia debet medicus facere, ipsæ quæ sponte sunt. Nimirum quæ bene & vitiles sunt iuuare: quæ contrâ, prohibere debet. Velut nunc diximus, humorem qui non exeat, inutiliter autem retineatur, euscure debet, & cum qui vitiliter exeat, simul euacuare. Producit verò alia exempla similibus & dissimilibus rerum, quas medicus faciet. *ἢ τῆς ἀγῆς*, inquit, quum dolor dolorem sedat: *ἢ τῆς ἀγῆς*, vt quum vergunt succi sursum, per inferiora reuellere conuenit, & contraria eodem modo. Hoc est, si repunt deorsum, sursum reuellere. Vt capitis morbum tollit purgatio per alium, & vena sectio ex brachio, atque etiam aliquando ex ipsis, cum non temere detrahatur, hoc est cum detrahere etiam sanguinem oportet. Ex hoc loco dicit Galen. quosdam collegisse, non sæpe cutari contrariis contrariis, sed aliquando contrariis, aliquando similibus: contrariis quidem vt febres viciu humectant, & morbos ex repletionem, inanitione: similibus, vt dolorem dolore, & vomitum vomitu, & dysenteriam ex purgatione. Et de hac re dicit fuisse contrarietatem. Ea verò facile decidit, nam omnis curatio per se agitur contrariis quædam verò similibus curant ex accidenti, vt aqua frigida remanens calidi percutit: & vomitus vomitum causæ euacuatione: & dolor dolorem, sensus distractione, vt in commentatione illius apothecarum dictum est. Duobus doloribus eandem partem occupantibus maior obscurat minorem. Itaque omnis curatio quæ per se agitur, contrario agitur. Hippoc. verò hoc loco non studuit distinguere, quæ per se, aut per accedens operantur, sed vt

cunq; hoc fiat, exempla producere similia & dissimilia, quæ model faciant. Quamquam perfectè dolo rem dolore curare tardè evenit, tutius enim curabitur anodynis, aut stupefacientibus, si causæ detractio ne curati non possit.

Abscessus velus glandularum tumores signum quidem exhibent earum partium, à quibus ortum ducunt, sed etiam aliarum, præcipue verò viscerum. Illi autem maligni sunt.

Partes habentes abscessum, seu productiones, seu exortas dicuntur, ex quibus alia producantur, & quæ ad alias habent rationem principiorum. Productio ex sit secundum nervos, venas, aut arterias, per quorum germinum rectitudinem abscessus fieri solere, lib. 2. sectione prima, dictum est. Itaque abscessus in quacunque corporis partes erumpentes, velut ad glandulas sæpe solent, esse signum rectitudinis. Verum & aliarum, inquit, nam abscessus sunt aliquando parte aliqua interna & nobili deponente sua excrementa in externam & ignobilem, aliquando etiam toto corpore in vnam quampiam mittente. Itaque aliquando abscessus est signum solum partis internæ, cum qua habet rectitudinem, aliquando etiam aliarum omnium totius corporis. Præcipue autem viscerum affectus solent significare hi abscessus, quia in visceribus plerumque colliguntur excrementa, ut in hepate aut bene: & quum hæc expurgantur, solent bubones, exortas: ut quum expurgatur hepar, in dextro inguine; quum lien, in sinistro: & tales quidem abscessus, qui scilicet sunt ob viscerum morbos, maligni sunt. Nam ob hanc causam dicitur 4. aphorismorum, febres omnes cum bubo ne esse malas præter diatrias. Quia scilicet bubones febribus non diatriis accedentes, significant morbum aliquem viscerum. Maligni autem sunt tales, ut ego in commentarijs citati aphorismi indicavi.

Spiratio parva frequens, magna rara, parva rara, frequens magna, fortas magna, intrò parva, intrò magna, fortas parva: alia quidam tardans, alia festinans: duplicata intrò reuocatio velut superspirantibus, calida & frigida.

Hæc sententia (ut & alia quædam quæ sequuntur) eisdem verbis scripta occurrat libro 2. sectione 3. ubi à me enarrata est. Si quis tamen Galeni desiderat enarrationem, quando quidem eius, in librum secundum commentaria non extant, & particula hæc, etiam in commentarijs quæ scripsit in textum, casu deest, requirit eam 3. libro de dispensa, capibus secundo, tertio, & quarto, quibus locum hunc suscepit explicandum, à me non est quod modo requiras plura.

A

Medela est continuarum oscitationum longæ respiratio. Non potantibus autem & vix, respiratio brevis.

Hæc quoque eisdem omnino verbis scripta est lib. 2. & à me libidem satis enarrata.

B

Secundum rectitudinem & laterum dolor, & hypocondriorum distentiones, & spenis elenationes & sanguinis è naribus eruptiones contingere solent: autemque secundum rectitudinem afficiuntur, & horum pleraque etiam in oculis apparent. Nuncquid igitur omnia? An ea quæ ab infernis sursum ferantur secundum rectitudinem, qualia sunt quæ iuxta maxillas aut iuxta oculum & aures contingunt, quæ autem à supernis deorsum non secundum rectitudinem ferantur? Quinetiam tumores angina rubicundi & laterum dolores secundum rectitudinem sunt. An etiam quæ ex supernis partibus infra hepar distribuuntur, qualia sunt quæ in testes & varices decumbunt?

D

Hæc sententia etiam enarrata à me est libro secundo, post proximè præscriptam. Tamen enim ibi non tota hæc dictio sit abantore scripta: sed quædam eius pars, sentis tamen est profusidem, & ob id coactus sum hanc totam dictionem illuc transferre, ac per anticipationem enarrare.

E

Hæc consideranda sunt, quæ ferantur, & unde & propter quid. Vena temporum non subsidentes, neque color splendidus, si spiratio intus deficiat, aut adsit in istis sicca non ferina, in articulos decubitus expectare iubent, idque magna ex parte secundum rectitudinem distentionum quæ in ventre contingunt. Habent verò horum plurimi & faciem rubicundam, & naturâ sunt albidioris habitus, nec vllus eis sanguis è naribus aut paucis erumpit, atque si quid ex effluentibus intus quidem relinquatur, apparatus adest.

F

Quandoquidem de euacuationibus, & in partes quasdam abscessibus dicere cepit, addit nunc, oculis, testibus, & idem, & idem, quasi dicet, in his humorum ex partibus in partes mutationibus considerandum quæ pars mittit, & quæ recipiat, & quam ob causam ea pulsio fiat, ad decretoria, an symptomaticè cognoscere autem evenit hæc ex signis quibusdam, quæ animadvertantur in partibus, cuiusmodi sunt quæ mox apponit velut exempla signorum, ex quibus ea quæ dicta sunt possunt

innoscere, dictum est, *quidam apud Hippoc. de febribus*, & reliqua. Dictum est ab eodem Hipp. lib. 2. sectione prima; ubi sermo habebatur de his libris humorum mutationibus, considerate verò sic oportet in coloribus, compressionibus venarum, tumoribus hypochondriorum, & motibus sursum & deorsum vergentibus. Doctrinæ quoque huius quoddam exemplum nunc producit, dicens, ex venis temporum quæ non subsident, sed tument: & ex colore qui fit ruber, non *cholericus*, *hecticus*, quale scilicet in ægrotis esse solet: & ex spiritu, qui *excoctus* sit, hoc est difficulter expirat. Itaque ex difficultate respirationis & ex rursi sicca non ferina, significari, fore ut in articulis firmetur abscessus. Color chlorus qui fit, dictum sepe iam est in hoc ipso opere, & in prognostici commentariis. Est scilicet qui pallidus, aut viridis, aut inter hoc: qui colores frigiditatis sunt familiares, nisi quum ob febres vehementissimas, aut raptum sanguinis in superna rubet facies. Tunc enim superueniente rubore color ille chlorus latet, neque effulget. Itaque color chlorus non effulgens, dicitur colore non apparet, sed sub rubore latens. Neque id improprie dicitur. Si enim colores omnes, fulgores quidem sunt, ut 2. lib. controuersiarum indicauimus, colorem apparere, fulgere quodammodo est, & qui non apparet, non fulgere propriissime dicitur. *Quædam* significat apud Hippoc. quid grauissimum, & horrendum in morbis, & iuxta Galienum explicari potest lib. 2. sect. prima, & rursus sectione prima huius sexti, velut atterabilia symptomatica, & terra vlcera, & in vnoquoque morbo quod malignum. Tussis igitur *hecticæ* dicitur, quæ rabi accedit, aut alteri grauissimo thoracis malo. Itaque tussis non ferina dicitur, quæ perniciosi alius morbi symptoma non est. Igitur quod prima huius dictionis pars continet est, quum sunt venæ temporum non subsidentes, sed tumide, & color ille morbidus, qui plerumque solet ægrotos comitari, non apparet, sed rubent potius, & spiritus difficulter redditur, & adest tussis sicca (per quam scilicet nihil excreatur) non ob morbum aliquem malignum, expectari oportere abscessum ad articulos. Sed dices hæc signa esse raptus humorum in superna (ita enim iam indicatum est loco citato ex secundo libro) igitur capiti oportet timere potius, quam abscessum articuloorum expectare. Certe ita est, significant hæc raptus sursum humores, quibus proinde si accedat aliquid aliud perniciosum, eorum quæ conuulsiones, aut demencias solent præmonstrare, capiti timere oportet: si verò nullum horum accedat, expectare oportebit parotidas, aut abscessum ad articulos, superiores quidem plerumque, nonnunquam tamen etiam inferiores. Non tardè enim qui in caput ceperant ferri humores, inde reperculsi retrocedunt in partes humiliores. Neque mirum, cum dictum sit sectione quinta secundi. Si caput doleat, in pectus descendit, deinde in hypochondrium, deinde in coxam: ac rursus paulo post eadem sectione dicitur. Quibus tussis sicca adest, hi non soluiunt, nisi dolor fortis in coxâ, aut in crura, aut in testibus irruat. Sed si succi qui in capite, aut thorace firmati, dolorem aut tussim ciebant, solent ad inferiores partes trahi, cur non etiam qui vndeunque sursum moueri ceperant, possunt deorsum detrahi? Possunt etiam

A in quamplurimos articulos diffundi, ut simul occupent superiores & inferiores, ut in his, qui vocantur arthritici, solet fieri. Non raro autem incumbunt abscessus, aut in alterum latus solum, aut solum magis in alterum. Quoniam igitur hæc omnia enenare possunt præsentibus his signis, signis aliis opus est, quibus distinguantur, quæ Hippocrates ipse hac dictione attingit. Nam quia dixit tussis non ferinam, insinuat affectionem non malignam, sed ex qua abscessum debeat expectare potius quam mortem. Eadem autem ratione tu intellige, neque aliud quippiam festinum adesse, ut neque denitum frigidum, neque oculis, aut qui crebro moueantur, aut fixi sint, & incontinentes; neque aliud quippiam commulsum, aut præputium. Hæc limitatione adhibita, abscessum expectabis merito, ad articulos verò, quandoquidem hæc partes ad eos excipiendos sunt natura præparatissimæ, in quos autem articulos, cognosces, considerabis tentiones quæ in ventre sunt. Secundum earum etiam rectitudinem magna ex parte sunt. Ventris nomine hic vocatur ea regio, quæ infra septum transversum est, parte nostra anteriore, in qua sunt etiam hypochondria. Duplex autem eius loci passio nati esse videtur, cui tentiois nomen dari potest, & ab utraque potest aliquid ad præsentionem hanc præstari. Aliquando enim hypochondrium, aut utrumque, aut alterum, sentitur ab ægro sursum distensum, ac velut reuulsum, est quæ hæc quædam partium ventris tentio. Tentio etiam vocatur, quum cutis est distensa ob partis tumorem; quæ tentio manu medici sentitur. Cum in quopiam hypochondriorum vlla harum tentio est, ad eius lateris articulos abscessus expecta. Si tentio prima sit, ad superiores, si secunda ad inferiores. Nam celebratissimum est apud Hippoc. dictumque pluries hoc ipso in opere, hypochondriorum reuulsiones significare raptus succorum in superna. Cum verò ex supernis ad inferna trahuntur, solere per hypochondrium transmitti, dictum est loco citato ex libro secundo, quo dicebatur. Descendit in thoracem, deinde in hypochondrium, deinde in coxam. Itaque hæc significant abscessus fore ad articulos. Velut autem possunt fieri ad superiores, aut inferiores, aut etiam non ad articulos, aut non solos, sed in superioribus post aures, in inferioribus ad testes, ita possunt ab eis homines præseruari duobus enumerationibus, supra quidem fluxu sanguinis è naribus, infra vicia crassa multa, & alia producant, ut apertum 74. sectionis quartæ dicitur. Quibus autem in nares tendit materia, solent cum temporum pulsationibus, & venarum intruscentia apparere, non vitium, quæ non chori, sed etiam valde rubri, præcipue qui sunt naturæ candidi. Nam qui nigri sunt ruborem nunquam comparant, et si fluxus sanguinis illis imminuat. Si igitur i quos descripsimus, sint abscessus habituri, oportet ut non sicut eis sanguis ex naribus, etiam si sunt valde rubri, aut ut sicut exiguum. Namque aliquando rubor, & alia signa imminentes fluxus sunt, & fluxus omnino non superuenit, aut non pro multitudinis ratione, & tunc propter istam est in abscessum incidere. Nam *si* *pulsus* *excoctus* sit, *et* *non* *est*. Hoc est, si quum humores ceperunt effluere, interemptiue cohibeantur effluxus, aut quum impetum ceperunt ut effluat,

rent, non effluant, sed intus maneat, paratissima est abscessus materia. Multo etiam magis quam si tam molli humores intus manentes moueri non cepissent. Nam illa succorum reperculio, & agitatio periculosa est, & in partem aliquam abscedere facit, ut quidam turgentia. Proinde canendum, est ne fluxum aliquem, siue ex naribus, siue ex alio, siue ex alia parte quauis, intempestiue cohibeamus, neve antequam vacuari satisauerimus, aut ex parte alia epacuauerimus corpora, quia si quid ex effluentibus intus relinquatur, breui truct abscessus materia, fortasse in principem partem, ut scio quibusdam supernemisse pleuritidem, cum tamen fluxisset sanguis ex naribus plurimum. Quod ne fiat, maxima cautio est, missio sanguinis reuulsoria ex brachio, & regione naris ex qua fluxit, potius quam localibus medicamentis, fluxum sanguinis curare.

Si intus relictæ, & siccitas oris, & insuauitas, & inappetentiâ hoc modo abscessus facere possunt. Tales autem febres non sunt acutæ, sed recidinas faciunt. Quæ post indicationem intus relinquuntur, recidinas facere consueuerint.

Hæc omnes dictiones pertinent ad eandem sententiam, scilicet morbos, qui sine indicatione perfecta videntur soluti, solere aut permutati cum aliis grauioribus, aut eisdem ipsos reuerti, aut abscessus facere. Quum igitur morbus integrè solutus est, nihil manet, neque causæ, neque symptomatum: præter illa fortasse quæ imbecillitatis & gracilitatis tantum signa sunt, & conualescentibus etiam adfunt. Quæcumque igitur post indicationem intus relinquuntur, *imperfectæ* sunt, si causæ quidem sint *imperfectæ* causæ dicuntur, quæ & recidinas, aut abscessus, aut permutationes facere natae sunt, si autem symptomata, *imperfecta* signa sunt, & dictorum aliquid præmonstrant. Vt si sit intus relictæ frigus (intellige nimium, & quæ non miscetur breui, nam alioqui & à perfecta siue indicatione, siue expurgatione, solet frigus oriri) & oris siccitas, & insuauitas, ut amaritudo, aut salugo, & cibi fastidium, hæc enim aptè indicant, nondum esse corpus perpurgarum. His signis accessit necessarium non corroborari, hoc enim etiam impediunt intus relictæ excrementa. Proinde dicitur in aphorismo Si accipienti cibos accidat non corroborari, indigere corpus euacuatione. Vt, si fieri possit, ita præseruetur à noxiis, in quas paratum est. Hoc itaque est, quod nunc dicit. Illud *de rebus* referri debet postremæ parti dictionis proximæ, dixerat enim *si per purgationem* intus relictæ, si ex effluentibus aliquid relinquatur, apparatus adest. Addit, si sitis, & siccitas oris, & insuauitas, & inappetentiâ remanent, hoc modo, hoc est, apparatus ad est. Porro quod interiectum est, febres autem tales non sunt acutæ sed recidinas faciunt, signum etiam continet abscessum, aut recidinarum, ex ipsarum febrium naturâ, acceptum. Dicit enim febres tales, hoc est, ex quibus solem fieri hæc, non sunt acutæ, sed recidinas faciunt. Quasi *imperfectæ*

A febres non sint acutæ, sed chronice, aut quæ deciderunt ex acutis. Sed nota reuertibus febres non dici debere, quæ possunt recidinas habere, sed quæ sepe solent. Hoc dico, quia febres etiam acutissimæ habent nonnunquam recidinas, quum sine concoctione aut indicatione perfecta disparant, atque præter rationem soluantur. Non est tamen id earum naturæ admodum congruens, sed perfecta indicari. Ac proinde non sunt reuertibus hæc, sed quæ non sunt acutæ.

B *Primum igitur si intus elevationes accidunt, nisi in articulos finiantur, aut sanguis ex naribus profusus, vel hypochondry dextri contentio, nisi prodeant vrina. Hæc enim utrorumque interceptio merito horum recidinas facit. In his igitur abscessus promouere oportet si non fiant: quosdam vero qui sunt declinare, quosdam autem excipere, si prodeant quales & quæ oportet. Quicumque vero non abundè produnt, coadiuuare: eos autem auertere qui omnino inutiles fuerint, maxime vero quum futuri sunt, sin minus cum nuper inceperint. Quæ quartâ die accidunt sanguinis ex naribus eruptiones difficilem faciunt indicationem.*

Hæc omnia eisdem verbis occurrerunt scripta & eodem ordine lib. 2. & sectione 3. vbi etiam sunt à me satis enarrata.

D *Quæ unâ die intermittunt febres, & alterâ supervenit rigor, à quinto ad septimum circuitum indicatione terminantur.*

Hæc quoque sententiola prioribus scripta addet ibidem, præterquam quod illic dicitur simpliciter ad septimum circuitum, hic verò à quinto usque ad septimum. Nihil autem differt, nam illud explicatur iuxta aphorismum, cum longissime: hic verò duo fines statuantur, primus & vltimus, quamquam hoc quoque magna ex parte intelligendum est. Aliquando enim quatuor solum, aut etiam tribus paroxysmis finitur tertiana. Neque verò intelligas nominari quatuor & septimum, quasi impari semper solet finire, sed quasi extemorum nomine, id etiam spatium quod interest, velut intelligi. Id quod ex ipsa phrasi constat. Non enim dicit, aut quintum, aut septimum, sed à quinto ad septimum, potest ergo & sex habere paroxysmos.

F *Quæcumque febres naturam tertianæ induunt, noctem quæ accessionem præcedit difficilem habent: quæ verò subsequitur, ut plurimum leniorem.*

Dicitur est aphorismo 13. sectionis secundæ, cum instat crisis, noctem ante accessionem esse diffi-

cilem: id quod eo loco non in tertianarum naturam imitantibus, sed simpliciter, & in omnibus dixit: nunc verò non ita, sed in his dicit accidere, non tamen solum cum instat crisis, sed quoties instat paroxysmus. Vnde coniunctis his duobus locis, recte colligit Galenus ex Hippocr. sententia, cum instat crisis omni in febre esse noctem quæ antecedit difficilem: in tritoeptis autem, seu tertianarum naturam imitantibus, etiam si iudicium non instet. Quæ sunt autem *tritoeptis*? Certe quæ sunt tertianæ, non tamen omnino. Quo in genere sunt omnes semitertianæ, & tertianæ productæ, atque adeo quæcumque non sunt exquisitæ tertianæ. Itaque dicit, tertianas exquisitas tunc solum habere noctem ante accessum difficilem, quum iudicium instat: alias autem omnes tertianas, etiam si nulla instet crisis. Cui sententiæ ratio quoque subsecibit, nam cum exquisitæ tertianæ motus celer sit, mox atque incipit, euadit in manifestum paroxysmum: quare nullam molestiam infert, priusquam iudicium instet, ac proinde secreto fiat. Noctis verò quia est motus tardus notitia, sed antequam paroxysmus manifeste appareat, consistatur plurimum ægrotus, incipiente putrescentiâ, & mori. Sed dices, videri hoc repugnare eidem Galeno, qui lib. 2. de differentiis febrium describens tertianam exquisitam dicit nullum habere signum quo percipiantur humores putrescere in die, aut nocte quæ consequitur accessum: manifestum vero iam adesse proximam, quæ antecedit accessum, aut die, aut nocte. Certe haud est dubium omni in febre, etiam exquisita tertiana, necesse esse, ut bilis incipiat irritare antequam expellatur, nam ob id expellitur. Proinde quum putrescere incipit bilis, contrahitur pulsus, antequam rigor superueniat. Verum in tertiana exquisita, neque tam longa, neque tam sensibilis est hæc passio, ut insigniter difficilem faciat diem aut noctem quæ antecedit. Itaque subsequenter fieri leuiorem, quam quæ antecedit, in omnibus tertianis dicimus, peragamus verò in exquisitis fieri tam quæ antecedit insigniter difficilem, ut in reliquis tertianis: atque neque in omnibus illegitimis fiet æquæ molesta ea nox, quia neque illæ æquæ absunt à legitima. Erit itaque in quascumque eo difficilem, quæ aberit longius ab exquisita. Si verò in ea quæ exquisita est, aut ab ea parum abest, nox aliqua fiat valde difficilis, decretorium signum esse putare oportet. Atque adeo & in ipsis illegitimis, si nox difficilior solido, aut quam pro morbi signa fiat, decretorium est. Sed cur tertianarum meminit nunc Hippoc. solum, ac non etiam quotidianarum, ac quartanarum? Quarantæ fortasse ut rariotes febres dimissæ sunt. In quotidianis non potest conferri nox, quæ antecedit com subsequente. Cum enim ea febris omni die inuadat, nox omnis est & antecedens, & subsequens.

A *dine obortis maxime accidit.*

Aphorismo 54. *secundis quartæ continetur hæc sententia, tamen in pauciora verba contracta. Quapropter ego in illis commentationibus hanc produxi, ut hinc illa explicaretur. Explicata igitur à me illic est tota hæc dictio, præter per pauca illa verba, quibus clauditur. Hoc in febribus ex lassitudine obortis maxime accidit. Quare possem nunc ab aliorum verborum enarratione supersedere, & ad illum locum lectionem remittere, sed satius est breui totam dictionem percurrere. Nam vel id, quod illic omisimus, ita facilius nunc adiicietur. Cum tussis sicca leuiter irritantes sunt pro febribus, non solent illæ febres esse secundum rationem sticlosæ, neque linguæ torrefactæ secundum rationem. Hoc est, minor sitis, & minor linguæ exsiccatio esse solet, quum pro febribus magnitudine, non tamen hoc semper ita sit, sed cum illæ tussis sunt non à ferina causa, hoc est, à maligna, cuiusmodi est destillatio renus, biliosa, aut falsa, aut inflammatio crudâ intra thoracem, sed à spiritu, hoc est, ab aëre ipso qui inspiratur. Multi enim ita affecti sunt, ut ab ipso aëre irritentur. Cognoscatur autem hæc esse talis passionis causa, quod cum loquuntur, aut hiant, tunc tussunt, alioqui minime. Hoc autem evenire solet iis, quibus refrigerata est aspera arteria, aut pulvere, quem inspirarint, reddita fordidior. Tunc enim aer frigore irritat, aut fordes illas commouet. Euenit hoc citra febres multis, quod frigore tempore iter fecerint, aut calido quidem, sed per impurum aërem, aut alioqui, quod pectus nudauerint, aut frigidam hiberint, aut in impuro loco commorati, tale aliquid fuerint perpassi. Cum febribus igitur præcipue fient iis, quibus labor aut aliquid huiusmodi, febricitandi præbuerit occasionem. Has igitur sententiam est Hipp. nunc ob proclatam causam vocare febres laboriosas. Tales igitur tussis com sunt, & ob distas causas, etiam si febres adsint magnæ, neque sitis veraxit admodum, neque linguæ erunt adeo exsiccæ. Quia si ob intemperiem frigidam sunt (nihil enim prohibet refrigerata via spiritus hominem febricitare) hæc ipsa statim etiam linguæ vitionem prohibebit. Sin autem ob fordes, tamen ipsa tussis leuiter irriter & assidue, commouebit in os pituitam. Constat verò si tussis sicca sitim arceat, multo magis id facturas humiditas, si modo excreetur pituita, neque maligna, putrida, neque falsa. Dicit vero Hippoc. sicca, significat etiam siccas id facere, sitamen sit leuiter irritantes, neque à maligno seu ferino sacæ. Nam si vehementer irritent, magis desiccant, & exasperant; si à maligna causa fiant, eadem erit causa tussis, & sitis. Quare nihilominus sitient.*

F

Nihil sine consilio suscipiendum, nec quicquam negligendum.

Tussis sicca leuiter irritantes in febre ardente, non sunt pro ratione sticlosæ, neque linguæ torrentur, non à malignitate sed spiritu provenire manifestum est. Cum enim loquuntur aut hiant, tunc tussunt, alioqui vero minime. Hoc in febribus ex lassitu-

Ad tria, inquit Gal. pertinere posse breui: bane sententiorum, librorum lectionem & vsum prænotandi, & morborum curationes. Ad lectionem quidem, quod nulla eorum quæ apud bonos autores scripta sunt, contemni debeant, etiam si prima fonte

videantur minutula. Solent enim ea non parum conferre. Neque tamen temere coipiam credeodum est. Ut faciunt ij, qui alieni sectæ sese adigunt, aut io cuiuspiam, ut aiunt, verba iurant. Sed potius examinanda esse omnia, & cum iudicio legeodum. Ad prænotionem verò, quod nulla, ne minima quidem signa sior negligenda, sed omnia confereoda in iudicium, oequ e vlli fidendum temerè, si reliqua omnia repugnent: itaque diligentem omnium obseruatorem esse debere, eum qui rectè velit prædicere, neque temerè, aut iudicare, aut prædicere. Ad coratiorum, quod qui rectè curare vult, nihil debeat omittere, quorum est vsus salutaris, quin ea omnia suo tempore exequatur, est enim occasio præcepti, sed oequ temerè, ut faciunt quidam adacissimi, tenendum quidvis, oam experimeotum periculosum. Hæc certè omnia sior verissima, & illis verba Hipp. optimè accommodantur, quin & ad omnem prudentiam, & omnia humanæ vitæ negotia videotur esse commodatissima. Sed alius etiam mihi præter dictos arriat scosus. Nihil scilicet negligendum, quia oihil temerè, & sine causa fit. Coortolent itaque hæc verba, & admonitioem, & causam. Moet Hippoc. vt diligenter, omnia, quæ ægrotis accidunt, obseruemos, neque omittamus quippiam eorum quæ spontè, hoc est, sioe causa manifesta sunt, oihil eotum fir sine causa. Ut illa quidem, (vt libello de alimento dicit) nobis quidem spontanea, nature verò sunt ooo spontanea, hoc est, causam aliquam habeo latentem. Quare & significationem aliquam poterunt præstare sapienti. Hæc est Hippocratici sermonis præstantia, vt multa, eaque polcherrima breuissimis dictio oculis significetur, vt vix scias, quod illas potius transferas.

Contraria paulatim adhibere oportet, & interquiescere.

Optimè potest hæc sententia cum priori coniungi, quum illa ad curationem referebatur. Nimitum curantem oportet nihil negligere, quin coortaria omnia, sua quodque occasioe & ex *ἡμετέροις* sensim & per accretionem adhibeat, neque tamen temerè semper aliquid circa ægrotantem moliri, sed vbi contraria tempestiue adhibita sunt, quiescere. Neque enim semper aliquid facieodum, sed interquiescendum non raro, vt facultas intenti recreetur. Atqui cum sint hæc duæ partes medietæ præxis, coortaria adhibere & quiescere, mihi hæc vltima videtur præstantior. Certe enim periculosius, incidere io medicum, qui oesciat quiescere, quam qui nesciat contraria adhibere. Nam qui nescit quiescere, nescit occasiones contraria adhibendi, quate neq; contraria adhibere. Qui nescit coortaria adhibere, tamen si prudens est, scit quiescere, atque si prodesse non potest, tamen ooo obest. Præstaoissimus tamen medicus est, eruditus pariter, ac prudens, qui nouit festinare lentè, pro ipsius morbi vrgentia auxilijs instare, atque in occasione vti maximè opportunis, aliqui quiescere.

A

Posteriora capitis dolentem secta in fronte recta vena iuuat.

Hæc ipsa dictio est apborismus 68. sectionis quintæ, præterquam quod illic est scriptum *ἀποτομή*. iouat, hic *ἀποτομή* idest, iuuat, quasi illic sententia aphoristica vnuersum præferatur, hic autem vna quæpiam historia narretur. Res tamen eadem est, & causa, quam in commentarijs aphorismorum explicauimus.

B

Exceptiones hypocondriorum ex qualibus & quales fiant consideratae sunt, & alia, & quantum possint in viscerum inflammationibus, siue ex hepate in lienem ferantur, & contrà, & quacunque sunt eiusmodi.

C

Δυσίτις vocat nutie quos solet vocare abscessus, quia sunt partibus aliarum partium excrementa recipientibus. Dixerat nuper in hac ipsa sectione, considerandum, quo, & vnde, hoc idem dicit nunc, his verbis, ex qualibus, & quales hoc est, ex quibus, in quas partes exceptiones fiant considerandum. Dicit verò exceptiones hypocondriorum, quia io morbis acutis hæc maximè indigere solet animaduersione. Sed quia oon horum solùm, sed aliarum omnium partium eadem ratio est, & consideratio eadem, addidit, & alia. Itaque dicit, videndum esse, ex quibus in quas partes factæ sint exceptiones hypocondriorum, & alia quæcunque. Velut in inflammationibus viscerum, considerandum, quantum possint, hoc est, quam significationem præstare valeant, siue ex hepate lien receperit, siue contrà ex liene hepar, & quocunque alia huiusmodi. Ut si ex costarum spatij pulmo, aut ex toto corpore. Non enim parum refert ad periculum, nosse ex qua parte quæ pars receperit. Grauius enim est recepisse hepar ex liene, quam lienem ex hepate, & pulmonem factam esse ex pleuritide, quam ex toto corpore, ac generatim, vt libro 1. sectione prima dictum est, ex ignobiliori io nobiliorum, exteriori in interiorum, inferiori in superiorem partem fieri abscessum, quam contrà periculosius est.

D

E

Reuellendum est si quod non oportet vergant, sin autem quod oportet, his via recludenda est, prout unaquaque vergunt.

F

Scriptum est in apborismo. Quæ ducere oportet, quod maximè natura vergit, eo ducenda sunt per coortentia loca: iuxta quam sententiam etiam quod nunc dicitur explicari conuenit. Nimitum ea quæ ducere, hoc est, euacuare oportet, quod redudent, aut praua sunt, si vergant quo oportet, hoc est, per conuenientem regionem spontè fluere incipiant, *ἀντὶ τοῦτο*, siue *ἐκ τῆς* *πύλης*, hoc est, eo ducere oportet, & per eandem partem euacuare. Si vero vergant quod

quò. non oportet, vt si efficerantur ex pulmone sanguis, reuellendum, hoc est, per contrariam partem vacuandum. Oportet verò & huic sententia adiungere aliam ex lib. 2. sectione 3. quæ ita habebat. In hisigitur abscessus promouere oportet si non fiant; quosdam verò qui sunt declinare: quosdam autem excipere, si prodant quales & quæ oportet. Quicunque verò non abundè produnt coadinnare: eos autem auertere qui omnino inutiles fuerint, maximè verò quum futuri sunt, sin minus quum nuper inceperint. Non enim quoties vergunt quò oportet aperiendū sed cum dicere oportet, vt dicebatur in aphorismo; aut cum non abundè prodest vt dicebatur in hac alia sententia; hoc est, quum etsi vergant quò oportet, non exeat pro multitudinis ratione. Nam aliqui non aperiunt oportet, sed excipere, hoc est, sinere vt exeat. Porro reuellere conuenit, si vergant quò non oportet, non solum cum ducere oportet, hoc est, cum euacuatione aliqua opus est, sed nonnunquam etiam, etsi nulla euacuatione sit opus, sed solum vt auertamus eas euacuationes, quæ omnino sunt inutiles. Vt nonnunquam per profusam sanguinis effusionem, sistendi solum gratia, vtimur reuulsoria missione sanguinis, non quidem vt euacuemus sed vt euacuatione euacuatione curemus. Abscessus vocari ab Hippocrate etiam euacuationes, constat, nam lib. 2. sectione prima, ita dicit. Abscessus qui cum euacuatione fiunt, velut sanguis è naribus.

Lata exanthemata non sunt admodum pruriginosa, qualia Simon habebat per hyemem, qui cum ad ignem inungeretur, aut calidè lauaretur, inuabatur. Vomitus non conferebant. Si quis calida fomenta adhibuisset, adiungi potuisse existimo.

Tumores præter naturam insignis magnitudinis vocantur tubercula. Solutiones continui, insignes etiam, vocantur vlceres. Alia omnia, quæ in cute progeminant, vocantur exanthemata. Itaque in horum genere sunt, & maculæ quæ spontè fiunt, vt quædam culicum moribus similes, nunc rubræ, nunc aliorum colorum; & tumores exigui, vt qui vocantur morbilli, & variolæ, & pustulæ etiam, quæ cum vlcusculis exiguis fiunt, aut sine eis, vt quæ vocatur scabies, cuius sunt multa genera. Cum verò hic dicat lata exanthemata, constat id nomen de tumoribus dici, nam lata tum hoc & obtusum contrarium est acuto, & acuminato. Hæ autem figuræ neque muscularum, neque vlcerum sunt, sed tumorum solum. Itaque hæc exanthemata sunt, multa exigua tubercula, corpus obdedita, quorum duplex genus est. Quædam enim rubicundiora & minora, & angustiora, vt ferè sint maculæ potius quàm tubercula, vocantur hodie morbilli, & pruriunt valdè: quædam alia sunt maiusculæ, & latiora, minus rubentia, & minus etiam prurientia, & vocantur variolæ. Scilicet componere insignis parua, videntur hæc inflammationis potius, illa erysipelatis naturam referre. Itaque lata exanthemata sunt multe inflammationes plurimum variant, quòd sint alie exquisi-

tae, alie œdematodes, alie erysipelatodes, ac alie etiam scirrhoræ, ita & hæc exanthemata, quædam ex sanguine magis, quædam ex sanguine bilioso, quædam ex pituitoso & crasso pendent, aut etiam melancholico. Atque vt succi specie, ita differunt colore, & figura, & reliquiis accidentibus. Nam quo ex calidiorè sunt sanguine, èd rubicundiora, & in acutum magis clara, & magis prurientia: quo. ex pituitosiorè, èd magis ad candidum vergentia, & obtusa, & minus pruriginosa sunt. Humisodi erant, quæ habebat Simon. Quæ cum talia essent, merito etiam in hyemem inciderunt. Itaque & temporis natura attestabatur tali morbi nature. Sed & curatio etiam. Nam inuabatur cum inungeretur ad ignem, inunctione scilicet calidâ, & discutiente, & cum lauaretur calidâ. Nam etsi exanthematum omnium communis curatio perficiatur calidis exterius ad mortis (nihil enim optatum magis, quam vt abundè exeat, neque timendum, quam vt recedat intrò) postquam toti corpori sit prospectum missione sanguinis, ac si opus etiam sit expurgatione, tamen constat id in frigidis exanthematibus potius fieri. Vomitus dicitur huic non contulisse, sed totam curationem in calefaciendò suam fuisse. Vomitus certè talibus exanthematibus vniuersum sunt inutiles, nisi forte plerumque humoris in cavo ventriculi contineri sentiantur, tunc enim licebit quod ibi continetur, vomitu rejicere, præcipue si qui ægrotae vomat facillè. Alioquin ad vomitum cogendus nullus est, ne morus humoris, alioqui visiosi, introitus reuocetur. Atque eadem ratione neque expurgandum per ventrem est, nisi maxima succorum multitudo videatur subesse, cuius non possis expectare per eam discussionem. Facta verò totius corporis euacuatione, quæ sit sufficiens, ad discutientia, & siccantia veniendum est. Atqui erumpere solent hæc non tantum ad externam cutem, sed ad internam etiam secundum corporis ventres. Vnde periculosa fieri plerumque censio, cum. sed asperam arteriam & thoracè, & intestina erumpunt plurima, aut maxima, aut maligna. Exire enim omnino introsum quid prohibet, vt sit scabies in velsis, & intestinis: Et vt intra poros natum fieri videmus: & intra os alacissimè. Sed & fieri plerumque vt in quidam internarum partium erumpant, ex symptomatis agnoscimus. Rancitas enim & tussis, quæ nonnunquam procedunt ad aphoniam, quin & ad strangulationem, indicant erumpere in asperæ arteriæ internam membranam. Intestinis solet accidere primum dolor, deinde & dysentericæ fluxiones, exanthematis interius in eis factis. Sūt verò hæc omnia periculosa si plurimum crescant, moderatiora enim sepe fiunt in iis etiam qui euadunt, & cum in vniuersum quæ introsum erumpunt periculosiora sunt quàm extrosum illorum etiam alia aliis sunt periculosiora, vt in hæc aut illas erumpunt partes. In ventriculo enim longè cum maiori sicut periculo, quàm in intestinis, ac præcipue in eius ore, ob actionis eius partis dignitatem, & compassionem cordis, atque in caput asperæ arteriæ, ob eius angustiam, quàm in partes alias. Suspicio autem nonnunquam in internum thoracem, & sepius transuersum, & inter septum, ac pericardium, atque fortasse etiam in ipsum, cordis corpus intrare posse.

Conandum igitur extrorsum agere humores, non solum vt exeat quæ iam inceptum exanthemata (hoc enim fortasse aliis euacuationibus posset supplere) sed multò magis, ne introrsum exeat, ac proinde morus introrsum vitari debent, multò autem magis vomitus quàm alui subductio. Neque abs re erit munire guttur eisdem, & eclegmatris, & gargarismis, quibus ad anginæ principia solemus, & ad intestina, vti clysteribus sine irritatione extergentibus modicè, & alstringentibus nonnihil, postquam alui subducta iam satis sit.

Quæcunque maturatione opus habent, occludi conuenit, contraria autem siccare, & aperire oportet.

Speciatim hoc intelligi potest de tumoribus præter naturam, sed generatim quoque de morbis omnibus pendentibus ab humoribus, vt de putridis febribus, & cacochymijs. Nimirum vt tumores præter naturam aliquando postulant concoctionem, quam suppurationem appellamus, aliquando aliud quippiam, ita & febrium causæ, & cacochymiz aliquando coqui postulant, aliquando euacuari. Generatim igitur quoties est coquendum, occludere oportet. Occludere autem contrarium est ipsi aperire. Nihil autem deterius quàm aperire, cum coquere oportet, veluti si crudum tuberculum feces aut in febre, aut alia cacochymia, cum foret coquendum, euacues. Contra enim tunc temporis faciendum & occludendum est. In tumoribus enim vtendum emplasticis, & obcurantibus (talibus enim sunt suppurantia) vt calidum effusum cohibeatur, & ipso detenti vaporis calore, succus coquatur, in febribus & aliis cacochymijs inungendum, & pannis contegendum, & abstinendum ab euacuationibus. Atque ita verum est, in omnibus quæ coqui oportet, esse occludendum. Contraria autem, inquit, siccate & aperire oportet contraria vocat, quæ coquere non oportet, sed aliter curari, vel vt tumores qui aut resoluunt rectè possunt, aut suppurari non solum, quòd gangrænæ sint opportuni, & febres cacochymizæ, in quibus vacuare conuenit, quòd concoctus iam succus sit, vt expedire concoctionem non oportet, vel quòd turgeat, vel urgeat, vel concoctionem recipere non possit. In his omnibus, siccandum & aperiendum. Nam & resolueret collectum in tumore succum, & euacuare eum, qui in venis redundat, siccare & aperire est. Siccant enim quæ resoluunt & aperiunt poros, contrarium verò efficiunt quæ suppurant. Quæ vacuant humores, siccant corpora, & aperiunt vias. Iam verò si tumor præter naturam coctus iam est, & proinde coqui amplius non desiderat, ad easdem indicationes transitur. Si n. exiguum pus prorsum continetur, resolutur, sin autem plus, aperitur ferro pars, & extrahitur succus, & siccandum curatur canum vicus. Si verò tumor neque resoluens cedat, neque suppurantium habeat tutum usum, ob gangrænæ metum, multò magis siccandum & aperiendum est, nam scarificandum, & vtendum, aut siccissimis medicamentis vtendum. Vigadeb verum est, in iis quæ coquere non oportet, siccandum & aperiendum esse.

A

Velut oculis fluentibus, si aliter videatur expedire, reuellere in fauces conuenit.

Oculos fluxos, seu fluentes, vocat, non arbitror illos solum qui rhyade, idest, excavatione anguli maioris laborant, sed omnes eos ex quibus ob nimiam humiditatem fluir assidue aliquid. Videtur mihi (quamquam Galenus repugnet) posse esse hoc exemplum proximæ sententiæ: quod particula illa, velut à qua incipit, videtur significare. Quasi diceret, velut in oculis fluentibus curamus concoquentium usum, vt lachrymæ transleantur, & inuentur in lippas, ac si ita non dedit, sicantibus & resolutentibus. Si tamen aliter videatur expedire, hoc est, si non videatur curatio localibus medicamentis posse perfici, sed expedire, vt aliis curetur, reuellere conuenit in fauces, hoc est, apophlegmatismis, & masticatoriis, in os reuellere, vt etiam ethinis, in nares. Potest etiam hæc sententia seorsum explicari, vti illa particula, velut, sic tantum continuatur, aut copulatur, erit verò hic sensus. Cum oculi fluxitatem habent; si aliter videatur expedire, hoc est, si videatur expedire vt fluxus in aliam partem transferatur, ne illa effluat reuellere in fauces conuenit.

B

C

D

Et ubi veltatio conuenit, & quæcunque alia eiusmodi.

Hæc sententia plurimum torfit Galenium. Quòd neque seorsum per se videatur esse perfecta, neque antecedenti, neque subsequenti rectè coniungatur. Vnde factum est, vt quamplurimæ fuerint interpretum sententiæ, quas Galen. recenset. Ego in eam feror, quæ censet verba hæc seorsum legi, & nihil continere aliud, quàm vtile esse nonnunquam ructus mouere, eo quòd eructatio quamplurimis conueniat. Duo igitur hæc Hippocrates indefinita reliquit. Erit operæ pretium nunc definire, quibus sit vtilis eructatio, & quibus modis prouocari possit. Eructatio est status ex ventriculo per os eruptio. Proderit ergo his quibus multum status in hypochondriis colligitur, aut roto ventre, carens tamen facili per sedem exitu. Quare conferet his qui cruditate acida laborant, & lienosis, & hypochondriaciis, & mulieribus quæ strangulantur ex utero, & colicis, ac vultuosis, quibus nodum malum deorsum repit, & multis nephriticorum. Ac proinde si non fiat, prouocari conuenit. Prouocatur verò usu calidorum & extenuantium, vt aniso, & caro, ruta, cymino, aut ex his paratis trochiscis, aut haustu vini meri, aut aqua stillantia ex vino, aut ex casia lignea, aut re alia huiusmodi, sunt enim quamplurimæ. Ipse etiam agrosus sua industria, & usu musculorum gula, solet ructus emittere. Præter hæc inbebat Sabbinus (vt Galenus narrat) ad mouendum ructus bibere ex vase angusti oris. Certo enim constat experimento, eos qui vtantur vasculis longæ

E

F

Cernicis & angustis oris, qualia ex vitro confluunt, eructare mox ac bibere cessant. Galenus non vituperat hoc auxilij genus inquam, neque commendat quidem, sed narrat solum, in Sabinum autorem ferens. Nunc video esse quosdam, qui laudant, vt ad eam rem vile, alios qui vituperant, vt quisque sentit de causa ob quam eructant ij qui ex tali vase biberint. Nimirum quidam dicant id fieri, quod ex eunte ex vase liquore necesse sit violenter in illud subire aërem, replendi causâ, & enim ex ventre potantis extrahitur itaque exhausti è ventre aërem dum exhauriuntur ex vase aqua. Er hi hac causa commendant talis vasis vsum: alij vituperant, quod putent homines ex tali vase haurire aërem cum aqua, & ob id eructare à potu, quasi recens repletos statu. Causa verò vt repleantur esse, quod exeunte aqua, & subeunte aëre (quod murmur indicat) commisceantur ambo, & aqua statiosa fiat. Ego hac in parte his consentio, repleri potius quam vacuari statu eos, qui ex tali vase potant. Ridiculum enim est censere, extrahi ex ventre aërem, qui in vas subeat. Quia si quis ore suo undique comprehendat, & obtulerit os vas, vt ex circumstante nos aëre nihil possit ingredi, neque bibere quidem poterit omnino nam opus est vt aër nps ambiens vas repleat, qui aër ex ventre nostro suppeditari nequit. Præterea si vacuaretur aëre eis ventriculis, nulli minùs à potu eructarent, quia qui tali vase vsi fuissent, at nulli eructant magis: replentur igitur aëre, non vacuantur. Nihilominus non vitupero auxilium, quin potius censeo eis qui ructibus subleuantur vtile esse, talibus vas vti, quia eructant à potu copiose, simulque cum aëre quem hauserunt, qui non est adeo multus, emittunt multò plus eius quem continebant. Velut eps quos succos in ventre continere agnoscimus, qui non facillè exeunt, immisso clystere facimus deiecere. Itaque hac causa, vel ipse status qui hauritur, ad mouendum ructum non est inutilis. Accedit alia causa potior eructandi, quod qui ex tali vase potant, sunt extensa ceruice, & hianti ore, & œsophago, ac tota gula vsq; ad ventriculum, & ventriculum totum inter deglutendum sursum commouent, quo motu status qui inerat, ad os ventriculi trahitur: interim humor qui hauritur, per patulam gulam ad fundum descendit, ac proinde cessante potu, & subsidente in sefe ventriculo expellitur status, qui ad eius os eruperat, & supernatur. Hac itaque causa subscribo sententiæ Sabini, qui statuosos talibus vas vti iubet, non tamen quò tale vas statum extrahat ex ventre, eoque repleatur, neque quod aqua quæ potatur, minùs statiosa ita sit. Hanc Sabini sententiam sequutus etiam est Paulus, statuosos talibus vas in potu vti iubens.

Meatns aperiendi sunt, vt nares, & alij quibus opus est, & vt conuenit, & qualia, & quæ viâ, & quando, & quantum expedit, velut sudores & alia sanè omnia.

Talis è potu dicitur quidam nunc vocat vacationes moliri. Meatus enim vocat ipsas euacuationes ac-

A commodatas vias vt nares, palatum, vesica, vterusque os, & sedem, & totius corporis poros. Com-
plectitur ergo breui hac dictione omnes considerationes, ad rectè vacationem corporis peragendam, & bonæ euacuationis conditiones. Dicit igitur, oportet (cum scilicet vacatione indigent corpora) aperire meatns, vt nares, & alios transitus, quibus opus est, hoc est, quorum aperi-
one opus est. Id verò faciendum, vt opus est: Potest enim meatns quibus multis, variisque modis aperiri, vt nares percussis, aut punctis, aut sacrificatis, fundunt sanguinem, & ethinis extrahitur pituita, & alius vacatur epico pharmaco; aut insectis clystere, & vna elicitur diureticorum vsu; aut immisso cathetere, aut aperi-
ente somento, & sudore elicitur, motu, mora in sole, inunctione, aut porione sudatoria. Cum igitur singula euacuationes multis modis moueri possint, nulla in omnibus eodem modo mouenda, sed in vnoquoque, vt opus est. Alijs enim pharmaco indiget, alijs clystere solum. Ad hanc etiam considerationem pertinet præparatio, ad quamcumque vacationem necessaria. Nimirum tunc fit expurgatio, vt opus est, cum ante pharmaci exhibitionem idonea accipiuntur scæpia, & reliqua præparatio peragitur, alioqui non fit, vt opus est. Præterea prouidendum, vt vacuentur qualia oportet. Ob quam considerationem propiatus, nunc cholagoga, nunc phlegmagoga, nunc melancholagoga. Prouidendum etiam quæ viâ fiat. Galenus putat hanc considerationem, referri ad loci, per quem euacuatio fit, differentiam, vt an per os, an per nases, an per sedem. Mihi verò magis placet referri ad electionem loci, quò oportet ægrotum collocare vt euacuetur. Quia hanc considerationem inutilem non esse constat. Nemo enim tentat sudore vacuare hominem, iaceantem in cubiculo; ventis plus satis perituo, & frigidissimo, & nudis parietibus, & male commissis fenestris, præcipue in tempore non calido. Atqui non parum seferre quo loco quis decumbat, vt melius, aut deterius habeat, aut curetur, indicauit (præterquam quod res est notissima) Hippocrates qui in historis singularibus sepe meminit loci, quo ægrotus decumberet: nonnunquam quidem memoriam solum gratiâ, sed nonnunquam etiam tanquam id ad rem ipsam plurimum pertineret. Vt multi enarratores intelligi voluerunt illud, Hermocratem, qui decumberet iuxta nouum murum. Censio itaque illud im, ad loci quo euacuatio agatur electionem pertinere quia egerat iam antea de differentia loci per quem fit vacuatio (quid enim aliud continuerunt illa verba, vt nares, & alij, quibus opus est?) & quia ita repetitione inutili vitata, nullam considerationem necessariam omisit. Prouidendum etiam quando fiat, quod ad tempus peculiare morbi referri potest, cum Hippocrates dicat. Inchoantibus morbis, si quid videtur mouendum moue; & rursum. Concocta medicari, & mouere oportet, non cruda, nisi turgent: & rursum. Purgare oportet in valde acutis, si materia turget, eadem die: & lib. de expurgantibus medicamentis silem non ante decimum quartum: & quarto de ratione victus, hos si ab initio purgare volueris, id ante diem quintum facito. Sed non minùs potest referri ad anni

tempus, cum idem Hippoc. dicat, quibus secare venam, aut expurgans medicamentum dare oportet, is in ipso vere faciendum, idest, & ipsemet libello de aere, locis, & aquis, plurima ad hanc considerationem pertinentia scribat etiam vitari debere Aequinoctia & Solstitia, exortus & occasus Vergiliarum, & Aetia. Omnium quoque praecipua & maximè necessaria, tametsi vltima consideratio est, quantum vacuari debeat, ne scilicet minus quàm vt profit, aut plus quàm vt ferri possit, siue semel, siue pluries effundatur. Potes enim ru (ne vlla hoc loco consideratio desideretur) numerum ad quantitatem referre, quia repetitio euacuationis fit ad supplendam quantitatem. Quòd si quando fiat repetitio non ob hanc causam, sed quòd per se repetita quàm assiatum facta, melior esse putetur, velut ad reuelandum, constat ad modum facienda pertinere, esseque illud in secunda consideratione, quòd distebatur, & vt opus est. Hac omnia si medicus sapienter prouiderit, nihil deerit ad optimam euacuationem, quacumque opus sit. Apponit exempla, dicens, velut sudores, & alia omnia, hoc est, aliz omnes euacuationes; quòd nisi exuderit, aut aliter vacuetur quantum oportet, sed aut minus, aut plus, certè aut inutilis, aut periculosa, & noxia erit euacuatio. Satis tamen est, vt omnes euacuationes exemplo esse fecit. Hippoc. (dixit enim & alia omnia) ita omnibus euacuationibus accommodari. Omnes enim indigent, modo, qualitate, quantitate, loco, & tempore, vt quisvis poterit per se considerare.

IN magnis malis facies si sit bona, signum bonum; in paruis bona significationi contraria denuntiatio, malum significat.

Bona facies est, quæ simillima beneuolentium; significans contraria bonæ significationi, hoc est, præstans prauam significationem, estque bonæ contraria, & dissimilis ei quæ in beneuolentibus, & ad eam, quæ in cadaveribus apparer, accedens. Apparete faciem bonam in paruis malis, nihil mirum, neque notatum dignum, neque quicquam significans: præter id, quod ex aliis omnibus signis, & ex essentia propria ponitur constare, putà paruum esse malum; tamen in magnis malis faciem esse bonam, & notatum dignum est, & bonam significationem præstat, non enim plurimum labascit facultas, dum adhuc perseuerat bona facies. Sane quantum ad hoc signum pertinet, ex hac facie nulla mala significatio præstari potest, nisi fortè quæm videretur minus quàm pro morbi magnitudine minus, longitudinem morbi aliquantulum maiorem portendat quàm putasset aliquis. Id verò in magnis non est admodum graue. Itaque signum hoc in magnis malis bonum est, non tamen quia bonum, statim est admodum salutare, neque tale vt ex eo possiam certo futuram sanitatem præfagire: neque sane adeò est bonum, quàm contrarium (putà mala facies in paruis malis) est malum. Nam vt in commentariis prognostici diximus, signa salutis aut mortis, valentiora sunt, significando mortem. Dicit igitur in par-

Auis faciem malam esse signum malum. Dicit verò in paruis, quia in magnis malis mala facies, neque infert admirationem, neque proinde adeò mala est. Eadem igitur ratione, quæ in initio prognostici dicit, malam faciem primis diebus apparere sine causa manifesta esse valde pernitiosum, quia si diuturniore iam factò morbo appareat, non adeò est graue: dicit etiam nunc in paruis esse malam, quia in magnis non adeò mala est. Constat igitur hæc quoque suppleri debere, si neque vigilauerit homo, neque alius soluta sit, neque omnino vlla alia causa manifesta accesserit. Tales enim cause cum adsunt, non est quod in horrendas causas symptomata referantur, velut cum hæc omnes absunt, in paruis morbis talis facies refertur in extremum languorem facultatis. Nam alioqui cur fieret? Sed dices, quò pacto possit, si adest signum, quod verè adeo malum sit, & in adeo malignam causam referatur, esse paruum malum? Quis enim dicit cum quem moriturum breui merito timet, teneri paruo malo? Certè nullus. Sed hic dicuntur parua mala, morbi propria essentia videntur esse parui, sunt enim maligni, & ex iis quibus mali morbi veteres vocauerunt. Hi enim quodammodo magni morbi sunt, quia maligni, & periculosi, quodammodo autem non magni, quia propria essentia, & priorum symptomatum magnitudine videntur parui. Alij contra sunt essentia propria magni, boni autem morbi & simplices, quorum causa multa quidem est, ac morbum magnum nasci est facere, nò tamè maligna vlla & venenosa qualitate infecta. Et hi quidem maiores, sed minus periculosi sunt. Si igitur facies extremè extenuata, idque breui appareat in febribus maximis, minus terret debet, quia in ipsam intemperiei magnitudinem refertur (tametsi hæc quoque sit periculosa) si verò in paruis longè grauius est, quia constat eas febres esse malignas.

DMulier qua iuxta magnum Theatrum post heroem habitabat, icterus superuenit, & permansit ipsi.

ENihil, neque vilitatis, neque difficultatis, continet hæc dictio, præterquam in ipsa verborum incondita serie: fortasse ex alia dictione perfectiorem reddente sensum decisa est. Hæc nihil continet aliud, quàm cuidam mulieri, quæ iuxta magnum scilicet Theatrum, siue templum, sine quidvis aliud habitabat post herois domum factum esse ictericum colorem ex morbo, & permansisse illi, aut tota vita, aut diutissime. Non narrat quo morbo laborauerit, illud verò fieri solet cum ex morbo remanent circa hypochondria obstructions difficiles.

Quia iuxta Temena neptim decumbebat hic niger erat.

Aliud est hoc exemplum icteris, qui ex morbo permansit, erat verò hæc icterus niger.

IN Perintho quid semini simile excrementum est, quod tale erat quia indicatorium, & ab istis abdominis affectibus tunc liberabant urinae excretiones, quoniam neque statu multo, neque stercore multo, viscido etiam procedente euacuabatur. Nam enim profecto magnum erat Hypochondrium. Qui brassicam die septimā comedit, cum adhuc difficulter spiraret, circa abdomen euacuabatur & recte spirans factus est, alius ipsi conuulsus est.

Certe aut Hippocrates hæc scripsit sibi soli, ut neque sermonis congruentiam neque aliud quicquam curaret, præter id quod sibi ad memoriam obseruationum putaret esse satis: aut plurima verba vel in sola hæc dictione delecta sunt. Partim enim videtur doctum aliquam multis communem, partim singularem historiam continere, atque hæc non videtur apte coherere (neque sanè possunt) nisi suppleantur quæ aut sibi soli tacuit auctor, aut deiecit remissus. Ea verò licet nobis supplere, coniecturam capientibus ex his, quæ scripsit, & adhuc supersunt. In Perintho (dicit) quid semini simile excrementum est, quod tale erat, quia indicatorium. Quæ verba haud dubie commune quiddam, & quod in Perintho quadā tempestate accidit, continent. Nam in singularibus historiarum, aut non nominat verbes, sed domos, aut viros, aut nominata vrbe adiungit nomen ægrotantis, vel notam aliquā, quæ certam personam indicet. Quare prima hæc verba nihil aliud continent, quam in Perintho aliquando ægrotis exire quid semini simile, id est factum, quia quod est humifodi, solet esse decretorium. Itaque dicit semini simile solere decretorie excerni, id est factum esse quadam tempestate in Perintho. Tò γενησθαι poterat excerni ex alio, aut cum vrina, succus scilicet, candidus, crassus, & lentus. Et quia (arbitror) utraq; via, aut alterutra exercebatur, non dixit deiectio semini similis, aut semini simile in vrina, ut solet dicere, sed simpliciter genituræ simile. Talis igitur excretio potest esse decretoria. Neque mirum: est enim excrementorum, ex genere crudorum, excretio. Quare conferre poterit, in morbis præcipue pituitosis, velut & ipsam veri seminis excretionem prodesse nonnullam, sectione quinta huius libri dicetur. Præcipue autem iudicari solent tali excretionem morbi pendentes ex cacochymia τὸ σπέρμα, hoc est, eius partis, quæ est inter vmbilicum, & pudenda: & vbi hypogastrium & pubes. Cuius rei maximum indigium est, quod tales mictio iuuat. Mictio enim quæcunque lenamen quoddam præstat, iis quibus fumen excrementis grauatam est. Quia cum ibidem sit locata vesica, eius vacatione laxatur pars. Iuuat etiam hos mictio, quæ quid genituræ simile affatim euacuatur, quia ea euacuatio habet magnam reddituam cum ea parte, atque adeo est accommodatissima deiniario. Itaque lenamen, quod ex vrina sentitur, ex ea parte euacuari indicat. Addit. Quoniam neque statu multo, neque

A stercore multo viscido etiam procedente, euacuabatur. Quæ verba cum mox sequentibus, haud dubie singularem narrationem videntur continere, & de vno aliquo ægrotato dici. Quæ propter necesse est verba aliquis supplere, ut à communi narratione ad singularem transitio fiat: Ita scilicet, ac si diceret (suminis talia sunt indicatoria, cum vrinae inuant. Quod cuiusdam (quis est estip se nouerat) accidisse constat, quod neque statu multo, neque stercore multo, lento autem exente, euacuabatur. Hic ægrotus laborabat crudoribus & trasorum multitudine circa fumen, & euacuatione multa semini simili indicatus est. Esse verò eius partis expurgationem, hæc erant signa, quod mictione iuuabatur, ut solent, quæ ita sunt affecti, & exercebatur exiguum & dentum quid (semini simile scilicet) non stercore multum, & cum statu multo: Adde, non enim magnum erat hypochondrium. Quæ verba duo possunt continere, & causam quæ non exibat stercore multum cum multo statu, & novum illud signum affecti suminis. Nimirum, ut in prognostico dicitur: Dolores qui in hypochondriis affligunt, ac tumores, si recentes fuerint, neque cum inflammatione, solum murtur inidens circa hypochondria, sed potissimum si cum stercore, vrina & statu exortantur. Secundum hæc sententiam dicit nunc, nec statum multum, nec stercore multum exisse, quia non erat illi magnum hypochondrium. Porro quia non erat magnum hypochondrium, significabatur affectio suminis, Quia omnino alicuius partis earum, quæ ad ventrem pertinent, consentaneum erat, affectionem esse: Cum igitur non esset tumor in regione hypochondrii, & alia signa adessent affectu suminis, siebat euidentior coniectura ab iis quæ aderant, & quæ non aderant. Sed & curatio subscriptis huic conieciatur. Nam expurgatione eius partis factus est *ἀσπύριος* .i. recte spirans, & magno perè adiutus. Sed pacto res sit acta, audiamus. Cum adhuc difficulter spiraret, die septimo brassicam comedit, & ab assumpta brassica alius ipsi quatiabatur, hoc est, rugiebat, & videbatur concuti, & sensit euacuari sibi fumen, & recte spirans factus est. His verbis simul docetur curationis ratio, quæ ita affectis est adhibenda, & confirmatur coniectura, quæ habebatur affectu partis à inuantibus argumento capto: Siquidem sumine vacuato subleuatus est. Sed simul insinuat species affectionis. Nam morbum acutum fuisse cum febre continua insinuat, quandoquidem septimæ diei tantam rationem habet, & difficultatem respirandi habebat coniunctam. Quid enim esset aliud, quod ex congectione excrementorum eo loci tantopere vrgeret, nisi forte dolor aliquis magnus eius partis? At verò si talis dolor adfuisset, tam multa alia signa non collegisset, nulla facta mentione doloris, qui morbi erat adeo euidentis signum. Erat itaque haud dubie febris continua, pendens ex succis ureferentibus, præcipue in loco dicto. Permulto enim sunt febres, per quas quædam certe partes præcipue affectæ sunt. Habuit difficilem respirationem. Ob eam (ut reor) alligationem, quam per rectos musculos habet pubes cum thorace, & septo transverso. Hinc merito euenit, ut vacuato sumine (vacuari autem illud indicant eius laxa-

tin): leuatus homo fit & *delinens* factus. Quidam enarratorum, vt refert Galenus, rectūspirum hoc loco censent dici, recta ceruice spirantem quem *epitome* dicimus: verum non est consentaneum: quandoquidem dicit ex difficulter spirante factum esse rectūspirum. Nam recta ceruice spirare, quādam difficultis respiratio est. Quare perinde esset, ac si diceret, ex febricitante factus est tertianarius. Cū igitur iam *epile* quā *suble* significet rectum, hoc est, bonum, & probum, ac rectum, quod non enrum, aut reflexum, multo magis consonum est, nunc significari bene spirantem factum esse ex male spirante, euacuato sicco, quo fumen distentum & tument erat. Mirum quod accepit brassicam die septimo. Si enim vt expurgaretur, cur tam debile iudicamentum, quod ne expurgans quidem dici meretur? Nam brassica vt & beta, semel ac leuiter cocta alium mouet debilitat: valde aut bis cocta, altitigit: bene autem ac satis, nunquam expurgat. Nisi forte brassicam maximam intelligit, hæc enim purgat mediocriter. Sed si satis expurgans esse censetur, cur accipiebat die septimā, si modò in diebus indicatoriis abstinendum ab insignibus euacuationibus est? Ego certe abstinendum illis diebus censeo, nisi magna vrgentia cogat (nam hanc semper excipio) mittere sanguinem aut expurgare. Nam illi dies aut iudicationes efferre solent (que verò iudicantur aut iudicata sunt integrè, aut etiam iudicanda sunt mox, neque mouere oportet, neque alterare, sed sinere) aut si non sint indicatorij illius morbi, tamen sunt semper illi dies contemplabiles, quia aut iudicationes inchoant, aut mutationes alias insignes faciunt, & accessiones illis diebus solent fieri maiores. Si igitur in accessionibus abstinendum est non solum (vt ego interpretor) à cibo, sed & à medicamentis, multo magis, his diebus, quā aliis erit abstinendum. Quapropter suspicor neque à medico quopiam datam esse brassicam, neque ob ipso acceptam expurgandi gratiā, sed casu, aut etiam solum leniendi; factam verò esse spontaneam alui subductionem ob vim eius diei. Itaque iudicationem fuisse hanc magis quā arte factam expurgationem censendum: designasse verò Hippocratem brassicæ esum, non quasi pharmacum, sed quasi occasionem, que tametsi levis esset, ob diē naturā potuit plurimum mouere. Dices, non igitur hic docet morbi huius curationem, sed quem spontè habuit exitum. Certe hinc pendet etiam & ratio curationis. Nam si huic non esset facta illa indicatio die septimæ, contulisset oſtium dare pharmacum expurgans, quod indicauit sanatio. Nam vt Hippocrates ipse dicit. Que cum sunt iuuare solent, hæc si non fiant, facere oportet. Sed cur alius quæreretur superest considerare. Mihi videtur eo verbo significari quiddam simile ei, quod concussis vtribus, exiguum quendam humorem continentibus, fit. Itaque erat, crepere modo quodam: quod vacuitatem superioris partis ventris ostendebat, quantum suspicor. Nimiram huic ex fumine expellebantur excrementa; reliquum ventris quærebatur, præ vacuitate.

A

DE sanguine seroso ita censendum est, quod talis reperiatur in pauidis & vigilantibus, siue malus siue bonus fuerit.

B

Dictum à me iam saepe est, sanguinem melancholicum esse serosum, similemque viciolo lacti, quod in casum & serum ferè totum resoluitur, nihil habens boni & vili lactis. Hinc fit, vt melancholici sint saluosi, & plurimum sudent, quia scilicet habent sanguinem serosum. Neque sanè illud serum est expers qualitatū, & tantum crudum, velut quoddā abundat in crudo & pituitoso sanguine, sed acre & mordax, referens sanguinis corruptionem, quod propterea vocatur ichor, seu sanies. Ichorosus igitur sanguis indicat melancholicos, quos significauit dicens, in pauidis, & peruiulibus. Symptomata enim sunt horum pauidi & peruiulissimi: hoc quidem ob siccitatem, illud ob melancholice nigritiem: Sed & ipsius ichoris redundantiam, arbitror aliquid ad timiditatem conferre: quia viciat sanguinem, & debilitat naturalem calorem in corde, atque ita & irascibilem facultatem, cuius debilitas timiditatem facit. Itaque duplex iam causa est timiditatis in melancholia, altera in nigritie, altera in ichoris redundantia. Illa quidem afficit cerebrum, hæc cor. Timidos ergo esse & vigiles, significat melancholiam. Nam pituitosi, & crudiori sanguine redundant, sunt etiam timidi ob cordis sangorem, tamen non sunt vigiles, sed potius somnolenti. Quia igitur vtrumque sunt, melancholici sunt, quibus sanguis esse solet ichorosus, idque siue bonus siue malus. Hoc est, siue patris, & alienis coloribus infectus appareat, vt per febres, aut internas inflammationes, aut magnas cacochymias, per quasque plurimum recedunt succi à natura sanguinis, apparere solet: siue integer & ruber. Solet enim melancholicis, etsi nullam aliam habeant eius corruptionem, esse sanguis perurber, crassus, & ichorosus. Itaque ichorosus esse pauidis & peruiulibus, siue bonus, siue malus sit.

C

D

E

Quibus splen deorsum vergit, iis pedes & genua & manus incalescunt, nasus & aures semper frigent, num propter hoc quod tenuis illi insit sanguis? Nam etiam natura talem hi habent.

F

Melancholicum sanguinem esse serosum & tenuem, hinc quoque constat præter dicta nuper, quod leniensi tenui sanguine abundare deprehendantur, cū lien membrum ad eò melancholicum sit. Est verò, vt diximus non totus tenuis (nam quomodo posset esse scæculentus) sed vt vinosum lac, quod mediocriter succi expers, ferè resoluitur in casum & serum. Talis cū sit qui colligitur in liene, accidit vt crassus & scæculentus in inferiora, & tenuis ac serosus in superiora repar. Vnde videmus his venas in cruribus & imo ventre nigrescere & crassescere, ac nonnunquam hæ-

morrhoidas crassum fundere; & ex narē sinistra sanguinem tennem & aquosum copiosē exire. Hinc etiam sit, quod Hippocrates nunc animadvertit, ut in his pedes, manus, ac genas caleant ob facies illas sanguinis patrescentes, & extremitates capitis frigeant ob redandantiam sanguinis aquosi. Non tamen hoc lienosis omnibus æquē, sed iis magis quibus lien est declivis. Qualis autem sit qui talis, & qua causa hæc fiant mox dicetur. Post præscripta verba succedit mox in codicibus omnibus, iis qui sunt à seculo Sabini & Ruffi, dictio hæc, Suppurationibus umbilicis: & post hæc hæc, Lien durus non superiore. Postquam, tursus hæc, Minus capitis gramitare, seu grauidine laborantibus. Ego verò suspicor, perturbatum esse harum dictionum ordinem, atque post hanc, quam modò enarrauimus, apponi debere, eam quæ differentias malè affecti lienis continet. Cui autem ita censeam, ipsa concinnitas dictionum indicabit.

Lien durus non superiore sed inferiore parte, rotundus, latus, crassus, longus, tenuis.

Dixit, pedes, manus, ac genas incalescere naturam, & aures frigare semper iis quibus lien est declivis. Explicat nunc qualem vocat, *rotundus, latus, crassus*, hoc est, declivem. Est autem cuius durities, & tumor ad infernam partem spectat: Nam tametsi lien transuersum positus sit sub septo transuerso, in sinistro hypochondrio ob molliorem, & laxitatem naturalem, tumere potest in omnem partem, & mirum in modum crescere præter naturam, ut aliquando infra umbilicum manibus comprehendere posse videatur. Differentie ergo lienosorum desumuntur ex parte lienis, in quam præcipue inclinat tumor, & ex tumoris figura. Quibusdam enim tumor magis superna pars, qua septum est: aliis inferna, quæ spectat ad umbilicum. Rursus quibusdam est tumor rotundus, aliis in longum productus. Declivis ergo est, cuius tumor humilem partem tenet. Cuius dux solent esse figure: quibusdam enim sentitur esse lien durus, non superna, sed inferna parte, & teres, latus, ac crassus, hoc est, magnam, amplamque rotunditatem sibi habens: aliis longus & tenuis, hoc est, in longum productus, & durus, & angustus, ut quidam musculus. Et hæc differentie non sunt omnino contemnendæ, cum hypochondria enim ea parte sita sint; quæ superiores corporis partes ab inferioribus separantur, merito sit, ut infernz eorum partes cum infernis, & supernæ cum supernis habeant magnam sympathiam. Cum ergo tumor supernam obsidet lienis partem, supernas afficiet, & difficultatem respirandi faciet, & fluxum sanguinis crassioris ex naribus magis faciet, & cuius curatio missio ex sinistra manu sanguine, melius succedet. Cum vero obsidet infernam, afficiet potius infernam, ut tenem sinistram, & ad hemorrhoidas aut varices inclinabit potius sanguis crassus: cuius curatio præcedet potius ex sinistro crure missio sanguine. Ut constet hinc, etiam ad rationem curandi conferre plurimum distas

tumorum lienis differentias, tametsi Gal. nullibi videatur eas perfectius, nisi forte in huius sententiole commentatione, ubi quid possent valletis conferre, non explicat. Constat verò etiam præter dicta, cur iis quibus lien est declivis potius quæ aliis lienosis frigeant capitis extrema partes, & manus, pedes, ac genas caleant. Nam quibus tumor in superna parte lienis est, venæ quoque sursum eo latere spectantes, plene sunt, & tument, deferturque in caput crassum sanguinem, qui cum obstructus, incutaturque putrescit, cassatque partes supernas in quas vergit, humiles verò tantè inopia caloris laborant: quibus verò tumor inferni lien, venæ inferiores eo sanguine tumentes calorem communicant extremis corporis partibus, præcipue humilibus: superiores verò venæ deferunt in caput ferum, sanguine velut casso deorsum subsidente. Quare merito partes extremæ ad se viam spectantes frigunt.

Suppurationibus umbilicis terminus: Quibus suppuratio continget, his alius turbatur, minus autem iis qui capitis grauidine laborant.

Dictum est ab Hippocrate in prognostico, tumor qui in ventre alligit minus facit abscessum quam qui in hypochondriis; minime vero partes infra umbilicum in suppurationem vertuntur. In hanc ipsam sententiam dicit nunc, In suppurationibus umbilicis terminus. Apponit nunc quoddam signum suppurationis iam iam subsecuturæ in qua vis intestini parte, id verò est, alium turbat. Nam cum fiunt suppurationibus dolores & febres magis contingant citra partes, hæc si in intestinis sunt, necesse est ob irrationem alui fluxiones concitari, nisi aut vacuum admodum sit corpus, aut superflui succi in aliam partem fluant, ut iis euenit, qui coryza laborant: quibus ob id solent plerumque alui siccati. Euenit ergo his, ut quum etiam fieri incipit suppuratio in intestinis, alius non humectetur, aut minus quam solet flux.

Vt omnia circa agrotantem sedulo administrantur, quadam de morbo sunt interroganda, videndum quæ sint quæ narrat, ut accipiendi sermones, quanam pertineant ad agrotantem, quæ ad assistentes, & ad externos.

Dictum est ab Hippoc. Aphorismo primo, qui & totius artis est proœmium, non satis esse medicum ipsum se præstare promptum ad ea quæ decet faciendæ, nisi & agrotus, & assistentes peccet inde faciant, & externa ut oportet disponantur. Verum hæc omnia ad medicum solum quodammodo pertinent, quia horum omnium cura ad eum deuoluitur. Non enim solum boni medici est, medicamentis & medicinalibus omnibus instrumentis rectè uti, & quod ad cibum & potum

arinet, victum instituire, sed etiam omnium quæ coram ægroto dicenda, sive agenda sunt ab ipso seu ab alio quopiam, & cubiculi, domus, & lecti, & exteriarum omnium providentiam habere, atque omnia disponere, ut maxime ad ægroti gratiam, & utilitatem referantur. Hanc providentiam vocat Hippocrates œconomiam circa ægrotantem, nomine profecto satis idoneo. Nam cum mitti sanguinem, aut propinari pharmacum, aut emplastrum admoueri, aut tale quidpiam facere iubet, medicam artem; cum verò fenestras, aut ianuas, aperiri, aut claudi, lectum ægroti huc aut illuc verti, hos haberi ab ingredientibus sermones, hæc nunciari, hæc celsari, œconomiam quandam videtur exercere. Et sanè, quinquam prima illa cura, & quæ ad medicinam instrumenta pertinent, maioris sunt momenti, tamen hæc postrema, non est omnino exigui. Certe multi alioqui præstantissimi, & suæ artis peritissimi medici, quod ad hanc œconomiam exercendam male se comparent, adeo sunt multis ægrotantibus ingrati, ut ob hoc ipsam eadant inuitiles. Alij contra parum periti, ita huic curæ sese accommodant, ut per pauca, quæ alicuius momenti sunt facientes, multis non parum viles esse videantur. Plurima sunt ab Hippoc. scripta ad hanc œconomiam pertinentia, in quibus & hæc sententia præcipue est. Dicitur enim circa ægrotantem œconomia. Quasi dicat, non tantum medicamentorum cura haberi debet, sed præter hanc etiam, debet esse circa ægrotantem œconomia, ad quam spectant etiam quæ de morbo sunt interroganda, hoc est, videndum quæ interrogas, ut scilicet nihil omittas eorum, quæ ad cognitionem morbi & causæ conferre possint, neque tamen sis nimis, quidvis ubique citra delectum interrogando: sed ita ut & ægrotus ipse, & qui adsunt intelligant, te non longe abesse à notitia eorum, quorum suspicis curationem. Hinc enim fit, ut bonam de te concipiant opinionem, & ægrotus melius pateat, & agat confidentius. Videat etiam medicus quæ narrat, qualia, & ut accipiendi sermones. Nam ægroti semper sunt pusillanimes, & suspiciosi, & multi medici adeo imprudentes, & loquaces, ut quicquid in mentem venit narrantes, interponant tristitia, & atrociam, unde ægroti in tristitia agunt magnam, & de suo morbo periculosos aliquid cogitant, timentes ne id quod narratur simile aliquid sit ei, quod ipsi patiuntur. Atqui sæpe ipsos sermones accipiunt ægroti alio modo ac dixerant medici. Medicus enim fortasse dixit accidisse quædam ex potu, aut cœna intemperatius grauius lesum esse, ut ægrotus melius sibi caueat, ne quid tale perpetiatur, & ægrotus interpretatur dictum hoc esse, ut se grauius iam & lethaliter esse affectum, significaretur. Videat ergo medicus quæ & qualia loquatur, & ut accipiendi sint sermones. Videat etiam quæ ad ægrotantem, & quæ ad assistentes loquatur. Nam quandoquidem non eadem facturi sunt ægroti, & assistentes, & spectat ad medicum utrosque sui officij admonere, non eadem ad utrosque locutus est, sed illum exhortatur, ut iussu pareat, & hos ut diligenter exequantur. Illi prospera pœlicitaturus, his dicturus certiora. Externa quoque omnia prouide-

re debet, ut habeant optimè, ed præcipue intendens animum, ut quoad fieri possit, ægroto sint iucunda & vilia. Huc spectat illud sectionis quaræ huius sexti libri. Ægrotantibus gratificandum, ut mundè parentur poculenta, & esculentia, quæ videt, & quæcunque rangat mollia sint, & rursus ægrotanti placeant introitus, sermones, figura, vestis, tonsura, vnguis, odores. Huc etiam spectant quamplurima eorum, quæ in libris de officina chirurgica scripta sunt.

Quoniam in calidiori parte concipitur quod in dextrâ, idè mares nigri sunt, & vene exterius eminent, & longè biliosiores sunt.

Ad foras generationem pertinent sententiola hæc, & duæ sequentes, quibus hæc sectio concluditur. Hæc autem & vitima scriptæ sunt secundum aphorismum illum. Mares in dextra, femine in sinistra præcipue generantur. Nunc ergo dicit quod in dextris gignitur, quoniam in calidiori vteri parte gignitur, calidius est. Mares itaque calidiores sunt feminis: & ob hoc nigri sunt præ feminis, & venæ (quo nomine arteriæ etiam intelliguntur) exterius, hoc est, eminentiores sunt, & maiores. Proxius biliosiores sunt mares feminis. Calidius esse dextram latus sinistro, ipsa promptius ad actiones indicat, & præter hæc natura partium singularum, quæ hæc & illa parte fitæ sunt. Colorem nigrum, amplitudinem venarum, & biliosam naturam, caloris esse signa, in arte medicinali satis est indicatum à Galeno, ac meipso in commentarijs: vnde rursus caloris dextri lateris capitur aliud argumentum. Quia ex anatome constat, vasa omnia dextri lateris (arteriæ præcipue) ampliora esse. Mares ergo ex his signis, constat esse calidiores feminis, præter multa alia argumenta, quæ nos proprio capite collegimus primo libro controuersiarum medicinalium.

Concreuit Mas & coalescit citius, postquam mouetur, desinit, & tardius augetur & longiori tempore.

Enarramus lib. 2. sectione 3. verba illa, qui citius formatur & mouetur factus, rursus augetur tardius & longiori tempore. Quo loco dicta sunt omnia, quæ ad hunc locum spectant. Nihil enim aliud continent hæc, quæ nunc præscripta sunt quam illa, nimirum masculum concretionem & constitutionem, hoc est, conformacionem idoneam, & vitam quæ motu agnoscitur, citius recipere, postquam verò mouetur, desinere, id est, non adeo in illis quæ supersunt propere, & tardius augeti, & pluri tempore. Cuius quidem rei causæ dictæ illo loco sunt, indicanturque non tantum hoc accidere maribus & feminis dixerunt vtero, sed & editis iam in lucem visque ad perfecta corporum incrementa (quod Aristoteles animaduertit 7. de histor. animalium cap. 3.) dictumque hanc ob rationem accidere quod etiam

civili figuram & vitam mares recipiant, non tamen edantur civili quam fœminæ, quia et si fœminæ primas mutationes recipiant tardius, vltima prægnationis parte festinant, angentiq; præpetet. Quæ re constat proportionem illam temporum figuræ motus & partus, quam lib. 2 huius operis, & libello de alimento scripsit, non esse certam, neque statim. Nam tempora partus maribus & fœminis sunt eadem, proportio tamen temporum diversa. Quod si mulieres affirmant mares nasci in principio noni mensis, fœminas in fine, id quidem evenit, qui illæ computant ab eo tempore quo deficiunt menstrua, mares verò plerumque concipiuntur post recentem illorum expurgationem, fœminæ quum iam instar illa expurgati. Sed hæc omnia lib. 2. dicta sunt.

Quod solidum factum est, & magis biliosum est, & magis sanguineum, hoc calidius efficit locum animalium.

Nihil continent noui hæc verba, sed quod nuperimè dictum est, quia dextra regio vteri calidior est, ob id quod in ea gignitur, puta masculinum corpus, solidius esse, & biliosius, & sanguinolentius, vt muliebree contrâ est mollius, & pituitosius. Non enim quia mulieribus sanguis singulis mensibus fluit, censendum est sanguinis boni plus in illis colligi, sed plus mali & crudioris, atque eum minus insensibiliter dissipari.

SECTIO TERTIA.

Cutis raritas affert alui densitatem: cutis compactio carni incrementum: ventris torpor omnium confusionem: vasorum impuritas, cerebri consumptionem unde etiâ caluitium instrumentorum attritionem.

Ad symptomatum causas pertinet tota hæc distinctio, nihil enim aliud continet, quam quorundam symptomatum causas, non omnes, sed præcipuas, quæque illi videbantur scitu dignissimæ. Vtut verò phrasi quadam vulgari, quæ res quæpiam esse dicitur id, cuius est causa, vt si quis dicat raptus Helenæ fuit excidium Troiæ. Dicit igitur, *Alipsum degenit, & volens maxime*, quasi diceret, cutis raritas est alui densitas, aut quasi apertius diceret, cutis raritas affert alui densitatem. Juxta hæc phrasim dicuntur etiam reliqua, scilicet, cutis compactio affert carnis incrementum, & alui stupor affert multorum confusionem, & vasorum impuritas affert cerebri consumptionem, ac proinde caluitium est organorum attritio. Hoc est, attritio organorum affert caluitium. Constat enim, iuxta grammaticæ regulas nihil ininteresse, sine dicatur caluitium est organorum attritio, siue attritio organorum est caluitium. Quare sensum oportet consulere, & id putare dictum, quod eis veritati sit magis consentaneum. Nec tamen hoc faceret, nisi cum ipse loquendi modus non magis

A fertur in hoc, quâ illud alioqui, si neglecta phrasi quis interpretatur iuxta id, quod sibi videtur consentaneum, profectò id non est enarrare auctoris sententiam, sed suam, & in suam trahere auctoritatem. Quod videmus multis licentiosissimis enarratoribus esse. Ego non ita iuduxi in meum animum facere, sed quem maxime consentaneum ferre possint auctoris verba, aperire sensum non autem quem non possint, quantumvis videatur consentaneum. Quorsum enim dicam meam sententiam alienam interpretaturus? id quorsum nunc dicam, mox intelliges, dum singulos dictionis præscriptæ articulos enodo. Cutis raritas facit alui densitatem, hoc est, astidiotem, seu scitiam (nimirum velut aluistrata, aut humida aut laxa dicitur, quæ plurimum fluit) quia raritas cutis facit copiosam per habitum corporis dissipationem, copiosa dissipatio siccæ alui, siccitas astringit, vt laxa humiditas. *Alipsum degenit* dicitur pororum cutis astictio, hæc prohibet corporis dissipationem, & ita facit carni incrementum. Hanc ob causam mulieres plerumque carnosiores sunt quam viri, quia scilicet eorum corpora minus digeruntur ob cutis maiorem densitatem. Eandem ob causam evenit, vt plerumque etiam sint laxiori aluo: vt & viri sunt plerumque graciliores, & aluo astictiori. Eodem etiam modo in ipsis viris biliosi se habent ad pituitosos.

B *Nâ pueri* propriè ad sensum pertinet, estque eius velut, resolutio & sublatio, metaphorice verò dicitur de aliis omnibus, siue actionibus, siue passionibus naturalibus. Quæ propter caliditatem patris dicitur esse resolutio, significatur ablatio, seu insignis imminutio propriæ illius actionis. Si igitur alui aut ventris nomine, intelligatur ventriculus, vt Gal. intelligit, imminutio seu ablatio significatur concoctionis primæ, quæ est actio ejus præcipua: sin autem intelligatur venter inferior, vt in initio cum diceretur alui densitas, significatur nomine torporis ventris privatio decoctionis. Virumque intelligas, verum est quodammodo quod dicitur, puta fieri inde omnium confusionem, hoc est, morbos quam plurimos solere inde nasci, & multa membra in compassionem trahi. Nam siue quis est cardiacus, siue vertiginosus, siue epilepticus, siue podagricus, siue colico dolore obnoxius, siue (vt dicatur semel) ad morbum alium quencunque paratus, facile quidem eo corripitur, si cibi non coquantur in ventre, aut fæces non excernantur ex aluo. Quod addit, *& m*

C *Alipsum degenit, & volens maxime*, Galenus coniungit cum antecessoribus, dicens fieri ex cruditate omnium confusionem. Et illa verba, *& volens maxime* coniungit cum sequentibus, dicens, fieri ob cerebri consumptionem, caluitium, & organorum attritionem. Fertur in hanc interpretationem, quod videatur hoc cum ipsis rebus maxime congruere: etenim phrasi & verborum contextus reclamant, iubetq; ita legere. Vasorum impuritas, cerebri consumptio: Quæ propter & caluitium, organorum attritio: Tentandum ergo, si quo modo inueniri possit, sensum idoneum, qui cum hac lectione congruat, inuestigare. Is verò mihi videtur, immunditiæ vasorum succedere cerebri consumptionem, & caluitium succedere organorum attritioni. Quia verò non sunt hæc quæquam distincta, sed ordinata

D *Alipsum degenit, & volens maxime*, Galenus coniungit cum antecessoribus, dicens fieri ex cruditate omnium confusionem. Et illa verba, *& volens maxime* coniungit cum sequentibus, dicens, fieri ob cerebri consumptionem, caluitium, & organorum attritionem. Fertur in hanc interpretationem, quod videatur hoc cum ipsis rebus maxime congruere: etenim phrasi & verborum contextus reclamant, iubetq; ita legere. Vasorum impuritas, cerebri consumptio: Quæ propter & caluitium, organorum attritio: Tentandum ergo, si quo modo inueniri possit, sensum idoneum, qui cum hac lectione congruat, inuestigare. Is verò mihi videtur, immunditiæ vasorum succedere cerebri consumptionem, & caluitium succedere organorum attritioni. Quia verò non sunt hæc quæquam distincta, sed ordinata

quodam causarum succedunt sibi, coniungit hæc interponens particulam illam, *At*. Nimirum impuritas vasorum affert cerebri consumptionem, & cerebri consumptio organorum attritionem, & cerebri consumptio organorum attritionem, & organorum attritio, caluitium. Sed quo pacto hæc, explicemus. Vasa vocat hic omnia cana, quæ intra cranium sunt, & meatus omnes quibus cerebrum expurgatur, qui ad nares, palatum, & aures, & concava oculorum simul pertinent. Omnia hæc in senescentibus replentur excrementis & impuritate, atque post hæc cerebrum illis consumitur, non omnino (neque enim possit) sed fit gracilius & minus: post hæc, organa, hoc est, porci per quos alimentorum & excrementorum fit dispensatio, cerebro, membranis, cranio, & externo capiti, velut attriti fiunt contrahiores, & angustiores, & succedit capillorum secundum sinciput corruptio, quod vocamus caluitium. Sed quo pacto sint priora posteriorum cause, nondum explicuimus. Nam etsi senibus fiant hæc omnia, non videtur cerebrum consumi ob impuritatem vasorum, sed ob frigiditatem & siccitatem, quæ naturaliter subrept: neque potest contrahi, quia cerebrum consumitur, sed quia siccescunt omnia: neque ob pororum coniunctionem fieri caluitium, sed quia deest capillis alimentum. Itaque videtur fieri potius omnia hæc ob frigiditatem, & siccitatem, quam ob dictas causas. Certe omnium horum cause reducuntur ad eandem intemperiem, & alia ex aliis nascuntur dicto ordine. Nam ob naturalis caloris defectum alimentum minus coquitur, & ob id, excrementa cruda copiosius congeruntur, à quibus obtruncum cerebrum, alioquin iam debile, tenuiter nutritur, & ob id extenuatur, fitque minus, quapropter minimè iam vt antea internum replens cauin, longè à cranio distat, præcipuè secundum sinciput, quo loco pueris erat mollius. Destitutum à medulla os arefcit, & quæ secundum illud sunt omnia: arefcens densatur, fitque minus porosum, atque ob id arefcunt capilli, & desinunt iam inde nasci, vt neque ex lapidibus nascuntur herbe, ac si quæ sint enaræ, facile arefcunt.

Detractio fit cursibus, luctis, quiete, multis deambulationibus celeribus, ouilla carne, maza cocta vt plurimum, & panis exiguus conuenit.

Vocat nunc Hippocrates *ἀσκήσις* quam aphorismo 3. sectio primæ vocauit *ἐξήρανσις*, seu *extenuationem* scilicet corporis, huic contrariam statuit *ἀνάψις*, hoc est, refectionem: Hic verò, vt sententiola ab hac quinta videbis, statuit *ἀνάψις*, hoc est, repletionem. Non quod propriè idem sit *ἀνάψις* & *ἀνάψις*, vt neque *ἐξήρανσις* seu *extenuatio* & *vacuatio*, hoc est, vacuatio, sed quod simul fieri consueverunt. Differunt quidem, quod detractio, seu extenuatio ad carnes propriè pertineat, velut ad easdem refectionem: Vacuatio ad humores, velut ad eosdem repletio. Sed vacuationibus extenuamur, & repletionibus reficimur, ob id hæc coniungit Hippoc. dicto aphorismo. Arque hoc loco alterum pro altero

A nomen accipit, repletionem scilicet pro refectione. Pertinere hæc omnia ad medicum, atque munus illius esse, vt quosdam reficere, ita etiam quosdam extenuare, & quousque vtrunque duci oporteat, agnoscere, docuit Hipp. illo loco: quibus modis fieri possit & debeat, nunc docet, atque primum quidem extenuatio, de qua prima hæc est sententiola. Si nihil diceret aliud quam detractioem fieri cursibus, luctis, multis & celeribus deambulationibus, ouillis carnibus, & cocta maza, atque exiguo pane, facilis esset doctrina, contrineretque duo auxiliorum genera, exercitationem corporis nimiam, & cibos fluxiles, atque infirmos. Nam ouilla, quia lata & humida est, facilius effluit, quam arctina & suilla, atque alimentum quod ex ea accedit, minus haberet firmiter. Eodem modo habet maza cocta ad panem, soliditatem enim comparat hic in furno, & quia esui fit aptior, plus illius comeditur ab hominibus alioqui sanis, quales sunt quos studemus extenuare quam maza. Quapropter, & tertio de dicta victum æstiualem descriptibus, inter cetera dicit, maza potius vtatur quam pane. Verum quia particula illa, quiete, interiecta est, difficilis prorsus reddita est sententia, ac quodammodo etiam inepta. Quomodo enim potest inter luctas, inter celeres deambulationes, apte fieri quietis mentio? Dicunt quidam enarratores, id dictum esse quia non omnes extenuantur exercitatione, & pinguescunt quiete, sed nonnulli etiam contra, extenuantur otio & exercitatione crassescunt. Atqui profecto hoc verissimè dicitur, nam vt ipsemet Hipp. dicit motus roborat, & otium cabefacit. Et sursum quarto de morbis inquit. Et propterea in quiete degeneri euenit vt attenuetur: at verò laborantibus hominibus, itidem corpus coalescit. Itaque haud dubiè iuxta sententiam Hip. quidam extenuantur laboribus, quidam otio, Sed vt Galen. in commentatione huius loci rectè monet, res hæc distinctione indiget, non enim idem & eodem modo habentes, à contrariis patientur omnino idem, per se. Sed aliqua prorsus distinctione res indigeat, necesse est. Ea verò non aliunde nasci potest, vt Hipp. ipse primo libro de dicta discretissime docet, quam ex cognitione naturæ hominis, facultatis, ciborum, & laborum.

C Oporteret autem (inquit) velut par est, dignoscere facultatem laborum, nam eorum qui secundum naturam, tum eorum qui per vim contingunt, & quinam ad defectum præparent: nec ista solum, sed etiam laborum proportionem, quæ adhibetur secundum ciborum repletionem, & hominis naturam, & corporum ætates & anni tempora. Optimè consulit Hipp. considerare laborem & ciborum vim, non simpliciter, sed ad se mutuo, vt ad cuiusque naturam. Quia vt paulò ante ibidem dixerat, labores ea quæ in sunt consumere solent, cibi autem & potus, ea quæ vacuata sunt, explent. Si igitur, labores ad cibos, & ambo hæc ad facultatem seu naturam, proportionem legauerint, optimè reficiantur corpora, quia facultas adiuta motu cibos conficit, illi bene confecti multum nutriunt, & replent. Si autem labores sint maiores, iis quibus ad hos cibos facultas indigeat, aut cibi plures, quam vt cum hoc mo-

F

tu ab hac facultate possint confici, ob illud quidē dissipantur corpora, ob hoc obruuntur crudis; & exstinguitur naturalis calor, & ob vtrumque homo consumitur. Igitur motus, ad huc eum quib' confecti debet, nimius, semper dissipat, siccitat, & absumit, minor autem quam pro indigentia, causa est infœlicis nutritionis, ac proinde pinguedinis frigida, aut etiam (si noxia maior sit) tabescentia. Sed quia non omnes eiusdē nature sūt, sed alij frigidiores, qui motu multo indigent, ut cibos conficiant: alij calidiores, quia motu facile dissoluntur, sit ut his nimius sit, qui illis est utilis motus, & ut hos inuit otium, dissipationē prohibendo, quod omnem tabefacit per incoctiones. Igitur, ut in vniuersum dicam, calidi, & qui paucio cibo vtuntur, rescientur otio, & ij ipsi exercitatione tabescent: frigidi, & qui vtēt multo cibo, inarescunt otio (nisi preueniant morbo aliquo perimi) exercitationibus rescientur. Sunt igitur qui exetitationibus & qui otio extenuantur. Quod carcerum custodes testantur, eorum enim qui diu detenti dimittuntur, quidā multo crassiores quam erant quum fuerant inclusi: quidam dimittuntur gracilissimi. Eset igitur hæc non parū idonea loci enarratio, si particulam illam. (Quiete) genuinam esse & loco propriam, suspicamur. Verū quia si id vellet Hipp. dicere, aliter mihi videtur dicturus, neq; inter multa verba nimum motum significantia, vnicam illā voculam, citra vllum ordinē, interiecturus; suspicor illam errore librariorū addidit esse, aut ex vocis alterius corruptione venire (fuerit esset autem inane velle diuinare ex qua) neq; esse Hippoc. sed ipsum nunc scribere causas, quæ per se faciunt detractiones, non etiā eas quæ per accidens. Nam motus nimius & inedia, aut cibus tenuis pro crasso, fluxilis pro solido, per se faciunt extenuationem, quia detrahunt: otium per accidens, quia suffocat, obruit, & plusquam oporteat, aut quam ferri possit, adiicit. Alioquin & cibos multos ponere deberet in causis extenuationis. Nam & hi, pēinde ac otium, extenuant obruendo. Non itaque atbitror id vlnoir Hipp. sed scribere causas, quæ sunt per se detrahentes. Nam præterquam quod doctrinæ procedunt rectius per ea quæ sunt per se quam quæ per accidens: ad medicos vsus erit etiā hoc vtilius. Nam cum opus est aliquem extenuare exercitatione, & cibi detractione sit longē tutius, quam otio, & multo cibo. Nam hæc duo, non aliter possunt id facere, quam onerando, & morbos periculosissimos inferendo. Potest itaque corpus extenuari otio, & cibis, sed nunquam debet ad praxim reuocari. Hipp. verò non consuevit dicere, quæ possint solum, sed quæ debeant etiam fieri. Nam cum dixit otium tabefacit, id ut virandum, non vt vniquam consulendum alicui dixit. Itaq; illa particula, quiete haud dubiè redundat, estque hinc expungenda. Sed dices colligi potest ex eā quam atulimus ratiocinatione, non omnes extenuari exercitatione, sed quosdam etiam fieri. Cur ergo Hip. causam ambigam, quasi semper extenuantem posuerit? Certè colligitur eos solum refici exercitatione, quibus ea non sit nimia, omnes tamen extenuari quibus sit nimia. Constat uerò his nominibus, cursibus, luctis, deambulationibus multis, & celeribus significari motus nimios, non sunt autē omnibus iisdem motus nimij,

A neque id docet Hippocrates, sed consulere vnicuique eorum quos extenuare velis motus nimios alius quidem maiores, alijs minores, vt euiusque naturæ etant nimij. Velut sibilosum hominem velis extenuare, motibus vt medicis confusiles, si autem pueritiosum, motus vehementissimos subire iubebis. Itaque bene feceris si particulis illis omnibus hanc (multis) adiunxeris, vt multis cursibus, luctis, & deambulationibus, atque intellexeris, multis pro cuiusque naturā. Nam multum & paucum ad aliquid dicuntur. Itaque optima ratio extenuandi est, exereci plus, & accipere cibum pauciorē, aut fluxiliorē quam si molem corporis seruare velis. Propterea Hippocr. iubet vt cursibus, luctis, & celeribus deambulationibus, & ouinis catnibus, ac pro pane maza cocta, aut omnino exiguo pane. Potes autem tu cum his & motibus & cibis, alios omnes & motus & cibos intelligere, qui ad dictum vsum aut æquē aut etiam meliūs his accommodantur. Nam etsi ouillam Hippocrates vt laxam quandam & fluxilem carnē pro exemplo scripserit ego nisi consueto ea vtī, aut etiam deterioribus carnibus, non darem, ne interim cacochymiam aliquam inferrem, sed si homo facile ferret inediam, darem pulchrius exiguum: si non posset ferre, carnes assas minus nutrientes, sed non mali succi, velut interanea arietis aut hædi cum multis oleis cocta, & ob hanc ipsam causam augerem motus magis. Sed de extenuatione crassiorum Gale. lib. vltimo methodi agit, & ego in hoc ipso opere antea egi.

D *De tractionis signum eandem horam diei obseruare oportet; repente enim contrahitur.*

Quandoquidem non iidem motus sunt omnibus detractorij, neque eadem victus ratio, & ea consuetudo quæ ex cuiusque natura capitur & consuetudo non est facilis, cum perpauci homines sint nobis ad eā familiariter cogniti, opus est signo aliquo cognoscamus, an victu eo quem perscripsimus, extenuetur homo, an non. Hoc signum scribir modo dicens, eandem horam diei obseruare oportet, repente enim contrahitur, hoc est, continere hominem sine cibo vsque ad eam horam qua consuevit capere, & obseruare eam horam; ut enim quibus victus quo vtuntur est detractorius, euenit vt eam horam quā cibum solent capere, non possint sine cibo transigere, ac si quis eos transigere cogat, repente contrahatur eorum corpus, vultus gracilescat, & virtus deficiat, angantur, aut refrigerentur. Si igitur hæc videas homini accidere, scias victum quo vtitur detractorium esse, vnde colliges regulam non solum ad eos quos extenuare vis, sed cautionem etiam vtilem, ad eos quos vis conseruare. Si enim hoc est signum victus detractorij, & vides id accidere alicui, cui detractionem fieri nolles; certò scies eum aut plus laborare, aut minus accipere cibi quam oporteat. Quapropter iubebis aut laboret minus,

aur comedat. Quod si plus cibi non ferat ventriculus, vt euenit multis conualescentibus, dabis crebrius. Vbi ego legi, contrahitur, dicit Hippocrates ipsum, quod multi interpretantur cultodie, alij trahitur, ego sequutus sum hac in parte interpretationem Galen. à quo enim potius vocis græcæ significatio peteretur?

Remitte labores, aut desinet, similiter enim totum concidet.

Scripterat detractionis signum. Idem autem erit detractionis nimis, aut repentinæ, quæque proinde sine periculo sustineri non possit, & moderatioris, vt scilicet illud signum plus aut minus inierit. Quoniam verò, neque vacuationes, neque repletiones, neque extenuationes, neque refectioes ad extremum sunt ducendæ, vt in aphorismo dicitur, neque illæ ipsæ faciendæ sunt, repenti sed paulatim fieri debent, quia repentinæ omnes mutationes sunt periculosæ: duplex peccatum accidere potest, quod aut celerius quam par sit quis extenuet, aut vterius quam par sit extenuationem producat. Vtrumque autem periculosum, quia euenit ob nimium imperum effluere, ac simul totum concidere, facultatem scilicet & corpus, atque adeò languescere corpus, & tabescere. Proinde quasi valde timere hæc oporteat, dicit, remitte labores, aut effluet. Quasi diceret, si ex dicto signo, aut etiam aliis quæ accesserint, videatur tibi celeridè agi, aut plurimum iam produci detraçtio, cura vt lentius agatur, aut cesset, remitte ergo labores. Nam vt in aphorismo dicitur, Vbi fames laborandum non est proinde opus erit cibos augere. Si autem augere nolis, nulla alia est ratio, quam remittere labores.

Cum autem iam conciderint, offerre suillam assam conuenit. Cum autem repleantur illud denotat quod corpus floridum rursum efficitur.

Vthætenus docuit qua ratione quis extenuet plus satis crassum, ita docet nunc quo pacto gracilem crassescere faciat, siue sit dicto prius victu extenuatus nimis, quod eo nimis sit visus, siue alia quacunque causa refectioe indigens. Atqui vt ad extenuandum iusserat ouillam dare, ita ad reficiendum præbet suillam assam, vt cibum scilicet crassum, & valde nutrientem, & boni succi: præbet assam, vt hac ratione solidior sit, & vt opinior, etiam gravior. Non enim parum hoc refert, vt reficiat, & sane his omnibus nominibus nullus est cibus ad reficiendū adeò accommodatus. Videre tamē debes vt in ventriculo coqui possit, non enim est tam coctus facilis cibus quā bonus, ac proinde extenuatorum & debiliū refectioem à gallinariū aut caponum carnibus ceteris incipies. Quæ respiciens Galenus. 7. methodi. cap. 6. ita scripsit. Porro omnium quos nouimus ciborum maximè nutritiens suilla caro est. Verūm non æquè ac prædicta concoctu facilis est. Præte-

Areā glutinosum succum crassumque generat. Alioqui neque alio esse habitu potest, quod in summo sit nutritius, Quippe adhærere debet, & firmiter affigi, non autem præ tenuitate diffuere. Non tamen ad propositum affectum vt hac conuenit: Si enim nutrimentum ipsum seipsum concoqueret, ac in partes digereret, procul dubio maximè nutriente cibo esset opus. Verum quoniam non aliud est quod nutrimentum desiderat, aliud quod ipsum conficit, sed quod nutriendum est ipsum sibi & nutrimentum attrahit & mutat, & concoquit, & adiungit, & assimilât, ad duo nimirum nobis in opportuno cibo eligendo spectandum esse dicitur, vnum ipsius cibi naturam, alterum vires suas proprias insitæque. Itaque ex his illud patet, neque planè quod maximè nutritiuum optimum esse his corporibus quæ refici magis egent, vt pote quibus concoquendi facilitas non est, neque etiam quod facillimum concoctu est, cum scilicet ipsū nequeat maximè esse nutritius.

B Cum igitur hæc indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est, vt dum alteri nimum sis intentus, alterius omnino obliuiscaris, sed vtrumque memor quoad licet vtrumque miscæas. Hæc Galen. quæ ego maximè probō. Quapropter Hippocrates meminit suillæ vt per sese optimi cibi ad refectioem, non tamen vt quo vtiendum omnibus sit qui refectioe indigent. Quapropter cum dicit Hippocrates, cum autem iam conciderint offerre suillam assam conuenit, intelligendum videtur, cum conciderint carnes, & extenuatum corpus fuerit, non autem vires. Nam si hæc etiam conciderint, restitui incipietur ab ouis, & gallinaceis pullis, quatinus ex his quoque procedatur restitit vtque ad suillam. Quapropter si placet magis, vbi dicit, cum autem conciderint, intelligere & carnes & vires (videtur enim hic referre omnia quæ prius intelligerat cum diceret, similiter enim totum conciderit) intellige quasi ita diceretur, cum autem iam conciderint hæc, offerre oportet suillam assam, adhibita distinctione aut mox suillam dare debeas, an post aliquos cibos.

C Quæ distinctio ex facultate ei⁹ qui reficitur, debet accipi. Sed dubitabis, cur cum extenuationem facere iusserit motu vehementi, & cibis leuibus, refectioem facit solum cibis crassis, ac non potius duobus etiam prioribus contrariis, otio, & cibis? Certè quis non vt motus nimis extenuat omnes, ita otium merum omnes facit crassescere, sed vt nuper diximus, plurimos etiam facit marcescere, ex accidenti: porro quia eos ipsos crassiores reddit, non bene & vt expedit crassos facit sed pingues, & excrementolos. Quapropter nullis merum otium consiliū oportet sed omnibus exercitationem, maiorem quidem aut minorem, vt cuiusque est natura & affectio: Atqui hoc siue extenuare, siue seruare, siue reficere velis hominem. Nam extenuantur omnes motu nimio citius quam quiete: seruantur & reficiuntur motu moderato, qui ad conficiendos cibos sit satis: & est quidem aliis maior, aliis minor, & inmoderatus, & immoderatus. Agi ergo debet extenuatio motu nimio, & exiguo cibo, refectio motu moderato, & cibo pluri: conseruatio vtriusque moderatis. His dictis scribit signum procedentis iam refectiois, quod planè contrarium est signo

D extenu-

E

F

extenuationis. Iis enim qui extenuantur, contrahitur corpus, & concidit ac deflorescit: iis qui iam replentur, contrā floridum fit, hoc est mediocriter tumens & nirescens, ac viuendum colorem habens. Hoc enim multum & bonum iam sanguinem generari significat.

Exercitationum modum significat sudor fluens guttatim, qui exit ex vena ex canaliculis, aut coincidentia ex eleuatione.

Hæc verba videntur hoc errore reiecta, cum forent scribenda post illa, detractionis signum, eandem dici horam observare oportet, repente enim contrahitur. Illa enim verba continebant signum detractionis ex hora cibi accipiendi: hæc continent signum aliud ex exercitationibus. Cum enim iussisset Hippocrates detractionem facere exercitatione, & cibo, congruus erat mox signa detractionis apponere, ex cibo & ex exercitatione. Scribit itaque signum quo agnoscas exercitationem detractionem: illud autem est, sudor ekienis guttatim ut ex canaliculis, aut coincidentia ex eleuatione. Nimirum motus tantum dici tur is quo corpus neque sudare incipit, neque lassari, neque intumescit: exercitatio autem salutaris, & conservans, quæ ducit usque ad lassitudinem mediocrem, & sudorem, equalem, vaporosum, & ad ruiorem & ruborem quandam partium, & tunc dimittitur: labor vero potius quam exercitatio, & defatigatio, seu exercitatio detractionis, est, quæ producitur, donec sudetur inæqualiter, grandioribus quibusdam guttulis, velut ex canaliculis erumpentibus, & quasi colliquecentibus iam carnibus, & donec cum ruiorem quem exercitatione comparauerant carnes, labore confectæ deponant. Quod quidem vocat nunc coincidentiam ex eleuatione coincidentiam scilicet carnium, ex eleuatione, seu intumescencia, quam comparauerant. Est igitur signum detractionis in exercitationibus, ita sudare, aut concidere vultum eius qui exercetur, cum incipiente exercitatione intumuerit. Qui vero edulque se exercet, defatigatur. Quare nisi cum animus est corpora extenuare, sciendum, ut prius ab exercitatione quiescat, iuxta illud. Vbi lassari cepit corpus, quiescere statim remedium est. Qui autem extenuari velit, ne quiescat, donec doceat extenuationis signa appareant.

Mulier quam primò Cranone curavi, quæque liem naturâ in gnu. m habebat, febris ardens corripuit, prius erat, & spirandi difficultate laborabat, decimâ die sudor plurimus à partibus superioribus dimanavit, sed etiam ex inferioribus decimâ quartâ.

Adeo brevis, imò, ut dicam melius, mutilata est hæc narratio (sueid fecerit Hippocrates, sibi soli scribens, siue quæ desiderantur detraxerit veru-

Astas) ut neque morbi narrationem possis intelligere, neque ubi intellexeris aliquid vilitatis capere, ut Galeno etiam visum est. Proinde prætereo.

Is qui capitis grauedine aut raucedine laborant, si febre corripiantur, minus recidunt, ut opinor, accidunt.

Quam bene & perfecte soluantur morbi, non accidunt recidunt, sunt enim ex iis quæ relinquantur in morbis. Dicit igitur Hippocrates eos qui laborant capitis grauedine aut raucedine, melius ac perfectius liberari, superueniente febre quam aliter. Quod quidem eisdem ratione fit, quæ qui convulsionem tenentur, febre liberantur: coquit enim succos trudos, & sic carum humectatas partes. Absorbet certe semper succos omnis febris, & suam causam conficit, verum ad nullos affectus adeo utilis est, ut ad eos qui ex succis crudis pendunt. Hi enim ut qui crudi sunt, possunt calore emendari, reliqui, utpote iam cocti, nil aliud possunt quam putrescere. Quare maiori cum periculo lentatur eorum consumptio per febrilem calorem. Grauedo & raucedo, ex piruita plerumque est, ea præcipue quæ est ex capite. Nam & ipsum caput naturâ piruitosum cum sit, talibus morbis est opportunum. Raucedo aliquando fit ob caput, aliquando ob totum corpus; grauedo capitis semper est passio, sed non semper in eo est primaria, sed fit nonnunquam recipiente capite aliunde. Quæ ob primariam passionem capitis sunt grauedines, & raucedines, duabus causis curantur febre, melius quam reliquæ, & quia pleniores magna ex parte sunt, & quia totius corporis redundantia; & cacochymia magis cedunt missioni sanguinis aut expurgationi. Ob hæc dicit, iis, qui ex capite laborant grauedine aut raucedine, minus sunt recidunt: si febre correpti sint.

Quicquid suppurat recidivam non patitur. Ipsa enim concoctio & indicatio nis simul & abscessus rationem habet.

E A' ruiopages, id est, sine recidiva dici intellige, non quod recidivam omnino non possit habere, sed quod rari habeat. Fieri enim potest ut in eandem partem tumor præter naturam redeat, in qua per suppurationem fuerat antea curatus: videmus, quod factum non semel, quod pars debilis maneat, atque ob id redundantes in corpore humores recipiat. Quamquam id petrad, neque hinc cum per intempestivum scarificorum usum pars nondum sanis expurgata, curata est, alioqui non fit nisi mors post, collecta scilicet nova in corpore multitudine, aut cacochymia, ut constet iam non eiusdem morbi esse recidivam, sed alium morbum. Itaque potes affermare, omne suppurans quod recidit curatur, esse omnino sine recidiva. Erit itaque ferè vniuersalis assertio. Illud saltem verum esse colligitur, ex iis quæ Hippocrates hoc loco &

aliis dicit, & quæ experimento comperiuntur, suppurationem sine recidua magis esse quam resolutionem, hoc est rariùs multò recidere breui tumores per suppurationem solutos, quàm per resolutionem. Reddit Hippocrat. causam, dicens, ipsa enim concoctio, & indicationis simul & abscessus rationem habet. Suppuratio re vera, ut alibi indicamus, concoctio quædam est, dicit verò, ipsa concoctio, quasi non hæc sola, sed aliæ etiam sint morbi concoctiones. Nimirum Hippocr. solutiones morborum solet concoctiones vocare, ut quum dicit, ut virtus possit durare, donec morbus concoquatur. Cum igitur eo nomine sic vtrius Hipp. intelligere potes, hæc concoctio, id est, hæc solutio. Est igitur, dicit, hæc solutio, crisi simul & abscessus, id est abscessus & euacuatio. Nimirum per suppurationem non per sanat homo, antequam humor in sinum quendam abscesserit, & sinu rupto euacuatum pus sit, atque vlcere multis diebus manente, pars mittens, & primaria morbi illius sedes sit perpurata. Fit ergo non tantum abscessus humorum in partem quampiam, sed etiam per eam partem totius corporis, aut partis primariæ affectæ purgatio. In resolutione non ita fit, sed eo succo qui in tumorem eleuat diffusio, pars subsidet, & interim apparatus, si quis adhuc erat, interius remanet. Quapropter suppurationem minùs reuersiuam esse quàm resolutionem verum est, siue de reuersione ipsius tumoris intelligas, siue alterius prioris morbi, qui cum pepererit abscessum. Velut si ex febre aliqua laboriosa tumor præter naturam homini eruperit, liberior erit à reditu febris & tumoris, si suppuratione curetur, quàm si resolutione. Si enim rupta suppurationis vomica, est parti primariæ affectæ pro emanatorio, seu, ut dicunt, vulgò pro fonte, liberabit non tantum à secundario, sed etiam à primario affectu. Huc accedit quod suppuratio non potest esse curatio falax, ut resolutio. Sæpe enim tumor subsidet, quasi resolutus, succus tamen verè resolutus non est, sed retrocessit: quo casu constat paratam esse recidivam, vtpote manente infestis causa. Hæc saltem deceptio non potest contingere per suppurationem: in pus enim mutatus iam succus, & in sinu collectus haudquaquam poterit retrocedere, sed necessariò euacuabitur sensibiliter, oisî oimò sit perpaucus, ut resolui possit. Simile quiddam cernitur in fluxionibus, seu partium quarundam caco-chymis, ut granedine, aut raucedine: atque adeò in febribus, oimò quæ in morbis quibuscunque penduntibus ex succis. Illi enim omnes habent solutiones quasdam dictis analogas, atque ita hæc sententia ad omnes morbos pendentes ex materia rectè transferretur. Nam & coryza aliquando videtur euanescere insensibiliter curata, aliquando non sine copiosa crassorum, & puti quadam ex parte similium emanatione: febrem quoque videmus sæpe citra concoctionem materiæ, & euacuationem desistere, quasi insensibiliter resoluta, plerumque autem cum euacuationibus, quas concoctio antecessit. In his omnibus plurimum potest ad securitatem, & ne recidua fiat, per suppurationem liberari. Dico autem inflammationem per propriè vocatam suppurationem: coryzam per emanationem crassorum & raucedinem, per excretionem: nephritidem, per mictionem ex-

crementorum: & alia huiusmodi. Febrem vero per hanc aut illam euacuationem, postquam apparuerint sedimenta, quorum generatio ex morbi materia, velut suppuratio quædam est. Igitur omnes hæc morborum solutiones, quæ curationi phlegmones per suppurationem sunt analogæ, securæ magis sunt à recidivis, quàm reliquæ euanescentiæ: quia per illas maturationes simul & euacuationes copiosæ sunt, & corpora perpartantur, abique simul cum ipsis morbis etiam apparatus morbosus: per has non ita, sed aut coniuncta solam vocata causa consumitur, manente ea quæ vocatur, antecessens, atque ea quidem tota, sed partius latent in partem quampiam abscedit, vnde rursum mora, morbum reducit. Sed dices, videri Galenum atque cum eo alios omnes medicos & chiturgos, his repugnare, quandoquidem præferunt resolutionem suppurationi, tanquam potiore solutionis modum: neque profectò sine ratione, quia resolutio est morbi sublatio, suppuratio verò est commutatio cum alio morbo. Quantum igitur præstantior est solutio morbi permutatione, tantò resolutio suppuratione: est autem quæcunque solutionis species tantò securior à recidivis, quamò præstantior, est igitur & resolutio securior quam suppuratio, alioqui quis non eligat sibi quietiorem curationem? Ut hæc contro-versiola decidatur, scire oportet, resolutionem & suppurationem, eiusdem morbi curationes esse, verum suppurationem resolutione esse auxilium maius & posterius. Nam exigua inflammationes, & extenui succo pendentes, resolutione curantur: maiores vero, & ex crasso, non possunt nisi suppuratione: Maius igitur remedium est suppuratio, quam resolutio: quæ propter accider eis quod aliis omnibus auxiliis, ut minora quidem & pauciora meliora sint, quàm maiora & plura, si sufficiunt. Nunquam enim Hippocrates ad auxilia maiora venire volebat, nisi cum minora non essent satis. Rectè igitur vel hac sola causa dicitur meliorem esse resolutionem suppuratione, quia minus est auxilium, & ob id cum minori molestia & lesione peragitur. Verum quia non omnibus inflammationibus sufficit, si quando, in his quæ ob magnitudinem aut succi crassidinem, videbantur suppuratione indigere, resolutio facta videatur, parum est secuta solutio, minor enim quàm pro morbi magnitudine aut contumacia, quare ei solutioni merito non fiditur, vtpote quæ præter rationem contigerit. Hoc idem habent omnia alia auxiliorum genera quæ quum minora sunt meliora: quæ quum maiora, magis sine recidiva sunt. Non enim corari debet ferro nisi quod non cedit medicamento, neque igne, nisi quod non ferro: tamen quæ curata ipse sunt, minùs reuerti quàm quæ ferro, & hæc quæ quæ medicamento, omnes chirurgi fatentur. Itaque resolutio melior est suppuratione, suppuratio vero minùs reuersua. Quod si Galen. (ut præpositò argumento respondeamus) ponit in bonæ indicationis ratione securitatem, censens eam securiorem quàm meliorem: ego quoque idem concesserim, non quidem simpliciter, seu in genere meliorem, sed quæ sit huic melior. Non enim si quis dicat vniuersum meliorem euacuationem esse fluxum sanguinis ex naribus quam ventris profluuium: teneat statim concedere

in quocunque id etiam verum esse. Ita quidem resolutio in genere melior est supputatione, non rationem etiam in quocunque, nam in eo qui supputatione indiget, non est resolutio melior, sed deterior, eademque minus secuta; itaque est in genere melior & minus secuta: ad singulos verò, cui melior eadem & secutior. Simile quiddam ei quod de inflammationibus dictum est, euenit etiam aliorum morborum, qui pendunt ex causa, solutionibus. Sepe enim febris putrida ex adco pauca pendet materia, vt sine manifesta euacuatione, neque materia cocta, sed dissipata, & propriam constitutionem non expectans soluitur insensibiliter. Quæ solutio optima quidem est, & facilissima, verum raro secuta, quia per pauca sunt febres ex tam pauca pendentes materia: ita etiam pleuritis veta sine vlla excretionem cessat aliquando, quod sit tam exigua vt solis cedat fomentis, petratò autem erit secuta ea euacuatio: in cotyza & raucedine, & omni alio morbo euenit perinde. Quatenon in vno aut alio, sed in omni iam morbo verum est quod Hipp. dicit, quicquid suppurat reciduum non pati.

Quibusdam quum venere vtuntur inflatur venter, vt Damagora accidit: quibusdam autem tunc fit crepitus, vt Arcefilas.

Paulò infra in hac eadem sectione occurret oratio alia, quæ hoc idem continet, & aptius explicat, quod Damagora & Arcefilas accidebat. Quare illam oportet huc transferre, vt hæc intelligatur. Illa ita habet. In mulierum congressibus quidam crepitum emittunt vt Arcefilas: i quidam quum sunt congressuri, horrent & corrugantur: quibusdam autem postquam congressi fuerint, venter inflatur vt Damagora. In ea ratione constat apud istos significari idem quod hic per *ἀρρεσιν*, ipsos scilicet coitus, seu congressus cum feminis. Constat quoque, conuenitque inter omnes interpretes, illud nomen *ἀρρεσιν*, quo hic vtitur, & verbum, *ἀρρεσιν*, quo illic, significare emittere flatum ex ventre cum crepitu. Damagora igitur contigit, cum coisset inflari ventrem: Arcefilas autem inter coeundum emittebat flatum cum crepitu, atque vt significaret hoc dixit Hipp. quibusdam in his (hoc est in ipsis Veneris) strepitus fit. Itaqz dicit venterbus Venere flatum augetur, idque non omnibus eodem tempore, neque eodem modo, sed quibusdam cum vti sunt, quibusdam cum vtuntur, aliis cum iam iam inflantur ad Venerem: rursum horum quosdam ob flatum intumescere semen ventrem, alios ob flatum toto corpore delatum rigere, alios emittere flatum cum crepitu. Neque sanè dicit Hipp. hæc accideat omnibus venterbus Venere, sed quibusdam: neque solum hoc ita accipiendum, quod est omnes ob Venerem lædantur modo aliquo horum, quibusdam tamen hoc, quibusdam illud, quibusdam aliud accidat, sed quod non omnes aliquam hanc lesionem contingant, sed plurimi nihil patiantur horum, alij autem quidam lædantur modo aliquo horum. Quidam (vt Gal. narrat) veterum interpretum, censabant hæc dici non de omnibus qui Venere vtuntur, sed de ijs qui primum incipiunt hircire, & Venere vti. Videatur

A huic interpretationi fane verba quædam, quæ paulò infra ante nunc citata scripta occurrunt. Ita enim legitur eo loco, cum Venere vti incipiunt, sanguinis proflauio laborant, in mulierum congressibus quidam crepitum emittunt vt Arcefilas. Cæterum experimento constat, neque omnes qui primum incipiunt vt Venere ledi aliquo modo horum, sed quosdam fortasse. Cum igitur non omnium qui Venere vtuntur, sine primò sine iam sæpius, sint dictæ lesiones, quorundam erunt eorum qui parati sunt ita ledi: velut ab alia quavis potestate: cæca causa læduntur, qui parati sunt ab ea ita ledi,

B vt à sole & labore febricitant non omnes, sed qui parati sunt febricitare. Igitur oportet definiamus, qui sunt parati ita ledi à Venere. Illi certè sunt qui flatuosi, cuiusmodi maximè sunt hypochondriaci, qui ob hoc ipsum dicuntur à medicis laborare morbo flatuoso. Hi vt Galenus & Aristoteles perhibent libidinosi sunt, vtu tamen Veneris lædantur & sunt flatuosiores. Vt sint libidinosi facit status, nam distendit pudendorum meatus, & semen facit magis prurient. Eandem ob causam interdicitur ijs qui priapismo laborant aut gonorrhæa vsus leguminum, & rerum flatuosarum: vt verò lædantur à Venere facit inopia naturalis caloris, quæ laborant. Refrigerantur enim, plus etiam quàm alij, quia simul cum flatu vitalis spiritus effluit illis abundantius: sunt ergo mentò flatuosiores. Consentaneum est ergo censere eos esse huiusmodi, quibus accidunt ea quæ bis otariis continentur, ac præter melancholicos hypochondriacos, alios etiam omnes, qui vtunque sunt flatuosi. Non enim omnes flatu abundantes, sunt hypochondriaci: et si hypochondriaci omnes flatu abundent. Hic autem dubitari potest; an hoc quod dicitur ita se habeat, an scilicet hypochondriaci lædantur vsu Veneris: videatur enim iuuari potius, quod si iuuantur non fient flatuosiores, sed potius subleuantur à morbo, & minus flatu cruciantur. Iuuari verò multos melancholicos Venere constat, siquidem vt dicit Gal. de loc. affect. retentione seminis sunt multi melancholici qui seminis excretionem necessariò iuuantur. Exemplò est quidam cuius eo loco Galen. meminit dicens, quidam vxoris mortem lugens, & à concubitu, quoad ea fuerat vsus, abstinens, cibi cupiditatem amisit, ac ne exiguum quidem cibum concoquere potuit. Vbi verò se ipsum cibum plus cibi ingerere, protinus ad vomitum excitabatur: morsus etiam apparebat, non solum has ob causas sed etiam (vt melancholici soleo) citra manifestam occasionem. Verum hic ad pristinum consuetudinem rediens, quàm celeritè liberatus est. Igitur haud dubiè multis melancholicis, siue sint hypochondriaci, siue secus, Veneris vsus est salutaris, quibus scilicet ex corruptione seminis morbus ortus est. Alia etiam ratione dicit Galenus hypochondriacos videri subleuari vsu Veneris, quod scilicet excernantur flatu cum semine, & ipso congressus calore discutiantur, detrudanturque ex hypochondrijs: subleuantur ergo hanc ob causam, vt & rictibus subleuari atrox in hoc ipso sermone diximus: videtur etiam accedere alia causa ex voluptate Veneris, cum enim melancholicis motu & morbidità maximè assigantur, contigit vt voluptate reddantur alacriores, atque adeo melius

sefe habcant. Totigitur cause sunt quibus quis si-
bi perſuadeat, melancholicis Venerem eſſe cauſam
ſalubrem, alioqui enim videtur eſſe aduerſiſſima,
quia eſt refrigerans & ſiccans, & exhaurit ſpiritus:
illi vero ſunt frigidi & ſeci, ichoſi & ſtatuofi, &
bonorum ſpirituum inopes. Certe ij qui ob reten-
tionem corrupti ſeminis facti ſunt melancholici,
ſive hypochondiaci, ſue non, necdum admodum
ſunt iam facti debiles in eſſentia, baud dubie iu-
bantur vſu Veneris. Nam morboſ ex repletionem
ſancti euacuatione, cum excernantur qualia oportet,
hoſt'eſt propria cuiuſque morbi materia & cauſa.
alijs vero omnibus melancholicis noxia eſt Venus;
niſi forte admodum moderata & rara, nondum de-
bilibus: hiſ enim non quod proprie materie ſit-
uacuatione vt prioribus, ſed ob poſteriores cauſas,
ob ſtatuſ, inquam, aliquam diſcuſſionem, & ob
aſcitiſtatem poterit leuamen quoddam afferre, ſed
neque id magnum vt prioribus, neque certe data-
nerit, ſiquiſ leuiſſimo ſolatio allectus perſiſt Venerem
vti, recideret enim in longè maiorem noxam, ob re-
frigerationem, ſiccationem, & ſpirituum ex hau-
ſtum, quod ſiqui bonum ſunt iam in eſſentia debi-
les, quales ſunt eorum multi, non tantum à multa
& longa ſed à quatuſlacunque Venerem lædentur,
neque vero ſolum poſtea ſed mox ab ipſo congreſ-
ſu ſentient ſeſe læſos eſſe, & doctetis habere. No-
te autem vitilitatis à Venerem orre ſunt, faciliſor ſpi-
ratio, aſcitiſtatem animi & corporis, promptiorque
ad omnia ſenſus: noxæ autem contrariæ. Porro
quod hac oratione ab Hippocrat. dicitur, vtriſque
euenire poteſt, & iſ inquam quibus Venus vitilis
eſt, & quibus damnola. Nam hiſ accidet tumor ſta-
tuofus venteris, aut excretio cum crepitu, auctò
ſtatu ob naturalis caloris extenuationem (& hi qui-
dem periclitantur fieri ex multa Venerem tympani-
tici: præcipue quibus ſtatuſ retinetur, & inſtat
ventrem) illis vero accidet excreto ſtatu, aut ex
hypochondrijs deorſum triſto. Nimirum calore &
motu euenit ſtatu qui in inteſtiniſ erat extenuari,
& extrudi, aut qui in hypochondrijs ad hypoga-
ſtrium detrudi. Sunt igitur hæc ſymptomata Vene-
ri ſuccedentia, nota ſtatuofe nature, aut diſpoſi-
tionis: per ſe vetò neque bona neque mala, ſed
neutra: in genere eorum, quæ aliquando cum ma-
lo, aliquando cum bono hominiſ ſunt: quia ali-
quando ſunt materia aucta, aliquando vacuata,
aut reiecta ab hypochondrijs. Bona autem an mala
ſuerint, agnoſces eiſdem ſignis quibus agnoſci di-
ximus, leſus ne ſit homo qui viſus eſt Venerem, an ad-
iutus Conſtat ex dictis deterioreſ diſpoſitionem
ſignificari tumore ventris à coitu, quàm excretionem
ſtatuſ in ipſo coitu. Quia craſſioris ſtatuſ & debilio-
ris expulſtricis ſignum eſt, abſcedere quam excer-
ni: hoc vero expulſtricis fortioris, & ſtatuſ tenuio-
ris. Atque ita crepituſ, vt leuior paſſio in ipſo con-
greſſu ſit, tumefcentia autem ventris, vt pote paſ-
ſio maior, non ſit, donec calor ipſius congreſſus
conque uerit.

Flatuſ ſimul cauſa eſt in iſ qui ſcapulas a-
larum inſtat prominentes habent, etenim
ſunt ſtatuofi.

A In aliquibus codicibus legitur non *inſtat*,
id eſt alatiſ, ſed *inſtat*, id eſt furtoſiſ. & eue-
nit hæc lectionum differentia à Galen. quin & à
Dioſcoridiſ ſzenulo, vt conſtat ex Galen. verbiſ.
Mihi vetò placuit ſequi hanc lectionem, quia ſen-
ſus quem reddid conſtituati poteſt experimento.
Nimirum furtoſiſtatuſiſ eſſe, neque experi-
mento neque ratione conſtat: ſtatuſiſ vero, eorſi-
quam qui ſunt anguſto peſtore, & eminentibus
humeris, & ob id parati ad hæmorrhoidicas paſſio-
nes, & ad phthylim, ſtatuofos eſſe Galen. teſta-
tur, eſſe ſibi experimento cognitum, & conſonum
rationi. Nimirum anguſtia thoracis, vt ſu arte me-
dicinali dicitur, cordis ſignificat frigiditatem, cùm
vetò in homine cor ſit quod eſt primò ac ſummè
calidum, eo frigidiore, nec eſſe eorſi-ſ corpus
frigidiuſ eſſe, & ſtatuofum. Flatuſiſ vero patarum
eſſe diſrumpere vaſa, & commouere fluxio-
nes, atque ob id hæmorrhoidicam paſſionem, &
phthylim facere, libello de ſtatuſiſ diſſertè admo-
dum docetur. Dicit ergo alatiſ non ſolum ob
eam figuram, ſed etiam quia ſunt ſtatuofi, ſolete
dictiſ morbiſ corripri, eſſeque ſtatuſiſ *ſimul* qua-
ſi diceretſ concauſam, hoc eſt, ſimul cum eà figurà
cauſam eſſe talium paſſionum.

Valde frigidum, velut nix & glacies ve-
nas rumpit & tuſſes excitat. Humorum
autem collectiones facit, quales ſunt Phreſa
& gongrona, durities autem eſt ſimul cauſa.

Digna, interprete Galeno in commentario huius
loci, & libello abſoletarum vocum Hippocrat.ſ
ſunt longe ſub auribus glanduloſe eminentiæ,
quales ſaryti habere ſinguntur. *Porphyra* eſt que vo-
catur bronchocele, id eſt, gutturis ramex, eſt e-
minentia quædam magna & rotunda in collo, eſt
ſcilicet que barbaro nomine vocatur boziſ. Ni-
hil continet aliud hæc dictio, quàm quod in aphor.
24. lectionis quintæ, vbi dicitur, frigida qualiſ nix
& glacies peſtoreſ inimica, tuſſes movent, & ſina-
guinem, & deſtillationes: Rurſum alio aphoriſmo,
Cutem obduſt & dolorem inſupportabilem facit.
Hoc idem eſt quòd nunc dicit, adicijs quedam
que ad illa pertinent, vt non ſit vlla melior ratio in-
terpretationis, quàm coniunctiſ ambobus lociſ.
Nimirum quia ſanguinem commouet & deſtilla-
tiones, & peſtoreſ inicum eſt, frangit venas, & hæ-
morrhoidicas facit paſſiones, & ob hæc ipſa tuſſes
ciet. Quia autem cutem obduſt, & ſuppuratio-
nes (eadem ratione & reſolutioneſ) prohibet, ac
præterea quia fluxiones ex capite commouet, facit
phreſa & gongronam, deſtillantibus ſcilicet humo-
ribus ex capite, & ob denſitatem cutiſ in diſſolubi-
liter hærentibus, & ſtigmatiſ in partibus. Inuar
autem bonum generationem naturalis cutiſ durities,
quod vt doceat dicit, *euenit* & *ai* *euſtophæus*.

Poſt miſtum concretio in pueris magis con-
tingit, nunquid quia calidiores ſunt.

Interpretatio, id eſt concretio, interprete Galeno
libello abſoletarum vocum, ſignificare poteſt a-

pud Hippocrat. aut concretionem quandam, aut
 appendiculum, aut sedimentum urinae, aut tosum.
 Etque hoc vltimum dicit Galen. melius esse intel-
 ligere (sexto Epidemiorum, hoc scilicet loco. Te-
 statur enim Galen. in huius dictionis commenta-
 rio, nullo alio loco se inuenisse hoc nomen, prae-
 terquam in septimo Epidemio. quem librum haud
 opinatur Gal. Hippocr. esse. Suspiciari itaque po-
 tes, dicere Hippocr. urinam puerorum paulo post,
 quam est munda, concretere aut conturbari, vel
 appendiculum sedimentumve fieri solere in urinis,
 secretionem aut concretionem facta, partium crassa-
 rum, praecipueque id fieri in puerorum urinis.
 Atqui potest videri sensus hic facilis & verus. Di-
 citur enim in libello de urinis, qui nomine Gale-
 ni circumferebatur, puerorum urinas multam & cras-
 sam subsidentiam habere, ob eorum voracitatem,
 & inordinatos motus. Potes itaque interpreta-
 ri Hippocratem hoc idem nunc dicere, concre-
 cere scilicet urinas, aut ipsas totas, aut partes in
 eis crassiores seorsum (vtrumque enim euenit)
 dubitantem verò cum dicere, an quoniam calidio-
 res. Opinari enim varia licet de causa, atque aut
 in voracitatem & inordinatos motus id reicere,
 aut in calidiorem naturam, praecipue si nomine
 concretionis intelligatur appendiculum, aut se-
 dimentum: sunt enim haec concoctione. Sed & vi-
 rina tota crassa, & quae perturbatur cito in vora-
 cibus est signum caloris. Voraces enim homines frigi-
 dos naturae reddunt urinas tennes, albas, & sum-
 me crudas: iuxta has interpretationes pertinet
 quidem haec sententia ad differentias & causas
 vinarum neque certe haberet quidpiam impro-
 bandum. Sed satius est eam sequi interpretationem
 quam Galenus sequutus est, alioquin omnes
 interpretes sequutos dicit, videlicet agere hic Hip-
 pocrat. de calculorum in vesica generatione, qui
 morbus pueris est familiaris, ut tertio etiam ap-
 bori dictum est. Generantur enim lapilli qui mictu ter-
 tiuntur partim in renibus partim in vesica. Pueris
 quidem sunt in vesica frequentius: adules, in re-
 nibus. Causam ob quam pueris sunt in vesica, di-
 cunt medici, esse eorum voracitatem: ob quam se-
 nioribus generantur in renibus esse duritiem re-
 num, & angustiam viarum, & debilitatem expul-
 tricis. Sed cur pueris non affert voracitas, calculos
 etiam in renibus? An ob molliorem laxitatemque
 viarum, & expultricis robur? Cur haec eadem non
 eos liberat à calculis etiam vesicae? Rursus cur stric-
 tura viarum, & durities partium, & debilitas ex-
 pultricis, non afferunt vesicae calculos etiam, sen-
 ioribus? Hip. videtur insinquare causam esse in calore in-
 tensionis. Verum si haec esset causa, videntur iuvenes,
 qui non sunt pueris minus calidi, calculis vesicae non
 minus laboraturi, quam illi. Porro pueri laborant
 calculis renum non minus quam vesicae. Non enim
 minus, sed plus etiam illi concrescunt calore. Non
 igitur haec est causa, aut saltem non haec sola, sed
 aliquid aliud oportet adduci de his causis, quod ego
 addam, hanc exorsus. Vtrobique & renibus (in-
 quam) & in vesica, gignuntur lapides ex crassis ve-
 lut siccibus, quae cum urina descendunt, haerent
 in via, velut ex crassioribus aquis generantur
 tosi in aqua dictionibus. Materia itaque est crassam,
 erodum, aut seculentum: efficiens autem causa,
 calor partium. Cum enim nulli tales lapides calore

A liquentes, calore concretis esse omnes constat,
 non tamen proinde fit, ut sit semper calida intem-
 peries in loco, ubi generantur lapides, nam ubi ma-
 gna est materiae aptitudo, exigua efficiens iussit
 vis sufficit, atque ita ubi crassum & leuissimum est quod
 in urinae viae congeritur, solus ille calor est satis ad
 concretionem, sine quo non possunt videntur
 partes consistere, velut aliquando etiam ob calidam
 intemperiem concretescunt, quae alioqui non con-
 creverunt, quod non adeo ac priora essent concre-
 tionis idonea. Igitur gignendorum lapidum duplex
 est causa, calor maior, & plurius crassa materiae de-
 tentio. Ut plus materiae detineatur, causa est, quod
 plus descendat cum urina, aut quod via sit angus-
 tior, aut expulso agatur debilius. Calor re-
 num quam vesicae maior est, in omni & aetate, &
 sexu, puerorum verò & iuuenum aequalis & vtro-
 rumque maior quam senum. Quare hac ratione
 pueri & iuvenes aequè essent calculosi, & vtrique
 magis renibus quam vesica, & vtrique magis quam
 senes. Verum senes colligunt maiorem copiam suc-
 corum crudorum ob impotentiam coquendi, qui
 descendunt illis abundantius ob exiguum discussio-
 nem, & quae illis est omnibus, & ventris siccitate,
 quae adest eorum multis: vias etiam habent angus-
 tias, & facultatem expultricem debilem. Ob quae
 omnia, necesse est magis calculosi sint quam alio-
 rum vtrique & in renibus magis ob eorum angus-
 tiam naturalem. Puerorum urinas, etsi videant
 medicos omnes ferè ita affirmare, ego non existi-
 mo esse sordidiorem, & crassius crudisque magis
 abundare secundum naturam, quin potius minus
 perturbatam, & limpidiorem, quia etsi sint vora-
 ces, habent tamen alios laxiores, & discussionem
 per corpus totum longè maiorem. Quorum illud
 facit, ut maxima pars crassorum & incoctibilium per
 alium anticipet descendere: hoc, ut reliquum in-
 sensibiliter discutatur: cum urina verò descendat
 non adeo multum. Hoc verò ita se habere praeter
 dictam rationem, cognouit experimento vel vul-
 gas hominum, qui puerorum urinas, & senio-
 rum & limpidiorem, ad innumera opera requi-
 runt. Haec igitur causa multo minus calculosos ef-
 ficere videtur pueros quam alios omnes, atque re vera
 in renibus tales sunt. Verum habent quandam in-
 signem occasionem colligendi calculos in vesica,
 ob quam aliis omnibus plures colligunt: ea est in-
 languida expulsiō. Nam expulsiō fortis est in re-
 nibus naturalis, & ob id in pueris est, non minus ve-
 hemens, quam in aliis vltis vesicae verò expulsiō à
 facultate animalis plurimum dependet, vtimur e-
 nim ad mingendum musculus abdominis, & prae-
 terea musculus quodam magno qui à vesicae ceruice
 producit per totum colem, multis fibris velut di-
 gnis venter, quasi mulgens, ut vno perpetuo quae
 impetu exeat urina. Pueri animalis facultas est de-
 bilissima, atque propterea minori impetu mingunt
 quam vici, quo fit ut eorum vesica nunquam min-
 gendo perpurgetur: sed semper fiat illis post mi-
 ngendam concreto, haerentibus urinae siccibus circa
 eius osculum: non aliter atque concretere solent
 sordes, & arenae in matulis, ac multo magis in va-
 sis officij angustis, cum non effunditur liquor ma-
 gno impetu, sed paulatim aut languide. Hanc
 ob causam, etsi puerorum urina sordidior non sit,
 magis tamen illis fit concreto in vesica post mi-

Etiam, quia quicquid fordim, adest, ob languidum vrinæ motum hæret, neque cum illa exit, sed congeritur: in renibus nouita, bi enim vt qui naturalis expultrice, que in pueris est fortissima, expurgantur, facile se ab omnibus expediunt: accedit mollities partium, & amplitudo viarum, vt ad proprii corporis magnitudinem. Quam igitur ab rationem pueri, ob eandem etiam qui dysuria aut stranguria laborat, periclitantur calculum in vesicâ cingere, quod scilicet debilitate mingant, quod Ferdinando à Mens præceptorum meo, qui etiam ante me fuit Philippi secundi medicus cubicularius, postquam & ipse Compluti primatiam cathedram multos annos felicissimè rexerat, contigit. Cui post mortem excisso solidissimus lapis, plusquam septem uncias peodens, extractus à vesica est. Hic multos ante annos reorum calculo laborauerat, vt sit verisimile, inde detrusum esse lapidem qui vesicæ hærens, stranguriam fecerat, ac per eam in tantam excreuerit molem: quod & in senibus omnibus censeretur debet qui cum antea laborauerint morbo renum, nunc laborant vesica. In quibus verò stranguria est, etsi nullus morbus renum antecesserit, timeri etiam lapidis vesicæ debet, non qui descendit ex renibus, sed illic ob languidum mictum congestione genitus sit. Nam sit post mictum coarctatio in omnibus, qui quacunque causa languide mingunt, sit verò id in pueris (& in senibus quidem, nunc verò de pueris est sermo) quia naturale est his languide miogere. Addidit verò Hippocratum quia calidiores, rectè sanè dubitandi particula vixit, vt insinuat, esse quidem aliquateous causam in calore, non tamen omnino, sed in omnibus his quæ dicta sunt.

Figura quedam magis subleuant, vel accidunt illi qui sarmenta manu componens & contorquens, pra doloribus decumbens, is paxilli defixi extremitatem corripuens adhaesit, & subleuatus est.

Figuram vocat semper Hippocrates corporis positum, vt quod sit, sedeat, ac decumbat, pronus; aut spinus, exporctis crutibus, aut contractis, aut rei alicui incumbas. Quantum possit figura commoda aut incommoda prodesse aut ledere. Hippocrates docuit diffusissimè libello de medicatrina, & de articulis, vnde verò vna quodam exemplo indicat. Dicit, *et ex parte de paxillis paxillis*, hoc est figuræ aliquando plurimum possunt ad leuandos dolores: vt enunt, quandam rusticum, cum de more sarmenta contorqueret & impleteret, dolore quodam idgeniti corripit, aded vt procumbere cogereur, qui paxillum corripuens, & velut ingens eam sibi, adhæsit eius, extremo fortiter, & subleuatus est. Galenus suspicatur eum dolorem fuisse manus, ego verò crediderim fuisse dolorem aliquem ventris ex flatu: tales enim dolores solent subleuari compressione forti, & corporis lactatione, ac maturatione figuræ, quia hincinde pulsus flatu, minus in parte occet, & tandem expellitur. Ego ipse soleo hoc dolore teneri, & nulla in te maius solacium inuenio, cum causa admodum firmata

oon est. Et velut natura ipsa docti, quicunque dolent parte aliqua, pugno eam premunt, nisi cum phlegmonosus affectus doloris est causa.

Quem ex montanis laboribus iuxta pontem vidi iactantem crura, tibia altera minime illi extenuabatur, femora autem valde: vrina & genitura non retinebantur.

Cum hanc sententiam intactam reliquisset Vallesius, vices illius supplere, eamque pro ingenij modulo enartare conabimur, eoque libentius, quod obseruationem difficultatibus quidem obvolutam sed notatu dignissimam contineat. In ea igitur breuem concinnat Hippoc. historiam cuiusdam montanis operibus addicti, ex quibus incidit in affectum neruotū, qui ex spinali medulla circa lumbos & os sacrum exoritur, crutibus motum impertiant, & surculos largiuntur musculo qui vrinam in vesicâ conseruat cohibet; siue igitur neruis solum læsis, siue ipsa potius spinali medulla affecta, femora aded extenuata & debilitata sunt, vt dum progredi conabatur, crura (vt censer Galenus) extoriorum iactaret, & disiceret, vel motu quodam tremulo aut concussio illius crura agitantur. Altera tibia minime extenuabatur, non quod vberius altera nutrimentum exciperet, sed quod propter humiditatis cuiusdam decubitus, defectus nutritionis latet. Causa quidem prociatartica indicatur his verbis *et ex parte*, id est, post exemplatos in montibus labores vel *et ex parte* & graves & acutos labores, vt legit Mercurialis. At quisnam fuerit affectus noodum constat, oon enim vertebra-rum luxationem aut perfectam neruorum resolutionem accidisse censendum est, quomodo enim crura iactasset? Hic fuit, ni fallor, *et ex parte*, cuius mentionem facit Hippoc. 2. de morbis, in quo secundum spinam veluti formicarum decursus percipitur, cui nōo admodum abimilis est *phlegmonosus*, affectus neogamis familiaris est his qui immoderatè vtuntur venete. Verisimile est igitur spinæ medullam tantis laboribus concussam, tantis onibus compressam fuisse, atque ob dolorem concitatam humorum proliuam emoluisse, & quodammodo resoluisse neruos, qui ex lumbis & os sacro in crura & musculos constrictores excurrant, vnde vitiatu partium alimento crura laborasse atrophiam, & deprauato motu progressio alimenterum non attraxisse, ipsamque vrinam & genitale semen vepote humidiora excrementa inuoluntariè effluxisse, facile enim ab his reserari potuerunt musculi obturatores ob neruorum debilitatem: nec animifculus vicio caruisse credendum est, etsi de alii deiectionibus sileat Hipp. verum cum crassiores essent, & exorât febre vel ieiunio aut prægressis laboribus exsiccata, non facile demittebantur.

Quicunque naturâ habent latere, alarum inflare eminentia ob imbecillitatem occisionis, in functionibus malignis, siue excretio fiat, siue non, illis malum portenditur.

Interpretes naturā paratā esse ad cibum dictum est libro tertio, nunc huius rei causam reddit, & periculum exaggerat, dicens, tales homines periclitari à fluxionibus malignis, idque siue insidendo exerceatur materia, siue non, sed insidens immorēque in pulmone. *À Hippocrate Galeno interprete, vocatur ab Hippocrate causā in genere eius quæ dicitur ab Aristotele impulsus*: Refertur potest illud, ob impotentiam occasionis, ad alatas naturas, quasi dicatur, alatas naturas costarum quæ sunt ob impotentiam occasionis: aut ad fluxiones malignas, quasi diceretur, in malignis fluxionibus, quæ sunt ob impotentiam occasionis. Primo modo impotentia occasionis erit, impotentia facultatis formatricis, quæ corpora nostra dilatat, & naturalis caloris, quo illa vitur: secundo modo intelligitur occasio nomine pars primariā affecta, & à qua venit malum, velut in illa oratione libri secundi sectionis primæ, quæ rursus repetitur paulo post, occasiones etiam unde quis egrotare incipit, considerandæ. Fluxiones in pulmonem aliquando veniant ex toto corpore, plerumque autem ex capite, atqui profectō alatis plerumque est debile caput, & excrementosum: petrarum enim est cum tanta cordis & thoracis debilitate, cerebrum & caput esse robustum. Ob debilitatem ergo capitis fit, ut in eo congerantur multa atque maligna nonnunquam, ac corrosiva excrementa, quæ distillant in pulmones, tabem parere solent, & periclitantur magnopere alati ab his fluxionibus, siue excretio fiat siue non. Nam si excretio non fit, hærens pulmonis materia rodit: si autem fit, per vehementem tussim laniatur pulmo, & vas aliquid plerumque dirumpitur, atque etsi nullum manifestè dirumpatur, quom vel minima exsiccata est fieri, tussiendo angustur vlcus inenodabiliter: Itaque alata nature costarum, id est, qui secundum naturam habent id vitium thoracis, ut alati more autem esse videantur, quod sint angustis lateribus: & exiguis costis, ac eminentibus humeris, id quod ob impotentiam naturalis caloris in corde fieri solet, in fluxionibus malignis siue excretio fiat, siue non, periclitantur. Vel secundum aliam enacrationem, quam non probo modis: quia natura sunt alati, à malignis fluxionibus, quæ nascuntur, ob impotentiam membri mittentis periclitantur, siue sit excretio siue non fit.

Rigores mulieribus quidem incipiunt magis à lumbis & per dorsum, & tunc ad caput ferunt: quin etiam vitæ posticæ magis quam anticæ corporis parte. Horremus enim exterioribus corporis partibus magis quam interioribus, ut cubitis & femoribus. Verum & rarior cutis id demonstrat, cuius inditum est pilus: à quibuscunque autem alijs rigent, ut forsitan ab vlcerebus, rigor incipit à vasis.

Hic est aphorismus sexagesimus nonus sectionis quintæ, præter illa verba quæ in calce sunt adiecta, à quibus autem alijs rigent ut forsitan ab vlcerebus, rigor incipit à vasis: quæ Galenus censet vel non esse scripta ab Hippocrate, sed ab alio quopiam, vel

A certum aliquid non definire, sed incertum & dubium aliquid, ac proinde cum in aphor. reponeretur: ex puncta esse. Dictum est enim sæpe omnino exactius scriptos esse libros apborisimor. quàm hos Epidemiorum. Dicit etiam Galenus hæc verba nulli enarratorum fuisse probata, sed omnes ac pro suo quemque arbitrari permutasse, quasi commodam enarrationem habuerint nullam. ut à principio innotabantur scripta. Et mihi profectō perinde videtur, ac Galeno & reliquis. Nam incipere à vasis illis, etiam rigoribus congruit qui incipiunt à lumbis, & à parte corporis posteriori, & acubitis: & femoribus. Nam etsi in quartana aut tertiana incipit refrigeratio à lumbis, morus tamen excrementorum, quorum delatio facit rigorem, à vasis incipit, quæ extorrum pellunt, ea quæ sibi quantitate aut qualitate molesta esse incipiunt, ea verò delata per sentientes partes, rigoris causa fiunt. Nisi forte ob hæc verba à communi de rigoris causis opinione recedendum sit: quod non video cur faciam. Præterea rigores etiam qui ob vlcera, aut in suppurationem abeuntia tubercula fiunt, incipere solent à posterioribus, & exterioribus corporis partibus, magis quàm ab anterioribus, & interioribus; non minus quàm rigores tertianarum & quartanarum. Cur igitur dicat, à quibus autem alijs rigent ut forsitan ob vlcerebus, incipit rigor à vasis: quasi qui incipiunt à lumbis non incipiant à vasis: atque qui fiunt ob vlcera, aut alias causas manifestas, non incipiant à lumbis? Nihil continere hæc verba vitæ, & sciri necessarium, certò mihi videtur scire: quid autem suspicet dicam.

Ante Hippocratem in inenodabilis erat philosophia, nihil erat in ea firmum & certum, sed innumeræ, incertæ quidem illæ omnes, ac velut aniles circoserebantur de eunisque rei causis opiniones. Hippocræ plerumque tam produxit, ut erat naturæ perspicacissimus, iteir tenuissima fundamenta, inuenitque principia rerum omnium certissima, calidum, frigidum, humidum & siccum, quæ ab eo receperunt omnes philosophi, qui fuerunt in præcio: nam Stoici, & Academi, & Peripatetici. Cum autem Hippocræ hæc quæquam le totum dederit naturalibus problematis, sed in medicinalibus ponis infudamentis, non aliter ac Socrates qui naturalia præteriens ad moralia se contulit, non potuit de naturalium rerum causis tam exactas præterre sententias, quàm posteri: ut Aristoteles & Galenus & qui illos in hunc usque diem sequuti sunt sed de his, cum alijs vtrunque sentiens, curavit inuenire omnia quæ ad medicinalia opera essent utilis, atque ea in tenellis vñquam eius vitæ diligentiam pariter & prudentiam est consequutus. In philosophicis ergo loquebatur quamplurima secundum vulgi opinionem: in medicinalibus verò nihil quod non haberet exploratissimum, in illis saltem operibus quæ ille perfecit: ut aphor. & prægnostici. Hæc intelligere desines mirari: quod tam multa occurrant in us quæ nomine Hippocræ loquantur, quæ tunc ab omnibus censentur falsa. Nimirum scripta sunt illa secundum eas sententias quæ tunc vigeant, nunc censentur antiquæ: Illud tamen fecit Hippocræ prudētissimè, tametsi spæsim in suis chartis habet multa dubia secundum temporis conditionem scripta, atque quæ forsitan ipsemet aut censeret, aut subolisceret, esse falsa.

E D d iij

ex libris autem quos ipse elaborauit ac perfecit, voluitque non secundum opinionem, sed ad artis utilitatem scriptos, omnia illa excludi, ea solum scribens, quæ utilia, certa, ac experimento longo potius quam ratione probabili (quæ plerumque in utramque partem fluctant) confirmata. Velut nunc, scripserat (secundum opinionem, arbitror, aliquam veteritatem) à quibus autem alijs rigent ut forsitan ab viceribus, incipit rigor à vasīs. Detrahit autem, in aphorismos translatus, quasi ibi nihil dubium, neque ad cuiuspiam opinionem, sed quæ omnium sectatum viris essent recipienda, scribi oporteret. Atque ita est factum, aphorismos enim & prognosticum, empirici, & dogmatici recipiebant, atque adeo omnes, medici, præter Theaslicos, qui omnia corruerunt. Quamquam & hi recipiebant eorum maximam partem. Erat vetus opinio, ut in libris de morbis licet videre, rigorem fieri ab aquosa humiditate sanguinis, partes per quas volutabatur refrigerante: volutari verò donec cum reliquo sanguine mixta calefceret, & tunc fieri febrem. Humiditatem verò illam, à qua rigor fiebat, fecerni, sanguine pariente corruptionem quandam, similem ei quam patitur lac cum resoluatur in caseum, butyrum, & serum. Fortasse ergo inuaserat etiam eo tempore opinio, rigores febrium fieri humiditate illa volutante circa ossa & nervos & extra vasa, eos verò qui exvulnere, tuberculo, ictu, aut omnino causa externa, volutante in ipsīs vasīs, velut nunc fert communis opinio per febres continuas moueri succos intra vasa, per intermittentes extra vasa: licet verò forte istæ opinionem de ea etiam re alicui aliter, idque sine artis medicæ detrimento. Quæ igitur aperte vera sunt, & experimento constans, scripta sunt in aphorismo, atque in eius commentario à me enarrata, quod præterea hic addidit, dictum est ad opinionem; quæ an vera sit patum refert examinare, certè non est consona ei quæ de rigoris causis Gal. libello proprio scripserat, & ego lib. 5. contr. medicinalium; sequutus sum.

Summa artis ex orta & occasione; & multis ægri sermonibus; & ijs quæ paulatim cognoscuntur colligenda est, & perdisseendum an inuicem similia sint vel dissimilia, ut ex dissimilitudinibus una fiat similitudo. Hæc sanè via est; sic etiam ea quæ se rectè habent probantur; & quæ se rectè reprobantur.

Summa autem est summa totius artis, ut Gal. interpretatur; ut autem ego intelligo, partis prognosticæ. Nam ipsemet Hippocr. dicit, hæc quæque tradit est via seu methodus, quæ ea quæ rectè se habent, probantur, & quæ non habent rectè, redarguntur: hoc est quæ quæ bona aut mala sunt circa ægotantem, dignoscuntur: constat verò hæc dignoscere, prognosticæ partis esse finem, totius enim artis aut partis curatiuæ. finis non est dignoscere, sed curare, itaque tradit nobis omne Hippocrates summam, seu caput totius prænotionis. Verba autem facile intelliguntur, ex ijs quæ alijs locis scripta occurrunt, præcipue in prognostico, in

cuius commentarijs non semel dixi, duo esse quæ ad rectè prædicendum nosse oportet, primum loca ex quibus capiuntur argumenta, & velut materiam signorum: alteram rationem vtendi argumentis, & adhibendi idoneas distinctiones. Loca quidem sunt præcipue, quæ in prognostico Hippocrates persequutus est, facies, decubitus, respiratio, pulsus, hypochondria, vrinæ, spura, deiectiones, & sudor, ac totius corporis calor & color. Rationem vtendi hæc oratione tradit, totam quidem vna summa complexens. Caput (inquit) est totius bonæ præsentionis, coniungere omnia & discernere ex generatione (hoc est ex infinita cuiusque hominis natura) & occasione (id est ex causa siue interna siue externa, quæ homo cepit ægotare, aut incidit in eam affectionem de qua agimus) & multis sermonibus, & ijs quæ paulatim cognoscuntur, id est ex ijs quæ medicus interrogando ex ægroti ipsius aut assistentium responsis intelligat, vel per se ipsum. Ex his enim omnibus intelligat, ea quæ contræ plañtor, similia ne sint an dissimilia iis quæ in bene valentibus adesse solent, præcipue autem in eodem ægroti: quæ consideratio omnium præcipua est ad præsentionem, quamque Hipp. primis verbis libelli de medicartina tradidit, dicens, an similia an dissimilia. Nimirum communis epilogismus, & omnium hominum menti insitum est principium, ut quantum cuiuspiam siue vultus, siue respiratio, siue decubitus, siue aliud quodvis, longius abest, ab eo quod natura homini inerat, tanto sit deterius; quantum abest minus, tanto sit minus malum: Est alia consideratio huic proxima, ea qua occasione, seu causa fluxerit signum quod contemplamur, an euidentem aliquam causam habuerit, an nullam, cum sciamus, tantò quodcunque signum, eorum quæ censentur mala, esse minus malum, quantum causam habet euidentiotem, & tanto deterius, quantum magis caret occasione. Harum considerationum prima fuit in *meo sermone*, hoc est, ex notitia insite naturæ, & eorum quæ homini naturaliter insunt. Quæ enim alia ratione posset cognoscere; an sint hæc symptomata naturalibus similia an dissimilia, quam cognoscendo quæ sunt homini naturalia? Secunda consideratio fuit, *ex meo sermone*, hoc est, ex notitia causæ, vtinamque autem, & natura inquam hominis, & causa affectionis seu symptomatis, agnosci potest, vel interrogando, vel ex alijs coniectando. Ita enim dicitur in initio prognostici, vbi de vultu ægotantium agitur. Considerare oportet hoc modo, primum quidem faciem ægroti, an similis sit ei quæ in bene valentibus, maxime verò an ipsa sibi ipsi, ita enim optima fuerit: si verò maxime contraria similis fuerit, pessima est. Hæc est prima consideratio, quam eoq̃libet fluere ex notitia faciei, quæ homini ex generatione inerat. Ad alteram considerationem pertinent ea quæ mox addit, dicens. Si signum in principio morbi facies talis fuerit, & nondum ex alijs coniectere potueris, interrogare oportet, numvigilauerit homo, an alons soluta sit: an fame teneatur, atque si aliquid horum constat, minus graue esse potandum est. Eo modo cognoscitur occasio *ex meo sermone*, hoc est, interrogando, & paulatim cognoscendo, ac per te ipsum coniectando. Quibus verbis insinuat, quod non semel iam dixi, debere medicum multa interrogare

& omnia, quæ ad affectus cognitionem, & naturæ hominis, aliquod conferre possint, disquirere, nequaquam tam multa, vt etiam interrogat quis ad rem non faciant, aut etiam quæ suspicionem viliam noxiam misero agitantur ingerant, vt in calce secundæ sectionis, de æconomia disputantes diximus. Sed & generatio discitur, nunc interrogando, nunc per te ipso coniectando. Nam videns angustum thoracem, & artérias exiguas, etiam nihil interrogans coniectas hominem naturâ habere cor frigidum: dubitans verò de ventriculo, an etiam sit naturâ frigidus, rogas an homo naturâ sit vorax, an sterculosus, an soleat bene coquere: sed & vultum conspicuas qualem Hippocr. descripsit, meritis interrogabis, an homo esset facie carnosus, & nitidus, an paulo minus quam nunc est, gracilis & decolor. Itaque verumque, generationem inquam & occasionem agnoscit medicus, colligens, & discens ex multis sermionibus, & iis quæ paulatim cognoscuntur. Sed non satis est ad firmam prædictionem, signum aliquod considerare, quàm sit dissimile, nisi alia omnia coniungantur, præcipue quæ sint eiusdem generis, & ad similem causam referantur, ita vt ex omnibus dissimilitudinibus similitudo vna fiat, id est vna syndrome similiter significantium signorum, & similiter dissimilium iis quæ naturâ inerant. Hunc locum pertractauimus in commentarijs prognostici, eo præcipue loco quo in calce libri dicit Hippocr. oportere cum qui rectè sit præsentus, signa omnia considerare. Optime autem dixit nunc Hippocr. *ὁμοῦ καὶ τῶν ὁπλῶν ἐξ ἑνὸς συμπτώματος, καὶ τῶν μὴ ἐκείνων.* Nimirum nulla ratio est paobandi signum, quod per se videatur esse bonum, vñdum tamen est satis firmum, neque redatguendi quod sit malum, vñdum tamen euidens, quam ex alijs signis quæ annuant, aut renuant; annuentibus enim multis alijs, præcipue quæ sint significatione similia, vt deficienti pulsui annuente frigida respiratione, & luore vnguium: aut respiratione facili pulsu forti, & mente firma: quæ per sese essent dubia signa, confirmantur. Hanc ob causam Hipp. vbi ad certitudinem prælagi videtur desiderari aliquid & signum quod tradidit esse non-nihil dubium, adducere solet, considerare oportet alia signa. Nimirum syndrome similiter significantium signorum, annuentium aut renuentium, reddat prælagium firmum, siue bonum siue malum.

Fluxus sanguinis, ex naribus accidit aut ijs qui ex suppalido colore nigricant, aut ex rubicundo pallefcunt, aut subpallidis.

ῥομφαῖος color est viridis, aut inter hunc & flauum. Sunt eius multæ species, velut missione aliorum colorum factæ: quorundam enim color videtur vergere ad viridem simul & nigram, aliorum ad rubrum & viridem, aliorum etiam ad flauum & viridem. Dicit igitur Hippocr. ijs qui per morbos talibus tinguntur coloribus, solere succedere fluxus sanguinis ex naribus: quod quidem verum esse ego experimento cognoui. Vidi enim, quosdam, quibus non sine admiratione eorum qui aderant, facies mutata est ad chlorum, & per hoc quasdam ad chlori indichibiles differentias, à

A fluxu sanguinis ex naribus periclitari, & eorum quandam mori, alium cum vehementi animi deliquio euadere. Itaque recipio hanc Hippocr. sententiam, vt potest quam experimento habeo exploratam. Ratio etiam mihi videtur probabilissima esse. Nam comparat sanguis colores allos bilescentes & corruptus, vt autem fluat duplex est causa, multitudo, & vitiosa qualitas: is autem fluxus, quia à vitio sanguinis nascitur, minus potest conuenire, quàm qui à multitudine: hic enim mox atque exit quod reddundat, sponte cessat, sublatâ scilicet iam fluendi causa: ille verò nunquam cessat, quia quantumuis minuitur copia, est maligna qualitas quæ irritat: nimirum eo fluxu sanguinis, nō exit seorsum quod in eo est malignum, sed simul totus: quare quamuis sit euacuatus multus sanguis, qui superest eadem malignitate præditus est quâ qui erupit. Qualitatem autem sanguinis malignam esse indicat, præter ipsam coloris speciem, illa ex alia in aliam speciem mutabilitas, quam dico me in talibus animaduertisse. Fit enim id sanguine nullo loco se continere bene, sed inordinate effuso, quod malignæ qualitatis, quam faciles partium non sustinet, euident argumentum est. Atqui illa ipsa humorum inconstancia fluxus futuri fidem auget, quia necesse est sanguinem agitarum exitum aliquâ parte querere, quem ex qua potius expectes parte quàm ex naribus, cum motum versus superiora indicent accidentia circa faciem? Merito itaque illa vultus species, minatur fluxum sanguinis ex naribus periculosum.

Dum parum remiseris, oportet incoassare sicco: in alijs autem minus incrassandum est, sed medicamento sicco albo utendum, quale est galla & alumen.

Cum dictum sit solere periclitari ex fluxu sanguinis eos, quibus ob bihosam totius sanguinis infectionem fluxit, vt qui sunt *ῥομφαῖοι, ὑπὸ τῇ ῥομφαῖᾳ*, & *ῥομφαῖος*: docet nunc quo pacto sibi talis fluxus debeat. Nam cum non ob morbum solū, sed ob aliquod etiam symptoma quis periclitatur, ipsi symptomatici debes occurrere, etiam dimisso morbo, qui illud attulit. Duplex autem consultatio est in sanguinis fluxu, quarum prima videtur esse mihi longè difficilior, & quæ medicum magis potest anticipitem reddere. Prima est, an sisti debeat, secunda, quomodo. Non enim omnis fluxus sisti debet, sed quidam sisti, quidam luuari etiam, quidam tantum fini, cum sit quidam valde salutis, quidam perniciosus. Certe si ob istum, aut casum quidam fluit sanguis, cum ex causa externa pendere, non erit periculosum sistere. Quare adhibere licebit mox astringentia, & moderatè frigida, nisi tamen contigerit hominem plenum esse, tunc enim mitemus spiritus sanguinem, aut effluere ex parte aliquâ sinemus, quia perinde est ab externa causa fieri eum corporis apparatu, atque ab interna: cum ob multitudinem fluat solam, non est quod sistas, copia enim fluendo minuitur, & cum fuerit sublatâ multitudo, sponte cessabit: nisi verò interim ruptum sit vas insignis, tunc enim oportuerit emplastrico, & astringenti, ad quem vsu

nillum vel inueniri posse putat Galen. præstantius suo, quod parat ex duabus partibus mastices & aloes vna, cum oui albumine, cum verò fluat ob malignam qualitatem, vel solam, vel cum multitudine: tunc est medicus consilij inops, quia habet res utranque viam periculosissimam. Si enim non sistitur, ob impotentiam retentitricis, quam irritatio facit, fluat vsque ad syncope, cum præcipue qui valde cacochymus est, non possit vllam magnam euacuationem sustinere, & cito deficiat: si sistitur, cum malignus sanguis non possit aliqua in parte pacatus quiescere, capere solet impetum in partem aliquam internam, quam contingit esse debiliorem, vt seni cuidam, qui cum elatis multum fluxisset sanguinis tenuissimi (erat verò tota facie *εμψυγος*), & auxilijs idoneis fluxus cohiberetur, plenitudo superueniente mortuus est. Quid igitur in periculo adeo accipiti faciendum? Certè quod Hippocrates monet quum parum remiseris, incrassandum esse sicce, circa partem verò vtendum, sicco albo, vt fortè pulvere ex galla, & alumine. Quod parum remittendum dicit, omnes eodem modo interpretantur. Scilicet non statim sistere, sed parum permittere vt fluat, certè quacunque causa, etiam procatarrhica, fluere incipiat sanguinis, permittendum est fluere nonnihil, antequam sistas. Nam non ad plethoram solum, sed & ad cacochymias vtilis est aliqua missio sanguinis, & ob idcum aut casum secamus venas, & ex quoqueque volnere recenti volumus mediocriter sanguinem fluere, vitamque igitur comperit fluere sanguinis, erit tutius permittere vt fluat nonnihil, quam statim sistere. In cacochymijs autem vt missiones sanguinis parce faciendæ sunt, quia non habent unde reficiantur, ita & spontaneæ fluxiones, siuendæ sunt parum. Si cui ergo vides cum plethoræ signis sanguinem fluere, siue fluat donec sponte cesset, etsi interim homo linquatur animo: si verò cuidam fluat, qui sit ex pallido vitescens, aut subpallidus, aut ex subpallido colore nigricans, causæ finis multum fluere, aut vsque ad deliquium animi. Nam tales maximum cum periculo linquuntur. Sed si non finis multum eueniat quo pacto facies, ne in partem aliam feratur? Certè incrassando sicce. Hoc incrassare, quidam interpretes referunt ad medicamenta admoventia naribus, intelliguntque admoneri debere medicamenta sicca, & astringentia, quæ coagulent, contineantque sanguinem in loco, & ita cohibeant: alij ad accipiendâ per os: horum rursus alij, referunt ad victum, intelliguntque vtendum victu sicco cum exiguo potu, ne fluat sanguis: alij ad medicamenta, dicuntque, illud *εμψυγος* significare, exhibenda esse siccatia, & crassissimi afferentia. Atque horum plerique dicunt intelligi debere de sanguine paulatim multo tempore fluente, non semel affatimque, quia hunc non censent posse expectare auxilium a victu, aut denotariis pharmacis, sed indigere auxilio præsentaneo, vt digito, aut medicamento admoto parti. Ego dicam quid ex his censum probatissimum. Certè enent homines utroque modo periclitari, & fluxu sanguinis copioso, & lento ac cæguo. Noui enim mulierem quandam, cui plus quam sex menses, sanguinis guttule continenter fluxerunt, atque cum tantum temporis spatium auxilium expectaret, nihil vtilitatis ex omnibus, quæ medicus moliebatur percipiens,

A mortua est. Vtroque ergo curati oportet, & quibus affatim, & quibus paulatim fluat, eadem curationis ratione, præter id quod exposcent diuersæ indicationes. Sanè est his differentia quædam indicationum communis cum aliis omnibus affectionibus: celerius affligentibus celerius occurrere, alijs verò lentius. Præter hanc, & in ipso modo occurrendi differentia est. Nam in his quibus paulatim fluat, haud quaquam censis permittendum vt parum fluat, sed potius secū vena in brachio aut curare, vt alia indicare videbuntur, sanguis ille euacuandus est, qui crassitudo fluxisset, si permittisset. B Quia cum lentè fluat, si expectes, magis lædetur homo consuetudine fluendi, quam iuuabitur vacuatione redandantis. Ob hanc igitur primam præceptionem videtur Hippocr. de fluxu consertim factu agere, sed quod sequitur de utroque fluxu intelligi potest. In utroque enim, siue inquam paulatim, siue consertim fluat, cum ob corrupti & tenuis sanguinis qualitatem fir, vtile est vt crassissimi inducentibus, & retundentibus sanguinis motum, atque cum præter hæc, opus sit localia admovent, quæ obturent, & Hippoc. in fine orationis dicit, sed medicamento sicco vtendum, quale est galla, & alumen, satius est censere, vltimis his verbis intellige localia: prioribus illis, accipiendâ per os, quum eandem rem inuoluntate repetere, potius dimissa alia non minus vtili. Itaque dicit incrassandum sicce, hoc est, vtendum est medicamentis & cibis (cur enim non erit victus medicamentis secundum eandem intentionem, quam præstat morbus?) siccatibus & crassissimis afferentibus. Sunt verò quæ id præstant duplicia quædam enim suarum partium crassitie, aut astrictione id faciunt, vt pulcullæ ex amilo, & ex lente, & suillæ carnes, & caseus & poma aspera, & serapium mitrum, aut ex moris, aut nucum corticibus: quædam sine crassitie & astrictione tardant sanguinis motum, atque ex accidenti quondam illi crassissimè inferunt, refrigerando aut refrigerando pariter & siccando. Prioribus illis vimor ad fluxus lentos ad repentinos posterioribus. Nam in copioso fluxu sanguinis seti expectatur auxilium ex eis amilis, aut pyrorum: potest tamen tunc consere potus aquæ gelidæ, aut decoctū pentaphylli, quo ego vtor, frigidissimo: vltus tamen crassissimè aut astringentium, paulatim facit sanguinem crassiores, & ita in paulatinis fluxibus auxilio esse potest. Videtur verò talium rerum vsus eam habere insignem noxam, quod obstructions faciat, atque, si quæ iam sunt, augeat, quod quidem copiosius alijs modis lædit, atque si qua fortè expurgatione vtendum postea est, impedit. Propterea ego quoad fieri potest talium vsum deuito. Reque vulneratis, neque fluxione laborantibus permitto, præter quàm ijs, qui nulla magis causa id patiuntur, quàm sanguinis tenuitate, quales maxime sunt, quibus, vt diximus, corruptus est sanguis. F Proinde Hippocr. vt qui consular auxiliorum genere quodam vti, quibuscum quidem necessario, haud tamen multis vtili, addidit, *μὴν δὲ ἰσχυρὰν μὲν πρὸς ἀνδρῶν, ἀσθενῶν, quasi diceret in alijs tamen affectionibus, atque adeo in fluxibus sanguinis, qui ex alijs causis oriuntur, incrassatio vitanda est. Nimium tenuitas semper iuuat, vt facultas corporis se expediat faciliè à quouis morbo, & crassissimæ indicationes omnes impedit, nisi fortè excitationem*

aliquando. Intersectum ergo est obiter illud in aliis verò minus incrassandum, Hippocrate monente, haud esse debere frequentem vsum retum crassitudinem inferentium in medica praxi. Est hæc phrasis similis illi, quæ in aphorismo vsus dixit, plurima verò non turgent. Perinde est enim, ac si nunc diceret, in plurimis verò non incrassandum. Itaque quibus per corruptionem extenuatus sanguis effluit, nisi tamen obstructionibus viscerum manifestis laborer homo (vt sic sæpe) vti hec victu, & medicamentis crassitiem facientibus. Magna verò pars victus ita instituendi est, potu vti parcellissimo, quia fluxilem & aquosum reddit sanguinem: contra siccatas reddit crassiorem: quod insinuans dixit; incrassare scilicet oportet quoniam ergo & iis etiam quibus fluit sanguis ob renuitatem, euenit esse complicatos alios affectus, non eodem modo procuranda est in omnibus sanguinis crassities, sed si tenuitas sit sanguinis sine vlla obstructione manifesta, licet vti crassis cibis, & cum crassitie refrigerantibus, & cibis, & medicamentis: si verò vlla obstructio sit, satius est agere victu sicco sine crassitie, & medicamentis frigidis, & siccis. Quod si viscus etiam aliquod intemperie frigida laborer, quæ talium vsum impediat, abstinēbimus ab illis omnibus, solum vrentes victu sicco, vt asis carnibus (bonis quidem illis & tenuibus) & exiguo potu, ac si res exigat dabimus potiones dictas contrarias, calidas scilicet & tenues, vt aperiant, totam verò speciem sustinēdi sanguinem collocauimus in aliis auxiliis, reuēlennibus scilicet, siue frictionibus, siue ligaturis, siue coeurtibilibus, & post hæc omnia, in localibus. In quo genere optima sunt siccæ, & astringentia, vt album medicamentum, galla, & alumen. His verbis, quæ incongruentiam grammaticalem continere videntur, ego intelligo, habuisse Hippocratem quoddam medicamentum aridum, album, constans ex galla & alumine, vel solum vel cum aliis similibus facultatibus. Vt ergo soleo puluillum facere ex his ipsis, & balauistis, cyrinis, symphito, & massicæ. Quem insuffillare iubeo in nares foriter. Euenit enim mox, eius mixtionem sanguinem concretere, & vehementer venas obturari. Est enim etiam ipse sanguis fibrosus & obruarus.

Cum Venere vti, aut hircire incipiunt, sanguinem fundunt.

Quandoquidem cum dixisset *de pueris* addit *et ætatem*, significauit non ob Venere vsum fieri fluxus sanguinis, sed ob naturam eius ætatis. Nimirum hircire, hoc est, irritari ad Venetem, incipiunt homines, atque adeo esse Venere idonei, finita pueritia, & ineunte adolescentia, quæ ætas, si anni temporibus velis vitæ tempora conferre, veri est analoga, atque ob id sanguine abundat, hinc fit vt mulieribus tunc primum menstruæ euacuationes fiant, ac si ob eandem aliquam fieri non possint, multis morbis cortipiantur. Vitis eadem causa fluit ea ætate sanguis, multis quidem ex naribus, quibusdam aliis ex hæmorrhoidibus, & quos euacuationes nullæ præstauerunt, solent ea ætate magnis corripi febribus, atque ex illis magnos pati abcessus. Eadem autem ratione, quæ huius ætatis ho-

Aminibus, adhuc bene valentibus, solent fluxus sanguinis accidere, debent & per morbos expectari: iuxta illud, quod tertia particula thorismi dicitur, ad pubertatem accedentibus pleraque ex his accidunt, & febres magis diuturnæ, & ex naribus sanguinis fluxiones. Durat vero ea promptitudo vsque ad finem iuuentutis. Nam in prognostico dicitur, Verum sanguinis eruptio magis expectanda est iunioribus triginta quinque annis.

B*In mulierum congressibus quidam crepitum emittunt, vt Arcefilans; quidam quum sunt congressuri, horrent, & corrugantur: quibusdam autem postquam congressi fuerint, venter inflatur, vt Damagora.*

Hæc oratio enarrata iam est prius in hac ipsa sectione huius libri, ferè enim eadem sententia est scripta cum eisdem verbis, præter quàm quod hic hora, seu pars ipsius congestus, quæ contingere solent hæc læsiones, explicatur, & adiecta hic sunt illa verba, *et si pueri horrent*, *et postquam congressi fuerint*, quæ illic desiderabantur. Ego verò illic ambas orationes coniunxi, vt ex se mutuo explicarentur. Solum illam particulam, rugosi, non explicui, quàm idem solam nunc oportet explicare. Dixi quibusdam iam congestis, cæochymis quidem existentibus, ob statum & malignum fumum per partes agitarum, fieri solere horrorem. Horrentium epichetum est, rugosi, vt paulò infra dicitur à Galeno in commentatione orationis illius: Omnis extenuatio laxat cutem, quia hortensium cutis videretur corrugari, tamen non tam corrugatur, veid, quàm ipsemet qui patitur, videretur sibi corrugari. Itaque *postquam congressi fuerint*, nihil aliud est quàm si simpliciter diceret, eos horrete. Vt Galen. notat, plurimæ ac variz erant lectiones. in quibusdam enim eodictibus habebatur, *postquam*, in aliis *postquam*, *postquam*, & hæc omnes hucusque durant. Ego hæc maxime probaui, quam sequutus Galenus est.

E*Mutationes cauenda sunt.*

Nonnullos scriptores dicit Galen. adieciisse huic orationi, ætatem, vt hæc esset tota oratio, mutationes ætatem cauendæ. Verum perperam, quia præterquàm quod in veratissimis libris Galenus id non reperiebat, præter rationem quod vniuersum & citra omnem limitationem dici potest, contrahatur in vnum quiddam, de quo omnium minime dici poterat. Nam mutationes cauendæ sunt quæ periculose. Huiusmodi vero sunt, quæ repentinz, iuxta id quod secunda particula aphorismorum dicitur. Multum & repente euacuare, aut replere, aut calefacere, aut refrigerare, aut vtrunque corpus mouere, periculosum est, & omne nimirum est naturæ inimicum, quod vero paulatim fit, tuto fit, tum aliis, tum si ab altero ad alterum transitus sit. Repentinæ ergo mutationes periculose sunt, calefacendo, refrigerando, humedando,

& succando, & replendo, & vacuando, & mouendo, quæ aëris, in quo versantur & reliqui victus mutatione fiunt. Vt cum tempus affert mutationes repentinas, aut cum quis se transfert ex loco in locum, vt oppido, aut habitaculo temperiè valde diuerso, aut a multo cibo ad exiguum, aut ex exercitatione assiduâ ad otium, aut contrâ. (Quæ omnia vitanda sunt.) Secundum ætates verò, non potest fieri repentina mutatio. Quare ad illam omnium minimè oportet hanc referre orationem, sed solum intelligere mutationes non qualescunque, sed magnas & repentinas. Atque ita pertinebit sententia ad sanitatis tutelam, & ad morborum curationes, Nam & in victu salubri, & in curatione morborum, sunt tales mutationes cauende. Pertinebit etiam ad mutationes quæ spontè fiunt, & ad eas quas ipsi homines faciunt, siue æroti, siue medici. Nam utreque vitantur, etiam non eodem modo: sed hæc omnino dimissæ (iubemus enim; ne quid tale circa ærotos fiat) illæ obiectu contrariarum causarum, temperatæ. Iubemus enim cum repente incipit flare boreas, concludi fenestras, conuertere in partem aliam cubile, & eos qui non decumbunt vestibus duplicibus indui: contrâ si calor esse repente ceperit, ventilationibus, & irrigationibus occurrimus, & cubiculorum parietes nudamus, & nostra indumenta deponimus, & aliud quidvis iuxta hanc regulam facimus.

Paucitas cibi, sine lassitudine, sine siti.

Quidam intelligunt his verbis dici, eum qui paucio cibo vitur, solere sine lassitudine, & sine siti transigere, itaque pauci cibi usum liberare à lassitudine & à siti: alij intelligunt finem sibi detrahendi esse, vt sit homo sine lassitudine; & sine siti. Hoc est, vtendum esse ea parsimonia, cen cibi paucitate, per quam homo sine lassitudine & siti sit, quod hæc sint signa vtilis & sapientis, seu cibi vtiliter extenuati alij intelligunt, seruanda esse tria hæc ad rectè tuendam valetudinem, vt paucio cibo vitur homo, & quoad vterq. possit sine lassitudine & sine siti sit. Verba omnes has interpretationes ferre possunt, vt & in plerisque aliis dictionibus Hippocraticis euenit. Quia proprium est hoc nimij breuiloquij, vt propter obsecritatem verba multis sensibus pateant, quapropter nulla alia est ad interpretationem via idonea, quam examinare ipsa sensa, ratione & experimentis scorsum, ac deinde conferte, vt consiler quid sit maximè consentaneum. Cibi abstinentiam tollere lassitudinem & sitim, in quibusdam verum est, non tamen simpliciter, neque in omnibus. Nam pituita aut sanguine abundantibus cibis affert lassitudinem, crudelitatem, aut multitudinem augendo: & sitim, omnibus qui pluri quam indigerent vsi sunt, quia cibis multas facit redundantiam sicce substantiæ, redundantia verò sicce, facit penuriam humidæ, & indigentia humidæ substantiæ facit sitim: cibi igitur paucitas talibus & lassitudinem tollit, & sitim. At verò bile flaua, aut atra redundantibus, cibis tollit lassitudinem & sitim. Temperantur enim cibi qualitate magis quam quantitate replentur: quare cibi paucitas his nocet: sicut enim in vren-temque calorem verit utroque, biliosos dico, &

A attrabiliarios eos, qui visione sanguinis secumfæ. Et sunt tales: nam qui sola secum abundantia, ij liccantur & refrigerantur, quare fame cruciabantur potius per medium quam sitim. Omnes autem ij debilitati cibi penuria amittunt agilitatem, suntque tanquam lassati sibi ipsis oneri. Primus itaque sensus non vniuersim verus est, sed in quibusdam: secundus à primo videtur fluere, & propius accedere ad vniuersim verum. Nam cum biliosi & melancholici indigeant pluri cibo, quam pituitosi & sanguinei, & eius ingestione tardius lædantur, omnes tamen lædi possunt, tamen enim non eadem quantitas fit omnibus nimia, nulli tamen sunt qui indigeant quantumcunque omnibus igitur vtilis est quedam parsimonia, non tamen omnibus æqualis. Parsimonia autem moderatæ, seu cibi moderatè accepti (quod idem est) satis congruens est definitio per quam minimè sentit homo lassitudinem, neque sitim. Nam siue biliosus, siue melancholicus, siue sanguineus, siue etiam pituitosus homo sit, si plus satis priuatur cibo, debilitatur & arefcit: quidam verò arefcunt cum calore ventre, vt biliosi, & attrabiliarij, & hi sitient vehementer: quidam cum frigore, & hi magis famelici, omnes igitur lassantur, & sitiunt, aut saltem lassantur. Cibi ergo abstinentia, quæ neque lassitudinem, neque sitim infert, nimia non est. Non igitur ineptè velut definitionem abstinentiæ nondum nimis posuerit quis, duo hæc, sine lassitudine, & sine siti esse, quia nimia, est hæc, aut eorum alterum facere. Quamquam sunt alia signa potiora scripta ab Hippocrate nimis abstinentiæ, vt quod debiles sunt, & infirmi, & ad quodvis opus timidi, & osculum ventriculi dolent, & viscera pendere ipsis videntur, & calidam ac chloram vrinam mingunt, & alui egestio comburitur. Quibusdam etiam os amarefcit, & oculi cavi sunt, & tempora palpitant, & extremæ partes refrigerantur. Hæc boni de ratione victus in morbis acutis, quæ cum paucipus sint signa defectus cibi, inedia nondum nimis optima definitio erit, per quam nihil horum eueniet. Possunt verò etiam hæc ad illa referri: Nam quibus sit debilitas, accidit etiam quedam lassitudo, & quibus os amarefcit, sitis. Itaque secunda hæc interpretatio satis videtur digna. Tertiāquam Galenus sequitur, consileremus. Dicit, proponere nobis Hippocratem tria, quæ nobis ad oculos esse semper debeant in vniuersa victus ratione, cibi paucitatem, & non lassari, & non sitire: itaque vtendum semper esse paucio cibo: neque mouendum, vel utcumque laborandum, donec defatigetur corpus, neque vsque ad sitim aliquam faciendum: sed vt diu duret sanitas, retinendum est corpus cum paucio cibo, & sine lassitudine, & siti. Quid ergo, nunquid beneuolentibus paucio cibi vtendum? Ac non potius mediocri, aut etiam crasso? Nullo igitur oportet robore, neque robustos conseruare, sed beneuolentes etiam permittere mediocriter debilitari. Hoc verò præter rationem est. Cur enim firmum naturæ hominem, & qui multum cibum sine noxa ferri possit, infirmum reddas, pauciorum tribuens? Porro si lassitudo adeo est cauenda, cauenda etiam esset exercitatio. Nam exercitatio est meta, vt corpus lassari incipiat, velut in aphorismo dicitur: at verò Hippocr. in salubris victus institutione ponit laborem & cibum. Rur-

B

C

D

E

F

sum si sitis est adeo capienda, consilium est mox ac quaecunque causa sitis incipit homo, potum capere quantum velit, neque vniquam parcere potui, quod tamen experimento docti, homines prudentes non probant. Certè intelligendum venit, cibum paucum vocari, non quidem parcum, sed prout cuiusque hominis constitutione, eum qui non redderet & granet: capendam verò lassitudinem & sitim, non quamcunque, sed nimiam: lassandum enim exercitatione corpus, ita tamen, ut ubi lassari coeperit, quiescendum statim sit: sustinenda etiam moderata sitis aliquando, maxima tamen bene sano homini nunquam. Itaque si sitis ex labore, tentandum est quare sedare sitim, si autem ex cibo, somno. Si vero magna sitis sit, neque placeat quiete, neque dormire linat, non est plus satis ferendum, sed capiendus mox potus frigidus, quantitate moderatus. Haecenus igitur verum est, accipiendam cibum paucum, & sine lassitudine & siti transigendum: præter tres dictas, quas Gal. attigit, insinuat se mihi alia interpretatio, meo iudicio longe facilior, & minus exposta columnis, atque iis quæ ab Hippoc. alijs locis dicuntur magis consona. Ea est, eum qui paucio cibo vitur, sine lassitudine, & siti debere transigere. Quia ut dicitur in aphor. Vbi famula laborandum non est: neque verò sitendum quoad fieri possit, ne plurimo potu se replere cogatur is qui ieiunat. Capendæ ergo omnes sitis causæ: ut labor, & ambientis etiam aeris calor: iuxta id, quod de ratione victus in acutis dicitur. Ei igitur qui præter consuetudinem vasa exinanierit, confert hanc ipsam diem transigere sine frigore, sine labore, omnia enim hæc contrariet feret. Itaque intelligi Hippocratem consilium modò, ut is qui vitur paucio cibo, vitet lassitudinem, & sitim: quapropter præter dicta, qua die quis ieiunat; prudenter se geret, si abstinerit à cibis siticulosis, ne aut corripatur febre, aut potu se repleat, distenditque. Vitatur ergo recentibus ovibus, & olenibus, & fructibus, & fluviatilibus pisciculis, & maxz generibus, & lacte; à salinis verò & acerbis abstinere.

Omnis extenuatio laxas cutem, deinde circumtenditur, resectio vicversa. Cutis corrugatio concidentis, extensio renutrita. Quod horridum, quod lene, alterum alterius est signum, velut quod subtile, quod subrubrum. Eadem ratione mamma demittuntur, graciles autem reuellantur & circumtenduntur, nec fieri propter eam causam quis putaverit, sed quia caro renutritur.

Com extenuantur corpora, primum quidem, & dum adhuc sit consumptio carnis, & aliarum partium mollium, laxatur cutis, ut quæ tensionem, quam subiecta faciebat caro, remittat: deinde, hoc est, cum plus iam procedit consumptio, & ipsa cutis iam arefcit, circumtenditur: resectio contrario modo procedit. Nam primum quidem qui pinguescere incipiunt, cutis tensionem comparant, ob subrescentem carnem: deinde verò non renutrita solum carne, sed & cute ipsa aucta, & substantiæ, ut dicunt, humectata, plicæ fiunt, & carniæ

A per totum corpus rugosa inæqualitas. Hæc quidem omnia experimento quotidiano cognoscimus. Videmus enim consulescentes, & quancunque causa citra talem graciles, rugas habere, & laxam cutem, quam digitis facile sine subiecta carne comprehendis: tabis verò signum est distentio & ariditas cutis: quod vel breui fieri solet per colliquantas febres, ut & in initio prognostici animaduertit Hipp. dicens, & cutis circa frontem dura, & circumtenta, & arida. Iam verò pinguescentibus fieri carnem solidam & distentam cutem, præpinguibus verò esse multas, easque magnas rugas, dalarata plurimum cute à subiecta humiditate, nemo non animaduertit. Reddit mox causas quibus hæc fiunt, & signa quibus distinguuntur. Nimirum cutis concidentis corrugatur, & quæ renutritur extenditur. Vtriusque signum est in extenuatis & in auctis. Horridum vocat inæqualitatem, & cutis asperitatem illam, quam facit corrugatio, ut paulo antè diximus, enarrantes orationem illam, in mulierum conuersibus quidam crepitem edunt. Horridum ergo est effectus corrugationis. Est ergo accedens cutis concidentis: laxitas vero sit extensio, quare est accedens cutis renutritæ. Verum quia rugæ duabus ex causis fiunt, quibusdam enim quod incipiunt gracilescent, alijs quod nimium iam processerit crassities. Distingunt hæc signa duo in extenuatis & in auctis. Nam qui rugas habent ob gracilitatem, plerumque sunt pallidi, aut chlori: qui vero ob crassitatem, & nutritionem nimiam, sunt rubri, utpote pletborici. His dictis, profer exemplum in mammis, cum enim in nulla corporis parte sit cutis adeo laxa, quare adeo nunc contrabatur, nunc distendatur, in illis magis quàm in vlla alia parte apparere quod dictum est. Ita (inquit) enent mammæ gracilescentes primum demitti, & deorsum concidere, ut quum nutricibus gracilescent; amplius autem gracilescentes, ut cum iam arcescunt senescentibus, reuelli & circumtendi. Atque (inquit) nullus utique putaret ob hoc fieri, qui scilicet nesciat ea quæ dicta sunt: sed renutrita carne hoc fit, id est, sed renutrita carne fieri potabit: vel, sed renutrita carne hoc fit aliquando. Quasi diceret, nullus putaret fieri ob hoc, quia aliquando fit renutrita carne.

B

C

D

E

Iugula manifesta, vena conspicua.

Hæc proximis verbis rectè adiacent, utpote pertinentis ad eandem doctrinam. Sunt enim etiam hæc signa gracilitatis. Iis enim qui extenuati sunt, iugula eminent, & vena conspicua sunt; iugula quidem, quia caro est consumpta: vena verò, & ob hoc, & quia nonnunquam redundantia vitiosi sanguinis est causa extenuationis.

F

Prodius interficiebat febricitantes multis deambulationibus, luttis, & calidis somentis. Affectus febricule sunt inimici fami, deambulationibus, luttis, cursibus, frictioni. His enim labor labori additur.

Prodicum notat, quod febricitantes malè cora-
ret, ac potius interficeret, cogens currere, luctari,
fricari, inambolare (hoc enim *mens dicitur* significatur)
& inediam sustinere, & calidis vi foveoris. Red-
dit causam ob quam censet illum hac curatione fe-
bricitantes interficere, dicens, febriculosi affectus
(id est, febris, aut quæ febrem comitantur symp-
tomata) inimici sunt fami, circuibus, luctis, cur-
sibus, & frictioni. Ille igitur addebat, laborem la-
bore in ipis; & ita interficiebat. Febriculosos affe-
ctus esse inimicos circuibus, luctis; & cursibus,
& frictioni, id est, lædi eos, qui febricitant his e-
xercitationibus haud dubium est; tamen inimi-
cos etiam esse fami, non tam est manifestum. Cur
enim si febris fames est inimica, febricitantes
transfertimus ad victum tenorem? Labores enim vt
inimicos febris, merito febricitantibus inter-
dicimus, iubentes in lecto decumbere, ac saltem
in domo se continere: cibos verò cur tollimus?
Sunt enim illi amici, si fames inimica. Quod si di-
cas, non esse famem febi inimicam, nec victum sa-
nem, sed eum qui sit tennior quàm res exigat, sa-
nè hoc modo non est, quod famem inimicam dice-
ret potius quàm cibum. Non enim minùs, sed vt
Galenus censet, etiam magis nocet dare crassio-
rem, quàm tenniorē. Itaq; hac ratione potius di-
ces cibum inimicum, quàm famem inimicam.
Cùm præcipue febris per se nunquam perat cibos,
ac multò minùs cacochymia ex qua oritur febris.
Ob febres igitur nulla fames videretur esse inimica, ob
facultatem verò, cùm est nimia, inimica est, non
quidem ea peculiariter, sed vt aliud quidvis, quod
sit nimium. Proinde ne intelligas famem per se ini-
micam esse febris, tamen enim sunt paucæ que-
dam, quas peperit fames, quæ cibo curantur, in
commune tamen id dici non potest, ob dictas nunc
causas, sed Hippocrates carpit victum quo
Prodicus vtebatur, qui simul inbebat ægros exerce-
ri & fricari, & calidis foueti, & cibum præbebat
pauciorē, quàm alioqui oporteret. Hoc verò du-
plex error erat, cum enim cibum pauciorē da-
re esset per se periculosum, tamen multò pericu-
losius cum homines laborarent, quia vt dicitur ab
Hippocrate, vbi fames laborandam non est. Ita-
que cum dicitur, affectus febriculosos esse inimi-
cos fami, circuibus, luctis, cursibus, & frictioni,
non oportet hæc separatim accipere sed con-
iunctim, vt intelligas inimicos esse, non quidem
fami seorsum, sed toti huic victui.

*V*enarum rubor, linor, pallor, aut laterum
dolores laxi accidebant.

Hæc mala intelligit Galen. accidere ijs, qui pèt
febres eo victu vtiuntur, quem Prodicus instrue-
bat: non tamen singulis omnia, sed omnibus eorum
aliqua. Omnibus enim plus satis exercitatione & sa-
me cruciatis fit venarum rubor, aut liuor, aut pal-
lor, aut dolores laterum molles. Vocat, vt omnes
ante Galenum enarratores censebant, quibus ipse e-
tiam subscribit, molles dolores laterum, eos
qui verè pleuritidis oco sunt, sed laterum dolores
sine inflammatione. Si enim medicorem habent san-
guinem, in tuborem eis accolluntur venæ: si verò
sebiles sint, sunt liuidi: si sunt biliosi, eliori sunt.

A Dolores verò laterum sunt, ob laborem nimium
instrumentorum respirationis, & ob fluxiones io
illa concitatas. Non mirum autem, si aliquando is
sit corporis apparatus, vt io biliosas pleuritides si-
niantur ij dolores.

*S*itim cohibet os claudere, tacere, ventum
cum potu frigidum inducere.

B Optimam cautionem continet oratio hæc, ne
quem suis fatiget: os claudere, ventum frigidum
inspirare, & potu frigido vti hæc qui facit, & quie-
tus manet, neque cibis vtiatur siticulosus, si sanus
quidem degit, sine siti est: si quàm maximè tenetur
affectu aliquo præter naturam siticulosus, tamen si-
tim moderatius fert. Hanc ob causam, æstiuo tem-
pore, sanis, & quibus otium est, vt sanitatis stu-
deant tutè, præcipio, vt domi se continent quieti
in cubiculo temperaro, vestibus moderatis indu-
ti, & os habeant clausum, taceantque, & aërem
quem sunt respiraturi, si res exigat, ventilatoe,
aut quascunq; alia arte temperent, & aquâ, vinum-
vè, vt cuiusque fert consuetudo, refrigerari cu-
rent, alij ninae, alij recondentes in subterraneis, alij
sub dio exponentes, vt cuiusque est temperies, &
consuetudo. Eadem & ad febricitantes fieri iubeo

C plas aut micus, vt est morbi tempus vniuersale, &
hora paroxysmi. Illud verò est nobis semper caræ,
ne plurimi egroti lecto assideant, neque omnino il-
lum inuisant, ne illorum frequentem aërem qui in-
spiratur calfaciat, & ægrotus multa cogatur loqui,
itaque ob id sitis augeatur & febris. Ventum frigi-
dum, & potum frigidum sitim tollere consue-
tum est rationi, quandoquidem sitis caloris & si-
citaris soboles est. Verum non omnis sitis est ea-
dem medela, neque omni æquè succurritur fri-
gido aëri, aut potu, sed vt cuiusque est causa. Ei e-
nim quæ ex caloris magnitudine nascitur, qua pas-
sione plerumq; laborat thorax & pulmo, aëre fri-
gido succurritur melius quàm potu, & potu non tam
multo, quàm frigidissimo: ei verò quæ noonem-
quam sit ex sicca intemperie sine humore, aut cum
humore salso, aut acro, qualis plerumque ex ven-
turo aut hepate est, melius succurritur potu
quàm aëre, & talem quidem sitim sedat potus æquè
eodem tepidæ. Itaque hic eius præcipue sitis mede-
la traditur, quæ ex vehementia caloris nascitur, per
quam etiam os claudere, & tacere est consuetissi-
mum. Si tamen liceat per febrem os claudere. Non-
nulli enim dum febris viget coguntur hiare, quos
si os claudere cogas, fortasse strangulabis. Verum
ore clauso recipitur redditurque spiritus per nares,
& oris salina coferuatur malus, qui loquendo
plurimum dissipatur, præterquam quod in otis pas-
sibus excitatur magna caliditas. Cur igitur ad sitim
cauendam raoti sit momentari taciturnitas, & os
clausum, hæc sunt causæ.

E

F *O*ccasiones considerande sunt ex quibus la-
borare quis incipit, siue ex capitis, siue au-
ris, siue lateris dolore. In quibusdam autem
dentes, & in quibusdam bubones signum ex-
hibent.

Vlcera & tubercula quæ erumpentia febres indicare possunt, si non accedant, indicationem tollunt. Si verò interius relinquantur, certissimas & celerrimas recidivas afferunt.

Hæc duæ orationes eisdem omnino verbis occurrunt scriptæ libro secundo, in calce sectionis primæ, ubi & enarratæ à me sunt.

Sata rotunda delirium portendunt, qualia in pleno appaerunt.

De hac spuri specie scriptum est ab Hippocrate in prognostico, atque à me in commentarijs, quod quidem significatæ pituitam crassam, & calidam in pulmone intemperiem Galenus censet, atque proinde tabem minari potius quàm delirium, tamen & delirium etiam asserre possit pulmonis ea affectio, quod calidi fumi copiose mittantur in cerebrum, id verò vnum quiddam esse videtur eorum quæ fieri possunt, non quæ crebri sunt, atque ob id fortasse scribete curauit Hippocrates exemplum, atque ubi acciderit. Censuit enim Sabinius Plenum nomen esse oppidi.

Hæmorrhoidum fluxu laborantes, neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagadæna, neque furunculis, neque tumoribus terminati formam referentibus corripuntur, neque forsam lepra, fortasse autem neque alijs.

Hæc oratio, & aliæ omnes, quæ sequuntur usque ad tertiam sectionis quartæ, eisdem verbis, & eodem ordine scriptæ sunt in calce libri de humoribus: sunt verò consona etiam alijs Hippocratis præceptionibus, quæ per totum hoc opus, & in aphorismis scripta sunt. Hæmorrhoides enim à multis morbis liberatæ celebratissimum est, nam & in aphorismo xi. sectionis sextæ dicitur, infanribus si varices aut hæmorrhoides superueniant, infans solutio fit. Hæc à pleuritide, & peripneumoniâ, & phagadæna, & furunculis, & tumoribus terminati formam habentibus, & alijs eiusmodi, dicit liberatæ: quorum quædam sunt infanæ (quæ scilicet sine febre fit) analoga, utpote melancholica: quædam sanguinea potius sunt, tamen si ea etiam possint esse ex melancholico sanguine. Sunt enim melancholica vlcera phagadæna, vlcera scilicet cancri, & furunculi, qui ex melancholico crassoque sanguine fiunt, & nigra quædam exanthemata in cruribus oriri solita, habentia figuram fructus terebinthi, & lepræ, quæ hoc differunt ab elephantæ, quod non tam altè subiectam carnem, sed cutem teneant. In quibusdam codicibus, quod & Galen. mouet, pro *infan* dicitur, legitur

A *infan* dicitur. Neque sanè omnino malè, nam & alphi sunt in quadam leptæ specie: cæterum hæc est vetus lectio. Plenius & peripneumonia ex redundantia sanguinis nasci solent, aliquando quidem vitiosi, aliquando verò solum redundantis. Verum quia per hæmorrhoidas multus & vitiosus sanguis effunditur, fit meritis ut ab his & ab alijs quam plurimis liberatæ possint. Nam & multitudinem, & cacochymiam possunt soluere, & ab omnibus membris principibus auertere.

B *M*ulti ergo intemperstius curati, talibus affectibus non cunctanter correpti sunt, atque ita perniciose perpeffi sunt.

Quia hæmorrhoides à tam multis & adeo malignis morbis liberant, non debent curari intemperstius, neque aliter quàm adhibita ea cautione, quàm in aphor. scripsit, dicens, Hæmorrhoidas sanant antiquas, nisi vna seruata sit, periculum est hydropem aut tabem accedere. Itaque intemperstius curantur hæmorrhoides, quæ cacochymo adhuc corpore curantur repente, nullâ seruata, quæ corporis necessitati subseruiat. In aphorismo communis est hydropem aut tabem, hoc loco dicit, cum quis intemperstius curatur, fieri ut illis ipsis malis corripiatur citò, à quibus hæmorrhoidum præsentia liberabatur. Neque tamen est vlla repugnantia, sed eadem res dicitur, præter quàm quod in aphorismo restrinxerat rem ad duas affectiones pessimas, hic latius, liberiusque rem produxit, dicens, in easdem affectiones citò incidere homines, à quibus per hæmorrhoidas liberabantur. Quod sanè rationi consentaneum est, iuxta rationem epilogisticam, & communem omnium consensionem. Ab illo enim morbo dicimus nos missione sanguinis, aut alio quopiam auxilio præseruari, in quem eo auxilio sublato effusius casuri. At verò hæmorrhoides non liberant solum ab his, quos nunc recensuit, sed etiam ab hydrope, & tabe. Fit hydrops sæpe calore naturali hepatis sanguinis multitudine suffocato, quo casu cum possint hæmorrhoides à multitudine liberatæ, necesse est ab hydrope etiam possint. Tabes verò sæpissime incipit à spuito sanguinis, quod nihil potest melius tollere quàm hæmorrhoides, id verò tollentes, constat ab imminente tabe liberatæ. Igitur qui intemperstius curatur, timendum est ne aliquo morbo eorum quos nunc recensuit, corripiatur, fiat quæ pleuriticus, aut peripneumonius, aut contrahat exedem cancerum, aut multos furunculos, aut exanthemata terebinthina, aut lepram, aut simile aliquid, aut etiam incidat in hydropem, aut tabem: idque vel per priores alios morbos, vel per se, & nullo alio morbo prægresso. Vtrumque enim fieri potest, velut in tabem per pleuritidem, aut peripneumoniâ, aut hæmoptoyæ passionem: in hydropem, per vteri, lienis, aut hepatis durities, aut etiam prægressis, lepta, aut elephantæ, aut quàm plurimis tuberculis. Nam ex his omnibus cū sunt maligna, procedi solet ad illa pessima, & postrema mala, tabem, dico, aut hydropem. Vt hac rursus ratione in idem recidat, quod hic & in aphorismo dicitur. Dicitur enim hic (quod & verissimè est) & ita perniciose perpeffi sūt: quod nihil

aliud significat; quam hæc mala cum sunt ob repressas intempestivè hæmorrhoidas, perniciosiora esse, quam alioqui esse soleant, unde fit ut in illa terminentur, & interimant. Huius causa est, quia cum consueta aliqua evacuatio cobibetur, omnia periclitantur simul, atque metus est, ne simul cum eo quod apparet, aliquid etiam latens & perniciosum in parte aliquâ princeps fiat: ut certe solet fieri sæpe. Adeo ut vel vulgi iam sit opinio, cum vetus aliqua evacuatio cessat, periclitari hominem de vita: idque siue chirurgus cessare faciat, siue sponte cesset. Tamen non semper eadem causa sit, sed cum sponte id fit; aliquando moriatur homo, quia ea evacuatio cessat, aliquando ea cesset quia homo moritur.

Atque istud in alijs abscessibus velut fistulis contingunt, qui aliorum medela sunt.

Non tantum hæmorrhoides antiquæ dicta cautione curari debent, sed & quicunque alij abscessus sunt aliorum medela, ut fistula. Fistula est longus sinus callosus, per quem aliquid expurgatur assidue. Fieri potest ubique, frequens autem est iuxta antrum. Illud vero *des eiphses*, non dicitur solum gratia exempli, sed ut explicetur modus eorum abscessuum, qui tali indigent cautione. Non enim omnes abscessus tam cautè curatione indigent: quidam enim non sunt decretoriè, sed prorsus rationis symptomatis, & sunt omnino inuiles: sed neque omnes qui sunt aliorum medela, nisi sunt medela, ut fistula. Si enim febris aliqua terminatur in bubonem, aut paronidem, nemo constituitur curare, nullo (si fieri possit) relicto vestigio: quamquam profecto abscessus ille febris medela fuerit. Sed quidam sunt abscessus, qui assidue ex morbo aliquo facti illum substituerunt, alij qui non ita, sed consuetudine quadam assidue aliquid ex præstantioribus partibus excipiunt, aut vacuant, & hæc sunt medela morborum ut fistula, id est, assidue aliquid detrahentes excrementi, & ita ab alijs morbis præservantes. Definitio autem eorum abscessuum diuturnitas est. Fiant enim diuturni, quod natura iam consuetudinem eo mittendi comparaverit. Igitur in omni diuturno abscessu, siue sit cum evacuatione, ut vlcus, fistula, aut hæmorrhoidis, siue etiam sine ea, ut vetus podagra, videndum est quomodo cures. Plurimum enim eorum, qui tali morbo multis iam annis laborarunt, solent in nephritidem, aut asthma, aut etiam aliquam apoplethicum passionum incidere: ut contra multis fieri vidi ex epilepsia, aut alio cerebri magno morbo, nephritidem, & ex hac podagram. Tales igitur abscessus cum iam sunt inueterati, etsi cum evacuatione non sint, dico esse aliorum morborum medelam, ut fistulas: quapropter sæpe curati prohibeo, aliquando etiam fieri suadeo, iuxta præceptionem Hippoc. quæ sequitur.

Quibus in morbis facti decubitus liberant, eosdem si ante fiant prohibent.

Nullus interpretum dubitat oratione hac significati decubitus, seu abscessus, qui morbis aliquibus supervenientes, eos tollunt, eosdem si fieri

anticipent, fieri prohibere. Verum hæc verba videntur ineptum sensum reddere, aut omnino in aliam ferre interpretationem. Nam illud, antefacta, non videtur dici de decubitu, sed de ipsis malis. Si verò ipsa mala antè facta sunt, quomodo decubitus fieri ea prohibet? Decubitus igitur ipsum oportet esse antè factum, non mala. Hanc ob causam quidam interpretum pro *προγεννηται*, id est, antefacta, censebant legendum, *προγεννηται*, ut referatur ad *κατα*, id est decubitus, itaque decubitus prius factus. Arqui profecto leuicula quadam literarum mutatione redditur rora oratio perspicua. Verum Gal'culus hæc erat lingua materna, censet hanc quoque phrasim, citra mutationem ullam, posse ferre eundem sensum; quare de ea re non oportet nos admodum laborare, sed rem ipsam expendere, & intelligere nihil aliud dici, quam eos decubitus, qui morbos aliquos solent superveniendo tollere, eosdem anticipando fieri prohibere. Dicitur verò nunc nomen decubitus de abscessu, neque sanè aliud est apud Hippocratem, nisi fortè ratione. Dicitur enim alterum ab ascendendo, alterum ab incuribendo. Constat verò idem esse, quod ab una parte abscedens in alteram incumbit. Constatque Hippoc. de eisdem prorsum rebus agere, cum nuper diceret, in alijs abscessibus qui aliorum medela sunt, & nunc dicit, quibus in morbi facti decubitus liberant. Idem enim est in quibus morbi facti liberant, & qui aliorum medela sunt; & ambo hæc eisdem congruunt. Idem enim abscessus, qui, quia sunt aliorum morborum medela, debent cautè curari, illi inquam iidem, quum morbos anteverunt, ab eis præservant. Nam hæmorrhoides sunt de quibus præcipuè susceptus nuper est sermo; quas dictum est præservare à melancholicis passionibus. Hæc autem eadem, ut in citato apboris dicitur, supervenientes tollunt illas passiones. Verum (quod ad curationem præstat magnam utilitatem) oportet hic scire, posse hanc sententiam pertinere ad partem prognosticam, & ad curaticam. Ad prognosticam quidem, si intelligamus *προγεννηται*. I. quæ antè sunt accidere spontè ac per se: ad curaticam, si à medico fieri. Nimirum abscessus qui quum superveniunt, solent morbos tollere, iidem si fieri anticipent, liberant, aut etiam si fieri non anticipent, fiant tamen arte, & à medico. Cum spontè sunt, & liberant, ad medicum nihil aliud pertinet, quam agnoscere, ac prædicere futurum, ut homo ab imminente aliquo morbo liberetur: cum autem morbus imminet, & abscessus non fit, optimè curantis consilium est, eundem facere, quia decubitus, qui superveniens liberat, antefactus præservat. Hac causa multis quibus à magnis morbis male timeamus, curamus hæmorrhoidas facere: alij etiam crura fricamus fortiter, non aliam ob causam, quàm ut fiant podagrici, quod quidem est morbum morbo curare, aut morbo à morbo præservare. Verum

non indistinctè pro quovis morbo, quovis abscessus procreandus, sed pro quocunque, is qui tali morbo solet vtiliter succedere. Nā Hippoc. dicit, non simpliciter decubiturum à morbo præservare, sed in quibus facti liberant. Oportet ergo per re ipsam medicari, quæ quibus solent succedere, vtiliter, & inutiliter, ut quæ inutiliter solent succedere prohibeas quoad possis; quæ vtiliter, nisi spontè

F

fiant, aut morbus videatur esse benignus, & bonæ indicationis (tales enim circa abscellum solentur) facias, aut etiam antequam morbus hominem preheudar, si ab illo vehementer times. Velut si qui superiori anno ab epilepsia liberatus est superueniente podagra, nunc à podagra se sentiat valde liberem, tentetur vero incubo, aut vertigine, aut omnino capitis graninare, prudenter facies, si pedes frictione, & labore laceraveris, ut à capite avertas.

A *Literis loci humores excipiunt loca, aut propter dolorem aut gravitatem, aut aliud quodvis, aut quia cum illis communionem habent, liberant.*

Ad eandem doctrinam pertinet hæc oratio, & quæ hanc antecessit: dicitur enim nunc, quædam loca liberant à morbis aliarum partium, quod eorum recipiant excrementa: nimirum, ut dictum est, decubitus rollunt, factos morbos & à nondum factis liberant: tantum addit nunc Hippocrates, quod ad causas abscelluum spectat, videlicet, si abscellus in quampiam partem ob dolorem, vel pondus, aut communionem, quæ illi cum parte affecta intercedat, aut ob aliquid aliud, ut exercitationem nimiam eius partis, aut calidam intemperiem, aut ob debilitatem. Nimirum omnis ex partem motus, necesse est fiat, vel quod trahatur, vel quod mittatur, vel quod veniat. Trahitur quidem calore, frictione, & motu partis recipientis. Mittitur ob partis mittentis laborem, cuius causa est, vel grauitas, vel qualitas maligna: venit autem ob pondus, vel vacuum; porro, ut quod venit, vel mittitur, in hanc ex hac parte veniat, aut mittatur, causa est dolor, aut debilitas partis recipientis, vel huius cum illa communio, seu rectitudo. Indicitur enim esse sepe esse quarundam partium communionem, ob quam in sese mutuo sua mala refundunt, idque ob rationem quandam multis communem, ut dextrarum cum dextris, sinistrarum cum sinistris, aut ob peculiarem & propriam, ut genitalium cum vocalibus.

P *Propter conuersionem sanguis non amplius exit; sed secundum humoris cognationem huiusmodi exspunt.*

Non solum in sanguinis excretionem verum esse competes quod nunc dicitur, sed in omni alio sanguinis effluxu, ut in muliebri profusio ex vtero, & in mictu sanguinis, & in dysenteria croenta. In his enim omnibus adhuc recentibus sanguis exit: inueteratis verò muratur excrementum forma in album, purulentum, aut biliosum, flauum, aut vinde, aut nigrum propter conuersionem sanguinis, secundum humoris cognationem: quia sanguis redundans in aliquam cacochymiz speciem vertitur, hanc aut illam pro temperie cuiusque hominis: biliosus enim in bilem, melancholicus in melancholiam vertitur, humidis valde cum calore, suppuratur. Similes conuersiones fiunt in febribus, incipientes enim à sanguine degenerant sepe in alios species,

A ob ipsius sanguinis conuersionem. Vbi ego legi *temperamentum*, idest conuersionem, innuebatur in antiquioribus codicibus *temperamentum*, idest inclinationem, verum quia Gal. probat censuram veterum interpretum, qui pro *temperamentum* censebant legi *temperamentum*, placuit hanc lectionem sequi.

Q *Vibuscum horum sanguinem detrahre tempestiue licet, in alijs autem velut in his æquum non est.*

In quibusdam eorum quibus sanguis exit, dicit oportere mitti sanguinem, in alijs minime. Vnica autem illa vocula, tempestiue, exponit quibus sit mittendus, & quibus secus. Nam mitti debet tempestiue, & antequam sanguis in aliam naturam degeneraverit, postea verò minime. Constat autem hoc dici in dicatione ab humoris specie, ob quam in illis quidem mitti sanguis, in his expurgans medicamentum dari debet: verum hoc nihil prohibet, quin in eis etiam quibus mutata sit eius species mittatur aliquando sanguis secundum alios de mittendo sanguine præceptiones.

I *n croenta spuentibus impedimentum affert anni tempus, pleuritis, bilis.*

Galenus, atque ut ipse refert, alij eo citiores, intellexerunt dici hic impedimentum, quod sanguinis missionem prohibeat: exterum durum est dicere, pleuritidem prohibere mitti sanguinem, neque Galenus se satis expedit ab hac difficultate, quantumvis laboret: quapropter ego in alium sensum feror, intelligo quæ impedimentum dici, non quod missioni sanguinis, sed quod curationi simpliciter obstat: quasi diceret, cum qui sanguinis spuro laborat, tempus anni valde aut calidum, aut frigidum, & pleuritis (si scilicet simul teneret pleuritide, ut fieri solet) & bilis toto corpore tendans impedimento est quominus recte curaretur: quia uterque temporis excessus, & frigus inquam & calor augeat sputum croentum, illud rumpens, hiellaxans: bilis exedit: quare cum sine hi tres modi quibus possit sanguis excreari, rupio, anatomis, & corrosio, necesse est tria hæc obstant curationi, præterquam quod bilis perit vsum expurgantium, quæ aperientia sunt & irritantia. Iam vero pleuritis non aliter curari potest, quam excreando, neque *aliquando* quicquam petie magis, quam thoracis quietem, ut ne loqui quidem talibus libenter permittamus: obstant igitur magis petere hæc omnia spuri croenti curationi. Hanc esse legitimam loci huius explanationem, facile intelliges ex Galen. in commentario aphorismi 16. sectionis 1. Ibi enim ita est scriptum. Etenim contraria indigent curatione sputum sanguinis, & pleuritis. Si igitur contraria perant auxilia, necesse est mutuo sibi impedimento sint.

SECTIO QVARTA.

Quibus ad aures circa indicationem exorta tubercula non suppurauerint, his euanescentibus morbi reuersio contingit secundum rationem reuersionum. Reuersione facta iterum attolluntur & permanent, velut februm reuersiones, in simili circuitu. In his aliquid ad articulos abscedere posse sperandum.

Dixerat Hippocras in proxima sectione, omne suppurans esse sine recidina, vnde collegimus, quod non suppurat non adeo sine recidina efficiuntur quam sententiam dicit nonc. parotides, quæ per morboi om acutorum indicationes fiunt, nisi supparentur, reuersiones habere, atque adeo barum quasdam solere pluries & solui, & reoerti secundum ipsos febrium circuitus, & talibus solere postremo fieri abscessus ad articulos. *nam dicitur* recidina dicit, vt Galenus libello vocum antiquarum Hippocratis interpret est, detumescere & emolli. Dicit itaque cum non suppurantur, sed inaniuntur, id est, detumescunt, vt videantur resoluta cedemata, solere reuerti, atque nonnunquam pluries circuitum quodam febrili simili, idque cū sit, expectandos esse postremū ad articulos tumores aut dolores. Constat, cum ~~est~~ dictus, *morbus hæmorrhoidalis*, non fuisse necessarium dicere, quæ non suppurantur, nam intelligi poterat, et si tantū dixisset, parotides si euanescent, iterum reuertuntur iuxta febrium circuitum. Nam quæ ita euanescent, & reuertuntur circuitu quodam non possunt esse suppurata. Verū Hippoc. dixit, quæ non suppurantur, vt alluderet ad id quod citato loco dictum est, obiterque insinuat, quæ non suppurantur esse reuersiones, quæ enim suppurantur reuersiones non sunt. Causa verò ob quam euenit, quod in hac oratione dicitur, est, quia quæ non suppurantia sæpe intumescunt, & rursus detumescunt, neque supputationem recipiunt, neque resolutionem integram, sed aut resoluuntur falsò, hoc est, retrocedentia videntur resoluta, aut imperfectè ac per partes succorum influunt, & resoluuntur, vt in paroxyfmis febrium euenit. Vtrunque autem horum malum. Retrocedere enim periculo soli & lethali signum est morbi: per partes influere, & resoluti est contumacia, longi, & difficilis indicatio. Est enim indicatio quædam sæpe teorata, quam tentari taurò est deterius signum, quam ipsi indicationis species est deterius, illis quæ cum euacuatione aguntur. Cum verò sæpe recidens, & abiens tumor possit fieri ob dictas duas causas, redire secundum febrium circuitus indicat id euenire ob resolutionem, quæ per partes agit, eodem scilicet modo quo in ipsis febrium circuitibus. Igitur merito eo apparet signum, expectantur abscessus alij grandiores, qui ad articulos plerumque fiunt, ob ipsarum partium naturam, vt alibi explicauimus non semel.

A *su sunt, quarta die aliquando prodit, & ab abscessu liberat: si verò præter hoc sanguis etiam è naribus effluat, manifeste admodum iudicat,*

Vbi dicit, manifeste admodum, suppleri debet soluitur, constat id ex apophismo 64. sectionis quartæ, qui hæc ipsa oratio est. Tantū hic additur exemplum Amphigenis. Verū hoc nihil facit, vt quis aliam enarrationem desideret, præter eam quam in apophismo commentatione scripsi.

C *vi intestinum in dextra parte dolebat, in quum articulari morbo laborabat, lenius se habebat: postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat,*

Vnū quoddam, idque accommodatissimum exemplum nunc proponitur illius doctrinæ, quæ sectione proxima tradidit dicens, Alterius loci humores excipiunt loca, aut propter dolorem, aut granitatem, aut aliud quiduis, aut quia cum illis communionem habent, liberant: & rursus illius, quam antea tradiderat eadem sectione dicens. Multi ergo intempestinè curati, talibus affectibus non cunctanter correpti sunt. Nimirum illa oratio dicebatur, quatuorundam partium dolores liberare à doloribus aliarum partium: hac verò, si partes illæ, quæ liberant ab aliarum passionibus intempestinè curentur, passionibus eas fieri, aut redire, velut huic cuius hic sit meo. Laborabat enim iostetici dextri morbo, superueniebatque ei nonnunquam dolor articulorum, atque tunc temporis subleuabatur à priori malo, & cum curabatur ab arthritide, redibat aut exacerbabatur intestini dolor. Nam, quia articularis doloris præsentia tollebat dolor intestinalis, sciebat absentia augebatur. Detrahebant enim dolendi causam articuli intestino, quæ non detrahta, necesse erat dolori augeri. Nimirum cum tunc esset tota dolendi causa insumpta, neque corporis apparatus morbosus subleuatus. Vt narrat Galē. altercabatur euacuatōres de hac intestini affectione, dicere volentes ad quod intestinum pertineret, & de hac arthritide, ad quem articuli. Dicebant alij, esse affectionem fuisse dolorem coli, alij decidentiam tæci in scrotum, quod id dextra parte locatur, & à mensesario solutum sit: rursus dolorem arthriticum, quidam mulorum articulorum, quidam pedum, alij coxæ fuisse. Videret enim multis non satis esse commentari autotum vtrū, nisi etiam diuinent. Nam quæ ratione scire poteris, cum Hipp. nihil dicat aliud, quàm cui intestinum in dextra parte dolebat, quod nam intestinum doluerit? Atque an doluerit solum, an etiam deciderit in scrotum? Atque cum solum dicat, articulari morbo laborabat, qui articuli, aut quot doluerint? Nisi probes non posse horum quiduis fieri, sed vnum quiddam necessarium fieri, alia omnino fieri non posse. Ego verò scio virum quandam doctrinā nobilem, & mihi valde familiarem, cum vtrique dolori, intestinorum dico & articulorum sit notus, & vtroque soleat laborare alternare, quasi alter alterum subleuet, laborasse iam sæpe dolore colico sine intestini deci-

V *ripa crassa alba, qualis Amphigeni aderat, in febribus qua cum lassitudinis sen-*

dentia, aliquando etiam decidencia intestini in scrotum: plerumque podagra & chiragra, aliquando etiam ischiade. Itaque possunt hæc omnia fieri, estque omnium ratio & causa eadem. Sed neque quod dicit in dextra parte, aliud quippiam nobis indicat, quam coenisse nunc dextra parte dolere, posset idem euentus in sinistra esse esse parte. Neque quidem ex intestino ad articulos factus est abcessus ob quampiam communionem (nulla enim est) sed propter dolorem, aut granitatem, aut aliud quidvis, ut dicebatur. Porro quod Hipp. dicat in numero singulari intestinum potius quam in plurali intestina, nihil refert, nam nomen intestini cum simpliciter dicitur, significatur totum id quod producit a fundo ventriculi usque ad anum.

Agasis filia cum esset quidem puella, laborabat frequentis spiratione, mulier vero facta non longe a partu lenem percepit dolorem, cumque in sublimem extulisset grave pondus, statim quidem crepuisse visum est aliquidin pettore. Sequenti die asthma & dextra coxa dolore laborauit. Cum hæc doleret, frequenti etiam anhelitu corripiebatur, qui desinente dolore cessabat. Spuebat spumosa, ab initio florida, cum autem confitissent, vomitioni biliosa & tenui similia erant. Dolores quidem maxime vicebant, quando manibus laborabat. Hinc prohibere visum est allium, suillam, ouillam, bouinam: spirandi vero difficultate laborantibus, clamore & ira præcipiti abstinendum.

Hæc mulier haud dubie habebat intra thoracem in suprema & posteriori eius parte, ad duo inquam prima spacia intercostalia, iuxta ipsam spinam, tuberculum aliquod, quod diuersimode crudum peristitit, postea vero labore partus denud exacerbatum, & factum phlegmonosum, & dolens suppuratum est, & postea nixu, quo mulier pondus magnum in sublimem extulit, rupto abcessu, pus in thoracem effusum est. Inde pure resudante intra pulmocnem factum est asthma, & corripiente coxa factus est dolor coxæ. quoniam vero ex eadem parte, & eadem causa coxæ dolor & asthma procedebant, consentaneum erat augeri & minui simul, atque tunc mulierem respirare difficilius, cum doleret magis coxa: facilius vero, cum minus. Constat vero necesse esse, ut huic in thorace non solum adesset asthma, sed dolor etiam, nam quo loco fuerat tuberculum, necesse erat manere vlcus cauium, & difficile sanescens, in loco præcipue ad coalescentiam vlcusum adeo incommodum ob motum assiduum, & sumum profundum. Fuisse vero & tuberculum, & ex eo relictum vlcus eo thoracis loco quo dixi, inde conicies, quod dolores tunc maxime ingranescerent, cum laborabat mulier manibus: Nimirum netri manuum nascuntur a dorsi medulla, inter primam & tertiam vertebra, & decurrunt per duo spacia intercostalia. Motus ergo manibus laborantibus, condolebat ea pars thoracis, quare si cum thorace condolebat coxa, laborantibus manibus dolebat utraque pars. Hæc om-

Amia secundum Gal. narrationem dicta sunt, atque adeo, ut ipse censet, nulli possunt videri dubia, præter illud, quod de compactione thoracis & coxæ dictum est. Nulla enim causa videtur, quæ condoleret coxa cum thorace, cum nulla esse videatur communio illis, velut est thoraci cum genitalibus. Galenus ob nullam communionem factum esse parat, sed quod casu huic mulieri coxa fuerit debilior, quam partes alie, atque ideo receperit excrementa. Mihi vero videtur in partem etiam natura & communiōe, causa aliqua esse potuisse. Nam thoraci cum utero magna communio est, siquidem vocalibus cum genitalibus: dolere vero coxam sæpe ob uteri morbum res est experimento competissimæ, & rationi maxime consona, & ab Hippoc. celebrata, præcipue vero quibus uteris incidit in eam: qualis fortasse erat hæc mulier. Sed est hæc consideratio dignum, cum ei, qui cum dolore dextri intestini laborabat articulari morbo, quanto magis ingranesceret architis, tanto magis remitteretur dolor intestini, & contra: huic vero mulieri ambobus dolores ingranescerant simul, cum præcipue dictum sit ab eodem Hipp. in aphorismo: Si duo dolores non eandem partem instant, maiorem alterum obscurare. Certe si illud obscurare significet, ut verbum ipsum præ se ferit, & Galenus in commentario eiuſdem aphorismi intelligit, facere ut lateat, seu ut minus ab ipso egroto percipiatur, sed velut contemnatur præ alio vehementiori, vera est sententia illa aphoristica vniuersim, distrahit enim semper mentem vehementioris obiecti sensus à debiliore. Verum si illud obscurare accipiat, ut Galenus in commentatione historiarum proximæ, eius inquam cui dolebat intestinum, accepit quasi diceretur, dolorem minorem à maiori tolli, aut curari iuxta illud, quod sectione secundâ huius sexti dicebatur, opus aliquod simile facere, ut quum dolor dolorem sedat, non est vera sine quadam limitatione.

Cum Nimirum cum pars aliqua dolet per consensum enim altera, ita inquam ut non sit solum passio secundaria, sed metâ sympathia, non tantum non curat alter dolor alterum, sed necesse etiam est crescant affectiones simul, ut si cui ob affectionem dolorificam ventriculi, aut capitis doleant oculi, necesse est crescat oculorum passio crescente passione ventriculi, aut capitis. Cum autem non est metâ compassio, duorum alterum necesse est fieri, ut alteram partem recipere ex altera, vel ambas à toto corpore, vel ab aliqua alia. Si altera ab altera recipit, necesse est, ut crescente dolore posterioris decreseat dolor prioris, iuxta quod libro secundo huius operis dicebatur, si doleat caput in pectus descendit, & hypochondria, deinde in coxam, & pedes. Impossibile est autem ut omnia simul doleant: Si vero ambæ partes recipiunt simul à toto, vel alia quadam, necesse est ut dolores augeantur simul, quia scilicet recipiunt simul, verum tunc quodque detrahunt sibi aliquid mali mutuo, quous enim earum reciperet plus, nisi in alteram pars succi mitteretur. Ille igitur cui dolebat intestinum, laborabat etiam artitride, non per meram compassionem, sed quod altera in alteram pars mitteret, ac proinde merito non simul sed alternatè augebantur: huic autem accidebat coxæ dolor & asthma, thorace fortassis compariante cum uterorant utraque parte recipient simul à toto, aut fortasse à capite. Ex specie spu-

D E

E

F

torum nihil aliud potes in telligere quàm à talibus hominibus pendisse malum, quales illi differenzie sputorum sunt nate significare, ab initio verò exisse floridum, hoc est, subrubrum, dimanante sanguine ex vlore. Verum de differentiis sputorum, & significationibus, in prognostico est satis diffusè actum; nunc quæ peculiariter sunt huius loci petra-dicor. Videbitur tibi hæc mulier etiam antequàm rumpetur tuberculum, laborasse asthma, quandoquidem laborabat respirationis difficultate, & crebra spiratione. Quid autem est aliud asthma quàm respiratio anhelosa, quæ oon fit ob febris magnitudinem? Certè oon quæconque anhelatio, sed tanta, ut sitiam orthopnoia. Itaque hæc antea respirationem habebat difficilem ob tuberculum, non dum verò erat orthopnoica, ac proinde neque asthmatica, ut postea. Si placet dicere fuisse antea asthma incipientem, quia id malum augescens in asthma abiit, nihil prohibet. Quid huic medici consulerint, narrat Hipp. non quidem curationem, sed victus solum institutionem. Fortasse, ut erat morbus longus, & qui eam decumbere non compelleret, non est curata, sed contenta solo victu, petinari posse non sperans, sed morbum melius ferre volens. Fortasse etiam curationem dicere omisit Hippocrates, quod non valuerit petinare; utrumque hoc habeat, censuisse dicit medicos, hanc abstinere ab alio, suilla, ouilla, & bouina, quia sunt hæc partim actia, partim concoctu difficilia, & crassa. Itaque eadem ratione abstinere debuit ab omnibus acerbis, & ab omnibus concoctu difficilibus, & crassis. Nam actia breui affertent phlegmæ exsatione pulmonis, concoctu difficilia & crassa impedirent excretionem, & omnem corporis expurgationem. *Et de vi-
a respiratoria* (inquit) *scit, & edipsum.* Rectè professus, n-hui est enim quod adeo possit vlcus dilatari thoracæ ac clamor, qui sit vehementi respiratione, & ita præcipui quæ facit febreorem sanguinis, & præter quàm quod humores conuocat, visu aucto facit respirare plus & crebrius. Quam dicitur *respiratio*, indicat duo hæc ob spirationem ledete, quia scilicet vtrumque facit respirare vehementius. Mirum tamen si huic non iussit Hippocrates ferreis candentibus fieri inunctiones, id doobus spatiis ioret costalibus supremis, iuxta spinam, in parte dextra: & circuecirca coram dextram: ego quidem huic hæc consuliissem fieri.

C *Vi in capite tumor exedendo proserpebat, ei primum alumen vsum profuit. Habiuit alium abscessum, fortasse quod os abscessurum esset, abscessit sexagesimo die super aurem, circa supernam verticis partem vultus erat.*

Hic laborauit affectibus qui per malignas cacochymias acciderent multis consueuerunt, tumoribus, vlcenibus, & carie io ossibus capitis. Quæ hoc nostro tempore fieri bandquaquam possunt, siue morbi gallici notæ, quaquam cum morbum nouum esse vulgus sibi persuasit. Huic duo tumores nati sunt, alter sponte exulceratus exedebatur, eratque vlcus hoc supra aurem iuxta verticem: alius abscessus quæ in parte capitis fuerit, non narrat Hippoc.

A suspicatur tamen ortum esse ibi, quod os subiectum carie laboraret, & inde esset abscessus nrm, ut factum est. Nam aperto à chirurgis eo abscessu, sexagesimo die ex quo nudatum est, & exipit ab aëre & medicamentis alterari, abscessit os. Fieri quidem potest, ut osse non corripito, ob redundantiam solum humorum fiant tumores, verum in iis qui maligna laborant cacochymia, sæpissimè sunt ob subiecti ossis corruptionem. Quare mox atque apparet tumor, timere talem corruptionem oportet, atque alio quopiam signo accedente, ut persistente dolore, aut fouea sub premente digito cum quadam asperitate aperte. Quod tumori qui exedebatur, alumen prodesset, iuxta illius naturam euenit, nam siccatur vehementer. Rectè autem dixit alumen profuit, insinuans scilicet, non omnibus ita affectibus illud ipsum medicameo futurum utile, sed aliis hoc, aliis aliud profuturum, pro cuiusque hominis natura, & dispositione: rectè etiam dixit primum, quia etsi primum videretur alumen prodesse, tamen non potuit eo solo petinari homo, sed alia fuit opus adiungere, fortasse caustica. Quod sexagesima die os abscessit, non mitum, plerique enim abscedunt post quadraginta, hic fortasse erat senex, & ossibus natura durioribus.

I *ntestina crassiora habent homines canibus similia, verum maiora: appenduntur ex medianis membranis, quæ mesocola vocantur. Hæc verò ex nervis à spina sub ventre.*

D Ad Anatomem pertinet hæc oratio, est autem maximè conspicuum, & exigua diligentia indigena, quod dicitur, nihil enim dicit aliud, quàm intestina hominū similia esse canibus, quod adeo est Anatomicis perspectum, ut quæ ad naturalia instrumenta pertinent, non nisi in caninis corporibus ostentent. Dicit hominum intestina esse maiora, certè ut & corpora tota. Ita autem habere, etiam non perpeissintestinis, ex vtrorumque facibus licet agnosceret. Sunt enim hominum faeces, quæ duræ egeruntur, crassiores quàm canum. Suspendi dicit ex mesocolis, hoc est, ex mesenteris. Quod enim Galenus vocat *mesæ*, id est, intestina, vocabat Hippocrates, & eo antiquiores, *mesæ*, quare & quod mesenterium, mesocolum. Dicit verò numero multitudinis mesocola, quia cooistat multis venis, quæ omnes alligant sunt spinæ, ligamento quodam magno iuxta septum transuersum. Ut inde line mesenterij vasa omnia, atque cum eis iocestina, ex spina, & ipso septo transuerso. Vocat verò nervos illa ligamenta, nomine ob substantiæ similitudinem latius accepto. Dicit sub ventre, vel quia infra ventriculi os, vel quia corpore supino collocato, substat omnibus intestinis.

F *Grotis gratificandum est in istis rebus, ut nimirum potus & cibi mundè præparentur, & quæcunque videt & tangit mollia sint. In alijs etiam quæ non valde ledant, aut facile emendari possint, ut frigida, quum ea opus est, in his etiam agrotis gratificandum.*

qualia sunt introitus, sermones, habitus corporis, vestitus, tonsura, ungues, & odores.

Omnia hæc pertinent ad æconomiam circa ægrotantes, de qua sectione secunda huius lib. non longe à fine dictum est. Omnia, quæ & ad ipsum ægrotum, & ad medicum, & ad eos qui adsunt, & ad externa pertinent, in gratiam ægrotantis debent esse comparata. Gratificandumque ei, quoad fieri potest, cibis, & potibus, & medicamentis, & cubiculo in quo decumbit, & iis quæ oculis obiciuntur, & sermonibus quos audit, & odoribus, & leuissimi mollitiæ, ac denique omni alia re, quæ non valde lædat. Vtique adeo ut & ipsum medicum velit Hippocrates sese componere, ut maxime ægrotis placeat, introeat scilicet compositus, & videat quos apud ægrotum se mouere habeat, & decentem habeat vultum, & torius corporis figuram, & vestibus induatur pretiosis & mundis, capillis bene ronsis, vnguibz expolitis, odoribus etiam utatur. Huc spectat ferre annulos, & auteos torques, & quædam alia quæ vulgus hominum miratur & amaret. Libello de medico scripsit Hippocrates multa ad hanc partem spectantia, ex quibus ego illud imprimis eligi suadeo, medicum circa totam vitam esse probè compositum. Quia maxime (inquit) ad opinionem, & auctoritatem comparandam conducit, bonis & honestis moribus præditum esse. Itaque si omnes hæc indolgentiæ, quibus ad ægrotantes vitimur, id possunt præstare præcipue, ut Gal. censet, ut diligant, & proinde nobis pateant, velint vnicis amicis, velut parentibus, velut Diis, nihil magis obedientiam parit, quam auctoritas, neque hanc quam probitatis opinio, ut Hippocrates dixit. Sed præter hanc vtilitatem, præstant hæc gratiæ ægrotantibus aliam non exigam, exhilarant enim quædam, ut quæ ad medici ornatum spectant, & sermones, & spectacula, ipsorum animos, ut minus æreote læguescat, quædam etiam ipsas naturales facultates, velut mundè parati cibos, potus, & suauitatia aliquid condonare, et si aliqui videatur non valde expediens. Certè his præceptis, non ad dicta, sed ad locum vtuntur multi, cauent autem horror, ne plus satis vtantur, & plurimum suis commodis studentes, eorum qui se illis crediderunt, salutem spernant. Videant quantum sit id, quod suauitatis causâ permittant, quod sanè Hippocrates ipse definit. Sed & id ipsum quod per artem licet, videant ipsi, quibus permittant. Nam quod insigniter possit lædere, aut quod inferre noxam quæ non facillè emendetur, nulli debent concedere, sed ut in apborismo dicit, Parum deteriorem cibum, aut potumiat quod vel tantillum possit lædere permittendum non est omnibus. Nā mores ægrotantium considerandi sunt. Quidam enim sunt adeo intemperantes, ut si medicus illis tantillum concedat, ipsi ea occasione sint plus multo adiecturi. Itaque hæc præcepta, ut alia omnia practica, prudentia indigent. Nam & medici compositio ad gratiam comparata, quæ plurimum artis prodit, cum facete solet ridiculum, & contemptibilem: quinetiam suspectum, putantibus hominibus, id quod doctrinæ deest, ambitione illa suppleri, & cum qui tam multis rebz, fortasse futilibus, studeat, non admodum posse vtilibus præceptionibus esse intentum. Neque tamen has ob causas velim medi-

com rigidum, grauem, inurbanum, & prorsus rusticum se præbere, ut noui alios, hac arte volentes simulare se semper tractare seria. Vtique adeo est quique sua astutia. Ego mihi nihil horum, sed facilem, non tamen leuem, aut grauem, non tamen tetricum comitum exopto, & omnis prudenter ac moderate facere. Vbi ego legi, sed non ut valde lædant, legitur in græcis codicibus ἀλλὰ μὴ μάλα βλάπτειν. Id est, alia non multum lædere. Quæ verba ineptitudinem quædam præ se ferunt, proinde mihi arrisit plurimum illud ἀλλὰ mutari in ἀλλὰ, id est, sed, sit enim mutato solum apice, & redditur sensus longe facillior, hic scilicet, gratificandum est quidem ægrotanti, ita tamen ut non valde lædantur, velut si dari debeat ægroti ad voluptatem frigida, ne tamen ita detur, ut patere possit noxam aliquam magnam, atque fortasse inemendabilem: ut hoc delibatosissimo tempore, quale nunquam viderat Hispania, scimos multis niuis vsu nimio conuulsis. Sed si de mollitiæ & voluptatibus, quæ nostrorum animis irrepserunt, sermo esset habendus, ad elegiam procederet commentaria. Faciat Deus, ut ab his expediat, ad virtutem pristinam, quæ alijs omnibus gentibus quondam fuerunt admirationi, conuertantur, & licebit medicis eos seriò curare, vtuturque illi arte ad salutem potius quam ad delicias.

Aquam quam decoxeris, partim quidem prouidebis ut aërem recipias: partim quidem ut non sit vas aquâ plenum, & operculum habeat.

Quidam enarratorum censebant, hæc verba simul cum prioribus legi, alij seorsum. Qui legebant simul, intelligebant Hippocratem hic docere rariorum refrigerandi aquam, pro ijs ægrotis quibus placeret frigidam concedere: qui seorsum verò, docere rationem elixandæ aquæ. Vtraque ratione accipit satis idoneam interpretationem, Galenus probat magis priorem, me verba ipsa videntur in alteram trahere. Proinde utramque persequat, & prius quidem priorem. Aqua multis causis, & eis quidem optimis elixatur, quarum vna est, ut melius refrigeretur, cum eam frigidissimam dare volumus. Promptius enim aqua calefacta niue, aut alia aqua frigidissima circumfusa, frigus in se totam admittit, quam frigida. Refrigerandi verò, cum iam fuerit calefacta, duplex ratio est, altera sub dio sine operculo exponere, altera in puteum aut niuem cum operculo, atque vase obturato immergere. Vtrumque autem ita fieri debere luce clarius est. Nam si cum operculo expuitur sub dio, minimè circumfusi aëris frigore alterabitur, si verò sine operculo demittatur in puteum, aut niuem, mixtionem aliquam inuitem admittet. Quod si galenus velit, ut vas quod in niuem metgitur, probè obturetur, ne aliquid recipiat: quantum minus ferendū est, quod delicosi nunc facium (permittentibus quibusdā assentatoribus) ut percolata per niuem aqua bibatur, aut etiam ipsa nix aqua soluta. Hæc de ratione refrigerandi aquam dicta sunt,

Deratione elixandi iuxta alteram enarrationē nunc dicatur. Elixatur aqua, præter dictam, duas ob causas, vt emendetur à vitio aliquo, aut vt facultatem aliquam recipiat. Vt emendetur, velut si crassa est vt extenuetur, si vitiosam aliquam aut alienam habet facultatem, vt eam deponat: vt facultatem recipiat, vt cum ea lignum sanctum, aut radicem cynæ, aut similem indicam, aut glycyrrhizam, aut aliud quidvis incoquimus. Cum emendationis causa solum elixatur, ad ignem lentum sine fumo, vase detecto fieri debet, vt vapor & quicquid ab ea dissolutum fertur, expiret, neque in eam deuoluitur: cū verò alicuius causā facultatis elixetur operculo superposito, ne facultas eius quod incoquitur, expiret. Ne sit autem plenus vsque ad summum, sed ad os relinquatur vacuum, quantum satis sit ad liberum feruorem. Nam alloqui, aut cohibebitur feruor, aut rumpetur vas, quod in multis etiam dolis licet experiri. Itaque siue elixare vis, siue elixatam refrigerare aquam, duplex ratio est, in detecto vase, aut tecto operculo, & vase non pleno. Quid autem? Cum refrigeramus detecto vase, nunquid pleno vase fiet melius, an etiam non pleno? Certè vt erit vasis os; siquidem lato sit ore, nihil prohibet plenum esse vas, si vero angusto, satius sit esse seminauum, vt secundum ampliorem extremitatem aqua ære tangatur.

Quod multi ex sanguinis profluuijs hydrope laborent, notandum est.

Nimio fluxu sanguinis siue menstruo, siue ex hæmorrhoidibus siue ex naribus, siue aliunde calorem naturalem hepatis tolli, hoc sublato hydrope fieri, res est certissima.

Si qualia oportet purgentur, etiam facile feruntur.

Hoc quoque est enarratum prima particula apborismorum.

Qui vigilat externis partibus manifeste est calidior, internis verò frigidior, qui dormit vicinior.

Inter hæc & proximè scripta verba, occurrunt in omnibus codicibus quædam alia, quibus narratur fames quæ fuit in Aëno, per quam ob leguminum esum morbi quidam facti sunt, quod idem libro secundo narratum est, & à me redditæ eius euentus, causæ. Nunc delenda censui, quia nihil continent noui vnde vtilitatis quippiam posset accipi, & sunt haud dubiè interiecta temerè. Galenus enim omnino non habebat in suis codicibus, siquidem nullam prorsus mentionem talium verborum fecit, sed post illa quæ de refrigeranda elixata, aut de elixanda aqua dicta sunt, ad ea quæ de vigilantiæ & dormientiam calore dicuntur, transiit. Ventres per somnum calidiores esse quam per vigiliam, & extremum corporis habitum frigidiorum

A ex somni & vigilæ natura constar. Si quidem colligit sese naturale calidum in interiora, exterioribus destitutum per somnum, quod per vigiliam contrario motu effunditur. Sed & hoc signo constat, quod qui dormiunt pluribus regumentis indigere, quàm qui vigilant, vt noctu etiam quàm interdiu, & hyeme quàm æstate, & quiescentes quàm qui exerceantur, & melius aut timidi quàm irati, quibus motibus est analogus somnus, vt vigilia contrarijs. Hinc fit vt somnus ad concoctiones, vigilia ad distributionem, & euacuationes plus conferat.

B

Natura calido refrigeratio, potus aqua, & quiescere conuenit.

Hæc oratio videbatur mihi excipienda hinc, locandaque ultra duas alias quæ mox sequuntur, quia illæ duæ cum priori aptè iunguntur, cum sint omnes illæ de somno, hæc verò separata aptius disponeretur, vt quæ tractat de re alia. Pertinet hæc ad dieteticam medicinam: continet enim rationem instituendi victum refrigerantem pro calida natura. Sed videri potest quod dicitur, aduersum alijs medicinx theorematibus. Receptissimum enim est & magnam artis axioma, quæ sunt naturalia seruanda esse, & quæ præter naturam submouenda: atque illud his proximum, conseruationem fieri similibus, curationem contrarijs. Vnde legitime colligitur, omnibus rebus naturalibus esse danda similia: quare naturâ calido non refrigeratio, sed calfactio congruit, quare non aqua & quies, sed merum & motus, atque ita in alijs omnium causarum salubrium generibus. Non enim omnia quibus constat victus Hippocrates nominauit, sed pauci quædam, quorum nomine reliqua potes intelligere, quæ in eandem partem cadunt, frigida cum sint. Gale- nus in commentatione, velut huic obiectioni respondens dicit, calidas naturas vocare Hippocratem consueuisse, quæ non ingenito calore, sed acutè & mordaci abundant, quem aduentitium, & non secundum naturam esse arbitratur. Durum verò est dicere, calorem acrem iuuenem naturâ biliosorum, non esse secundum naturam, aut eum qui febriliter ardeat (si modò hunc intelligit) dici ab Hippoc. naturâ calidum. Quamobrem ego naturâ calidum dici intelligo, eum qui naturâ suâ est calidior quàm temperatus: neque tamen Hippocratem docere, talem esse refrigerandam, sed refrigerationem talis (cū scilicet refrigerandus est) agi aptimè potu aquæ & quiete. Sed dices si naturâ calidus refrigerari non debet, futile est docere, quomodo refrigeretur. Certè refrigerari debent qui calidi naturâ sunt, quia calidiorum vsu periclitantur corripri morbis calidis: vt frigidi etiam frigidis, vsu frigidiorum, quia à similibus faciliè patiuntur corpora, à dissimilibus difficulter. Non enim semper seruari debent omnia quæ sunt naturalia, sed quæ sunt naturalia & omni reprehensione carentia, vt mediocris temperies seruanda semper, vitiose autem naturæ seruandæ solum per morbos, aut per negotia, alioqui reducendæ ad meliores, quod sit vsu contrarium.

C

C

D

D

E

E

F

F

Somno indulgendum in loco frigido, corpore cooperto.

Breviloquium, quoscunque de re agatur, consuevit multis interpretationibus esse expositum, quod in plerisque Hippocr. sermonibus, & in hoc non minimè evenit. Nam illud, *ὄντας ἐν ψυχρῷ ὑπναισθαι*, significare potest, hoc modo maxime somnum conciliari, aut hoc modo vtilissimum esse dormire. Illo modo pertinebit oratio ad physiologiam, hoc ad salutem medicinam, seu de tuenda valetudine. Rursum legi possunt scorum illa, *ὄντας ἐν ψυχρῷ*, ut significetur frigore conciliari somnum, vel vtile esse dormire in loco frigido: & particula illa *ἐν ψυχρῷ* adiungitur proximè sequentibus, quæ ita habent, *ὄντας ὑπναισθαι, ἐν ψυχρῷ*. Ita legebant (ut Galen. dicit) multi, & *ὑπναισθαι* vertebant iacenti. Vnde multæ etiam interpretationes sequentis orationis nascuntur. Verùm Galeno videtur valdè violentum *ἐν ψυχρῷ* accipi pro *ὑπναισθαι*. Quapropter magis consentaneum est vertere cooperto, & legere, somno indulgendum in loco frigido, corpore cooperto. Ambæ autem interpretationes quas diximus probabilissimæ sunt. Nam quia per somnum calidiores sunt homines interitūs, & frigidiore exteriūs, aëre ambiente frigido indigent qui occurrat interno ardori, & indumentis quæ externorum frigori, ne quid simis fiat: atque eadem ratione melius conciliatur, ita somnus, quam aliter. Nam qui dormiunt in loco calido excitantur ab interno æstu: qui non probè operū, ab externo frigore: qui verò in loco frigido cooperti, à nulla causa offendantur, & is somnus est placidus & vtilis.

Eccellorum niectatio somnum affert profundum;

Qui hanc orationem dicunt incipere à voce *ἐκκατα* idest (ut ipsi interpretantur) iacenti, intelligunt *ἐν ψυχρῷ* dici profundum & quietum metaphorice, atque significari hominem iacentem dormire quietè: stantem verò, aut etiam sedentem, aut insidentem equo (hi enim omnes sunt recto corpore) non posse nisi niectare. Sed dices, quid hoc ad medicum? Certè ad tuendam valetudinem spectat, consiliorumque, ut qui dormiturus est decumbat, ne lassitudinibus corripatur, si sedens aut stans dormiat. Si verò hæc oratio quatuor has solum voces contineat, *ὄντας ὑπναισθαι, ἐν ψυχρῷ*, videretur significari, cum qui rectus niectat, sedendo dormiturum. Hoc verò leue est & parui momenti, vtilior multò sensus est quem Galenus sequitur, & continet præceptionem quandam curatorem, & rationem occurrendi perui-gilio. Scilicet quum quis capere nō potest somnum, coactus vigilare, & stando niectare, antequam ei permittatur decumbere, solet in sedentarium & profundum somnum incidere: velut etiam cum quis conqueritur, se nunquam cum appetentia accedere ad cibos, consultum erit, cogere ut incipiat

A net quousque appetat, nam priuatio parit appetitum. Ergo iuxta Galeni enarrationem hæc verba, *ὄντας ὑπναισθαι ἐν ψυχρῷ*, significant, niectationem stantis afferre somnum placidum & profundum. Constat verò banc curationem vtilem non esse, cum ob aliquam affectionem grauem sit ea impotentia, nam si quis phrenitide exquisitè laborantem cogat vigilare, donec somno corripatur, aut eum qui ob phlegmonem, aut erysipelas oris ventriculi, aut gulæ, cibum non potest capere, ieiunare cogat donec appetat, prius morietur eorum uterque. Curatio igitur hæc tunc est accommodatissima, cum fastidium incipit à satiaret, aut dormiendi potentia ab orio. Sed etsi hinc non inciperit, sed ex contrariis causis, ut fames ex bile aut ex calore oris ventriculi, & perui-gilium ex cerebri siccitate, si tamen affectiones graues non sint, ut quas nuper dixi, fieri potest ut hæc curatio locum habeat. Nam ad inopiam tracta membra possunt ciborum appetentiam facere; etiam repugnante bile & calore ventriculi: & facultatis animalis labor poterit afferre somnum, etiam in siccis cerebri. Quapropter neque tertianis febribus laborantes admodum cogendi sunt cibum capere, sed cum valdè fastidiosi sunt sinendi: neque melancholici semper accendi ab omni labore, & à lectione, & aliis omnibus quibus præcipuè solent delectari, sed concedendum est illis horum quidvis moderatè, ut minus mensi sint, & dormiant. Verum ut dixi, qui præ granissimo aliquo malo tale habent symptoma, non ita curandi, sed nobis contrà euntibus, & vi cogentibus. Si enim phreniticum prohibes dormire, aut laborantem phlegmone ventriculi comedere, sperans inde futurum, ut ille dormire velit & hic comedere, perinde feceris ac si lethargicum dormire sinas, & laborantem fame canina comedere, sperans fore ut ille euigilet, & hic saturetur, nihil enim tale eueniet. Sed talem omnium somnus dormiendo, perui-gilium vigilando, fames comedendo, fastidium ieiunando crescet vsque ad mortem.

B
C
D

Debiles vietus frigidi, robusti verò calidi.

Idem prolixus continet verba hæc, & quæ paulò post sectione quinta huius libri occurrunt, ubi dicitur, debiliores cibi breuiorem vitam faciunt: Scilicet debiliores cibi dicuntur à Galeno eum locum enarrante, qui exiguum præstant alimentum; velut olera, & fructus. Debilis ergo vietus est usus talium ciborum: constat verò cibis recti naturalis calorem, quate vsu parum nutrimenti languescit naturalis calor, atque hoc languescere necesse est vitam contrahi: contrà vsu bene nutrimenti naturalis calor roborabitur, & vita producetur. Debiles ergo vietus frigidi, idest naturalem calorem facientes marcescere, & mortem accelerantes: calidi verò robusti sunt, & vitam producentes.

EX aquis arte carentibus qua ab aethere excernitur cum tonitru, tempestiua: nubilis-
sa verò mala est.

Aquæ arte carentes sunt fluuiales, fontanæ, puteales, & pluuiiales: artificiales verò, stillatitiæ, & expressæ, & elixatæ. Hæ quia medicamentosæ sunt frequenter in vsum veniunt, etenim & potus & medicamenta simul sunt, habentque vires eorum ex quibus exprimentur, aut distillantur, plus aut minus, vt est eorum natura, aut induunt vires eorum quæ in eis incoquantur. De naturali aqua variæ sententiæ fuerunt, auctores quidam præferunt fluuiales, ob assiduum motum; alij puteales, ob colatram; alij fontanas ob mundiciem; alij etiam pluuiiales quòd videantur esse tenuiores. A me dictum est de his, atque omnino de aquæ electione, in commentatione tertij de ratione victus in morbis acutis, vbi & hanc orationem enarraui quapropter licebit nunc, & aliorum opinionibus, & earum refutationibus prætermisissis, quod huius loci est solum dicere. Ex sententia Gal. & aliorum, veterum band dubiè præferatur pluuiialis omnibus aquæ generibus. Nam in medicamenta omnia, quæ aquam recipiant, immitti iubebat aquam pluuialem. Galenus vbi deest pluuialis permittit fontanæ, atque id quidem non quòd semper fluuiali sit melior, sed quia vt ipse narrat, Romæ erant optimi fontes, Madriti quoque sint optimi ac multi; Compluti mediis fluuialis reposita immittitur. Sed quòd pluuialis præferatur optima ratio est, nam est tenuior, & concoctior (si modo concoctionem aliquam accipere potest aqua) vt potè ex reliqua aqua vicaloris excreta: id verò non omni pluuiali æquè iustè, æstiuales enim & quæ cum tonitruis descendit, quæ ob tempus anni æstiuæ sũt ap. l. aqua æstiuales dicitur, vt fructus etiam temporales seu borarij dicuntur, quæ eo tempore prodeunt, ea inquam aqua, vi caloris, & terra etiam arida excremitur hyemalis verò; & quæ copiosis, & opacis nimbis cadit, non tam vi caloris, quàm humoris redundantia, & vaporum copiâ prodeunt: quare illa tenuior est & concoctior, hæc crassior & crudior. Optimæ igitur aquarum omnium, & quibus ad medicamenta, & ad vsus eorum qui aqua vulgari lūduntur, sunt pluuiiales æstiuæ. Vbi dicitur tempestiua, deest particula, bona, cui illa mala opponitur: nisi fortè nomine tempestiuæ voluerit Hippocrates bonam significare.

A Quæ edax, vigilia edax.

Ad physiologicam partem pertinet hæc oratio, continet enim quæstionem duorum naturalium problematum, cur qui aqua vtuntur plus cibiciant, quàm qui vino: & cur qui ob negotia vigilantes plus soliti, accipiunt plus quàm qui dormiunt satis. Dixi verò ad physiologicam pertingere, quia non vt in iis qui naturaliter ad victum hunc sunt dispositi verum esse deprehenditur, ita etiam

A in his qui reuenerunt morbo. Nam eos qui aqua vtuntur semper voraciores esse, vinolos verò parco cibo esse contentos, experimento est cognitum, neque minus eos qui totam noctem insomnes transigerunt, intentos negotijs plus cibi capere, & lautius ientare quàm solebant. Non tamen perinde si quis per morbum fastidiosus est, & aquæ potu iunatur, neque si quis laborat per uigilio, ob hoc magis appetit cibos, aut vigilando amplius appetitum comparat. Quin potius multi ægroti qui cibos capere non possunt, vsu modici vini incipiunt accipere, & multi qui per uigilio & fastidio laborant simul, modico somno recreati comedant. Atqui profectò hæc omnia eueniunt merito, omniumque oportet causas dicere. Quod in benevolentium victu vsus aquæ quàm vini sit magis edax, causam dicit Galenus esse, quod frigida ventriculi intemperies cibi appetitum faciat, velut calida potus. Ego huic etiam addo aliam. Ex aqua nihil vtquam alimentum accedere corpori, ex vino vero cōsumunt non omnino exiguum. Merito ergo qui vino vtitur, accipit aliorum ciborum minus, quàm qui aqua. Verum per morbos multis fastidientibus vinosa qualitas est pro condimento, quod aqua non potest, quia nulla est qualitate prædita: præter quàm quod quidam vini potu adiuti coquere incipiunt, atque ob id etiam accipere. Quod qui ob negotia vigilant accipiant multum, causa est magna dissipatio, quam facit vigilia præ somno, vt motus præ quiete. Ita sit merito vt dormientes faciliè, laborantes difficilè sustineant ieiunium. Quod ægroti qui cum per uigilio fastidiosi sunt, somno recuperent appetitum, causa est, quod somnus emendat intemperiem calidam & siccam, quæ fastidium parit, vigilia augeat.

D Per calidam naturam, calidò anni tempore, cubile in aëre frigido crassam reddit, in calido attenuat.

Significant hæc verba cubile in aëre frigido, calido tempore, crassam reddere naturam valde calidam, in calido autem loco attenuare: hoc est, eum qui est natura valde calidus, tempore calido, si dormiat in loco frigido crassescere, si vero in loco calido, extenuari. Quod quidem extenuetur natura calidus, tempore calido, in loco calido decumbens, causam esse dicit Galenus, quod calidi faciliè dissipantur, quare accedente temporis & loci quo dormiant calore, dissipabuntur plurimum: nempe conuenientiam causæ tres dissipationis, calor hominis, temporis, & loci. Sed si hoc ita habet, cur hic idem eodem tempore in frigido dormiens crassescet, deberet enim etiam extenuari, etsi minus; si quidem adesse extenuationis duæ causæ, proprius calor, & temporis: quibus repugnaret vnica, frigus cubilis. Quid ergo? Nunquid per crassam reddi intelligit Hip. minus extenuari. Quod si dicatur naturalem calorem non dissipare, sed nutrire (quod ego sæpiam indicau) ne proinde non esse in causis dissipationis, sed crassitie, atque ita calidum æstare dormientem in loco frigido, duas habere causas crassescendi, calorem proprium, & frigus cubilis, vnam extenuandi, calorem temporis, hær, vt calidus æstiuus

æstiuo tempore in calido cubiculo minus extenuetur, quàm frigidus eodem tempore & loco, quia frigidus habebit tres causas extenuationis, calorem temporis, & loci, & frigus proprium; calidus verò duas extenuationis, calorem loci, & temporis, crassifici alteram, proprium calorem. Quid ergo? Nunquid dicit Hippocrates naturam calidam calido tempore & cubiculo attenuari. Non quod magis quàm frigida, sed quòd ea quoque nonnihil attenuetur? Hæc mihi videntur explicationem postulare, ac præterea, cur potius requirat Hippocrates cubiculum frigidum æstate quo dormiatur, quàm domum qua interdum vigiletur? Videtur enim cum vigilia dissipet plus quàm somnus, ut nuper dicebatur, magis dissipatum iri cum qui in calido loco vigilet, quàm qui dormiat. Vtrum ergo erit satis æstate (alterorum agendum est) domum habitare frigidam, ut in calido dormias cubiculo, an in cubiculo frigido dormire, etsi domum habites calidam? Quam his omnibus erit satisfactum, videbitur mihi Hippocratis oratio satis enarrata. Non videtur autem posse aliud melius incipere, quàm à causa qua quedam corpora faciliè, quedam difficilè dissipantur. Constat verò eam non esse solum in calore aut frigore, sed multò magis in substantiæ corporis duritiæ & mollietis, quæ quidem non caloris modum sequantur semper, sed humiditatis, aut siccitatis potius. Constat (ut exemplo etiam hoc declaratur) multò facilius dissipari corpora puerorum quàm iuuenum, quamquam nihilò censentur à Galeno calidiora, atque ab alijs quibusdam multò frigidiora. Non igitur tota causa est in calore aut frigore, sed neque omnino nulla. Nam etsi reliqua sint æqualia, à sola caloris aut frigoris naturalis differentia, recipiunt corpora differentiam maioris aut minoris dissipationis, sed quæ sit differentia hæc investigemus. Calorem naturalem dissipationis corporis, & partem cui inest, causam non esse, demonstratum à me est satis, nihilominus potest calor naturalis esse causa dissipationis faciliis, ut materię dispositio. Quòd scilicet quæ calida sunt, faciliè à causis calidis patiantur, atque cum illæ dissipantes sint, faciliè dissipantur; sed & ab omnibus externis causis, patiantur faciliè quæ sunt rara, calor innatus raritatem parit; qua igitur ab externis calidis, & dissipantibus patiantur, duplex causa est, analogia temperamenti, & raritas. Itaque hac ratione, etsi calor naturalis non dissipet, tamen naturaliter calida faciliè dissipantur ab externo calore. Accedit, quod & ut efficiens etiam potest partem alteram extenuare, velut si calor hepatis absorbuit pinguedinem partium circa ipsum consistentiam, quinetiam & se ipsam potest ex accidenti extenuare pars calida, quòd scilicet absorbuit & dissipet sua alimenta, & excrementa reddat acriora. Tot sunt cause quibus corpora calida sunt facilioris dissipationis, etsi calor per se non dissipet suam substantiam. Quoniam verò calor ex accidenti extenuat, per se verò facit contrarium, constat id non facturum, nisi in eum qui sit valde magnus, moderatus enim faciet quod per se natus est facere, contrarium accidet ex immoderatione. Dissiparetur igitur non de calida utcumque, sed ut Hippocrates dicit, de per-

A calida natura, atque statuatur, per calidam naturam cum eodem aut simili substantiæ modo faciliorem esse dissipatu quàm frigidam, ob dictas causas. Igitur per calidam naturam, æstiuo tempore dormientem in loco calido, extenuari magis quàm frigidam naturam, ac magis etiam quàm in loco frigido dormitet, faciliè concedes. Crassescere verò naturam per calidam æstate quòd dormiat in frigido, atque id magis quàm frigidam, est aliquanto difficultius. Mihi verò id quoque videtur consensaneum. Nam calor naturalis, nisi vincatur ab externo, iuuatur: non vincitur autem cum externus calor corrigatur, velut cum quis oppido & domo & reliquo victu vitetur, frigido, cuius præcipua pars est dormire in frigido. Cum igitur æstas ita corrigatur, non prohibetur caloris naturalis opus, sed iuuatur potius, quare & nutritur corpus felicius. Ita etiam frigida nature, nisi earum calor ab ambientis frigore vincatur, iuuantur, quia introscit colligens robustius sit. Quapropter frigidi hyeme dormientes in loco calido, & reliquo victu calido videntes, ne temporis frigus vincat, & calidi æstate dormientes in frigido crassescunt magis quàm æstate frigidi, & hyeme calidi, videntes eodem victu. Frigidi enim æstate, & calidi hyeme, quia non indigent aëris correctione, neque illo victu videntes melius habent, neque inquam frigidi æstate indigent frigido cubiculo, neque calidi hyeme calido. Satis est enim, ut bene habeant, naturam toti victui opponi. Igitur calidus in æstate dormiens in loco frigido, magis crassescet, quàm frigidus eodem modo vivens, & multo magis quam ipsemet dormiens in calido. Merito autem cubuli in quo dormitur meminit potius quàm loci quo vigilatur, quia etsi per se vigilare in calido, maioris dissipationis causa sit quàm dormire, tamen quia dormire in calido prius concoctionibus, & nutritione magis, contingit ut ex accidenti etiam multo magis extenuetur. Accedit quod neque dissipatio sit multo minor quæ dormiendo agitur, si tollantur concoctiones. Nam etsi aliæ euacuationes dormiendo cessent, insensibilis euacuatio parum minuitur, & sudor etiam augetur.

E

Sanitati tua est cibus non satiari, & impigrum esse ad dolores.

F

Nihil est quod adeo repleat malis succis, & ad morbos reddat opportunos, atque satietas & ocium, quare merito laudatur ad valetudinem tuendam, non uti cibus vsque ad saturitatem, & impigrum esse ad labores: quod valde confusum est eis quæ docet libro de dieta, ubi dicit contrarias inter se vires habere cibos, & laborem, cibi enim replent, labores inanunt: igitur cibi paritatis & labores easdem vires habent, vacuandi scilicet. Quare cum plerique morbi nascantur ex repletionem, in commune quidem rectè dicitur, exercitationem salutarem esse, non satiari cibus, & impigrè laborare. Constat vero neutrum horum omnibus æquè convenire, sed pro cuiusque natura, abstinendum à cibus esse plus aut minus,

& laborandum plus aut minus. Quandoquidem autem cibi, & labores contrariæ causæ sunt, qui in sanitatis tutela pauciori indigent cibo, illi indigebunt pluri motu, & qui pluri cibo, motu minori. Vtique adeo ut sint quædam naturæ, quæ ob ingentem dissipationem plurimo cibo, & nullo motu indigent. Aliud est, quam qui pauciori aut pluri vtiuntur, non quod pauciori aut pluri ob corporis naturalem dispositionem indigent, sed aliam quampiam ob causam, ut qui paucio cibo vtiuntur quod multo carcat, aut quod volens ieiunet, aut quod ob debilitatem fæcultatis, vel totius hominis, vel ventriculi, multum non possit ferre, vel ob fætidium non possit accipere, vel ob crebros aut longos paroxysmos, non vacet Medico dare: aut contrà ob incontinentiam homo ingerat multa, vel quod sit frequens in conuiuijs. Hi omnes quanto vtiuntur pluri cibo, tanto debent laborare, plus, & quo pauciori eo minus, ita ut proportionem ad se se feruent cibi, & labores: quia ut dicit Hipp. loco citato, homo comedens sanus esse non potest, nisi etiam laboret. Verum rhodus accipiendi cibum, & laborandi, per bonam valetudinem, in mediocribus naturis, atque adeo in pluribus, optimè definitur, ut cibus capiat infra satietatem, & labores suspiciantur sine pigritia.

Leni inter vigilandum siti somnus medetur: & verò que somno succedit, vigilia interdum.

Superficialem, seu famem, seu sitim, seu passionem, quamcumque aliam, vocari, quæ non est valde firma, sed levis, & ex causâ quapiam leui pendet familiaris est phrasis Hispanis magis quam Latinis, iuxta quàm nunc Hippocrates vocat *σύνεση*, id est sitim in summo existentem, seu superficiale: itaque sitim non magnam, neque ex magna pendentem causâ. Rectè igitur, & iuxta Hippocratis mentem interpretatur Galenus aphorismum vigesimum septimum sectionis quintæ, quo dicitur. Qui noctu bibere appetunt, si superdormierint, bonum, intelligi de mediocri potus appetentia. Nam si quis tenetur ingenti siti, satis non erit dormire, nisi prius poterit: imo vero sitis ipsa dormire prohibebit, si vero mediocri solum sit, dormiendo citra potum sedabitur: ita quoque quidam qui cum siti expurgantur, vigilando solum, etsi nihil accipiant potus, à siti leuantur. Nimium vigilia faciendo facit sitim, quam merito tollit somnus, cum humectet: somnus etiam aliquibus sitim facit calfaciendo viscera, quia ut dictum est nuper, qui dormit calidior est interior, frigidior exterior, hanc ergo sitim tollit vigilia auocando calorem à visceribus ad externa. Sed neque hanc sitim vigilia, neque illam somnus tollere valet, nisi exigua sit. Quod significat Hippocrates dicens, si inter vigilandum superficialis, id est, non magnæ, somnus medela est; ei vero quæ succedit somno, vigilia interdum, non enim omnibus, sed quibus sitis ex somno superficialis est. Quid ergo agendum si superficialis non est? Certè si quis ex vigilia sitit vehementer,

capiat pocum donec sitim extinguat (per sanitatem intelligantur hæc, nam hydropycon non erit hæc idonea procuratio) mox dormiat, si dormiendi tempus est, ne cito rursum sitiat: non tamen ita consuluerim, si expurgatur cum sit magna, mox bibere, ut euigilet, sed prius euigilare perfectè & aliquandiu sustinere sitim, eam ubi vigilia non sedari videretur, potare: aut si eum tantopere vrget sitis, abluat os, vinum aut alterum haustum ore prius detentum deglutiat, dum euigilat, ne autem copiosè poterit, frigidam precipere, nisi cum plene euigilauerit. Nam si quis antequam naturalis calor sese in corpus effuderit, copiosè frigidam deglutiat, periculum suffocationis asseret calidiori, & eius distributioni impedimentum. Quare qui id faciunt, breuifolent euadere cachectici, aut hydropici.

Quibus copiosus inest calor, ij maxima voce præditi sunt, nam copiosus etiam ær inspiratur: ex duobus autem magnis quæ nascuntur, magna etiam existunt.

Μεγαλοφωνοὶ sunt quibus ampla sunt vocis organa, & firma latera, ambo autem hæc sunt fœdoles caloris insidii. Itaque quibus magna est vox, plurimum inest calidum, & quibus plurimum inest calidum, ij magna voce sunt, nisi ob materie defectum, aut errorum formatricis aliter contingat: huius orationis duplex est enarratio. Prima quibus plurimum inest calidum, eos statim habere magnam vocem, quia qui plurimum habent calidi, ob vsum auctum trahunt multum ærem frigidum, duobus autem his existentibus, calore scilicet multo, & ære qui inspiratur, necesse est etiam quæ inde nascuntur fieri magna, ut vocem, cuius materia est ær, & effecrix causa facultas, quæ in calidis valere solet. Itaque qui cunque plurimum habentes calidum, plurimum trahunt ærem, & magnam habent respirationem, illi omnes magnam habent vocem. Quæ enim, etsi calidi sunt, ob dictorum aliquod habent angustiam thoracis, non trahunt multum ærem sed paucum crebro. Vbi igitur sunt duo hæc calor magnus, & multi æris tractio, magna est etiam vox. Altera enarratio est, eos quibus plurimum inest calidum statim esse magna voce, quia cum generantur corpuscula cum multo calore, trahunt multum ærem, duobus autem his existentibus magnis, calore inquam multo, & multi frigoris tractione, necesse est & quæ innascentur, ut thoracem, pulmonem, & asperam arteriam esse magna, ut etiam vocem. Itaque vtrumque interpreteris, significatur, eos qui sunt magna voce, multum habere calidi innati. Argumento est, quod experimento cognouimus, plurimos talium esse voraces, ut qui cum plurimum habeant innati calidi, indigent plurimo alimento.

Qui ventriculo calidi sunt, frigidas habent carnes, & graciles sunt, his vena eminent & iracundiores sunt.

Si tantum diceret, calidos ventre & graciles esse venofos & iracundos, intelligeremus tales esse naturā calidos & siccos. Nam dictum monstratumque pluries alibi est, crassos cum venarum gratitudine, esse frigidos & humidos: crassos cum venarum amplitudine, esse calidos & humidos: graciles cum venarum angustia, esse frigidos & siccos: graciles cum venarum amplitudine esse calidos & siccos. Itaque intelligeremus *hominem* nomine dici calidos ventribus, hoc est, interno corpore, quibus scilicet plurimum habent ventris innati calidi, & nomine *iracundiorum* eos qui habent magnas, venas, diceremusque ea omnia esse signa calidi & sicci temperamentum. Sed cum dicat etiam frigidas habere carnes, euadit oratio longe difficilior. Nam qui naturali calore abundant, ii carnesque etiam calidi deprehenduntur. Quapropter hæc nota videtur aliis omnibus esse contraria, & repugnans: neque in eundem hominem posse conuenire omnia. Quidam interpretabantur calidam naturā, quorum alii omnes notæ sunt, accedite etiam frigidas esse carnes, quod calor ventris carnum calorem ad se trahat, atque ita ille frigide maneat. Quos carpit merito Galen. quod id quod ob quasdam affectiones præter naturam fieri potest, ut per lippriā vocatam febrem, & quibusdam humorum moribus, ut in febrium invasionibus, & in somno & quibusdam temporibus, ut hyeme, aut quibusdam moribus animi ut mœsticia (in his enim omnibus abundat calor interius, quod interdum trahatur, aut ipse sese intro recipiat, aut introsum repellatur) fieri simpliciter in calidā naturā affirmant. Cum tamen hoc nunquam ita fiat, sed quod calidiores sunt ventres, eo carnes maiorem calorem præ se ferant. Nimirum carnes naturaliter recipiunt calorem à visceribus, quapropter dicere corporis habitum esse frigidiorē, quia venter calidior est, petinde est ac si dicas defecisse aquam fluminis, quod fontes vnde oritur redundauerint. Simile est quod frequenter audio medicos dicere, ubi quis cibos non bene coquit, sentit verò finem, aut omnino aliquem habet sensum caloris interius, aut in voce lium manu: affirmant enim hepar calidum ventriculo calorem detrudere, cum tamen id, naturaliter adhuc sese habente homine, fieri non possit, quia naturaliter accipit ventriculus calorem ab hepate per venas, atque adco per continuā alterationem: quineriam fortasse neque exultio præter naturam facta in hepate potest eo peruenire, ut ventriculum calore priuet. Nam cum ob ingentem inflammationem hepatis cunctis refrigerari habitum corporis, sium habent ægroti, quod ardoris ventriculi signum est, nimirum est ventriculus hepatis proximus. Non ergo ob calorem hepatis illud vniquam euenit sed ob dispositionem quandam morbosam, quam Galen. interpretatur significari præscripta nunc oratione: ea est intemperies calida ventriculi, per quam cibi

pro concoctione corruptionem subeunt, exis enim corruptis non potest non fieri vitiosus sanguis. Vnde fit ut carnes penuriam pariantur alimentum (perinde enim patiuntur, cum carent alimentum, atque cum prauo vtuntur succo) atque ob id marcescant frigide, & sicce factæ: tales ergo sunt ventriculo calidi, calore nimio, vitioso, & corruptiuo, ac fortasse etiam hepate & totō ventre calidi, & quia prauo vtuntur succo, frigidi carne & graciles: venosi vero, non quod magnas venas habeant sed quod habere videantur, quia nulla pinguedine sed sola cute teguntur: sunt etiam iracundiores, non ut qui multo prædicti sunt calidiores naturali, cum magnanimitate, sed faciles ad irā, moleste ferentes quidam, & sibi ipsis & aliis omnibus displicentes, id quod fit ob pungentem illam vitiosi sanguinis qualitatem, & imbecillitatem. Atqui profecto verba quibus vritur Hip. plurimum aspiantur huic interpretationi. Nam *iracundiorum* non tam videntur esse qui magnis sunt venis quam qui habent eminentes, atque, ut quis dixerit, superstantes. Iam vero *hominem* haud dubie dicuntur qui celeriter irascuntur, quorum ira *sepe* dicitur porius quam *sepe* ut & qui cum fortitudine irascuntur, dicuntur *sepe*. Sed hæc in arte medicinali, ubi de naturalium temperamentorum signis agitur, satis superque explicata sunt à me.

Terra siccitatis squalidā volatiliū genus bene se habet.

Volatilia aeris alterationem multo magis sentiunt, quam reliqua animalia, ut piscium genus alterationes aquæ. Nimirum vrilique est quedam familiaritas cum suo naturali domicilio. Hinc fit ut venti & imbres avium volatu, & perturbatione: maris tempestatibus, plus solito subsultantium & gregatim huc & illuc decurrentium piscium perturbatione, præmoueantur. Nimirum aer vaporibus multis, usque crassioribus admixtus crassescit cum instant imbres: mare vero cum instant tempestates, exhalationum, quæ marcia ventorum est, mixtione turget. Vtraque autem est aliena & vitiosa affectio, illa aeris, hæc aquæ, atque vtraque sympathiam. habentia animalia tangit. Si igitur dictam ob causam volatiliū corpora imminetibus imbribus male afficiuntur, merito cum tempus humidum est, & multi imbres antecesserint, ægrotabunt: atque proinde in contrariis temporibus, cum scilicet terra arida est, bene habebunt. Nimirum temporibus siccis aer tenuior & purior est, & suam naturam melius retinet: humidis crassior & impurius, & in aquæ naturam violenter tractus. Nam cum calefactione & siccatione fiat ex aqua aer, & contrariis passionibus ex aere aqua, tempus siccum & calidum erit nature aeris propitium, frigidum & humidum nature aquæ. Quare & hoc piscium generi, illud auium.

Vter testis extra apparuerit, videndum: si dexter, mas: si vero sinister, semina porrenditur.

Testis dicuntur Hippocrati qui ardent libidine, infliganturque ad coitum, atque *epære* qui ita est affectus. Velut ex matre agnoscere docuit Hippocrates in aphorismo atque in hoc ipso opere, mas generetur a femina, quod in dextra vteri parte generetur, aut sinistra ita nunc docet agnoscere ex parte, quod hircienti dexter testis turgescat, atque ob id exterius appareat magis quam sinister, aut contrā. Nimirum partes dextræ vtriუსque parentis sunt calidiores. Hanc ob causam equis admittariis, quum in Equas mittantur, ligari solet testiculus sinister, vt ex solo dextro emissio semine Equus generetur. Constat tamen hic quoque intelligi debere, *videtur*, vt quum Hipp. dixit mares in dextra, feminas in sinistra parte magis generari. Nihil enim horum est perpetuum.

Oculi prout valent, ita & totum corpus: & color in deterius aut melius labitur. *Æquum est autem prout se habet alimentum, ita etiam externas partes sequi.*

Oculos sæpe teneri multis morbis propriis, reliquo corpore non perinde affecto, res est notissima, cum oculorum plures multo quam vilius alterius partis morbi recensentur. Sed quod dicitur intelligi debet; non de morbis, sed passionibus, quæ symptomata sunt, & de significatione quæ inde accipitur. Longè enim maiorem significationem præstare oculos, modi quo totus homo affectus est, nemo ignorat. Inditium enim est in eis quod solemus, quum de cuiuspiam valetudine solliciti cogitamus, in illius oculis inueneri. Nimirum demissus & sub tristis intectus languorem indicat, vitiosus color nulla in parte tam citò apparèt, neque vlla pars tam citò colliquefcit, & excoriatur: Hinc fit vt Hippocrates in prognostico, nulla ex parte tam multa signa accipi iussit. Itaque hæc pars omnium maximè significare potest, quo pacto habeat totum corpus: quinciam (si hoc quoque nunc dicere est oportum) & quomodo habeat animus indicat. Nam & physiognomii vtuntur ad mores animi agnoscendos hac parte magis, quam vlla alia, & motus omnes animi, vt iram, timorem, mœsticiam, hilaritatem, pudorem hæc pars prodit, quin & proprii criminis conscientiam magis quam reliquis vultus. Itaque oculi & corporis & animi passionem indicant melius quam vlla alia pars. Corporis quidem quia lucidissimi tam sint, colores alios faciliùs repræsentant, cumque ob naturalem reuerentiam finit suffulci circumquaque mollissimis carnibus, facillimè excantur, & quia plus longè quam vlla alia pars recipit ex cerebro animalium spirituum, qui facili per facultatis debilitatem subtrahuntur: animi verò, quia sunt illius fenestra, & nullo alio organo adeo cum externis rebus conuersantur, atque ideo necesse est plus quam alia omnia esse animi naturalibus propensionibus accommodatos, & mutari, vt animus ad res externas afficitur. Quod addit, & color in deterius aut

A melius labitur, intelligi potest speciatim de oculis (mutatio enim coloris est in iis, quæ præcipue in oculis possunt significationem. aliquam præbere) aut simpliciter, non enim in solis oculis, sed omni etiam in parte mutatio coloris significat corporis affectiones: siquidem vt rectè dicit Galenus, necesse est colores similes efflorescere in cute; succis, qui in corpore redundant: quod idem Hippoc. nunc dicit his verbis: æquum est autem prout se habet alimentum, ita etiam externas partes sequi, hoc est vtræ habent succi, ita & cutis colorem apparere. Eadem verò est causa viriosi coloris & in oculis, & in aliis partibus, vitium scilicet succorum:

Signa lethalia sunt quum per cutem vapor calidus exit, si nasus frigidum spiritum prius emisit. Vitalia autem contra se habent.

C Interprete Galeno scribit Hippocrates vnum quoddam signorum lethaliū, idque esse calidum vaporem exire per cutem, cum prius nasus frigidum spiritum reddiderit. Cuius causam esse dicit, quod vt in prognostico, atque adeo aphorismis celebratum est, per caloris naturalis penuriam frigidam exparetur. Quibusdam verò horum paulatim tabescente naturali calore, paulatim succedit omnium partium frigus, & nunquam recalescentes moriuntur: aliis exiguis ille calor qui se intra cor continebat, dissipatus exhalat, atque horum quibusdam succedit sudor quidam, præcipue per frontem & cæticem, & inter nasum & os: quibusdam euaporatio calida ex cute. Rursum horum quibusdam, simul cum exhalante calore emoritur cor, alij quib' cor per se ferat firmius, & sustinent tunc quoque expectare, donec dissipato iam fere toto naturali calore, frigent toti aliquot horas eorum quidam, etiam sine pulsu in carpi manuum, & hi quidem solent mori aliquanto tardius, quam medici putarent, & illi quibus cor simul moritur cum caloris exhalatione, citius, vt vtrique solent eos fallere in moriendi hora. Itaque lethale est calidum vaporem exhalare per cutem, cum antea frigidum spiritum reddere nasus ceperit. Addit vero, vitalia autem contraria, quod quidem dubitationem ingerit. Nam monstratum est a me in commentariis prognostici, in genere signorum salutis aut mortis non esse signa bona æqualia contrariis malis, sed quæ contraria sunt lethaliis, esse tantum bona, non etiam salutaria, aut vitalia. Velut mente motum esse, lethale: mente consistere, tantum bonum. Igitur nunc quoque, etsi vapor calidus per cutem post frigidam expirationem lethale sit, contrarium non est vitale, seu valde salutare, sed tantum bonum. Nimirum vt Galen. sæpe monet, cum de prognostici signis agitur, animaduertendum quo attributo vtatur Hippocrat. *Quum* vero seu vitalia longe plus significant, quam si diceret *et* seu tantum bona. Proinde mihi persuasum, quum dicit *et* nasus, non intelligere, vt Galenus interpretatur, non respirare frigi-

dum, neque calidum vaporem effern per cutem. Lene enim est, siquis, quia neque respirat frigidum, neque emittit calidum vaporem, asfirmet ægrum non moriturum: sunt enim innumere alie signorum syndromes; quæ indicant mortem, sed vocat Hippocrates aut contraria signa valde salutaria, quæque ea sint: aut hæc oratio est mutilata, desuntque multa alia signa, si enim esset integra, contineret catalogum signorum lethaliū: quum verò addit & *summe sanæ*, intelligit omnia contraria simul, hoc est, vitale esse, nullum lethaliū signorum adesse. Nam in morbis acutis, præcipue cū processerint ad vniuersale incrementum, nullum adesse lethaliū salutæ est, meritoque medicus tunc temporis salutem promittet. Huic vltimæ enarrationi plurimum fauent, ipsa verba. Nam vnici signi mentionem facturū, non dixisset, velut dicenda proponens, signa lethalia sed signum lethale: neque vitalia contraria, sed contrarium vitale.

SECTIO QVINTA.

Natura sup̄s morborum medicatrices.

Ad hanc sententiam pertinet quod libello de alimento dictum est his verbis. Natura iuuat omnia omnibus, quæ à nobis enarrata sunt: nihilominus nunc quoque aliquid adiiciemus. Certè medicina est morborum medicatrix, siquidem est ars medendi, & medicus curat morbos. Verum natura hæc facit multò magis, quia natura est principium & causā rebus omnibus suæ conseruationis, morbus autem est affectio corruptiua, ac proinde necesse est naturam omni morbo repugnare, ac si possit etiam vincere, quod quidem est esse morborum medicatricem. Ars cum rectè operatur, iuuat naturam aduersus morbos. Nam cū sanitas non sit res quæpiam artificialis, sed naturalis, non potest ab arte fieri sed à natura, potest verò ars suis instrumentis naturam iuuare, quod rectè significauit Hippocrates loco citato ex libello de alimento, dicens. Natura iuuat omnia omnibus, ad hanc verò extrinsecus cataplasma, illitio, vnguentum. Itaque natura primò ac maximè sanitatem reſcit, & morbos expugnat, medicus verò est naturæ minister, & medicina artis ministrandi naturæ. Occurrer fortasse aliquis, obiciens, artem non ministrare naturæ, sed per se ferri contra ipsum morbum, alioqui enim (diceret) medicamenta essent naturæ similia (siquidem simile iuuatur à simili) at vero non sunt, sed morbo contraria, quasi per se, non naturam iuuando, ferantur in morborum curationes. His addet alius artem multa facere, natura nihil in ea opera conferente, ac nonnumquam etiam repugnante, quia propter talium morborum non videri naturam medicatricem, sed artem solam. Nam cum os reponitur in articulum luxatum, aut conficiuntur vulnera aut secantur, vitæque quippiam, nihil videtur facere natura partium. Iam verò cum ferro, aut igne, aut medicamento extirpatur supercreſcens caro, videtur repugnare. Quia natura auget carnem, quam ars

demolitur. Præterea plerisque morbos videtur natura facere, eisdemque ars naturæ repugnando tollere. Quamplurimi enim sunt, ac fortasse etiam plerique, quos parit fluxiones, non aliter factæ quàm ipsa natura, cæca mixtente quod non oportet: qui sunt curantur medico in aliam partem retrahente, aut deriuante. Quomodo ergo curare quis dicat naturam morbos, quos facit? Aut naturæ ministrare artem, cum contrarium morum ciat? Non dicimus solam naturam esse medicatricem, sed eam quidem maximè, quia naturæ rerum, cum non in vna quapiam qualitate, sed multarum mediocritate consistat, non vni cuiuspiam morbo sed omnibus contraria est, atque quodammodo causā vniuersalis. Quamquam ergo medicamentum morbo contrarium sit, vt frigidum calido, aut calidum frigido, ac proinde in illum pugnet, pugnantibus autem simul diabus causis, altera interna, altera externa, merito illi deferuntur prius. Itaque hanc ob causam merito natura dicitur esse præcipua medelæ causā, medicina verò illi ministrare, quia cum præcipui conſecratores sint natura & morbus, quod pugnat cum morbo merito dicitur naturæ ministrare. Porro ars multa facit sola, perficit tamen nihil, neque vllus morbus potest ope solius artis perſanari. Nam futuræ non sanabunt vulnera, nisi natura agglutinet, neque repositio ossis erit satis, nisi natura firmet articulum ligamentis, neque scissio conferet, nisi natura pellat malum quod suberat, vt pus aut os cariosum. Neque catem extirpari erit satis, nisi desinat natura repugnare, & cicatricem producat, neque sanè ad inflammationis, aut articularis doloris curationem, satis est fluxionem auertere, nisi partis affectæ natura id morbi quod factum est demoliarur. Itaque illos ipsos morbos quos mittentium partium natura fecit, partium recipientium parata sanat. Omnium itaque morborum est natura medicatrix, quia sine ea nulli perſanantur, ab ipsa autem sola quamplurimi. Semperque illi medicina ministrat, etiam cum aliquatenus repugnat, quia tunc quoque inchoat ipsa, quod perficiat natura.

Inuenit natura sibi ex se non ex consilio aggressiones, partim quidem vt oculis conſpicere, partim verò vt ea quæ lingua subministrat, & quæcumque alia huiusmodi. Existi inuoluta sit natura, nec ab vlllo edocta, facit ea quæ expeditur.

Hæc quoque sententia à me enarrata est in commentatione libelli de alimento. Ibi enim ita est scriptum *quis miris æstetum*. Tradat Galen. hunc locum fusius primo, de vsu partium non longè à principio, vbi vt etiam in commentatione, huius loci, de liberis animalium moribus intelligit Hippocratis verba esse prolata, dicitque illud esse mirabile in animalium naturis, quod vnumquodque feratur in ea opera, quibus exequendis habeat accommodatas partes & instrumenta, atque perinde moueat, atque si ab aliquo esset singularum partium vtilitates & vsus edocta. Nimirum cum non sit propensum

animal quodcumque in naturales actiones, quia habet idonea instrumenta, vt dicebat Anaxagoras, sed potius vt dicebant Aristoteles & Galenus, naturali propensione instrumenta adaptentur, datæque sint talia, quia talis naturæ propensio talia poscebat, & propensio illa naturæ antiquior sit quibus organa, vt animam dixit Plato antiquiorem esse corpore, sit vt in talem motum ipsa animantis natura feratur, instrumenta verò vt pote accommodata facile obsequantur, ipsa natura itaque docta, neque omnino agnoscente instrumenta. Vt conuenient palpebris homines, & linguam variè mouent, cum tamen per pauci sciunt quibus instrumentis claudantur oculi, aut moueatur lingua, & imitantur quascunque audiunt voces, ignorantes quibus musculis, quomodo, & quousque mouenda sit lingua, vt proferatur hæc aut illa vox. Eadem autem ratio est & aliorum, nam neque crura sciunt, nisi pauci, quibus musculis moueant, atque oh id, natiuitatis & linguæ mentione facta, addit Hippocrates & quæcumque alia huiusmodi. Meminit autem arbitror, illorum potius, quia motus illi in motibus dubiis sunt, hoc est qui non aguntur manifestis instrumentis, vt alij qui ad nutum voluntatis aguntur quod quidem de motu palpebræ testatur ipse Galenus decimo de vñ partium cap. 10. confessus se instrumentum illius non agnoscere, promittensque si quando inueniret, in libro de dubiis motibus indicaturum. Is liber non extat qui sit legitimus, neque scimus an eius motus causam alicubi Galenus docuerit, est tamen merè ponendus in dubiis, velut etiam linguæ extremæ volubilitas. Nam muscoli nouem, qui in linguam sese inferunt, non procedunt ultra medium illius, superest caro quædam laxa & mollis, sui generis, neque vlli aliarum partium corporis similis, quæ videtur sine musculis atque omnino sine fibris in omnes partes moueri: nisi fortè inuisibiles quædam fibræ muscutorum vsque ad linguæ cuspidem procedant, scis autem est dubius motus, qui ad suspicionem inuisibillium fibrarum venit. Palpebræ motum quidam referunt in membranam carnosam, vt & frontis: alij verò eam eisdem musculis moueri, quibus oculum, & ex musculis, contorquente oculum ad angulum minorem, & sursum eleuante, fibras quasdam inferi in palpebram superiorem, quibus ea eleuatur, & oculum aperitur, atque à contorquente in angulum maiorem, & deorsum trahente, alias quibus ea deprimitur, & oculum clauditur: argumento, quod quis conatur oculum plurimum aperire, eleuatur ipsum oculum, & in externum angulum contorquent; qui claudere conatur. Verum dicti ambo motus habere causam satis dubiam & neque vlli medico satis perspectam. Tamen eam ita sit, quibus, etiam recens natus, scit eos motus exequi, ipsa ductus naturæ, non minùs quam si quomodo, & quibus instrumentis essent agendi, optime didicisset. Iuxta hanc enarrationem interpretatur Galenus dissillè Hippocratem, *ἀνεκτον τὸ πῶς ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν*, perinde ac si dixisset, impetus ad agendum. Verum si hæc verba vt Galen. ipse in commentatione proximè sententiæ, quæ huius sectionis erit tercia, dicit, cum prioribus coniungenda sunt, & expo-

nenda secundum illud, naturæ sunt morborum, medicatrices, ego in alium feror sensum, *ἐπιδὲ* scilicet vocari eas vias, quibus propriè id nomen congruit, per quas scilicet euacuantur excrementa, & quicquid in corpore propter naturam continetur: atque hæc verba perinde accipi, ac si dixisset, natura morbos curat, si quidem etiam cogitatione non vratur, perinde tamen ac si vreretur, & esset docta, inuenit sibi vias, per quas morborum causas euacuat: nunc quidem manifestas, vt quum deiectione, vomitu, mictione, aut fluxu sanguinis ex naribus morbum iudicat: nonne occultas, vt quum citra omnem expectationem, atque adeo cum magna admiratione omnium, quædam nulla parente via rejicit, velut ego vidi quendam ex naribus emungere officula quædam ex cranio, in fronte decisa. Inuenit quippe natura sibi vias non ex cognitione, sed naturaliter, cum nihil didicerit, facit ea quæ expediunt. Velut etiam motus animales exequitur, nasciturque, & loquitur quicquid lubet, impetu quodam naturali, etiam si ipse qui tentat ita mouere, nesciat vt eas agatur. Itaque natura non tantum quæ ad animales, sed quæ ad naturales etiam motus spectant, facit perinde atque si esset docta: & hoc loco Hippocr. naturales potius respexit, quibus curantur morbi: quæ verò de animalibus dixit in confirmationem, & exemplum, apposuit, quod vel mox sequentia verba palam faciunt.

*L*acrime, narium humiditas, sternutationes, auris sordes, oris solæ reiectio, spiritus introitus & exitus, oscitatio, tussis, singultus, non eiusdem sunt omnino modi.

*C*onsideranda est vrina & status excretio, & huius alterius, alimenti & spirationis: & quæ feminis accidunt & secundum reliquum corpus, sudores, pruritus, pandiculationes & quæcumque alia huiusmodi.

E Quia distans antea est, naturam esse morborum medicatricem, & ipsam quidem sine cognitione inuenire sibi vias per quas purget corpus, vrina etiam quàm plurima facit naturali quodam siue impetu, sine instinctu (vrinque lubet Hippocr.) perinde ac si esset docta, profert nunc Hippocr. quàm plurima exempla, partim quidem euacuationum, partim aliorum operum, quæ ita facit natura, vt mirari quis ex illis possit, eius sine cognitione naturalem sapientiam, seu providentiam. Enumerat verò lachrymas, & narium humiditatem, & sternutationes, & sordes aurium, & reiectionem saliuæ, & spiritus introitum & exitum, hoc est inspirationem & expirationem, & oscitationem & tussim, & singulum, quibus enumeratis dicit, non eiusdem sunt omnino modi: deinde rursum addit, vrinæ deiectionem. Quibus verbis quidam intelligunt vrinæ excretionem, alij accipiunt ac si diceretur vrina & deiectionem, quia nomen deiectionis (græcè *ἀποκέν*) non videtur

dici propriè de mictione, sed de sæcum excretionem, ego suspicor vitiatum aliquid esse hoc loco, legendumque non vrinæ in genitio casu, sed vrina, aut vrinæ in nominatio, aut deficere vocem quandam, legendumque *ἡν ἔκκριται ὁ ὕδωρ* Vtunque legatur, intelligo hic connumerari vrinam, & deiectionem, post quæ dicit, & status, & huius alterius alimonix, hoc est, (vr Galen. interpretatur) & status qui ex alio exit, & huius alterius, qui ex alimento eleuatur ex ventriculo, emittiturque eructando per os: addit & spiritus, hoc est transpirationis quæ agit arteriarum liquidum pulsum, & alia insensibili expiratione. *Καὶ τὸν ἵσμον*, inquit, hoc est, & ea euacuatio quæ feminis est propria, agitque venis vteri exsulantibus intrailum sanguinem singulis mensibus. His (inquit) & secundum reliquum corpus sudores, quasi dicat, his, quæ dicta sunt, accedunt sudores secundum reliquum corpus: Addit deinde, & pruritus, & pandiculationes, & quæcumque alia huiusmodi: Scilicet non sunt enumerata omnia quibus natura mirabilis est, & corpora nostra à morbis liberat, vtunque enim accidit, omnibus iis, quæ sunt enumerata. Ea enim omnia mirabilem vim nature, & veluti sapientiam, atque (vr dicam melius) sapientiam parentis ipsius nature indicant, & modi quidam sunt expurgationum, qui sua vniuersique occasione, à morbis liberant. Fletus, & salubris spuitione, & mictus & sudore euacuatur serosa humiditas ex capite, & faucibus & venis, & corporis habitu: nasum humiditate & aurium sordibus crassiora cerebri excrementa, sternutamentis, & expiratione, & oscitatione, & pandiculatione; & duplici statu, & transpiratione, vapor ex cerebro, & pulmone, & buccis, & totis artibus & ventriculo, & intestinis, & toto corporis habitu: rasis expurgat pulmonem; & arteriam asperam, ac per ea thoracem: singultus discendit ab ore ventriculi, nunc statum, nunc succum. Scalptus etiam discendit multa per earem, & extergit. Itaque omnes hæc sunt vacationum species: atque adeo in morbis quibusdam viles. Lachrymæ aliquando deonerant caput, & laxant cor, quo fit, vt humiditate serosa secundum caput redundantibus, & iis quibus cor angitur, viles sint: natum humiditas copiosa perinat à coryza, atque adeo sine recidit, vt sectione tertii huius secti diximus: sternutamenta hæc ita magnam euacuationem faciunt, sunt tamen & ipsa vilia in declinatione morborum capitis, aut cum ià saltem penitus cessauerint fluxiones. Sordes quotidianæ aurium, quæ ob substantiæ similitudinem vocantur cera, & *ωτὰ*, capitis excrementa sunt, non tamen sunt satis ad insigniū morborum curationes, aliæ autem sordes, vt effluens ex auribus sanies aut pus, maximis capitis morbos soleat iudicare. Ià vero spuitione multà & confertà, videt melancholia morbo laborantes, magno opere subleuatos: cuius causa est, quia sanguis melancholicus est etiam serosus, vt sectione secunda huius secti diximus. Expiratio assidue expurgat pulmonem, iudicario tamen morbi per eam non fit, vt neque per oscitationem, aut pandiculationem (est enim oscitatio, pandiculatio musculorum oris) neque per singultum, verum suas ipsorum causas consumunt. Tuli omnes morbi thora-

A cis iudicantur, quia sine ea nihil potest ab illo reijci. Ià verò vrina & deiectione, & euacuatione muliebri, & sudore iudicari multos morbos, nemo ambigit. Flatus inferni excretus, vel solus aliquando tollit dolorem colicum: superne eructatus, hypochondriacos, & mulieres quæ præfocantur ex vtero mirè subleuat. Scalptus multis etiam morbis est utilis, quia ad cutem conuocat ex visceribus, & inde discendit, habet denique utilitates duræ frictionis. Itaque hæc omnia sunt genera quædam euacuationum, quas molitur natura. Neque enim quia merè libera sunt eorum quedam, velut scalptus, non sunt præstidae dicenda naturalia opera: Nam quæ quàm maxime sunt talia, aguntur instinctu quodam naturali, vel nihil tale cogitant hominē aliquando, sed necessitate ipsa doctus, vt ipsum consuetudine oculis, plerique autem sunt facultatis, quæ peculiariter vocatur naturalis. In omnibus tamen his mirabilis naturæ prouidentia indicatur, habentque hæc omnia mirabiles causas, & generationes: lachrymarum generatio mirabilis est profecto, cui etiam per merorem, quæ cordis passio est, ex oculis serosa illa humiditas tam abundanter destillat. Vnde præstatur materia tam copiosa aliquando fletui? Cur animalium solus flet homo; cum non solus moreretur, aut doleat, neque video quis satis aperit dicat, neque facile discit. Quamquam vt ad alia omnia, ita ad hæc quoque videtur Aristoteles omnium optimè aperuisse viam, dicens (secti. 5. proble. 35. lachryma sudor quidam est. Quod quidem verum esse ipsa lachrymarum substantia indicat, siquis enim pariter & flet & sudat, vt vtriusque guttæ decurrant per genas, ex substantiæ modo non poteris sudoris & lachrymarum titulos distinguere: consentaneum igitur est, generationis modum esse similem, hæc solum ratione differre, quod lachrymæ ex solis oculis distillant, sudor ex aliis partibus, vt sint lachrymæ oculorum sudor. Sudant vero copiosius oculorum partes quàm aliæ, quod oculi glandulis humidissimis & mollissimis substrantur, ex quibus humiditas multa facile elicitur. His consonum est, à similibus causis vtunque fieri, quod certe ita euenit, in maioris & minoris solum ratione consistente differentia. Nam & qui exercentur multum, mouenturque rapide sudare solent, atque si humidi sunt cerebro & oculis etiam lachrymari, atque etiam si risu magno suffunduntur, vt calorem contrahant, vtunque patiuntur. Sed & ex angustia atque cordis afflictione solent homines non flere solum, sed & sudare. Verum non sunt ambo æquæ ab his omnibus causis, sed ab afflictione cordis, aut dolore fletur magis quam sudatur: à vehemēti corporis motu sudatur potius quam fletur, quia exercitatio calore mouet humiditatem. Calor verò magis exercitatione totius corporis musculi, quorum proprius est ille labor, quàm oculi, qui & cerebro sunt proximi, & tunc quidem non nisi cum capite mouentur. Ex risu verò, & cachinnis, & calore etiam mouetur humiditas, vt citato loco Aristoteles dicit, fletur tamen sæpius quàm sudatur, quia videndi motus à corde ad oculos est, maximeque agitur oculi, & reliquæ faciei partes. Tristitia & perturbatio non mouet humiditatem calore: sed debet

litate, & tentione, vt Aristoteles docet, vt vndecima sectione problemare quinquagesimo, his verbis. Sunt enim qui flect corpore intentioni, & infirmiori. Id dicit quia cor triste, debile, & in sese contractum est; reliquum autem corpus compactum est necesse, cum accipiat à corde vim & robur omne (vitalis enim vis omnium aliarum est consuetudinis), & sit illi alligatum per venas, sed & per nervos: cum articularum quidem radicatio cor sit, nervorum autem ramuli arterijs alligati decurrant. Itaque debilitantur, & tenduntur partes omnes cum tristi & anxio corde, multò autem magis vultus, atque in eo, oculi maxime, quia illis cum corde est maxima sympathia. Cum enim cordis motus alix omnes partes aliquatenus representent, multò autem magis oculus & vultus. Quod quidem natura in hominibus præcipue procurauit, vt vel hac causa temperarent ab affectibus, & à criminibus, quæ difficile esset vultu non potest. Proinde maioribus venis & arterijs texti cutem vultus, quam reliqui corporis: oculi verò præter hæc alligantur cordi plurimum per cerebrum, cuius cum eo maxima sympathia est. Tentio igitur facit vt humiditas exprimat, debilitas verò vt dimittat. Verum cum cor vehementer est contractum in sese, velut exorbet humiditates, tuncque oculi aridi sunt, cum laxari incipit, dimittit, tuncque oculi præ tentione & debilitate desiliunt, & cor amplius laxatur, & degenerat cerebrum, quia glandulæ oculorum hanc humiditatem deponentes, reliquam quæ in cerebro redundat alliciunt. Accidunt autem hæc soli homini, ob dictam sympathiam vultus cum corde, & quia cordis motus in homine sunt vehementiores, ob imaginationis vehementiam, & sollicitudinem futurorum, & quia habet cerebrum maius & humidius, vnde succus circa oculos redundat. Saluè redundantia, similem quodammodo habet causam. Nam vt oculorum glandulæ lachrymas, ita quæ vocantur paristhymia generant in ore salinam. Reiectio verò eius longè differt à sctu; partium enim redundantia effluit, partim muscularis oris reijcit. Reliquorum omnium, quæ Hippocrates hic commemorat, cause, etsi mirabiles sint, atque si quis eas seorsum velit contemplari, sit habiturus magnam sapientie diuinæ, quæ in natura rerum se insinuat, argumentum, traditæ tamen sunt à Gal. & à me etiam ipso aliis locis, vt non sit opus nunc sermonem de his longius producere. Sed solum consideremus, vt illud quoque verè Hippocrat. dixerit, hæc non esse eisdem modi: sunt enim valde diuersi, atque quædam etiam modi contrarij. Nam lachrymæ & salua effunduntur vt dictum est, sterutatio & singulus sunt conuulsiones, narium humiditas & aurium sordes expultricis motu, ei facultati maxime consuetæ, vt & menstruæ euacuationes, & sudores, & vrina, & deiectio, & flatus. Quamquam & in his quoque interest, quod quædam à sola naturali vi, quædam adiuvante, etiam eâ quæ muscularis virtus, oscitatio & pandiculatio musculorum laxatione, aut alternatè aliis seruantibus, aliis mouentibus, vt ita non tam expellantur flatus quam dètur via exumbus: scalpæ velut derafiō quædam est. Sed & contraria etiam facit natura

A similibus moribus. Nam oscitatio dilatando euacuat flatus, respiratio verò dilatando flatus trahit. Aded sunt miranda quæ narrata pro sanationis animalium tutelâ, & morborum curatione machinata est.

B *Hominis anima semper producitur vel reficitur usque ad mortem. Si autem una cum morbo incendatur, ipsa tunc anima corpus depascitur.*

Quam tenuerit de animæ essentia Hippocrates opinionem nullibi aperuit. Nam de natura humana scribens, temperet ex elementis videtur tribuisse nature nomen potius, quam vltimam animæ propriam essentiam inuestigasse. Galenus quoque vbi de animæ essentia sermo incidit, deuitat eam disputationem, dicens se nullam demonstrationem eius reponisse vquam consequi, præterquam libello de rigore & tremore, & palpitatione, vbi (quoniam arbitror ad inuestigandam rigoris generationem, quam vltima alia erat accommodatior) in opinionem incidit Stoicorum, dicentium animam esse ipsum naturale calidum, quod quidem est sanguis & spiritus: illud enim esse substantiam ex se ipsa semper mobilem, neque vquam quiescere, sed per arterias, atque aded corpus totum huc & illuc per se moueri (hoc respiciens Hip. in hoc ipso libro, impetum faciens ipsum appellauit) atque aded compactum esse ex igne & aere, vt calore moueretur, frigore verò (frigidum enim dicebant esse aërem) coarctaretur, quominus dissiparetur, & transiret. Alij etiam vetustissimi philosophi, vt testatur Hippoc. primo de natura humana, censabant sanguinem esse animam. Diogenes censabat esse aërem, seu spiritum. A me de animâ scripta sunt quàm multa in commentariis in libros de anima Aristotelis, cuius sententia omnium mihi placet maxime, esse scilicet actum corporis physici & organici. Quamquam si hominis anima seorsum definienda est, sit satis dicere, esse substantiam quandam incorpoream, cui præ aliis omnibus mundi rebus simul accidit, & esse corporis actum, & separari posse. Verum hæc exactè definire, ad præsentis orationis interpretationem haud est necessarium. Illud vnum sit satis nunc scire ad medicinæ placita indifferens esse, quæ de animæ essentia tenes opinionem: scias verò Hipp. nunc iuxta aliorum sententiam, succos & spiritus vocare animam, atque ita dicere, animam dum homo vivit semper refici, si autem ignescat, morbum fieri, & animam ipsum corpus depasci, ipsamque consumi. Nimirum sanguis ex alimento quotidie reficitur, atque spiritus ex sanguinis vapore, & ex aere, qui inspiratur, & articularum motu trahitur: quum verò ignem calorem concipiunt, sit sepsis, ex spiritu diaria: ex succis, putrida, à quibus enenit corpus exuri, ac colliquecere, atque ita nunc in febrem hæticam procedere, nunc liquefcens mori.

D *Ut testatur Hippoc. primo de natura humana, censabant sanguinem esse animam. Diogenes censabat esse aërem, seu spiritum. A me de animâ scripta sunt quàm multa in commentariis in libros de anima Aristotelis, cuius sententia omnium mihi placet maxime, esse scilicet actum corporis physici & organici. Quamquam si hominis anima seorsum definienda est, sit satis dicere, esse substantiam quandam incorpoream, cui præ aliis omnibus mundi rebus simul accidit, & esse corporis actum, & separari posse. Verum hæc exactè definire, ad præsentis orationis interpretationem haud est necessarium. Illud vnum sit satis nunc scire ad medicinæ placita indifferens esse, quæ de animæ essentia tenes opinionem: scias verò Hipp. nunc iuxta aliorum sententiam, succos & spiritus vocare animam, atque ita dicere, animam dum homo vivit semper refici, si autem ignescat, morbum fieri, & animam ipsum corpus depasci, ipsamque consumi. Nimirum sanguis ex alimento quotidie reficitur, atque spiritus ex sanguinis vapore, & ex aere, qui inspiratur, & articularum motu trahitur: quum verò ignem calorem concipiunt, sit sepsis, ex spiritu diaria: ex succis, putrida, à quibus enenit corpus exuri, ac colliquecere, atque ita nunc in febrem hæticam procedere, nunc liquefcens mori.*

F

Morbi conuulsi in senectute desinunt, & per concoctionem, & solutionem, & rarefactionem.

Non omnes morbos qui à prima ætate homines diuexauerint, relinquere in senectute constat, quandoquidem ipsemet in aphorismis dicit, multos commori. Quid ergo est quod nunc dicitur? Certè quod in aphorismo, senes inueniuntur ut plurimum minùs ægrotare. Quod ut in commentario dixit, fit, quia plerumque morbi eorum qui prioribus ætatibus solent crebrius accidere, senescentibus desinunt fieri: nunc explicat tres modos, quibus id solet euenire. Per concoctionem, solutionem, & rarefactionem. Vocat concoctionem, cotractionem malæ temperiei; itaque attemperationem solutionem vocare censeo, laxationem, & profusores euacuationes: fit enim hoc quoque multis senescentibus, iuxta id quod in alio aphorismo dictum est. Quibus iuuenibus alius siccus est; his senescentibus humectatur: eos verò quibus id accidit, dixit Galenus in commentario, eam ob causam melius se habere. Rarefactionem vocat meatuum amplitudinem, constat verò id quoque euenire per senectutem, his qui cum prioribus ætatibus essent pingues & crassi, gracilescent senescentes. Itaque liberabuntur à morbis (calidis scilicet) quidam senes, quia refrigerantur: quidam quòd alius eorum soluitur, quidam quòd etiam gracilescent. Non eueniunt autem hæc omnia omnibus. Nam etsi omnes refrigerentur senescentes; tamen quia non omnes laborabant morbis calidis, non omnes iuantur ea refrigeratione: neque omnes fiunt alio laxiores, neque graciliores: sed quibus alius erat adstricta, senescentibus laxatur; quibus laxa, astringitur: qui iuuenes erant pingues, senescentes gracilescent: qui graciles, crassescunt: atque ita profecto qui iuuenes erant sani, senescentes incipiunt multis corripi morbis: qui verò erant morboosi, tunc fiunt saniores.

Curatio est reluctari nec consentire morbo.

Hoc est, curatio obiectione contrariorum agitur, non similium. Exemplum autem est id quod mox subiicit, dicens.

Frigidum & auxiliatur, & tollit quacunque à calido.

Precepta iracundia contrahit, & cor & pulmonem in sese, & in caput calorem & humores euehit: gaudium autem cor relaxat.

Ira est feruor sanguinis circa cor, illud autem circa cor est quæ sunt magnæ arteriæ, quod est

A inter cor & caput, pulmo autem maximè iuxta cor est: nam ipsum cor velut digitus contegit, & duobus magnis vasis illi alligatur, arteriæ venali, & venæ arteriæ vocatis. Hinc fit, ut feruente sanguine, cor, pulmo, & caput calefiant; & repleantur. Nimirum sanguis feruore turget, & venas arteriæque tumefacit, sed & ob vehementem calorem qui illis in locis est, eo contrahitur vndique sanguis. Vnde fit ut multis ob iram oculi & venæ frontis intumescant, & tota facies rubore suffundatur, & tempora pulsent, & caput doleat, quin & febris superueniat. Gaudium calfacit etiam cor, sed minùs. Non enim tam feruēt sanguis, quàm effunditur, atque ita per iram cor & pulmo tenduntur, & firmitudinem habent, quasi versus caput reuellantur, per gaudium autem laxatur cor, & omnem amittit contentionem. Quo fit, ut per gaudium vitalis virtus dissoluatur, & dissipentur spiritus; per iram distentionem pariat cor, à feruente & tumefaciēte arterias sanguine reuulsam, & ardeat caput, virtus vero dissoluatur minùs. Quo fit, ut aliquando quidem vitilis sit ira ad naturalem calorem suscitandum, & vitium calorem paribus comparandum, quod in secundo huius operis ab eodem Hipp. dictum est his verbis. Danda est opera, ut ira excitetur, & caloris, & succi comparandi causa. Rectè ergo dicit iram, contrahere & pulmonem, & cor in se ipsa, quia non sunt laxa ut per gaudium, sed cum quadam contentione, firmitudine, & tono, & in caput euehere (quia humores eo tendentes & plena vasa reuellunt ea viscera sursum) calorem & humores: calor consistit in spiritu & sanguine: humores sunt quatuor. Gaudium autem cor relaxat.

D Labor articulis, & carnibus cibis, somnus visceribus, anima deambulatio, cogitatio hominibus.

Galenus & post illum alij omnes, atque adeo ante illum, ut ipse testatur, distribuunt hæc verba in duas orationes, leguntque scorsum *moros nrae ætatis, & caput & cor, & visceribus, & sursum & deorsum, & spiritus & humores*. Ego vero per coniunxerim, ipsa enarratio indicabit. Sunt multæ interpretationes, quas videntur verba ferre posse, atque ob id in eas diuersi enarratores inciderunt. Legunt omnes, labor articulis & carnibus cibis, atque quidam intelligunt dici laborem, id est exercitationem & motum vehementem esse cibum, id est refecationem, atque adeo robotis causam articulis & carnibus, hoc est articulis & musculis; quia partes omnes propria exercitatione roborantur, atque orio & intermissione actionis propriæ languescunt. Cum igitur motus animalis instrumenta sint articuli & musculi, dicunt eos roborare exercitatione. Alij inuertunt hæc dicentes, cibum hoc est satietatem; & nimiam cibi ingestionem esse articulis & carnibus laborem, hoc est pondus & molestiam asferre, & est sane hic sensus verissimus quoque (nulla enim ex causa sapientius nascuntur articulorum dolores, & musculorum resolutiones, quàm ex ingluvie) verum

F

Gal. non placet, quia sequentia illa verba, somnus visceribus, iuxta priora interpretari est consentaneum, itaque iuxta hunc secundum sensum dicitur, somnum esse visceribus laborem, id verò est falsum, nisi quis id quod generatim dicitur, particularim accipiens, intelligat somnum laborem visceribus esse, cum tenentur inflammatione aliqua, aut in febris inuasionem. Secundum rationem autem ipsius somni rectius dicitur, somnum esse visceribus cibum, quia maximè iuvat eas, quæ in visceribus aguntur, concoctiones. Quapropter verba hæc primum sensum confirmant, quem proinde Galen. sequitur. Quod autem ad reliqua verba attinet, dicit Galenus, si ea ita retineantur, ut occurrant scripta, significare cogitationem esse animæ deambulationem, hoc est, exercitationem. Itaque quod deambulatio est corpori, id esse animæ cogitationem. Verum dicit Dioscoridem, quod videretur ei loquutio affectata, quæ cogitatio vocatur animæ deambulatio, commendasse codicem pro suo arbitratu, legisseque pro *meis*, hoc est, deambulatione, *meis*, hoc est, de omni re, atque interpretari, quod Galenus quoque probat, animam de omni re debere cogitare, hoc est, ratiocinari, & meditari: pertinere verò hoc non ad philosophiam solum, sed ad omnes artes, atque ad medicinam peculiariter, posseque referri ad medicum, ut significet, hunc nihil debere temerè præterire, sed meditari omnia, ut agat prudenter, atque ad rationem debere uti: posse etiam referri ad ægotum, quia nonnunquam ipsum de re aliqua cogitare, quæ exercitare eum possit, siue tristis, siue iucunda, remedio est in iis scilicet passionibus, quæ primi sensus affertur stuporem, aut gravem somnum. Hæc omnia dicit Galenus, quorum est nonnulla probabilia sunt, ac vera, quædam tamen etiam videntur conquesta solum ad dicendum. Quapropter ego in alium sensum feror, quem iam dicam. Mihi videntur hæc omnia legenda coniunctim, continerique quandam præceptionem Platoniam, pertinentem ad procurationem boni habitus, non solum corporis, sed totius hominis, corporis scilicet, & animi. Quid autem habet absurditatis, putare Hippocratem scripsisse aliquid, quod ad medicinam pariter, & ad philosophiam morum pertineat, si modo verè dictum est a Galeno, libello cui titulus est, si quis sit medicus, debere philosophum etiam esse, & eum qui velit Hippocratis esse imitator, debere morum philosophiam tenere, ad quam spectat, & componere suum animum, & alios ad virtutem cohortari: Atque ipse Galenus non est sibi visus medici manus excedere, quem scripsit de cognoscendis & curandis animi morbis. Sed quæ sit Platonis præceptio, quam his verbis contineri dico, audiamus. Ille in dialogo de natura ita scripsit. Idem quoque iudicandum de eo ex anima & corpore composito, quod animal appellamus. Quando enim anima corpore admodum potentior est, exultat in eo, atque effertur, totum ipsum intrinsecus quatit, langoribus implet. Quando etiam ad discendum inuestigandumque, collectis in vnum viribus vehementer incumbit, liquefacit protinus corpus & labefactat. Denique cum ad docendum dis-

rendumque, privatim & publicè ambiciosa quadam concitatione contendit, inflammatur corpus atque resolvit. Nonnunquam etiam destillationes, fluxusque commouens, medicorum plurimos decipit, cogitque illos contrarias causas iudicare. Rursus quando corpus graue, & pigriori mole superexcedens, pusillæ exilique cogitationi animi copulatur, cum gemine sint in homine secundum naturam cupiditates, una quidem per corpus, alimentorum; altera verò per id, quod diuinissimum in nobis inest, prudentia: tunc sanè potentior illius prævalentes agitationes, quod suum est adaugent: quod verò anani, hebes, indocile; obliuiofum reddunt, atque ita infirmitatem maximam, videlicet imperitam generant. Una demum est ad ytrumque salus, & conseruatio, vt neque animam sine corpore, neque corpus absque anima moueamus, vt in mutua contentione exæquatis inuicem viribus insurgentia, bonam totius valetudinem tueantur. Hæc Plato quibus apertè innuit, ut totus homo bene valeat, neque sine corporis exercitatione esse meditandum, aut litterarum studiis incumbendum, neque his omnino dimissis corpus exercendum, quia illud faciet hominem morbosum & infirmum, hoc imperitum & stupidum, quasi meditatio animæ sit exercitatio, vt motus corporis. Huc mihi videre tendete Hippoc. & docere, quæ procuratio esse debeat corporis & animi, ut utrinque firmum sanumque seruetur. Roborant verò corpus hæc tria: labor, cibus, & somnus: animam, cogitatio, quia est animæ exercitatio propria. Itaque quicunque sibi toti bene prospectum vult, exerceat sese satis, & consentienti cibo utatur, & somno qui satis sit ad concoctionem: & reliquum tempus meditetur, quæ pertineant ad pietatem & scientiam. Ita enim viuet, & sanus, & probus, & doctus. Vbi solius corporis salubrem procurationem docuit Hippoc. labori, cibo, & somno adiecit Venerem; nunc verò animi quoque cultum docens, Venerem tacuit, quia ea iomica Mineræ est. Sunt verò dicta tria omnibus corporis partibus necessaria, quia omnes indigeat alimento, quod ex cibo capitur, & expurgatione excrementorum, digestionemque alimentorum quam facit exercitatio, & concoctionem quam somnus: verum commendatur præcipue labor ad articulos, cibus ad carnes, somnus ad viscera, quia exercitatio præstat habilitatem ad motus, qui in articulis aguntur: cibus nutritionem quæ carnes maximè augentur: somnus concoctiones, quæ in visceribus maximè vigent,

IN vlceribus sanguis concurrit: subueniendum, ut vacuum impleatur.

F Vnam quandam rationem cohibendi profluuium sanguinis ex vlcere docet, replere scilicet rotam ipsius vlceris cavitatem linamentis, nunc siccis & constipatis (sola enim hæc aliquando sunt satis, velut si quis ad motus digitis cohibeat, atque eò magis, quod ipse sanguis concretescens obturandi vim habet) nunc imbuis emplastico aliquo succo, ut oui albumine, aut etiam agglu-

cinante, vt albumine cum rerebentchina.

SI auris doleat, lana digito circumuoluta intingenda est vngvine calido, & postquam ipsam lanam interiori manus vola imposueris, auri supponenda, vt videatur aliquid ipse flexire, deinde in ignem projicienda est. Dolus.

Galeno aded nulla huius orationis explicatio placet. vt illis omnibus examinatis, tandem censet, Hippocratis non esse. Mihi verò videtur, eis quæ ab eodem aurore dicta sunt alibi consona. Nam dictum est in prognostico, Aurium dolor acutus cunctis febre continua ac vehementi grauis est, periculum enim delirij, & mortis imminet. Proinde cum hic locus sit fallax, statim à primâ die omnibus signis mentem aduertere oportet. Eandem sententiam hic scripsit, apponens vnum quiddam eorum, quæ curandi simul, & tentandi gratiâ, ne locus nos fallat, facere oportet. Quod igitur dicit dolus, idem est, quod in prognostico, fallax locus hic est. Quid igitur iubet facere? Lanam digito circumdatam intingere vngvine aliquo, oleo scilicet, aut pinguedine, & in aurem infundere (eadem ratio fuerit, si specillo et circumdatis, aut forcipibus accipias) deinde eam lanam manu derentam auri supponere, ita vt aliquid ei exire videatur, id est donec videatur aliquid exire ex auro, & in ipsam lanam imbiberit, postea, hoc est, postquam id quod exire imbibebit, in ignem producit, ita enim indicabit tibi ipse odor, an vlcus aliquod sordidum interius lateat, an non, atque etiam hoc vnum quiddam eorum quæ prodere possunt eius loci dolum, facereque quominus fallat. Sarius aurem est, in ignem projicere solum humorem expressum, quam ipsam lanam; quia scetor ipsius aliam quemcunque scetorem obducatur.

Lingua vt lotium humores noxios significat. Lingua ex pallore virescentes sunt biliosa, biliosum autem à pingui rubicunda verò à sanguine: nigra ab atra bile; arida autem ab exustione fuliginosa & vterina parte, alba verò à pituitâ.

Non in lingua solum, sed in roto etiam reliquo corpore, colores præter naturam mutati significant redundantiam succorum, quorum tales colores sunt. Lingua autem multò magis quam vlla alia pars, quia excipit vapores, & fluxiones, ex capite, ex ventriculo, & ex pulmone, atque aded ex toto interno corpore. Significationes verò similes sunt in lingua, & in vrina. Vt enim vrina colore refert speciem cacochymiae, ita etiam & lingua, quod significat dicens, γλῶττις ὀρεν ποικίλη, hoc est, significat vt lotium. Nam lingua γλῶττις (hoc est, flauæ, aut virides, vel inter hos colores sitæ) biliosæ sunt, hoc est, bilem significant redundare. Nimirum illi omnes colo-

Ares sunt bilis magis aut minus vitæ: interponit obiter generationem biliosi succi, dicens, biliosum autem à pingui, hoc est à tenui sanguinis parte, Affirmant enim omnes medici cum Galeno, cum vitur aut putrescit sanguis, eius rennem partem murari in bilē. Vocatur autem pingue, quod tenne in sanguine, quia reuera est pingui simile, & innatat ipsi sanguini, vt flos vino, & vt oleum aque superuchitur, & lacti quod butyrosolum: Galenus dicit vocari pingue per metaphoram, quia huius, vt plurimum nutrens criscum vocamus pingue, addit, rubræ verò à sanguine, & merito quidem, nullus enim succus ruber est præter sanguinem: i tamen Galenus in commentario huius sententiae videtur bilis rubræ speciem quandam ponere non aliter ac Auicenna; reuera tamen, qui succus talis esse censetur, sanguis biliosus potius est quam bilis. Μέλαινα δ', inquit, ἀπὸ μαλακῆς γλῶττις: αἷμα δὲ διὰ τὴν ἐκτέννησιν ἀρτυροῦται, & ποικίλῃ ποικίλῃ. Nimirum lingue sunt nigre aliquando ob febris & vitionis vehementiam, à fuliginibus ascendentibus etiam ex aliis succis, velut videmus linguas eas, quæ assationem subeunt, ab igne nigrescere. Itaque nigrescunt aliquando nigro humore imbutæ, aliquando exultæ solum, & tinctæ fuligine. Euenit autem hoc per febres vrentes, quales maximè esse solent, quæ ab interitis & magnis inflammationibus pendunt, vt ventriculi, hepatis, aut vteri. Est autem discrimen linguarum nigrarum, quod quæ ab humore ringerantur, sunt nigre magis quam aride, quæ à fuligine vitæ, aride magis quam nigre. Ob id fecundas has, quasi ab eo quod eminet, atidas appellauit. Dixit autem & ab vterina parte, non quod ea pars sola inter internas, aut ea vtrunque affecta, tales facere soleat linguas (nam neque ea solæ nisi vehementer inflammata, neque minùs aliz internæ quamplurimæ possunt) sed quasi vnum quoddam exemplum producens: postremo dicit albe autem à pituita. Rectè autem monet Galenus; dictis signis ea omnino quæ significantur, euenire: rebus autem non accedite signa necessario; necesse enim est, si color sit chlorus, redundare bilem: si ruber, sanguinem: si niger, nigram bilem: si albus, pituitam: non tamen si redundet sanguis, necesse esse rubram esse linguam, neque si pituita, albam, posse enim succum non in eam partem incumbere. Sed & prima consequatio videtur mihi indigere quibusdam animaduersionibus. Nam primum, cum niger color dicatur habere duas causas, & altera, putæ vitione, cum aliis succorum speciebusungi possit, constat non valere consequentiam à nigro colore ad succum nigrum, sed posse fieri nigram linguam in febre ardente pituitosâ. Præterea fieri poterit obfluxiones particulares, vt causa morbi non certò ab eo indicio cognoscatur.

F Voco autem particulares fluxiones, vt si homo febre teneatur biliosa, tamen lingua distillationem pituitosam à capite recipiat. Perinde accidit in vrina, in commune enim rectè dices significari talis succi redundantiam, qualis color apparet in vrina, ea vero sæpè fallit ob peculiare vitium renum. Itaque vel ob hoc rectè dicitur linguam significare vt lotium.

Vrina est concolor cibo & potui, & talis esse consuevit, qualis est humidi colliquatio.

Tam varie reperi scriptam sententiolam hanc, cum in codicibus Græcis, tum etiam in Latinis, ut fuerit non parum difficile, eligere maxime consentaneam lectionem. Nam in quibusdam codicibus reperi scriptum *ῥῆμα*, quam lectionem sequitur Cornarius, & vbi ego verti, talis esse consuevit humidi colliquatio, ille vertit, & qualis in^o est humidis colliquatio. Porro reperi in versione quadam veteri Fauji Calui, lotium concolor corpori, potionique par, humorisque interioris confilillat. Qui haud dubie habebat in suo Græco codice, pro *ῥῆμα* id est cibo, *ῥῆμα*, id est, corpori, & vbi habetur *ῥῆμα*, id est, & ut, *ῥῆμα*, id est, par, seu æquale. Verum hanc lectionem reieci, quia non congruit cum narratione Galeni, qui in commentario reddit causam, ob quam vrinæ aliquando referunt colorem cibi, & potus, & quantitatis nullam facit mentionem, ut facile constat Galeni codicem habuisse *ῥῆμα*, nullam verò particulam qua significaretur par, aut æquale. Priores dæ lectiones omnino habent eandem sensum, neque refert quicquam dicere, talis esse consuevit qualis est humidi colliquatio, aut qualis intus est humidi colliquatio, vtrique enim oratio significat vrinam eiusdem coloris cum cibo & potu qui accipitur, esse qualis solet reddi, quum est humidi colliquatio. Cop^o non legit humidi colliquatio: sed vbi humiditas colliquatio, sequitur arbutor aliū codicem, vbi occurrit scriptum, pro *ῥῆμα* *ῥῆμα*, id est, qualis est humidi colliquatio, *ῥῆμα* vel *ῥῆμα*, id est, vbi humiditas colliquatio, seu ab humiditate colliquatio. Sed neque hæc lectio mihi videtur sensum permutare, sed in idem recidere, siue dicas humidi colliquatio, siue vbi humiditas colliquatio, siue ab humiditate colliquatio. Nam his omnibus significatur affectio, quæ diabete vocatur, per eam enim multa vrina redditur, & corpus arefcit: arefcit verò, quia humiditas non moratur interius, sed effluit multa. Itaque congruit hæc morbo vocari humidi colliquationem. Siccario enim humidi colliquatio est, atque etiam colliquationem pati dicimur, vbi humiditas multa, id est, multa aqua mingitur, & ob humiditatis colliquationem arefcit corpus à multa missione. Est autem proprium huius morbi, reddi vrinam incommutatam, concolorem cibo & potui, quod per eam affectionem, & concoctrix hepatis, & retentrix renum facultas debilitata sit, tractrix verò renum operetur plus satis. De hac itaque passione loquitur Hippocrates in præfenti oratione, dicens, heri nonnunquam vrinam concolorem cibo & potui, ut conuenit in diabetica passione. Quapropter mihi hic nō probatur enarratio Galeni, qui nescio qua occasione agit de o-robinis conrentis, & hordeo similibus, & lami-nis, & carunculis, & perturbatis vrinis, cum cer-tè illa huius loci non sint.

Lingua concolor est humori prædominanti, ideoque per hanc dignoscimus humores.

ῥῆμα id est, extensiones, vocat excessus, quibus quidam succi præ aliis videntur in corpore eminere, seu ut dicere solent, dominari. Itaque hæc oratio nihil continet noui, sed causam ob quam dixit, lingua lotium significat. Nimirum cognoscimus suc-cos per linguam, quia ea induit colorem eius suc-ci, qui in corpore dominatur.

Si carnes videntur esse salsa gustanti, re-dundantia signum est.

Vno quodam appositissimo exemplo indicatur, non solum colore linguae, sed etiam passione eius facultatis qua gustamus, agnosci redundantis suc-ci speciem. Nimirum cum redundant bilis, omnia videntur esse amara: cum sanguis dulcia: cum melancholia, acida. Ita si cui carnes (eadem ratio est aliorum ciborum, nisi qui habent qualita-tes alias insignes, quibus falsedinem cohibeant) gustanti videantur esse salse, signum est redun-dantiae salis pituitæ. Causa autem est manifesta, quia tali humore imbuta est lingua, & omnium quæ gustantur succi miscentur cum salina, & ac-cipiunt illius qualitates.

Si mammarum papula, & quod rubrum est, pallidum sit, aegrotat vas.

Particula illa, &, non est continnatiua, sed declaratiua, idem enim est dicere, Papulae mam-marum, & rubrum mammarum. Nam mamme eam solam partem habere solent rubram, neque eam quidem totam, sed eius extremum, per quod lac exurgitur. Illud igitur, quod secundum natu-ram apparet rubrum *ῥῆμα*, *ῥῆμα* (inquit) *ῥῆμα*. Galenus per *ῥῆμα* intelligit vterum, tametsi id non admodum sit iuxta phrasim Hippo-craticeam, dicitur igitur colorem vitiosum papula-rum, significare morbum vteri, ob consensum eius cum illis per venas communes, quæ ascen-dunt per musculos rectos abdominis, per quos habet vterus & mammae commune alimentum: vitiosus ergo color vitiosum succum in vtriusque partibus redundare significabit, atque ob id vte-rum morbo aliquo teneri, nisi tandem mulier vte-rō gerat, tunc enim citra morbum solet id fieri, & prægnationis potius quam morbi signum est.

Hominibus aurium sordes dulces quidem lethales: amara verò non.

Nimirè diligentia videtur esse hoc. Turpe enim esse videtur excrementa linguae admonere, ut ex-corum

eorum saporibus accipias significationes, neque quispiam, qui non sit sordidissimus, eo vique procedat. Causam autem reddit Gal. dicens, non aliter fieri eas sordes dulces, quam liquescente cerebro, liquefit verò cum putrefcit, ac corrumpitur, nisi tamen quid sanguinis cum ipsis sordibus commiscetur, ita enim dulcescent cum minori malo: sanguine verò dempro, ea dulcedo sordium erit lethale signum. Quam fortasse gustare tentabit aliquis, aut egrotus ipse suam, aut mariti vxor, aut filij marer, aut alius qui sit egroti amantissimus, vincit enim amor vt alia omnia, etiam tedium.

Terram mutare confert in morbis longis.

Copus legit solum patrium, & plerique medicorum intelligunt, hic Hippoc. docere, in morbis longis, vbi quis extra patriam egrotat, in patriam transferri debere, quasi aer patrius, aut etiam solum patrium opem sit iururum. Ego verò cenfeo, patrium habitare solum, quibuldam esse vtile, quibuldam noxium, atque ita vt quibuldam vtile est, cum egrotant, in patriam reduci, ita alijs in alienum solum à patria deportari. Si enim vt Hippoc. docet, lac proprium & maternum quibuldam vtile, quibuldam autem alienum, quantò magis & solum patrium, fir. aliquando inutilius, quàm quod alienum. Neque sanè experimentum repugnat, vidimus enim multos in sua patria degere insalubrius, in alias siue regiones, siue vrbes commigrantes, saniores reddi: alios multos contrà. Id quod merito euenit. Si enim in loco calido natus est valde calidus homo aut in frigido valde frigidus, cur non esset his patrie commutatio utilis, ita vt eorum vterque in alterius patria degat melius quam in sua, regionis temperie intemperiem propriam corrigente (nisi tamen differentia sit tanta, vt eam sustinere natura non possit, quod accidit Ethiopibus huc repente translati) eum intemperati homines ad contrarias causas melius, & ad similes deterius habeant Hipp. igitur ita dicit, terram mutare conuenit in longis morbis. Hoc est, cum morbi, aut suapte natura, aut à principio sint longi, vt quartana febris, atque quibuldam podagra, aut nephritis, vel ex acutis deciderunt, consultum est in regionem aliam commigrare, non tamen in quancunque temere, sed cum delectu, in eam cuius temperies illi morbo maxime aduersetur. Quo consilio, multi ob febres quaranas, & morbos alios melancholicos Complurum veniunt. Quod scilicet huius oppidi temperies calida, & humida sit, verum ob hydropem, nullus veniet, etiam si contingat Compluri esse natum.

Debiliores cibi breuem vitam praestant.

Duplex est huius sententiae interpretatio: prima, debiles cibos dici eos, qui facili concocctionis sunt, quia parum resistunt commutanti, & hos breuem vitam habere, hoc est, parum manere in corpore, eò quod citò expernantur, quia vt dici-

A rur in apborismo, Eorum quæ velociter narrantur celeres sunt excretionis: Altera, debiles cibos dici eos, qui prestant paucam, idque tenue alimentum: & eos breuem vitam habere, hoc est, breuem vitam præstare hominibus, qui eis vescuntur, quia qui talibus vescuntur, necessarii sunt debiles, infirmi verò, & debiles non possunt diu viuere. Eadem est ratio, cibi pauci, etsi is naturâ debilis non sit. Quare non remerè consulendum est hominibus, vt cibi quem possint coquere, partem detrahant, aut cibationem consuetam interrumpant. Tanrùm enim sibi vitæ detrahunt, etsi interim videantur nonnulli eorum salubrius degere. Probat hanc secundam interpretationem magis, (etsi vitæque verum sensum reddat) quia, vt Gal. rectè dicit, affectum est vitæ alimentum vocare eius moram in corpore.

Qum accidunt fluxiones in coxam, venae in auribus posteriores aperiende sunt.

C Dicunt grammatici *xipha* esse dolores genitalium, par est autem magis hac in parte Galeno credere, qui interpretatur, ita vocari ab Hippoc. fluxiones in crura, & coxae articulum. Itaque dicit eos, quibus fluxiones sunt ad coxam, iunari scarificatione venarum, quæ sunt post aures. Ego de hac curatione lib. 5. in historia Lyconis, qui in Oeniadis dolore coxae laborauit, dicere cepti, distali autem in hunc locum. Illic quidem, & in proxima historia Eupolemi, dixi rotam huius morbi curationem, quam proinde nunc repetam: sed quod ad hanc venarum in auribus, aut post aures sectionem attinet, explicabo *exauris*, seu scarificare, dicere nunc Hipp. non solum de capillarum venarum conferta sectione, quæ peculiariter ita vocatur à medicis, sed de sectione grandiorum venarum. Quia scarificatione citetne cutis aurium sperari non potest aliquid emolumenti capi posse, quia exiguum omnino erit, quod scarificati parte extrema, & excarni, atque ob id frigidè exire poterit, neque vllus medicorum ita facere tentauit: atque ob id Galenus, vbi dicitur venas, quæ in auribus posteriores sunt, non vult intelligi venas vllas in ipsis auribus, quia scilicet ibi nullæ sunt, manifeste, sed eas, quæ per ceruicem repunt post aures: censetque oportuisse ab Hippoc. dici venas, quæ sunt circa aures potius quàm venas in auribus. Sed neque si ita intelligatur, probat Gal. id quod dicitur, sed falsum & superfluum esse opinatur, quia neque ab vllò medicorum qui id landant, in ipso opere tentari vquam dicit. Ob id de causa, quæ hoc ischiadicis vtile sit dicit nihil, quia ne esse quidè vtile opinatur. Nos verò si quid pro hac quoque sententia dici potest probabiliter, explicemus, ab eo quod in ipsis curationibus vidimus exorsi. Venâ autem secari, ob ischiadem & inde sanguinem affarum educi, nunquam vidi. Tamen scio empiricos quosdam ischiadicis omnibus internam auriculæ parrem, quæ cartilago velut replicata tumorem quandam habet, cauterio vrere, & eorum quosdam, vt ipsimet narrant, esse inuatos. Ego eius rei causâ esse ratus sum, quod multis ischiadicis ex capite suat

materia, & eius loci vitione interceptiatur. Nam sectione 5. lib. 2. legimus apud Hipp. si caput doleat in pectus venit; deinde in hypochostridium, deinde in coxam. Itaque potest venire fluxio à capite in coxam; quod cum fiet, non erit præter rationem, vitione interceptis vijs subleuari eos dolores. Finit autem abscessus, vt sectione 1. lib. 2. dicebatur; aut per venas, aut per ossa, aut nervos: censeo igitur factis inustionibus, & intra auriculam, atque etiam extra siue post siue ante auriculam, iuuatur ibi eos quibus ex capite decurrit fluxio, quod ex antecedere, aut etiam nunc simul existentē capitis passione cognoscēs, vt dicebat Hippoc. si caput doleat. Itaque vtriusque aures scribatur circa aures; vt Gal. censet, facile recipiam. Illud autem scarificare aures, intelligo pro se care vtque, velut si cauterio interfecerint venæ & artetiz quæ ibi sunt, tametsi scio barbaris quibusdam nationibus esse in more positum, ob pterofque morbos scarificare aures ipsas posterius. Id quod didici à Sarracenis filijs, quos nuper Philippus dominus meus deuicta rebellionē à Granate finibus in interiorem Hispaniā secedere imperauit. Illi utebantur aurium scarificatione, quam poterit quispiam in hunc Hippoc. locum referre. Neque sanè ego vt noxiam vitapero, neque vromino inutilem, debilem vt dē esse dicam, ac fortasse illi, vt mittendi sanguinem timidi sum; atque adeo, vt raro profusa missione indigentes ob parsimoniam, illa scarificatione contenti iuuabantur. Nostis verò proferus erit debile auxilium. Siquid vero conferet ad ischia dem; faciet quidem id quod sectio & vizio solēt, intercepti fluxiones in via. Iuuat enim hanc interpretationem, præter id quod ex ipsis operibus potest colligi; & illa vox *quæ*, quæ significat fluxiones in coxam; videturque ob id significare simul passionem coxæ, & eius causam, pntā de fluxu à partibus supernis.

Venus in morbis à pituita vilis.

Venus est causa siccans & vacuans, in principio calfaciens, vt alia quauis exercitatio (exeretur enim totum corpus) deinde vero refrigerans. Vbi igitur vitius erit robustus, moderata Venus vilis erit per morbos pituitosos; quia calfaciet & siccabit. Inmoderata verò nunquam proderit, quia vt siccabit, ita etiam refrigerabit, atque afferet noxam maiorem quàm vtilitatem, quin etiam cū vacuando siccet, per accidens augebit excrementiciam humiditatem, per incoctionem, arguine moderata quidem erit talibus vilis; si facultas egrotantis valde debilis sit, quia non poterit citra noxam sustinere spirituum effusionem; quæ per coitum fit copiosa.

IS qui sunt ventre calido, fortes ibi & potius turbationem afferunt.

Fortes vocantur hoc loco cibi & potus, qui vim habent medicamentosam, & vehementem, eiusmodi autem sunt, qui valde calidi, ex enim tempo-

ries est omnium efficacissima, constat vero talia ventri calido noxiam, & turbationē allatura, quia augebitur eius intemperies. Vocauit vero ipse met. oratione 37. sectionis 4. cibos fortes calidos.

Attrebile simile quiddam hamorrhoides effundunt.

Familiare est hamorrhoidibus attrē bile simile, hoc est, sanguinem melancholicum effundere; non tamen ita proprium, vt bonum sanguinem effundant numquam. Fiunt enim aliquando, natura per eam viam sanguinis feces expurgante, nunquam etiam ob multitudinem sanguinis. Cumque sunt facultate expurgante, insaniam, & alios morbos melancholicos si adsunt tollunt: si nondum adsunt, ab eis præseruant, vt in aphorismo dicitur: cum vero sanguine redundante fundunt bonum sanguinem, si tempestiue sustineant, liberant corpus à multitudine: sin minus, deiciunt vires, & refrigerant hep ar, atque mali habitus, & hydrops causa sunt.

Increfcentes morbos coitus exasperat.

Mis vocari coitum, seu Venerem congesum inter omnes interpretes semper conuenit, vt testatur reliquit Galenus in commentario. Verum altercati sunt quamplurimum, quinam sint morbi increfcentes, & quid sit quod Hippoc. sibi velit, an mixtionem morbos illos ledere, an iuuare. Nam vox illa *coitus* omnino est ambigua, ipse vero omnino non explicat, quid mixtio faciat. Nulla ergo est via alia ad interpretationem, quàm ex ipsis operibus coniectare: ad id vero oportet definire prius, quos vocet increfcentes. Ego de re tam incerta non ausim quidpiam certo affirmare. Producam interpretum sententias, vt quisque censcat pro suo arbitratu. Non enim res magni momenti est, neque detrahre multum aut eponere arti potest. Quidam increfcentes morbos dicunt esse pos; qui diuturnitate suæ semper grauiorē: Huiusmodi quidem sūt omnes, nisi enim auri ipsa natura vincantur, aut artis opera curentur, morbi omnes per moras inualeſcunt, vt ille dicit: verum dicuntur peculiariter

increfcentes, illi qui solent sæpe sine curatione derelicti, diuturnitate eadē incurabiles, vt podagra, arthritidis, renuū vitia, morbus coxitis, arthritidis, & alij eiusmodi, qui nisi ætatis mutatione curentur, solent commoti qui sequuntur hanc interpretationem, intelligunt Hippoc. affirmare increfcentes morbos ledi mixtione: videntur enim illi omnes, quos commemorauimus coitu ledi: quanquam quosdam eorum aliquando moderato iuuari, non est inopinabile: magna autem ex parte, atque nimio semper ledi, verè dicit quis. Proxima huic interpretatio alia statui potest, vt increfcentes vocentur, qui in incrementum sunt morbi, quicunque ij sint, atque affirmetur, etiam dictum sit morbos pituitosos Venere iuuari, non tamen id esse faciendum morbis increfcentibus, sed inclinantibus, aut incipientibus. Hæc enim sunt duo tempora euacua-

F

tionibus opportuna, ut tempus increfcendi concoctioni, itaque ut ab aliis omnibus euacuationibus morbis increfcen- tibus abftinendum eft, ita & a coitu. Alij cenfent vocari morbos increfcen- tes figuratè, eos qui folent inuadere infantes, & durare toto tempore crefcendi, vfque ad pubem fcilicet. Nam ad eam vfque ætatem, crefcunt corpore manifèftè, iam inde parum, & qui citò incipiunt hircire exiguo folent eflè corpore, quod citò tardetur eorum incrementum. Hi dicunt Hippoc. docere, tales morbos Venere fanari: quia eo tempore quo multienibus incipiunt fluere menftrua, & mates Venere vti, folent iudicari tales morbi, ficcefcente corpore. Ecce duas interpretationes, prima placuit Galeno, fecunda Sabino, ut Galenus narrat. Ego in fecundam hanc inclino, quia nihil magis medicis receptum, & experimento cognitum, quam pueriles morbos fluentibus menftruis, mulieribus, pueris verbò in adolefcencia folere finiri, alijs quidem incipiente adolefcencia, alijs procedente, ut quibus tota adolefcencia, quæ vfque ad vigefimum quintum annum producit, non finiantur, folcant manere incurabiles, ut de morbo comitiali in aphorifmo dicitur. Verùm videtur Galeno, epilepfiam, & prodagram puerilem, & lapidem veficz, & vermes, & alia eiusmodi mala non curari Venere (ab hac enim potius ledi) fed mutatione ætatis quæ ficcefcent corpora, atque ita malè dici coitu curari. Verùm etfi hoc recipere, non eflèt admodum durum, ætatem Venere idoneam, vocari puer, atque ita intelligi morbos crefcentes; idèft, morbos crefcentium curari coitu, idèft ætate coitus, feu coitui iam apra. Res autem exigit, vt definiam, an ipfe coitus curet tales morbos, an ætas. Ego certè non dubito iuuare aliquando eam feminis effufionem ad curationem talium morborum, ut & menftrui fanguinis mulieres: nam vtraque harum euacuationum ficcat, atque vt detrahât materiam corporis incrementi, poteft detrahare etiam morbis humidis & pituitofis, cui præcipuè ætate maxime confent vites. Alioquin quo in cafu verum eripituitofos morbos Venere iuuari? Verùm eflè Venere debilitari cerebrum, & neruofum genus multò magis quàm menftruis vacuationibus, atque ita non eflè eius vsum tam falutarem, quàm menftruis vtpote copiofiori euacuationi accidit, ut magis ficcent & euacuent, debilitent verò minus, quia neque cū tanto labore cerebri, neque cum tantâ fpiritus finit exaufione. Quam ob caufam merito menftrua euacuat io leuare poterit multos morbos, quos Venus exacerbat. Nihilominus Venus non eflè per fe ætèr femper caufa infalubris ac noxia, vt cenfebant Epicurci, fed aliquando falubris, ut docet Gal. in arte medicinali, atque Hippoc. hoc ipfo libro, eflè que eius quidam modus retinendus, ut aliarum omnium caufarum, quæ nunc profunt, nunc lædunt. Quandoquidem ergo ficatione & vacuatione poteft conferre, labore verò & fpirituum diffipatione lædere, ij quibus ob magnam humorum redundantiam magis quàm ob cerebri propriam debilitatem videbitur accidiffe epilepfia, villis erit Venus moderata: vacuabit enim, & ficcabit circa debilitatem infignem: quibus verò contrà debilitatis cerebri, quàm redundantie

A pituitæ erunt plura figna, ipfa per fe Venus fempè erit noxia, vtpote ad euacuationem non valdè neceffaria, debili vero aliqui debilitatem magnam allatura. Igitur nimia Venere vti, nulli horum (neque vero aliorum) permittendum eflè; illi vero qui debilitatis alias notas non habent, fed redundantie humorum, funtque falaces, & tedium dantes femine; etfi epilepfia laborent, permittendum in adolefcencia vti Venere moderata, debilibus vero & biliofis, neque valdè redundantibus fuccis, iubendum vt omnino abftineant, fed folius ætatis beneficium expectent: canefcente, ne fi ea vtantur plus lædat Venus, quàm ætatis mutatio iuuet, & in pofterum habeant deterius.

Refrigeratio ea qua funt circa aluum indurata.

Ea quæ circa aluum, aut in aluo funt, haud dubie vocat feces, hæ, velut res alia quæuis, indurari poffunt duobus modis, nam aut per veram duritiem quam facit ficcitas, aut per concretione, quam facit frigus, ut durefcit frigore glacies. Fæces intra aluum contentæ, haud poffunt adeo refrigerari, ut durefcant, citius enim, vt rectè Galenus cenfet; interierit animal. Superest ergo, vt ficcitate durefcant (neque enim plures quàm due hæ funt caufæ duritiæ per fe, ut alibi non femel iam monftratum eflè) quare frigus haudquaquam poterit duritiem facere, nifi per aliquod accidens, atque quoniam per accidens facit frigus ut durefcant feces, non fempè facit, fed aliquando contrarium. Videmus enim fæpe ob occurrum frigidi æris, aut pedum nuditatem, aut potum frigidum, aut talem quamcumque caufam refrigerato ventre fieri diarrhœam: ftante autem borea, aluum ficcari teftatur Hippoc. aphorif. 5. fectionis tertie, conftatque experimento. Igitur frigus feces aliquando duriore, aliquando molliore reddit, & vtrumque quidem per accidens. Quæ ergo ratione id accidat, contempletur. Certè non nifi per eas caufas, quæ per fe faciunt feces duras aut molles. Nam omnis caufa per accidens reducit ad caufam per fe. Oportet ergo fcire caufas per fe earum paflionum, illis enim perfpectis facile intelligemus, quando & quomodo frigus indurat feces, quod Hippoc. præfenti oratione teftatur. Quandoquidem ergo concretione non poffunt durefcere, fed folum ficcitate, ficcitatibus vero eius caufæ funt nimia confumptio quam calor facit, aut nimia diffufio, nimis confumptionis caufa erit calor nimis ventris: diffufionis, calor partium, aut ficcitas: trahunt enim valenter quæ calida funt & alliciunt humorem ad fele quæ ficca. Vt autem horum quidvis magis fiat, caufa eflè longa mora fecum in aluo. Nam etiam nulla dicitur caufarum fit nimia, tamen per longam moram nimium quid facit, ea etiam quæ mediocriter: ut autem multum morentur feces, facere poteft debilitas expultricis. & ftupor, feu infenfibilis intellèftinorum, per quam irritationem non sentiunt: & ipfius exitus adftrictio, & quidquid impedire poteft villorum adftrictionem, velut in primis ftatus: humiditatis nimis fecum erunt contrarie caufæ, fcilicet exigua, aut diffufio, aut alteratio; ut parum alteretur caufa eflè

caloris penuria in ventres, vt parum distribuat, frigus hepatis, aut totius corporis redundantia. Impedit autem vtrumque, & coctionem dico, & distributionem, pręparata deiectio. Vt autem deiciatur citius quā oportet, causa est debilitas retentrix, aut dolor, irritatiove. Considera ergo nunc, quę horum possit facere frigus. Certę frigus si externas solum attingit partes, facit calorem augeri in visceribus, quare & concoctiones, & solidiores fęces, pręcipuę si, vt alias externas partes, ita etiam attingat podicem, constringi enim faciet, & sursum moueri intestina, atque ob id detineri, & durescere fęces: si veró id frigus cum siccitate coniunctum sit, vt in Borea, sicciores reddet omnes partes corporis, quę siccitate allicient humorem, & siccabunt fęces. Quod si tale frigus attingat internū ventrem, siccando intestina debilitabit expultricem, quę quadam humiditate indiget, & flatu replebit, qui expultricis motum impediat, atque vtroque modo faciet, vt fęces morerentur, & siccescant: ita potest, & insensibilitatem intestinorum frigus etiam solet facere, atque ita facere deiectionem raram, & duras fęces: flatum etiam, ac proinde tardum descensum quatuor causa refrigerans faciet, nisi interim debilitet concoctricem, aut dolorem inserat, vt accidit ijs quibus venter est natura frigidus. Ijs enim deiectiones liquidę ob frigus sunt. Hanc ob causam in quibusdam, aquę nunc per refrigeratę poru siccescunt fęces, in quibusdam sunt liquidę. Quibus scilicet venter est calidus siccescunt, quia neque sublata concoctione, neque excitato dolore, sit paucus quidam flatus, qui fęces detinet, ac pręterea extinguit bilis feruorem, & tollit irritationem; quibus venter est frigidus concoctione & dolore, sunt a frigidis causis deiectiones liquidę. Quum igitur dicit Hippocrates, refrigeratio ea quę sunt circa aluum indurat, addendum est ijs qui sunt calido ventre.

Mixtio, quę in ventre sunt, indurat.

Mixtio, seu congressus venereus causa est ahaloga nimirum excitationi, sicut enim, & commouet totum corpus, atque insuper habet coniunctam euacuationem manifestam. Ita fit, vt siccet alui fęces, nisi tamen adeo sit multa, vt deiciat facultates coquendi, & retinendi in ventre, ita enim facere poterit diarrheam, quę autem nō sit adeo nimia, merito ponitur in causis siccantibus.

Si epotum Helleborum celerius purgare volueris, lauare aut cibum sumere oportet.

Enarrata a me est hæc oratio simul cum aphorismo decimo tertio sectionis quartę, quo ita dicitur, Qui accepto helleboro non facile supra purgantur, nisi ante portionem corpora præhumectare expedit. multo cibo & quiete: eandem enim sententiam continent ambę hę orationes, nimirum quā & illa, corpora ubi quispiam purgauerit voluerit oportet fluida facere. Nam hæc vlti-

Ama oratio iuber fluida facere corpora, duz illę priores, quomodo id faciendum sit, indicant: nimirum humectando. Quia quę humida sunt corpora, laxiora sunt, & laxiores habent vias. Succī etiam humectatione liquefunt, & sunt fluidiores, humectant veró corpora cibis, quies, & balneum. Cibi meminit vtroque, in aphorismo autem quietis, hic lotionis, seu balnei. Verum, quia cibo solido replere eum, quē ad purgationem pręparas, aut in balneo continere corpus impugnum, alienum est a ratione, explicauimus, intelligi hæc de cibo medicinali, cuiusmodi sunt serapia, & apozemata, seu decocta, & alie portiones eiusmodi, & de balneo particulati, vt de obstruere foru, aut irrigatione hypochondriorum. Jam veró quies cum reliqua preparatione plurimum potest, vt humores in ventrem fluant, quia motus in corporis habitum tennem humiditatem distrahit: & pręter hæc, quia quies iuuat quā maxime ad concoctionem, quā ante expurgationem esse procurandam constat, si quidē non oportet mouere cruda. Itaque, inquit, si celerius purgare velis eum qui pharmacum bibit, hæc facito, non sane postquam bibit: nam postquam iam cessauit purgatio, nihil proficiet, vt agatur celerius, quę omnino iam est acta: dum autem agitur, lauare non oportet, quia auertentur a ventre succi distracti ad corporis habitum: cibare veró multo minus, quia vt alibi dicitur ab eodem Hippocrate, Purgatione in media cibos dare non conducit. Sed neque quies, accepto medicamento, facit ad celerem purgationem, cum alibi dicatur. Si velis magis ducere helleborum, moue corpus.

Dquum autem minus, somnum facito, & non moueto igitur facienda sunt hæc antequam helleborus (eandem est ratio cuiusunque alterius medicamenti expurgantis) accipiat: nec sic intelligendum, eum qui helleborum bibit lauare oportere, aut comedere, si velis celerius purgare: sed ita, lauare oportere aut comedere (ante scilicet quā bibat) si velis eum qui bibit, celerius purgare: non quidem dicit celerius, quasi ad solam celeritatem expurgationis faciat, ac non etiam, vt purgetur melius: sed quia cum celerius fluunt humores, melius etiam agitur expurgatio, hoc est, perfectius, & cum minoribus symptomatis.

E Sanguis per somnum ad interiores partes magis refugit.

Hęc oratio continet causam eius quod vndecima particulā sectę quartę scriptum est his verbis, qui vigilat externis partibus manifeste est calidior, internis veró frigidior: qui dormit viceversa. Nimirum quia sanguis in somno interiorum fertur, & in vigiliis exteriorum, vigilantes sunt exteriorius calidiores, & qui dormiunt interiorius.

F Rigor a superiori ventre, febris autem ab inferiori magis exoritur.

Dicens magis, aperte significat non esse perpe-

rum id quod dicitur, sed aliquando accidere contrarium, sicutque febris succis in ventriculo putrescentibus, & rigores ob passionem intestinorum. Verum horum naturam paratorem esse ad febrem, & illius ad rigorem constar, quia est ventriculus longè acutior sensus, & intestina remissioris caloris: hæc ergo parata sunt ad putrescentiam, cum præcipue sint naturalia receptacula excrementorum, ille ad dolorem, & mordicationem sensum. Cum igitur sentientium partium irritatio rigorem, & putredo febrem faciat, sit ventriculus paratior ad rigores & intestina ad febres. Si igitur succus aliquis vitiosus in ventriculo confluat, rigorem faciet, quo partim reiecto vomitione, partim detruso in intestina, conquiescet, ac succedet febris, eo qui in intestina incidit, putrescente: si verò à principio confluat succus ipse in intestina, & ibi putrescat (potest enim mox deijci) faciet febrem sine rigore, aut à minori multo rigore incipiente, quam si conflueret in ventriculum. Vnde constat rigoris causam, non in speciem humoris solum, sed in partem in quam incidit naturam teijci debere. In satietatibus etiam, seu humorum corruptionibus euenit, dum corrupti cibi in ventriculo morantur, quendam rigoris sensum habere homines, postquam verò iam descenderint, si deijcantur affatim, succedere febrem, imprimis quidè diariam, facile tamen putrescentia communicari, venis, abeunte in putrida.

A *Tractio, pulmo, aridum incendium, Euacuatum siccat somnus molis.*

In quibusdam codicibus legitur *monachus, et melioris hanc, et in oppidum hanc*. Id est æter attrahitio sit, aut quum pulmo siccat, aut adest humidum incendium. Verum Galenus, ut ex eius commentario facile colligitur, non eam habebat lectionem in suo codice, sed hanc, quæ ego sequutus sum. Videtur mihi hæc dictio in duas fuisse diuidenda, legendumque seorsum, attractio, pulmo, aridum incendium: atque deinceps, euacuatum siccat somnus multus: quandoquidem diuersum admodum reddunt sensum: quamquam ergo simul scriptæ sint, explicabuntur à nobis seorsum illæ partes. Prima quidem ænigmatis formâ scripta est, quæ tamen si ad communem modum dicendi redigatur, habebit facillimam interpretationem: ita scilicet, attractionem facit pulmonis aridum incendium, aridum verò incendium est calor igneus: attractio verò quam calor igneus pulmonis facit, est æter attractio. Itaque dicit respirationem magnam fieri ob intemperiem calidam pulmonis. Id verò est apertissimum, siquidem vis respirationis est attemperata calor in corde: pulmo verò est, per quem cor accipit ætrem, vt attemperetur; quum igitur inalefcit pulmo, calidior ær cordi communicatur, ideoque paucus id non potest attemperare. Quam ob causam contender animal trahere multum. Primæ igitur partis hic est sensus. Secunda pars significat corpora vacua siccat à somno multo. Nimirum corpora, quæ multum cibi capiunt, aut alioqui crudis succis plena sunt, velut voraces homines, & vix somno longo pini-

A gnesunt: quis accidit eis multi alimenti multa concoctio: si verò qui valde inaniti sunt, aut parum cibi accipiunt, vtantur etiam somno longissimo, graciles sunt multo magis, quam si viderentur paruo somno pro cibi paucitate. Nam postquam id cibi quod ingestum erat, concoctum est, succi excoquantur, & consumuntur, atque ob id, & quia sanguis & succi simul cum spiritibus inter dormiendum interius se continent, neque diffunduntur ad irrigandum corporis habitum, sit vt corpus tabescat. Huc accedit, quod & ipsum innatum calidum, neque interius habens vberem materiam à qua alatur, neque exterius ventilatum tabescat, atque cum eo corpus. Quid ergo agendum, cum quis paucò vitur cibo? Num vigilandum, & mouendum, vt veniatur calidum? Non sanè, & quia vbi fames laborandum non est: sed vigilandum, & quiescendum, vt neque motus, neque somnus sit maior quam pro cibi copia, sed congruens.

C *Frigidissimi cibi sunt lentes, milium, cucurbita.*

Galenus caput hanc sententiam, quod milium, & cucurbita frigida sint, non tamen frigidissima, sed milium primo ordine, cucurbita secundo, lentes vero ne frigida quidem, sed in hac oppositione tenentes medium: fortasse autem dixit Hippocrates hæc frigidissima, non secundum qualitates medicamentosas, sed vt alimenta. Nimirum vt à Galeno dicitur tertio de temperamenti, omne alimentum quod alimentum est calidum, non quidem quod qualitatem augeat, sed quod substantiam calidam, hoc est sanguinem & spiritus reponat. Illud ergo quod alimentum præstat plurimum, erit hac ratione calidissimum, & quod minimum, frigidissimum. Sunt verò lentes, milium, & cucurbita, cibi minimi nutrimenti, & paucissimi sanguinis, quare vt alimenta, omnia sunt frigidissima.

V *Lcera exoriuntur, si quis impræparatus exercitatione utatur.*

E Non temerè iudicare oportet, vt homines sese laborando exerceant, si enim sunt pleni, à lassitudinibus, & febribus, aut inflammationibus multis & magnis, aut vasorum rupturis periclitantur: si immundi, succis biliosis aut salis, his incutem distractis, & eam corrodeantibus, vlcera multa fiunt. Si succis pituitosis, & crassis, lentisque sunt renum, aut hepatis obstructions, & tumores scirrhusi per corpus. Euacuandum igitur prius, & incidendum, & expurgandum, quam homo laboret, atque dum laborat, victus rectè instituendus. Nam qua ratione, si immundus laboret, vlcera oriuntur, eadem etiam orientur, si qui laborat, alioqui non immundus, vtatur cibis mali succi, acris, aut salis.

S *mulier aut capra elaterii vel cucumerem syluestrem comederint, pueri etiā purgantur.*

Continent hæc verba optimam quandam rationem expurgandi lactantes infantes; quâ medici frequententer vtuntur, dato scilicet pharmaco ipsi nutriti, quia lac induit expurgatorium medicamentum facultatem. Si igitur mulier clatetum, hoc, est succum cucumeris syluestris, aut aliud quoddam medicamentum ex purgans accipiat, aut capra depasta sit cucumerem syluestrem, aut tithymalum, aut ricinum, aut cyclamen, aut aliam eiusmodi herbam, & eius lac detur infanti, purgabitur infans. Duabus causis euenit nutritæ purgare, aut vt infans simul purgetur, cum scilicet simili cacochymia laborant ambo, aut vt ipsa solum purgetur, quo purgatum lac deinceps præbeat infanti, cum scilicet infanti adhuc sano datur nutritrix cacochymia aliqua laborans. Cùm vis, vt ambo purgentur, fac vt nutrit, dum purgatur, lactet infans; cum autem purgas solum nutriticem, ne lactet donec purgationis motus conquiescerit. Alia est huic præceptioni proxima cautio, vt qui necessitate quapiam capræ lacte vitur, eam custodiat, ne quâ maligna herba vescatur. Nam si tabescens vtatur lacte (ita vt sit) & capra aliquam dictarum herbarum depasta sit, soluetur alius, quò tabescentibus nihil est noxentius, atque adeo qua ratione lac accipit expurgatorium facultatem, accipiet deleterium, si quid tale capra gustauerit. Narrat enim Galenus in Doticæ, Bæotici, & Thessalici, atque etiâ Athenis, multos conuulsione correptos esse esu coturnicum, quæ vetatissimo vellebantur.

Calido corpori calidus est interna refrigeratio, exterius verò ladunt sol, ignis, & vestes tempore æstiuo: contraria verò contrariis modo se habent.

Videtur his verbis dici, calido homini vtile esse, eo quod comeditur refrigerari interius; exterius verò calefieri labore, sole, igne, & vestibus, in tempore æstiuo; frigido contrâ, vtile scilicet esse calefieri intus cibis, abstinere verò à labore, & sole, & igne, & vestibus in æstate: seu potius inuari quiete, vmbra, & nuditate in hyeme. At verò repugnat hoc sententiæ decime quartæ sectionis 4. quâ Hippocrates dixit, Calido naturâ refrigeratio, potius aquæ, quiescere conuenit. Od id Galenus hanc ita interpretatur: calido vtile esse cibo & potu intus refrigerari: laborem autem asferre, & noxium quiddam esse: exterius calefieri sole, igne, & vestibus, præcipuè in æstate: frigido contrâ. Itaque calidus inuatur frigidis, & lædijur calidis; frigidus contrâ inuatur calidis, & lædijur frigidis. Hunc ego sensum sequor, satis enim est interpretationem esse duram quàm falsam.

Ciborum alij quidem celeriter vincuntur, alij contra.

Alimentum nomen est rei victæ, non vincens vt Aristoteles, & Galenus dicunt, quia superata nutrit; cum autem superat, corrumpit, & morbos facit. Quod ergo facillè, ac citò nutrit, ci-

Ardè vincitur, & coquitur, contrarium, contrâ esse verò cibos qui facillè coquantur, alios qui difficulter, cuiusque causam in substantiæ modo consistere, quoddam tenuia facilius, crassa difficilius coquantur, res est notissima. Iuxta quam, scriptum est ab Hippocrate illud. Eorum quæ velociter nutriunt, & quæ tardiùs: & illud, quicunque velociori apothione indigent, ijs humidum qua reficiendis vires medicamen optimum est, quicunque verò adhuc velociori, per olfactum: qui autem tardiore, solido alimento vtantur. Nimirum, quod **B** forma solida accipitur, vincitur tardiùs, quàm quod liquida, & eadem ratione oua assatione durata, aut seixa tardiùs quàm forbilia vincuntur, & quæcunque, aut naturali mixtura, aut artificiosa præparatione sunt solidiora.

SECTIO SEXTA.

Carnes attrahunt ex ventre & extrinsecum. Sensus ipse significat totum corpus esse expirabile & inspirabile.

Omnino est hæc eadem sententia, & quàm libello de alimento scriptis his verbis. In pilos alimentum, & in vngues, & in extremam superficiem intrinsecus petuenit; extrinsecus alimentum ex extrema superficie ad intima petuenit. Confluxio vna, conspiratio vna. Vtrobique enim dicitur, alimentum trahi posse ab intima corporis parte, extortum vsque ad extremam superficiem, & ab externâ cute, intortum vsque ad intima, non aliter atque per inspirationem, & expirationem agitur introsum & extrosum motus. Quod quidem est, esse corpus conflatile, & conspirabile. Confluxio quidem dicitur propter humores, conspirabile propter spiritalem substantiam, quæ inspiratio, & expiratione, atque dilanatione, & constrictione arteriarum trahitur, & expellitur. In hanc igitur sententiam dicit nunc, carnes trahentes esse, hoc est, vim attrahentiam habere ex ventre (hoc est, ex profunda corporis parte, atque præcipuè ex eo; qui peculiariter vocatur venter, in quo cibi coquantur) extrosum: & extrinsecus introsum: esse autem tales quosdam motus (extrosum scilicet & introsum) naturæ nobis sensus indicat: sentimus enim apertè expirationem & inspirationem, quæ quidem motus quidam tales sunt. Hec verba, & quæ in libello de alimento scripta sunt, videntur sapere antiquarum opinionum eorum qui putant, vsum respiracionis esse distributionem alimentorum. Verum quoniam Hipp. placitis id non congruit, sed alimenti distributionem per facultates naturales dispensari, handquaquâ in eo sensu accipienda sunt: sed carnes attrahere vniuersa alimenta quidem per naturales facultates; ærèrem verò, & substantiam quæcunque halituosam per respiracionem & pulsus. Ambo enim hæc cōmuni appellatione vocantur, expirationes, & inspirationes. Hac ratione, si quod venenum ingestum est, aut etiam cuti affixum (quædam enim etiam ita necant) tantò citius solet interimere, quanto

E

F

hæc calidior, & maiori pulsu est, quia pulsu attrahitur. Hoc etiam facit, ut admodum cuti medicamenta internis partibus non leuiter profusur, quæ nisi carnes essent tractrices prodesse non nihil: hæc quoque causa cæleo non esse vatum aliquando, res nutrientes exterius admovent.

Calidior venula sanguinis multitudine exustum quid procreat, & illico secerit.

Quidam (ut Galenus narrat) interpretabantur hæc verba de febris ardentis generatione, quasi diceretur, venas solito calidiores, ex sanguine redundanti procreare bilem, eamque postea secerere, atque vomitu, aut deiectione reiicere, ponit enim Hippocrates ipse, in libro de ratione vitæ acutorum, in signis febris ardentis deiectiones liquidas, serosas, & valde pallidas. Non est certe sensus hic omnino spectandus. Nam id quod dicitur, nihil congruere cum proxima oratione, siue quæ antecedit, siue quæ sequitur, nihil miror, euenit enim toto hoc opere fere semper. Galeno vero placet (quod non minus probō) secundum proximam sententiam hanc orationem esse scriptam, continereque vsum constrictionis pulsus: dixisse enim ceuset Hippocratem antea vsum dilatationis, carnes scilicet dilatatione trahere, nunc dicere vsum constrictionis, scilicet expellere fulgines. Dicit igitur calidiorē venulam vocari arteriam exustum vocari fuliginem: itaque dicere arteriæ ex sanguine gignere fulgines, hæcque illico compressione excernere. Certè vterque sensus est verus, & consentaneus.

Et quibus quidem pingue inest, bilis flaua gignitur: quibus verò sanguis, atra.

His verbis nihil significatur aliud, quam quod Galenus dicere solet, sanguinis, quem vritur aut putrescit, tenuem partem abire in bilem, & crassam in melancholiam. Nam oratione decima tertia sectionis 5, cum Hippoc. diceret, biliosum autem à pingui, ostendimus pingue ab eo vocari tenuem partem sanguinis: sanguis igitur vocatur nunc reliqua sanguinis pars excreta pingui: crassa igitur: itaque tenuis pars abire dicitur in bilem flauam, crassa in atram.

Qui frigidior est, frigidus anni tempore & regione calidior erit.

Mihi quidem videtur sonare hæc vox, idem quod aphorismo illo dicitur, ventres hyeme, & vere calidissimi sunt naturæ: scilicet, qui tempore, & regione calidis est ventre frigidior, frigidus tempore & regione calidior. Causa dicta est in eius aphorismi commentariis. Præter hunc videtur se insinbare alius sensus, quem Galenus sequitur, scilicet eum qui sit naturali temperamento frigidior, frigidus tempore & regione calidior fieri.

A Quod videtur rursus intelligi posse duobus modis, calidiorē esse, quam tempore & regione calidis, aut quam sit naturæ calidior. Videtur autem vtrūque falsum. Nam si rectè à Galeno in commentario aphorismi secundi sectionis 3, dicitur. Ad æstatem frigidam, & ad hyemem calidas naturas optime affici, malè verò contrā, constat frigidiorē naturam calidiorē fieri æstate, quam hyeme, alioqui haberet ad æstatē deterius & ad hyemem melius: atque adeo constaret frigidiorē naturam hyeme esse frigidiorē, quam naturam calidam, alioqui frigida haberet melius hyeme quam calida: vero natura frigida habet hyeme deterius quam calida, & deterius quam æstate, ergo vtrūque intelligatur, videtur falsum esse quod hic dicitur. In commentario aphorismi citati ex prima particula dixi, et si plerisque hominibus essent hyeme ventres calidiores, non tamen omnibus, debere. n. excipi eos, qui sunt naturæ valde frigidi, tales enim toto corpore habere deterius in hyeme, & gracilescere, resici vero in æstate: hinc fit, ut cum Hipp. dicit, naturam hæc quidem ad æstatem, hæc vero ad hyemem bene malè se habent, & Gal. interpretatur frigidus ad hyemem habere deterius, id quidem non de omnibus frigidis intelligi, sed de ijs, qui tales admodum sunt: nam qui tales sunt mediocriter, retrocessu caloris fient hyeme calidiores, atque ob id habebunt ad plerumque melius. Non tamen perinde de calidis dicere possis. Nam omnes, qui supra mediocritatem sunt calidi, frigidum iuuantur tempore, quia tale tempus naturalem calorem auget, & morbosum extinguit. Vnde sequitur, ut multo plures sint, qui hyeme iuuantur, quam qui æstate. Nam & calidi omnes, & frigidorum multi. His dictis arri-

B det muleo magis prima interpretatio, frigidior id est, qui æstate est ventre frigidior, frigidus anni tempore, & regione est calidior. Nam omnes calidi, & qui non sunt vehementer frigidi, per æstatem sunt ventre frigidiores, atque hi omnes sunt hyeme calidiores: qui verò non sunt hyeme calidiores, quia sunt naturæ frigidissimi, illi neque æstate sunt frigidiores, sed tunc velut renuiscētes, calefunt nonnihil. Quod si tamen non placet suppleri vlla verba, sed simpliciter dici eum qui est natura frigidior, hyeme fieri calidiorē, id intelliges de frigido, qui non est admodum talis, intelligesque eum esse hyeme calidiorē quam æstate: calidiorē verò esse in hyeme, quam alios homines qui sunt naturæ calidiores, haudquam potes intelligere, nisi velis dicere calidiorē esse, id est, minus dolere à frigore, & frigoris esse patientiorē. Hoc enim ita habet, nimirum corpora frigida densa etiam sunt, & calida rara; ob idque densa & frigida hyeme frigoris molestiam minus sentiunt, videnturque esse calidiora, quam rara & calida, quamquam reuera non sunt. Itaque si vis illud rectè accipere, non quod talis reuera sit, sed quod existimetur, aut etiam partibus externis (nam ut calidus & rarus internus, ita frigidus & densus externus calidior est, quia detinetur ad obstruendam cutem effluuium calidum) potes conferre naturam frigidam cum naturæ calido. Prodeuntque iam ex dictis tres præscriptæ orationis sensus veri, & nihil dissimulantes habentes.

D

E

F

IN doloribus proximum ventrem expurgare, sanguinis verò ventrem scindere oportet. Conueniunt vñtio, scissio, calfactio, refrigeratio, sternutamenta, plantarum succi secundum variam illorum facultatem, & cyceon: malignis medentur lac, allium, vinum feruifacuum, acetum, sal.

Refert Hippocrates hic multa & varia, neque eaquidem æqualia dignitate & viribus, quibus dolorificæ passionēs solui possunt. Non quidem quiddam in vilo dolore vtendum his omnibus sit, sed quiddam in quouis horum aliquo, aut alio simili. Imprimis refert quæ sunt maxima, ac præcipua, expurgationemque, & missionem sanguinis: est verò in vtriusque harum euacuationum seruanda rectitudo. In doloribus (inquit) proximum ventrem expurgare. Est duplex venter, per quem vacuare possis, inferior, qui & aluus vocatur, & superior, quem vocamus ventriculum: horum verò vacuandus est, qui dolet parti est proximus: quibus autem partibus, qui venter dicatur esse proximus, explicatur aphorismo decimo octauo sectionis quartæ, quo ita habetur. Supra septum transuerfum dolores qui purgatione indigent, per superiora purgatione indigere significant: quicumque verò inferiora molestant, per inferiora. Itaque in doloribus proximus venter est purgandus, quia si dolor sit supra septum transuerfum, vomitum expurgandum, si infra, deiectione. Sanguinis quoque ventrem, hoc est, vnam scindere oportet, seruata etiam rectitudine superiorum cum superioribus, inferiorum cum inferioribus, dextrorum cum dextris, & sinistrorum cum sinistris, vt alibi non semel explicuimus. Neque obstat, quod ob coxæ dolores, & vuluæ, & colli vomitus curatur, & ob cephalalgiam, & hemigraniam expurgatur aluus. Hæc enim sunt prius agenda ob reuulsionem, illa posteriùs ob curationem. Post totius corporis vacuationes quæ antecedere debent, accedendum est ad locales curationes, quæ igne, aut ferro, aut medicamento agitur. Quæ tria enumerat Hippoc., non quo ordine agenda sunt, sed à maximis procedens ad minima. Nam vt in aphorismo dicitur medicamento primùm, deinde ferro, postremò igne tentandum est curare. Hic verò ab vñtione scissationem nominat, deinde medicamen. Vñtione ad coxæ doloris curationem utebatur Hippocrates. Sed & ob aliarum partium rebelles dolores, ea vti consueuimus, aliquando ad interceptandas in via fluxiones, aliquando ad deripiendum in proximas partes materiam. Scissio autem curat omnes dolores, quos parit aliquid in alto putrescens, quod educi potest. Medicamentorum dolores sedantium duplex est genus, quædam enim sunt mediocriter calida, quæ propriissimè sunt anodyna quædam frigidissima, quæ dicuntur etiam anodyna, sunt autem stupefacientia: dicit ergo, calfactio, refrigeratio: addit sternutamentum, quod sanè per sese leue auxilium est, neque nisi ad exiguos capitis ex flama dolores sedandos sufficiens, ramen

A inter alia sternutatoris etiam vitmur, ad discutiendos maximos capitis affectus. Addit, plantarum succi secundum variam earum facultatem. Constat non in solis plantarum succis vires medicamentosas esse, neque vim anodynam, sed in alijs omnibus plantarum partibus, & in multis etiam terræ generibus, & metallis, & animalium partibus: quare vt vnum quoddam medicinalis maris genus nominauit Hippoc. plantarum succos: dicens verò *ἐν τῇ τοῦ θάλασσης ἕρπονι*, videtur leue quiddam, & quod nullius momenti est dicere, nam omnia medicamenta admouenda sunt secundum eorum facultatem. Nam contra eorum facultatem, quorsum qui eis vtatur? Inquit autem Hippoc. illis verbis, quod libro quinto de simplicium facultate à Galeno indicatum est, esse facultates quasdam quæ respiciant certa quædam membra, neque indifferenter medicamenta omnia omnibus partibus admouenda, sed quædam habere vires pro capite, quædam pro ore, quædam pro hypochondrijs, atque ad eò inde accipere nomen, vocarique alia cephatica, alia stomachica, alia hepatica, aut splenitica. Docet itaque Hippocrates, siue calidis siue frigidis sit occurrendum, deligida semper esse, quod dolenti parti rectè accommodentur. *Κνωίον*, interprete Galeno, erat polenta quædam ex vino & farina, constat eam aliquando solitam accipere salem, aliquando secus, quandoquidem libro secundo de morbis mulieribus dicitur, cyceonem bibat non falsum. Itaque commendatur ad dolores vixi potus inperfo farinæ pollinæ: quod quidem consolorum est illi aphorismo quo dicitur, dolores oculorum vini potio soluit, qui suo loco enarratus est. Tancum hic adjicitur farina. Quod quidem vt Galenus in commentario dicit tutius est, quàm si quis solo vpo vtatur. Quia vt mentis alienationem, & capitis grauitatem, & alia omniatula magis facit vinum, siquis eo solo vtatur, quàm si cum cibis, aut à cibo, ita & fluxiones magis auget, itaque si quando dolores oculorum, aut alterius cuiuspiam partis vino curare tentandum sit, cyceone id faciendum potius aut à cibo, quàm ieiunio dandum merum. Hæc dicta sunt pro doloribus citra malignitatem vllam, aut venenosam qualitate concitatis. Apponit deinde quædam, quæ sunt antidota malignorum, hoc est dolorum pendentiũ ex causa maligna, vt ex veneni potu, aut morsu venenati animalis. Hæc sunt, lac allia, vinum feruifacuum, hoc est, perfectè coctum, ne sit mustum (seruifacitione enim perficitur) acetum, & sal. Commendatur à Galeno de antidotis ex Asclepiadis sententia lac ad eos, qui herbam Apollinariem biberint, aut leporem marinum ediderint, aut dorycnium, aut hyepstres, aut cantharides, aut cerusum. De allio hæc scripsit Dioscorides, contra viperarum ictus, & pruriatũ hæmorrhoidũ prodest, ita vt non aliud magis si cum vino ingerat assuamur, aut tritum in eodem ebibatur. Contra rabiosorum morsus, & illitũ, & cibo valet. Vinum antidotum esse dicitur, eodem loco libri de antidotis, cicuræ, & coriandri, & toxicũ, & fungorum. Acetum ad concretionem lac, & ad epòtum tantum sanguinem. Sal solus non datur, sed in muiæ contra hirundines, inijcitur in theriacam Apollonijs. Sicut autem

uicissimas eius usus in externis partibus scarificatis, ut putredo prohibeatur, & absumatur venenum:

Homo ex itinere defessus, debilitatus & grauatus expuit, tussiebat enim ex vertice. Febris eum corripuit acuta ad manum nonnihil mordens. Secunda autem die capitis grauitas aderat, lingua exusta est, nares vnguibus excisse sanguinem non fuderunt. In sinistra parte lien magnus & durus infestabatur dolore.

Miror Hippocratem prætermisisse morbi huius euentum, neque dixisse, fuerit ne mortuus, an superuixerit: multò magis miror, Galenum voluisse ex vrina id diuinare, cum constet morbum hunc 'fuisse' lienis inflammationem; vrina verò eorum solùm morborum sit indicium, qui pendunt ex succis intra venas & arterias putrescentibus: ego mallem eum dixisse, quo modo haberet pulsus, & respiratio, & mensuram vrina, vt de morbi exitu iudicium ferrem. Sed quandoquidem Hippocrates id non narrauit, vicumque se habeat, nos quæ narrauit interpretemur. Causa procacitica, quæ cepit egrotare fuit defatigatio ex longo itinere, vnde grauitatem cum debilitate primùm sensit, & expuit tussiens ex vertice. Deinde febris illi successit acuta, ad manum submordens; secundà die febris sensit capitis grauitatem, & exusta illi lingua, & habebat hypochondrium sinistrum magnum, & durum, & cum dolore, quæ signa sunt propriâ inflammationis lienis. Medici tentauerunt sanguinem, nares vnguibus scalpendo, vacuare, tamen non exiit sanguis. Consentaneum est hunc multitudine excrementorum laborantem ingressum esse iter, id enim maximè solet grauitatis sensum & debilitatem facere, & fluxiones commouere. Fluxio verò, & distillatio ex capite faciebat vt expueret, & tussiret ex vertice, hoc est, distillante acri humore ex suprema capitis parte. Id verò non aliter significari potest, quam dolore & calore eius partis. Hæc autem omnia per neutram adhuc dispositionem eueniebant: Crescente magis humorum alteratione, & agitatione, cepit acute egrotare lienis inflammatione, & febre continua, cui mox successit capitis grauitas, & linguis vltio, ob capitis cum liehe, atque aded cum toto corpore compassionem, & febris vehementiam. Malum autem fuit excissa nare, sanguinem extrahi non potuisse, quia inflammationis internæ magnitudo solet esse in causa, vt non fluat. Inerit nota rudiratem illius seculi, quo vnguibus lacerabant venas in natibus ipsi medici, vt missionem sanguinis molirentur: Nunc scalpellis vtitur. Quod dicit *αὐτοῖς τοῖς νύχθιν*, videtur dictum per pleonasmum, vt dicimus lac candidum sorbere, quamquam nigrum nullum lac sit. Verisimilissimè autem esse censeo, quod & Galenus coniectat, vitium esse codicem: legendumque fuisse, naris sinistra vnguibus excissa sanguinem non sudat. Lien magnus, & durus infestabatur dolore. Nam ob lie-

nem verisimile est medicos tentasse ex sinistra nare fundere; Inde enim maximè expediebat fundi, vt etiam erat grauius inde non posse fluere.

Quartana laborantes nullo magno morbo corripiuntur: si prius autem corripiantur, & quartana superueniat, liberantur.

Dictum est sectione tertia libri primi, securissimè omnium, & facillima; & longissima est quartana: Non enim solùm ipsa ex se talis est, sed & ab aliis magnis morbis liberat. Huius addit nunc liberet; siue præueniat, siue subsequatur. Si enim quis quartana corripitur, liberatur ab aliis morbis magnis; qui alioqui ei accidissent, si verò cum iam acciderint superueniat, illi soluantur, insumpta scilicet materia in quartanos paroxysmos. Galenus hic intelligit nomine magni morbi epilepsiam, & non est quidem ea interpretatio parum vrilis. Nam is est morbus maximus inter diurnos, & à quo per quartanam solent homines maximè liberati. Verùm quia libro primo plurali nomine dixit, ab aliis morbis liberat, inueniens à multis aliis, non ab vno aliquo liberare, idem prorsus vtroque dici intelligo, atque hic, etsi vtratur nomine singulari, ita accipi, morbo magno non capiuntur, quasi dicat, nullo morbo magno capiuntur, cum præcipue in aliquibus codicibus ita inueniatur scriptum, *ὅτι πρὸς μεγάλῃς πόσει διὰ διήκουσαν*, idest, ab aliquo magno morbo non capiuntur; Galenus haud dubiè non ita habuit in suo codice, sed *ὅτι πρὸς μεγάλῃς πόσει*, idest à magno morbo, atque ille articulus, *πρὸς*, videtur indicare certum quendam. Certè si quis certus hic est notandus, qui soluatur à quartana, nullus potius, quam quem Galenus dixit, epilepsia scilicet.

Pro quibus quinam morbi succedant videndum.

Non parum refert medicum scire, pro quibus qui morbi succedere soleant, & qui morbi post quos bene & salubriter fiant, qui malè & lethali-ter. Magna enim pars prognosticæ artis est hæc, ad quam pertinent plurima eorum quæ in aphorismis, & in prognostico, & in aliis libris, de præfensione scripta sunt. Tractat vtrū hunc locū præcipue libro primo de morbis, vbi in primis catalogum facit morborum, qui ex aliis fieri solent: deinde eorum qui ex aliis quibusdam necessariis sunt: deinde eorum qui salubriter aut insalubriter succedunt: non quidem omnium, sed multorum, quibus tu per otium poteris reliqua adiungere, ex aliis locis colligens. Nunc verò tantum apponamus quæ illic habentur, si (inquit) in alios transeunt, pleuritidis in febrem ardentem, phrenitis in peripneumoniam. Verum ex peripneumonia febris ardens non fit. In dysenteriam tenesmus transit, & ad dysenteriam lienteria conuertitur, ex lienteria in aquam intercutem transitus fit: ex pituita alba in aquam intercutem, & à peripneumonia ac pleurinde in pectoris suppu-

rationem. Mala potro malis superuenire necesse est, velut si rigor corripuerit, ardor igneus superuenit: atque si neruas dissectas fuerit, conuulsionem facit: atque si cerebrum concussum fuerit, ac doluerit, cum qui percussus sit necesse est mutum fieri, & neque videre, neque audire: si verò sanctiatum fuerit, febrem necesse est superuenire, & bilis vomitum, & aliquam corporis partem syderatam fieri, ac petire. Si verò exciderit omentum, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex vulnere, aut vena efflaxerit in supernum ventericulum, necesse est ipsum in pus verti. Quibusdam interopseis, non ita multo post, addit. Talia autem sua sponte hominibus in morbis contingunt, cum bona, cum mala. Febricitanti ac bilioso rempessitue foras dispersa bilis confert, diffusa verò ac dispersa sub cutem toleratu leuior est habentium, & curatu facilius sanandi: dispersa autem, & ad vnam corporis partem allapsa malum affert. Alius turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut suppurato malum portendit. Febricitanti ac vulnerato alius rescicata, malum denunciat. Subaqueo aut lienoso, & alba pituita detento, alius fortiter turbata confert. Erysipelas si extra diffusum intro verratur malum. Si verò intra diffusum foras vertatur, bonum. Profluuium alui vehementi corcepto vomitus superueniens confert. Mulieri sanguinem vomenti menses erumpere confert. A fluxione verò infestata ad nares, aut os fluxionem transire, bonum. Mulieri conuulsione laboranti ex partu febrem superuenire bonum. Tetano ac conuulsione occupato igneum ardorem superuenire, bonum. Huc etiam pertinet quod Hippoc. hic dixit, morbos magis, ac præcipue epilepsiam quartana superueniente tolli, & multa alia, quæ tum in aliis locis, tum in sexta particula aphorismorum docet Hippoc. quæ omnia huc transferre esset longum & sediosum, cum liceat cuique per se ipsum legere: hinc solum discemus attentè considerandum esse, pro quibus quinam morbi soleant bene aut malè succedere.

B *His sit ut dicebam de auius, quod biliosa sint.*

Hæc verba non satis perfectam videntur reddere orationem, sed aut ipsa quidem decisa esse ab alijs, à quibus penderent, aut ab his alia esse detracta. Si quid tamen de hæc, vt cuncte scripta oratione, dicendum est, mihi videtur nihil aliud continere, quam aues esse biliosas, atque illis verbis, vt dicebam, referri orationem vigesimam tertiam sectionis quartæ, qua dicebatur, terra siccatibus squalente, volucrum genus bene habet: quia oratio præsens continet illius causam. Nimirum aues terra siccatibus squalente bene habet, quia sunt naturæ sicæ & biliosæ.

C *Caliditas acrimonia signum.*

Quia propria rei acris caliditas, acrimoniæ illius causa est, calidi autem est calfacere, sit vt quæ

A acris sunt calorem corporibus inferant, & ita calor acrimoniæ signum sit. Nam et si acrimoniæ, gustandi facultate quæ in lingua est, facillimè sentiamus, agnoscimus tamen plurima acris esse ante etiam quam linguae admoveamus, quod calida vehementer sint, præcipue cum partium tenuitate.

B *Turbationes, transitusque morborum considerandi sunt, ut quum delirantibus laterum dolores cessant: quibusdam verò etiam febres: quibusdam vero non, sed cum sudoribus, quibusdam cum perturbatione. Quibusdam cutis arida, circumtensa, sanguinolenta que efficitur.*

Modos omnes quibus solet finire morbus aliquis, cõplexus est Hippocrates hac oratione, proferens exempli gratia laterum dolores. Hi sunt indicationes & permutationes: atque permutationes, vel in alias principes partes, & morbos graues, aut etiam grauioribus prioribus. Vel in cutem, & partes externas. Vocat indicationes turbationes, quia iis quibus crisis imminet, turbationes accidunt: permutationes vocat transitus, quia aguntur ab alijs in alias partes transeuntibus succis. Itaque dicit turbationes, transitusque, quasi dicit, duo hæc solent finire morbos, turbationes, & transitus. Vt aliquando cessant laterum dolores delirantibus, hoc est, permittuntur pleuritidis in phrenitidem: quibusdam verò etiam febres cessant, scilicet delirantibus, hoc est, terminatur febris in phrenitidem. Dicitur autem hoc secundum illam phrasim, quæ in aphorismo vsus est, dicens. Qui in febribus ardentibus tremores sunt delirio soluentur: ibi enim dicitur, febres arduentes quas tremor comitatur, delirio solui; quod in deliria finiuntur, tam et si cum ipsa phrenitide adsit etiam febris. Ita etiam nunc dicitur, quibusdam delirantibus febres cessant: nimirum cessant esse generis earum, quæ febres simpliciter vocantur, sique phrenitis. Quibusdam verò (phreniticorum scilicet, aut febricitantium) non cessant cum transitu; sed cum sudoribus, quibusdam cum perturbatione hoc est, per indicationem: Nihil enim aliud est indicatio quam extinctio morbi affatim facta cum perturbatione, & euacuatione: interius autem inflammationibus, & febribus accommodatissima euacuatio est sudor, quamquam iudicantur non raro etiam per alias euacuationes. Quibusdam (inquit) cutis arida circumtensa, sanguinolenta que efficitur: hoc est, quibusdam illi morbi finiuntur in scabiem, & prurium cutis. Vocatur *Aspa* ex *porosis*, quod tanquam sale infuso mordeatur.

E *Stupescationes quales ex qualibus fiant videndam, & quales sint ei cui coxa doluit.*

Quidam per *stuporem* intelligunt stupores medicamentis illatos, vt cum ad dolorem sedandam medicamentis narcoticis vtimur, atque hæc verba prolata esse aduersus quempiam, qui curat

S *Stupescationes quales ex qualibus fiant videndam, & quales sint ei cui coxa doluit.*

Quidam per *stuporem* intelligunt stupores medicamentis illatos, vt cum ad dolorem sedandam medicamentis narcoticis vtimur, atque hæc verba prolata esse aduersus quempiam, qui curat

bat talibus medicamentis coxae dolorem. Velut facere solent quidam medici imperiti, aut nequam, qui cum idonea ad affectiones dolorificas medicamenta ignorent, aut velint aegroti etiam cum magno eius malo blandiri, videntur saepe narcoticis, illis enim appositis, evenit mox sedari dolores (quod aegrotantibus est gratissimum) etiam si in posterum affectio maneat deterior. In huiusmodi medicos censent scripta esse hæc verba. Quasi dicatur, considerandum quales stupefactiones, & ex quilibet medicamentis sint faciendæ, neque faciendæ tales, quales fiebant ei cui coxa dolebat, cuidam scilicet, quem fortè medicus quidam curabat narcoticis. Nimirum faciendæ aliquando sunt hæc curationes, sed non nisi cum dolor inolerabiliter urget, & veris anodynis non cedit, neque ex qualibetque medicamentis, sed ex correctis, & aliorum mixtione temperatis, quales maximè est, quod vocatur Philonium. Hic sensus vetus est, ipsi autem verbis non videtur satis congruens. Proinde ego in alium feror, intelligo quæ, stupefactiones dici stupores quarundam partium: qui, quia diversis, & ex diversis causis esse possunt, iubet distinguere quales sint, & ex quilibet causis, & memoriæ gratiæ mentionem facit cuiusdam ischiade laborantis, cui stupor cruris accidit, ut saepe profectò talibus solet. Stupor, ut Gal. dicit, est affectio quædam media inter bonam valetudinem & paralysem: itaque est velut inchoata paralytis. Quanquam videretur mihi communem loquendi modum consulenti, stuporem ob sensus, paralysem ob motus diminutionem potius dici: nam resolutam partem immobilitate, & demissione agnosceamus: stupidam verbò dicimus eam, cui sensus est hebes, etiam si motum nulla læsio attingat. Itaque stupor accidit aliquando partium solùm sentientium, aliquando etiam moventium, atque hic aliquando fit ob intemperiem frigidam partium stupefactam, quia frigus adversum est omnibus viventium actionibus, aliquando propter obstructionem nervorum deferentium sensum, vel etiam sensum & motum: minorem tamen quam ut faciat paralysem atque hanc obstructionem aliquando facit succus, qui ipsos nervos occupat, aliquando membra adiacentia, quæ ipsos comprimunt. Distinguenda igitur hæc, quia si refrigeratio in causa est, solis caloricis occurreretur, si obstructio, expurgatione: si compressio, hanc rollere curabimus. Facit eam saepe vicinarum partium tumor ex plethora, & tollitur sola missione sanguinis. Ijs quibus coxa dolet, solet cruribus regione posita usque ad extremum pedem stupefcere, ob nervos crurum, qui omnes iuxta ipsam coxæ os ab vicinis lumborum vertebra decurrunt: præcipue verbò ob ordinem quartum, qui etiam est postremus, & maximas eorum qui descendunt à lumbis, quia cum tribus sequentibus sacri ossis nervis coalescit: is enim simul cum arteria & vena magnis, penetrat per foramen, quod ex ossis ilij & sacri coarticulatione, velut in hunc solùm usum formatum est. Evenit igitur propter fluxionem coxæ dolorem inferentem aliquid in nervum reducere, aut à venis, & arterijs, ac carnibus etiam multitudine cumentibus comprimunt, atque ob diversam affectionis modum,

A quidam stuporem cruris, quidam dolorem quemdam per totum crur productum, secundum illius nervi longitudinem sentiunt. Cui malo occurrendum videtur sectione venæ in contrario crure, quanquam nisi crur doleat, ob dolorem coxæ secanda est in eodem.

Propter aures, & ex auribus saepe moriuntur tertia die.

B Hippocrates in prognostico ita reliquit scriptum, Aurium dolor acutus cum febre continua ac vehementi difficilis est, periculum enim delirij & mortis imminet: Quia igitur fallax hic locus est, citò etiam animam ducere omnia alia indicia à prima die, necesse est. Natu minores septimo die, aut citius ab hoc morbo interimantur: natu verbò maiores multò tardius. Gal. in commentatio inquit, Multi interimantur per dolores aurium vehementes, in consensum perdocto cerebro. Quo circa nonnulli aegroti delirant, nec non aliqui repente moriuntur, in eundem modum quo apoplectici, quoties in cerebrum decumbit universa dolorem aurium committens fluxio. His consona est præsens oratio. Nimirum Hipp. dixit septimà die, aut citius mori, & Galeus explicans quando citius mori solent, dicit, nonnullos brevissimè ac repente, illud nunc definitè dicitur, tertià die. Hoc enim est brevissimè mori, cum tertia sit prima decretoriarum: Itaque mihi hæc oratio nihil aliud significat quam locum hunc adeò esse fallacem, & periculosum, ut nonnunquam ex eius dolore contingat mori intra primum quaternarium: Id quod est verissimum, quia facillimè inde serpit in cerebrum malum, & homo conuellitur. In quodam fragmento commentariorum, quæ quasi nunc denuo inuenta, sub Galeni nomine nappèrimè sunt in lucem edita, dicitur, illud ex auribus significare fieri ex primario auris affectu, propter aures per consensum. Quod scilicet aliquando eveniat mori ob ipsam aurium affectionem per se, aliquando tracto cerebro in consensum. Mihi verbò non videtur fieri posse, ut ob non videtur fieri posse, ut ob passionem ullam auris moriatur homo tertià die (imo verbò nec ut moriatur omnino) nisi cerebrum in compassionem trahatur. Quapropter geminationem illam verborum, propter aures, & ex auribus, illud potius significare intelligo, propter aures mori homines tertià die, non tamen proximè, ac per se, sed quod ex auribus malum incipiat, refundatur verbò in cerebrum.

E **Q**uibus cutis arida & dura intenditur, sine sudore: quibus verbò laxa est, & cum sudore moriuntur.

Cerrò si quibus cutis intenditur, moriuntur sine sudore: & quibus laxa est cum sudore: fit ut omnes aegroti moriantur: omnes enim sunt cures laxæ, aurintendæ, siquidem hæc sunt contrarie dispositiones. Non est igitur hoc quod docet, sed eum ex alijs signis constare hominem esse lethali-

ter affectum, cognoscere ex his, sine cum sudore, an sine eo moriturus. Cum verò dixerit in prima orationis parte, cures intentæ, aridæ, & duræ, quasi tres hæc sint diuersæ qualitates, constat in secunda quæque parte, esse tantum dicat, quibus verò laxæ, suppleri debere humidæ, & molles. Nam reddi debent tribus illis contrariæ. Non est autem xnum pluribus, sed vnum vni contrarium, vt millies dicit Arist. Præterea quia laxæ tantum cures fieri possunt ob siccitatem, & extenuationem: nam vt dicebatur sectione tertia huius sciti, omnis extenuatio laxat cutem, deinde circumdatur: laxæ verò, & humidæ, & molles, non nisi ob humiditatem extrorsum vergentem fieri possunt, quare illæ differentie merito significant sudorem, atque in morituro mortem cum sudore: contrariæ verò humoris in cute vacuitatem, ac proinde neque sudorem futurum sed sine eo moriturum hominem, si alioqui sit moriturus. Hæc eadem sententia scripta est eisdem ferè verbis in sectione quinta aphorismorum iuxta calcem.

In morbis dolosis & vagis mutationes profunt; in his mutationes fieri debent ad loca opportuna, antequam vitium aliquod sit contractum, vt Chetioni accidit.

Morbi *passivi* sunt, qui cum videantur esse sedati, aut etiam soluti, redeunt, præcipue si id sepe fiat, vt accidit Chetioni, qui fuit quintus ægrotus libri tertij. Illi enim, vt licet tunc illuc redeunt legere, ter visus est à febre liber, & totidem habuit recidius. Monet nunc Hippocrates, vt in talibus si quam oporteat facere mutationem, velut in locum alium, aut in aliam domum, aut tale aliquid huiusmodi, quod magis deceat, idcirco facere, dum subleuati videntur ægroti, antequam euadant deteriores morbis malignis redeuntibus. Velut si fortè Chetionem iter agentem in diuersorio febris corripuisset, fuisset sanè satius in domo sua ipsi ægrotare, atque ita in domum mutari decens; non fuisset autem expeditius id facere, dum febris erat vehemens, & dolor capitis maximus, neque poterat dormire, & conuulsionibus tentabatur, & delirabat. Efferat autem faciendum die octaua, aut septima mox ac soluta esset febris, neque expectandum donec die nona rediret. Huc etiam spectant quæcunque alia ægrotos facere decet, neque tamen vigentibus morbis fieri possunt. Nimium quicquid ægrotus sit facturus, aut quæcunque mutatio circa eum tentanda sit, si morbus quem aliqui malignum & fallacem esse suspiceris, die aliqua subleuatus esse videatur, arripienda occasio est, faciendumque quod deceat, ne fortè re infecta ægroti euadant deteriores. Velut si quis ægrotaret vt Chetion (non est enim quod recedamus ab exemplo) qui cepit tertia die delirare, & vsque ad octauam non resipuit, & preoccupatus esset delirio antequam peccata sua esset confessus, aut bonorum suorum heredes designasset, profectò multatius esset magne, nisi mox ac resipisceret id faceret, antequam scilicet malum reuenteretur. Ita, etiam si quæ alia mutatio facienda sit. Fiant autem illæ tantum

A mutationes, quæ ad decentia sint. Nam neque cum antea iuberet Hippocrates per morbos longos mutare solum, quæcunque soli mutationem commendauimus, sed eam quæ est commodior ad cuiusque morbi curationem. Itaque hac oratione nõ commendat vllas mutationes, qui scilicet. 3. huius sexti ita scilicet erat, Mutationes esse cauendas, sed docet, si quam facere deceat aut omnino oporteat, quam morbo vigente facere non liceat, si quam remissionem in indicet, non esse præstolandum, donec fortasse reuertatur peior, sed in occasione faciendum. Sed rogabis quæ causa erit, vt timeam; cum morbus solutus videtur, fore vt reuertatur? Certè si non videatur secundum rationem solutus, iuxta id quod in aphorismis dicitur, Non est fidendum bonis quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talium durare non solent, velut Chetioni febris maxima, & maligna sine concoctionis & sine iudicationis vlla indicatione, soluta est die septima, redijt verò nona. Artis tamen medicæ placitis magis consonus sensus erit, si intelligatur hæc sententia de humorum metastasi, quæ valde laudatur in morbis, quum sit ad loca conferentia & opportuna, antequam pars primario affecta labem aliquam contraxerit.

Irritantia ex quibus procedant videndum, in faucium asperitates terminantur.

Vltimum actuum & mordentium, atque adeo extergentium vehementius, denique irritantium dicit finiri in sensum quandam asperitatis in faucibus & larynge, qui vocatur propriè *σπίγξις*: hac ratione probat Galen. oleum, etsi alias partes videatur lenire, & si quis sit dolor, & quæ lassitudo tollere, habere tamen aliquid mordax, & irritatorium, quod cum dealbatur deponit. Quia si quis illud lingendo accipiat, terminatur eius visus in *σπίγξις*: quia & *ἐπὶ τῇ σπινθὴρ* est *ἡ σπινθὴρ* *ἐπὶ τῇ σπινθὴρ*. Hoc est, irritantium visus *σπίγξις* facit.

Quibus quod sanum est relinquitur, per inferiora subducta causa, eos aut purgato, aut deligato, aut eiecto, aut secato, aut vrito: quibus verò minime, nil tale molientum est.

Chirurgicum partem quampiam putridam aut valde alteratam curant, cum habent scopum, vt vsque ad sanam partem pertingant, secando, aut vrendo, aut medicamentis exedendo. Nunc ergo mouet ne prius desistant, quam vsque ad partem sanam peruenerint, sed si quod sanum est relinquitur, id est, quod sanum est non attingeris, sed adhuc relinquitur sub sordibus, aut sub parte putri, curationem perforce, deorsum versus facta sectione, vt sanies quæ eius mali causa est, subducatur, aut vsu extergentium purga affectam partem, aut deliga, id est vinculo excipe quod emortuum aut alteratum est, vt ita excidat, aut excisum eiice, aut seca, id est, scarifica, aut vte; quibus vero minime, id est quibus sanum non relinquitur

tur intactum, sed ad illud usque iam sit curatione peruentum, nil tale molendum est, idest, ne facias quidpiam tale, sed vtere repletibus, aut cicatricem inducentibus, vt res exigit.

Quibus sanguis fluit multus ex naribus, si quidem decolorationes immoderate adfuerint, is parum prodest, qui autem prarubro sunt colore, in is non ita se res habet, & quibus capita facile tolerant prodest, quibus vero secus, minime.

F. Vbi ego verti, quibus de colorationes immoderate adfuerint, is parum prodest, habetur in meo codice, *ἡ ἀρρυθμία ἐκ τῶν, τῶν δὲ ἐκ τῶν* in alius fortasse codicibus (non enim in eos indici) *ἐκ τῶν* quia quidam vertunt, qui quidem decolores sunt merito modo: in aliis etiam fortasse (nam neque in eos indici) *ἐκ τῶν* quia quidam vertunt, is parum prodest datum prodest. Prima quidem versio, quae iam Cornarij est, sensu quidem haud multum distat ab hac mea. Nam decolorationes immoderatas ego dici intelligo, quasdam mutationes coloris in albidum, & debilitarem, ac naturalis caloris defectum praeseferentem colorem: quales videmus quotidie in iis quibus haemorrhoides largiter fluunt, aut mulieribus quibus menses. Tales, etiam dici possunt decolores merito modo, quia omni virido colore carent. Altera autem versio plurimum mutat orationis sensum, significat enim eis, quibus ob multitudinem fluxus sanguinis sublatus est color, prodesse vinum merum modice datum: iis vero qui rubri sunt non prodesse, atque rursus iis, qui firmo sunt capite, vt meri potum ferre possint, prodesse, aliis vero secus. Mihi vero videtur merum fluente sanguine noxium esse, vt pote quod fluxiones magnopere angeat, atque, si metus ne tenet caput, rimendum potius esse ne sanguinem agar sursum, & faciat effluere abundantius: neque sane merum talibus dandum est, nisi forte in aliquo deliquio animi. Proinde mihi placet multo magis praescripi lectio, videturque pertinere oratio non ad tutatiuam, sed ad diagnosticam partem, continereque duo quae considerate oportet, vt agnoscas an fluxus sanguinis creber ex naribus conferat. Alterum pertinet ad affectum, vnde nascitur conferentia, aut contrarium; alterum ad facultatem, vnde rolerantis, aut contritum. Coloris ergo illa sublatio, sanguinis penuriam, & succorum in aliam speciem mutationem significat, quare ita affecti missionis sanguinis non iuuant: color vero ruber significat abundantiam sanguinis, quare eius euacuatione iuuantur. Quoniam autem non est satis, vt euacuatio iuuet, & eam affectio postulet, nisi etiam facultas ferat, considerandum etiam, an habeat homo firmum caput an debile. Nam cum missio sanguinis partes omnes, & omnes facultates quae nostra corpora regunt, possit debilitare, quae omnium maxime sanguinis penuriam persenscit, caput est: quia est pars princeps, & exanguis cerebrum, & ex sanguine habet animalium spirituum refectionem. Vnde natum suspicor maximum illum vulgi timorem secundae venae cephalicae, quia,

A arbitror, intempestiue secta, cerebro affert noxam satis insignem, quod quidem vbi ea non est opus, aut non bene fertur, effluxio ex naribus magis facit, quando ea pars cerebro est propior. Qualis autem sint capita quae fluxum sanguinis bene tolerent, dixit Hippocrates in libro secundo sectione 1. cont. 18. vbi ego hunc locum citavi, quod ad illius explanationem plurimum faceret.

B Quibus nares sunt humidiores natura, & semen humidius & copiosius, hi minus firma videntur valetudine, plurimus autem quibus post morbum accidit, contrario se habet modo.

Hae sententia enarrata à me est in commentatione aphorismi secundi sectionis sextae, vt non sit opus eam rursus enarrare. Illud solum inbet monere, hoc loco manifeste deprehendi fragmentum illud commentariorum huius libri, quod nunc nomine Galeni venditur, legitimum non esse: Contrarium enim prorsus ibi affirmatur, atque in commentario aphorismi à Galen. adeo vt si Gal. esse censerem, essem duo ea loca in libellum de locis manifeste pugnantibus repositurus, verum ob quamplurima mihi iam id fragmentum videtur suppeditium.

Sputa rotunda delirium significant, qualia erant illi qui in Plinthio arotabat, huic fluxit sanguis ex sinistra nare, & solutus est morbus die quinta.

D Sputum rotundum vituperat Hippocri. in prognostico, dicens esse inutile: nunc quatenus sit maius explicat, dicens esse adeo grane, vt delirium significet, huius causa est, quia significat ingens incendium circa partes spirituales, à quibus facile trahitur cerebrum in compassionem: velut cuidam in Plinthio accidit, cui reliqua quoque intra eandem rationem euenerunt. Nimirum cum raptus esset factus in caput, liberatus est per fluxum sanguinis narium: ex sinistra vero, quia forte fortuna contingit secundum id larus laborare magis: die vero quinta, quia erat morbus acutissimus exade.

Vrina multam subsidentiam habens soluit deliria, qualis fuit Dexippi post defluuium capillorum.

Velut haemorrhoides, & varices, & quaecunque alia, quae succos biliosos aut atrabiliarios ad inferiora restabunt, à delirio liberant, ita & vrina in qua multum subsidet. Nam si verè dicitur in protheticeis, vrinam in qua tenue quiddam natat ipsam minari, certè in qua multum crassumque residet insaniam solui indicabit. Nam vt infanie solutio ipsi passioni contraria est, ita & tenue crasso, & supernatans subsidenti. Rursus si rectè dicitur in aphorismo, vrinam albam & tenuem malam esse, si in

delirantibus appareat, quia significat. raptum humorum in caput, et sane in eisdem bova quæ crassa. Noo autem quæ crassa secundum se totam; & perturbata, qualis est iumentorum. Nam talis, ut in alio aphorismo dicitur, significat dolorem capitis, qui adest aut aderit, quare malum iminatur capiti. igitur bona est in tabulis crassa in qua crassum subsidet. Nam neque flatum & perturbationem significat, quæ in caput cleoet, neque succorum in superas partes aptum, sed contraria omnia, æstuationem scilicet, & agitationem in venis conquiescisse; & succos deorsum retrahi. Hoc dicit accidisse Dexippo, cuiusdam post defluuium capillorum. Scilicet ille, cum laboraret insaniam, defluuium capillorum passus est primum, deinde multo tempore (paucis enim nihil profecisset) urinam reddens plenam multa & crassa sordie, quæ in matula rehidebat, liberatus ab insaniam est. Neque certe haberet hæc narratio quicquam quod non sit rationi consonum. Nam defluuium capillorum sæpe fit per abscessum, interno capite incutem mittente sua excrementa, eo igitur per cutem proximam expurgato, & maxima succorum copia in infera tractata, merito melius habuimus mens.

Quartana non producit ultra annum.

Quidam vicienas duas voces orationis proximæ, ad hanc reuocantes scribunt; post capillorum defluuium quartana non producit ultra annum. Ego verò non video, cur capillorum defluuium liberare possit à quartanæ febris longitudine. Nam si dicas, quia cerebrum expurgatum est, non placet primum quia quartanæ neque generatio, neque productio refertur ad caput, sed ad lienem potius, aut totum corporis habitum; deinde quia non semper fit defluuium capillorum per abscessum, sed aliquando per redundantiam regurgitantibus excrementis vsque ad verticem: atque cum per abscessum fit, non opus est ut per purget interna: sunt enim plerumque imperfecti abscessus: atque ob hæc evenit, ut plerique quibus capilli excederent sine excrementosiori capite, quam ij quibus nihil tale accidit, nimirum excederent iam multum bis & ter. Ego sanè eam qui quartana corripitur, non putabo ab eius productione æturiorem, quod passus sit capillorum defluuium, nisi me aliquando experientiam ita docuerit esse: hæcenus non conrigit videre multos quartana laborantes, quibus excedissent capilli, proinde probò multò magis seorsum legi, quartana non producit ultra annum. Dicit ergo nunc Hippocrates quæ sit quartanæ constitutio. Dixerat enim libro primo, quartanam esse longissimam, in prognostico etiam eam morbi longi exemplum effecit, dicens, est etiam quartana febris ex hoc ordine, atque in aphorismo dixerat, æstiales quartanæ esse breues, autumnales longas: itaque esse alias aliis longiores, tamen eius constitutionem definire non dixerat: neque nunc dici omnino, sed ultra annum ooo protogari. Itaque æstiales non producentur vsque ad annum, neque autumnales ultra. Cuius rei causa erit, quod ut acutæ febres motum sequantur lunæ, ita longas sequi motum Solis est consentaneum: igitur

ut ut acutæ febrii fines sunt intra mensem, ita chronicæ omnes erunt iotta annum. Atque ut acutæ quædam mensis dimidiom, atque aliæ etiam minus durant; quæ verò mensem superant, sunt decedentes ex acutæ constitutione, ita longæ in hoc genere sunt quotidianæ, & quartanæ; quædam dimidium anni durant, quædam meosles duos, & quæ longissimæ sunt, annum integrum: quod si eum superant, id quidem fiet ob prauum victum, vel ob ineptam curationem, aut etiam aliquando ob coniunctam viscetis cuiuspiam intemperiem, etique ea quartanæ producta ultra communem quartanæ constitutionem. Certè testari possumus paucas esse, quæ in iis qui prouident se gerunt, oon iotta vnum annum terminentur.

In aurium inflammationibus eruptiones æstate sunt die quintâ, aliquando quidem etiam longius producantur, eodem modo quæ circa gingivas & nates contingunt suppurationes.

De aurium inflammationibus ita scriptum est ab Hippocrate in prognostico, Auris dolor acutus cum febre continas æforti horrendus est. Periculum enim est, deliraturum esse hominem, ac perituum. Proinde cum hic locus minimè tutus sit, citò mentem aduertere oportet etiam aliis signis, à prima statim die. Percutit autem iuniores die septima, & adhuc citius ex hoc morbo: febris verò longè tardius. Nam & febris deliria mioris ipsi accidunt, & hæc de causa aures antea suppurantur. Verùm his quidem statibus recidit morbi contingentes plurimos occidunt. At verò iuniores prius quam suppuretur auris pereunt. Hæc Hippocrates quibus æpetere docuit, eum affectum aded esse periculosum, ut plurimi moriantur antequam morbus suppuretur, & ij qui superfuerint euadant per suppurationem. Nam addit, nam si pus album effluxerit, spes est iuuenem superstitem futurum. Itaque non senes solum, sed iuuenes etiam, erumpente ex aure pure solent liberari, senibus verò tardius sit pos, iuuenibus verò citius, intra septimum scilicet, quia nisi præueniant suppurari intra id tempus, moriuntur ob symptomatum vehemenciam. Neque solum ætas, temporis suppurationi facit differentiam; sed & tempus æoni. Omnes enim & concoctiones, & iudicatioes citius sunt æstate quam hyeme. Si igitur iuuenibus, qui ab hoc morbo liberantur, soler septimo erumpere pus aliis rempotibus, æstate erumpet quinto aut etiam citius. Quoniam verò ea ætate, & anni parte raro sunt tardius eruptiones superuictis, neque hoc perpetuum est, ita ut non possit aliter contingere, ut neque aliud fert quicquam in arte, addidit, aliquando quidem etiam longius producantur, addidit rursum: Et quæ circa gingivas, & secundum nates contingunt suppurationes: habent scilicet hoc eodem modo, & sunt eiusdem constitutionis. Hoc interest, quod inflammationes circa nates & gingivas non sunt aded periculose, neque ea loca tam fallacia quam auris.

Quibus in dentium dolore à supercilio tenuia adueniunt; his à pipere probe affricto posttridie prodeunt crassiora, si etiam reliqua non obtinuerint. Nam Hegesippo somniferum ibi non obtinuit, sed potius commocuit quiddam vehementius.

Commendat Piper ad dolores dentium, ex fluxione tenui descendente ex supercilio (eam enim capitis partem vocat superciliū per synecdochem) ut eo affricto dolenti parti dicat posttridie descendere crassiora, posseque illud ita iuuare etiam, cum stupefacientia (quæ tamen censetur esse postrema ac maxima ad sedandos dolores auxilia) non obtinent. Nam Hegesippo dicit ibi ad motum somniferum (nunc somniferum vocat stupefaciens, quod soporiferum diceret proprius) non obrinuisse, hoc est non effecisse id cuius gratiā admovebatur, sed potius commocuisse quiddam vehementius, hoc est, auisse fluxionem & dolorem. Videtur autem consentaneum intelligere, etsi id Hippocrates aperit non dicat, hunc postea curatum fuisse pipere. Huius sane causa fuit, quod dolorem & fluxionem Hegesippo excitauerit frigida causa, atque ob id stupefacientia auxerint passionem, atque ea aucta, ob id etiam & dolorem; aut si paulo post ad motionem, stupore inducto, dolorem abstulerint, ita tamen, ut postea redierit vehementius, aucta causa. In eo ergo merito processisset rectius curatio, affricto pipere, per materiam concoctionem, & attemperacionem partis. Nam in materia adeo frigida est piper concoctorium, atque ita materiam reddidit crassiorem, cum omnia quæ coquantur crassiora fiant. Non igitur hinc debes colligere, omnem dentis dolorem curari melius pipere quam opio. Si enim intemperies & fluxio sit calida, contra fiet, sed tunc conferre piper coquendo, cum stupefacientia non obtinent, quia tunc & passio & fluxio frigida est. At qui tunc quoque constat, si in mittente parte multa sit redundantia, non posse vinci piporis affricto, nisi prius ea vacuetur, & expurgetur. Intellige igitur piper affricto facere, ut fluxio vna die crascescat, postquam prospectum iam est capiti, quod cum fluxio non tam copiam exuperat quam qualitate frigida.

A capite osium naturam perpendimus, deinde neruorum, & venarum, & carniū, & aliorum succorum, & superiorum, & inferiorum ventrium, & mentis, & morum & eorum quæ secundum annum fiunt, nam quædam aliquo anni tempore præcocius contingunt ut exanthemata, & quæ huiusmodi sunt, simili modo accidit in iis quæ quotidie citius aut tardius inuadunt.

Naturas hominum, & anni tempora, & singulorum dierum partes considerare, hac oratione in-

Aber Hippocrat. Naturam quidem quæ est in compositione, & quæ in temperamento: eam quæ est in compositione, ex consideratione magnitudinis singularium partium, ac naturalium succorum, & canitarum: eam quæ est in temperamento, ex consideratione mentis & morum, quia hæc maxime omnium sequuntur corporis temperaturas. Ergo dicit à capite osium naturam perpendimus, deinde neruorum, & venarum. Qui putaret neruos, venas, & arterias originem ducere à capite, atque inde in totum corpus distribui, ut libello de osium natura docere videtur Hippocrates (si modo Hippocratis is liber est) & nonnulli veterum sunt opinati, certe in eam sententiam acciperet hæc verba, ut osium, neruorum, venarum, & arteriarum (nam vno venarum nomine intelligit Hippocrates venas sanguifluas, & pulsantes) naturam considerare oportet, initio sumpto à capite, ut à communi illorum omnium radice. Vocatur enim osium natura citato libello nihil aliud, quam ipsorum compositio naturalis. Verum cum constet eam non esse Hippocratis sententiam, sed solos neruos oriri ex cerebro, venarum vero radicacionem esse iocetur, & arteriarum cor, coeſtat non ita esse accipiendæ hæc, sed illud à capite, solum esse coniungendum cum illis verbis, osium naturam, significatque considerare oportere naturam osium, deinde neruorum, & venarum: osium quidem naturam à capite initio facto. Nam capitis offesa pars est velut osium radix, à qua produci videtur spina, à qua pendent costæ, & artuum ossa: deinde neruorum, initio etiam facto à capite, non tamen illius eadem parte, sed à medulla, quæ cerebrum vocatur: deinde venarum, utraqueque scilicet, sanguifluarum, initio facto ab hepate; pulsantium à corde: deinde etiam carniū, musculorum scilicet, quorum dissectionem nosse magni est momenti. Quoniam verò non parum solum, sed succorum etiam naturas considerat medicus, dicit, & aliorum succorum. Videtur quidem inepta loquutio, cum succorum antea non meminisset, sed fortasse insinuat inuestigandam esse naturam aliorum succorum, præter eam qui vnicuique parti proprius est. Sui enim succo quævis pars nutritur, & præter proprios partium succos, quorum natura simul cum ipsis partibus est inuestiganda, sunt succi naturales & communes quatuor, pituita, sanguis, & duplex bilis. Et superiorum & inferiorum, inquit, ventrium. Vocat Hippocrates ventres canitates, & partes naturaliter cauas, sunt autem duplices: superiores, thorax & ventriculus, inferiores inanis pars sub septo transuerso, quæ peritonæo circumſcribitur, & intestina, & vterus, & vesica. Itaque numerum omnium partium, & succorum secundum naturam in vobis existentium tenere oportet, quæ omnia pertinent ad corpus: deinde etiam ea considerare oportet quæ pertinent ad animum, mentem scilicet & mores: quia hæc plurimum valent ad temperamenti cognitionem, ut Gal. indicauit in arte medicinali, & commentario libri de natura humana, & libello, quod animi mores corporis temperaturam sequantur, & alibi sæpe. Quod verò, & ea omnia, quæ secundum annum fiunt oportet animaduertere, constat, nisi frustra à Hipp. scripsit huius operis partem magnam, & tertiam particulam aphorismo-

rum, & libellum de aëre locis, & aquis, & sparsim alia quam plurima. Considerandum verò quibusdam anni partibus quosdam morbos esse familiares, & aliquando ob intempestiuam anni, aut cuius illius partis constitutionem, morbos quosdam fieri citius solito, ut gratia exempli exanthemata, quæ medio vere fieri solent, si hyems sit aëstrata & veti similis, merito fient citius solito. Non dissimilis est consideratio partium diei cuiusque, & totius anni, quod Hippocrates ipse docuit prima sectione libri secundi huius operis non longè à principio, ubi docuit quosdam morbos citius & summo mane, quosdam tardius & ad vespertam soletè apprehendere. Quod idem dicit modò his verbis, simili modo accidit in usque quotidie citius aut tardius inuadunt.

Similiter considerandum biliosum, & sanguineum corpus fieri melancholicum, nisi habeat euacuationes.

Illud *omnino* ne ita accipias, quasi significet eodem modo, sed quasi sit particula copulanda. Nam & biliosum & sanguineum corpus, nisi habeat euacuationes, fit melancholicum, non tamen eodem modo. Nam biliosi sunt maniaci, sanguinei simpliciter melancholici. Quia bilis exusta migrat in atram bilem, sanguis crassescens in sanguinis fecem. Veri finium autem est, utroque ætatis mutatione fieri melancholicos, sanguineos. n. ætate consistendi, biliosos in media iuuentute, nisi habeant consuetas aliquas euacuationes quibus præseruentur, ut biliosi, vomitus aut diarrhæas biliosas, sanguinei, fluxus sanguinis ex naribus, aut hæmorrhoidas, aut (si sit mulier) menstruas euacuationes. Scire autem licet, posse victus probam institutionem euacuationum vices explere: sanguineis quidem tenuem, ut trinus sanguinis proveniat, & biliosis refrigerantem & humectantem, ut visio prohibeatur.

Icyano postremo splen intumuit cum dolore die quarta aut quinta.

Ut solet Galen. dicere, quæ ita sunt prælata, ut constare non possit quid significant, perinde oportet putare, ac si nunquam essent scripta. Huiusmodi sunt hæc verba, non quidem quod obscura atque inusitata, sed quod mutilata, & ab aliis quæ iam interierunt decisa.

SECTIO SEPTIMA.

Tusses inceperunt circa solstitia hyemalia, aut decima quinta, aut vigesima die, ex crebra mutatione ventorum Australium & Borealis, & temporum nivosorum. Ex his quedam breuiores, quedam diuturniores erant, & post hæc peripneumonice affectiones contigerunt frequentes. Rursus ante æquinoctium plerisque reuertebantur, ut plurimum quadraginta diebus ab initio, & quibus-

Adam breues admodum & indicatæ faciles fiebant: quibusdam autem fauces inflammabantur. Quibusdam autem angina contingebant, quibusdā leues partium resolutiones, quibusdam nocturna cecitates, maxime vero pueris. Peripneumonia autem breues admodum fuerunt: faucium verò inflammationes posttussim aut partium admodum proptius contingebant, atque hæc breues erant, magis autem nocturna cecitates. Angina autem & leues partium resolutiones, aut dura & siccerant, aut parue & raro concocta educentes: quibusdam etiam valde educebantur. Qui igitur aut voce plus fatigabantur, aut rigore corripiebantur, in anginas ipsi tusses magis desinebant: qui autem manu laborabant, manuum resolutionem solum passi sunt. Qui verò equitauerunt, aut multum itineris confecerunt, aut alioqui cruribus fuerunt fatigati, his lumborum aut crurum impotentia ex resolutione contingebant, & femorum & tibiarum lassitudo & dolor: durissima autem & vehementissima tusses erant quæ ad eas partium resolutiones perducebāt. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant, in principijs autem non admodum. Multis autem horum in medio tusses remiserunt, perfectè autem non desierunt, sed cum recidiua adfuerunt. Quibus voces abrumpebantur propter tussim, horum plerique non febricitarunt, quidam verò breuiter. Sed neque peripneumonia horum cuiquam contingebant, neque partium resolutiones, neque aliud quicquam significationem præbebat, sed in voce sola indicabantur. Nocturna autem cecitates, siccabantur, ut & alia quæ ex causis procacitatis ortum habebant, nocturna verò cecitates pueris præcipue contingebant. Oculorum autem nigra partes aliquantulum variegata erant, quæ pupillas exiguas habebant. In idem niger ut plurimum oculus erat. Magnos autem potius quam paruos oculos habentibus istud accidebat, & plurimis qui rectos & nigros capillos habebant. Mulieres autem non equè tussi laborabant, sed paucæ etiam febricitant, & harum paucæ admodum ad affectionem pertneumoniam deueherunt, atque hæc seniores, & omnes superstites manserunt. Huius rei causam assignabam, quod non similiter ac viri foras prodirent, nec similiter ac viri morbis corriperebantur. Angina autem acciderunt duabus liberis, atque hæc mitissimi moris: abundantius vero seruis, & quibus vehementissima contigerunt, eas etiam celerrimè peremerunt. Viris autem plurimis aborti sunt, quorum alij superfuerunt, alij perierunt. In summa ipsi qui deplurimè solam poscerant, mites admodum &

rant & toleratu faciles: qui verò præter hæc loquebatur obscurius, his & molestiores erant & diuturniores: quibus etiam vena in temporibus & ceruice intumescebat, aliquantulum præuæ: quibus quoque spiratio sublimis fiebat, pessima erant, hi namque etiam tepe fiebant; nam sicut scriptum est, talia erant affectionum consortia. Qui quidem primò descripti sunt, etiam sine posterioribus accidebant; qui verò posterius, non sine prioribus. Celerrimè moriebatur quæ febre correpti subinde riguiscent. His ita oppressis nulli mentione dignum attulit auxilium, aut alui perturbatio, aut vena sectio, aut quicquam eorum quæ tentant. Venas autem sub lingua secui, quosdam etiam per superiores partes purgari. Hæc igitur æstate omnino acciderunt, velut etiam quæ pròperant plurima. Primum quidem per squaiores ophthalmia dolore afficientes populariter grassata sunt.

Tempestatem describit morbosam quæ incepit circiter quindecim aut viginti diebus post solstitium hyemale, perducitur autem natiuitas vsque ad æstatem eiusdem anni. Intemperiei & eorum morborum causa fuit mutatio sæpe & repente facta Australium & Borealiū & nivosarum tempestatum. Nimirum eo anno tunc erat tempus placidū & Austrinum, nunc flabat Boreas, nunc etiam nungebat, eaque omnia alternatè & pluries. Existimandum est autem eam temporis conditionem præcessisse morbos. Ita enim est naturæ comparatum ut causa antecedit, id verò quiddam ab ea sit sequatur. Atqui corpora paulatim disponuntur ad morbos. Cum igitur morbi inceperint aliquando post solstitium hyemale, fuit quale dictum est tempus ab initio hyemis, quod numeratur à pleiadum occasu, in eunte Nouembri, ac fortasse etiam prius. Mutationes magnæ frigoris aut caloris in temporibus, ut dicitur aphorismo primo sectionis tertie, maximè pariuunt morbos. Hæc verò quæ sunt ab Australibus ad Boreales & viuosas, natæ sunt facere fluxiones multiplices, ut quisque est paratus hæc aut illa parte laborare. Nam per australem constitutionem augetur humiditas, per æquilonarem exprimitur pelliturque à parte in partem, per viuosas refrigerantur & læduntur partes quædam, præcipue quæ spectant ad pectus & vocalia instrumenta, atque proinde recipiunt distillationes ex capite, aut etiam fluxiones ex toto corpore, ut certe factum est. Quamvis autem ob communem causam, magna ex parte similis esset, in quam plurimis hominibus morbi species, tamen ob diuersos corporum apparatus, necessariò fiebant nonnullæ passionum differentie, patiebanturque multasnam, partium diuersis morbis, commune tamen quiddam habentibus: partim eisdem, sed minoribus, breuioribus aut diuturnioribus, boni aut mali iudicii. Primum igitur cœperunt tussis multe circa solstitium hyemale, quindecim scilicet diebus aut viginti, paulo plus minuse post solstitium, desinere scilicet Decembri: & multis ex his qui tussi laborabant degenerabat distillatio in peripneumoniā. Et

hoc quidem tempore licet intelligere ex natiuitate, non dum esse hanc mala graui, leuiter enim percurrit vsque ad tempus reciditarum, quatum mox facit mentionem. Ex merito quidem sic (ut in aliis etiam epidemialibus constitutionibus animaduertimus) ut morbosus status à leuiori incipiens, tractu temporis ingrauescat. Plerisque ergo ante æquinoctium verum reuertebantur tussis. Magna ex parte quadragesima diebus à principio, hoc est, circa medium Februarii, quæ vltima hyemis pars est, & vetis temperiem iam incipit imitari, flante Favonio. Et quibusdam erant tunc quoque tussis breues & boni iudicii, hoc est, soluebantur breui, & in vultum malum aliud trāsibant; quibusdam autem inflammabantur fauces, hoc est, partes oris quæ interiacent inter gulam & laryngem quibusdam autem fiebat angina, hoc est, inflammationes strangulantes, quarum quæ grauissimæ sunt, & crassissimæ strangulant, sunt in capsum caput asperæ arteriæ. Alia buæ proxima fir in eius musculis. Dicuntur etiam angine esse species, quæcunque in ore, aut rôtæ ceruicæ sunt inflammationes, tanto autem minus propriè, quanto minus strangulant: atque iam hæc patente nomine, etiam faucium inflammationem angina quædam dicitur, sed quia non tam propriè, dixi, quibusdam faucium inflammationes, quibusdam etiam anginæ fiebant. Quibusdam etiā facta sunt angine vixisse, hoc est resolutiones quarundam partium. Nam et si paraplexia ab autoribus vocari solet, ea solum quæ dimidiari corporis est, sic tamen hic vocari cuiusvis partis resolutionem, facile constabit ex ipsa narratione. Quibusdam autem nyctalopiz, magis autem pueris. Nyctalopia est oculorum morbus, quo laborantes videre noctu nihil possunt, sed mox atque tenebre scit hallucinantur. Causa est nimia oculorum opacitas, ob quam nisi in splendore magno non possunt videre: is morbus fiebat multo magis pueris, quia sunt humidis & excrementosis, atque debiles coëbro & oculis. Peripneumoniz etiam fiebant aliis, & ex quidem valde breues: præcipue vero, hoc est, faucium inflammationes fiebant post tussis, hoc est, postquam homines tussi laborassent, aliis breui admodum fiebant pro tussi, hoc est, paulo postquam tussi fuerant correpti homines, fiebant, tussicessante. Erant vero hæc etiam inflammationes breues. Magis autem (inquit) nyctalopes. Si diceret, breuiiores esse nyctalopes quàm faucium inflammationes, tepugnaret sibi ipsi paulo post dicens, & sic non est. Intelligere ergo hic est consentaneum, magis autem durabant nyctalopiz. Trium mala fuerunt in hac epidemia: licet constitutione difficilia & graua, facta post recidivas & precedente tempore (nam ante recidivas, ut diximus, nihil fuit graue) angine, paraplexiz, & nyctalopiz. Angina quod multi ex illis morerentur: paraplexiz & nyctalopiz, quod solui non possent, sed multis firmarentur, & inueterascent. Hæc igitur nullum desu ibit, dicens quælia fuerint & ex quibus occasioibus initium cœperint, & quos habuerint exitus. Anginæ autem (inquit) & paraplexiz, aut duræ & siccæ erant, hoc est, per quas nihil excrearetur, et si esset magnæ aut paræ, & raro concocta eductæ: quibusdam autem etiam valde multa concocta educebantur. Nimirum etiam hæc quoque non omnibus eque graua, sed aliis plus, aliis minus. Occasiones morbo-

rum deinde narrat, dicens. Qui igitur aut vocibus amplius sese fangarunt, vociferantes scilicet, aut tignunt, hoc est, plurimum frigus sustinent, an anginas magis definebant tussis, id est incidebant ex tussi (omnibus enim inceperunt à tussi mala) qui antem manibus laborauerunt, (solis manibus) sunt facti paraplectici: qui verò equitauerunt, aut plurimum iter confecerunt, aut aliter cruribus sunt fangati, his lumborum aut crurum impotentia ex resolutione contingebant, & femorū & tibiārum lassitudo & dolor, hoc est resoluti sunt secundum lumbos, & habebant crura resoluta, idque indissolubilibiter, ac pertinaciter, & habebant secundum femora & tibiā lassitudinis sensum, & dolorem. Itaque mouere non poterant crura, sentiebant autem cum dolore fluxionem in ea decumbentem nervos obstruere, adeo ut facultas quæ per eos deferretur, motui non sufficeret: non tamen adeo, ut neque sensui. Eadem verò fluxio faciebat ut sentirent cum dolore. Facta sunt autem hæc dictas ob causas, quia ut dicitur in aphorismo, si quæ pars ante morbum laborauerit, in eam morbus firmitur. Iam verò frigus externum nullam partem lædere magis poterat, quam eam per quam inspiratur aer, refrigerata verò ea pars facile recipiebat fluxionem, ut alia quævis quæ ob quamcunque intemperiem debilitata sit. Addit, durissimæ autem & vehementissimæ erant (tussis intellige) quæ ad eas partium resolutiones perducebant. Verissimile est ex vehementiori pependisse causā, ea quæ maiores consequerentur abcessus. Omnia autem (inquit) hæc quæ grauiā & difficilia continebantur in recidiis, in principis autem non admodum. Tunc enim, ut dictum est, nihil fiebat præter tussis, & mites peripneumonias. Et multis horum in medio (hoc est inter primas inuasionē & recidiā) tussis remiserunt, & ob id visæ sunt secundæ passionis esse recidiū: perfectæ autem minime desierunt, sed perseverantes à principio aderant simul cum recidiā. Rursum percurrunt singula mala, quæ in recidiis simul cum tussi aderant, & explicat singulorum euentus. Hæc fuerunt, ræcedo quædam tanta, ut vox interceptetur, & omnino eam emittere non posset (hoc enim vocat vocem tussi abrupti) & nyctalopia, & paraplexia, & angina. Dicit itaque plurimos eorum quibus voces abrupterentur tussi, omnino non febricitasse, quosdam autem febre, sed breui correptos esse, neque peripneumonias neque paraplexias, neque aliud quippiam eis successisse, & in solam vocis interceptionem finitum esse malum. Et hoc quidem merito fiebat, quia quibus per ræcitatem vox omnino intercepta, plurimū succi imbibitur in ipsam asperæ arteriæ membranā, quæ pars non facile commouet sua excrementa, sed sustinet donec paulatim discutiantur. Quin etiam vidimus horum plurimos multū temporis voce caruisse, & in posterum toto vitæ tempore ræcos mansisse, durata & indissolubili facta passione. Fiebat ergo hoc ijs quibus cerebrum non ræco impetu excrementa pellebat, ut in pulmonem truderet aut artus, ooque materia erat adeo calida, ut anginam quæ inflammatio est pareret, aut febrem citet, sed frigida materia lenitē pulsa, in ipsa aspera arteria hæret febrim non inferens. Nyctalopia autem firmabatur, id est, manebant indissolue, ut alia quæ

A ex procatartidis causis fiebant, id est, ut paraplexia. Dictum enim antea est fieri eas, iis qui manibus laborauerunt, aut equitauerunt, aut iter fecerunt. Itaque dicit & nyctalopias & paraplexias firmatas fuisse. Factæ autem sunt, inquit, nyctalopie pueris præcipue. Huius causam esse censeo humiditatem nimiam cerebri, & omnium capitis partium, quæ in ea parte est: oculus enim est exortus quidam ipsi cerebro valde proximus. Fiebant verò per nyctalopiam nigre oculi partes (quæ scilicet inter iridem & pupillam sunt) variegatæ, ob fluxionem inæqualiter membranæ hærentem: magnæ tamen ex parte tendebat ea pars in nigrum, quod crassitie influentis succi opaculo fieret oculus, quod speciem refert nigræ. Inter ipsos autem pueros illi maxime fiebant nyctalopes, qui erant grandioribus oculis, & habentes capillos rectos & nigros, non tamen qui paruis oculis. Nam oculi grandiores sunt ob humidam naturam, aut ob calidam, quibus verò calida est natura, pilis non sunt recti, sed crispis: quibus igitur simul sunt oculi magni, & capilli recti, natura est sine calore hominū, quæ parata est ad nyctalopias: qui verò sunt paruis oculis necessarii sunt sicci; & ob id humidis morbis non capiuntur: esse verò siccos (nisi materiam defectus fecerit exiguitatem) utcumque se habeant reliqua, constat. Quia si sint oculi parui, & capilli crispi, erunt sicci & calidi: si verò recti, frigidi & humidi. Vbi dicit Hippocrates *μακρόφθαλμοι*, id est capillis nigris, ego censeo legendum esse (quem etiam errorem alibi in Galeni scriptis animaduerti) *μακρόφθαλμοι*, id est magnis capillis. Nam nigrescent capillorum potius significat calorem, & estque contrarium signum rectis: magni verò capilli sunt iis qui sunt excrementosi & humidi, quibus etiam sunt recti, ut in mulieribus videre licet. Itaque fiebant nyctalopia pueris habentibus oculos magnos, & capillos rectos & longos: non tamen fiebant habentibus oculos paruos. Videbatur his consonum, mulieres hac tempestate deterius habere se quam viros, & crebrius ac periculosius ægrotare: tamen non ita fiebat, sed multo pauciores corripiebantur tussi, & cum iis quæ corripiebantur agebatur etiam melius, quam cum viris, quia paucæ febricitabant, & harum rursum paucæ in peripneumoniam incidebant, & hæc seniores, & omnes superstites manserunt. Huius rei causam ipsemet Hippocrates aperte exponit dicens, id accidisse ob euacuationem menstruam, quæ feminis est familiaris. Ea certe euacuatio à plurimis morbis mulieres præseruat, & plurimos iudicat à quibus alioquin non euaderent, ut etiam cum intempestiue supprimatur multorum malorum illis causa est. Itaque laborabant tunc temporis rursus mulieres paucæ, & ex seniores, quibus scilicet desit fluere ea vacuatio: neque tamen moriebantur, quia talibus cum fluere desit, mutatum est temperamentum ad siccius, neque ex qua carent admodum indigent euacuatione. Aliam etiam causam esse dicit, ob quam mulieres non perinde ac viri ægrotabant, quod non eodem modo ac viri in publicum prodant, id est non ut viri se exponant aletantibus causis, neque in negotiis versentur, sed domi se contineant: huic autem causæ attestatur ipse euentus. Nam anginas duobus solum liberis acciderunt, & ex quidem minutissimæ, seruis vero fiebant multo plures, & vior-

lentissimæ, & citissimè iugulantes: quia scilicet liberæ vtebatur meliori victu, & minus in aëre versabantur, seruz vero domo exibant vt viri, ob id quæ afficiebantur vt illi, arque do etiam grapius quod deteriori vterentur victu. Vis enim etiam plurimis coenerunt angina, & alij quidem super-tuerunt, alij vero mortui sunt. Mortui vero à superuictoris his distinguebantur notis. Iis qui solùm bibere poterant, idest qui non aliret quàm deglutendo noxam sentiebant, quod nihil nisi potum deglutire poterant, valde erant mites, & toleratu facillimæ, atque ita minimè periculosæ: qui verò etiam loquebantur obscure, iis & molestiores, & diuturniores: molestiores quidem, quia spiritus viam magis obturbabant, & suffocabant magis, nam ex prohibita deglutitione loquæ minus est periculum, quàm ex prohibita respiratione, minus tamen ex utriusque quàm ex alterius læsione: diuturniores verò, quod essent inflammationes maiores, quæ attingebant vtramque partem, gulam inquam, & laryngem. Quibus verò venæ in ceruice & temporibus attollebantur, aliquantulum prauæ, hoc est, malignæ & periculosæ, quia illud magnæ suffocationis inditum esse inde agnosces, quòd & in iis qui laqueo aut manibus strangulantur, appareat. Quibus verò spiratio fiebat sublimis erant longè pessimæ, id enim est iam signum mortis proximæ, significatque strangulationem & debilitatem extremam. Quam significationem augebat, quod & sepecebant, idest refrigerabantur secundum extremas partes. Erant verò hæc omnia dicto ordine mala præter cætera, quia sic erant dictarum passionum confortia, vt quæ primum descriptæ sunt, etiam sine posterioribus acciderant: quæ verò posterius, non sine prioribus. Qui scilicet habebant ex angina sublimem spiritum, his etiam attollebantur venæ, & quibus attollebantur venæ, ij obscure loquebantur, & qui obscure loquebantur, bi malè deglutiebant: non tamen contrà; si malè deglutiebant, loquebantur etiam obscure; neque si hoc, etiam attollebantur venæ; neque rursus si hoc, etiam respirabant sublime. Igitur vel ob hanc solùm causam necesse est, posteriora esse deteriora prioribus. Signum autem superuenebat, quod in his pestilentibus anginis (talisenim erat iam hæc constitutio, cum essent morbi communes, & ex eis plurimi morerentur) significabat mortem iam iam imminentem, vt in p. ex p. morbus est, hoc est, quum iis superuenebat rigor similis ei qui solet per febres fieri. Nam ex tali rigore qui egrotis iam debilibus superuenit, non solent recalescere, sed cum ipso rigore extinguuntur. In quantum autem malignitatem euaserit hæc constitutio, quæ benigna à principio fuisse videbatur, inde vult Hippocrates coniectes, quòd ita oppressos morbo (hoc est laborantes angina non leni) nihil tantum manifeste, tamen multa circa illos molus sit. Nam & alium mouit, & venæ sectione est usus, cum in brachijs, tum etiam sub lingua, vt per anginas fieri consuevit. Quin etiam quosdam dicit se solum purgasse. Ipsa vero phrasis indicat, eom non ita multos purgasse solum per vomitum (nam neque id legitimum est per anginam fieri) sed quosdam, ob peculiares fortasse cõsiderationes. Hic autem decursus iam processerat vsque ad ætatem, fiebantque dictæ anginæ iam in ætate, quo tempore iam

A fiebant multa alia quæ eruperunt, idest multa alia mala externa, vt exanthemata, & vlcera. Inter quæ primum quidem in squaloribus populariter grassatæ sunt opthalmiæ dolore afficientes. Annumerantur enim tertiæ particula apborismorum opthalmiæ morbis æstius. Et tales quidem sunt sicce, & ex sicca & accipiente fluxione, quare, & dolent

B *Venarum sanguinem sistunt deliquium animi, figura aliorum tendens, venarum interceptio, linamenti contorsio, appositio, deligatio.*

Quibus rebus possit supprimi fluxus sanguinis ex naribus, docet breui hac oratione, p̄ma est *deliquium* .i. deliquium animi. Nam per animi deliquium colligitur affatus sanguis versus cor, atque ob id reuclitur intorsum à parte ex qua fluebat. Hec est causa, ob quam plurimis tales fluxus sponte cessant, quia scilicet superueniente deliquio animi tolluntur. Alia est *figura*, idest figura aliorum reodens, scilicet figuræ mutatio facit nonnunquam sola (semper autem iuuat) vt sanguis fluere cesser, velut si cui fluit ex naribus caput erigat, sitque ceruicæ recta. Alia est *interceptio*, idest contorsum linamentum, & inditum in partem ex qua fluit: alia est appositio, emplastrum scilicet, aut omnino medicamentum agglutinatorij, aut cucurbitulæ. Alia est deligatio, si pars est apta ligaturæ. Interiecti *deliquium* .i. alia interceptio quia præter dictas sunt alie causæ interceptioms. Nam & potu frigida, & eiusdem infusione, & vinculis extremarum partium, & reuclionis sanguinis missione (quæ vt antea enam diximus, nulla securior interceptio est) evenit fluxum sisti.

G *Lanularum tumores plurimi exoriebantur, quod icteraria vena affecta esset. Quod si ab arteria malignè affecta fierent, malum signum erat, quale quid Posidonius accidit.*

E Meminit Hippocrates auxiliorum quibus sanguinis fluxus sistitur, ob quandam tempestatē morbosam (non dicit quo loco, neque quo tempore) per quam ob sanguinis plurimam redundantiam, quibusdam fluebat sanguis multus adeo vt morerentur inaniti: aliis excrebatur per asperam arteriam: aliis fiebant adenum phlegmonosi tumores, qui vocantur *posidonii*: aliis alie affectiones, habentes tamen omnes communem causam, redundantiam sanguinis. Dicit ergo de ea tempestate agens, *deliquium* .i. animi, *deliquium*, hoc est quòd vena causa redundantia laboraret. Scilicet bubones plerumque sunt, quòd hepar, & quæ ab eo oriuntur vena multitudine laboret. Si verò sanguis ab arteria (aspera scilicet) malignè affecta, vlcerrata scilicet exiret, malum erat signum, vt accidit cuidam mulieri vocatæ Posidonie. Nimirum passioni hæmoptice ex tali causa orta succedere solet magna ex parte tabes.

Qui ex sanguinis fluxu moriebantur, ij tenui circa frontem sudore non perfundebantur, sed talia passi sunt qualia qui praesiccate contrahuntur:

Dictum est proxima sectione, quibus cutis intenditur arida & dura, sine sudore, quibus verò laxa est, cum sudore moriuntur: qui igitur à sanguinis fluxu siccati erant, merito moriebantur sine sudore, &c. &c. *De hypochondriacis* hoc est, sed talia perpeffi sunt, qualia ij quibus moles corporis ablumitur & exsiccat.

Et qui spirandi difficultate laborabant, & qui cum sudoribus deficiebant, male habebant.

Duo signa mortis sunt hæc, siue separatè intelligentur scripta esse, siue quoddam in aliqua tempestate acciderent, ut quædam esse, id est difficile respirantes ac anhelosos, & à sudoribus deficere, id est animo linqui. Hæ enim ambo per morbos acutos pessima sunt, significantque defectum facultatis, illud animalis (anhelosi enim dicuntur præcipue, qui respirant sublimè) hoc vitalis. Quid potest autem esse periculo sius, quàm per febrem continuam, qualis ab acuto morbo nunquam abest, non posse respirando recreari, aut cum multa evacuatione opus sit, non posse mediocrem sustinere?

Ventrius abundantia turbationem ferunt, quale quid Posidonius accidit, & quæ lumbricorum generationem promouent.

Quum est redundantia in ventre, aut cruditas multa, qualis quæ solet vermes gignere, purgatione est opus. Nihil enim magis celebratum apud Galenum, & medicos omnes, quàm ventrem evacuatione, quam ventris turbationem vocant, indigere. Modus autem mouendi sit, si in ventriculo sit vitium, vomitorio; si verò in intestinis, si quidem in crassis clysteribus; si in tenuibus, subduclorio medicamento. Redundantia quidem in aliquacunque ventris parte esse potest: vermes verò ascariides in podice semper: rotundi in gæcilibus plerumque, latiper omnia intestina generantur. Quare vomitu curari nunquam debent (nisi forte ob antecedentes cruditates) proascariidibus clysteres & giandes eant satis.

In extenuatione circumtentio ante mortem facta est, & umbilicus protensus extractus est ipsi, & gingiuarum dentes ambientium exulcerationes acciderunt.

Dictum est sectione tercia huius sexti libri, omnis extenuatio laxa cutem, deinde circumtentio. Idem est dicere, in extenuatione circumten-

Asio ante mortem facta est, cum scilicet prius laxata cutis sit, sit deinde eius circumtentio ante mortem, indicat verò ante mortem, quia vicinam iam mortem indicat circumtentio laxitati succedens. Narrat verò hoc, & duo alia sequentia signa, accidisse cuidam mulieri, tamen non nominet. Quam ob causam videntur hæc verba decisa esse ex aliqua narratione longiori, & perfectiori: quasi post alia quæ hic desunt dicat, in extenuatione accidit circumtentio ante mortem, & umbilicus qui prius laxa cute protensus est, postea, circumtentus, est retractus ipsi scilicet laboranti extenuatione, & facti sunt gingiuarum dentes ambientium exulcerationes: scilicet finduntur gingivæ præ siccate, ut & labia quibusdam, & partes alie. Itaque extenuatis sunt imprimis cutis laxitas, & umbilici protensio, proximis verò iam interitui sit circumtentio cutis, & umbilici retractio, & gingiuarum exulcerationes, ut cuidam mulieri accidisse Hipp. narrat.

Multa sunt quæ de quocunque rectè præcipi possunt, alia quidem eadem potentia, alia autem minimè. Qualia sunt eiusmodi, diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & ubi opus est timidos & lecto pel-
Clere, & mutatione excitare serpentes ad ea quæ ferius agunt.

Optimè quidem ac verissimè dicit hæc Hippocrat. & est nobis sæpe opus apud vulgares homines & indoctos hac defensione. Sæpe enim accersuntur, ad visendam eundem ægrotum, duo aut plures medici seorsum. Et perarum est in idem medicamentum indicare, sed diversa fieri iubere, vulgus verò hominum statim iudicat errasse alterum, quoddam non eandem rem dixerint: & ob hanc vulgi opinionem ambitiosi medici, nihil non mutant eorum quæ, qui prius accesserant ad ægrotos, fieri iusserant, alia quæ eiusdem sunt facultatis, aut fortasse etiam inferioris imperantes, id curantes solum, ne quid eorum, quæ ab aliis imperata sunt, videantur probare. Horum ambitionem detegit, & indoctæ vulgi opinioni occurrat, dicens non esse unicam rationem occurrendi cuiusque morbo, ac multo minùs vnicum medicamentum, sed multa de quocunque rectè præcipi posse. Alia quidem eadem potentia, alia autem minimè. Nimirum fieri potest, ut duo medici eandem propterea sequantur indicationem, & eadem intentione curent morbum eundem, utantur verò medicamentis diversis, sed eiusdem facultatis. Nimirum cuiuscunque facultatis sunt innumera medicamenta, & quousque vtiur suis. Fieri etiam potest, ut ad eundem morbum utantur duo medici auxiliis diversis neque eiusdem facultatis, quod non eadem intentione curatione suscipiant, neque tamen quispiam illorum erret. Nam fieri potest ut idem morbus diversis viis ac methodis cuteretur: si velit quispiam phlegmonem resolutione curare, atque alius maturatione. Vtrosis enim modo sæpe procedatur rectè.

E Quin etiam quæ resolutione aut maturatione curata bene sunt, aliquando si reperculsione, & inductione à principio ad finem essent curata, nihil

deterius cessissent, ac fortasse aliquando curare essent cum minori dispendio. Egrotum aliquando curauit medicus mullo sanguine, hunc ipsum fortasse curasset alius sine missione sanguinis, nibilo deterius. Verum hanc ob causam nihil periculosius excogitari potest, quam duos medicos accersere scortum, ut multi faciunt, quo utriusque deirent inuidiam. Nam sepe fit, ut cum eorum quisque eam recte curaret, ambobus scortum tentantibus auxilia diuersa, perdat egrotus. Quapropter consulo, ut in consultationem, vocentur ambo, ut in vnicuique conueniant curandi rationem aut eorum alteri tota curatio commendetur. Itaque dicit Hipp. multa sunt quæ de quocunque recte præcipi possunt, alia quidem eadem potentia, alia autem inioimè. Quælibet suorum eiusmodi, diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari. Hic scribit exempla habentium easdem facultates & diuersas: quasi diceret, ut si velis diffundere & resolvere, quod idem est, & alius utatur oleo citrino, alius laurino, alius recinino. Aut educere expurgando, & alius de capota vocata aggregaria, alius portionem ex infusione agarici & electario ex succo rosatum; aut indurare, & alius admoveat solanum, alius sedum, alius plantaginem: aut maturare, & alius admoveat puliculum ex hydrele o & farina triticea, alius ex vitellis eorum cum oleo & trixiga portione rebinthinæ: aut alius velit resolvere, alius marurare, alius aliquid aliud facere. Nam hoc quoque fieri potest, ut diximus, nullo eorum male suscipiente curationem. Consultis his dictis quiddam aliud, quod etiam videatur leve, nonnunquam est magis momenti, ne facultates torpeant, & egroti plurimum debilitentur. Nimirum morbi quidam sunt difficilius indicationis, quorum solutionem si expectes antequam egroti de lecto surgant, illi cerere languescunt, & facultates obliuiscuntur suorum munerum, & intereunt. Oportet sepe ita egrotantes cogere, ut lecto surgant etiam condum curati integre atque torporeos, ad ea que agunt serius, excitare, hoc est, cogere ut rebus agendis se inferant, etiam si pigri sint, & demissi, & id faciant tandem ac segriter, tunc enim ut paulatim eam pigritiam deponant, & facultates velut reuiuiscant, atque ita deinde morbos paulatim superent, qui alioqui à iacientibus, & otiosis, ac de sua tantum miseria cogitantibus nunquam superarentur. In longis autem locum habet hoc præceptum, aut decideoibus ex acutis.

Hydropsicos celeriter secare oportet: tabescentes vix se statim: secare caput, & humi modis.

Tres curationes recenset Hippocrat. ophiles, & magni momenti, quæ tamen raro admodum conferuntur, quod vix vnicquam agantur tempestiue. Hæ sunt, hydropicorum sectio, tabidorum vntio, & capitis vulnerati apertio. Ut harrat Cælius Aurelianus libro 3, tardarum possionum, de hydropicorum sectione, quam paracentesim vocabant, magna fuit inter veteres contentio, Euenore, Erasistrato, & Theffalo virperantibus; Alclepiade, Themisone, & Sorano laudantibus id genus cu-

A rationis. Cur autem vituperarent, dicit plurimas fuisse causas, præcipuas verò, quod peritoozum nervosum cum sic, non possit sustinere sine periculo punctiorem aut sectionem; deinde quod non facile perficiatur nisi secto aliquo intestino: deinde quod non videatur aquæeductio tollere effectiorem, sed symptomata, cum non tollat hepatis intemperiem, sed aquæ redundaotiam; postremo quod periculum maximum sit, ne cum effusa rosa aqua effuso etiam spiritu homo moriatur. Has ob causas affirmabant illi, neminem hydropicorum sectione esse seruatum. Nihilominus testatur Aurelianus, se vidisse quosdam, qui sectione enaserant, atque ob id probat eam curationem, quæ etiam Hipp. vsum esse constat, cum eius crebra in illius scriptis mentio fiat. Quod autem plurimum moriantur, dicit Aurelianus causam non esse quicquam eorum quæ alij obiciunt, sed quod ea curatio serius semper tentetur, & cum iam morbus est diurnitate factus incurabilis, id quod dicit his verbis. Plurimi verò moriuntur, siquidem medendum tardare consilio serius paracentesis adhibetur. Quibus a perrè significat, si tempestiue fieret sectio, antequam plurimum aquæ collectum, & hepar plurimum intemperatum esset, nullum periculum eorum quæ alij timebant, accessurum. Nam aqua tunc non efflueret affasim plura, & homo potius esset admodum debilis, ut sustinere non posset, neque hepar adeo intemperatum, ut non posset resistere semota aqua, quæ etsi intemperato successit hepati, eius tamen intemperiem seruaret, & augeret. Itaque sectio si incipiente hydropice fieret, multos liberare fortasse posset: quoniam verò adhibetur sero, igitur nullum. Hoc idem de tabescentium vntione dicere par est, siquidem tabidum ex suppuratis, suppuratorum verò & hydropicorum idem periculum esse dixit Hippocrates his verbis. Quicumque suppurati aut hydropici secantur aut vntuntur, si purè aut aqua acerrimam effluere, omnino moriuntur. Hippocrates vntio hic ipso opere iam indicauimus, & ex aliis multis eius viri constat, inuentione plurimum utebatur, & in suppuratis ac tabescentibus semper, mox ac suppuratiore non incipiebant esse conspiciere, atque ob id plurimos magnifice iuuabat, hoc verò tempore merito sectionis & vntionis in hydropicis & tabescentibus vntio dimissus est, quia vel ob egrotantium mollietatem vel quod non valeamus auctoritate apud eos, ut veteres illi medici, nunquam horum qui piam lubenti obtinebantur, donec morbus omnino viciat: tunc postulant nonnulli id sibi fieri velut in re desperatâ, quo tempore nihil aliud fit, quam quod quæ tempestiue suscepta contulissent, susceperit infamemur auxilia. Simile quiddam evenire scimus in sectione capitis. Nimirum ut Hippocrates docet libro de vulneribus capitis, multa eorum vulnerum secari postulant, vel quod viciis satis dilatatum non sit, vel ut cognoscatur an os laesum sit, vel ut pateat melius curationis, cum tamen hæc quoque vulgaribus videatur dura curatio esse, plerumque recusor id sustinere, dōbēt lethalius iam signis restitueretur, rursusque magna ex parte nihilominus moriuntur, & vulgus quidem hominum non intelligens factum id esse, quod serius sectum sit, videtque paulo post sectionem egrotos mori, potius letius esse sectio-

741
ne, & in posternam sectionem magis reformidant. Quapropter satius est, medicos, nisi tempestivè voluerint agrosi parere, intempestivè nihil facere. Non enim solum in his quod dixi, sed in aliis quibusvis curacionibus. Euenit verò sepius in tribus dictis, quas ob id mihi videtur Hippocrates rectè notasse, atque consuluissè hydropicos celeriter secare, mox atque hydropici esse incipiunt, tabescentes statim atque sunt supputati, & tabescendi periculum minantur, vterque & caput vulnerarum secare tempestivè; alioqui neque secare, neque vtere, neque vlcus aperire, sed prædicere, ac finire moti.

Hidropicorum omentum non oportet ferro tangere, neque interiora; simile enim ac in multis generibus accidit.

Inter multas partes significare solet, hoc loco nihil aliud videtur mihi significare posse, quam omentum. Si enim significaret hypomphalon, hoc est, partem imam ventris, haud diceret hanc tangi non debere, siquidem Paulus libro 6. quatuor digitos infra umbilicum secare iubet: sed neque abdomen videtur posse significare, nisi enim feces peritoneum, nihil exibat aqua. Peritoneum autem non potes secare, nisi feces prius abdomen intra quod est situm. Quod autem Hippocrates dicit, nihil est aliud, quam sectionem committi debere chirurgi petito, qui sciat secare abdomen & peritoneum, nec tangat omentum, aut aliquid interiorum, vesicam dico, vterum, aut intestinum. Est enim periculum in ventris sectione, ne lædatur aliqua subiectarum partium, ut etiam in aliis partibus, velut etiam in multis tumoribus genuum. Nimirum in eius quoque partis collectionibus quæ apertionem postulant, aut vlcibus quæ requirunt contra apertionem quam vocant, canere plurimum oportet, ne tendones, aut nervi aliqui crurum, aut vasa quæ prætereunt, lædantur. Comparat itaque sectionem ventris in hydropicis, cum sectione genu, non alia in re, quam quod habeant simile periculum. In sectione ventris illud nosse oportet, non debere sectionem abdominis esse & regionem sectionis peritonæi, sed inferiorem, ut fistulam coruam, per sectionem abdominis immisam in sectionem peritonæi, educi possit quod oporteat atque deposita verò fistula, sectio peritonæi à parte sana abdominis obtineatur. Ita enim cauetur periculum copiosæ, & assatim factæ effusionis.

Videndum qualis sit vox iratus, nam si talis non irato, secundum naturam est: & quales sint oculi, nam natura turbulenti, qui tales sunt quales habent qui irascuntur, non tamen iræ percipiunt: & alia pro ratione morborum, ut si quis morbus tabidam speciem indicat, videndum an ager talis sit a natura, ut in talem morbum incidat, & cætera eodem modo.

A Hæc oratio partim pertinet ad physionomiam, partim ad prognosticam medicinæ partem: prima eius pars ad illam, secunda ad hanc. Actum vero est antea in hoc ipso opere de physionomia, dictumque est, vtili esse ad medicinales considerationes, quia docet agnoscere, quæ hominibus insunt secundum naturam: quorum cognitio necessaria est ad cognitionem eorum quæ præter naturam: quia hæc collatione illorum cognoscuntur, quàm sint graua, aut secus: iuxta id quod initio libelli de officina medici dicit, considerandum similia sint an dissimilia, & rursum initio sectionis tertii libri primi, dixit, morbos diagnosticemus ex communi natura, & ex cuiusque propria: & in initio prognostici, an similia sint benevalentium, potissimum sui. Itaque si vis accipere argumentum aliquid à voce, oportet scias quali voce sit homo. Si ab oculis, qualibus oculis, nam si talis esse videatur, qualis est natura, aut non valde dissimilis, haud est graue malum: si verò plurimum dissidet, graue est. Reddeamus ergo ad priora. Vnum quoddam argumentorum quibus physionomi vtuntur, vt licet videre apud Aristotelem libello de physionomia, est à specie moris animi ad affectum. Hoc modo, si quis non iratus habeat naturaliter vocem similem ei quæ est in iratis, is iracundus est: ita etiam si oculos naturæ turbulentos, & quales habent qui irati sunt, habeant quidam etiam iræ non percipiunt, illi sunt iracundi. Si ergo per morbum aliquis habeat vocem talem, & tales oculos, nosse oportet an tales habeat bono naturæ, si enim habet nihil significatur mali, sed solum agnosces per physionomicam rationem cum esse iracundum; si verò non habet id secundum naturam, neque modo ex occasione aliqua est iratus (oportet enim semper excipere occasiones) agnosces per rationem medicam, eum tutiori esse proximum. Alia etiam multa sunt huiusmodi secundum rationem morborum, hoc est, in morbis considerata, an secundum rationem morborum fiant, an verò secundum naturam agrotantium. Ut tabidus morbus speciem quandam & formam vultus facit, nimirum acutum nasum, caecos oculos, & cana tempora; si tamen talis vultus homini insit naturæ, in talem euadit morbus, id est, facile in morbum talem incidit, neque ob id graue malum est. Nimirum ut morbi naturæ similes facili sunt, & minus sunt periculosi, ita etiam & morbi illi, quos naturalis hominis species repræsentat. Nam ut species significat mores, ita & reliquam naturam, quare & in tales aut tales morbos propensionem: ob id addit, & cætera eodem modo.

B
C
D
E
F

Tves laboriosa incumbunt in partes lasas, sed maxime in articulos, quinetiam in inducentibus. Lassitudinem febribus susses sicca sunt. Susses sicca firmanantur in articulos cum febre, fibre, si intus relinquuntur.

Utrumque dicuntur, quæ comitantur febres laboriosas. Laboriosæ verò febres sunt: quas comitantur lassitudines spontaneæ. Quas à multitudine succorum pendere, haud dubie indicat lassitudo. Hinc fit, ut abscessus in articulos plerumque

faciant, vt in aphorismo 31. & 74. sectionis quartæ dicitur, nisi fluxus sanguinis copiosus anticipet: eandem quoque ob causam comitatur has febres tussicula sicca, quia omnis multitudo fluxiones commouet. Iidem igitur abscessus expectari debent ex tussibus laboriosis, qui ex laboriosis febribus, siquidem in laboriosis febribus tussis tales sunt. Tussis igitur sicca cum febre firmantur in articulos, vt scilicet ipsæ febres, si intus relinquantur (causa scilicet morbi) hoc est, nisi enacuario insignis, & accommodata anticipet, vt fluxus sanguinis ex naribus, aut multa vrina. Cum itaque dicit tussis sicca, cum febre, intelligere debes iuxta sermonis consequentem, cum febre laboriosa. Nam tussis sicca febrium ardentium, quas in aphorismo 54. eiusdem sectionis dicit sitim tollere, nisi etiam sint laboriosæ (plurimæ autem ardentium laboriosæ non sunt) non minantur dictos abscessus. Cum itaque prius dixit, tussis laboriosæ incumbunt in partes læsas; & postea, tussis sicca cum febre firmantur in articulos, eadem tussis intelliguntur, quæ sunt in febribus laboriosis. Neque enim intelliguntur, quæ in aliis febribus, vt dixi, neque etiam quæ sine omni febre. Nam vt sectione prima libri secundi dixit Hippocrat. tussis diuturnæ (nam ex non diuturnis, & sine febribus nihil timeas) quæ sine febre sunt, finiri solent in tumores testiculorum, & amari abscessus in partes bumiles, contra ac tussis febrium laboriosarum, quæ finiri solent in abscessus circa maxillas. Rectè autem hic dicitur, incumbunt in partes læsas, sed maxime in articulos, et si in aphorismo tantum dicatur circa articulos. Nam in eo aphorismo dicitur, id quod maxime solet fieri: hic verò adiicitur, & quod alias etiam fit. Nimirum vt alio aphorismo dicitur, si quæ pars per morbum dolet, in eam sunt abscessus. Quia si quæ pars est parata recipere, in eam potius abscessus est expectandus, quam in vllam aliam; parata autem est, & quæ dolet, & quæ aliter vtrunque læsa est, vt si quam habet homo partem insigniter debilem, vt si sit mancus aut claudus, aut ex labore defatigatam, velut nuper dicebatur in hac ipsa sectione, Qui igitur aut vocibus amplius sese fatigant, aut rigerunt, in anginas his morbus magis terminabatur; qui autem manibus laborauerunt, solis manibus sunt facti paraptetici; qui verò equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut aliter citius fuerunt fatigati, his tumorum, aut crurum impotentia ex resolutione contingebant.

Spirationes obscuræ in tabidis, & non patientibus mala sunt: & quæcunque alia huiusmodi ab eadem constitutione procedunt.

Talæ spiratio vocatur respiratio obscura, & apnæ proxime. Talis respiratio in tabidis significat extremam facultatis debilitatem, & proximam mortem: in non patientibus, vt mulieribus semine abundantibus, abstinentibus verò à congressu, vt sacris, aut viduis; significat præfocationem ex vtero periculofam, quæ aliquando finitur in mortem repentinam, cum symptomatis similibus his quæ ex veneno. Quoniam verò non solum

A respiratio obscura, sed innumera alia mala sequi consueverunt, tam à tabe quam ab vterino morbo, addit, & quæcunque alia huiusmodi ab eadem constitutione procedunt.

Tabescentibus autumnus malus: malum autem & ver, cum sunt ficus folia pedibus cornicis similia.

B Autumnus malus est tabescentibus ob intemperiem siccam, & caloris ac frigoris diuersitatem magnam, & facultatum omnium languorem. Est autem malus, & quod eo tempore plurimi tabescant, ex morbis æstiuæbus male conualescentes, & quodij qui superiori tempore tabuerant, eo tempore soleant mori, vt dicitur secundo libro propter rhetoricorum. Ver non ita videtur esse posse malum, siquidem est saluberrimum, ac minime lethale, vt sectione prima libri secundi dictum est: est tamen etiam quoddammodo malum tabescentibus, non tam quod eo tempore moriantur, quam quod tabescendi initium multi eo tempore accipiant, ob hæmoptoicam passionem, quæ Veri est familiaris, & ob distillationes, quas pariunt humorum redundantia, & multi venti. In Vere solere ficus proferre folia similia pedibus cornicis constat, atque ea verba nihil continere aliud quam veris desceptionem.

D *In Perintho vere plurimi tabe laborauerunt. Simul in causa fuit tussis per hyemem populariter grassata, & quæcunque in alijs diuturna fuerunt, etenim in ijs qui ambigunt se habebant tabem confirmarunt. In quibusdam autem morbis diuturnis tabes non accidebat; velut in habentibus dolores renum, quinetiam in quibusdam alijs, qualis fuit homo ille, ad quem Cyniscus me induxit.*

E Hæc oratio ex proxima pender, continetque exemplum quoddam eius quod vniuersim dictum est, puti ver esse malum tabescentibus. Dixit igitur in Perintho vere plurimos factos esse tabidos, causam verò simul fuisse tussim, quæ hyeme per populum grassata est, & quæcunque alijs diuturna fuerant defuisse in tabem, & non in debilitatem, id est, ambignis confirmatam esse, hoc est, in illis, in quibus ambigebatur an tabescerent, confirmatam esse suspicionem, factis aperte tabidis. In quibusdam verò morbis chronicis nō ita accidisse, neque factam esse tabem, velut in dolores renum habentibus, & in quibusdam alijs, qualis fuit homo quidam ad quem Cyniscus eum induxerat: qui scilicet cum diuturno morbo teneretur, non est factus tabidus. *Xpēras* vocat modo quæcunque solent homines diu pati, velut asthma, & hæmoptoicam passionem, & cephalicam, & renum dolores antiquos, & alia huiusmodi, quibus valetudinarij homines folent continenter aut crebro molestari. Dicit itaque hyemem fuisse tussiculosam, & sequenti vere multos eorum qui tussi diuturnā labo-

rauerant, & qui alioqui erant morboſi, & macilenti, de quibus dubitabatur an tabeſcerent, faſtos eſſe tabidos. Eaſſiſſe verò tabem, eos qui dolore renum diuturno vexabantur, & paucos quoddam aliorum. Nimirum ſæpe qui renum malo diuturno, aut coxæ, aut podagra, aut hæmorrhoidibus, aut alio quopiam tali tenentur, ob hæc ab acutis morbis, & aliis periculis liberantur, verùm quoniam non narrat qualis fuerit eius anni tempus, haud poteſt magna hinc vtilitas accedere.

IN doloribus laterum, & peſtoris, diarumque partium, tempora an multum differant conſiderandum, quum aut melius aut ruſus deterius ſe habuerint, in alijs non delinquentes.

Pertinet hæc oratio ad aphoriſmum illum ſecundæ ſectionis, quo dicitur, iſs quæ non ſecundum rationem leuant, non oportet fidere, neque admodum timere: ea quæ præta ſiunt præter rationem, plurima enim talium inconstantia ſunt, & non valde permanere, neque morari ſolent. Vnum quiddam eorum, quæ maximè indicare poſſunt, bona aut mala præter rationem eſſe, eſt iſta mutatio temporum morbi, quæ plurimum diſſideant, & pluſquàm ratio poſtulet. Nam ſi ij qui dolore lateris, aut peſtoris, aut alterius partis, aut deoique alio morbo (nam eadem eſt omnium ratio) plurimum vexabantur, repente ſequenti die aut horà videntur ſubleuari, ita vt illæ morbi partes multum differant, pluſque quàm ratio ferat ſendum non eſt, quia cum melius habuerint, ſtatim deterius habebunt, vix quædam res, id eſt, eſt nulum erratum committant iſo viſta. Hanc eandem ſententiam continet aphoriſmus 3 ſectionis ſextæ, eſt paucioribus verbis, in cuius commentatione hæc quoque enarrata eſt à me, eſt non omnino eodem modo. Neque mireris, multos enim, eoſque veros, ac conſonos ſenſus ferunt grauiſſimæ Hippoc. ſententiæ.

SECTIO OCTAVA.

IN longis dyſenterijs cibi faſtidium malum: tum alijs, & præcipue ſi febris ſuperuenerit.

Hic quoque eſt aphoriſmus tertius ſectionis ſextæ, verbis quàm minimum mutatis. Solùm enim quod hic dicitur, tum alijs, & præcipue ſi febris ſuperuenerit, illic explicatur magis, diciturque, ſi autem cum febre deterius. Explicatum verò à me eſt in commentario intelligi, non quidem iſtum faſtidium cum febre eſſe deterius quàm ſine febre, ſed faſtidium & febre grauius malum eſſe quàm faſtidium ſolum. Sed hoc loco dubitari poteſt quomodo faſtidium à longa dyſenteria malum, ſi vt dicitur primo de morbis, & aphoriſmo 15. eiſdem ſectionis, à longa diarria vomitum fieri bonum eſt: Videtur enim diarria cum dyſenteria, & vomitus cum faſtidio habere analogiam: Certe & diarria à dyſenteria, & vomitus à faſtidio diſſi-

Adet multum. Nam per dyſenteriam, præter fluxionem eſt iam in iocetiſtis exolceratio, & faſtidium vacuatio noceſt. vt vomitus, ſed accidens quoddam corrupta iam facultate ſuperueniens, vel alteratio ventriculo communicata. Vomitus verò à diarria reuulſio naturalis.

VLCERA circumglabra maligna.

BHic aphoriſmus quartus ſectionis ſextæ, eodem ibi ordine poſt proximam orationem, quo hic ſcriptus, & à me enarratus.

LYmbos dolenti recurſus in latera, & tubercula quæ ei vocantur, malum portendant.

C24 tabifici cuiusdam ſerpentis nomen eſt, datur verò etiam id nomen tuberculis cum putridis & ſaciſſis vlceribus abortis. Duo itaque dicit, quæ lumborum dolori (intellige diuturno & magno) ſuccedere ſolent, recurſus in latera, & tubercula ſanoſa. Reſtè verò dicit recurſum in latera, ſit enim materia ſurſum recurrente, contra ac per bonos abſceſſus fieri ſolet. Laudauerat enim libro ſecundo ſect. 1. abſceſſus infra morbos, velut varices, & lumborum grauitates ex ſupernis. Ergo ex lateris dolore lumborum dolor, & ex hoc varices, aut tale aliquid in cruribus vtiliter fietet, ex lumborum autem dolore dolor lateris perpetuū ſit, & contra ac expedir. Finor tamen etiam abſceſſus prauus, eiſdem vis quibus boni, ex contrariis in contraria. Velut quia ſurditas alui proſunio ſoluitur, ab alui ſuppreſſione ſurditas debet timeri, vt dicitur 28. aphoriſmo quartæ ſectionis. Ita quia lateris dolor vlciter ſolet in dolorem lumborum deſinere, à lumborum dolore timeri debet dolor lateris. Tubercula ſanoſa non tam videntur fieri ob loci patientis naturam, quàm ob naturam materiæ, quæ ſcilicet eſt cruor aliquis atrabiliarius, & ſanoſus. Verùm quia in bumiles partes corporis ſanguinis feces ſolent reſidere, ſit ſæpe, vt graues lumborum dolores ex tali quapiam materia ſiant, quali hæmorrhoides, & vatices, & tubercula quædam crurum cancroſa, quæ nonnunquam vlcérantur, atque ita non raro ex graui dolore lumborum, diſectorum aliquid ſit, in quibus ſunt tubercula illa ſanoſa. Ita Hippocr. narrat duos abſceſſus, alterum inuilem ob contrarium motum ei quæ abſceſſus amant, alterum ob materiæ malignitatem laborioſum, eſt locus non ſit incommodus. Nam tamen ſi Hippocr. locum tuberculorum nullum nominet, ego ea quæ in iſtis operibus fieri ſolent animaduertens, intelligo eum de tuberculis talibus in cruribus abortis loqui.

REnum morbos non vidi curatos ultra quinquageſimum annum.

Hæc ſententia pertinet ad aphoriſmum ſextum ſectionis ſextæ, quo ita habetur. Vicia renum, & omnes

omnes circa vesicam dolores, difficulter sanantur in seniotibus: hoc idem nunc docetur: præterquam quod dolorum vesicæ non meminit, ut illic, sed morborum renum solum. Dictum verò à me sæpe iam est à principio, longè aliam rationem scribendi tenuisse Hippocrati in hoc opere, atque in aphorismis. Hoc enim composuit scribens observationes, & experientia; librum verò aphorismorum scribens generatim præceptiones, quas ex observationibus multis dabatur colligere: quoniam ergo dum captaret experientia, nullum renum morbum vidit curatum ultra quinquagesimum annum, assertionem illam aphoristicam collegit, vitia renum senibus difficulter curari. Constat verò hoc de diuturnis renum vitiis intelligi, velut imprimis de lithiasi, atque de perfecta curatione, ita ut malum nunquam amplius reuerteretur. Nam ex renum dolore subleuari in sævis multis dies, cunctis sæpe senibus, reiecto lapide: non ita tamen, ut non maneat in renibus ad similem morbum apparatus. Intelligi etiam velim citra permutationem. Nam succedente stranguriâ, aut podagrâ solui solet morbus renum, etiam senibus. Atque Hippocrates arbitror, id vidit, neque enim est aded rarum.

Observanda sunt qua per somnos exacerbantur, & quibus extrema refrigerantur, & mens perturbatur, & alia quæcumque circa somnum accidunt, & quibus contraria.

Nihil aliud continent verba hæc, quàm quod aphorismo 1. sectionis 2. dictum est, In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si autem somnus iuuerit, non mortale, qui à me suo loco enarratus est, ita ut ad præsentis orationis enarrationem nihil desideretur.

Quibus autem nihil mali intra constitutum tempus accidit, singula partus vitales edunt. Apparentia quibus mensibus accidunt videndum est. Labores certis circuitibus sunt, & quisquid septuagesimo die mouetur, in triplici temporis intervallo perficitur, & quisquid nonagesimo die mouetur, in triplici temporis intervallo perficitur. Observandum etiam quod post menstrua aliquando dextra, aliquando sinistra hiant, & quiddam humiditas qua per exuentia significatur, vieturatione sicca opus habet. Quod autem citius formatur & mouetur, rursus augeatur tardius. Labores ut plurimum contingunt tertio, quinto, septimo, nono mense, item secundo, quarto, sexto, qua ex parua tabula consideranda sunt.

Hæc omnia occurrerunt iam antea, non longè à fine sectionis tertii libri secundi, in multis orationes secta, nonnihil diuersè scripta, quanquam quicumque vtrumque locum leger, intelliget luce clariùs, autorem idem procius voluisse scribere hic & illic, quinetiam fortasse altero tantum loco esse

A hæc ab illo scripta (quorum enim eadem verba repeterentur) sed ab aliquo malè compilante Hippoc. chartas esse geminatas. Neque mirum corrupta esse hæc, & multis modis permixta, ut & alia quamplurima huius auctoris, in tanta verustate. In cæteris quidem quàm minimùm dissident duo hæc loca: plurimum autem in vltimis his verbis, labores ut plurimum contingunt tertio, quinto, septimo, nono mense, secundo, quarto, sexto. Nam illic illud *et ad octava xxi* coniungebatur cum prioribus; postea verò legebatur, labores contingunt citra tertium diem supra quinquaginta, & citra sextum supra centum: si per menses numeres, secundo & quarto mense, quæ nosse oportet ad septimestrem partum. Quoniam verò eam lectionem probavi, neque, quam eò loco scripti, horum verborum enarratio displicet, non est, quod nunc dicam aliud, quàm censere, ut hic locus secundum illam testificatur, puteturque pertinere ac si hic nihil esset scriptum.

Victus ratio constat repletionem & inanitionem ciborum, & potuum. Horum mutationes sunt consideranda, prout se habeant; quum ex alijs in alia sunt.

De ratione victus scripta sunt ab Hippo. multa, cum in operibus non paucis ei solum tractationi destinatis, tum etiam ipsarum in alijs omnibus, atque aded gloriatur se hac medicinae parte priorum medicos superasse, quod illi de victu egrotantium perperam tractaverint, de victu sanorum omnino non egerint. Plurimi itaque faciunt rationem victus, neque immerito, magni enim est momenti, & in curandis morbis, & in tuenda valetudine. Dicitur nomen *diætae* de moderato usu omnium rerum non naturalium, peculiariter verò cibi & potus. Ob id de his agit hæc oratione, alijs quæ iam sequentur ager de alijs rebus externis, quas oportet medicum moderari: agit verò de eis omnibus aded breviter, ut duorum alterum videatur, aut scripsisse hæc sibi soli memoriz gratiâ, dilatanda alibi, & ut hinc acciperet materiam alijs libris componendis: aut facere velut epilogum multorum, quæ alibi dicta sunt. *Diæta* itaque constat peculiariter ijs quæ ore accipiuntur, quorum duo sunt genera, cibus, & potus, quæ alibi vocat alimentum humidum, & alimentum siccum. Est autem potus, seu alimentum humidum duplex, quoddam enim est porcio nutriendi, quoddam tantum potus: unde oriuntur res differentiz, de quibus exactè distinxit lib. de ratione victus in acutis, cibus, sorbitio, & potus. Victus qui his constat, primas differentias accipit ex quantitate ingestorum, ex repletionem inquam, aut inanitionem, hoc est, adiectionem, aut detractiōem: vnde fit victus crassus, aut tenuis, aut moderatus. Horum mutationes dicit considerari debere, prout se habeant, quum ex alijs in alia sunt, hoc est, qui & quando debeant potu pro cibo uti, aut contra à potione ad sorbitionem, aut ab hac ad cibos crassos transferri, & omnino à victu crasso in tennem, aut à tenui in crassum, & quomodo id agendum, an procedendum

detrahendo, an adijciendo. Hanc spectant omnia, quæ in libris de ratione victus disputata sunt adversus medicos Gnidios, & quæ prima particula aphorismorum, & alibi, quæ omnia nunc reperere esset longum, neque admodum utile, cum sint suis locis satis explicata.

O *Odorem oblectantium, molestiam inferentium, implentium, & placantium mutationes observanda sunt, ex quibus contingant, & quomodo se habeant.*

Odores etiam ponit Hippocrates in victus materia libello de alimento, ut & in aphorismo, & alibi dicens. Quicumque veloci appositione indigent ipsi humidum ad reficiendas vires optimum est. Quicumque verò adhuc velociori indigent, per vlsatum. Eorum nunc refert differentias, & præcipit considerare, ut fieri debeant mutationes. Odorum paucas differentias agnoscunt homines, ut Aristot. dicit, atque ob id de bono aut malo, seu grato & ingrato odore solum loquuntur. Boni odores sunt duplices quidam incunditatem solum præ se ferunt, sine vlla alimenti qualitate, aut saporis significatione, ut odor musci, galliæ, & ambriæ (his odoribus solos homines delectari putat Aristoteles, hand scio an id possit iudicare) quidam alij sunt propriè odores ciborum, ut carniū, & recentis panis. Primos odores vocat Aristoteles delectatores, secundos replentes. Quia primi delectant magis quam nutriunt, secundi nutriunt potius. Hinc fit, ut primi odores sint iucundi satietis, secundi nonnisi famelicis. Horum utriusque sunt placentes, hoc est, sedantes anxietates, & multas animi inquietudines. Multæ enim nascuntur ex debilitate, aut ex qualitate aliqua maligna interiūs genitarum fuliginum, quas odores aut nutrientes, aut iucundi placent. Alij verò sunt odores ingrati, aut molestiam inferentes. Quorum etiam video esse duplex genus, quidam enim sunt fætores putridi, quales stercoris, aut saniei, & tales semper nascuntur à putredine: alij odores molesti, qui circa omnem putrefactionem rebus quibusdam naturales sunt, ut galbano & bitumini. In his quoque iubet considerare mutationes, quomodo fieri debeant, sæpe enim expedit voluptatis gratiā uti delectantibus, ac nonnunquam gratia refectiois pro eis uti replentibus, quænam pro placentibus oportet aliquando uti molestiam inferentibus. Velut si cernens mulierem animo linguæ admoneas illius naribus odores delectantes, aut replentes, videbisque illam ob id magis suffocari, intelliges morbum esse veri suffocationem, & commutabis cum inferentibus molestiam. Quia odores grati sunt placentes, placatis autem cerebro & reliqua respiratioe, suffocatur multo magis mulier: contra inferentes molestiam irritant, & excitant cerebrum, & respirationem augent, & excuti faciunt morbi causam citius. Igitur oportet scias odorum species commutare, & qualibus uti debes in quacunque occasione.

A

I *rruentes, ingredientes, & egredientes spiritus, aut etiam corpora considerare oportet.*

Externa etiam spectant ad victum, ut dixi, ob id post ea quæ intra corpus assumuntur, externorum quæ contactu lædunt aut profunt mentionem facit. E' *entia* vocat ventos, illi enim irruunt in nos: aer verò quietus nos circumstat. Ingressus & egressus horum iubet curam gerere. Non certe exigua pars medici muocis est, curare ut ingressum & egressum habeat aer, quantum, quando, & qua parte oportet, in domum quam inhabitare soles, aut in qua decumbas ægrotus: idque iuxta naturam morbi, & qualitatem venti considerandum. Nam ad pleuriticum non admittes Boream, neque ad pestilentem febre occupatum, Austrum. Porro cui sudores cientes, aut copiosam evacuationem insensibilem volēs, concludēs cubiculum; cui volēs attemperatiorē moliri, aperies ut pateat vento introitus & exitus. Neque solum ventos considerare iubet, sed etiam corpora, hoc est, res alias omnes quæcumque corpus possunt tangere, denique res omnes exteriūs accedentes. Vocat verò corpora ad differentiam ventorum, quasi venti corpora non sint, iuxta eam phrasim, qua Aristoteles in physica doctrina dicit aërem esse incorporeum, quia tenuis est.

D

S *ermones sint meliores: quidam autem tristitiam afferunt.*

Curare debere medicum, ut apud ægrotum habeantur semper sermones meliores, & non qui coarctent dictum est antea sectione secunda huius sexti libri his verbis. Ut omnia circa ægrotantem sedulo administrantur, quedam de morbo sunt interroganda, videndum qualia sint quæ narrat, ut accipiendi sermones, quæna pertineant ad ægrotantem, quæ ad alios, & ad externa.

E

I *n lingua etiam ex quibus quamvis alliciat, ut, videndum.*

Lingua, ut dictum est sectione quinta, significat humores noxios ut lotium. Ex pallore quidam virescens est à bile, rubra à sanguine, nigra à melancholia: causa est ut in commentario eius loci explicuimus, quòd lingua alliciat ad sese seu excipiat ab interno corpore fulgines succorum qui redundant. Itaque à quacunque excremento alliciat fulgines illud referentes. Si igitur velis significationes accipere à lingua, scire debes quamvis ex quibus alliciat. Nimirum alliciat ex biliosis flava, aut chlora, ex sanguine rubra, ex pituita alba, ex melancholia nigra.

F

A

Videndum etiam quanta sit aeris caliditas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, an repleat plus aut minus, in quibus quanam fiant mutationes, ex quibus, & quomodo se habeant.

Per ista nunc intelligit aerem qui nos circumstat, à quo magis ac facilius quam ab vlla aliare nostra corpora alterantur, quia & vndique nos continet, & intrà in ipsum cor continenter assumitur. Ob id maximè sunt observandæ aeris mutationes, procurandæque viles & cauendæ noxiæ. Nam, vt antea diximus, morbos longos, & quos nulla alia causa curare potest, aeris sola mutatio sanare solet. Repentinæ autem temporum mutationes (mutatur vetò aer secundum anni tempora, & regiones) maximè pariunt morbos; vt dicitur in aphorismo, & per aeris infectionem transmittuntur omnes contagiones. Considerandum ergo ab aeris differtentis mutationes, quarum, ex quibus, & quomodo se habeant, id est, quanam mutationes sint bonæ, & quanam malæ. Id verò scire nequit, nisi qui sciat prius, quæ sint aeris qualitates, à quibus differentias potest accipere. Eæ sunt caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas, crassities, & tenuitas, & replens plus, aut minus. Esse temperatam temperatam, & regionem regione calidior, aut frigidior, & humidior, aut siccior, res est notissima, sed & calidior aut tenuior aere frui dicitur alia quam alia regio, & minus aut plus replens, replens inquam capita eorum, qui in eo aere versantur. Quanquam hæ differentie videntur esse illis posteriores, & ab eis nasci. Tenuis enim aer est, qui siccus & purus, velut qui in locis sublimibus, & quæ borea perficiuntur: crassus, qui humidus & impurus, vt qui in locis humilibus, & iuxta aquarum stagna. Et qui aer boreæ qualitates imitatur, frigidus, & siccus, & tenuis, & purus, hic minimè replet capita, sed pura reddit, & sensus acutiores, & ingeniosiores facit homines: qui contra est calidus, humidus, crassus, & impurus, hic replet capita, & sensuum pariter hebetudinem, & homines ad disciplinas ineptos reddit.

Continentia, contenta, impetum facientia corpora sunt consideranda.

Hæ sunt tres substantiæ, quæ naturaliter in nostris corporibus sunt, Continentia sunt ipsæ partes: contenta, facci, seu humores: impetum facientia, spiritus. Qui duplices sunt, alij vitales, qui in cordis sinistro ventriculo gignuntur, & in omnes partes impetu feruntur per arterias, & facultatis vitalis sunt instrumentum: alij animales, qui gignuntur in cerebri ventriculis, & in nervos irruunt, quosdam eorum rotos penetrantes, alios quodamtenus, & facultatis animalis sunt instrumentum. Horum demonstrationes in libris physiologicis pluries scriptæ sunt à me, & multo antea à Galeno.

Sermonis & silentij habenda est etiam ratio. Dicere oportet quæ velis agere, quibus sermonibus utatur videndum, sine magni sint sine multi, sine veri sine consilii.

Iubet Hippocrates medicum loqui, & tacere ad gratiam egrotantis, & dicere quæ ille vult, & eis verbis quibus ille dici velit, siue opus sit magna, siue summissa voce uti, siue multis dicere, siue narrare vera, siue aliquid fingere. Quid ergo? Num hæc scurrilitas est? Non certe. Non enim in assentionem, sed in veritatem debent hæc tendere. Neque enim dicendum est, quod egrotato oblit, etsi placeat, sed quod ita placeat, vt etiam profit, aut non oblit. Pertinet hæc sententia ad illam sectionis quartæ, quæ dicebatur, in his gratificandum est egrotis, qualia sunt introitus, sermones: & ad illam quam nuper citauimus ex secunda sectione, quæ dicitur, vt omnia circa egrotantem secundum administrantur, quædem de morbo sunt interroganda, videndum gratia sunt quæ narrat, vt accipiendi sermones.

Scire oportet unde prodentia initium ceperint, & vbi cessauerint, & quantum diuulsa sint, & colores ex quibus aut calor, aut fassedo, aut dulcedo, aut tenuitas, aut crassities significatur, nam equaliter vel inæqualiter corpori & quo tempore adueniant. Quales mutationes ex quibus fiant considerandæ.

Quæ oportet considerare in euacuationibus quibuscunque hæc oratione complexus est, imprimis vnde ceperint, & vbi cessauerint, hoc est, quantum prodentia sint. Illud enim maximè exoptandum in euacuationibus, siue sponte, siue cum medicamento factis, vt tempestiue incipiant, & quousque oportet producantur, neque cessantes prius, neque procedentes vltius quam oporteat. Incipiunt autem tempestiue spontaneæ, post signa concoctionis in die decretorio: non spontaneæ à medicamento alterato, hoc est, tunc post acceptum pharmacum, quantum, vt illud ad actum deducatur, videatur esse satis. Cessandi verò tempus est, non ante perfectam, siue iudicationem, siue expurgationem, sed mox atque perfectam sunt. Vt neque superpurgatio, neque superflua indicatio sit. Et quantum (inquit) diuulsa sint, hoc est, quantum intermiserint. Vocat enim nunc diuulsa siue deiectiones, siue vomitiones, siue denique euacuationes quascunque, eas quæ non continentur sunt, sed intermissiones habent, & sunt intercissæ. Hoc quoque ad earum multitudinem spectat, nam quæ multos dies durauerunt, nullas interim intermittentes, multo magis prosterunt vires, quàm quæ intermiserunt.

Iubet deinde considerare qualia sint quæ exeunt, plurimum enim refert scire, an quales oportet purgentur. Huc pertinent colores, si enim speciem succorum exeuntium maxime indicant: quam ob causam tam multa de deiectionum, & vinarum, & sputorum coloribus scripta sunt ab

Hippoc. & Gal. & alijs omnibus medicis autoribus. Calorem quoque considerare iubet. Nam calor significat bilis redundantiā, aut exustionem. Hunc verò debet sentire ipse ægrotus: non enim inædicijs debet excrementa tangere: atque intulit minùs gustare, vt sentiat falsedinem, aut dulcedinem: quapropter duo hæc verba accipi hic debent metaphorice, veluti sectione prima, vbi dicebatur, febres alie falsuginosæ. Illud enim falsuginosum dicebatur ad tactum, quod rodit tactum, velut à falsuginoso roditur gustus. Dicitur hoc modo vrinam exire, ipsi qui eius ardore laborant, calidam & falsam, hoc est, rodentem. Ita etiam sentit is qui deiecit, exire quiddam vrens, & rodens. podicem Dulcedo verò dicitur, quod huc contrarium, hoc est, quod exers est mordenis, & rodentis qualitatē: remanentem etiam & crassissimam considerari debere, constat, cum ea sit insignis humorum differentia, & ad morborum & curationum differentiam plurimum valens. Hæc omnia possunt accidere excrementis æqualiter, aut inæqualiter aduenientibus secundum corpus, aut secundum tempus. Deiectione secundum corpus suum inæqualis est, cuius partes diuersæ sunt, secundum vnam aut plures diuersas qualitates, vt variegata, aut alia parte crassa, alia tenuis: secundum tempus inæqualis est, quæ nunc habet hoc nunc illud: vt quæ semper habet eodem modo est æqualis. Quam æqualitatem in prognostico exposuit, dicens æqualis per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Postremo considerari iubet mutationes, quales ex quibus habeant, hoc est, vt habeant se, quæque bonæ quæ malæ mutationes sint. Nam vt dicitur in aphorismo, mutationes excrementorum inuant, nisi ad malam mutationem fiat. Itaque sunt mutationes ad bonum & ad malum, quas agnoscere & considerare oportet.

Num inceperit eructationem nec oblinere, videndum.

Dicta sunt ea quæ spectant ad præcipuas & maximas euacuationes, vt ad deiectionem & vrinam. Nunc de quibusdam pusillis agit peculiariter, vt de ructu, & de lachrymis. In ructu illud dicit considerandum, an is qui eructare incepit obtinuerit, id est, perfecerit eructationem, an non, sed solum inceperit. Nimirum vt est quidam motus, per quem rejicitur quod in ventriculo continetur, sicut aut humidum, qui vocatur vomitus, & alius velut inchoatus tantum, per quem nihil rejicitur, quæ vocatur nauasita est quidam ructus, per quem rejicitur facile ex ventriculo aer: alius inanis ructus, & per quem incipit homo eructare; nihil tamen emittit. Quod fit cum adest flatus, qui ventriculum irritat, non potest tamen expelli, velut nonnunquam etiam euenit in intestinis, quod flatus plurimum distendit intestina, neque diffundi, & extenuari à calore possit, vel quod expultrix debilis sit. Quod in colicis sæpe fieri videmus. Ij enim torquentur vehementer, donec possint eructare, & pedere, interim vero neutrum possunt facere: cum vero possunt, sub-

A leuantur, vt etiam hypochondriaci eum eructant, si vero aggrediantur, incipiuntque eructare, non tamen obtinent, anguntur, & malè habent. Neque tamen solum hoc in eructatione considerandum, sed quanta etiam sit, vt an multa, magna, an pauca & parua: & qualis, vt an nididosa, an acida, an qualiter exers. Nam longè diuersas præstant hæ differentie significationes. Multa enim & magna multum flarum: nididosa calidam corruptionem; acida frigidam: qualiter exers, flatus generationem sine corruptione. Pater aliquis non immerito hanc orationem partem esse narrationis alicuius longioris, pendereque ab alijs verbis, quæ desiderantur, quandoquidem quasi de aliquo homine agatur, dicit *ipse* *ipsum*, *de ipso*. Vtunque hoc habeat, nihil refert. Nam incipere eructationem, & non obtinere, significat quod dictum est.

Lachryma consideranda an volenti vel nolenti effundantur, multa vel pauca, calida vel frigida, in his quoque crassissimam & saporem spectare oportet.

Quæ in lachrymis consideranda sunt continet hæc oratio, & ex quibus diuersæ nascuntur significationes: imprimis volenti, an nolenti exeant multum refert, quia, vt in lib. 1. huius operis comment. 1. dictum est, lachrymæ spontaneæ insalubriter affectis significant fluxum sanguinis, in alijs mortem. In prognostico etiam vituperant sponte exeuntes, atque etiam in aphorismo. Multæ etiam an pauca sint, oportet considerare, siue spontaneæ sint, siue non spontaneæ. Si enim sint sponte exeuntes & multæ, deteriores significationem præstant, quàm si pauca. Quamcumque enim malam causam indicent, tam indicant maiorem: si vero non sponte exeant, sed ob mestitiam: quis lachrymetur, copiose lacrimæ in bene valentibus significant celebri multam humiditatem: in ijs, qui sunt in acutorum morborum vigore significant constantem facultatem. Qui sunt morti proximi non possunt lachrymari, aut non copiose. Frigidæ & calidæ lachrymæ, vt rectè tenetur Aristot. sectione 31. problematum, easdem significationes habent, quas frigidas & calidas sudor. Nimirum, vt dixerat sectione 31. lachryma sudor oculi est. Itaque frigida crudam humiditatem, calida concoctiorem significat. Hanc ob causam dicit Aristot. eo loco, lachrymæ eorum qui ob mororem flent calidas esse, eorum verò qui ob morbos oculi, frigidas. Id quod de morbis pendentibus ex crudis succis intelligi. Nam sunt quidam morbi oculorum calidi, per quos destillant lachrymæ etiam vrentes. Verum vt caliditas tanta significat vitionem, ita naturalis significat concoctionem, & frigiditas cruditatem. Easdem habet significationes tenuitas, & crassities lachrymarum. Hæc enim concoctionem, illa cruditatem indicat, vt & in vrina. Quandoquidem enim vrina & sudor ex eadem materia sunt, & lachryma sudor quidam est, profecto omnium horum tenuitas & crassities indicant eodem modo. Hanc ob causam lippa, vt Aristot. 4. meteororum est autem, concoctionis & maris,

ritatis est nota, quia ex crassescencia lachryma fit, crassitiem verò parit concoctio. Saporem quoque lachrymarum considerari iubet, quem sanè si ipse qui lachrymatur potest facillè sentire, cum defluunt per genas. Naturalis earum sapor, ut Arist. loco citato ex quinta sectione problematum dicit, est salus, ut & reliqui indolis, & vrinæ. Induit tamen alios sàpores iuxta speciem succi redundantis; amaritudinem quidem, ob biliosam cacochymiam; aciditatem ob melancholicam, dulcedinem ob sanguinis redundantiam. Hæc verò præcipuè in capite lachrymæ significant.

Considerandum an eger sputum per se exsercet, an tussiendo reijciat.

Modus excreationis locum vnde exit indicat, quapropter ad loci malè affectû notitiam plurimum confert. Nam ex thorace nihil exire potest nisi tussiendo; excrescit verò citra tussim quod ex capite defluit, aut ex ventriculo regurgitat. Sputi conditiones, & differentias omnes in prognostico complexus est vno capite.

Vomitus.

Vomitum etiam ponit inter euacuationes, quarum haberi ratio debet, differentias verò hic non scripsit, tantum monuit ne omitterentur. Scriptæ autem sunt diffusæ satis in prognostico, & in vnum caput repositæ.

Solis æstus, frigus, humectatio, siccitas consideranda sunt. Mutatio per qua, ex quibus, & ad quam se habeat.

De temporum mutationibus scripsit hæc, easque maximè morbos parere libeo restio aphorismo dicit. Hæc sunt autem temporum conditiones præcipuæ, secundum quas euenit mutationes fieri: Solis æstus, frigus vebemens, irrigatio, hoc est, pluuia multæ, & siccitas, hoc est, pluuie defectus. Nam aliz conditiones, quæ præter has considerantur, ad hæc etiam referantur. Tempus enim quo nungit frigidum & humidum est, quo status sunt boreales, frigidum & siccum plerumque; ut cum austrinis plerumque calidum & humidum. Qui verò conditiones anni & temporum mutationes considerat, non solum considerat qualia sunt, sed etiam ex qualibus, neque solum hoc, sed etiam per qualia. Multum enim refert, ut hi aut illi morbi fiant. Velut si trãsferatur ab hyeme sicca & aquilonari, in æstatem calidam & siccam, qualis esse consuevit, per ver pluuiosam & australem, sicut in æstate febres acutæ, & lippitudines, & dysenteriz. Si verò contrà ab hyeme australi & pluuiosa trãsferatur in æstatem, per ver siccum & aquilonare, sicut minus malignæ febres, abortiunt tamen mulieres. Si verò ab hyeme australi, & pluuiosa trãsferatur in æstiuum calorem, per ver etiam blâ-

dum, longè periculosior esset annus, & magis malignæ febres, quia hyemis humiditatem nec flatus aquilonares emendant, faciuntque vel calor tantam excipiat humiditatem, & acutæ illæ febres quæ fiunt, cum ex hyeme sicca & aquilonari trãsferatur in æstatem, per ver austrinum & pluuiosum, multò magis fierent, si hyems etiam fuisset blanda & veri similis, atque minus etiam si æstas non superueniret calida, sed à multis ventis perflateretur; itaque refert plurimum in qualia, & ex quibus, & per qualia mutationes fiant. Ut in qualem æstatem, ex quali hyeme, per quam ver, & quodcumque horum est causa differentiz alicuius in morbis qui superueniunt: Eadem autem est ratio considerandi aliorum temporum mutationes, ut ex quali æstate, per qualem autumnum, in qualem trãsferatur hyemem. Nam ita etiam dicitur in alio aphorismo: Si verò æstas sicca fiat, & aquilonaris, autumnus autem pluuiosus & australis capitis dolores ad hyemem fiunt.

Considerare oportet labores, otia, somnos, vigilias, insomnia, & qua in somno occidunt, & cubilia in quibus agri decumbunt, & ex quibus trãsferuntur.

Moderari oportet medicum labores & otia, somnos & vigilias: maxima enim pars est hæc artis tuendæ valetudinem, & curandi morbos considerare etiam debet insomnia. Quantum enim confetat ex consideratio ad prædictionem in morbis, dixi ego in commentario prognostici, sed & ab Hippocrate, Galeno, Aristotele, & Theophrasto licet id dicere, qui omnes de præfagatione ex insomnia scripserunt, præter alios quosdam neotericorum, qui etiam scripserunt de eo argumento: Cubilia quoque docet videre, in quibus debet ægrotus decumbere, & ex quibus in quæ mutantur. Quidam contemplantur diligenter cubilis positum, an spectet caput decumbentis ad meridiem, an ad septentrionem, an ad orientem, & de his superstitiosa quedam loquuntur, & difficilem somnum, insomnia, aut inquietudinem in tales referunt mutationes. Verum hæc omnia vana sunt, & vulgaria. Ego cubilis positum non ad cæli, (sed ad cubiculi) angulos, & fenestras, ac ianuas, & ut antea dicebatur ad irruentium spirituum ingressum, & egressum, velim eligi. Verum cubili lecto locato, in obscuro aut clato loco, ut cuiusque ferr consuetudo, aut morbus, ex videntur differentiæ esse, sublime esse cervical aut demissum, molle esse cubile aut durum. In quibus eligendis consuetudo est faciendâ maximè, quo ægrotus decumbat sine dolore. Non contempsisse autem Hippocratem hæc minutulla, intelliges ex his quæ secundo de ratione victus in morbis acutis, his verbis scripsit. Nam & lectus præter morem mollis dolorem inducit, itemque præter consuetudinem durus, sed et si sub dio præter morem lectus sternatur, corpus induratur. Considerandum ergo in quibus, & ex quibus. Si enim quis sub dio consuevit in solo decubere, ledetur in valde concluso loco, & molli lecto, atque hic si ægrotet, rectius fecerit, iubens decumbere in duro cubili, & loco qui plu-

simam ventiletur, quia alioqui dolebit, augeatur, neque dormire poterit: is vero qui assueverit molliſſimo lecto in reconditiſſimo loco, non poterit ſine periculo dormire ſub dio, quia durabitur & deſabitur eius corpus, vnde ventilatione prohibita graues morbi ſiunt.

Mentis cogitatio ipſa ſecundum ſeipſam ſine organo & rebus meret, gaudet, & terretur, & conſidit, & ſperat, & deſperat. Velut Hippothoi puella accidit, quæ in animo ſciebat per ſe ipſam, ea quæ in morbo ſiebant.

Videtur hæc oratio multorum mirabilium problematum cauſam continere, & pendere ex philoſophica contemplatione. Nam ſi mentis cogitatio, ſeu mens ipſa quæ cogitat, per ſe ipſam moueri poteſt ſine rebus, hoc eſt, ſine externis obiectis, facile intelligi poteſt cauſa diuinationis ſimpliciter, & eius quæ accipitur ex inſomnijs. Nimirum ſi mens per ſe mouetur, perinde intelligere poſſet, atque ſi a corporis vinculis abſoluta liberè vagaretur, quare cognoſcere poſſet tam quæ alibi agantur, tum quæ intra proprium corpus, etiamſi nullis externis ſenſibus ſint obiecta. Velut inquit accidit Hippothoi puellæ, quæ in animo, id eſt, non per externos ſenſus per ſe ipſam, hoc eſt, nullo illi narrante, ſciebat quæ in morbo ſiebant, vt fortasſe partem internam, quæ malè eſſet affecta, & eius affectionem. Multa huiusmodi narrat Hippocrates, Galenus, Ariſtoteles, & Teophrasus, libellis de præſagitijs ex inſomnijs, conceduntque hi omnes, videri animam multa variè diſcerno dicere. Narratur etiam ab omnibus quæ plurima, & ad me nonnulla declarata ſunt, à viris non contemnendis autoritatibus ad diuinationem pertinentia. Quæ ſane omnia motus eſſe videntur animæ ipſius per ſe, non ex corporalibus incipiens inſtrumentis, neque ex obiectis rebus. Siquidem dicunt, quæ neque vident, neque audiunt, neque viſu alio ſenſu percipiunt. Pender autem quod hic dicitur ex philoſophica conceſſione, quia quibus placet Platonis de anima ſententia: hominem præcipue eſſe ipſam animam, eamque eſſe intra corpus, & illi vinculis quibusdam alligatam, non vt corporis actum, ſed vt externum quiddam, & ſeparabile, & vt natum in naue, aut moderatorem in vrbe. Denique ipſam vt corpore, vt re quædam extra ſuam ſubſtantiam conſiſtente: vt inquit, quibus hæc ſententia placet, dicunt animam ipſam eſſe per ſe omniſcientem, ſeu omnium rerum gnaram, (nihil enim denud diſcere) immenſam autem eo corpore, & ei alligatam, vix poſſe quicquam cogitare, præter id quod ipſi ſenſus offerant: aliquando verò moueri etiam per ſe, & quædam contemplari: atque hæc in re homines quosdam alijs præſtare, quod non omnium animæ ſint æquè vinculis illis ligatæ: ſed aliæ plus alijs, ob diuerſam corporum naturam. Velut imprimis melancholicis corporibus cenſent minoribus vinculis alligatas eſſe animas: atque ob id homines multos, cum dormiendo, tum etiam vigilan-

Ado diuinare: quod ſcilicet animabus vt pote minus alligatis liceat vagari magis. Hanc dicunt eſſe cauſam ob quam dormiendo magis quàm vigilando diuinetur, quod ſcilicet mens minus ab externis ſenſibilibus interrumpitur, quominus per ſe moueri poſſit, & in ea quæ longè abſunt ferri. Multa huiusmodi dicunt Platonici, quibus facilis eſt huius orationis interpretatio. Quibus verò ſententiam veriliſſimam hæc in parte certum eſt ſequi, hominem ſcilicet conſtare corpore & anima, atque hæc eſſe ſeparabilis ſit, ſeparatam tamen imperfectum quiddam eſſe, & alterius partis indigum, quod naturalis quidam actus corporis ſit, non concedent poſſe animam dum hoc corpore cõtioetur, ſeu, vt dicam melius, dum hoc corpus cõtinet, poſſe quidpiam agere ſine corpore, nam ne ipſum quidem intelligere, ſecundum quod ſeparabilis eſſe cognoscitur, poteſt agi ſine phantaſmatibus corporalibus: nedum timere, gaudere, ſperare, & deſperare, quæ ad cordis vim ſpectant. Hi de diuinatione aliter ſentiant. Duplicem ſcilicet eſſe præſentationem, alteram naturalem, quæ ſluit ex naturalibus quibusdam ſignis: alteram diuinam. Signa rurfum naturalia quædam eſſe extra nos, quædam intra, atque adeo ex externis præſentiri externa aut ioterna: & ex internis interna aut externa. Ex externis externa, vt agricolæ ex vento qui ſtat præſentiant pluuiam, aut ex animu volatu, aut cõli facie: Ex externis interna, vt medicus ex cõli ſtatu præſentiat futuros morbos: Ex internis externa, vt podagricus, aut hernia laborans ex doloribus præſentiat pluuiam: Ex internis interna, vt ex dolore partis futurum in eam abſceſſum. Pertinet itaque ad hanc naturalem præſentationem Aſtologia iudicaria ſi quæ eſt, & medicinæ pars prognotiſtica, cuius vna quædam pars eſt (vt in commentario prognotiſti Hippocratis indicam) quæ vitur inſomnijs. Fit enim etiam hæc naturaliter, neque anima quidem ſcõrum (neque enim poteſt) ſed ſimul cum corpore ſentiente. Proponatur enim nobis gratia exempli is quem Galenus narrat ſomniariſſe, eras ſibi factum eſſe lapideum, quod ciſſimè illi reſolutum eſt: allegorice itaque præmonſtrauit anima reſoluoedum eras, dicens eſſe factum lapideum. Nunquid anima cum ſeſe tolligit ab externis ſpectaculis, quibus cum vigilaret homo detinebatur, perluſtrat proprium corpus, videt quæ ioterna aguntur, & quæ vult declarat, nunc a parte, nunc allegorijs vt eos poetarum modo: Non ſane. Nam hoc ipſum poeticum eſt, & inſomnio ſimile. Sed oportet hic meminiffe, indicatum à me alibi eſſe, imaginandi vim, eſſi in cerebro vigeat, non tamen in eo ſolum contineri, ſed inſeparabilem eſſe à ſenſu, atque ob id in omni parte ſentiente eſſe. Cum igitur ſenſu prædictæ in nobis ſint, non minus internæ partes, quàm quæ ad cutem ſunt, euenit, vt ceſſantibus motibus ſenſuum, qui inter vigilandum ab externis rebus cientur, quibus animus occupatur, quominus motus minores animaduertat, ſentiant partes internæ ſuas ab internis cauſis paſſiones cum imaginatione quædam, atque ea imaginatione inſomnium eſt. Cum igitur paſſionem diſtincte ſentit, diſtincte etiam imaginatur, atque tunc aperte ſomniat quid patiarur, vt fortasſe

puella Hippothoi euenit: cum autem non sentit
distinguit, imaginatur quasi similem quandam pas-
sionem, & inde nascitur allegoria. Plurima ho-
minum sententiam est accidere dormientiibus, quo-
rum ob lentam imaginationem, non est expectan-
dis recordatio. Cum verò est passio vehemens,
que cerebri excitat imaginationem, accidit som-
ni recordari, & ab eo accipere significationem.
Præsentio diuina, que verè talis est, nullam habet
iura nos causam, neque ex ipsis sensibus accipit
exordium: sed sit extrinsecus accedentibus phan-
tasmatis, & spectris quibusdam oblati ipsi animæ
à demone, siue bono, siue malo. Est alia diuina-
tio vana, que vulgaribus, & indoctis imponitur, qua-
si verè habeat aliquid diuinitatis, ea verò nullam
habet causam certam, sed casu & temerè incidiis,
credulitas autem facit, ut quasi certam quippiam
accipiat. Euenit verò hoc ipsi præcipue homini-
bus, quibus imaginatio est facillima, ita autem
voco eam, que vix vlla in re consistit, sed per om-
nia agitatur temerè, sunt tales homines plerumque
& loquaces, & hi ipsi vix vnquam dormiunt sine
infortiis. Atque quod ipsis seu somniantibus, sen-
tencie imaginantibus aliquando euenit, simile est
ei quod loquentibus. Nimirum, ut quia loquaces
sunt temerè loquantur quædam, que cum postea
eueniunt, videntur recordantibus cum quodam
homine esse peiora; ita imaginantur, & somniant
quædam, que qui hæc minus intelligunt, putant
referenda in nomen. Res autem habet, ut dixi.
Quare solum superest, ut præscripta oratio, iuxta
probabiliorem de anima sententiam explicetur.
Mentis cogitatio (inquit) ipsa secundum se ipsam,
sine organis, & rebus moreretur, gauderet, & terretur,
& condirer, & speraret, & desperaret. Hoc est, cogi-
tatio ipsa per se, sine organis; hoc est, sine sensibus
externis, & sine rebus; hoc est, sine vllis ex-
ternis obiectis, causa est ut hominem moueat, gau-
deat, & aliis quibusvis animi motibus moueatur.
Nimirum, ut accidit melancholicis, qui non mi-
nus morerentur & timent, nulla re tristi aut terribili
sensibus externis occurrente, quam si malicia tales
occurrerent. Et hinc fit, ut multi somniantes, aut
alloqui cogitandi, omnia que ipsis per mor-
bos sunt agnoscant, anima ipsa velut præfagen-
te, quod Hippothoi puella accidit.

A Etatem quidem ab ætate distinguere oportet, atque an prius vel posterius quam conueniat aliquid accadat. Dentium eruptiones, pilorum ortus, semen plus aut minus redundans, incrementum, crassities, robur, diminutio.

Notas quibus ætates ab ætatibus distinguuntur continet hæc oratio, quas accipit Hippoc. ab iis que in quibusdam vitæ articulis contingunt, cuiusmodi præcipue sunt dentium eruptiones, ortus pilorum, in quibus sunt coma, barba, & pubes, & semen, quod plus aut minus redundat adulescentibus, & iuuenibus, cum quo ferè & barba & pubes incipiunt. Merito autem dicit Hippoc. hæc distinguere ætatem ab ætate. Non enim definiendæ sunt medicis, ut grammaticis, ætates annorum numero, sed mutationibus temperamen-

A ti, quas mutationes consequentur signa illius modi: atque ob temperamentum differentiam illa ipsa sunt quibusdam prius aut posterius. Nimirum differentia temperamenti causa est, ut neque æque viciales sint omnes, neque æquales habeant ætates. Considerare iubet, an hæc aut horum quiduis fiat prius aut posterius quam conueniat. Conueniens esse dicitur omni in re, quod mediocre, & ad id dicitur quod plus aut minus. Velut nunc est quoddam tempus dentitionis, non idem omnibus, sed mediocribus septimus mensis, ut dentitio incipiat, septimus annus ut dentium commotio perficiatur: si cui ante id tempus incipit aut perficitur, id dicitur fieri prius quam conueniat: ut si post fiat, dicitur posterius quam conueniat fieri.

B Pubes etiam & lanugo orti incipit anno decimo quarto, ut & semen emitti. Quod prius aut posterius sit, prius aut posterius quam conueniat, sit. Id verò considerare expedit, quia non parum confest ad agnoscendum temperamentum hominis. Quibus enim dentes citius solito oriuntur, calidiores sunt & humidiores, quia calor vim augendi habet, & in humido abundat materia: quibus tardius, sunt frigidi & sicci contrariis ob causas, aut alioqui debilem habent facultatem naturalem, impotentia enim quædam est. Seminis etiam præter redundatiam, indicat temperamentum calidum & humidum, nam illa est redundancia boni alimenti. Contrarium est ex contrariis causis.

C Pubes etiam & barba redundans, & priusquam expediat orta, calor signum est, sed non perinde humiditatis, quia fuligo cum sit, ex qua pilus accipit materiam, calidis etiam & siccis, ac proinde biliosis accidit: tardius fieri, est frigiditatis signum, utcumque habeat altera qualitas. Nam & frigidi & humidi, & frigidi & sicci serius pubescunt. His dictis enumerationem facit Hippoc. ætatum omnium. In quatuor eas omnes distribuit; quas his quatuor nominibus significauit, incrementum, crassities, robur, diminutio. Incrementi nomine intelligit pueritiam & adulescentiam, deinde id quod visque ad iuuentutem est, que fere vigesimo quinto anno incipit: crassitiem vocat iuuentutem totam, que visque ad trigessimum quinquem producit: ætatem, tempus consistendi: reliquum vitæ est diminutio, & senium. Nimirum visque ad iuuentutem crescent in longum corpora quantum possunt, tota iuuentute crescunt, & corpora entiora sunt: consistendi tempore stant, corporis molem nullatenus amittentia, ac neque vires insigniter: iam inde minuantur omnia & corpora inquam, & vires. Hæc oratio in omnibus codicibus, tam grecis quam latinis, habet verba quædam alia interiecta, que quia ineptam, & inconcinnam reddunt sententiam, ego censui expungenda, & hoc modo restituendam lectionem.

D **E** **F**

Quod cognatum, & quod per se est, & quanto magis aut minus tale est, spectare oportet.

In morbis oportet considerare, quod cognatum, & quod per se est, hoc est, que pars laboret per
li iij

se ac primario; & quæ per consensum. Vocat vērò quod per consensum laborat *sympliciter*. i. cognatum, quia causa sympathiz est cōmuniō quædam naturalis partium, velut os ventriculi & caput ob communes nervos, vterus & mammae ob communes venas sese trahunt mutuo in compassiōnem. Refert vērò quam plurimū ad recte suscipiendam curationem, an pars laboret per se, an per consensum, & quanto magis aut minustale est: nimirum hoc ipsam laborare per consensum, aut propriam passiōem, recipit magis aut minus. Quædam enim sympathiz sunt, per quas omnino nihil passiōis propriæ est in parte, vt cum pars tantum priuatur, velut oculus, si nervus opticus obstructus sit: aliz quæ habent aliquid, exiguum tamen & sine primaria passiōe non valens persistere, vt cum dolet caput ex ventriculo, & morbus nondum firmatus in capite est: aliz etiam, quæ est secundariæ sunt passiōes, & ab aliis fluxerint, abierunt tamen iam in passiōes proprias, vt si firmatus iam in capite sit dolor, qui aliunde inceptit.

A Nni tempus spectandum est, in quo maturius aut serius aliquid contingit, & tempus in quo assidue pluvia aut siccitates accidunt, quod frigidum est aut calidum, in quo quidam flant venti aut nulli, & quales venti. Spectandum quoque est an hac in temporis principio, vel medio, vel fine, aut assidue, præterito aut præsentē contingant.

Ad præsentendum futurum temporis statum, aut ad cognoscendum statum præsentem, in quam causam referre debeas, consideres oportet anni tempus, quodcunque, vt ver, æstatem, autumnum, & hyemem. Quæ tempora quia temperamentis à nobis definiuntur, possunt prius aut posterius fieri, dicimusque verissimè breuiorem hoc anno fuisse hyemem quam superiori, quod ver prius inceptit. In tempore autem quocunque hæc conditiones considerandæ, vt paulò antè in hac ipsa sectione dixeramus, an pluviosum sit aut siccum, an calidum vel frigidum, an ventis quibusdam aut nullis persistetur, & qui venti flauerint. Atque cum solcant hæc, aut toto aliquo tempore sine intermissione fieri, aut quadam eius parte, considerandum an in principio, medio, aut fine. Neque parum refert, quia finis temporis cuiusque sequitur conditionem subsequens: & principium antecedentis. Considerandum ergo, si rationem & causam morborum qui grassantur velis inuenire, quid præsentē tempore accidat, & quid præterito acciderit. Cum enim ita natura sit comparata, vt causæ effecta antecedant, morbi præsentēs à præterita temporis conditione fluunt, accipiunt vērò etiam differentiam à conditione præsentis, quare utriusque oportet habere rationem. Hæc autem ita habere in enarratione tempestatum epidemialium, abunde explicatum est.

A

Morbi horam & tempus considerare oportet, & quæ superueniunt, & circuitus, & ex circuitibus quinam maiores aut longiores sint, & incrementa: atque etiam totius morbi incrementum, aut remissio, aut vigor, & qui magis aut minus perficitur, & quando & quomodo, & quo tempore & aetate.

B

Quæ consideranda sunt in ipsa temporis constitutione dixit prius, nunc quæ in quocunque morbo consideranda sunt docet. Dicit considerandum horam morbi, & rursus paulo post eadem voce utens dicit, *hæc & nō hæc*, hoc est, & in qua hora, seu in quo tempore. Videri poterit repetitio inutiles & inartificiosa, quandoquidem eadem videtur voce: verum non est, illa enim vox *hæc* significat dici horam, vnde horologium dicitur & tempus anni, præcipuè æstium, vnde horarum fructus appellati sunt. In prima huius orationis parte significat horam diei, in vltima tēpus anni, quod vt ego explicarem, in prima verti horam morbi, in secunda & in quo tempore. Dicit itaque considerari debere horam morbi, hoc est, quā horā inuaserit febris, aut qua hora exacerbatōnes fiant, an mane, aut vespere, an noctis prima, an postrema parte. Non esse autem hanc considerationem superuacaneā docuit Hipp. in initio sect. 1. libri secundi, atque rursus in hoc sexto, vbi dixit, quatuor dici partes respondere quatuor partibus anni, & suum in quacunque earum moueri humorem, nocte media pituitā, medio die bilem, mane sanguinem, vespere melancholiam: Hora igitur motus morbi confert nonnihil ad agnoscendum speciem humoris: considerat etiam inber morbi tēpus, quandoquidem autem temporis nomen aliud significat quam horam, & quam anni tēpus, si quidem velint aliud quiddam dicitur posita, & in quo tempore, non est aliud quod hic possit significare, quam ipsam morbi constitutionem, hoc est, an morbus chronicus sit, an acutus, & natura brevis, in hanc aut illam partem finendus citò. Hoc autem scire imprimis est necessariū, quia non poteris aliter vidum instituerē, neque agnoscere quantum debeas auxilijs instare. Vtranque enim horam ad futuram morbi indicationem accommodatur. Ad hoc vērò, id est, vt præsentiri possit morbi constitutio, considerari etiam debent quæ superueniunt, & circuitus, & ex circuitibus quinam maiores, quinam longiores. Quis vt dictum est in aphorismo, atque in multis aliis locis Hippoc. cum huius operis, rum etiam aliorum. Paroxysmos & constitutiones indicabunt morbi, & anni tempora, & circuitum ad se mutuo incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue ex longiori tempore fiunt. Hoc ipsum colligitur ex ijs quæ mox apparent, vt in pleuritidis spiritum si statim ac incipit morbus apparet, cōtrahit: si autem posterius apparet, pro ducit. Explicat deinde sigillatim circuituum partes, hæc sunt, incrementum, cuius nomine intelligitur tota accretio denud repetentis paroxysmi; quæ constat principio & incremento. Et vigor, seu status paroxys-

C

D

E

F

Ami: & remissio: & tempus intervalli. In incremento considerandum, an tantum crescat ipse morbus cuius est paroxysmus, secundum speciem propriam recipiens accretionem, an etiam accrescat alter morbus: utrunque enim fieri solet: Quibusdam enim per paroxysmum nihil noui accidit, sed tantum crescat quæ inerat febris: alij accedit delirium, aut coma, quæ passionēs cerebri sunt, quibusdam etiam stranguria, alijs hæmicræ: alijs cardialgia: alijs alia eiusmodi. In intervallo considerandum, qui morbus magis, & qui minùs finiarur, quædam enim remissiones in solutiones integras perueniunt, quædam propè, aliæ etiam longè. Hoc autem ipsum confert, quando & quomodo fiat, hoc est, quomodo die, & an per aliquam euacuationem. Si enim cum euacuatione insigni in die decretorio fit solutio, longè melius est quàm si aliter, aut alio die. Ad hæc autem omnia confert multùm, vt anni tempus (velut etiam in nuper citato aphorismo dicitur,) ita & ætas ægrotantis. Nam vt sui quique tempori sunt familiares morbi, & solutionis modi, ita & ætati, vt præter multa alia loca tertia particula apothorismorum Hippocrates ipse docuit.

Morborum populariter grassantium natura spectanda est.

Considerate oportet naturam morborum populariter grassantium. Ea enim consideratio inter cætera confert quamplurimum, ad agnoscendam speciem cuiusque, qui se obtulerit. Vbi enim aliqui est dubia cognitio, talem esse morbum rectè conijcies, qualem tunc temporis populariter grassati noueris:

Atque si quis sine vomitu inceperit, velut quum post epotum medicamentum alans subsistit, aut parum purgatur.

Causæ quoque præcatardicæ morborum considerandæ, quia illæ si adhuc manent cum morbo conferunt ad indicandam curationem, sin non manent, ad cognitionem. Velut si quis morbus inceperit, quòd cum biberit homo aliquid vomitorium, retinuerit, neque euomuerit, aut cum acceperit alui subduكتورium, parum purgatus sit: Nimirum multi apparatus aliquem morbosum sentientes, vtantur præseruationis gratiæ medicamentis vomitorio, aut subduكتورio, quæ res illud inter cætera habet periculi, vt si vacuatio non succedat, motis excrementis, neque vacuatis, quæ antea non aderat febris excitetur, quòd & cauete debes, & vbi euenient, perpendere mox, qualem reliquerit in corpore affectionem. Solet enim ventris, aut hypochondriorum inflammatio inde oriri: quare qui ob malè succedentem expurgationem oborta febre, purgationem aliam adiiciunt, quasi priorem petfecturi, plurimum etiam phlegmonem enim augent, deberent potius mox sanguine misso eius generationi occurrere:

Valde candidi etiam sunt spectandi quum fortasse febriçant, quorum etiam labia considerate oportet, qualis sit modus, & tempora.

Illud scis. r. fortasse significat, non semper sed aliquando albidus esse febriculofus. Quod reuera ita habet, siue illud *supradictis* significet hominès febriçantes, siue febribus opportunos, & qui illis crebro cortipiantur, etiam si nunc non febrient. Nam quidam eorum quibus facies albida est & omni rubore vata, febres tenentur assidue: quidam non ita, sed crebro in febres incidunt: quidam ex ijs omnino febriculofus non sunt, sed cum vitioso illo sint corporis habito, febribus vitæ nunquam capiuntur. Quidam enim sunt decolores & albidus, quòd multus illi assidue sinat singulus ex hæmorrhoidibus, vt mulieribus ex vtero, aut etiam ex naribus: quidam ob frigidam intemperiem, & pituitosam cacochymiam in hepatis, & totius corporis. Atque hi omnes longè absunt à febribus, est illi hydropis sint opportuni. Alij sunt decolores ob hypochondriorum, velut mulieres ob vteri obstructions, qui per sanguinis suppressionem febriçant, quòd is qui oppilatus est succus putrescat, aut febribus cortipiantur crebro, quòd scitrosi tumores viscerum à sanguine malè committente fiant phlegmonosi. Itaque *supradictis* *scis* ei *scilicet*, hoc est, quidam sunt febriculofus.

Considerati verbè debent horum labia, & qualis sit eorum modus, & tempora. Nimirum quæ postremo his albescent sunt labia, vt pote quæ naturæ sunt rubicundiora, quàm aliæ partes faciei, ac postinde cum ea sunt iam alba maiorem temperamenti corruptionem indicant, & sunt quidem aliquibus ea sola ruborem quendam retinentia, alijs iam partibus colore vacuis, aliquibus alternatè ex quibusdam temporum intervalis sunt nunc alba, nunc rubentia, idque vel ob inertis excitatum motum, vt sanguine aut calida fuligine in caput ascendente: (id quòd obstructis visceribus fieri consuevit) vel ob externam aliquam causam, vt cum ieiunis & nondum exercitatis albida sunt, sed in recens exercitatis, aut relictis ruborem quendam comparant, id quod accidit cum frigidis & exhaustis. Igitur refert considerare quomodo se habeant talium labia, & tempora quibus nunc rubent, nunc albida sunt, si modò tales subeant mutationes, nam inde cognoscet quàm grauiter sint affecti. Quia si sunt etiam labia velut mortua sine colore. grauis est corruptio: sin nondum, leuior. Atque etiam inde dignationem habebis febriculoforum, & eorum qui tales non sunt. Nam si erraricos quosdam suntorum calidorum raptus in superba sequatur labiorum tubor, obstructi sunt & febriculofus: sin autem non, sed solum motum, aut refectionem, hi sunt refrigerati, & absunt longè à febre.

Corpus, opus in considerationem adducere oportet: visus, auditus, nasus, tactus, lingua, ratiocinatio considerentur.

Constat actiones læsas ante omnia considerandas esse à medico, quocumque se illi ægrotus offerat, siquidem ipsum ægrotare læsione actionum definitur, & dignotio loci affecti inde incipit. Ob id enumerationem facit Hippocrates actionum naturalium, quot enim naturaliter habent nostra corpora actiones, tot modis possunt præter naturam ledi. Sunt autem duplices, quædam quæ animalium sunt propriæ, ac proinde animales vocantur, in quibus sunt motus voluntarij, & sensus: aliæ, quæ non vt animalibus, sed vt visceribus accidunt; hæ sunt quæ circa nutritionem, & naturalis caloris custodiam versantur. Has quæ non tam sentientis animæ partis sunt, quam ipsius corporis, vocat vno hoc nomine corpus. Itaque dicens corpus, intelligit actiones naturales, & quæ sine sensu sunt, in quibus sunt etiam vitales vocatæ. Motum liberum vocat opus, omnia enim quæ hominum opera vulgò vocantur, in aliqua corporum aut partium translatione consistunt. Sensus enumerat, externos quidam sigillatim, visum, auditum, tactum, & odoratum, ac gustum, quos partium nominibus vocat, nasum, & linguam: internos omnes sensus intelligit nomine rationationis, qui autem & quot illi sint, alibi est à me disputatum.

Tumores in superioribus palpebris relictis spectare oportet, nam quum alia extenuantur, morborum recidiva significantur. Consideranda sunt etiam palpebra in extremitate subnuba & dura, & quæ ex his sunt viscida & extumescent, & quæ in his continentur, velut Pharsalo Polyæda contigit.

Recidivæ timeri debent, vbi corpora non mox purgata, sed morborum causæ interiorius relictæ sunt, id quod indicant vitia quædam immanientia, velut sitis, & oris amaritudo, & fastidium, & quæ nunc commemorat, & quæcumque alia eiusmodi. Tumor palpebrarum superiarum relictus ex morbo aliis partibus extenuatis, significat corpus impurum manere, atque ob id paratum ad recidivas. Videmus enim eam partem ante alias intumescere, vbi corpora vitiofo abundant succo, & concoctiones malè in corporis partibus aguntur, velut in iis quibus leucophlegmatia fieri incipit. Fieri etiam solent in corporibus impuris alij oculorum morbi, vt in extremitate, hoc est, in palpebra ipsius tarsu, tumores subrubri, & duri, qualis est affectus qui vocatur *pterygia*. Quibusdam verdè hi tumores ex aliis morbis relictis fiant per abscissos, & sine recidivæ periculo, vt opte puro iam corpore. Distinguitur autem id, vt in aphorismo dicitur, ex excrementis, ita enim dicit Hippocrates, vbi fauces ægrotant (eadem est ratio aliorum omnium abscissuum, & particularium morborum) si enim ea bene habent, tutum est corpus nutrire, vt opte purum iam, sin minus, opus est expurgatione: sed est etiam alia ratio distinguendi ex adiunctis. His enim quibus scilicet vitium aliquod est in palpebris ob inreritis relictam morbi causam, adesse solent etiam aliæ

A *pterygia*, hoc est, lentores quidam in ore intra dentes, aut in ipsis oculis ad eorum angulos, & *entropia*, seu erumpentia, seu extuberantia, hoc est, tubercula aliqua aliis etiam in partibus innascentia, & contra, Græcè *entropia*, hoc est, (vt ego interpretor) mala quæ sub cute continentur, & latent, velut quibusdam in partibus nascuntur tubercula, aliæ compressæ aut motæ dolent, etiam si neque tumorem, neque maculam præ se ferant. Hæc animaduertit Hippocrates in Pharsalo Polyæda. Hic, arbutos, ex morbo superfuit, palpebra superna tumente, & *entropia* affecta, habebatque in ore lentores, & tubercula, doloresque in variis corporis partibus, & postea in recidivam incidit. Caurum fuisse in hoc homine purgatione corporis recidivam antecurrere.

P *Prorumpentes tumores vel liuores in ophthalmijs aut ulceribus spectandi sunt, verumetiam ea quæ deferuntur ex tuberculis & suppurationibus, quod signa sint.*

C *Kala*, *pterygia* vocat ruptiones quæ spontè fiunt, vt cum finduntur partes quædam, & sanguis erumpit, aut pus, aut sanies. Tumores vocat, eos qui præter naturam, quorum sunt multæ species, liuores, maculæ liquidæ. Hæc omnia dicit consideranda in ophthalmijs (ita autem & in aliis inflammationibus) & in ulceribus: nimirum quædam ophthalmijs finduntur & cruore emittunt, suntque hæc multò magis dolorose, quædam etiam finduntur suppuratæ iam materia: tumores etiam habent quædam ophthalmijs magnos, quædam aliæ exiguos, quæ aride ophthalmijs vocantur: postea liuores etiam habent quædam, vt & aliæ omnes partes, siue inflammatae, siue ulceratae, siue refrigeratae, in quibus naturalis calor emoritur. In ulceribus labiorum etiam consideranda sunt hæc tria, solent enim fissuras habere, & tumores, & liuores. Quæ omnia consideratione digna sunt, quia habent insignes significationes. Rupturæ enim aut extenuatam exesamque cutem à suppuratione significant, aut siccitatem nimiam ab humore acro, aut salso: tumores in ophthalmijs redundantiam ac multitudinem: in ulceribus tumores non sunt mali, quia vt in aphorismo dicitur, qui eos habent, non valdè conuulsuntur, neque insaniunt, si verdè in viceribus magnis ac pravis tumor non appareat, magnum malum: atque etiam si cum apparere coperunt, rependè dissipati sint. Liuores (vt dixi) semper sunt refrigerationis soboles. Neque solum est his, sed ex qualitatibus eorum quæ deferuntur ex tuberculis suppuratis cum finduntur, & ex suppurationibus per excretionem (vocat enim suppurationes antonomasticè) paris intra thoracem collectiones) indicia accipiuntur. Nam quod melius pus exit, aut excreatur, eò affectio est minor, quò deterius, eò est immittior. Est autem optimum pus, quod album, læue, & æquale, & quàm minimè foetidum, quod huic contrarium est, deterrimum. Hæc spectat illud suppuratorum prognosticum, ex suppurationibus quæcumque, dum

spurnm adhuc biliosum est, suppurantur, perniciose valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuat.

Circa mensem tormina circa umbilicum, & dolores nonnunquam à porris, sed etiam ab allijs postea his contingebant.

Porros & allia eredit hominum vulgus esse esse frigida. Hoc arbitror argumento, quod videant menses illis uti, & qua die vsi sint, melius Solis ardorem tolerare, & quod nonnulli eorum ea tempestate sentiant ab eorum esu tormina circa umbilicum, & dolores alios, siue capitis, siue lumborum, quos pati antea soliti erant. Horum autem euentuum alij sunt causę. Nimirum iusticiis, & talibus uti consuetis ex eorum vsu roborantur & angescit naturalis calor, & proinde extraneus melius fertur. Tormina autem & dolores aliquando sunt ab acerbis succis quos gignunt, aliquando à flatibus quos commouent. Atque vtraque ratione per ęstatem maximę possunt dictas noxas inferre, quia tunc bilis maximę abundat, simulque venter est frigidus, & ob illud ędit mordacitas, ob hoc flatus. In hanc sententiam dictum est ab eodem Hippocrate quarto de ratione victus acutorum, alium flatum parit, caliditatemque in thorace, capitis item grauitatem facit, & anxietatem, atque si alius quispiam dolo infestare consueuerit, ipsum irritat. Hoc idem est, quod nunc innuit dicens, *ę mē mēdis tormina ē pōr,* hoc est, ab alliis, qui prius inerat dolores, iterum excitantur. Explicatum vero à me est in illius loci commentatione, allia non esse flatuosa quod gignant, sed quod dissipent & commoueant flatum. Possunt vero nihilominus commouendo inferre tormina, & dolores alios quoscumque. Pręter hanc Valesij interpretationem, alij etiam sensum recipi hęc sententia, nam pro *ę mēdis* vel *ę mēdis* dicitur. i. circa mensem, quidam legendum putant *ę mēdis* dicitur, atque hanc hysteri-corum affectum eliciunt diagnōsim, ut tormina circa umbilicum & dolores venter male affectum significant, et si ex porrorum & aliorum esu eadem contingere nonnunquam soleant.

Erysipelas quibusdam à ceruice exoriebatur, & circa has partes in facie indicabatur. Quibus verò nigra in ceruice apparebant, mala erant, atque si pustula erupissent, mala, & quibus venter turbabatur.

Verba hęc videntur decisa ex longiori quapiam narratione morbozē tempestatis. Possunt nihilominus seorsum intelligi, quę hic dicuntur. Erat scilicet quędam tempestas per quam fiebat multę erysipelata à ceruice incipientia, aut circum-circa ceruicem, à proxima aliqua parte, quę serpebant in faciem, & ibi iudicabantur. Erat sanę enirum sursum ascendentiā cū ad bene iudicari. Nam ut dicitur ab Hippocrate in prognostico, maximę enadunt ij quibus fauces & ceruix rubuerint, si & ceruix & pectus ruborem habuerit,

A itaque dicit illic si rubor deorsum repat, nunc verò est sursum & ad faciem ascenderit, liberabatur multi. Erysipelata à facie incipientia vidimus multa sursum & in capitis cutem serpere sine periculo ægrotantium, atque descendere à facie fortasse esse periculosos, ne serperent in fauces, guttur, & pulmonem. Tamen à ceruice ad faciem ire bonum non est, quanto minis expectares, ut ibi bene iudicarentur. Notauit itaque hoc Hippocrate ut rarum. Quod autem subdit manifestas habet causas, nigra scilicet à ceruice oborta, mala fuisse, maxime si pustula nigra simul orientur. Nam id erat signum nigri & exusti succi, qui morbos plerumque facit insuperabiles. Illis etiam dicit malę cessisse, quibus venter turbabatur. Constat *ę mēdis* vocari, quę sunt cum turbatione. Dicitur id nomen ab Hippocrate de turbatione alui, & de turbatione mentis, & de circumstantium ea perturbatione quę fieri solet, quum proximi iam sunt mortui qui ægrotant. Hic non congruit de hac vltima perturbatione dici, leue enim est dicere mala fuisse erysipelata, quę perturbarent circumstantes. Congruum autem est dici *ę mēdis* *ę mēdis*, quę inciperent cum alui perturbatione, aut afferrent perturbationem mentis, aut vtrunque: vtrunque enim malignitatem humoris indicat, & eius redundantiam. Constat autem hęc maximę posse accidere nigris, & pustulosis. Niger enim & vitus humor, maximę paratus est perturbare mentem, & alium maximo cum periculo turbat. Porro quę erant & nigra, & pustulosa, & turbatoria, ea erant terrima omnium.

D Melancholicus Adamantus assumpto multo peplo vomuit aliquando nigra, quod quandoque à capis accidit.

Hippoc. vsum esse vomitoriis medicamentis sæpe, & inter cetera peplo, sciet quicunque vel tantillum sit in eius libris versatus: cepis tribuit facultatem Dioscorides expurgandi, & facilem reddendi aluum, vomitorias esse non dixerunt verò si sanguis ingerantur, siquidem, ut ille dicit, sunt fastidiosę. Quę enim fastidium inferunt, eadem in paratis, & nauseam mouent, & vomitum. Neque obstat, quod idem Dioscorides dicit, cepas appetitum excitare. Vtranque enim fit, & experimento facile est cuius agnoscere. Cepę scilicet parçę acceptę mouent appetitum, ingestę abundanter fastidium, nauseam, & vomitum mouent. Quare ut Dioscorides vindicetur à contradictione, haudquaquam opus est interpretatione, quę accipitur ex Auicenna transferente nomen appetitus ad libidinem, dicentisque cepas libidinosas esse; neque Marcelli Virgilij dicentis, *ę mēdis* quod nomine Dioscorides est vsum, significare quę repletionem inferunt fastidium. Nam reuera id nomen significat fastidiosa, aut anxietatem inferentia. Quod hic Adamantus nigra vomuerit, causa fuit non propria peplij aut ceparum facultas, non enim sunt melancholagoga, sed redundantia eius succi, quod ut insinuat Hippoc. dixit melancholicus Adamantus.

Febres in quibus ulcerantur labia, fortè sunt intermittentes, & tertianis refrigerationes: videntes vero statim ad manum soluta semper apparent.

Hæ omnes sunt notæ tertiararum intermittentium. Solent enim per æstuales tertianas exire circa labia quædam pustulæ, ex quibus ulcerantur. Quod quia non ita est earum proprium, ut non fiat aliquando per continuas, dixit *insignis*, innuens scilicet id non esse necessarium, sed solere ita fieri. Ut autem explicet modum intermittendi, addit & *quædam* *signa*, hoc est, & tertio quoque die habent refrigerationes, unde fit ut tertio quoque die habeant intermissiones, iuxta sententiam illam aphoristicam, Quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluantur, ita enim & quibus tertio quoque die, tertio etiam soluentur. Itaque sunt hæ tertianæ intermittentes. Addit aliud, quod talium etiam febrium signum est, dicens, videntes vero statim ad manum soluta semper apparent. Nam ut dictum est in enarratione sententiæ vigesima primæ sect. 1. huius sexti, biliosæ febres statim ac quis admovent manum vident, si tamen manus persistat, vincuntur & vix desinunt: tertianæ autem fiunt à bile, ut in commentariis de febribus demonstratum est.

Quæ quid insit articulis considerandum, annon etiam suppurentur.

Considerare iubet, annon suppurentur abscessus facti ad articulos. Quod duabus causis mihi videtur dicere, tum quiddam sæpe evenit falli chirurgos, putantes illis in locis, ut in genu, aut cubito pus esse, cum tamen non sit, sed pituita quædam crassa, inundationis quandam speciem præstans, ut in oedematis: tum etiam quia curare expedit, quoad fieri possit, ut sine suppuratione illi abscessus solvantur, quia a vlcera iuxta articulos sunt periculosa. Considerandum itaque ne fallaris, an non suppurentur, sed id quod suppurationis speciem exhibet, succas aliquis sit pituitosus. Considerandum, quoque an fieri possit ut non suppurentur, sed citra suppurationem solvantur.

In tuenda sanitate consuetudo spectanda est in victus ratione, regumētis, laboribus, somno, rebus veneris, & animi affectibus.

Ad artem tuendæ valetudinis pertinet hæc oratio, continetque enumerationem earum rerum, quarum usu constat victus benevolentium. Eæ sunt sex res non naturales vocatæ, & causæ à quibus perpetuo alteramur, quas Galenus in arte medicinali vno capite collegit, scilicet, eibus & potus, quod in ambitu est, motus & quies, somnus & vigilia, quæ excernuntur aut retinentur,

A & animi motus. Hæc sex causarum genera insinuat Hippocrates non obscure, victus nomine intelligit cibum & potum: nomine vestitus, quidquid nos circumstat: laborum nomine, morum & contrarium: ut etiam nomine somni, vigiliæ: nomine Veneris, alias etiam excretiones, quæ fiunt aut non fiunt: *proprie* autem nomine, motus animi aperte significantur. Consuetudines benevolentium ex his constans, & cum quis interrogat, qua consuetudine homo esset dum adhuc valeret, de modo quo his sex rebus uteretur, interrogat. Nam medicamentorum non est consuetudo bene valentibus, multò minùs causarum, quæ non semper sed casu quodam nos alterant, ut ensis, incursio ferarum, & fulminis. Superest ergo consuetudinem bene valentium esse in iis quæ perpetuo nos alterant, quæ quidem tantum sunt sex illa rerum genera.

Considerare oportet quomodo morbos ferant, a quibus quas figuras habeant, in qua loca conuersi sint, quo tempore inceperint, adfuerint, cessauerint.

Consideranda dicit hæc, quomodo morbos, hoc est quales morbos quis patiat, quod quidem potest pertinere ad speciem, aut ad constitutionem: duabus enim is rationibus dicantur quales, ut an biliosos an pituitosos, an acutos an chronicos patiat: deinde quas mutationes faciant, fecerintve. Quæ quidem fieri possunt secundum figuras ipsorum morborum, aut secundum affectas partes. Considerandū ergo à quibus quas figuras habeant, ut si ex tertianis quartani sint facti circuitus: & in quæ loca conuersi sint, ut si ex costis in pulmonem, aut ex pulmone in caput, ex renibus in coxam, aut ex hac in genu. Ac præterea considerandum quo tempore inceperint, adfuerint, cessauerint. Hoc est, initium, & finem, & id tempus vniuersale quo nunc sunt. Itaque cognoscere oportet tempus quo inceperint morbi, aut illæ morborum mutationes, quæcumque illæ sint, atque si adhuc adfuerint morbi, quo tempore vniuersali sint, si iam recesserint, quo die finiti sint. Esse enim magni momenti hæc tres considerationes, intelliges ex quædam multis, quæ ad eas pertinentia ab Hippocrate scripta sunt. Ad primam pertinet illud: Considerate vero future suppurationis initium oportet, ab ea die qua primum homo febricitavit, aut si fortè primum ipsum rigor prehenderit, atque si pro dolore pondus sibi factum esse dixerit; in loco quo dolebat: hæc enim in principis suppurationum accidunt. Ex his igitur temporibus eruptionem fore expectare oportet ad prædicta tempora. Itaque ut scias in quæ tempora expectare debeas eruptiones, refert considerare quando inceperint suppurationes. Quam utilitatem præstet agnoscere tempora morborum qui adfuerint, indicant illa, Inchoantibus morbis si quid videtur mouendum, moue, si vero consistunt ac vigent, melius est quietem habere, & illud. Quam in vigore fuerit morbus, tenuissimo victu uti necesse est. Itaque & curationis opportunitates, & victus instituendi rationem

E enim magni momenti hæc tres considerationes, intelliges ex quædam multis, quæ ad eas pertinentia ab Hippocrate scripta sunt. Ad primam pertinet illud: Considerate vero future suppurationis initium oportet, ab ea die qua primum homo febricitavit, aut si fortè primum ipsum rigor prehenderit, atque si pro dolore pondus sibi factum esse dixerit; in loco quo dolebat: hæc enim in principis suppurationum accidunt. Ex his igitur temporibus eruptionem fore expectare oportet ad prædicta tempora. Itaque ut scias in quæ tempora expectare debeas eruptiones, refert considerare quando inceperint suppurationes. Quam utilitatem præstet agnoscere tempora morborum qui adfuerint, indicant illa, Inchoantibus morbis si quid videtur mouendum, moue, si vero consistunt ac vigent, melius est quietem habere, & illud. Quam in vigore fuerit morbus, tenuissimo victu uti necesse est. Itaque & curationis opportunitates, & victus instituendi rationem

rationem indicant tempora morborum, quæ ad-
sunt: tempus autem quo cessauerunt facit ad se-
curitatem aut contrarium, quia nisi diebus im-
paribus febris reliquerit, solet recidivam pati.

IN quibusdam intemperantia terrorem in-
currit.

Quædam sunt quæ ægroti per intemperantiam faciunt, quæ tamen ferenda sunt à medicis, quia non sunt adeò noxia, siquidem Hippocrates ipse dicit, quoad fieri possit, gerendum esse morem ægotanti, atque paulò deteriore cibum & po-
tum, suaviorem tamen, meliori & iocundiori esse præferendum. Quandoquidem autem dicit paulò deteriorem, constat non quidvis esse per-
mittendum agere pro arbitrari, sed quædam esse valè mala, & nequaquam ferenda, in illis exponis possis, quia ex quibusdam erratis contingit pluri-
mum periclitari. Considerandum ergo in quibus intemperantia metum incutiat, quia ea minimè fe-
renda sunt, sed ponis abstinendum à curatione, ne quæ per intemperantiam ægroti evenetint, me-
dico imputentur.

Contraria victus ratio in morbis insituen-
da est.

Morbi petunt econtrariam victus rationem, ut
& curationem omoem. Iuxta hanc sententiam di-
ctum est illud. Omnis victus humidus febricitan-
tibus convenit. Nimirum ut abbi dicitur, medi-
camentum in alimento optimum. Itaque victus re-
cet in vnoquoque morbo institutus quædam cu-
ratio est, omnis autem curatio agitur per contraria.

Quod facile, quod difficile toleratur etiam
videndum est.

Hoc quoque magni semper fecit Hippocrates,
nam siue quid medicus sua arte circa ægotantem
molitus sit, siue quid illi sponte fiat, bona to-
lerantia confectio, mala tolerancia ooxæ indi-
cium est.

Victus ratio quantum fieri potest cognos-
cenda, nam illius ignoratio multas affert
calamitates.

Quàm multe calamitates nascantur, ex artis
bene instruendi victus ignoracione, disertissimè
indicaui Hippoc. in eo libro, quem de ratione
victus in morbis acutis scripsit. Reducam verò
tibi in memoriam exemplum quoddam ex libro
primo sectione tertia, ibi enim legimus, Phalonis
filiam, quæd intemperantiæ cœnara esset, mortuam
esse septima die.

A Optimis etiam medicis similitudines im-
ponunt, & dubitandi ansam præbent, sed
contraria efficit causa. Scio difficile esse ratio-
cinando curandi vias cognoscere, velut si æger
sit acuminato capite, si resimis naribus, si ali-
quantum succus, si biliosus. ægrè vomat, atrà
bile refertus, si iuuenis, si negligentet vixe-
rit, de his inter se collatis ratiocinari diffi-
cile est.

B Empiricorum istrumentum quoddam viru-
peratur hac oratione, & rationis via laudatur, &
inducitur eius difficultas. Empirici enim &
vulgares omnes videntur in morbis translatioe
à similibus, similibus videntes auxilium ad affectio-
nes quæ similes esse videntur. Quæ res impe-
ritis plurimum placet, quia cum paucas affec-
tionum differentias norint, quæ non sunt mani-
feste diuersa indicant esse omnino eadem. Bo-
nis autem medicis non ita, sed similitudines suæ
maximè suspicæ, utpote quæ imponunt & du-
bitandi ansam præbent, quæd prima quidem fron-
te similia similibus videantur curanda, sciant ta-
men illi multos morbos, specie etiam similes,
contrarias curationes desiderare, quæd à contra-
riis causis nati sint. Causæ ergo cognitio contra-
ria efficit, hoc est, errores illos & dubitationes
tollit. Velut si duo homines laborent dolore colico,
alter ex potu aquæ gelidæ, alter ex flatu, alter
ex bile, Empiricus quidem eundem videns mor-
bum eadem admovebit: rationalis verò contrarias
agnoscens causas, contraria. Male itaque procedit,
qui solas similitudines considerat, bene autem, qui
causas disquirat: adeò profectò utilis est causæ cog-
nitio, ut sepius oblit muli à magis causæ igno-
ratio, quàm speciei morbi, & loci affecti. Multò
enim minùs suscipere potest curationem, qui igno-
rat siue dolor à causa calida an frigida, quàm qui
ignorat siue colicus an nephriticus: atque ad fe-
brium curationem maioris est momenti, contemplari
humoris speciem in excrementis, quàm modum circui-
tus, & reliquam figuram. Itaque ad agnosce-
dam viam, seu methodum, qua morbus quivis cu-
randus sit, plurimum refert à causæ inuentione in-
cipere. Difficile tamen est ratiocinando cognosce-
re vias, hoc est inuenire methodos, siquidem diffi-
cile est inuenire, quæ sit affectio, quæ causa, qui lo-
cus affectus, quæ cuiusque hominis natura, & coo-
fuerudo, hæc ægræ omnia habent proprias indica-
tiones, seu insinuationes faciendorum, quas om-
nes oportet considerare seorsum, ac deinde ad se-
le mirò conferre, atque contrarias & mino-
res à contrariis & maioribus subtrahere, similes
verò opere æque plus aut minùs, ut quis in-
dicatio potentior est, aut debilior. Hinc enim nasci-
tor curatio omnis. Profert exempla rerum qua-
rundam, à quibus indicationes accipi possunt. Ut
si quis sit acuto capite, ut qui vocabatur ma-
crocephali, aut simis, aut aliud vitium composi-
tionis habens, si subficcus, ita etiam si bomidus,
calidus, aut frigidus: atque si biliosus, hoc est bile
redundans, tuncque an facile vomens an difficile
(nam hoc quoque est in peculiaribus naturis) an

Hiosus niger, hoc est atrabiliaris, ad iuuenis: ita etiam an puer, an senex, & an negligenter viuens, ad temperatē. Omnia enim hæc indicationes habent, quas scorum considerare difficile est, mutuo coniungere difficilius. Conferre figuram corporis ad naturæ cognitionem, intelliges ex iis quæ de physioomia scripta sunt in primo libro. Natura verò indicat similitum vsum, calidiora eorum calidioribus, frigidiora frigidioribus indigent auxiliis. Biliosum & difficile vomentem esse, quodammodo sunt contrariæ indicationes. Nam biliosa caro chymia petit expurgationem per superiora, difficultas vomendi prohibet: tales ergo erunt purgandi per aluum, quia cachochymia petit purgationem, difficultas prohibet per superiora fieri. Biliosus oger, indicatio est à succi specie, poscit expurgationem per inferiora. Iuuenilis ætas sustinet maiora auxilia, quàm senilis: puerilis indiget minoribus. Qui per bonam valetudinem sunt temperantes, exquiritores victu vti debent per morbos: qui vtrunque viuunt, liberi etiam vti cū curandi sunt.

Cui fistula rumpebatur, cum tussicula prohibebat quiescere.

Fieri poterat vt tussicula prohiberet hunc hominem quiescere, quia fistula. hoc est aspera arteria rumpebatur, aut vt rumpebatur fistula ob tussiculam assiduam quæ prohibebat quiescere, aut vtrumque. Certè maxima causa ob quam vlcera spiritalium instrumentorum difficulter sanantur, est quia citati sine expurgatione & quiete non possunt, vt neque vlla alia vlcera, neque expurgari sine tussi, tussis verò prohibet quiescere.

Evm cui apex hepatis complicatus erat concussus, repente dolor cessauit.

Mirabilis casus, doluisse hepar complicato apice, & concussione explicatum, ac dolore liberatum esse. Vellem autem diceret nos quibus complicatum apicem agnouit, & hepatis ita mutati positis symptomata. Non arbitror fuisse alia, quàm dolendi modum, & ipsam ægroti phantasiam.

Satyrus in Thaso, cognomento Grypalopex, cum esset annorum circiter viginti quinque, semen per somnum effudit sæpe, & interdum quoque sæpe ipsi prodibat, cum autem ad annum trigessimum peruenisset, tunc correptus mortuus est.

Tabescant ex gonorrhœa siue viri siue mulieres, quibus à quacunque causa inceperit, ad magnam recenter debilitatem res peruenit. & iis quibus ob magnam corruptionem semen effugit. Illi quidem vnam ob causam, quod scilicet solidæ partes omnium feminis fluxum priuentur alimento: hi

A ob duas, quod præter euacuationem ipsa seminis corruptio faciat compotrescere alimētum partium: quo fit vt valetur pauco, & eo corrupto, est autem vtrique arefcenti causa. Vt verò effluente semine, ob debilitatem recenter vasorum seminariarum, membra solida alimento priueantur, eadem causa euenit, quæ per diabetem ob debilitatem recenter reorum, priuantur omnes partes seroso humore. Scilicet partes generales, quum id quod traxant facile deponatur, rursum trahunt, atque tabeoria multum aliis detrahunt. Est verò semen succus coögener toti partium solidarum. Hoc accidit ei, de quo hæc historia narratur, in ætate calidissima, qui nescio an ob morbum vocetur ab Hippocrate. Satyrus, an id fuerit homini nomen, nam Satyriasis nomen de Priapismo potius dici consuevit, quàm de Gonorrhœa. Hic verò Gonorrhœa tenebatur potius, nisi forte tenebatur vtrique, complicari eorum possunt.

C Aderis palestra castos, qui Sthenens vocabatur, cum multum luctatus esset cum alio fortiori, & in caput cecidisset, digressus frigidam multam bibit. Subsequentem autem noctem transegit insomnem & difficilem habuit, extrema frigida erant. Postridie domum ingressus est, & glande supposita nihil deiecit, parum mixxit cum prius nihil mixxisset. Sub noctem lotus, nihilominus insomnem & difficilem habuit noctem, delirauit. Tertia die extremorum refrigeratio accidit, excalescens sudauit. Epota verò mulsam moruus est tertia die.

Iurauerim hunc hominem mortuum esse contumeliosum. Nam haud dubie sustulit eum raptus humorum in caput, ob magnam contusionem, quam in illud cadens accepit, si autem lethargicam, aut phreneticam, aut talem vllam contraxisset affectionem, vixisset diutius, sunt enim illæ longioris constitutionis, quando verò tertiæ die interijt, cum potuerit secundam in domum suam venire, a populestica aliqua passione aut conuulsione magna correptus est. Apoplexiam verò nullam notam narratur. Sed cum huic caput grauiter læderetur, & vt solet, ceruicis ocerui ac tendines macerarentur, corperunt succi qui forte redundabant biliosi in caput occurrere, cum verò ingruerent in neruos, accidit primæ nocte difficilis somnus, capite scilicet biliosam fluxionem recipiente, & difficilis item tolerantia ob eandem causam, & extremarum partium refrigeratio, ob neruorum mordicationem refugiente calore. Sed & quod sequenti die euenit, indicat raptum in caput. Nam neque supposita glande deiecit, neque mixxit nisi parum, cum antea mixxisset nihil. Suppressio enim euacuationum per infensa significat raptum in superiora. Sub noctem die secundam lauit, conciliandi scilicet somni gratiâ, nihilominus cum materia quæ se in caput collegerat esset multa, nihil profuit, sed habuit nihilominus quàm nocte superiori difficultatem, & somnum & tolerantiam, & insuper

F

delinquit, atque; vt ego inspicor, cepit conuelli. Tertia die refrigerata rursum sunt extrema, & calfactus sudauit. Mirum nisi medicorum qui aderant quisquam, bonam hinc spem conceperit, suspicatus aut bonam esse indicationem, aut certe tertianum cito curum. Verum hæc accidentia non figuræ sed malignitatis erant indicia, sequebanturque eundem raprum in caput, qui fieri cœperat à principio. Refrigeratus est ob mordicationem neruorum, calfactus sudauit præ anxietate. Poterat malignitatis huius medicos admonere delirium, & conuulsus motus, quæ à secunda die cœperant, & per illum sudorem non sedebantur, sed ceterabant potius. Nam necesse est, vt signa quæ per se sunt ambigua, ex aliis quæ cecedant, bona aut mala distinguantur, cum igitur mortuus sit, necesse est maligna affuisse. Quando autem hæc ita habent, consentaneum est non esse hunc hominem læsum potè aquæ frigida. Ea enim non malè bibitur à recenti casu, quippe quæ tardat motum sanguinis, prohibetque fluxiones fieri. Quare non idèd suspicor narratum ab Hippocrate, esse, sed quod ita factum sit, atque vt scias quo auxilio usus sit. Fuisset tamen bene consultum huic mox copiose mittere sanguinem, & assiduo frictionem & acrium clysterium vsu à capite retrahere, circa cervicem verò vt anodynus.

Melancholici plerumque consueverunt fieri epileptici, & epileptici melancholici. Horum autem quidvis præcipue sit, prout in alterutram partem morbus inclinauerit; siquidem in corpus, epileptici fiunt, si autem in mentem, melancholici.

Hunc locum interpretatur Galenus libr. 3. de locis affect. dicitque conuerti in mentem esse afficere secundum temperamentum, conuerti in corpus afficere secundum compositionem. Epilepsiam ergo fieri ab humore obstruente, melancholiam verò ab humore intemperiem inferente, & obrenitante mentis sedem. Itaque fiunt ab eodem humore eandem partem, sed non eodem modo afficiente. Non tamen æquè parata est omnis epilepsia in melancholiam abiit, atque melancholia in epilepsiam. Nam epilepsia fieri potest ab omni furore crasso, melancholia non nisi à melancholico.

Aderis Phaëtusa Pythæiconiunx periuuentam antea secunda fuerat, cum autem vir ipsius in exilium pulsus fuisset, muliebria multo tempore defecerunt, postea verò in articulos dolores & rubores acciderunt. Quæ cum ei contigissent, tunc corpus virile factum est, & omnino hisfutum, & barba producta est & vox aspera reddita, & cum omnia fecissemus vt muliebria elicerentur, non profuixerunt, sed mortua est, cum non diu postea vixisset.

Evenit autem & Namyssia Gorgippi uxori in Thaso idem. Videbatur autem omnibus medicis, quibus & ego forte adfui, vnica spes esse, vt in muliebre naturam reduceretur, si menses secundum naturam prodirent, sed neque huic potuerunt prodire, quamvis omnia tentaremus, sed non multo post mortua est.

B Mirabilis eventus, factas esse mulieres hispiditate, barba, & vocis asperitate viri similes, ob menstruum retentionem: vt videatur barba nasci viris, quod tales euacuationes non suant; feminis autem non nasci, quod suant. Quasi sanguis ille redundans & viscosus materiam præstet pilis. Quod tamen alia consideranti non probabitur, nam nasceretur barba etiam eunuchis, siquidem neque illis sunt menstrua. Non nascitur autem, quia excisis testibus amittunt virilitatem, contrahuntque muliebrem temperamentum. Non igitur tollunt barbam menstruum euacuationes, sed illud ipsam temperantem, quod menstruum necessitatem affert, tollit barbam. Sed rogabis, cur ergo eunuchi, qui carent barba, non habent euacuationes menstruas? Certè quia eunuchi sunt frigidiores etiam quam mulieres, & exercitiores, quorum illud facit vt minus sanguinis gignant, hoc vt plus discutiant: sunt verò frigidiores, quia nullos habent testes, feminæ verò habent aliquos exercitiores verò, quia cum mulieres non sint, virilibus negotiis sese vitæque inserunt. Itaque videtur barba non à mensuræ vacationibus tolli, sed à muliebri temperie. Sed si non tollitur à mensuræ euacuationibus, quomodo factum est vt in his mulieribus, illis retentis barba nasceretur?

C Certè causa præcipua barbae & hispiditatis temperamentum virile est, vt glabriciei muliebri, & hæc est quæ vim habet efficiendi. Accedit autem menstruum fluxus ad glabriciei causas, & eius euacuationes vacuatis ad causas hispiditatis. Quia materiam pilorum est fuligo, ea verò nascitur ex sanguine calcæto, quem menstruum euacuationes curi detrahant: insensibilis autem effusio, quæ per cutem viris copiosius fit, abundè suppediat. Non ergo nascitur barba quibuscumque menstruum euacuationes cohærent, quia sine efficiente causa materiam non est satis. In his autem evenit, ob ratam quandam naturæ, & mulieris, & sanguinis proprietatem, virili naturæ proximam, qua contrigit mulierem, & sanguine menstruo aliquot abundare, & virilem ferre calore. Quod certè vt rarum, ita & mirabile: atque ed mirabilius, quod mulieres fuerant antea fecundæ, nam viragines non solent fecundæ esse. Ob id Hippocrate, velut admirationem augens, narravit fuisset per iuuentam fecundam. Causa ergo peculiaris ac propria his mulieribus mirabilis huius eventus fuit sanguinis calor: qui cum ob mariti absentiam effluere cessauit (quia, arbitror, cum non satis muliebri esset naturæ, indigebat viri vt in muliebria ferretur) articulates fecit dolores cum rubore, quales scilicet per calidam podagram fieri solent. Quod vero primum podagrici fierent do-

lores, nihil habet admirationis, siquidem in aphorismo dicitur, mulier non laborat podagra, nisi menstrua defecerint. Si igitur menstrua liberant à podagra, menstruorum defectus eam affert. Mirabile verò quod postea subsequutum est effuso enim in totum corporis habitum eo sanguine, & multa fuligine in totam cutem lata, corpus vitile factum est, & hirsutum, & nata est barba, & vox aspera reddita, quia calefactione dilatata, & robustiora facta sunt vocis organa. Visum est medicis omnibus omnia facere, ut men-

sterna effluerent, cum verò ea alteratio naturæ esset admodum aduersa, neutrum fieri potuit, ut effluerent, neque ut diu viveret, sed utraque velut longissimè à sua natura acta cito mortua est. Videtur mihi in his vtendum fuisse missione sanguinis repetita ex quibusdam intervalis, quæ naturalem ordinem imitarentur, & balneis aquæ dulcis, & victu refrigerante. Sed utique tractentur, suspecti semper haberi debent magni à propria cuiusque naturæ recessus.

LIBER SEPTIMVS

EPIDEMIORVM

POST Canem febris grassabatur, in quibus multi manabant sudores, nec post sudorem agri omnino refrigerabantur, sed rursus incalescebant. Atque hæc mediocriter longa erant, & difficilem habebant indicationem, nec admodum sitim adferebant, paucis septimana non à die cessabant, alijs undecimæ, decimæ quartæ, & decima septimæ.

Parum affuit quin hunc librum septimum relinquere sine commentariis, quod viderentur esse in eo multe dictorum iam antea repetitiones, & narrationes multe, partim viciatæ ac confusæ, partim imperfectæ ac murilæ, atque ob id nihil utilitatis continentes. Visum tamen deinceps de hac re cogitanti, hoc quoque præsentis operis perfectioni adicere. Nam et si sint multa, quæ ut inutiles reiciantur, sunt etiam nonnulla, quæ merito studiosi desiderarent. Faciam igitur quod soleo, quæ dicta fuerint antea & explicata, præteribo; quæ omnino corrupta, expungam; reliqua pro meo capto interpretabor. Hæc oratio à qua liber incipit, occurrit antea in quinto libro contextu sexagesimo octavo, nulla fere vocum differentia, atque ut ego iudico, exactius ac melius quàm hic scripta. Quare hic nullam commentationem oportet me apponere, sed hunc locum secundum illum emendare ac restituere. Quod hic dicit, *παρὰ τὴν νόσον τὴν δυνάμειν*, dixit illic, *παρὰ τὴν νόσον τὴν ἀσθενείαν*. In quibusdam codicibus legitur, alijs undecimo, & duodecimo, & decimo quarto, & decimo septimo. Libro quinto legebatur, & vigesimo. In alijs etiam adiectum est, & vigesimo secundo. Quis scias, quæ sit legitima lectio? Neque enim vlla dies harum est, in qua iudicari non possent, neque in qua necessarii indicarentur. Poterant quibusdam paribus, quibusdam imparibus moueri, atque ita quibusdam paribus, quibusdam imparibus indica-

ri. Postremo in calce orationis legebatur illic, *καὶ τὸν λόγον*, quod verbum desideratur hic.

Polycratem febris corripuit & quoad sudorem præscriptis similia acciderunt. Id eductamento deorsum purgatus est multum, & febris adeò lenis facta est, ut obscura consistere præterquam in temporibus, & sub vespere sudores exigui accidebant circa caput, cervicem, & pectus, deinde etiam per totum ventrem, & rursus incalescebat. Circa duodecimam autem & decimam quartam intendebatur febris, & paucæ erant alui deiectiones. Post purgationem autem sobrietatibus usus est. Circa decimam quintam autem dolores ventris secundum lienem, & lateris sinistræ inanitatem corripuerunt. Calidorum quàm frigidorum admotiones minus proderant, cum molli per clysterem infuso usus esset; dolores cessauerunt (hoc ipsum etiam Cleocydæ doloribus & febre eodem modo laboranti contulit.) Circa decimam sextam calores mitiores esse videbantur, & deiectiones ex bile sinceræ erant, & mens audacior, Spiratio autem moderata, aliquando tamen aërem acuatim attractum rursus confertum expirabat, quasi deliquium animi pateretur, aut velut in umbræ sedens spirare solet is qui per aëstem iter fecit. Decima septima igitur vespere in sella desidens animi deliquium passus est, & diu sine voce & sensu iacuit. Aquam mulsam vix capiebat, fibras in collo distendens, utpote faucibus resiccatiss, & exolutis omnino viribus. Vix itaque seipsum redijt, & calores mitiores erant. Tandem vigesima secunda cessauit febris.

Polycrates, & Cleocydes duo quidem ægroti fuerant, ex iis qui ægrotauerunt illa tempestate, quam proximis verbis descripsit. Narrat vero Polycratis historiam diffusè, de Cleocyde tantum dicit obiter ac per parenthesis, eodem laborasse morbo, atque eodem modo. Cæpit etiam post præscripta verba in libro quinto narrare hanc historiam. Verùm quia illuc ad decimam quintam solum ducta narratio est, distulimus commentationem in hunc locum. Hæbuit Polycrates sudorem, & febrem, qualia scripta sunt in ea narratione, scilicet febrem sudorifera, continuam, mediocriter longam, & difficilis indicationis, & non valde fuculosa. Hic cum fortè videretur medicis purgationi opportūnus (non dicit qua die) pharmaco per aluum purgatus est, & febris est facta mitior. Quadam autem die, cum ob hæc non putaretur futurus paroxysmus, post meridiem ceperunt rursus sudores exigi, circa caput & collum (vnde scilicet solent plerumque sudores inchoari) deinde in totum ventrem processerunt (in libro quinto non reperitur vox illa ventrem, sed in totum) & rursus supercalfactus est aucto denuò paroxysmo, ut antequam purgaretur, & morbus totus denuò creuit. Nam circa duodecimam & decimam quartam, rursus accepit febris intentionem. Circa decimam quintam superuenit illi dolor circa lienem, & ileosinistrum, qui ad intestinà eo loco sita haud dubè pertinebat, quandoquidem clystere molli sedatus est, pendebat verò ex bile, ut & morbus totus. Nam ex admotione frigidorum opelem sentiebat potius quam calidorum. Et sequenti die (decima sexta scilicet) calores erant iam mitiores, & deiectiones ex sincera bile erant, & mens audacior, & spiritatio moderata. Nimirum quia deorsum cæcebat necura sincera bilis, siebant calores mitiores, & mens audacior & respiratio moderata. Nam sincera bilis per sublimēs partes agitata, & in cerebrum & cor fumos mittens, consuevit inferre anxietates, pulsillanimitates, & spiritus frequentiam ob anxietatem. Hæc bile deorsum repente destiterunt, factaque est febris tactu moderatior, & recuperatus animus, & moderata respiratio. Verùm cum morbus ob temporis conditionem non esset bonæ indicationis, non adeo processit hæc bilis subductio, neque cum tanta conferentia & tolerantia, ut non etiam bona bilis pars rursus recurret in superiorem, & symptomata attulerit etiam prius magis horrenda. Nam aliquando eadem ipsa die, corripiebatur repente respirandi difficultate, velut ab animi deliquio ingroente (nimirum cum respiratione recedant spiritus, qui deliquium incipiunt persentiscere respirant cerebrò & acutius) aut velut qui per æstus iter fecerit, & in vmbra se coëcit æstus, multò enim tunc sudatur evidentiùs quàm in ipso sole, vaporum exennatione & euacuatione insensibili remittente. Decima septima integre iam animi deliquium passus est, nam vespere decidens in sella cecidit sine sensu & motu, quod multum tempus durauit. Interim neque melicratum deglutire poterat, etiam in os infunderetur. Habebat fibras in collo diversas, tendentes scilicet venientes à cervice in clauiculas. Quod quidem dicit factum ob siccitatem faucium, & ob id ipsum non potuisse deglutire. Mihi verò videtur id con-

uulsioni signum fuisse, atque indicasse illud deliquium fuisse passionem aliquam apoplecticam, atque deglutendi difficultatem ortam esse ex eorum tendinum consensione. Impedit enim eorum tentio gulæ motum ad deglutitionem necessarium. Atque iam consensione, quamvis post febrem ardentem aliquot dierum facta sit, non censeo fuisse ex siccitate (non enim arbitror esset tam breui soluta) nisi placeat Hippocrati: redundantiæ bilis, aut rigorem illum & dntitiam, siccitatem appellare. Accedebat ad difficilis deglutitionis causas, imbecillitas omnium facultatum quæ aderat, non profectò tanta res ipsa & in essentia, quanta ob passionem cerebri & cordis à bile esse apparebat. Atque id res ipsa indicauit. Nam cum vixim tandem ad se ipsum redisset, calores expernit mitiores fieri, & vigesima secunda cessauit morbus. Mirum si sine aliqua euacuatione. Ego sanè suspicor vigesima, utpote quam indicat decima septima, quæ adeo insignem artulit mutationem, euacuationem aliquam incorpisse, ut sudorem, aut alui fluxionem, etiamque durasse vsque in vigesimam secundam, quæ die cum morbo finem inuenit. Difficilis sanè fuit morbus, atque inter cætera illud habuit autumnalis, & maligni, quòd per dies pares maxime moueretur, illud vero constitutione legitimi, quod cum illis moueretur, die etiam pari iudicatus sit, & quod cum duodecima ceperit crecere, iudicatus sit vigesima secunda. Nam patet dies quæ in viginti duobus medium tenet, duodecima est. Hæc itaque modo hoc acta sunt. Sed rogabis, cur hæc febris non desit post expurgationem, si tempestiue purgatus est? Hæc dubitationi occurrat Hippocrates dicens, deiectiones exiguæ, sorbitionibus post purgationes vsus est. Quasi diceret, quia non est euacuationum quantum oportuit, & post purgationem deliquit in victu. Nam ut dicitur, secundo de ratione victus in acutis, cum cessauerit purgatio, minus est sorbendum quàm quis consueuerit, postea paulatim est redeundum ad maiorem copiam. Hic vero non ita fecit, sed mox à purgatione copiosis sorbitionibus vsus est. Quod sanè erratum committunt hodie vulgates omnes medici, mox ab ipsa purgatione, quin & in ipsa purgatione augentes cibum, quasi id quod est delectum cito sint exequantur. Quod quàm noxium sit vel ex hac historia intelliges: nam quasi graue quoddam, & periculosum esset erratum, animaduertit Hippocrates sorbitionibus post purgationem vsus esse hominem.

Pythodorum circa idem tempus febris continua corripuit. Octaua die sudor contigit, & rursus incaluit: decima rursus sudor; duodecima sorbit succum, & febris vsque ad decimam quartam obscura fuit, in temporibus verò erat, sine siti tamen, & ipse sibi sanus esse videbatur, singulis diebus sudores contingebant. Decima quinta verò insensum pulsi sorbens vomuit bilem, & alui deorsum turbata est, & febris exacerbata rursus deiecit, & sudores multi contingebant, & corpus totum

785
 dores. Talis autem quidam erat oblitio, cum interrogasset de eo quod pando ante audierat, aliquo interposito tempore rursus interrogabat, & repetebat quasi non interrogasset, atque sodesidere oblitiscabatur, nisi quis ipsum admoneret, & ipse sibi conscius erat eius affectionis, neque ignorabat. Spiratio qualis est per sanitatem. Ultra trigesimam vero diem usque ad quadragesimam dolor ventris multum crescebat, & supinus decumbebat, neque se tantillum convertere poterat, & quia dolor erat vehemens, aliorum ope qui cibum exhiberent, indigebat. Alui deiectione multa erat, discreta, tenuis, & coloris vinosi, quacunque tandem ingessisset, & aliquando subcurrenti. Et corporis robur in extremam colliquationem & impotentiam degeneravit, ut surgere amplius non posset vel alio sublevante. In medio autem umbilici & cartilaginis, qua est circa hanc regionem manu apposta, talis percipiebatur palpitatio, qualis neque a cursu, neque a dolore suscitari posset. Cum per duos dies bibisset novem circiter heminas Atticas lactis asinini excocti, biliosa purgatio exorta est vehemens & dolores cessaverunt, & ciborum appetentia accessit. Pestis bubalis lactis cum quatuor circiter heminis bibis, singulis diebus duos cyathos, primum aqua sexta partem, & vini nigri & austeri modicam admiscens. Semel autem cibum capiebat sub vespere, panis subcineritij dimidiatam circiter choricem & pisciculam saxatilem simplicem, aut caprina vel ovilla carnis frustulum. Lac potabat usque ad quadragesimam diem, post primos decem dies sine aqua, sed cum vino nigri medicam portione. Post septagesimum iam diem a primo post balneum, sub noctem sudor exiguus accidit. Exiguo vero potu utebatur, eoque post cibum, aut austeriore, quod eius cupiditate caperetur.

Non narrat quis fuerit huius morbi exitus, an liberatus iam tandem post tam longam agrotationem homo sit, an protus in tabem incidit. Ego certe omnes feci ita affectos vidi postmodum perire tabidos: euenit tamen nonnumquam in etate florente, hominem alioqui natura robustum paulum velut reuiuiscere. Vnicus mihi nunc in mentem subit ita affectorum, quem liberari viderim. Sed quae fuerit hae affectio, quam adeo periculosam dicimus, enarremus. Imprimis dysenteria cum continua febre laboravit. Vnde consentaneum erat mox timere morbi malignitatem, quibz scilicet febris inuaderet a principio cum euacuationibus. Scitum enim est illud secundi libri huius operis, decretoria ne statim appareat. Sed & qualitas executionum malignitatem indicabat, cum essent deiectiones biliosae, tenues, multae, & mediocriter cruentae. Fiebant enim multa bile tenui regurgi-

A tante per intestina, adeo acti, ut vlcendo ac radendo, sanguine tingeretur, & vehementer moueret ventris dolorem. Vererrimi, ut nuper notauimus, contincbant agrotos primam septimanam cum solis potionibus, secundam sorbitiones praebentes, veniebant deinceps ad cibos: ponopjes vero tribuebant non eisdem omnibus, sed cuiusque morbo accommodatas, ut & sorbitiones, & cibos. Huic datum est primum postquam serum laetis, deinde postquam purior, hoc est in quo extincti essent igniti lapilli, aut orbiculi ferrei. Quod quidem iuxta dysenteriae indicationem est factum recte.

B Nam videntur primum extergentibus, & expurgationem faciliorem reddentibus, quale certe serum est, deinde temperantibus succorum moderatitatem, & oblenientibus vlcera, & nonnihil adstringentibus, quale est lac asinarum. Nam lapillorum ignitorum immersione absumitur serum, & deponitur facultas expurgandi, & comparatur adstricchio quidam: ipsum vero per se lac est temperans, & pingue, praecipue vero crassius signum. Ita mentis factum est, ut huius potu dolores mitterentur, & deiectiones essent minus cruentae.

C quoniam vero materia supererat adhuc multa, biliosa deiectiones procedebant, & exurgebat crebro, etsi cum minori labore: ut diceret iam curatam esse laetis qualitate dysenteriam, superesse vero ob bilis redundantiā diarrhoeam. Febris post primam septimanam adeo est remissa, sedata scilicet iam in intestinorum vlcetatione affectione phlegmonosa, quae talia vlcuscula saepe comitatur, ut ipsi agroti & multis eorum quiderant, nulla prorsus esse videretur. Cum vero nondum maneret purum corpus, & intestina adeo aciem & exultam fluxionem pati cessarent, factus est exulsa bilis in superiora recurfus, & ob id ceperunt superiores partes biliosiores esse, quod indicabat pulsus circa tempora (dictum iam saepe est vocari ab Hippocrate) & lingua ob siccitatem vltimae (nimirum ut natus lingue humiditas facit balbutiem ob molliciem & infirmitatem, ita siccitas ob immobilitatem) & quod fuculosus esset, quamquam id non nimis, quia febris erat exigua, satis vero ob siccitatem, cui etiam accessabat petuigilium, erat enim etiam sine somno. Ita transiit totam secundam septimanam, deinde secundum consuetudinem vlcatur sorbitionibus, & vino. Sorbitionibus quidem, quia erat elapsa septimana prima: vino vero quia febrilis, ut dixi, erat exigua, (nam aliqui vinum in potionibus ponebant, non in sorbitionibus.) Cum iam ad decimam quartam peruenisset, oborti sunt tumores circa aurem vtramque duri & crudi, dolores vero moderatos afferebant, itaque erant phlegmones scirrholi cerebro deponente excrementa in partes adenosas facti. Nihil tamen attulerunt utilitatis, quia euanescent, hoc est disparuerunt repente, neque resoluti sunt paulatim, neque suppurati, quid periculosissimum esse testatur Hippocrates: saepe, atque fortasse tuberculorum retrocessu factus esset intestinus albus phlegmon, nisi deiectiones biliosae persisterassent. Verum haec nunquam cessabant, & semper erant biliosae. Cumque vellet iam diari hae occurrere, sorbit inquit in farinam herbam. Non dicit quam herbam, licet vero intelligere aliquam

D

E

F

earumque ad cohibendam aluum sunt accommodatae, ut plantaginem, aut ochrasim, aut pentaptyllon. Parata ergo illi est forbinio ex farina triticea, & tali quapiam herba coctis, & moderatiores facti sunt dolores, & egestiones biliosae esse destiterunt, & factae sunt multae & crebrae micturitiones, hoc est, aquosae. Argui neque hoc quicquam contulit, cum ne tunc quidem expurgatum esset laeum corpus, ut liceret cohibere biliosas deiectiones. Suppressa iterum est bilis, & rorsum recortit forbinio in hypochondria & capot. Quod indicant fastidium ingens adeo, ut cibum vehementer abhorreret, nec sine magna viaci periret, & calor, & linguarum ariditas, & sitis, quae tuoc demum aucta sunt. Sudores vero nulli fiebant, natura scilicet nihil notatu dignum per corporis habitum expellebat. Accidit etiam tunc oblitio quaedam illi (quae haud dubie ex mentis alienatione erat posita, quam ex memoria ipsius per se lesione) similis illi oblitio, in qua fieri solet in phreniticiis, aut in quibus iam iam insania imminet. Nam cum interrogasset quod paulo ante audierat, rursum interrogabat, & rursum repetebat, quasi nunquam interrogasset, atque cum alicubi sederet obliuisceretur inde surgere, nisi quis ipsum admoneret. Atqui et ipse sibi conficius huius passionis, neque ignorabat. Haec certe melancholica erant, significabantque mentem nigra evaporatione in caput delata ex bile vitia laedi. Nonquam autem basit multum talis bilis citae spiritalis partes, & ob id respiratio erat qualis per sanitatem. Haerit verò plorima circa hypochondria, quae à trigesima vsque ad quadragessimam diem tantum dolorem ventris excitauit, ut nisi supinus decumbere non posset, neque tantillum se posset conuerrere, neque cibum quidem praedolore vehementia sua manu caperet, sed opossuisset, ut alius ei indulgeret tribueret. Addebat dolore fractus. Alii egestio erat multa, *Aureolus*, hoc est diuersa & male cohaerens, tenuis & coloris vinosi, quaecunque tandem ingessisset: hoc est colores potuum & eduliorum, apparebant in deiectione, quaecunque essent ingesta. Quod incoctionem significabat, & debilitatem maximam facultatis ventriculi, quae quidem in ita affectis fieri consuevit, ut & acida cruditas naturali calore debilitato per caloris ignei exuperantiam: aliquando etiam erant colores subueruati, similem etiam (arbitror) iam patiente hepate debilitatem. Nam per talem, ut ex prima coactione exeurit tenuia referentia coloribus ipsos cibos, ita ex secunda subueruata quodam similia carniū loturae. Inter vmbilicum verò & cartilaginem apposita manu, talis sentiebatur palpitatio, qualis neque à cursu, neque à dolore circa cor suscitari posset. Constat hic palpitacionem vocari, non eam solum quae à Galeno exactius distinguente nomina ita vocatur, sed omnem subiectarum manui parum moritationem. Nam is cordis motus qui à cursu fit non est palpitatio sed pulsus, neque qui à dolore, sed tremor. Atque is eodem motus, qui in praesentis historiae aegroto sentiebatur, erat pulsus. Fit verò multis egrotantibus eo in loco pulsus quidam insignis eius arteriae, quae per spinam descendit ob affectum pblegmonosum eius loci, qui quidem aliquando fit in acutis morbis, & ut dicitur in prognostico, significat periculum & furorem, aliquan-

do etiam manet post acutos morbos, bile vitia collecta in hypochondrio, sitque affectio eo loco canicrosa, ex qua perpauci euadunt, plerique tabescent. Velor hic, cuius corporis robur in extremam collimationem & impotentiam degenerauit, hoc est, totus corporis habitus talis erat, qualis in tabidis, & extrema macies, & debilitas tanta, ut neq; alio quidem subleuato forgere posset. Hac occasione purgatus est copioso haustu lactis asinini excocti. Accipit verò duobus diebus circiter noceum Articas cotylas, quae capiont vncias 8i. Erat veteribus familiaris vios huius lactis ad purgandam bilem, ut facile cōstat legendo librum secundum de ratione vitelae io a cutis: quem vsu ego nō sine magna utilitate sum aliquando imitatus, cogens aegrotos accipere huius feri aut huius lactis, quod etiā est valde ferofum, plusquam duos sextarios. Lac coqui debet, ubi non potest esse recens multum, & per se caleos, ne accescat: ferum datur melius frigidum: hic certe biliosa purgatio vehemens oborta est, & dolores ventris cessauerunt, & recedente bile accessit ciborum appetentia. Postea accepit per dies duodecim summo mane lac bubulum, quod facilitate expurgandi longē inferius est asino, pingue tamen est, & nutrit multo plus quapropter tabescenti ex dysenteria post expurgacionem erat accommodatissimum. Tabes enim post corporis expurgacionem petit nutritionem: dysenteria post extersionem petit inunctionem ex aliquo pingui. Accipiebat verò quotidie cyathos duos, hoc est vncias 3. Itaque accepit his omnibus diebus fere cotylas quatuor Articas. Addebatur verò huic portio matutinae aquae pars sexta, & vini nigri austeri parum. Itaque potio accipiebat lactis bubuli vncias 3, aquae viciam semissem, vini austeri nigri parum. Fiebaturque ita portio pinguis, nutrienda, & non nihil adstringens, antea etiam per totum ferē morbum (nam à decima die vsque ad quadragessimam) accipiebat summo mane potionem dictae similem, praeterquam quod non accipiebat aquam, sed solum lac (non explicat qualem, fuerit verò asinum, aut equinum quod illi est proximum, fortasse etiam caprinum, nam & hoc probatur) & vini nigri partem modicam, ut fortasse sextam. Haec quoque potio ex lacte & vino commixtis familiaris erat antiquis, ut ex aliis etiam huius operis locis constat: hoc autem tempore nullus est eius visus, quod timeant medici ne facile accescat. Sed visus quoque quo utebatur, sapiebat plurimum veterem illam medicinam. Nam accipiebat cibum semel in die sub vespertam, contra ac tunc fit, nisi in ratis quibusdam morbis. Verum hoc non est mirum, eadem enim ratione veteres dabant cibos vesperti, & non dantur in meridie, vtrumque enim fit iuxta temporis conditionem, & hominum mores. Accipiebat verò panis subcineritij dimidiatam circiter chancen, & piscium laxatulum teoem, aut caprinae vel ouillae carnis frustulum. *Aureolus*, autore Galeno cap. a. primi de alimentorum facultate, omnium est deterrimus, quia praeterquam quod inaequaliter coquitur, malam qualitatem à cineribus accipit. Fortasse vocat hic subcineritium ad ignem tostum, postea quam sit in furno coctus. Talis enim per diarrhoeas non inuoluitur datur. Sin autem vocat subcineritium, cum qui propriè talis est, rudior illius se-

culi imputandum est, quò malè paratis & pane & obfusis in commune homines vebantur, non tamen hoc & alia huiusmodi imitanda nunc sunt. Fructum enim potius cultiori victu quem tempus attulit, & hominum ingenia. Chænicis dimidium est paulo plusquam libra none vulgaris & mercatoria. Nam duo sextarii constituunt chænicem, sextarius vèro capit uncias duo de viginti. Pisciculum laxatorem Galenus commendat lib. 7. Meth. pro arescentibus, simplicem intelligo vocari simpliciter paratum sine muria aut garo, quasi non salinè medicas, neque aliter conditum. Carnem capream & ocellam viroperat Gal. etiam 3. lib. de alim. fac. cap. 2. quasi mali foeci, & alteram excrementosam, alteram screm. Quare neque hoc imitandum est, nisi forte *ψαδν* dixerit, vt tenebram ætatem animalium significaret, dederitque carnem capelle, & agninam. Has enim in tam longo morbo & arescente homine, non erat omnis licentiosam concedere. Itaque hoc victu peruenimus ad quinquagesimum diem est. Postea cum balneis vteretur, quotidie corripiebatur sub noctem post balneum sudore modico. Non vrebatur autem multo potu, neque crebro, sed solum post cibum, & tunc austeriore, quod eo delectaretur, non narzæ quæ exurum habuerit morbus. Fortasse, quandoquidem non dicit esse mortuum, liberatus est psularum. Ego vero quod certo affirmem non habeo. Sudor enim ille Æni solet sub noctem, non solum in squibus corpora excren emola psularum purgantur, sed etiam tabidis. Abhorreere vero à potu, & austeriore delectari, eorum est quibus bilis redundat, & effusa per totum est, aqua enim illis & omnis moderatus potus insuavis fit, solus vero austerus gratus, quod austeritas bilis amaritudini occurrat. Itaque etat adhuc corpus excrementosum, gracile, & debile, nescio quid de eo æctum sit. Certe non euasit breui, sed si quàm maximè erat natura robustus, vix longo tempore fuit liberatus.

Cresciti autem quod in farina assumptum est magis contulit quam caprinum serum, cum dolores & labores totum venarem occuparent, & crebro exurgeret, & subcrenata deiceret, & pedes tumerent à viginti quinque ferè diebus. Contulerunt eadem Adrianos filio autem Canas lac asininum coctum.

Hi quoque laborauerunt dysenteria, & eisdem remedijs vsi sunt, puta lacte asinico, & sero caprino, & sorbitione ex herba & farina. Quorum facultates in hystoria filij Eranolai dicte sunt. Hoc autem Hippocratis diligentiam testatur, quod nota uerit quoniam maximè anxio leuaretur, quicunque famili morbo per eam tempestarem correpti sunt. Cresciti quod in farina assumptum est dicit contulisse magis quàm caprinum serum. Hec phras. *ἡ τῆς ἀσίνης* significare solet nihil aliud quam farinam ipsam. Hic fortasse refert id quod nuper est dictum, significatque herbam in farina coctam. Dicit vero habuisse hunc dolorem, & labores per totam ventrem, & multam surrectionem & sub-

A crentiam, quod est habuisse dolorem intestinorum ob eorum affectionem, labores vero ex crebra surrectione ad deiectionem, eam vero fuisse sobrenentam cum tumore pedum, quia viginti quinque iam diebus hominem tenebat. Quæ notæ euidenter significabant dysenteriam cum debilitate concoctricis in hepate, unde hydropsis periculum ob refrigerationem impendebat. Hoc casu merito sermum erat inutile, vt potius refrigerans, & aqua magis repleti; iuuabat vero herba aliqua corroborans in psilicula, vt alterum firmaret hepatis, alterum muniret intestina. Eadem inquit contulisse Adriano, quod, vt arborur, eodem modo laboraret. Puer vero Cænei iuuatus est asinino lacte, quod, arbitror, sine hepatis debilitate esset biliosior.

CYdis filium circa Solstitium hyemale corripuit rigor & febris, auris dextra & capitis dolor. Huiusmodi autem dolor statim à puero illam comitabatur cum destillatione, & fistula & grani odore. Cum autem ita se haberet, plerumque erat sine dolore: tunc verò dolor aderat vehemens, & capitis dolore consistebatur. Secundà aut tertià die bilis vomitatu accidit, desideranti subtilissem quid lentum prodijt, velut ex ovo subpallidum. Quartà & quintà sub noctem aliquantulum delirabat, & auris capitisque dolor vehemens & febris adebat. Sextà à mercuriali alo detecit, & calor & dolor cessasse videbantur. Septimà velut sanus erat, in temporibus autem pulsatio non cessauit, sudor non est abortus. Octauà succum sorbuit, sub vesperam autem betam sumpsit, & noctu dormiuit omnis etiam doloris expertus. Nonā sub Solis occasum delirabat, sub noctem vero capitis & auris dolor vehemens accidit. Aurem autem pus effundere contigit circa hoc tempus, cum maximè doleret statim à principio. Per totam autem noctem nona diei, & sequentem diem, & noctis maximam partem nullum cognoscebat, suspirare verò persenebat, die autem ad seipsum redijt, & dolores cessauerunt, & calor factus est mitior. Cum autem Mercurialem sorbuisset, undecima demisit aluus pituitosa, mucosa, grauelentia. Duodecima & decima tertia moderatè se habuit, decima quarta à sanimo mane incipiens vsque ad meridiem toto corpore sudabat cum somno & graui sopore, nec nisi agere excitabatur: sub vesperam autem expectatus est, & corpus moderatè quidem refrigeratum est, sed in temporibus pulsatio persenerant. Decima quinta & decima sexta succis vtebatur. Decima septima vero dolor eorumdem rursus sub noctem redijt & delirium, & pus effluebat. Decima octaua, & decima nona, & vigesima furioso sese habebat modo, & vociferans,

batur attollere sese tentans. Cum autem caput sustentare non posset, manibus protensis semper aliquid frustra venabatur. Vigesima primâ exiguis accidit sudor circa dextrum latus & pectus & caput, vigesima secunda circa faciem plurimus erat. Per illud verò tempus, si quidem voce plurimum conaretur, loquebatur perfecte quæ volebat; si verò temere, semiperfecta proferebat, & ore resolutum tum maxilla tum labia semper movebantur, quasi vellet loqui, crebre erant etiam oculorum motus ac intuitus, & in oculis dextro color qualis dictus est, aliquantum cruentus, & superior palpebra intumuit. & circa maxilla extremum rubor erat, & omnes faciei vena aded compacta erant, ut manifeste essent, nec oculis amplius nitebatur, sed intente intuebatur & palpebras in superiorem partem distrahebat, quasi aliquid in oculum incidisset. Et cum biberet, potus in ventrem & pectus descendens sonitus audiebatur, qualis etiam Charradi accidit. Spiratio autem fere semper moderata fuit. Lingua qualis est peripneumoniciis, ab initio ex pallido candida, & dolor capitis perseverans. Cervix semper immobilis, nisi quum eam cum capite circumferre cogebatur, & pars quæ ex cervice in spinam excurret, recta & inflexibilis erat, & decubitus erat qualis dictus est, nec semper supinus erat. Pus autem iam serosum & album effluebat, operosum erat illud spongijs detergere, gravi odore exuperabat sub extremum tempus, nec pedum contactum admodum percipiebatur.

Hic hand dubie mortuus est, tamen id dicere Hippo. omiserit, nisi forte id insinuerit, dicens sub extremum tempus, sub extremum scilicet vitæ tempus. Hic puer statim à parulo laborauerat ris dextræ humiditate, quem morbum Hippocr. aphor. 24. sect. 3. dicere pueris recens natis familiarem. Habebat verò dolorem dextræ auris cum destillatioe, ac fistula, & gravi odore, hoc est, patiebatur cum dolore & fistula diuturnitate iam facta puris foetidi effluxum. Verum etsi semper habet, non semper dolebat, sed plerumque effondebat sine dolore pus. Quodam autem anno circa solstitium hyemale, coacta illi in aërem (ut scilicet fieri solet in partes, quæ sanæ alioqui debiles) nova fluxione, atque adeo iotorum caput, præcipue secundum id latus, obtutus illi est in auditorio porto, & proximis partibus phlegmonosus affectus, qui tamen adhibitis idoneis auxilijs aliquoties mitigatur, tolli verò omnino non potuit, quin postremo, communicato malo ipsi cerebro, quod est mentis sedes & nervorum principium, cum delirio & consilio moretetur. Principio rigor eum apprehendit, quod arbitror, partes sentientes humor acer tangeret, mox firmato humore & in inflammatione

A oborta, successit febris & dolor vehemens, & patiente simul toto capite cephalalgia. Secunda autem tertia die (non alia causa videtur ea particula distinguendi, quodam, quod non satis recordatur) accidit vomitus biliosus. Hoc quoque symptoma fieri crebre solet per cephalalgiam & hemikraniam, ut & per capitis vulnera, ob eam compassionem quæ inter caput & in os ventriculi intercedit. Hoc ipso tempore cum desideret, deliciebat ex alio subbiliosum quid lentum, velut ex ovo subpallidum. Ne putes hac periphrasi descriptionem bilis vitellinæ contineri (ut fortasse quispiam censeret sequuntur sententiam Avicennæ, qui eam bilem mistioe bilis & pituitæ fieri potat) sed deiectionis cuiusdam ex pituitæ & bilis mistioe factæ, similis non vitello oui, sed albumini bile tincto. In ovo enim non vitellus, sed albumen lentum est. Dicit ergo esse quod egrediebatur subbiliosum lentum, quasi albumen oui, quod tinctum redditur subpallidum. Itaque ab excrementis supernæ & infernæ bilis & pituitæ redundans significabatur in toto corpore. Quarta & quinta die sub noctem delirabat aliquantulum, & dolor capitis & auris vehemens, & febris aderat insignis scilicet. Quod morbus hic noctu ingrauesceret consensum est rationi. Dicitur iam enim esse non semel antea in hoc ipso opere morbis capitis & oculorum (est autem eadem ratio & aurium) id esse familiare. Crescebat verò hæcenus malum, & cum eius impetus in septimum videtur diem timeretur, iuxta id quod in prognostico dicitur, nam minores septimâ sur citius ab hoc morbo intereunt, ob motum vigentiam volentibus medicis periculum antevocare, & deorsum repellere materiam, sextâ die mercuriali purgatus est per inferiora, & res optime cessit. Nam perfecta purgatione calor & dolor cessasse videbantur, & septimâ erat velut sanus. Hoc exemplo sese tuebantur vulgares medici, qui omnes ægros qui coctis febribus tenentur die sextâ pharmaco purgant, ut magna huius humoris pars detrahareretur, antequam prælium quod dies septima solet afferre superoccurat. Verum id oio est faciendum incaute neque temere. Interest enim quæ sit morbi constitutio. Nam ne scitis quidem omnibus est septima indicatoria, sed alijs videri, alijs decima, quarta, alijs etiam vigesima septima. Scire oportet an turgens materia, an non vergeat multitudo, an sit aliqua coactio; an cessaverint principij fluxiones, an secus: his omnibus perspectis iuxta commones præceptiones expurgandum erit, aut secus, non sextâ die solum, sed & quiesce, & quarta, & tertia, aut etiam prima, si res ferat, quod in commentarijs quarti de ratione videtur explicuimus. Huic oio male videtur neque præter artem datum medicamentum, quia oodum sentiebatur cessasse fluxio, & in tenuiora expurgatione non opus est expectare coactionem. Posset non deterius dari die tertiâ cum lenta & biliosa deici corpore; fuissetque fortasse deuita molestia quartæ, & quintæ: nisi id prohibuit vomitus biliosus, qui ex eadem accidit occasione. Quæ verò antea non potuit, recte est acta die sextâ expurgatio: à qua cum quammaxime sanus esse videretur, restitit tamen quiddam (ita ut fieri in ijs quibus est futura recidiva, Hippocrates ipse ante)

durat (quod vñdum esse hominem liberum à morbo. sed rursus deterius habiturum indicabat: pulsatio scilicet non cessauit in temporibus, quæ affectus phlegmonosi nondum solati integrè erat symptomata: cui accessit non esse obortum sudorem, neque verò vllam aliam decretoriam euacuationem, qua id quod in capite fuerat firmatum, solum iam esse putaretur. Vbi animaduerte Hippoc. etiam post euacuationes arte factas, quæ videbantur plurimum contulisse, desiderare spontaneas & decretorias. eaque non succedere, suspexit salutis cense-
re esse signum. Atqui cum medicus, siue is fuerit Hippoc. siue alius quispiam (plurima enim, vt in superioribus historiis vidimus, narrat in hoc opere Hippoc. quæ ab aliis gesta sunt) videret vñdum esse solum morbum, in victu ægrotantium hominem continui, deditque octaua à forbendū succum (fortasse ptisanæ) ad vesperam autem dedit succum betæ, quem constat esse medicamentosum, & aluum subducere. Quoniam arbitror, viderat mercuriali esse hominem adurū, etiam sequebatur viam quam monstrare videbatur fortius. Quod consilium ego in curationibus magnopere probo, modo nihil agatur nimis. Non narrat an hac die alius sit soluta, tamen vtrunque euenierit, homo habuit melius. Nam ea nocte somnus accidit, & fuit admodum sine dolore, & vna ad Solis occasum lætus erat, & sine omni querela confabulabatur. Atque cum omnes (ita vt sit) essent domi læti, & inciperet morbi curam deponere, eadem nocte redit capitis & auris dolor vehemens, simulque cum maxime doleat, statim à principio, hoc est, antequam dolores vlla ex parte mitterent, pus fluxit ex aure, & per totam eam noctem (quæ vna erat morbi, & diem sequentem) & maximam noctis (sequentis scilicet diei) partem non agnouit quenquam, & perseuerabat suspirare, quod delirii signum erat. Nam suspirare est spiritum magno & raro vri; quod vt in prognostico dicitur, delirium indicat. Sed miraberis, quomodo fieri potuerit, vt in ipso doloris impetu pus efflueret, viderit enim vt in aphorismo dicitur, tunc maxime generari, quomodo dolores ac febres sint, exitu verò cum iam est confectum. Certe coniectandum est, hoc pus per dolores quartæ & quintæ diei esse genitum, erupisse verò per dolores nonæ & decimæ, in interuallo quo confectum pus erat, neque adhuc rumpebatur abscessus, mitius habuisse omnia. Non tantum autem per hos secundos dolores prius geniti, puris accidit eruptio, sed cum corpus adhuc esset impurum, noua fluxio est concitata & noua puris generatio: itaque alius motus priori omnino similis, præterquam quod interuallum vsque ad dolorum recrudescentiam (vt Hippocratico modo loquar) habuit longius. Nam à fine decimæ diei vsque ad decimam septimam, quæ febres, dolores, deliria, & puris eruptio redierunt, melius habuit. Itaque inter primos & secundos dolores vnus fuit quaternarius, inter secundos & tertios duo quaternarii. Causam autem fuisse existimo iudicationem quandam imperfectam, quæ die decimaquarta intercucurrit. Sed quid duobus his quaternariis ædum sit exponamus. Cum dolores & deliria per maximam partem noctis decimæ diei perseuerassent, sequenti diei initio ad seipsum redijt, & dolores cessauerunt, & calor febrilis factus est moderatus. Medicus verò eadem die, eodem prorsus

A consilio quo antea fecerat, dedit mercurialis succi forbendum, & successit tunc quoque bene. Nam fluxere deorsum pituitosa, mucosa, maleolentia. Duodecima & decimatertia habuit se moderatè. Decimaquarta à summo mane incipiens vsque ad meridiem toto corpore sudabat cum multo sopore, vt ægrè excitaretur. Vespere autem expectatus est, & corpus moderatè refrigeratum, vt videretur scilicet extincta febris. Mirum si hæc iudicatio non adeo placuerit medicis qui aderant, vt putarent iam inde ægrotum futurum sine periculo. Nam erat sudor calidus (dixisset enim Hippocrates haud dubè, si esset frigidus) per totum corpus, sine anxietatibus, (siquidem cum somno) & tactu quidem videbatur febre rem subsistisse, & hæc omnia in die decretorio sunt acta. Restitit tamen nunc quoque idem imperfectæ solutionis, & futuræ recidux signum, quod prius aderat, puta pulsatio in temporibus: quapropter decimaquinta, & decimasexta, non cibis vt qui bene iam se haberet, sed succis vsus, vt qui adhuc ægrotaret, decima septima sub noctem correptus rursus est dolore earundem partium, & delirauit denud, ac pus effluxit iterum, processitque delirium ad manum, & durauit vsque ad vigesimam primam, & vociferabatur attollere se tentans: non poterat tamen miser caput sustentare, sed protendebat manus, & semper frustra venabatur, quod qua ratione accidit phrenitici, in prognostico commentatio & multis aliis locis explicatum à me est. Vigesima prima accidit sudor circa dextrum latus, & pectus, & caput: hoc est, circa dextrum latus pectoris & capitis. Qui sudor non decretorius (fuit enim æqualis) sed symptomaticus multitudine & debilitate indurum, iuxta id quod in aphorismo dicitur, Vbi sudor, ibi morbus. Laborauit enim toto hoc morbo dextrum latus præcipue: iam hinc abite ceperunt signa omnia in deteriora manifestè. Nam sudor vigesima secunda die accidit circa solam faciem, quæ deteriori sudoris est species, & caput conuulsus habere motus in partibus faciei, qui processerunt vsque ad tetanum, & puris conditio mutata est, abiitque in ierosum, donec postremò extremarū partium cæperit amitti sensus, & homo mortuus sit. Vt iam hinc constet, quam verè dixerit Hippoc. in prognostico, & in huius operis libri sexti sectione quinta, aurem esse locum fallacem: fallaces enim vt in commentario sectionis sextæ libri eius dixi, morbi sunt, qui cum videantur esse sedati aut etiam soluti, redeunt. Cuius præsens historia præstat accommodatissimum exemplum. Sed redeamus ad pensum. Est uocatum dignum, quod si quid (inquit) voce conaretur plurimum, loquebatur quæ volebat perfectè, si verò temerè, atque vt aliud agens, & sine magno conatu loqui inciperet, loquebatur semiperfectè, hoc est, non perfectè proferebat sed velut ore resolutum. Hoc accidens vidimus in quibusdam per abolitam memoriam, aliis etiam per irrationale obliuionem, qualem habebat Erasolai filius, cuius historia vni per narrata est. Nam quibus abolita est memoria, accidit aliquando vt vel in media prolatione verborum obliuiscantur, atque ita semiprolata dimittant, cum verbis quibusdam, & simul profere inbent, perfectè profertur, vt ipse nullo vitio consistente in sermonis instrumentis: melancholici etiam aliquando per mentis alienatione balburiunt, & quædam

dam imperfectè prolata effusione, tamen cum aliquando conatur aliquid proficere, & aduertunt animum, nullum in prolacione vitium est, vt neque in eius instrumentis. Ab hoc homine mentis alienatio non abet, verum aliorum symptomatum concursus indicat, in aliam potius causam reijci debere quàm in dictorum vltum. Nam genæ & labia mouebantur semper tremulè, quasi semper aliquid loqui vellent, oculi quoque crebè mouebantur, & in varios vertebantur intus: quæ non aliter quàm incipiente resolutione, aut conuulsione parui fieri poterant. Fuisse verò conuulsiones initium exitus declarauit. Nam desijt hæc agitatio in immobilitatem oculorū, vt non amplius uiderent, sed attentè intuerentur, & in tetanum, vt ceruicem cum capite circumferre cogetur, & pars quæ ex ceruice, hoc est, spina ceruicis recta esset & inflexibilis, vt simul cū capite & pectore moueretur. Consentaneum ergo est dicta omnia in conuulsione reijcere. Nimirum antequàm conuulsio musculos apprehendat, mouentur conuulsorib, imprimis quidè faciatore vim magnam retinente, causa verò præter naturam adhibe lædente erigum: deinde conuulsi paulatim prævalente morbo, & succumbente facultate. Igitur cum imprimis conuulsi inciperent muscoli, qui os claudunt, & qui buccas mouent, loquebatur semperfecta, & ore velut resolutio, quod scilicet conuulsio spirituum claudentibus repugnaret, & labia, & genæ, & oculi, conuulsio motu mouerentur. Deinde crescente conuulsione infixi sunt oculi, & distortæ palpebræ versus superiorem partem, velut consilio fieri solet, cum aliquid in oculum incidit. Postremò secundum caput, ceruicem, & totam spinam superuenit tetanus. Factam esse conuulsionem multitudine sanguinis in caput irruente indicabant color suberuentis, & tumor palpebræ in oculo dextro, & genarū rubor, & venarū in rota facie tumor: siquidem erant manifestæ & compactæ, hoc est, tumentes, & solidæ, atque obstructæ multo sanguine. Commemorata itaque signa erant conuulsoria: reliqua extinctionem facultatum quibus corpus regitur, & naturalis caloris sequebantur. In quibus est illud insignis, quod cum biberet perciperetur potus descendens in ventrem & pectus sonitus (quod & Characius dicit accidisse, cuius historia paulò post narrabitur,) hoc signum vidi ego in multis moribundis, atque haud siccò an viderim in illo eorum qui superuixerint, certè in vno tantum eorum qui acutè ægrotarent, & id accidens acutè febri superuenisset. Causam verò esse censeo eius accidentis, quod corruptis iam facultatibus naturalibus potus poudere & propria fluxilitate setatur, velut in obmortuum corpus, atque ob id sonitum edat. Accedit etiam sonitus edendi alia causa, quod moribunda corpora statim iam admittant intra naturales cauitates, qui sonitum edat verberatus ingressu humoris, qui non fugitur paulatim a naturalibus instrumentis, sed propriè naturâ decidit. Has ob causas ego hoc signum in pessimis pono, subscribitque meæ opinioni præfens narratio. Pus etiam redditum est serosum, & graueolens, tale naturalis caloris debilitatem indicabat: ac multò magis illa pedum mortificatio, quæ sub extremum iam tempus superuenit, per quam tactus non sentiebatur. Cum dicit spiratio fere semper moderata, ne

A intellige fuisse per totū mortuum moderatam (nam vt dictum antea est non à nocte suspirabat) sed nunquam fuisse maximas spiritus immoderationes, vt orthopnoeam, aut sublimem spiritū, aut offendentem aut talem alium. Lingna *apopharyngea* erat à principio, qualis esse solet peripneumonici, talique secundum naturam redundantium humorum fiebat. Siquidem indicatur antea est, pituitam & bilem redundasse. Dolor capitis eum semper affluerit, nemo dubitabit, cum locus præcipuè affectus fuerit caput. De huius ægroti curatione illud vnum lubet nunc monere, purgationes reuulsorias bene ac tēpestiue esse actas, missionem tamen sanguinis (si modo vt sermone, re etiam ipsa omissa est) perperam, neque sine pernitie hominis esse omisissam. Fuisse huc prima & secunda die, quibus vehemens erat auris dolor & cephalalgia, mittendus sanguis ex cephalicæ dextri lateris, quantum vires ferrent, & ea ventris suppurgatio ex mercuriali, quæ die sexta facta est, fuisse faciendā die tertia aut quarta, cum adhuc humores motu principij agitabantur, ferebanturque sua sponte in alium, & exibat lentæ velut ex onobiliosa subpalidia. Fortasse enim, his tēpestiue actis, inflamatio ante supurationem fuisset resoluta, & ea quæ accidit septimā die fuisset firma morbi inclinatio: quod si tunc quoque exacerbatum fuisset denudè malū nocte dici non, redeunte motu simili, eadem curatio fuisset rursus repetenda, mitèdusque tunc denudè sanguis ex eodem loco; quanquam parciùs, vt potè facultate minis iam cōstante. Quod si videretur perī à morbo copiosior missio sanguinis, quàm à facultate posset ferri, affigendæ essent dorso & scapulis ecurbitæ cum scarificatione, & rursus (vt est factum) molienda aliqua alui subductio. His actis, corporeque ad eū vacuato, fuisset fortasse indicatio diei decimæ quartæ perfectior, quod si fuisset nihilominus imperfecta, & decima septima superuenisset tanta exacerbatio, malum censei debet perniciosum, & insuperabile. Neque enim omnia vni possunt, quantumvis quis ardeat repugnet. Interim non fuissent omittenda (vt neque medicis, qui hunc ægrotum curandū susceperunt, verisimile est esse omisissam) collyria ad autem mitigantia imprimis, ac mediocriter repellentia, vt rosaceum, aut lac: deinde coquentia; aut tantillum resolutentia, simulque anodyna, vt multam calidam, aut chamæmelinum: postremò extergentia, & prohibentia putredinem, vt miasmam cum aliqua mirthæ portione. Fuisse quoque toto morbi tempore viles frictions eorum reuulsorias, & clysteres. Fuisse quoque affundendum capiti oxymelidinum, quod ptenitica incipiebant apparere accidentia & nerui iuxta spinam emolliendi amygdalino, aut violaceo, aut alio eiusmodi vnguento, cum inciperent conuulsione tigræ.

F *Harpalida serori circa quartum aut quintum prægnationis mensem tumores pedum agnoscere contingebant & oculorum orbis intumescabant, & totum corpus, velut leucophlegmaticis in tumorem eleuabatur. Tussis sicca, orthopnoea autem & anhelatio eiusmodi, atque aliquando a spiritu adeo stragula*

batur, ut in lecto sedere cogeretur, nec decumbere posset, & si qua somni opinio accidisset, desideret. Febbris erat admodum moderata, nec fetus longo temporis spatio movebatur, veluti corruptus esset & delaberetur. Anhelatio autem per duos ferè menses comitabatur, cum autem fabis mellis, & eclegmate mellis usa esset, cumque ex vino Æthiopium cuminum potasset, melius se habuit. Postea insensendo excreavit multa concolata, pituitosa, alba, & spirandi difficultas cessavit: peperit verò femellam.

Fieri in prægnantibus tumores edematosos pedum rarum non est, neque verò eos in corpus totum procedere, quasi leuco phlegmaticæ sint, accidunt enim in his quæ pituitosæ sunt ob menstrui sanguinis inpressionem, ut certè in aliis citra prægnationem quibus supprimitur. Hoc tamen interest, quòd ob solum affectum præter naturam supprimiti, quàm ob prægnationem grauius sit, neque ex postulat auxilium à partu, ut in prægnantibus. Verùm tantam anhelationem illi partium tumori accedere rarum est, etiamsi id quòque viderimus aliquando, & simul cum prægnatione finiri, atque ab his omnibus simul mulierem liberari. Nimirum morbi quibus affectus alioqui naturales occasionem præbent, aded periculosi non sunt. Est verò dignam admiratione, hanc non fecisse abortum ob tussim aded crebram & diuinam, nisi fortè admirationem minuat eam vtero gestasse femellam. Miores enim hæ quàm mares sustinent occasionem, & minus abortiuntur, saltem post primos menses: femellæ enim rarè exidunt, nisi initio prægnationis, & antequàm formationem & molem receperint: mares verò faciliùs, ubi iam augeri & moueri cœperunt, velut à quarto aut quinto mense, quibus hæc mulier cœpit pati: causam esse existimo, quòd acetabula masculorum sint faciora, & motus vehementiores. Itaque hanc ne abortiret, non parùm fortasse iunxit, femellam gerere. Atque ob id videtur Hipp. animaduertisse, & ut exemplo etiam indicaret, id quod medici omnes docent, difficiles & morbosas prægnationes in dicte femineos conceptus. Est præter hæc multorum medicorum opinio, quæ non videtur ratione, omnino destituta, eas quæ femellas conceperunt, vi morbis huiusmodi, qui ex retentione excrementorum fiunt, solent magis capi, ita magis ab illis (pares sint) liberari, quia scilicet earum habitui magis congruunt, quàm earum quæ mares conceperint. Deteriori enim & morbosiori habitu sunt illæ, quàm quæ mares conceperint magna ex parte: quare filias enixe in lethales morbos magis incidunt, ab æqualibus verò magis liberantur: potuit igitur præter dicta, hoc quoque Hipp. innuere dicens, peperisse femellam. Scilicet ob id minus mirum fuisse euadere. Multis itaque de causis fuit rationi consonum mulierem hanc parere femellam, ut quæ prægnationem habuerit aded morbosam, ut quæ non fecerit abortum, ut quæ euaserit. Percurramus igitur breuè omnia quæ mulier hæc passi est. Circa quartum aut quintum (dubitatio est illa phrasis) mensem prægnationis tumores a quos circa pe-

des accidebant. Primis tribus mensibus solent fieri vtero gerentibus vomitiones, nausæ, & picæ, vtpote ventriculo citò consentiente cum vtero: tumores verò pedum & alia eiusmodi nò ante quartum, aut quintum, quum iam menstruz euacuationes pluries defuerint, & hepar diuturnitate cacochymiz debilitatum est. Sed euenit dubitare, si tumores tales fiunt mense quarto aut quinto, velut maiori iam facta patiendi causa, cur eo iam tempore cessant nausæ & picæ? Quæ enim à minori causa nata sunt fieri, accessione maioris causæ non solent extinguuntur, sed augeri aut cum aliis morbis qui superueniunt commorari. Gal. primo de symptom. caus. cap. 7. dicit, earum pleraque sic affici vique ad secundum & tertium mensem, in quarto verò desinere vomitionem partim vacuato humore, partim spatio temporis concolto, muliere ipsa præfastidio pauca comedente: atque factu, vtpote iam grandiori plus trahente: atque ita totum corpus desinere plenitudine laborare, & aded visioso esse succo. Verùm hæc ratio non videtur posse omnibus congruere. Sunt enim nonnullæ aded excrementosæ, ut ex illis mulier aut deterior excrementorum copia singulis mensibus excremeretur, quàm ea quæ à fortè trahi possit. Quibus constat futuram in dies per totum prægnationis tempus maiorem cacochymiam. His sine superuenient tumores pedum sine nòis, nulla causa est cur fastidia & picæ & nausæ cessent. Minus autem excrementosæ, in quibus scilicet vomitiones primorum mensium, & inedia, & maior factus grandioris iam facti fetus, plus poterunt cacochymiam minuire, quàm diuturnitas inpressionis menstruum augere, cessabunt illa mense quarto atque fieri poterit, ut his ipsis tunc incipiant agnoscere pedum tumores, quòd diuturnitate sit hepar debilitatum. Multè enim citius trahitur in compassionem vteri ventriculus quàm hepar, verò diuturnitate intemperanti hepar retinet compassionem, quam ventriculus vomitione iam expurgatus deponit. Hoc verò non accidet quibus hepar erit firmum, sed deponent ventriculi passionem, nullis tumores succedentibus. Quamquam contrarium quoque potest quibusdam euenire, ut nullis insignibus ventriculi passionibus laborent, & deinde tumores pedum & asthma cœrripiantur, quibus scilicet eueniet ventriculum esse firmum, & infirmum hepar. Itaque tumores pedum rarè fiunt ante quartum, picæ plerumque finiuntur intra tertium, neutrum tamen horum est perpetuum, neque eas quibus tumeant pedes, ventriculo antea laborasse, neque secus. Huic non narrat quid ante quartum acciderit, potuit vtrumvis accidere. Tumores pedum, crescente crudorum humorum copia, superuenit oculorum & totius corporis tumor, qualis est leucophlegmaticis, & respirationis instrumenta occupata sunt aded, ut laborauerit maxima orthopnæa, tanta scilicet, ut dormiret etiam erecta. Succus etiam principia erant aded crudi, ut vexaretur sicca tussis. Febbris exigua erat, quia non ex humorum in venis putrescentia, sed ex crudorum oppilatione in vijs spiritus nascebatur. Erat ergo qualis esse solet hydropicis & asthmaticis, vtrisque enim rati quæ alias accedat morbus, exigua tantum est febricula. Hoc verò videbatur in hac muliere horrendum magis fetus motum multo tempore non sentiri, & velut mortuum translabi ex latere in latus, quum mu-

lier conuertebatur. Quod sanè magnum incuteret timorem, videretur enim id fieri, quòd fortis esset decisus ex vtero & mortuus. Mortuum non fuisse constat, siquidem est suo tempore in lucem editus, tamen egrotasse eo tempore fectum intra vterum non est dubium, adeò vt non posset sese proprio impetu loco mouere, neque videri continere, cum matris corpus versaretur, sed pondere exideret, vt valde debilibus egrotis videmus accidere, ipsi enim non possant sese erigere, sed facile decidunt si quis eos conuertit erigere, neque sustinet. Laborare verò fectus intra vterum morbis satis grauibus, quique plurimque quadraginta dierum habent constitutionem, Hippo. docet libello de partu septimestri. Durauit ergo fortis ea debilitas fortasse plus quam mensem, quod significauit dicens, longo temporis spatio non mouebatur: Anhelatio verò durauit duos menses. Dicit melius habuisse vñ fabarum admixto melle, & eclegmate ex melle, & potu cuminij Arbiopici ex vino; concocta enim esse excrementa, & tussiendo excreta. Faba (dicit Galen. septimo de simpl. facult.) si quid aliud, excretionibus ex thorace & pulmone est idonea. Mel esse thoraci congruentissimum ad extergendum, & ad coquendum, inrer omnes medicos constat. Atque ob hæc setapia omnia, & eclegmata pectoralia parantur ex eo, & alia quæcumque siue catapotiorum formâ, siue holorum pro rhorace parantur, nullo succo melius quam melle conformantur. Duobus modis poruit hic vti faba, atque vterque fuit vtilissimus, aut ex fabacea farina melle subacta formatis catapotijs aut bolis, aut melle cui farina inspergebatur. Ego verò intelligo, vñam esse farinâ melle subactâ, atque scorsum eclegmate ex melle, aut solo & despatmato, aut cum re alia, succoue alio, velut eclegmate ex aiantio, aut hyssopo, aut alio simili. Dicit enim, quasi duo diuersa medicamenta inuenis, *καρπον δὲ ὑπερπικρὸν καὶ ὑπερσικρὸν ἐστὶν ὑπερπικρὸν δὲ καὶ ὑπερσικρὸν ἐστὶν*. Cuminij genus omne habet vim calfaciendi tercio oedice, & discutit flatus valenter; probatur maximè ioter omnia eius genera Æthiopicum, vt inquit Dioscorides. Quoniam verò eius puluerem ex vino potate iubebant medici, constat eos concoctu contumacem esse censuisse succum, qui in mulietis thorace redundabat; neque sanè aliter vti oportebat in hac tam valenti auxilio, cum præcipue in diureticis esse à Galeno dicatur cuminum, quorum vñus in grauidis periculosus est.

Polyeratis uxorem æstate circa canicule sydus febris corripuit. Spirandi difficultas manè minor erat, à meridie vero maior & paulo frequentior, tussis & excreatio statim ab initio qualis est putulenti. Intus circa arteriam & fauces asperitas erat aliquantum stridula, facies bene colorata, in maxillis rubor non intensus, sed moderatè floridus. Procedente autem tempore & vox rancia facta est, & corporis colligatio, & circa lumbos eruptiones, & alnus sub extremum tempus liquidior. Septuagesima die febris eam corripuit cum insigni exteriorum partium refrigeratio-

A ne, in temporibus autem quies erat. Spirandi difficultas vero intendebatur, verum post hanc requiem spirandi difficultas adeo aucta est, vt sedens vsque ad finem permaneret & mortua sit. In arteria vero strepitus multus erat, & sudores prauit, & intuitus admodum conpositi ad extremum vsque tempus. Superuixit iam refrigerata dies plures quam quinque, post primos autem dies putulentum quid excreare persenerat.

B Vxor Polycratis, vt ex symptomatum narratione licet colligere, laborant primò peripneumoniâ, deinde ex ea breui incidit in suppurationem, & à suppuratione postmodò in tabem, à qua citò est mortua. Insumpti enim sunt in has omnes mutationes paulò plures quam septuaginta dies, cum soleant quidam tabidorum durare plures etiam annos. Neque tamen hoc non fuit rationi valde consonum, quia ex peripneumoniâ, vtpote quæ est breuicis constitutionis quam pleuritis, ita citius fit suppuratio, & illius vomica rumpitur prius, & nisi prius etiâ perpurgeretur, tabescunt ab ea prius suppurati, vt in commentariis sectionis 1. apborismorum indicauimus. Iam verò tabidi facti, qui ex interna inflammatione tales facti sunt, breui moriuntur, atque tantò breuius, quanto ex inflammatione acutiori. Qui enim tabescentes durant diu, ij sunt qui ex destillationibus à capite, aut toto corpore, vel ex congesta inter latera puritas inceperunt.

C Merito igitur hæc quæ à peripneumoniâ processit ad tabem, adeò breui consumpta fuit; futuram verò citò mortem significauerunt lethalia signa citissimè apparentia, & celestiter alia ex aliis successentia. Laborasse enim à principio pulmonem, indicauit hæc syndrome signorum, febris continua, difficultas spirandi; tussis. Si enim fuisset pleuritis, ad fuisset etiam dolor, qui tamen non adfuit. Sed & rubor genarum, & sibilus, & nixus, hoc est, asperitas stridula citæ asperam arteriam & fauces, pulmonis & arteriarum eius indicant affectione. Quod spiratio vespertina maior esset & densior matutina, signum erat malum, passionem simul indicans, & periculum. Nam peripneumonia uo tardè est pituitosa inflammatio, cuius febris quodidiana habet incrementa. Fieri verò hæc vesperti à prandio, familiaris est omnibus catarrhosis, & quacumque ex causâ tabescentibus, quorum vtrunque huic aderat, fluxionem scilicet secundum pulmonem pari, & ad tabem vergere. Nam erat statim ab initio tussis, & excreatio similis putulenti, hoc est, qualis in iis qui tendunt in suppurationem. Huiusmodi autem est tussicalia quedam molesta, partim omnino sicca, partim cū tenui excrezione & alba. Cum ergo maligna inciperet pulmoneis inflammatione laborare, citò processit in suppurationem & tabem pariter. Cū supra suam constitutionem, quæ septem diebus est, prorogata sit peripneumonia, procedente tempore etiam vox est facta aspera, & accidit corporis colligatio. Siccescere simul toto corpore, & aspera arteria. Nam quæ à *ὑπερπικρὸν* dicitur, quæ ob siccitatem arterie fit, vocatur aspera. Factæ sunt circa lumbos eruptiones, quæ etiam recententur ab Hippocrate inter signa suppuratorum in prognostico, vbi ita dicitur, Ceterum omnes suppuratos

D

E

F

ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, sed diu quidem tenuis est, noctu verò amplior, & sudores multi oboriuntur, tussisque ac tussendi promptitudo ipsi adest, & nihil memorabile expuunt, & oculi cavi sunt (hoc fit simul cum corporis colliquescentia) & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum curuantur, digiti verò caleant, & potissimum summi, in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustule per corpus nascuntur. Horum plurima adfuerunt vxori Polycretia. Cui pustule factæ præcipue sunt circa lumbos. Illud quoque accidit, vt reliquis tabescentibus consuevit, quod extremo iam tempore alius liquidior facta est. Aphur. 12. sectionis quintæ dicit Hippocrates, quibuscumque tabe laborantibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuiio accedente moriuntur. Capillos defluere tabescentibus, signum est eos in extremo constitutos esse, quod huic mulieri non narratur accidisse, neque verò necessarium est adesse omnibus, & mulieribus quidem multò minus, vtpote quarum capilli radices habent firmiores, & ex crassiori ac lentiori fulgine. Postremo acciderunt postrema iam signa, quæ accideri solent moribundis. Nam septuagesima die refrigerata sunt extrema, videbaturque extincta febris, quia & in temporibus facta est quies, hoc est, cessauit pulsus in temporibus sentiri, id quod extinctione naturalis caloris factum est. Respirandi verò difficultas intendebatur, atque adeo post hanc requiem, hoc est, post hanc apparentem infebri-lationem, tantò aucta est, vt nisi sedens esse non posset, idque durauerit donec mortua sit. Erat verò etiam *ῥιπιδία* in aspera arteria, contingebant hæc puto in asperas arterias pulmonis regurgitante, & vias spiritus obstruente, atque ita demum suffocante. Quod quidem in tali statu constitutus facile fit, quia debilissima facultas non potest diu laboriosam respirationem sustinere. Aderant quoque sudores prauis, quales scilicet per syncope solent, frigidi secundum faciem, & frontem. Nihilominus constabat mente, atque ad extremum vsque vitæ finem consistit, quod *ῥιπιδία* & *ῥιπιδία* indicabant. Scilicet cum iam loqui non posset præ angustia, non erat vndeque iudicium sanæ mentis acciperet, nisi ex oculis. Modum verò quo aegri intuentur, magnam præstare significationem mentis, ex ijs quæ in prognostico docet Hippocrates facile intelliges. Congruens autem fuit huic mortis generi, mentem ad extremum vsque consistere. Ita enim consuevit in ijs qui tabescent ex suppuratione, sicut & in extremo, & cum iam iam videntur extingui, durare plusquam quous speret. Velut hæc quæ iam refrigerata, & pulsus deficiente etiam in temporibus, durauit plus quam quinque dies. Id verò fit in ijs, qui extinctione moriuntur potius quam morbi magnitudine, exsoluitur enim vis sensum. Concludit Hippocrates narrationem dicens, post primos autem purulentum excreare perseuerabat. Quæ verba non ad extremos hos dies debent referri (in his enim excreare iam desinebat) sed ad totum morbum: significant enim post primos dies, velut post primam septimanam, toto reliquo tempore excreatum esse pus.

A

B

C

D

E

F

*Μ*ulier quæ supra portas habitabat, iam seniori febricula oborta est, quæ cum iam desineret, cernicis dolor vsque ad spinam & lumbos extendebatur, nec his partibus admodum valebat. Maxille verò & dentes in seipsos adeo compingebantur vt specillum non admitterent, & vox balbutiebat, quod resolutum corpus esset immobile & imbecillam, mente tamen constabat. Calefacientium & aqua mulsa tepida vsu hac remisitunt tertia ferè die, & postea succis & insculis conualuit. Hoc autem sub extremum Autumni contigit.

Huic mulierculæ abscessus factus est in solutione febriculæ lentæ, quales senibus sunt familiares: congreuens sanè solutio, & febris naturæ (si quidem erat lenta) & ætati mulierculæ, siquidē senior iam erat. Factus verò est abscessus ad articulos spinæ, à cernicis initio vsque ad lumbos, neque solum in articulis fecit dolorem humor, sed in neruorum etiam iniuria refusus omnium eorum fecit resolutionem, in quibusdam maiorem, in quibusdam minorem. Nam alatum omnium partium, quæ motum à spina recipiunt, non valde potens erat, id est, non bene eas poterat mouere, quod resolutum, & immobile, & debile esset corpus. Manifeste autem resoluti sunt musculi mouentes linguam, & apertientes os. Nam balbutiebat, & habebat os clausum, & dentes adductos, adeo vt specillum non admitteret. Quod quidem accidens fieri poterat, ob conuulsionem claudientium, aut ob resolutionem aperientium, ex alijs verò quæ vnà aderant, verisimilius est in resolutionem reiciendum esse. Præterquam quod Hipp. id noluit sub dubio relinquere dicens, quod resolutum & immobile & debile esset corpus. Velut etiam quod affecta esset lingua cum maxillis, constabat affectionem ad totam cernicem pertinuisse. Nam nerui eas partes mouentes descendunt ab ipso cerebro, à quo iam iam ortum ducit spinalis medulla. Itaque ipsum etiam cerebrum abscessus partem accepit. Atque ob id Hippoc. eum dixisset maxillæ compingebantur, & vox balbutiebat, velut quiddam notatu dignum adiecit, constabat autem mente. Nimirum cum laboraret cerebrum, videbatur contentaneum, vt mens quoque esset læsa. Verum non adeo mirum est, vt non occurrant sæpe læsiones motus sine sensuum læsione, vergente, vt dixi in proximo libro Hipp. succo ad corpus. Calefactoriis (vt fortasse frictione olei vulpini, aut ricini) & collutione oris ex melietato tepido, atque etiam eiusdem melierati potione *ῥιπιδία* cepit scilicet laxare os, vt posset iam abducere dentes, & accipere plusquam melieratum, & postea succis & insculis vtens (quod scilicet nondum haberet maxillas adeo solutas & firmas, vt posset cibum vi) paulatim euasit omnino sana. Videbitur curatio fuisse leuior, quam pro magnitudine affectus. Verum scire oportet, affectus partium indicatione factos, multò facilius curari, quàm quoniam ob multitudinem, aut cacochymiam fiunt, præcipue cum nondum indicatorij abscessus ob medi-

ci incuriam, aut quod eius copia non fuerit, induerint, aut inueterauerint. Nam persucci sunt particularum affectus curatu difficiles, nisi quod fouetur à multitudine, aut à cacochymia corporis totius, aut aliarum partium. Quod in indicariorum abfcessibus non euenit. Hinc fit, ut morbus regius in febris solutione ortus, per quē & vrina & deiectio sunt quales in bene valētibus, facillimē soluantur, ac breuiter: qui verō ob bilisam fit cacochymia, non vili saepe, ac vehementer expurgato corpore. Dicit euenisse hoc sub autumni extremum. Merito profectū. Nam autumni huius partim retinet autumni conditionem, partim hyemis conditionem imitatur. In autumno verō sunt dysenteria, seu difficiles indicationes, quales præcipuē quæ per abfcessus: in hyeme sunt dolores laterum, & lumborum, & resolutiones, ut in apborismo dicitur. Contingunt igitur huic omnia secundum temporis conditionem.

VNctor apud Harpalidem inbecillior cruribus & manibus circa autūnum factus est, bibiit tunc medicamentum sursum ac deorsum purgans. A purgatione autem febris cum corpore, & tale quid in arteriam de fluxit, ut loqueliam impediret, & inter loquendum anhelaret, quasi agina & raucedine laboraret. Suffocatio deglutienti & cætera angina symptomata acciderunt, tumor tamen non aderat. Febris & tussis intendebantur, & humidam & multam pituitam excreabat. Progressu autem temporis dolor etiam circa pectus & mammam sinistram exortus est. Cum autem exurgeret aut commoueretur, anhelatione multum angebatur, & sudor à fronte & capite dimanabat, & faucium affectus detinebat, remissius tamen, ex quo dolor in pectus descendit. In principio igitur fabis melle conditis utebatur, at postquam febres detruerunt, potius oxymelite calido, & multo mellis linctū. Transactis quatuordecim diebus omnia desierunt, nec nullo post manibus & cruribus validus euasit.

Hic ob redundantiam crassiorum & frigidorum succorum, quibus eum in autumno contigit esse plenum, cepit pati crurum & manuum pariter resolutionem. Causa sane satis periculosa. Nam ubi omnes pariter artus pati incipiunt, meritū rimetur comeniti omnium principio, cuius resolutio apoplexia est. Hanc arbitror ob causam, bibiit tūc (nam illud tunc festinationem significat) phasmacum sursum & deorsum purgans. Cum verō esset excrementorum copia maior, quam ut posset vni quantumvis forti expurgationi cedere, factum est ut febris & multæ fluxiones excitaretur, alteras scilicet & exagitationis succis magis quam euacuatæ, & periclitatus inde est, siquidem febris fuit acuta, fluxio autem in spirituales vias abundanter incubuit: primum quidem in superiores, & quæ ad ceruicem sunt, unde cum asperitare arterie anginosus & rau-

Acus factus est, & suffocabatur deglutens, omniaque apparebat ut in anginoso, quāvis tumor exterior nullus appareret, quia non tam erat causa horum inflamatio, quam multa fluxio in gulam, & asperam arteriam incubens. Adde agebatur, ut cum exurgeret anhelaret, & præ anxietate sudaret ex capite & frōre. Deinde conseruit, descēdente fluxione ad pectus, quæ circa fauces erant affectiones, habere se remissus & tunc adhærente lateribus pituita, superuenit dolor circa pectus, & mammam sinistram. In initio quom scilicet fluxio partes faucium & colli magis afficiebat, & curationis gratiā, atque ob raucedinem utebatur eo medicamine, cuius nuper in historia vxoris Polycratis facta est mentio, ex farina fabarum & melle: postquam verō febris visa est intendi, & fluxio altiores partes obfidere, cepit vni oxymeline calido abundantiū, & multo linctū ex melle, seu solo, seu cum succis quibusdam parato, velut fit in pleuritide, & peripneumonia, & alijs huiusmodi passionibus. Transactis quatuordecim diebus omnia hæc desierunt cum febre, atque adeo caput etiam & manuum robur paulo post recuperauit: eadē profus ratione, qua is qui à conuulsione tenetur, febre superueniente liberatur. Nam ut solvatur febre, eadē ratio est resolutionis & conuulsionis à repletionē, & aliorum morborū quæ ex multitudine crudorum humorum ortum habent.

B

CHartadem febris ardens corripuit, copiosus bilis vomitus, & per aluum deiectio, vigilie aderant, & circa lienem rotundus tumor. Ipsæ die manū surrexis strepitus capitis ventrem sine dolore abortio. Cum verō aluum exoneraret, sanguinis recentis plusquam congruum demisit, & cum parum cohibuisset, concretū grami etiam tertio effusi sunt. Anxietas autem aderat circa os ventriculi, & per totum ferē corpus, sudor exiguus & febricula, frigiditate videbatur. Primò quidem mentis erat compos, procedente verō die & anxietas maior, & inquietudo, & spiratio paulo frequentior, & confidentius ac benignius quam pro tempore homines alloquebatur & excipiebat, & quadam animi deliquia videbantur superuenire. Cum autem quidam offerret succos & aquam in qua farina macerata erat, non soluebantur, sed spirandi difficultas sub vesperam admodum magna erat, & vehemens corporis irritatio, & in dextra ac sinistra sese conuertiens nullo tempore quiescere poterat. Pedes erant frigidi, in temporibus & capite maior calor, Instante iam morte & multi sudores parui manabant, & quum bibebat strepitus descendens potus circa pectus & ventriculum percipiebatur, quod pessimum est. Cum vero dixisset sibi aliquid velle demitti, & oculos intendisset, non diu se cohibens mortuus est.

Hic est Chartades, cuius nuper meminimus in historia filij Cydis, ob illud signum quod hinc quoque accidit in ventre dum biberet, strepitus scilicet potus velut descenderet in thoracem & ventrem. Quod signum tanti momenti facit Hipp. ad mortem significandam, ut non contentus narrasse dicar, quod autem pessimum, quasi diceret, hoc autem pessimum est. Sed enarramus historiam à principio. Hic, quantum intelligo, intra diem naturalem mortuus est, ex febre ardente cum cholera morbo, quæ in profusum sanguinis defectionem processit, ex qua per syncopem interijt. Quamquam legator in quibusdam codicibus, & apud quosdam iuxta quam lectionem est mortuus Chartades intra diem tertium. Et fieri quidem potuit utrumque. Nam choleram, quocumque vehementem, in diem tertium protrahi mirum non est, præcipue si sanguinis defectione non acciderit usque ad tertium mane, quod intra secundum esset diem. Neque mirum adeo fuisse vehementem, ut intra diem hominem tolleretur, si in ipso primo mane superuenisset defectione sanguinis. Iuxta hanc ergo lectionem, videtur Chartades copiose febricitare vesperti, & totam noctem transigisse vigilem, mouendo, ac deiciendo, & primo mane descendisse ad defectionem, ac deiecit sanguinis optimi, ac velut effusi ex iugulata victima pluviam congium, hoc est, plusquam duodecim cotylas (congus enim capiebat sex sextarios) atque ab ea tam copiosa sanguinis effusione, cum signis instantis syncopæ perseverasse diem totum, donec vesperti, superueniente alia effusione sanguinis, non extra corpus iam ob debilitatem, sed in ipsa intestina. mortuus est. Quam autem causam affectionis huius fuisse Hipp. cooiciat, nunc superest ut dicam. Cum errore facultatum naturalium, ob malignam aliquam sanguinis totius qualitatem, & debilitatem lienis, multa sanguinis copia ad eum sese collegisset, intenuit adeo, ut rotundi rotundis speciebus præberet radium satis conspicuam, ut ex manifesta ac facili eius cognitione constaret esse magnum, ex rotunda figura pertinere ad viscum potius quam ad villam musculorum. Putrescentibus igitur ijs qui oppilati erant succis, orta est febris ardens. Irritata verò lienis facultas multitudine ac qualitate, cepit in ventrem superiorem pariter & inferiorem reuocare, primum biliosos succos, secernens inutilia ab utilis, paulo autem post non potens iam se continere, (ut fieri solet quum evacuationes incipiunt à maxima irritatione) reiecit omnia affatim, adeo ut vel ipse sanguis colore integer, & similis sanguini victimæ effunderetur, penique exhauserentur venæ per ipsum lienem. Nisi forte tunc quoque hepar conspiravit cum liene, atque, ut ita dicam, simul cum illo sese præcipitavit. Vtunque hoc habeat, iam inde, velut cum syncopæ reliquum eius diei colluctatus, vesperti mortuus est. Fuerunt verò syncopæ duæ causæ: nimis evacuationis sanguinis, cum qua non potius non exhauserit vitalis spiritus maxima copia, quia boni atque integri sanguinis erat effusio & ex impotentia facultatis nascabatur: tum grumi decerati intra ventrem. Nam cum ille virum exolutionem sentiens, semel atque iterum cohibere curasset, atque valenter spasmum astrinxisset, compacti sunt grumi. Sanguis enim mox ac in ventrem incidit, hoc est, extra venas & arterias effun-

A ditur, concrevit in grumos & contrahitur, atque eior quam vilius alterius succi corruptio multo maiorem infert noxæ cordi. Symptomata, quæ roræ eam diem affuerunt quandiu spiravit, aperta habent interpretationem. Nam anxietas & iactatio, & febris extinctio, & sudor exiguus, & spiratio frequentior, exolutionis vitalis facultatis sunt signa, ut etiam frigiditas pedum cum calore maiori temporis & capitis. Exiguam eorum quod vitalis calidi reliquum est, ad pedes aut manus non effunditur, expirat verò per arterias capitis & temporales, unde & sudores ea parte solum orti syncopales sunt. Iam verò strepitus descendens potius esse signum corruptioris facultatum, quæ regunt nostra corpora, interpretati antequam sumus. Deliravit quoque, tamen non maniacè. Scribit enim id solum habuisse delirij, quod alioqueretur & exciperet homines confidens, & benignius quam pro tempore, hoc est, quam conveniret homini in tanto periculo constituto. Omnia verò huiusmodi desipientiam indicant, non verò qualem phrenitis facere solet, sed qualem nonnunquam debilitas, quam medici mentis vacillationem vocant. Narrat etiam Hipp. quid sit actum. Cum autem (inquit) quidam (medici scilicet, aut adstantes) succos offerrent, & aquam in qua farina macerata fuerat, potentiam scilicet ad reficiendum hominem, & ad cohibendas evacuationes, (nam farina ut & athylum cohibet, non quidem adstrictione, sed agglutinatione & lentore) non soluebantur deliquia, sed procedebant, augebanturque signa syncopæ. Memini me aliquando ad ægrotantem in hoc eodem periculo constitutum, accessitum esse, simul cum alio medico non vulgari, qui eum à principio susceperat curandū, in quo quod consilium coeperimus dicere non gravabor, quandoquidem optime cessit, & ille casit. Tenebatur quidem ille iam per aliquot dies febre continua, superuenit illi quadam die morbi (neque enim meminimus quā) defecit ad defectionem, fluxus sanguinis non minus copiosus quam Chartadi, & ex effluuio similiter atque ille periclitatus est. Cibum concoctu facilem, & tenuem, & reficientem facile dari credidi iussimus, ut iuscula gallinæ refectoria, qualia quæ succi alicuius permixtione paillant. Interim odiosis rebus eius aptatum, ut carniū, panis recentis, & vini refocillari, cordi aliquid eorum quæ proprietate quadam dicuntur illud roborare, admoventi, & clysteres dissolventes grumos sine irritatione infundi, ut ex multa, & ventrem totum unguento diaphenicon unguere. Erat itaque tota curatio in refectione virtutis, & ventris adstrictione, & grumorum paulatina dissolutione, & evacuatione. Si enim sine reliquis agatur sola resectio, non erit satis, grumi enim inferunt mortem, ac multo magis si quis simul adstringat: si verò grumos curet dissolvere sine roboracione, non poterit evacuatio sustineri, ac multo minus, nisi quis etiam adstringat. Itaque ea omnia simul facere expedit, in hoc & quocumque alio casu simili. Chartadi fortasse non fuisset ea curatio satis, quod non mediocriter iam debilitatus ex cholera, ea sanguinis effusio superuenisset.

Hermopolemi uxorem hyemæ tempore febris & capitis dolores corripuerunt, &

cum biberet quasi difficulter deglutiens surrexit, & cor sanum esse dixit, lingua ab initio livida fuit. Agrotandi occasio visa est esse ex horrore post balneum, nocte dieque insomnis erat. Post primos dies interrogata, non solius capitis sed totius corporis dolore se affici dicebat, sitis aliquando intensa erat, aliquando moderata. Quinto & sexto, & usque ad nonum diem ferè delirium, rursusque apud seipsam semiperfecta cum sopore loquebatur. Interdum etiam manum extendebat ad dealbatum parietem, & pulvinum quandam frigidam quasi capiti supponebatur, etiam lateribus admonerebat: interdum etiam stragula proiecebat, & in oculo dextro subruentum quid & lachryma aderat. Ea verò erat urina quæ in pueris semper pessima est. In principio quidem deieciebat aliquantum rufa, deinde verò aquosa admodum & eiusmodi coloris. Undecimo die remissius calere videbatur, & aliquando sitis experta adeo erat, ut nisi quis daret non peteret. Somni post primum tempus mediocres contingebant interdum, noctu verò insomnis erat, & ad noctem magis laborabat. Nono venter turbatus est agnoscis excrementis, & similiter etiam undecimo: sequentibus autem moderatè, sed frequens exurrectio erat, & eadem deiectio. Prioribus autem diebus exandescerebat & instar pueruli plorabat, & vociferabatur, & terrebat, & circumspecte, quando ex sopore excitabatur. Decimo quarto verò die operosum erat eam continere, repente & vehementer exilientem & clamantem, velut ob acceptam plagam, grauemque dolorem & timorem, adeo ut quis eam apprehensam pansom tempore detineret. Deinde rursus quietem agebat, & sopore pressa dormire perseverabat, nihil omnino videns, aliquando etiam neque audiens. Crebro autem in utrumque modo in tumultum, modo in quietem per totam ferè hanc diem transmutabatur. Sequente vero nocte per alnum prodijt quiddam subruentum, veluti mucosum, rursusque velut limosum, postea verò porracea valde & nigra. Decimoquinto vero vehementes aderant corporis iactationes & timores, & clamor erat remissus: consequebatur autem efferatio & exandescencia & inulatus, nisi cito ei quod vellet esset porrectum, & cognoscebat quidem omnes & omnia statim iam post primos dies, & quod in oculo erat sedatum est, mania autem secundum occasionem, & vociferatio, & prædicta mutatio ad soporem consequebatur. Audiebat inæqualiter, quandam quidem promptè, etiam si summissè quid diceretur: quædam vero altiori voce pronuntiare oportebat. Pedes semper æqualiter cur

A toto corpore calidi usque ad ultimos dies, verum decimo sexto die minùs. Decimo septimo cum pacatius quàm alijs se haberet, ad noctem velut horrore suborto contrahens se magis febricitavit, & magnopere sitiebat, cætera autè similia consequebantur. Tremores manuum contingebant, & caput concutiebatur, & oculorum insuitus erant prani, & sitis vehemens, cum bibisset, rursus petebat, & rapiebat, & copiose bibeat, auellere autè non poterant. Lingua sicca erat & valde rubra, & totum os ac labra exulcerata & sicca, manus etiam ambas ori admoventes manducabat tremula, & siquid comedendum aut sorbendum offerretur, avidè ac furiose deglutiebat & sorbebat, ea etiam quæ circa intusum considerantur prava erant. Tribus autè aut quatuor diebus ante mortem tanti aliquando horrores ipsi incidebant, ut corpus contraheret, & cont egeretur & anhelaret: crura convellebantur, & pedes refrigerabantur, sitis verò similis erat, & quæ ad mentem pertinent similia, & exurrectiones aut inanes erant, aut pauca & tenuia cum exiguo quodam conatu deieciabantur. Postremo die qui fuit vigesimus tertius oculus mane magnus erat, & circumspectio brevis & quietem agebat, aliquando etiam sine integumentis, & sopore. Ad vespertinam autè dexter oculus ab externo angulo ad nasum movebatur, quasi intueretur aut aliquid vellet, & cognoscebat, & interrogatis respondebat. Fox post multa aliquantum blæsa erat, & præ vociferatione fracta ac rauca.

Longa certè & difficilis est hæc narratio. Magna enim ex parte est incondita, & præpostero cõtexa ordine, & verbis obscuris. Quæ propter maximus labor erit in ipsius dictionis expositione. Quod ad huius morbi speciem, seu essentiam attinet, constat fuisse febrem ardentem, cui succellit phrenitis. Quod verò ad internam causam, & succos qui in mulieris corpore redundabant, multiplices fuisse, ac multam omnium copiam. Nam bilis erat multa, & ea quidem partim flava, partim nigra exustione. Sed & crudi ac pituitosi intencant non pauci. Ex hac succorum varietate & copia, nata sunt adeo multa & varia symptomata, atque adeo contraria, & hanc ob causam morbus fuit adeo magnus & perniciosus. Cerebrum præcipue passum est, ut in reliquis phreniticis, sed & cor satis insigniter, ut in melancholicis, ad hæc facile est si percurramus referre symptomata omnia, quæ cõueniunt hæc narratio. Dicit hyemis tempore accidisse hanc febrem, nõ quod talis cum hyemis natura congruat, sed ut intelligas, idèd fuisse adeo periculosum, quòd non coogrueret. A principio adfuit febris, & capitis dolor, ut par erat futuro phrenitico, quia si quæ pars per morbum doler, in eam sunt abscessus, atque si ante morbum, in eam morbus firmatur. Initio morbi cum offerretur illi potus, surrexit ad bibendum more eorum qui difficulter bibunt, & hausto potu dicebat se cor sanasse, quia scilicet magnum sensu secundum cor solatium

ex potu, vt faciunt plerūque qui anguntur, & pariturus deliquia. Hæc melancholici succi erat nota (quia hic succus cor debilitat, & angit) sicut & quod mox apponit, lingua à principio liuida. Occasione fecundatū dicit, videri fuisse horrorem post balneum. Vulgus hominū diceret, illum horrorem causam fuisse febris, & esse mulierem refrigeratam, reuera tamen non ita erat, sed balneū intēpestium rigorem fecit, & toti morbo dedit initium. Neque mirum. Nam vbi corpora prauis succis, aut crudis, aut multis sunt referta, balneū periculosum est, nisi prius vacuentor, aut expurgentur. Quia balneū in talibus fuodit, & mouet magis quā euacuat, & ita fluxiones multas monet, & putrefcēdi saepe præstat initium. Cū igitur hæc mulier esset plena prauis & varijs extremētis, non mirum læsam esse aded, vt rigeret primū extremis per sentientes partes delatis, & deinde putrefactis febricitare acutē. Primis diebus erat vigil die ac nocte, ob magnitudinem febris & capitis dolorem, post primos (duos aut tres fortasse) dies interrogata dicebat, non solū caput, sed totū etiam corpus dolere, crescente febre & debilitate. Sitis quandoque vehemens, quādoque moderata. Hæc enim & alia fere omnia inæqualiter secundum tempus inerat, ob succorum varietatem. Quinta & sexta, & vsque ad nonam ferē delirium, hoc est, ferē continēter delirabat, & statim ad seipsam redibat, loquebatur cum sopore semiperfecta. Quæ etiam diuersa sunt, & diuersorum humorum signa. Erat etiā tunc quoque vehemens exustio, oam manus extendebat ad dealbatum parietem, quem propē habebat, & vertebat cervical, atque quā frigidum erat admovebat capiti, & lateribus, & aliquando proieiebat stragula. In dextro oculo suberueorū erat, & lachrimabatur. Quod signum visuperabatur ab Hippocrate in prognostico. Si involuēte lachrymentur, aut albas partes rubentes habeant, hæc mala & perniciofa esse potandum est. Vrina verdē (inquit) qualis pueris pessima est. Hæc periphrasi significat urinam albam & tenuem, iuxta illud prognostici, at rum in viris, tum mulieribus, nigra: urina: pessimæ sunt, in pueris autem aquosa. Erant verdē hæc urina: pessimæ huic mulieri, vt pote deliranti, ita enim dicitur in aphorismo. Urina: albæ & perspicuæ malæ, maxime si in delirantibus appareant. His dictis describit speciem deiectionum dicens, à principio deiectiones subrusæ, & biliosæ. Deinde autem (hoc est, nonā die) aquosa & eiusmodi coloris, hoc est, substantia & colore aquosa. Narrat mox per anticipariōnem ea quæ acciderunt die vndecimā, & mox redit ad nonam. Melius autem sit me ordine texere narrationem. Antea igitur deiecerat subrusa, deinde aquosa. Nam nonā venter perturbatus est extremis aquosis, eodem modo etiam vndecimā, in qua videbatur iam mulier calore remissius, & sitis exars aliquando erat, adeo vt nisi quis offerret potum, non peteret. Somni (inquit) post primū quidem tempus, hoc est, post hos dies (noo enim primis duobus aut tribus totius morbi, siquidem in illis vt dicebatur, vigil erat & nocte & die) congingebant interdiu medioeres, ad noctem autem vigil erat, & laborabar magis ad noctem. Hoc certe græce est signum, & in morbis sit periculosus, tantū enim deterius est noctū vigilare, & die dormire, quā contrā, quantū dissimilius est ei quod

A secundum naturam sit in bene valentibus, ita habebat vsque ad vndecimam, sequentibus autem moderatē, sed frequens exurrectio erat, & deiectio huiusmodi, hoc est, durauerunt vsque ad decimam quartam deiectiones, & crebra ad deiciendum exurrectio, & eiusdem modi, putā excrementis aquosis, moderatius tamen fiebat omnia. Hæc aquosa deiectio, quæ à nooa fuit vsque ad decimam quartam, significabat redundantiā serosorum & crudorum, atque bilis raptum in superiora, sicut & aquosa vrina. His eisdem diebus, qui scilicet fuerant vsque ad decimam quartam, erant exacerbescentiæ & sterus velut pueruli, & vociferatio, & terrores, & circumspectiones quæ ex somno excitabatur. Hæc omnia melancholica simul erant, & pteuitica, quæ die decima quarta aucta sunt plurimū, factaque sunt iam maciaca, seu ferina, rapta in caput atrā bile. Nam decima quarta operosum iam erat ipsam continere, & exilientem, & clamantem reperere, & pertinaciter, quasi accepisset plagam, aut gravis dolor repente incidisset, aut quasi timore aliquo repentinō esset percita, quasi quis ipsam apprehendens oculis, contineret fortiter. Rursum hoc tumultu velut peroxylmo aliquo exacto quiescebat, & premebatur comate, & perseuerabat dormire, aliquando quidem conclusis oculis non videns, et si non omnino dormiret, aliquando etiam neque audiret, quod omino dormiret. Tanta erat humoris caput occupantis diuersitas, vt mutaretur ferē totam eam diem crebro in vtrunque tam tumultum tum quietem. Deiectiones quoque spontaneæ indicabant multiplices humores, nam nocte diei decimi quatti subiebat quiddam suberuentum velut mucosum, & rursum velut limosum, postea valdē porraceæ & nigra. Decima quinta vero (inquit) exasperatio & ei ipsi vocat, arthritor, acutas iactationes, celetes & repente factas, quales cum timore fieri solent. Vociferatio fiebat nunc lenis, nunc consequabatur effratiō, hoc est, ferocitas, seu furor, nunc exardescētia, & ciulatus, nisi citō esset potestum ei quod vellet. Tantos animi motus eiebat, & tantam debilitatem inferebat vinosis succis, præcipue melancholicis. His dictis de die decimaquinta, repetit rursum quædam eorum, quæ superioribus diebus in eam vsque contigerant. Cognoscebat (inquit) omnes & omnia, statim post primos dies, & quod erat in oculo sedatum est. Mania autem secundum occasionem, & clamor, & dicta moratio sequebatur ad soporem. Quasi diceret, et si die quinta inceptis delirare, & iam inde parū apud sese fuerit, tamen non semper eodem modo, neque æqualiter insaniebat, sed cū primis delirij diebus, hoc est, quinta & sexta, & fortasse vsque ad nonam non agnosceret eos qui aderant, statim post primos & toto reliquo morbo agnoscebat omnes, & omnia (nimium non errabat imaginatio) & illud quod in oculo dextro erat, sedatum est. Corripiebatur verdē mania (inquit) hoc est, quum occasio aliqua fuendi sese offerrebat, & clamabat etiam secundum occasionem, & vt dictum est, morabatur, nunc ad soporem, nunc ad peruiigilium. Habebat quiddam aliud notatu dignum, audiebat enim inæqualiter, quendam promptē, et si summissē qui aderat loquerentur, quādam nonnisi clariis. Hoc necesse est fiat organo eodem modo habente, aut mutato. Mutari

quidem adeo crebro, ut uunc videretur audire nimis, nunc non satis. fieri non poterat nisi ob flatuosam aliquā & tenuem substantiam, quæ obuersaretur: velut iis qui ob ventriculū aut partem aliam laborant suffusione. Quædam enim vident expedire, tunc fore in illo vapore opposito; quædam mox obscuræ, vapore intercurrente eodē modo habente organo fieri potest ob mentis alienationem. Quibus enim mens non satis cōstat, solent quædam eorū quæ adiungunt, neque audire, neque videre & rursum quædam facillē sentire. Præcipue verò hoc accidere solet melancholicis, & ex eo succo insanientibus. Sunt enim sicca & exarati aures, atque ob id, si adsit animus, nūpiū audiunt; sin autem absit, non audiunt. Huic mulieri utramque causam adfuisse est verisimile, quia & melancholica tenebatur insanīā, & vapor ei multus ferebatur in caput. Decimasexta, cum antea habuisset semper æquē calidos pedes, cepit eos habere minū calidos, quā reliquū corpus. Quod sanē erat deterius iam, nam debilitatis calor erat id signum, & sanguinis ad superiora multo magis effusi. Decimasēptimā, cum interdū videretur moderatius habere quā antea, ad noctem cepit sese cum sensu frigoris contabere, quasi rigor ei superuenisset, & inde rursus magis febricitauit, & huius vehemensiam aderat. Reliqua verò ut antea. Iam hinc habuit multo deterius, & ceterum ac nervosum genus multo magis est affectum, & succus qui antea mentē solum sedebat, cepit ad corpus verū, & conuulsivē cepervit moveri partes. Quod processit ad usque ut conuulsio interiret. Flebant (inquit) tremores in manibus, & concubiebat caput, & oculorum intus prauū, cōtortus scilicet oculis. Hæc omnia erant conuulsoria, quæ et erant grauiora, quò post maiorem, & cum maiori febre fiebat. Aderant verò simul maximæ febris signa. Nam erat situs fortis, & cū potasset, rursus periebat, atque si deiegebatur, rapiebat, ac largiter bibebat: auellere autem ab eius manibus potum non poterant qui ei aderant. Lingua erat sicca. Ferebat in os ambas manus, & manducabat, cum esset tremula. Dicens, cum esset tremula, causam reddit, quasi dicat, illud manducare per conuulsorium motum mandibularum fieri. Erat itaque illud, manus ferre in os, anxietatis & manie signum, illud manducare, conuulsorium. Si quis offerebat aliquid comedendum aut forbendum, ausu ac maniacæ deglutiebat ac forbebat. Hoc accedens anxietas & futurus accidit, quibusdam etiam moribundis, quod langorem sentiant, & inde expellent auxilium. Erant tunc quoque quæ circa intuitum spectantur praua, conuulsione scilicet procedente. Tribus autē (inquit) aut quatuor dieb* *ἐπὶ τῆς πλεονεξίας* hoc est, antequā interiret, à vigesima scilicet usque ad vigesimā tertiam quæ interit, incidit, quandoque ipsi horrores, & sensus frigoris, ut contraheret corpus, & contegeretur, & anhelaret more eorum qui horrent, aut tigent, & pedum refrigeratio. Hæc iam erant refrigerationes perniciose, de quibus primo prorheticè ita dicitur. Perfrigerationes ex rigore non recalcantes, malum portendunt, siue enim hæc iam extinctio naturalis calore. Processerit simul conuulsio & mania, nam crura conuellerantur, & quæ ad mentem attinent, similia. Post emò tentare naturali facultate, & apponente exten. os conatus ad expellendum, nihil tamen proficite,

A surrectiones ad egerendum, aut insues omnino, aut per quas pauca & tenuia egererantur *μὴν οὐκ ἐβόησε* &c. hoc est, cum quodam exiguo impetu, qui mox remittebatur. Vltimū iam die, quæ vigesima tertia morbi fuit, erat oculus magnus, alter scilicet altero maior, & circumspēctio brevis, quod est, circumspiciēbat omnia breui, quasi fortim. Ad vesperam dexter oculus movebatur ab angulo externo versus internum, qui est iuxta nasum, quasi vellet aliquid videre, quæ ut & prius conuulsionem indicabāt. Eadie quietior videbatur esse quā superioribus, neque se contegebat, neque sopore tenebatur. Cognoscebat, & interroganti respondebat. Erat verò hæc alienatio, qualis solet iam iam morientibus fieri, concidentibus facultatibus, & cedentibus morbo. Vox vltimò lædi cepit, ut non posset quis iam intelligere quæ loqueretur, clamabat, quod non parū faciebat ad exheredandos vires, & facta est illi vox fracta & rauca, deficiente virtute & siccata arteria, & post tam multa tandem obiit.

C *Filiū Amphiphradū astate lateris sinistri dolor, & tussis corripuit. Multa etiam alius excernebat agnosa & aliquantum biliosa, & febris circa septimam soluta esse videbatur, tussis aderat, & subalbidus & subpallidus. Circa duodecimam autem diem ex vitore subpallidum exserebat. Spiratio procedente morbo semper densiores, & anhelatio, & stridula quadam asperitas circa pectus & arteriam, sorbitionibus utebatur, mente constabat toto tempore. Circa vigesimam octauam mortuus est, quandoque sudores foras erumpiebant.*

Hic filius Amphiphradis laborauit pleuritide biliosa sinistri lateris, à qua ob huius moris copiam liberari non potuit, quin ad suppurationem vertetur, ceptique suppuracionis adesse nota septimā die, ut videretur hic moriturus intra decimam quartam iuxta id quod ab Hippoc. dicitur in prognostico. Ut licet comedere, adfuisse huic aliquid aliud bonum signum, præcipueque constantiam ficultatis, ob quam vixit duplum, duraueritque usque ad vigesimam octauam. Ita enim habetur citato loco. Ex suppuracionibus, quæcumque dum adhuc spiritum biliosum est, suppurantur, permittose valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pite expuatur, atque hoc potissimum, si morbo ad septimum diem progresso, suppuratio ab hoc spiritu procedere incipiat. Timor autem est, eum qui talia ex puit, moriturum esse decimaquarta die, nisi aliquid bonum signum ipsi acciderit. Interpretor verò fuisse hoc, quod præsentī ægrotō accidit, quia habuit à principio dolorem lateris cum tussis & febre continua (nam dicens febris videbatur soluta circa septimam, insinuat fuisse antea conuulsiam) & difficultate respirandi (nam dicens *πνέουσα πρὸς τὸν στήθος* &c. insinuat ab initio fuisse spiracionem densam, qualis scilicet est signū doloris) quapropter pleuritice habuit: (Nā pallidus erat meminit Hippo. fuit is reliquis quatuor

signis congruens) eam verò fuisse biliosam, licet colligere ex cōditione temporis quo aegrotauit homo, siquidem æstare, & ex delectionibus aequalis subbiliosis, quæ non aliter quam ob redundantē bilem fiebant. Suppurationem verò pernitentem esse factam breuissimē, vt in talibus solet agnosces, quia circa septimam videbatur febris esse soluta, & rosis nihilominus aderat. Er densior spiritus, & color (sputi intelligo) subalbidus, & subpallidus, qualis .f. sit admissio puris cum bile. Procedente verò alteratione in deteriore, nō fiebat in dies sputum candidius, vt oportuisset, sed biliosius, vt circa duodecimam *ὡς ἄλλοι* iam excrearet. Iam inde fiebant omnia, vt in suppuratione, & priorem suspicionem confirmabant. Nam spiratio fiebat semper densior, & anhelatio, & *ἰσχυρὰ καὶ μετ' ὀσμῆς ἡ ἀπνοία*, hoc est asperitas quædam pectoris & asperæ arteriæ quæ subilam & stridorem edebat (*σφύγξ* vocant) & erumpent sudores aliquando qui in noctu solent accidere suppurationis. Vtebatur (inquit) sorbitionibus, quibus scilicet tales vti solent. Mente constabat toto tempore, vt solent qui ex istis morbis moriuntur. Mortuus est vigesima octauā, moriturus, vt dixi, decimaquartā, nisi virtute valuisset. Esse autem hoc in casu adeo velox periculum, ob malignitatem alterationis materię dictum est in cōmentario prognostici. Animaduertit Hippoc. dolorem fuisse lateris sinistri, quasi aliquid fortasse interesset, vtrius esset. Anicenna banc nobis dubitationem ingessit, quam Apocensis post illum suscepit discutendam, fecitque id tenuiter, fortasse quia ipsa questio levis est, neque adeo magni momenti, neque medici qui pleuritici curationē aggreduuntur, adeo multum curant, vtrum latus doleat. Nihilominus viderur id Hipp. considerasse, atque ob id dicendū aliquid de ea etiam esse. Anicenna non respondit satis distinctē, dicit enim ob partis dignitatem deteriore esse pleuritidem sinistri lateris, quod cor eo loco situm sit, tamen ob cordis calorem facilius discuti, si modò ea sit pleuritis quæ discuti possit. Tamen hoc non est quæstionem decidere, sed argumenta ab vtraque parte proponere. Fuisset dicendum, vtrum horum planis faciendum sit, dignitas partis ad morbi malignitatem, an facilius discuti ad contrarium, vt inde fluere affectio, sinistri lateris pleuritidem deteriore esse, aut minùs malam. Falso etiam affirmat Anicenna, latus sinistram præstantius esse, & calidius dextro. Nam reuera est tantò frigidius, & ignobilius, quantò licet hepato: cor enim in medio thoracis situm est, & arteria, etiam oriatur à sinistra parte cordis, mox reflectitur dexterorsam ad spinā, indeque demittit in vtrāque partem ramos numero pares: sed in dextrā ampliores. Quod vel pulsus indicat, qui plerisque hominibus sentitur in dextra manu maior. Has ob causas censet Rasis lib. 3. contineris, deteriore esse pleuritidem dextri lateris, quia .f. est partis nobilioris. Cōstat verò nihil adeo facere ad periculū, quàm principatū partis affectus. Huius sententiæ videtur fuisse auctor librorum de morbis, siue sit fuerit Hipp. siue quis alius. Nam lib. 2. ita scripsum est. *Quam rempus longius protrahitur, & febris vehemens, ac rursus corripit, & latus dolet, & in sanam partē decumbere non potest, sed in dolentem, & pedes & oculos cauitates intrinsecant.* Hunc vbi decimus quatuor ab eruptione dies adesset, multa calida lotum

A in sede firma collocao, & alius ipsius manus quidē renear, in verò bumeri concurio, vt audias in vtro latere affectio strepitum edat, opandum autē esset vt in sinistro. Hæc eo in loco, quibus verbis videretur perferri pleuritidis sinistra, vt minùs periculosa: quandoquidē dicit fuisse opandū, vt sinistru teneret latus. Verum si rectē cōsideres, hic auctor non loquitur de pleuritide, sed de suppuratione ex pleuritide, fieri verò potest, vt non idem iudiciū ferendū sit de pleuritide, & de suppuratione ex pleuritide. Consideretur ergo seorsum vtrūque. Pleuritis bos exitus habere potest, resolutionē, & suppurationē. B & corruptionē. Resolutionē liberantur homines breui, & intra morbi constitutionem; corruptione moriuntur breui: in suppuratione magna ex parte moriuntur lenit, tabescentes aliquando etiā liberantur, multo tempore repurgati. Tres ergo cū sint pleuritidis exitus, opandum maxime id quod sit resolutionē, timendus qui corruptione: timendus etiam, etsi minùs, qui suppuratione. Pleuritis dextri lateris, quārum in partis natura est, erit maior & acutior; quia calidior & sanguinolentior pars ad calidus & acutas inflammationes est paratior, sinistru lateris erit minor & tardior: igitur dextera pleuritidis paratior erit ad citam aut salutem aut mortem, per resolutionem aut corruptionē. (acutiorum enim est hoc propriū) sinistra verò sapienter in suppurationem abibit. Vide vtrum eligas. Postquā facta iam est suppuratio (fieri enim potest vtroque in latere) deterior sit haud dubiè quæ in dextera. Nam non potuit fieri, nisi ea parte plurimū debilitata, debilitatam verò esse partem alioqui fortem grauius est, quàm debilem. Accedit quoddā sinistra pars, vt ignobilior, opportuniore est tūranoni. Nam cum minori periculo secatur & vitur. Huc respexit auctor librorum de morbis dicens, opandum autem esset vt in sinistro: subiungit enim, hunc igitur locum feces, manūs enim lethalis est. Videtur ergo mihi Hipp. hic appositi narrasse, quod latus doluerit, quum filius Amphiphradasi in suppurationem incidit.

E *Casponi qui peripneumonia laborabat alius statim subijt, circa quartam diem sudor multus accidit, febricula soluta esse videbatur, tussicula nulla erat, vt ita dicam. Quinta & sexta & septima detinebat febris, sudor octauā, nonā excrebat pallidum. Decima affatim non sapsit alius deieciebat, circa undecimam mitius se habuit. Decima quarta sanus enasis.*

F *Rarum exemplum est hoc peripneumoniæ, bene per alui profluvium solutæ, nam vt in aphorismis modicitur, à peripneumonia malum est. Neque suo successisset, nisi pariter sudasset, & excreasset homo. Excretio enim peripneumoniæ est principalis, vt Hippocraticè dicam euacuatio, sudor omnibus inflammationibus est conueniens. Accessit peculiaris quidam causa, ob quam huius alui profluvium contulit, species facci. Nam color sputi pallidus bilis indicatior redundantiæ, ea verò per aluum vtiliter subit aut subducitur. Itaque etiam morbi eius species soluitur ventrem*

non su adeat, si tamen bilis redupdare videatur, licet ob cacochymiam etiam in eo morbo aliquando facere. Illud etiam habuit egestio alui cooconiens, quod deiiceret acuatim non saepe. Nam talis egestio quia est copiosa confert, quia rara recidit. Neque tamen bene ac cito solui potuit fluxu alui peripneumonia, non enim intra suae constitutionis tempus soluta est, sed vt quae difficilis fuerit indicij producta est duplum. Solet enim intra septimam terminari.

Hermoptolemo post Pleiadum occasum febris supervenit, tussis non valde vexabat, lingua autem qualis est peripneumoniciis. Nonna die sudavit, totus refrigeratus est velut videbatur, obtulerunt ipsi succum, & circa meridiem calefuit. Undecima sudavit, & aluius demisit. Siccata sunt biliosa deiectiones & suffula supervenit. Decima quarta cum excrebat & steriebat: decima quinta cum toto tempore mentis compos fuisset, mortuus est.

Hic mortuus est eodem morbo, & eodem fere tempore, quo Caupo liberatus. Nam ex peripneumonia obiit hic die decima quinta, ille ex eodem morbo liberatus est decima quarta. Illud habuit simile hic morbus priori, quod sudores & alui profluvia acciderint. Verum hic ipsa fuerunt deterioris conditionis, & lethalia. Nam a sudore refrigerabatur, & aluius cum fluere corripisset, suppressa est intempestive, & recurrens sursum bile, tussicula aperta est deinde, cum a principio fuisset exigua. Supervenerunt postremo illa duo pessima signa, excretae pallidum decima quarta, (nam morbo adeo progressu, is color est signum materis invictissimae) & steror, qualis solibet accidere solet us tui strangulatur. Quod quidem ex instrumentorum spiritalium passione mori indicavit, neque admodum consentiente cerebro, si quidem mente toto tempore constitit. Post pleiadum occasum hyemem esse, saepe iam antea dixi.

Alius quidam in palato stertens, Lingua sicca erat qualis est peripneumoniciis, mente constans mortuus est.

Duplex est stertor in gutture & in palato. In gutture stertant, quibus ibi serior quidam strepitus est, vt Hermoptolemo; in palato, quibus strepitus fit ea via, quae est inter palatum & nares, vt fieri consuevit multis dormientum. Hermoptolemon dixit habuisse linguam peripneumoniam; hunc alium siccam peripneumoniam. Nimirum linguam peripneumoniam dici, qualis peripneumoniciis esse solet, par est intelligere. Fit vero plerisque peripneumoniarum crassa, & excrementosa, humidique: alius sicca, emissa cum rubore, vt solibet ipsa peripneumonia, in erysipelatis naturam magis inclinat, aut edematosi phlegmonis.

A

Posidonius etiam in eunte adhuc astate pectoris & hypochondriorum, & lateris dolore circa febres diu affectus est, multis vero antea annis suppuratus est. Hyeme autem cum inbormisset, dolor intendebatur & tussis febricula, & excreatio purulenta erat, tussis cum asperitate stridula circa fauces & sternore, mente autem constans mortuus est.

B

Multis enant vt afficiantur dolore aliquo diuturno partium thoracis, aut ventris sine febre, & tandem suppurati fiunt, iuxta illud quod in aphorismo dicitur, a dolore diuturno partium circa ventrem suppuratio. Nimirum, vt extremis in partibus euenit aliquando tubercula quaedam cruda fieri, quae febrem nullam excitant, donec suppurentur, tunc vero, etiam si sint succi subiecto frigidi, ob putrescentiam quae supervenit, febrem inferre incipiunt, ita etiam in internis venteribus, sine inferiori, sine superiori. Febres enim fiunt quous plus conficitur magis quam iam confecto, & quam antequam conficeretur. Itaque quibus antequam confecti inciperet febres erant, tunc fiunt maiores, i. quibus non erant, tunc superveniunt maiores aut minores iuxta succi putrescentis naturam. Haec ita euenit. Laborant enim sine febre multo tempore, dolore pectoris, lateris, & hypochondrij, pituita lateribus, qua parte alligantur hypochondrio, haerente & impacta, neque tamen putrescente: deinde suppuratione oborta febricula superuenit, & horror, & dolor intentior, quae omnia suppurationis fientis esse signa, dictum est saepe in hoc ipso opere, & in prognostico. Accidit etiam huic aliud quiddam notatum dignum, quodque multis euenit. Nimirum sunt nonnulli quibus ob debilitatem partium illarum saepe redit hoc malum, fiuntque suppurati leui ex causa, sed quia leui ex causa, facili etiam liberantur, atque ita fit, vt crebro id patiantur, donec aliquando debiliores solide forte existentes effugere non possint, & moriantur. Quam ob causam fit, vt plerisque interimat is morbus in quem sunt paratiore, vt quorum natura vergit ad tabem, tabes: tamen verum etiam fit, ab eo morbo facilius eos quam alios homines liberari. Sine delirio mori frequens est in morbis thoracis.

C

Dolor intentior, quae omnia suppurationis fientis esse signa, dictum est saepe in hoc ipso opere, & in prognostico. Accidit etiam huic aliud quiddam notatum dignum, quodque multis euenit. Nimirum sunt nonnulli quibus ob debilitatem partium illarum saepe redit hoc malum, fiuntque suppurati leui ex causa, sed quia leui ex causa, facili etiam liberantur, atque ita fit, vt crebro id patiantur, donec aliquando debiliores solide forte existentes effugere non possint, & moriantur. Quam ob causam fit, vt plerisque interimat is morbus in quem sunt paratiore, vt quorum natura vergit ad tabem, tabes: tamen verum etiam fit, ab eo morbo facilius eos quam alios homines liberari. Sine delirio mori frequens est in morbis thoracis.

D

E Alius filius cum in monte plurimum aberrasset, sexto lingua prava erat & subrubra, & in aberratione vociferatus est multum. Oculi colorati, natantes quales nictantium. Color etiam reliqui corporis non valde auriginosus, sed subpallidus & lividus. Vox prava, obscura, lingua qualis est peripneumoniciis, non erat mentis, compos. Spiratio ad manum prava, non frequens, neque magna, pedes frigidi, lapidei. Circa nonam mortuus est.

E

F Alius filius cum in monte plurimum aberrasset, sexto lingua prava erat & subrubra, & in aberratione vociferatus est multum. Oculi colorati, natantes quales nictantium. Color etiam reliqui corporis non valde auriginosus, sed subpallidus & lividus. Vox prava, obscura, lingua qualis est peripneumoniciis, non erat mentis, compos. Spiratio ad manum prava, non frequens, neque magna, pedes frigidi, lapidei. Circa nonam mortuus est.

Hic puer cum aberrasset plurimum in monte, atque in aberratione plurimum esset vociferatus,

ex defatigatione, & labore & anxietate incidit in febrem acutissimam, malignam, ex qua nona die mortuus est. Hæbit verò, ut par erat in febre tam cito interemptura, cito signa perniciosa, & referentia causam à qua laesus est. Nam cum erraret, & clamaret plurimum, enenit efferri illi in caput sanguinem, & excrementa quæ in corpore contigit abundare, unde facta est lingua prava subruba, hoc est subruba & referens malignum mortuum, velut siccæ pluvium & aspera, & oculi etiam colorati, rubri, & *muti*, hoc est rumidi velut dormientium. Effusus etiam est illi vitiosus humor per totum corpus, unde factus est color corporis velut inter sub-pallidum & lividum. Quorum alterum significabar excrementa, alterum exindignem caloris naturalis, quem labor & timor anxius extinxerant. Vox prava, hoc est aspera & clangosa, lingua obscura, hoc est obscure loquens, peripneumonica qualis descripta est, *sux iussu* hoc est delirè loquens. Hæc quoque omnia raptim esse bilem in omnes capitis partes significabant: spiratio ad manum prava, hoc est frigida. Nam hæc solum differentia respiratoris exploratur tactu, non frequens, neque magna. Itaque prava & rara & frigida, quæ ut in prognostico dicitur, valde perniciosa iam est. Pedes postremo facti sunt frigidi, lapidei, hoc est frigidi & sine sensu, atque velut emortui.

Anginosa apud Metronè dextra manus & cruris dolore affecta est. Febricula eam tenebat, tussicula, suffocatio tertia die remisit. Septimà convulsa est, vox intercepta; stertor, dentium collisio, maxillarum rubor. Hæc non multum vitam protrahens, quintà aut sexta mortuus est. Signum circa manum apparuit sublividum.

Quo pacto mortua est hæc quintà aut sextà, si septimà convulsa est? Duorum alterum licet suspicari, aut vitiarum esse codicem, legendumque aliter: aut dici quintam vel sextam diem, ab ea qua cum convulsione, & stertore, & collusione dentium, & maxillarum rubore vocem amisit, ut mortua fuerit mulier undecimā aut duodecimā à morbi initio. Ego primum censco probabilis, atque ex lib. 5. epid. pro *epilepsi convulsione*; legendum *nona convulsione*; nam cum tam gravi morbo non potuisset ramdiu durare. Morbi quidem essentia & permutatio perniciosa non est obscura. Nam febricula, tussicula, & suffocatio anginam indicabant, reliqua accidentia convulsionem vniuersalem, à qua facilissimè mori enenit ob spiritus interceptionem. Duo signa sunt hic notata digna, alterum quod antecessit morbum veluti futurum morbi signum, alterum quod superuenit, futurum mortale. Dolor manus & crutis convulsionem præmonstravit. Quia artium dolor plerumque fit patientibus nervis, qui in eos inseruntur; si autem pars aliqua ante morbum dolet, in eam morbus firmatur. Livorem verò manus lethalem esse in prognostico dicit Hippocr. his verbis. Si digiti ac pedes omnino nigrescant, minus pestiferi sunt quam si liveant. Quod signum circa rigorem, aut occasionem emolodi, tanti facere sua

Adeo, ut quom apparer, nulla deinceps ægris ceterò morituris præscribas auxilia, quantum necessaria circa mortem edicas postrema; tamen ægrotus de se aliter cogitet. Quia in proximo esse iam mortem, experimento didici. Exemplo est etiam hæc anginosa.

Bon ex hydropoe diuturno cibos fastidiebat multis diebus, & urina stillicidium patiebatur. In sinistro genu abscessus contigit, & suppuratus mortuus est.

BHydropici merito sunt fastidiosi ob redundantiam aque putrida & falsa, in ventriculi runcis imbibita. Siranguria fit eadem aqua ad urinæ vias detinuit, atque ob id redditur falsiori quam pro naturæ modo. Vix autem habent vllum exitum salutare, si diuturni iam sit passio. Nam per debilitate sustinere non possunt vlos abscessus. Evacuatio verò nulla est eis satis idonea, nisi forte aquosum alui profuvium.

Ctesiphon ex ardente febre valida in hydropem incidit, & cum antea hydropoe & lienis tumore laborasset, plurimum repleta sunt & scrotum & crura & peritonæum. Circa mortem tussis & suffocationes contingebant sub noctem, magis à pulmone, veluti pulmonis affectu laborantibus. Tribus aut quatuor diebus ante mortem rigor & febris cum corripuerunt. Ad internam dextri femoris partem iuxta venam mediam quæ ab inguine fertur, collectio veluti ignis agrestis facta est, quæ ruborem habebat sublividum. Ad noctem os ventriculi doluit, nec multo post vox intercepta est, suffocatio cum stertore, & mortuus est.

EVelut ille hydropicus, cuius narrata est historta, mortuus est cum in putratione ramoris circa genu, ita hic mortuus est cum carbone, qui in interna parte femoris dextri iuxta inguem obortus est tribus diebus ante obitum. Signa verò carboniserant evidentiissima, erat enim rubor sublividus, vrens ut ferus ignis. Ortus est cum rigore & febre. Dicitur ortus esse hunc carbonem iuxta venam mediam, quoniam verò in femore non sunt multe venæ inegris magnitudinis, sed unica, constat mediam venam vocari eam, quæ per medium femur repit in alto recondita. Consentaneum est, huc ponis quam illi factum esse carbonem, quia fuit hydropicus ex multa febre ardente. Nam quibus fit hydrops ex febre ardente, manet simul cum aqua sanguis exustus, quo in partem aliquam truso carbonem sunt. Facile aut erat agnoscere, hunc hydropicem in malum tendere, quia per ea processit signa, quæ in hydropoe vituperantur. Nam plurimè repleta sunt scrotum & crura & peritonæum, quod quidem signum est hydropis plurimum aucti, deinde tussis accide. Dicitur autem in aphorismo, hydropicum si tussis

vexer, desperatus est. Fiebat verò huic tussis non qualiscunque, sed suffocationes etiam ad noctem *μᾶλλον ὅτι σπέρματος ὄντος τὴν πνεύματιν*. Tota hac phrasi nihil aliud significat, quàm fuisse tantam suffocationem, vt videretur esse peripneumonicus. Postremò crescentibus his eisdem symptomatis, & materia superiores partes affarim occupante, mortuus est. Nam *τελευτήσας*, hoc est, oris ventriculi dolor superuenit, & vocis interceptio, & suffocatio cum stercore.

Et in Olyntho hydropicus repente voce priuatus est, desipiens per noctem & diem mortuus est.

Exemplum aliud est hoc hydropici mortui per aphoniam. Quo pacto dignosci possit desipientia, in homine qui loqui non potest, explicatum antea non semel est. Nimirum ex oculorum iactatione, & gestibus.

Prodomi filius estate subleuus febre ardente laborabat, lingua ipsi subarida, obscura, deiectio multa, seruatus est.

Alii deiectionem conuenientem esse febriliter ardens indicationem, indicatur hoc exemplo, quod testatur Galen. vt in aliis locis, ita 3. de crisi cap. 3. dicens; si sit febris ardens, vel sanguis e naribus fluat, vel post vehementem rigorem, sudor multus & calidus per totum corpus emanabit, aut per vomitum aut aluum aliquid biliosum excerneretur.

Leoporbiam post Solstitium hyemale corripuit febris acuta. hypocondriorum & ventris dolor, deiectiones erant liquide, biliose, multe, & interdum sopore premebatur, lingua qualis est peripneumonicis, tussis non aderat. Duodecima nigra, pauca, & porralia per aluum demittebat. Decimaquarta soluta videbatur febris. Postea verò sortitionibus utebatur: decima sexta os valde sanguinosum & siccum fuit. Ineunte autem vespere horror & febris acciderant. Vigesima prima circa meridiem rigor & sudor. Febricula soluta est, calor verò suberat exiguus. Sub noctem rursum sudor accidit, & vigesima secunda sub noctem sudor adfuit, & calor remisit. Omnibus autem diebus prioribus siue sudore fuerat, verum aluus humida fuit, etiam in ea qua deinde censetur morbi recidua.

Ardens erat hæc febris, & pendebat ex multiplici ac varia materia. Nam nunc indicabatur bilis flama, nunc viridis, nunc nigra, nunc falsa pituita. Consentaneum verò est ab his omnibus succis causam fieri, siquidem à quocunque horum fieri consuevit. Laborauerunt in hoc homine precipuè instrumenta naturalia, hypocondria J. &

A venter. Nam erat hypocondriorum & ventris dolor, collecta in eas partes maxima succorum copia, ex qua multe humidæ & biliosæ deiectiones nascebantur. Tussis verò non inerat, vipote vitalibus non perinde laborantibus. *ἰσχυρὰ* fiebat *πνεύματος*, ob hypocondria. Nam, vt dictum est sepe, exposita est lingua excrementis & fuliginibus omnium ferè internarum partium: nam ventris, hypocondriorum, pulmonis, & capitis. Vocatur verò Hippocr. vt explicatum antea est, lingua peripneumonica, quæ utcumque est excrementosa. Sopor diurnus, ardens febris etiam symptomata, cum quadam portione pituitæ. In tanta succorum multitudine & differentia, non poterat morbus non esse diuersus, inæqualis, & difficilis iudicij, habuit verò præcipuè quandam diuersitatem, qua putatus est habere recidivam; cum tamen tævera inæqualitas quædam esset motus, non tanta, vt mereretur nomen recidivæ, quod innuit dicens, in ea quæ deinde censetur morbi recidiva. Intermisso visa est fieri, inter decimaquartam, & extremum decimæ sextæ.

B Contulit huic ad solutionem deiectione copiosa, quæ per totum morbum duravit, fuitque vtilis, etsi inceperit symptomaticè, sed multò magis sudor, qui superuenit iam concocto morbo. Tempus quoque fecit ad diffilem indicationem.

Theoclis cognatam qua superne habitabat, sub Pleiadas febris acuta corripuit. Sexta defuisse videbatur, lauit velut sedata febre. Septima mane maxilla valde rubeat, vtra non memini. Sub vespertam vehemens accidit febris, & animi deliquium, & vox interceptabatur, nec multò post sudor contigit, & morbi sedatio septima.

D Non est facile scire quod tempus vocet *ἡνίοχος*. Nam alibi interpretati sumus sub Canis dici tempus quo regnat Canis, inter exitum scilicet eius & occasum, nunc verò non possumus hanc interpretationem sequi. Nam etas & autumnus totus sunt sub pleiadas, esset verò in tanta anni parte incerta narratio. Consentaneum ergo est nunc intelligi ad exitum aut occasum, neque scio vtrum potius ea phrasis significet, tempora certè ea multum dissident. Acutissima febris, qualis hæc fuit, multò magis congruit æstatis initio quam hyemis. Fiant verò etiam sepe morbi non congruentes. In hac narratione nihil est notatu dignum, præter indicationis formam, ea verò est rarissima. Fuerunt enim decretoria signa, maxillæ alterius rubor, febris vehemens, animi deliquium, & vocis interceptio. Quis autem non putasset ea esse lethalia? Subsecutus autem est mox sudor, & solutio morbi. Ad eò non oportet terterè malis in initis indicationum.

Et Theodori uxori in vehementi febre sanguinis e naribus fluxus hyeme contigit. Cum verò defuisset febris circa nonam, nam multò post lateris dextri velut ab utero gravi-

tas adfuit. Tum primum autem & sequentibus diebus gravis dolor pectoris ortus est, calidusque fomento lateri dextro adhibito, quarta die dolores remiserunt. Spiratio frequentior erat, & arteria vix respirans sibilum quendam edebat, & quum supinatus esset difficile se converterebat. Sub noctem acutior febris adfuit & breue delirium. Quinta mane mitior esse videbatur, sudor parvus è fronte fundebatur, primum paucus, deinde longo tempore pervinens, sum corpus & pedes, post hac autem ipsi videbatur febris remisse. Arteriarum verò corpus ad manū frigidius sentiebatur, at temporum arteriarum magis saliebant, & spiratio frequentior erat, & subinde delirabat, & omnia in peius vergebant. Lingua usque ad finem erat valde alba, nulla infusa, præterquam tertiā & quinta die paucis tempore, sitis nulla aderat sed spatatio. Hypochondrium dextrum circa quintam valde intumescerebat, postea vero emolliebatur. Supposita glande pancratis stercore deiecit, quinta rursus paucum humidum, alium autem molliū erat. Prima acerbæ erant, & cineris (vel succi) speciem referentes, oculi veluti de lassata, difficulter suspiciebat, & oculos circumferebat. Quinta sub noctem gravis se habebat, & delirium sequebatur. Sexta rursus eadem hora quam plenum solēt esse forum, sudor copiosus dimanabat, à fronte incipiens per totum corpus diffundebatur, multo tempore prudenter res suas disponebat. Circa meridiem autem vehementer delirabat, & perfrigeratio similis erat, graviora autem omnia erant circa corpus. Sub vespertim ipsius tibia ex cubili decidit, & præter rationem puero minata est, rursusque tacuit, & ad quietem converterebatur. Circa primum autem somnum sitis multa & insaniam aderat, & risidebat, & presentibus conviciabatur, rursusque tacebat, & quiescebat & per reliquam noctem sopore detineri videbatur, verum oculos non clauderebat. Ad diem verò plurima nitibus indicabat, corpore quiescenti & mediocriter intelligens. Rursus eadem hora sudor accidit, similiter oculi demissi, ad inferiorem palpebram magis inclinantes, intente ac rigide intuentes, alba oculorum partes pallidae erant & mortuis similes, & totum corpus pallidum & nigrum. Manum plerumque ad parietem aut stragulum admovebat, & quum bibebat magni edebantur strepitus, respicebat, rursusque in nasum regerebat, & floccos legebat & faciem obvelabat. Post sudorem autem manus crystalli in modum congelate, sudor frigidus subssecutus est, corpus ad manum frigidum, exiliebat, vociferabatur, insaniebat, spiratio multa,

A manus erant tremula, instante verò morte convellebantur. Septima mortua est. Sexta nocte exiguum minxit, quod minxerat palea irabebatur, lentum, & genitura simile. In somnis omnibus morbi diebus, & post sextam urina fuit sabernenta.

Hæc mulier primam habuit febrem, à qua die non liberata est, facto vehementi sanguinis fluxu, & cum ab ea liberata esse videretur, non multo post incidit in febrem aliam acutiorē & graviorē, atque symptomatis urgentem, cuius die septima mortua est. De priorī febre nihil aliud narrat, quam accidisse hyemē, & cum fluxu sanguinis solutam esse die nonā, secundam describit fusius. Quam etiam constat in hyemē accidisse, siquidem paulo post primam. Morbus certe uterque fuit temporis naturæ contrarius, atque ob id periculosior sed & indicationis species, & constitutio. Quia in hyemē longiores fieri, & indicationes minus habere solent morbi. Verum omnes fieri possunt in omnibus temporibus. Secunda febris descriptionem enarramus. Lateris dextri dicitur factam esse ab utero gravitatem, & prius autem factum esse gravem dolorem pectoris. Hoc nihil aliud est, quam quod secundo de morbis mulierum dicitur his verbis. Si uteri ad costas allapsi fuerint, tussis tenet, & dolor sublati. Numerum aliquibus ex uterimorbo fit dolor lateris, & est id tam grave, ut in eodem loco paulo post citata verba dicatur, nonnullas ab eo morbo perire, ut certe accidit huic. Quæ autem causa sit ob quam id fiat, requiritur. Veterini nihil dicebant aliud, quam quod uteri in partes dolentes illaberetur, aut quod ita re vera putarent, esse scilicet uterum errabundum animal, aut quod ea in re loqui vellent iuxta vulgi & ipsarum mulierum phantasiam. Revera tamen uteris non errat, neque proprio impetu agitur hæc aut illuc, sed statim aut humore, aut vacuatione contrahitur, laxatur, inflatur, aut subdet, atque inde nascitur imaginatio proprii motus. Genitalia cum spiritalibus instrumentis habent magnam communionem, ut lib. 2. explicatum est, per venas communes utriusque partibus, quæ per rectos musculos abdominis producuntur, præter communes nervos ex sexta coniugatione. Quam ergo totus redundat excrementis uteris, refunduntur in partes pectoris: quum altera uteri pars insigniter, in alterum latus. Hanc ob causam ex partu difficili, & menstruoſi suppessione multe sunt pleuritice: sed & sine vera pleuritide, doloſæ sunt multæ ex utero. Ego verò hanc suspicor, primo quaternario fuisse pleuriticam, secundo (ut fieri solet) peripneumoniam. Vtrumque verò fluere ex utero, ut laevis & pulmo esset pars recipiens, uteris mitteret. Pleuritidem agnosco ex dolore, febre, & tussi, ac difficili respiratione. Differentiam pulsus rari explicat Hipp. quam tamen hic etiam attigit dicens, arteriarum corpus ad manus frigidius sentiebatur. Id enim nihil est aliud, quam maiorem calorem indicari arteriarum motu, quam tactu. Itaque habebat pulsus vehementer aucti viſus. Duritiei pulsus non video ubi nunquam meminit Hippoc. Tussim ter-

tiâ & quintâ die fuisse dicit, spirationem frequentiore dicit, à principio innens. Dolorem dicit fuisse granem, quod non videtur indicare pleuritidem, siquidem esset purgens. Verùm neque pulsus neque doloris differentiam adeo exactam reperies in omni pleuritide, sed magnam vtriusque in alias differentias inclinationem, ob partis differentiam & humoris, & complicationem aliarum passionum. Quis verò dubitabit febrem habuisse à principio eam, quæ ad eam acutè agrotauit, vt à prima die mortua sit septimâ, ant eam quæ cum febre, & dolore lateris, & crebra spiratione, & tussis, et si ræta, & spinatione ad tam citam mortem venit, fuisse pleuriticam? Transiunt in peripneumoniam indicat mihi dolor remissior die quartâ, & spiratio facta crebrior, & arteria aspera subtilis, & vix respirans, & quiddam supina difficile sese conuertebat. Id enim etiam est di facillima respirationis signum, nisi fortè id faciebatur vteri phlegmonosa passio; poterat enim ea quoque facere. Primariam verò affectionem fuisse vterinam agnosco, quia Hippoc. dicit. Neque certè est hæc incommoda agnoscendi affectionem ratio, nam vt ipsemet testatur, bonam partem dignotionis accipim⁹ à medico, præterquam quòd omnia symptomata maligna, quæ hunc morbum comitatur sunt, refrigerationes scilicet quarundam partium, deliria, & conuulsiones, & illa repentina hypochondrii intumescencia, & rursus laxatio ex vtero fieri consueuerunt. Supplicor tamen Hippocr. agnouisse vterinam esse affectionem, quòd cognouit ante mulierem, & eius naturam, atque familiares ei affectiones. Atque fortasse præter ea quæ narratur, habuit ea etiam symptomata, quæ loco citato ex secundo de morbis muliebribus recensentur his verbis. Si vterus in costas illapsus sit, tussis obinet, & dolor sublimis, & insidet vterus durus velut pila (hoc est quod in dextro hypochondrio sicut hinc mulieri, & ad contactu dolere velut ab ulcere, & contabescit, & videtur ipsi peripneumonia esse, & contrahitur, & gibbosa fit, & menses non apparent: alique autem quibus prius apparuerunt (hoc est quibus iam fluctuant antequam inciperent agrotare, etiam pereunt: atque si tunc prodeant, imbecilles sunt & pauci, ac deteriores, & genitura non fit hoc tempore. Hoc est, semen non excernitur, sed supprimitur, quod, vt medici omnes affirmant, longè graviora afferit mala, quam suppressio sanguinis: suppressum verò esse hinc semen, satis indicauit ea mictio, quæ sexta die mulieri iam morti proximè accidit. Mixxit enim sexta ad noctem exiguum, & id erat album & lentum semini simile, ad eam vt velut oui albumen palea traberetur. Quod purridum semen, quod tanti mali fuerat causa, per impotentiam retentis iam (vt fieri solet) exire indicabat. Et eadem ratione dictæ vrinæ successit subcruenta, exente post semen etiam sanguine, quæ ambo soboles erant propriæ causæ morbi, retenti scilicet sanguinis & seminis. Mirum verò quod ex sanguinis suppressione agrotauerit paulo post, ac per vehementem fluxum sanguinis ab alia febre fuerit liberata. Hoc verò indicat malignam potius qualitatem suppressi sanguinis, quam multitudinem fuisse morbi causam.

A

Antiphanis filio hyeme accidit dolor lateris dextri, tussis, febris, edebat, ambulabat aliquantum febricitans. Videbatur ruptura laborare. Nonâ die remisit febris, non reliquit, tussis multa, & crassa & spumantia exspuit, lateris dolore afflictebatur. Circâ decimam quartam rursusque vigesimam febres desinere videbantur & rursus corripiebant. Calor verò tenuis erat, & per breue temporis intervalum relinquebat. Tussis autem aliquando quidem relinquebat, quandoque intendebatur cum multa suffocatione, tunc autem remittebat, & post illos dies excreatio multa cum tussi suffocante, & purulenta supra vas feruentia & spumantia prodibant, & in faucibus multa asperitas stridula subtililabat. Anhelatio crebra semper desinebat & spiratio densior, raro spirabat facile. Ultra quadagesimam diem, prope sexagesimam (vt arbitror) oculus sinister cum tumore sine dolore occatus est, non multo autem post etiam dexter, & pupilla valde alba & sicca erant, nec multo post cecitatem mortuus est, non ultra septem dies cum stertore & multo delirio.

B

C

D

Eodem etiam tempore similia ex similibus causis Thessalioni contigerunt, feruentia, spumantia, & purulenta prodibant, & tussis aderant & stridula faucium asperitates.

E

Antiphanis filius hand dubiè habuit ex fluxione pituitosa, quæ ex capite facta est in thoracem, hæcque in latere dextro, ibique purrescens excitauit primùm pituitosam pleuritidem, deinde & pulmonem occupauit, ibique feruentius putruit, & suppurationem malignam fecit ac talem. Venisse autem hanc fluxionem à capite, nihil magis indicat quàm cecitas illa, quæ paulò ante mortem aduenit, candidis & arefactis pupillis. Id enim factum est eandem ob causam, ob quam tertio lib. sect. 3. dicebatur, fuisse tabescenti faciem chatopam. Ibi enim interpretati sumus, chatopam dici pro glauco. Fieri verò tabescentibus, quibusdam glaucos oculos, quòd lacri crudi oculos occupent, & ibi dureant, & siccentur. Ergo, inquit, Antiphanis filio hyeme accidit dolor lateris dextri, tussis, & febris, ex pituitosa scilicet fluxione. Edebat (id dicit, quia pleuritici neque solent neque debet primis diebus cibos capere) ambulabat aliquantum febricitans, & cū ambularet, non videbatur esse pleuriticus, sed putratus.

F

hæc est fractura aliquis ossis, aut carnis diuisione laborare. Hæc opinio multos vulgares fallit, plurimos n. putant luxatione aut fracturâ laborare, qui ob alias causas dolent. Nonâ die remisit febris, non reliquit, tussis multa. Iam binè cepit humor à latere in pulmonem abscedere,

Nam latus dolebat minùs multò quàm antrè, & incipiebat excreare multa & crassa spumosa. Febres & tussis iam inde inæqualiter, nunc desinebant, nunc credebant; nunc suffocabatur cum tussis. Et tunc, hoc est cum maximè suffocari videretur, repentinè aliquando desinebat tussis. Hæc sunt, quoniam fluxiones ipsæ fluunt aut fluere desinunt, & suppuratio per partes fit, aut cessat. Excreabat aliquando purulepta, & spumantia, & feruentia supra vas, hoc est si incidisset in illa spumantia in testam aliquam, aut in vas quodcunque, feruebant & spumabant. Id quidem fiebat ob ignem feruorem in pulmone, ob quem citissimè tabuit. Cur stridula asperitas in faucibus, & sibilus, & anhelatio adesset, & crebra spiratio, non est cur interrogetur. Cur oculi excæcati sunt, videri anteà est. Postremò neque intemperiem tantam, neque redundantiam extemperiorum sustinente natura, mortuus est. Perinde autem & Thesalon. Quamplurima eorum quæ supersunt, ut nonnulla eorum quæ præcesserunt, occurrant anteà in libris prioribus scripta; præcipuè in quinto, & sine villa vilitate, neque (ut arbitror) consilio auctoris, sed temeraria cõgestione chartarum. Quare ego neque scribere iterum laboro, sed præteribo. Ea verò sunt, quæ mox sequitur historia vxoris Polemarchi, & alia Aristippi, & alia cuiusdam cui hepar percussum est iaculo, & alia cuiusdam percussis capite à Macedone, & paulo post alia Neapolis, & alia Billi percussis in dorso, & alia infelicissimi filij Philæ: & alia filij Parmenisci: & alia Anaxidis in Delo iaculo percussis, & alia filij Callimedontis: & alia Aspasijs vxoris: & alia Melisandri, & alia Eurychidis: & alia Timocharis: & alia pueri Cleomenis: & alia vxoris Simonis: cuius tacito nomine, historiam in calce quinti narrata est, & alia filij Phaniz, & Euergetæ: alia Harpali filij: & alia Thuronis Damonis filij: interque has, verba quædam de hemi-crana & distillatione: & alia quædam mulieris quæ sine nomine dicitur pharvacum ad perdendum factum accepisse: & alia Pythodis; & rursus alia puellæ quæ ex rupè cecidit. Atque inter duas has historias repetuntur etiam verba quædam spectantia ad pernionum curationem, & quædam medicamenta oculis commoda, & curationem doloris lumborum, & coxæ, & crurum, & origani naturam, & rursus alia fullonum habentium tubercula in inguinibus, & alia Nicænoris, & alia Timoclis, & alia Phœnicis: & alia Cononis serui, & alia serui Timocharis: & alia Diophetis fororis, & alia vxoris Epicharmi, & alia ipsius Epicharmi, & alia Merrodori, & alia mulieris Abdetæ, & alia Tychonis in obsidione circa Datum percussis: nescio an vllæ aliz me fugerint repetitæ, seu historiz, seu dictiones. Hoc certò scias, quicquid videbitur tibi, codices alios librorum Epidemiorum consulenti, in hoc, ex libro septimo sublatum, te cum enarratione repetiturum in quinto.

Theodori filium, cum nona die in Sole versaretur, febris corripuit decima die, ex ossis denudatione nullius momenti. In febre

Autemos denigratum est, discessit cutis, valde clangosus erat. Vigesima secunda die ventriter intumuit, præcipuè verò secundum hypochondria. Vigesima tertia mortuus est.

Multis exemplis indicauit iam Hippocr. in hoc opere, quod primis verbis libri de capitis vulneribus docuit, nullum vulnus capitis leuiter esse contemnendum, etiam si sola cutis esset incisa, addit in eandem assertionem nunc exemplum aliud filij Theodori. Qui cum ictus esset (capite ut ego coniecto) ira tamen ut nulla esset ossis fractura, sed solum denudatio nullius momenti, hoc est, quàm quauis chirurgus contemneret, quod esset exigua, & in loco tutissimo, ut fortè in occipite, aut vertice, & longè à commissuris, nona die abiit, contemnens iam vulnus, in sole versatus est, & die sequenti, decimà scilicet febre est correptus, & cum febre cœperunt lethalia fieri signa, denigratio ossis, & decessio cutis ab ossis (decedit quæ in labiis est vlcere, eadem ratione quæ siccatur, sitque salitæ similis, arida enim faciliè deciduntur) & vox clangosa. Hæc duo signa, decessionem inquam cutis, & vocem clangosam, habuerunt filij Phaniz & Euergetæ, quorum historia enarrata est in libro quinto, ibique explicatum in quas referantur causas, & cur sint lethalia: non minùs atque in historia pueri Nicolai, cuius in eodem lib. enarrata est historia, explicatum est, cur quibusdam mortui iam proximis alius intumescat, quod hinc etiam puero accidit vigesima secundà, cum esset vigesima tertia moriturus.

Diximus ossa fracta fuerint, his septima die febres accidunt: si vero calidius fuerit anni tempus; etiam citius: at si magis fracta fuerint, etiam illud.

Præcipuum ac maximum signorum superuenientium, quibus fractum esse os in capitis vulneribus indicatur, est febris. Hæc dicit solere die septimà superuenire: si verò sit calidius anni tempus, etiam citius, velut quartà aut quintà, ac si magis fracta sint ossa, etiam statim. Quibus verbis videtur significare, in temporibus aut frigidis, aut temperatis superuenire febres die septimà, in æstate verò prius: idque si fractura sit mediocris, si verò sit maxima, multò citius, usque adeo ut aliquando superueniant statim. Hoc sapè prima fronte videtur consentaneum. Quia ut calor temporis plurimum faciat ad faciliorem partium vlcercatarum corruptionem, ita etiam faciet fracturæ magnitudinem. Quod enim à fractura natum esset fieri, id à magna fractura fiet magis, ac citius.

Furget rursus duplex obiectio; prima, Hippocr. lib. de cap. vulneribus dicere, ubi fractum est os, & vulnus tale, ut seruari homo non possit, ante decimum quartam incidere eum in febres magna ex parte in hyeme in æstate verò, post septimum: nunc verò dicere in tempore calidiori fieri ante septimà. Quodnam autem est aliud tempus calidius quàm æstas altera, chirurgos ferè omnes censere, grauius signum esse febrem vlcere aliquando

post superuenire, quàm statim fieri: neque sanè ea essentia videtur ratione destituta: quandoquidem, si mox sit, censetur nasci ex recenti fluxione, & inflammatione: si verò superuenit, quo tempore solent iam inflammationes & dolores conuenisse, non videtur posse referri, nisi in partium putrescentiam. Si autem febris statim hinc minis malum signum est, non potest profectò fieri ob maiores fracturas: esset enim deterius, quod nasceretur ex causa deteriori. Pro prima obiectione, scias Hippocrat. in lib. de viceribus capitis loqui de viceribus adutorum, hic verò ob filium Theodori agere solum de puerorum fracturis. Dictum verò ab eodem est in eodem libello, pueros ex capitis fracturis citius quàm adultos & liberari & mori, vtrumvis sit euenturum. Citius igitur lethalius puerorum fracturis accidit lethalia signa, quàm adutorum. Quare non est rationi dissonum, in ætate fieri febres adultis post septimum, pueris citius. Pro secunda obiectione, scias febrem quæ mox accidit vulnèratis, animaduersione indigere. Esse enim potest simplex, & ob dolorem & recentem phlegmonem oriri: aut maligna, & nasci ex fracturæ magnitudine, & internarum partium læsione. Dignosci possunt hæc, quòd illam non comitentur accidentia alia maligna, sed videatur qualitate diuturna, & conquiescit intra primum quaternarium: hæc durat usque ad finem, & mox incipit malignitatem præ se ferre, accedantque citò pericula, deliria, aut convulsiones, & ossis malignus color, & saniei, quod malus, atque alia signa.

ET Exarmodi famulus similiter dolorem habebat ad femur, non secundam rectitudinem vulneris, & factus est clangosus, & dolor cernicæ adfuit.

Haud dubie hic quoque percussus est capite, & mortuus cum convulsione. Nam dolores ab infernis partibus procedentes ad cernicem, convulsionem minantur in vulneratis. Dolore verò contrariis lateri vulnerato partes, significat id quod fieri solet in capitis vulneribus sæpe iam diximas, contrarias partes conuelli. Habuit etiam hic, præter ea quæ narrantur, alia signa lethalia, ut scilicet habuit clangosam vocem, quam in lethaliibus signis esse sæpe iam dictum est.

ET Posidocreon tertia die convulsione correptus est, calor non relinquebat, mortuus est decima octaua.

Nihil aliud est hic notatu dignum, quàm tandiu durasse ægrorum, cum tam citò convulsionem pati cœperit.

A

Isagora filius posteriore capitis parte vulneratus est, confuso osse ac denigrato die quinta, liberatus: os autem non abscissit.

B

Rarum sanè est, quodque nisi in puero expectare non datur, confuso osse ac postea nigrescente liberari, nullo osse abscedente, sed ab ipsa natura firmato, vnito, & emendato. Non parùm contulit, ne fractura ad interna penetraret, & sanien in cerebrum transmitteret, posterioris capitis os esse vulneratum, quod omnium quæ in eo sunt est firmissimum. Hinc expuncti historias magnæ nauis gubernatoris, & Harpali filij, & Thronis Damonis filij, quæ requirendæ sunt in quinto libro.

C

Menonem sub Arcturum, prius quidem febre astutâ, & alui profluvio agrè affectum & ex itinere delassatum, lateris etiam sinistri dolor corripuit, & tussis, quæ quidem etiam prius ex catarrho aderat, tunc verò intendebatur, & insomnis erat & statim à principio febrem implacide ferebat, & resurgens tertia die suebat pallidum, arteria cum stercore subsibilabat. Circa quintam spiratio erat moderate densa, pedes, tibia, & extrema plerumque frigida erant & extra stragula. Alui excrementa à principio demittebantur biliosa, neque valde pauca neque multa. Septimâ, octauâ, & nonâ facilius ferre videbatur, & somni quidam contingebant, & quæ excreabantur crudiora erant, decima & usque ad decimam tertiam valde alba & pura. Et hypochondrium mollius factum est, sinistrum vero contentum erat, & melius spirabat: Supposita vero glande mediocriter alui deiecit. Decima

E

tertia rursus pallidum exspuit, decima quarta vero magis, decima quinta porraceum. Alui vero maleolentia, biliosa, liquida trebro demisit, sinistrum hypochondrium eleuatum est, decima sexta valde etiam intumuit, & spiratio erat iam cum stercore, sudor circa frontem & cernicem, raro pectus occupabat. Frontis & partes extrema moderate frigida permanebant, saluatio vero venarum circa tempora detinebat. Somni comatosi postremis temporibus noctu diuque premebant, vrina à principio crude cineris speciem referens. Circa decimam & usque ad decimam tertiam tenues & non decolores, à decima tertia vero quales à principio.

F

Non est dubium deesse huic narrationi verba aliqua, quæ nisi restituantur, intelligi quidem non potest quid dicatur. Velut statim in initio vix intelliges, an hunc ipsum mortuum de quo

agitur vocat febrem æstiuam, an loquatur de morbo alio, qui conualefcenti ex febre æstiuâ superuenierit. Verum paucis verbis appositis euadit res clarior; vt si ita legatur: Menoni sub æstiuum, & prius quidem febre æstiuâ, & alui profluuiio ægrè affecto, & ex irine de lassato febris superuenit, & lateris sinistri dolor, & tussis, & reliqua. Ita sit apta & concinna oratio, significaturque quod verissimum esse coniecto, eum cum debilis adhuc esset ob prægressam febrem, iter egisse, atque vt par erat esse defatigatum, & ob eam occasionem incidisse in aliam febrem cum sinistri lateris dolore. Dubium tamen tunc quoque est, an dicat habuisse æstiuam febrem sub æstiuum & prius, an incidisse in hunc morbum de quo narratur historia, sub æstiuum & prius. Mihi videtur illud primum magis consonum verbis Hippocratis. Nam sub æstiuum & prius, significat orto iam æstiuo, & antequam oriretur. Itaque significat febrem incepisse antequam oriretur, & durasse illo sydece iam orto. Ortus eius est initium autumnus, incipit ergo nondum finita æstate. Quapropter hæc fuit febris æstiuâ, de qua agitur, alia vero superuenit postea, forte in fine autumnus, si forte laborauerat priori febre, quam æstiuâ vocat, ad exortum Caniculæ, aut ante in vocatis Prædromis, & posterior superuenit paulo ante ortum æstiuum: & quasi hæc iam esset autumnalis, quia autumnum attingit, vocat auctor priorem æstiuam. Aut forte non obtempus, sed ob acutiem, velut in aphorismo, vbi dicitur, in autumnus & morbi æstiuus. Vtrumque potest dictio ferre, neque sanè plurimum refert, an facta fuerit hæc febris initio aut fine autumnus: quanquam in initio solent fieri morbi acutiores, in fine redolentes iam hyemem. Sed, vt dictum sæpe est, possunt fieri omnes in omnibus temporibus. De hoc igitur dubitantes, cætera exponamus. Menon itaque cum adhuc esset debilis ex febre æstiuâ & alui profluuiio (quod alui profluuium, aut simul cum ipsa febre fuerat, & ita vt ipse symptomaticum decreta plurimum vires, aut febrim superuenit iudicatorio modo, tamen productum est plus satis, ita enim etiam retardauit corroboracionem iter agens lassatus est. & ob eum laborem intempestuè succubum correptus est febre, & dolore lateris sinistri, & tussis, quæ tenebat quidem hominem ex cararthis etiam prius, tunc autem erat multò copiosior. & erat homo infirmus, & statim ab initio male ferebat febrem. Huic etiam (vt ex his quæ mox dicentur intelliges) facta sunt mox hypochondria dura & distenta. Vnde constat calore & motu concitata esse corporis excrementa, & auctas eas, quæ prius inerat fluxiones, & concitatas alias, atque ita distillationem à capite in pectus quæ prius inerat, auctam esse adeo vt pleuritidem sinistri lateris attulerit, & tussim plurimum auxerit: hypochondria vero calore quem labor exciuit, & debilitate totius corporis, quæ ex priori morbo adhuc supererat, alioqui commota excrementa traxerit, & receperint in sese. Facta est itaque continua febris cum pleuritide, & affectu phlegmonoso vtriusque hypochondrij. Nam esse febrem putridam, & morbum per se, non solum inflammationum accidens, indicabat vrina quæ à principio ac semper signis concoctionis caruit. Esset verò pleuritidem, non est quod quisquam neget, cum adsint febris

A continua, dolor, tussis, & respiratio difficilis. Nam pulsus differentiam ab Hippocrate quis requirit? Erat infirmus (non mirum, nam vel tussis prohiberetur dormire, nedum febre) & implacide ferens febrem statim ab initio. Statim ab initio incepit habere signa facularis concoctionis, & malignæ alterationis materiz. Nam residens iam die tertia, factusque *perueniens* spebat pallidum, hoc est biliosam & crudam, & aspera arteria subsillabat ex stertore nimirum hæc omnia pleuritidis in exitum tendentis signa esse, & in malignas referri causas, dictum iam sæpe est. Morbi verò qui breui sunt interimpturi, citò incipiunt à salutaribus plurimum diffidere. Deiectione etiam fiebat à principio morbi biliosa, quod multum versus quaque bilis redundantiæ, & facultatis debilitatem indicabat. Neque boni quicquam promittebat, quia in pleuritide ab alui profluuiio nunquam expectatur auxilium. Non tamen deiecit statim vires, vt primis quaternarijs moreretur homo, quia neque erat valde pauca, neque multa. Circa quantum spiratio facta est moderate densa. Illud *monens* mori, non significat parum densum, sed densum mansuerit, sine ortopnea, & sine sibilo. Quæ quidem spirationis mutatio non semper fit in melius procedente morbo, sed aliquando in deterius. Nam spiratio recta & stertorosa aliquando conquefcit euacuata materia, & expurgatis vijs, & tunc agitur bene cum ægroto: aliquando secumbente facultate, & id est pessimum: aliquando cessante aliquo materie motu, quod sine insigni neque bono neque malo fieri conquefcit, sed vt mitecat morborum pyroxyfmi. Huic non esse sedatum illum stertorem ob salutarem quampiam causam, sed facultate concidente, & materia alius recondita, producit symptomata reliqua: nimirum crebritas, quæ non est imminuta, & pedes, ac tibiae, & extrema (manus scilicet, brachia, & nasus) plerumque frigida erant, & extra stragula. Quod quidem grauius esse videtur, quàm si partes frigidæ sub stragulis contineret. Nam non continere, pereunus cum calore sensus signum est, aut nimis anxietatis. Septimâ, octauâ, & nonâ facilius ferre videbatur; hoc est minus anxius esse, & symptomata omnia habere miriora, & inter cætera vigiliam, nam somni quidam contigebant. Neque tamen huic remissioni fidendum fuit, quia præter rationem accidit, & sine signis concoctionis. Nam quæ excrebatur (inquit) erant crudiora. Explicans quæ vocet *amalgama* dicit, decimâ & vltimâ ad decimam tertiam erant valde alba & pura, hoc est, aquosa, alba, & tenuia pure aque similia. Et hypochondrium fiebat mollius, vt phlegmonem deposuisse videretur. Sinistra verò hypochondrij pars distenta, & melius spirans. Quod durum propriè est, separari facillè potest à distento, etiam si vtramque tamen resistit, sed modo diuerso. Durities nascitur à corporis soliditate, & concrecione, quæ in tumore phlegmonoso aut scirrhusio fieri conquefcit: distentio à flatu. Itaque solui cepit phlegmonem hypochondrij, & flatu colligi ad partem sinistram. Sed est consideratione dignum, quid sibi velit vocans hypochondrium melius spirans. Non n. dicit illud melius spirans de homine, sed de hypochondrio, liquet in græca lectio. Ita n. habet *si de aëre spirante* *si de aëre spirante* si de aëre spirante: si verò spirare non pertinet

ad hypochondrium, sed ad thoracem, quo pacto dici potest hypochondrium melius aut deterius spirans? Certè spiratio thoracis & septi transuersi est, tamen hypochondrium distentio, aut durus tumor sepe facit respirationem difficilem, quia compriment septum transuersum, & in plerisque hominibus habent viscera, quæ in hypochondrio sita sunt, vincula quibus alligantur, vtrumque suo lateri: ergo ab effectu, quod difficilem faciat respirationem, dicitur hypochondrium *distentio*, quod non faciat difficilem *ventio*. Tunc ergo erat *distentio* finitimum, quod minus quam antea impediret respirationem, Sed quomodo fieri poterat, vt esset distentum, & melius spirans? Certè quod ea distentio ad externas, & cunctas proximas partes spectaret, septum verò minus traheretur ad tensionem aut compimeretur, glande verò supposita (inquit) alius mediocriter deiecit. Itaque non suppressa erat alius, neque fluens. Decimateriâ redire cœperunt rursus signa concoctionis contraria. Nam spuit ea die pallidum, & decima quarta magis adhuc pallidum, & decima quinta portaceum: alius verò iam inde demisit maleolentia, biliosa, liquida & crebra: aucta. f. toto corpore cacochymia, & corruptione. Sinistrum hypochondrium eleuatum adhuc magis est: decima sexta verò etiam magis intumuit, non tamen erat adhuc *distentio*. Erat enim *distentio* *distentio* occupantibus iam excrementis pulmonem & laryngem, & septo transuerso impedito. Nam difficilis septi motus facit sublimem spitationem, succi verò faciunt stertorem, & seruerem in gutture. Iam erant omnia velut in moribundo, sudor, sapor frontem & ceruicem, qui vel ad thoracem descendebat tardè extema, & frons frigida *distentio* *distentio*. I. salatio venarum circa tempora, quæ cum frigore extremorum pessima est, quia significat vri interiora & superiora cum extremorum refrigeratione. Somni comatosi nocte & die postremis temporibus premebant, ea scilicet die & sequenti, quæ vltima fuit. Mortuus enim est, quantum coniecto, decimaseptimâ. Nam cum decima tertia inieperit sterile chale incrementum, id exigit ratio legitime constitutionis, præterquam quod signa decimæ sextæ erant qualia reperiuntur in ijs qui eadem die aut postredie moriuntur. Fuisse verò vsque ad decimam tertiam morbi principium, & inde inieperit incrementum, constat facile ex ijs quæ de vrina addit. Siquidem præcipua temporum distinctio est per concoctionis signa. Dicit verò, *distentio* *distentio*, *distentio* hoc est cineris speciem referens (colore scilicet) à decima & vsque ad decimam tertiam tenuis & non decolor à decima tertia vsque ad finem qualis à principio, cineritia scilicet. Nimirum eo modo processerunt signa concoctionis & contraria in omnibus excrementis. Nam & spura, quæ a principio fuerant pallida, facta sunt alba & pura à decima vsque ad decimam tertiam, ab hac rursus pallida. Deiectio etiam quæ a principio fuerat biliosa, & à decima quarta cepit subire mediocriter suppositâ glande, decimateriâ rursus cepit fieri deterior, male olens, biliosa liquida, & crebra. Itaque decimateriâ cœperunt omnia abire à crudis ad malignè putrescentia. Sed rogabis, cur morbus videatur processisse à malignis ad cruda, & ab ijs rursus ad maligna, cum à crudis incipiant omnes morbi pendentes ex materia. Certè cruda

A excrementa sunt duplicitia, quædam quæ neque habent concoctionis manifestæ villas notas neque corruptionis malignæ, habent tamen notas humorum à quibus morbi pendunt: alia sunt quæ ne horum quidem villas notas habent, sed solius concoctionis. Sapissimè primis morbi diebus apparent excrementa cruda primi generis, deinde secundâ à quibus procedunt in lethalius morbis ad malignè putrescentia, in salutaribus ad concocta. Quod quidem fit, quia incipiunt morbi agitari excrementis, & ab agitatibus necessitatè excidit aliquid cum exeuntibus. Cum verò cessat is motus, & concoctio nondum inieperit, sunt excrementa tantum cruda, duranteque ea per totum principium, donec scilicet aut malignæ putrescentia, aut concoctionis manifestæ notas accipiant. Sed & alia etiam symptomatarem quendam habent progressum. Maiora enim ac difficiliora fieri consuevunt in prima parte principij, in quo iam conquiescit ob motum materię, quæ procedente principio, donec procedente in vigorem morbo, ob materię alterationem & incrementa morborum redeant maiora. Hinc fit vt multi inexpecti, & vulgares medici putent, quæ adhuc sunt in initijs, putensse morbos ad inclinationem, scilicet remittentibus doloribus, & excretis quandam puritatem accipientibus.

C Leocho lateris dolor & febris accidit, remissit febris, sudans per corpus totum. Per vrinam multa efferebantur, hac postea turbata est.

D Sudor & vrina ex eadem sunt materia, proinde sepe in eisdem morbis incidunt amba iudicationes, & quisudando indicari cœperunt, postremò per vrinas iudicantur perfectæ: postea vrina turbata diuersis occasionibus fieri consuevit, aliquando fit in initio, agrediente natura concoctionem, estque signum concoctionis occultæ; aliquando fit in morbi decessu, ob perturbationem in totis venis sentient, estque signum doloris, seu morbi capitis: aliquando fit inclinante morbo ob excrementorum exeuntium perturbatam mixtionem, estque tunc decretoria euacuatio, qualis huic facta est post vrinas concoctas, & post sudores. Illud *distentio* non sine ratione referri potest ad quandam corporis aut mentis perturbationem, quæ instante crisi solet contingere, quem in sensum nomen *distentio* ab Hippocrate frequenter usurpatur.

C Irca pleiadum occasum Olympiade uxorem octimestrem satum gestantem, ex casu febris acuta corripuit, lingua erat ardens, sicca aspera, pallida, oculi pallidi, & corpus mortuo simile. Quintâ die solum corruptis, faciliè liberata est, & somnum cum sopore esse videbatur, vespere cum excitaretur non sensit, stertantiorio adhibito subandius, potionem accepit & succi nonnulli, aliquantum iussit cum deglutivisset potionem. Vox non solabatur, neque ipsa quicquam lenabatur, oculi demissi erant, sputa

no sublimis quæ naribus traheretur, color prauus, sudor accidit circa pedes & crura inflantem mortua est.

Cum periculosum semper sit vtero gerentibus cadere, aut percuti ita ut allidant fetus, multo tamen magis osimemstibus, quia fetus magnus cum sit, & aliqui ægroter, facile ex collisione moritur, quod periculosissimum est, præcipue cum inflammatione vteri, quæ ex casu etiam fieri consuevit, ut huic accidit. Inflammationem enim in vtero factam indicabat febris statim acuta: serum moruum, corpus *magis* & fetus corruptus, hoc est abortus mortui. Quinta die dicit liberam esse facile, intellige facile emississe fetum, liberata enim omnino non est, nedum facile. Non parum fuit emittere ex inflammato vtero moruum, tamē fecit id irritatio magna, & fortis expultrix. Nihil tamen habuimus, quin potius in deterius lapsa est cum maxima cerebri compassione cum vtero, quam indicabat coma tantum, ut eadem die excitantes non sentiret, sed tamē sternutatorio videretur exiguum quiddam excitari & audire, non tamen ita ut loqueretur, neque ipsa quicquam alleuaretur, & cum prauis signis circa oculos, & spirationem, & totius corporis colorem ad mortem processit. Haud scio an intra ipsam diem quintam, certe non multo post. Quod sudor huic iam morienti factus est circa pedes, & crura, ut solet alijs circa frontem & ceruicem, causam esse existimo; quod calor igneus qui per extrema exspirauit, partem humilem hoc est vterum teneret.

Nicolaus uxori ex febre ardente tumores circa utramque aurem exortis sunt, paulo post alter velut tumor laxus, cum iam febris remittere videretur. Circa decimam quartam magni sine indicationis signis subsederunt. Recidiva facta est, color mortuo similis, lingua aspera, valde densa, subalbida, siticulosa, deiectione alui copiosa, liquida, maleolens per totum tempus. Ante obitum corpus deiectionum multitudine obsumptum est. Mortua est vigesima.

Non narrat qua die ardentis febris parotides factæ sint, constat factas esse multo ante tempus indicationi idoneum, nam multo ante decimam quartam: siquidem die decima quarta tumores magni subsederant, cum antea ortæ essent parotides, ac post eas alius tumor, in quas eruptiones non potuissent infundi satis multum tempus, siquidem non sunt factæ simul, sed ordine aliz post alias, Itaque non longè post morbi initium corperunt abscessus apparere, quod vitiosissimum esse Hippocrates multies significauit, maxime lib. 2. his verbis, decretoria ne statim appareant. Certè raro bene agitur cum ægroto, cui citò apparent abscessus, aut ex quæ decretoria esse solent euacuationes. Exemplo est hæc ægrotæ, quæ cum per morbi decursum aliquoties videretur melius habuisse, ut aliquando interim febris videretur solui, postremò mortua est. Quæ autem fuerint signa grauiora, oportet notemus, ut merito cum finem habuisse morbum intelligamus.

A Imprimis factos esse abscessus ante tempus, deinde & subsedisse tumores, aliqui magnos, die decretoria, sine signo, hoc est nullo relicto vestigio. Hoc enim nihil est aliud quam euasisse repente, & fecisse in altas partes imperum, quod in magnis tumores tanto periculosus est, quanto minus debemus opinari, magnos quam paruos fuisse per insensibilem euacuationem resolutos: & quanto grauius est, multa quam pauca excrementa in partes nobiliores conuertere. Omnia autem lethalia signa diebus decretorijs facta, firmiorem habent significationem quam alijs, ac proinde deteriora sunt. Merito ergo, quandoquidem non multo post initium factæ sunt parotides, fuit morbus difficilis indicationis: quandoquidem verò die decima quarta magni tumores sine signo subsederunt, merito est facta recidiva, longè perniciosior primo morbo & habens lethalia signa, colorem faciei morbo similem hoc est, qualem in cadaveribus videas, linguam asperam, valde densam, hoc est crassam, & duram, subalbidam (qui color ob emorientem etiam calorem fieri solet, estque deterior quam cum est a parte alba ob pituitam) & siticulosa ob calorem igneam, & deiectionem multam liquidam, male olentem per totum tempus, quæ deiectionis corruptionem significabat, potius quam indicationem, & quia male olens (non scilicet utcumque, sed grauius & malignè) quia per totum tempus. Tempellius enim sunt quæ bonæ, non quæ per totum tempus sunt euacuationes. Atqui euentu confirmata est hæc coniectura: Nam *πρὸς τὴν πλείονα, ἰσχυρὰ τὴν ἀπορροήν*, hoc est mortua est præ multitudine deiectionum, corrupto corpore, & colliquescentibus simul succis, & carnibus. Mortua est vigesima, à primo insultu morbi arbitror, quia ita solet Hip. numerare: recidiva fortasse fuit facta decima-septima, fuitque totus morbus acutus simpliciter: in recidiva verò seorsum acutissimus, & perniciosissimus.

B

C

D

Andream ante Pleiadum occasum horror, febris, vomitus corripuit, ab initio semitertiana apparebat, verum tertiana erat. Rursus cum in foro ageret horruit, febris acuta fuit, vomitus bilis sincera, sub noctem delirauit, rursus melius se habuit. Quinta agere. Sexta à Mercuriali bene aluus decit. Septima grauius habebat, & sequentibus iam diebus affligebat febris, & ab initio sine sudore & siticulosa erat. Maxime autem os resiccabatur, nullumque potum libenter admittebat, cum multa esset in ore insauitas. Lingua erat arida, inarticulata, asperitas efflorescebat cum pallore abibicans, in somnis erat, & anxius, exolutus, fractus, lingua præ siccitate aliquantulum habuitiebat, donec madefecisset, succum præcipue admittebat. Nonā aut decima circa aurem sinistram & circa alteram tumores parui sine indicationis signis apparuerunt. Prima per totum morbum non fuerunt decolors, sed sine subsidentia. Decima-quarta sudore exiguus circa partes superiores non admodum moderatus exortus

est calor circa decimam septimam mitigatus est. Aluus post decimam sicca erat, nec nisi subditis glandibus deieciat. Circa vigemam quintam exanthemata per totum corpus exorta sunt pruriginosa, calida, velut igne ambusta. Dolor autem aderat circa alas & latera, in crura sine signis transiit & desit. Balneum proderat & illitus cum aceto. Mens vero secundo fortasse aut tertio dolor ad renes, qui antea etiam aliquando adfuerat, sedatus est.

Postmodum dicit, nec explicat an ante ortum pleiadum dicat, an ante occasum. Mihi videtur consonum ante occasum intelligere, quia morbosus multo tempus est, & difficilis indicationis morbis magis opportunum, quod occasum antecedit, quam quod ortum, & quod occasus quam ortus pleiadum rationem potius haberi vellet Hippocrates. Siquidem libello de aere, locis, & aquis, ita dicit: oportet autem & astrorum exortus considerare, præcipue Canis, deinde Arcturi, & pleiadum occasum. His verbis hanc dubie ortus Canis & Arcturi potius quam occasus rationem haberi vult, occasus vero pleiadum. Itaque idem est ante pleiadum dicere, ac autumnii tempore. Morbus hic vsque ad diem septimam fuit tertiana febris, naturâ quidem intermittens, ut quæ ab horrore inceperit, ad eam vero producta & molesta, ut fortasse ægrotum nunquam eueniret sine febre esse. A septima die cepit esse febris continua, magna simul & maligna, à qua post dies multos vix per multos abscessus liberatus est. Dicit itaque *modum*, hoc est, in autumnio, horror, febris, vomitus corripuit, hoc est, febribus quædam ab horrore incipientibus cum vomitu, neque solum, arbitror, vixit tertianæ solent, inceperat horrore, & mox in apertam febrem euasit, sed horrida etiam per totum ferè tempus, æt magnam diem partem existit. Nam (inquit) ab initio semitertiana apparebat, quia scilicet hemitertius febris est horrida, multarum febrium complicatione constans: verum non erat semitertiana, altera dies duos, altera vnicum paroxysmum habens, sed tertiana. Itaque erat tertiana simplex, sed notha, semitertianæ ob horrore productionem similis. Præterit paroxysmus primus, & (ita vt sit) exurrexit, ac domo exit: & rursum die tertius in foro agens, correptus est febre eiusdem prorsus figure cum prima. Nam horruit, & febricitauit, & vomuit bilem meracem. Ad noctem eius diei delirauit, paraphreneticus scilicet vi febris factus, rursum vero die sequenti, quæ fuit totius morbi quarta, melius se habuit: quinâ rursus difficulter, ut primâ scilicet & tertiâ. Sextâ mercurialem accepit expurgationis gratiâ, & aluus quidem bene deiecit, nihil tamen inuatus est, quin potius septima difficiliter habuit, & sequentibus tam inde diebus magis continenter, hoc est, citra intermissionem febricitauit. Optimum sanè exemplum læsionum quas inferit purgatio suscepta intempestive, & ante materię concoctionem: nimirum febres auget, & ex simplicibus duplices, & ex

intermittentibus facit continuas: etiam si aluus fluat, & purgatio iis qui adsunt videatur rectè successisse: quinetiam ob aliquando magis homo læditur, quod purgatio videtur abundantius facta, quia colligatione finit tales deiectiones. Et vidi multos mox ab intempestua expurgatione incidere in tabem. Vique ad eam vitari debet vulgaris pitaxis eorum, qui die sexta omnibus febricitantibus pharmacum tribuunt, cum tamen ea die perparcis possit vtiliter dari. Quia plerique acutè laborantium sexta die finiri est, aut iam finitur principium, tempus vero concoctionis nondum venit. Circa hæc autem tempora raro, aliquando tamen videntur gratiâ, et purgamus. Ducta vsque ad septimam narratione, rursum repetit ea quæ ab initio febribus his aderant. Sine sudore (inquit) ab initio, & fuciculosus, maxime vero os resiccabatur, & potum solum libenter accipiebat: cum multa esset in ore insauitas. Hæc maxime siccitatis erant signa, & fucorum siccissimorum, bilis, & falsæ pituitæ. Ab his enim resiccabatur corpus ad eam, vt neque inclinantis paroxysmi sudaret, & esset fuciculosus, atque sicco ore, tamen nullo potu delectaretur, ob oris insauitatem. Lingua sicca & aspera, hoc est, inarticulæ profertens verba, *περὶ τὴν ἐν τῷ στόματι ἀσπερίαν*, hoc est, asperitas erat in lingua, velut innatis quibusdam granulis, quasi fuciculis, cum pallore quodam albicante, velut mixture bilis & falsæ pituitæ facta. Erat insomnis, quod sicce & calide intemperiei signum etiam est, anxius, exolutus, fractus, hoc est defatigatus, quasi fractis artibus. Lingua præ siccitate aliquantum balbutiebat, donec madefecisset, hoc est ob siccitatem lingua non poterat proferre, nisi aqua aut aliquo humore prius eam madefecisset. Natrat deinde quo victa vteretur dicentis, succum maxime capiebat. Hoc est non vebatur cibis solidis, sed pro his vt solent qui febricitant acutè, succis. His dictis, persequitur narrationem vltra septimam diem, à qua continua febris esse cepisset. Nona (inquit) aut decima (incertus qua die, dubitanter dixit) circa autem sinistram primum, deinde & circa alteram, tumores parui *δυσμεν* apparuerunt. Sine signo euanescere tumorem, aut exanthemata, quid sit, dictum antea est, scilicet nullo relicto vestigio, sed quid sit sine signo apparere consideratione est dignum. Videtur autem nihil esse aliud, quam nullo prægresso signo talis abscessus. Nimirum fururi abscessus solent significari dolore aut lassitudine partium, in quibus sunt fururi. Perinde est ergo ac si diceret, facti sunt tumores parui in aurem utramque repente, imperarè, & nullo dolore, neque vilo alio fururi abscessus signo prægresso. Hæc autem abscessus generatio ad eam repentina significat, causam ad qualitatem fucci referri debere potius, quam ad multitudinem, aut partem debilitatem. Repentina enim irritatio repentinam ex parte in partem læsionem facit. Quæ autem multum lassitudinis sensum habet prius, & debilis pars aliarum excrementa paulatim admittit. Itaque abscessus repentini & sine signo facti, qualiterque malignam succi plurimum irritantem & vgenicem significant, qualem sane fuisse in hoc ægrotò, satis aperte indicantur deinceps.

ceps exanthemata circa vigesimam quintam per totum corpus facta. Fuerant enim calida, & pruriencia, velut igne combusta. Urinas dicit semper huic fuisse non sine colore, sed sine subsidentia. Hanc urinam crudam extemē non esse, tamen esse principij constare ex ijs, quæ de urinis Gal. tradidit. Cunctari verò signa concoctionis plus quàm pro aliorum symptomatum celeritate, dyctis significat. Decimaquarta (dicit) sudor exiguus circa partes superiores exortus est. Explicans exiguum fuisse, non admodum tamen, dicit, non valde moderatus. Multis modis à bono sudore deficiebat hic, nam quod exiguus, quod non per totum fluens, quod sine concoctionis signis, & quod sine conferentia, solum quidem videbatur dici naturā bonus: verum id, ubi cætera abfunt omnia, nihil est melius. Quia dies decretoria, velut & alia omnia decretoria, nihil aliud præstat quàm fidem, bona quidem meliora, mala verò deteriora efficiens. Febris circa decimam septimam *quarta*. I. est mitigata, non tamen soluta perfectè, neque ita indicata, ut sine quantumvis obortis abscessibus, possent homo liberari. Aluum (dicit post diem decimam) siccam fuisse nec fluentem sine glande. Insinuat ante decimam non fuisse adeo siccam; satius autem fuisset contra fieri, ut primis diebus siccata aluus, procedente morbo humectaretur: consensum enim est hoc morbis salutatibus, & benignis: in quibus concoctioni tempestiua succedit expulsio: sed in morbis difficilis iudicationis, omnia sunt præposterè. Circa vigesimam quintam (dicit) exanthemata *dupla*, *tranquilla*, *acuta*, *mediana*, in quibusdam codicibus legitur *si* *hæc* hoc est per totum, in alijs hoc est *si* *hæc* hoc est breui, per paruum tempus. Prima lectione significatur exanthemata illa orta esse per totum corpus: secunda orta esse repente, quodque antea dixerat *dupla* hoc est sine signo. Dolor erat circa alas, & latera, & transiit ad crura sine signo: hoc loco sine signo alterutrum potest significare, aut nullo doloris vestigio relicto in lateribus, aut nullo signo abscessus in cutibus prægresso; deinde hic dolor desinit, visusque est iam homo liber à morbo. Tamen mense secundo aut fortasse tertio post hæc, dolor incidit in renes quo ante hunc etiā morbum aliquando laborare consueuerat. Et sedatus est dolor, & iam iude conualuit homo. Curationem non narrat Hipp. Illud solum interponit, balneum proderat, & inunctio in aceto. Hoc est lauari aqua dulci, & à balneo inungi ex oleo, hoc est oleo, & aceto. Hoc non quacunq; morbi parte faciendum fuit, sed postrema, quæ erat post decimam septimam, quum scilicet iam febris erat tenuis, erumpentem verò per cutem exanthemata, & abscessus in hos & illos articulos. Taxis enim utile est balneum ad vacuandas reliquias succorum per cutem, & fundendos crassos ne concretentur, & attemperandum corpus, atque extinguendæ febres: inunctio verò olei necessaria est, ne spiritus dissolutior: aceti verò, sicut etiam salis quædam portio propter articulos, ne sola aqua & oleo ligamenta ossium emolliantur, & debilitentur. Quapropter ego consulerem in hoc casu, balneo & inunctione ex solo oleo prius primū ad totum corpus; ex aceto verò,

A aut sale & oleo post balneum; ad solos articulos.

Aristocratem circa solstitium hyemale lassitudo, horror, & calor corripuit, postea vero tertia die lateris & lumborum dolor incipit, & tumor ab axilla initium ducens per totum latius dextrum extendebatur, durus, rubicundus, lividus, quasi ab igne calefactus & inflatus fuisset. Anxius erat, & molestè se habebat, valde siticulosus, lingua erat erat subalbida, urina non prodibant, crura subfrigida. Aluus à mercuriali panca deiecit, liquida, subalbida, spumosa, sub noctem spiratio sublimis facta est: sudor exiguus circa frontem erupit, inferiores partes frigida, anxius erat, cernix inflabatur, tussis non aderat, mentis compos mortuus est.

C. Intra primum quaternarium febris mortuus est Aristocrates, die tertii orto carbunculo ingenti: neque mirum, minores enim carbunculi solent venenosa symptomata inferre, & citè mortis periculum, necdum tantus, ut latus totum occuparet. Cum præcipue dolor lateris & lumborum indicaret, non solum extrinsecus sed intrinsecus etiam cum illis partes teneri. Quamquam non affectum fuit os ventriculi, aut septum, aut aliqua aliarum partium, cum quibus facile mens consentiret, aliqui non fuisset mortuus sine delirio. Data est eadem die mercurialis ob virginitatem. Satius autem fuisset mittere sanguinē vigne ad animi deliquiū, iuxta consilium Gal. 14. methodi. Exiguus, liquidus, subalba, & spumosa deiectione colliquationem indicat.

Onesiana circa autumnum accidit ophthalmia, postea vero febris quartana. Incipiente quartana plurimum auerabatur cibos, procedente autem morbo libenter accipiebat. Sed & Polychari in quartana febre eadem circa cibos contigerunt.

Quod Onesiana & Polychari contigit, quam plurimū imò etiam plerisque quartana laborantibus enire conspicimus: ut scilicet: recens occupant, aliquando nausea, & fastidio, & anxietatibus, & magnis laboribus consistuntur, & horum aliqui paucis paroxysmis ut quinque aut septem exadīs liberantur, alij conquiescentibus anxietatibus, & ad cibos deinde melius habentes, manent cum quartana quadam mitiori per longum tempus, quam pati possunt exurgentes, & domo exeuntes, & negotia tractantes. Huius rei causa est, quod febre illa laborare non incipiunt, antequam multo & eo quidem malo succo repleti sint, & irritata natura incipiat cum agitare: agitando verò hac & illuc trudit, & hac & illac pellet. Vnde evenit, ut interim homo magnis angatur laboribus, & effusa excrementa fastidium in-

ferant, & euacuationes diuersæ fiant, & aliquando per eas euacuationes purgato corpore cessat morbus, aliquando non sunt ex satis, & natura conuertitur ad reliqui concoctionem, & apprehendit retinere quietum. Quietum ergo excrementum, & copia diminutum paroxysmos quidem facit ordinem diu seruantes, ob partium mittentium & recipientium intemperiem, & debilitatem, & ob id quod Gal. vocauit cinericiunt: verum symptomata afferre miora, non quidem quæ propria febris sunt, siquidem pathognomonica cum quocunque morbo crescunt, sed quæ principij, & inquietudinis humorum. Inter cetera verò symptomata in quartana, cum ea iam elapsi primum illum incursum resider, placari maxime solet fastidium. Quia melancholia per se quidem famem potius infert, fastidium verò non, nisi quum redundantia maxima putridæ materię abominationem infert.

Accidit autem etiam Onefianacti ante febrem alui deiectio, quæ diu postea perseuerauit, multis albis, mucosis prædentibus: & aliquando paucum sanguinem sine labore & dolore deiebat, sed strepitus in ventre percipiebatur. Post febrem abscessum fecit iuxta sedem tuberculum durum, quod diu perseuerauit incoctum, eripit ad intestinum, & fistulosum enasit. Cum autem in foro deambularet, ei ante oculos fulgores obuersabantur, nec Solem omnino aspicere poterat. Cum autem paucæ alui excrementa demisset, extra seipsum fuit, & cernicis conuulsione correptus est. Postquam verò domum relatus est, vix suscepit, & agere ad seipsum euersus est. Primum autem circumstantes oculis collustrabat, & corpus adeo refrigeratum est, ut vix vtriculis & meatus in vapo, id est, fomentis subinde adhibitis recaleret. Postquam verò sui compos fuit & surrexit, volebat exire, sed timere dicebat. Siquis vero de gravibus morbis differeret, præ timore se subducebat. Aliquando calorem ad hypochondria sibi occurrere dixit, & oculorum fulgores perseuerare, & multa alui deiectione, & sæpe & similis hyeme contigit. Pena scitio celebrata est, helleborum propinatum, lac vaccinum potu exhibitum, prius vero asinum quod contulit, & deiectiones sedauit. Aqua potus ab initio fuit, deambulationes quoque & capitatis purgationes.

In quibusdam codicibus legitur, non Onefianacti, sed Mnesianacti, videturque esse ægrotus alius, ab eo qui ophthalmia laborauit, & quartana, & alia narratio: mihi autem eadem procius esse videtur, & de eodem Onefianacte haberi sermo. Nam & illæ duntaxat particule, altera continuans, altera coniungens, accidit autem etiam

A Onefianacti deiectio, aperte indicant, illi de quo coepit erat sermo, præter ophthalmiam accedisse etiam ante febrem quartanam alui deiectionem, hoc est fluxum alui, quem dixit postea quam incepit quartana, durasse multum tempus, excrementis multis albis mucosis, & aliquando exiguo sanguine. Hæc cum dolore inordaci exiissent, indicassent hand dubiè dysenteriam, verum exhibant sine laboribus & dolore, unde constaret fuisse diarrhæam pituitosam. Illud exiguum sanguinis, quod coniequebatur aliquando, deponatur ab hepate aut mesenterio, nisi forte ab hæmorrhoidibus, nam ab his etiam aliquando exit sine dolore: refrigeratum verò ventrem à pituitosâ fluxione, indicabat flatas, qui in ventre erat. Merito huic finira est ophthalmia ante febrem quartanam, cum alius ante eam plurimam fluxerit, multum enim cedere solet ophthalmia alui profluuiio. Post febrem (inquit) abcessit iuxta sedem tuberculum. Intelligendum post febrem, hoc est, postquam correptus est febre: non enim verumille est iam esse finitam quartanam, cum nondum narratio ad totam hyemem pervenerit, siquidem quasi narrationem producens dicit postea, alui deiectione multa & sæpe & similis hyeme contingebat. Itaque idcirco, postquam correptus febre est homo, factum esse illi per abscessum tuberculum durum iuxta sedem, illudque diu mansisse crudum, durum scilicet, postea erupisse humorem in intestinum, & extrosum esse factum fistulosum: itaque factam illi esse fistulam, externum habentem os, & penetrantem usque ad ipsum intestinum, quod quidem fecibus excurrentibus, erat facile agnoscere. Facile est coniectare, & ex corporis apparatu (siquidem quartana laborabat) & ex loci natura, quæ tales succos solet recipere, & ex corruptione, tanta enim facta est brevis, fuisse succum qui eo ab abscessu attraheretur. Cum iam ita haberet, contigit quadam die deambulantem in foro, splendores apparere ante oculos, ita ut Solem omnino non videret, & exire nonnihil extra se, simulque conuulsam esse secundum cervicem: & ita domum reduci (fortasse ab iis qui aderant) iamque ingressus, vix respexit, & vix ad seipsum reuersus est (illud vix significat difficultes, neque satis perfecte id fecisse) primum verò (ut fieri solet) circumspexit eos qui aderant, & refrigeratum est illi tunc corpus, & vix recalescere potuit, etiam si multi vtriculi, & multa calida fomenta adhiberentur. Postquam autem apud se fuit, & surrexit in lecto, volebat exire domo, sed dicebat se timere, ne forte illi accideret eadem passio iterum: atque si quis coram illo de morbis difficilibus loqueretur, abibat præ timore: itaque mansit timidus. Dicebat sibi aliquando occurrere ad hypochondria calorem, & perseuerare oculorum splendores. Ex his accidentibus manifestum fit, cum in foro correptum esse apoplecticâ passione, simul cum quadam conuulsione, ob raprum melancholiz in superiores partes, eas verò passiones decessisse in melancholiz morbum, partim quidem affecto cerebro, partim verb hypochondriis. Alui deiectionem multam & sæpe, similemque, ei .i. quæ incepit, hoc est mucosam albam, exempto aliquando exiguo sanguine hyeme fieri non mirum.

quod per melancholicas affectiones tam multa redundaret, pituita. Siquidem familiaris est melancholicis, multum generare pituitam per incoctionem, præcipue in concoctione primâ, cuius excrementa excipialius. Narrat summam quæ in huius morbi curatione acta sunt, dicens, vena sectio facta est, helleborum propinarum (hoc est expurgationes) lac vaccinum potu exhibitum. Prius autem asininum quod conlulit, & deiectiones sedauit. Potus a quo ab initio, deambulationisque, & capitis purgationes, per errhina scilicet & apophlegmatismos. Ratio curationis minimè sanè vulgaris. Quotus enim quisque medicorum, fluente alio mittit sanguinem, nedum & iam expurgat pluries? Aut lac præcipue adeo frigidum & serolum in quartana non inreducit? Et in diarrhoea quiescere non iubet, & vino modico vti? Capitis verò peculiariter quotus quisque habet curam, nisi quæ ei propria accedat affectio? Ea tamen omnia se fecisse hic auctor narrat, neque tamen in omnibus ita laborantibus ea fieri iusserim, etsi ea duæ vtiliter in Onesimacte facta esse dicenti credam, nam possunt etiam aliquando vtiliter fieri contraria. Nullus enim est morbus, qui vnicui certamque habeat curationem, neque qui pro ratione causæ & naturæ hominis, ac denique singularium animaduerfionum, non possit accipere contrarias. Quapropter oportet singulorum auxiliorum considerare vires, & adhibitis distinctionibus dicere, in quibus ita laborantibus fieri debeant, aut fecus. Illud vnum dicam generatim Hippocr. & omnes qui in magno pretio fuerunt medicos, indicationem causæ sequi consueuisse multò audacius quam vulgares medicos, qui plerumque præsentibus symptomatis territi, illisque occurrentes, morbos plerosque producant & vix nisi leuissimos persanant. Velut nunc vulgaris missio ne sanguinis iniret diceret, timens euacuationum multitudinem, & expurgationes caueret, ne excrementa vndique traherentur in ventrem, fluxione alioqui laborantem: interim admoueret siccantia & adstringentia, & totum victum eo dirigeret. Hippocrates verò, multò magis timens copiam sanguinis & viciolorum humorum, qui toto corpore redundabant, ac certò sciens, nisi hæc tollerentur, alia omnia adhiberi frustra neque sine noxa, misit primum sanguinem, deinde expurgatione usus est, & potu lactis asinini primum, cui ob multum serum vis est expurgandi, deinde vaccini ad renutriendum, & deambulationibus. Arripit autem & frictionibus, vt toto corpore magna dissipatio fieret. Si quis verò incidat in laborantem debilitate potius virtutis, aut intestinorum intemperie, quam multitudine succorum, contraria consuler merito: quod si frigida esset ea intemperies, vt plerumque solet, vino vti inberet, quod tamen huic detrahit Hippocrates, ne cum multitudine, vini potus inflammationis cuiuspiam fieret causa. Multitudinem verò indicauit sanguis, qui aliquando sine dolore exibat. Expurgadi per errhina & apophlegmatismos capitis, magnam curam habere solet in huiusmodi morbis Hippocrates, & merito quidem (quamquam id post nullum sanguinem & expurgationem, aut omnino aut

A bona ex parte factam) quia à capite clementer distillationes frequentissimè in partes alias vt, pectus, ventrem, & renes. Quare si quæ vel exigua excrementosi capitis significatio est, in morbis thoracis, aut diarrhoeis, aut frigidis renum morbis, consultum est caput purgare. Atqui hæc rursum fuit alia causa interdicensi vini huic arguere, ne repleteretur caput, repleturque in ventrem & alias partes refunderet.

B

A Næbethi filio hæc contigerunt. Per hyemem in balneo cum ad ignem inueneretur, calefactus est & subito in convulsiones comitialibus similes incidit. Post autem satis multas convulsiones circumspexit, non erat apud se, postquam vero ad se rediit, rursus sequenti die mane convulsione correptus est, spuma non valde apparuit, & tertia æque, id est, in articulata fuit loquela, & quarta se velle loqui lingua significabat: quinta loqui non poterat, sed in principijs nominum hærebat, in quinta etiam lingua admodum hæsitabat, & convulsione corripiebatur, nec sui compos erat. Cum autem hæc remitterent, lingua vix in suum statum restituebatur: sexta cum ab omnibus abstinnisset, etiam à serbitione, & potu, nihil amplius accepit.

D

Hic puer sex dies colluctatus, vt ita dixerim, cum epilepsia, nunc plus nunc minus excutens humorem, prope oppressus. Postremò mortuus est convulsus totus, aut apoplexia occupatus, vtrumvis enim fieri potuit iuxta hanc narrationem. Nam dicit die ultimâ, nihil neque cibi, neque serbitionis, neque potus accepisse amplius, quod aut convulsus cum aliis omnibus mulculis etiam gulæ, aut resolutus omnibus per apoplexiam fieri potuit. Consideranda verò hic occasio, quæ in homine parato hand erat exigua, nimium calore fusa & commota excrementa in circuitum irruerant. Vt hinc constet, eos qui ad periculosas fluxiones sunt parati, arcendos esse à multo igne, & longa mora in balneo, & ob eandem rationem in sole.

E

C Leocho ex lassitudinibus & exercitijs cum melle per aliquot dies vteretur, tumor ad dextrum genu exortus est, magis autem ad infernam partem circa tendines quæ sunt sub genu. Circuibat aliquantulum claudicans, & poplitis tumor cum duritie aderat, qui vsque ad pedem & ad malleolum dextrum extendebatur. In gingivis etiam iuxta dentes magni tumores velut acini vna, lividiebant, denigrati, doloris expertes quando non comedeat, nec cur a dolebant nisi exurgeret. Venit etiam in sinistram partem tumor, verum minus linefcebant. In tumoribus circa ge-

nua & pedes quædam velut suppuraciones erant: postremo autem stare non poterat, nec calcaneis insistere, sed in lecto iacebat. Calores erant manifesti, aliquando cibum auersabatur, non admodum siticulosus, neque ad sedile exurgebat, anxius erat, & aliquando pusillanimitate tenebatur. Helleborum ad capitis purgationem est exhibitum. Ad os medicamentum ex thuris polline quibusdam alijs admixtis contulit, ad vlcera oris sorbitio ex lente conueniens erat. Circa sexagesimam subsederunt tumores post veratrum secundo exhibitum. Dolores tantum in genua decumbenti aduerunt. Humor autem & bilis abscessit in genua, multis etiam diebus ante sumptum helleborum.

Nihil refert scire, an hic Cleocus, & ille qui paulò antè dicitur febricitasse, idem sit an alius: ceret est alius homo, aut eiusdem alius morbus. Haud est dissonum cedere ob morborum analogiam & naturam, eundem esse hominem, cumque iuuenem naturâ calidum, talibusque morbis opportunum, etiam à talibus causis lædendam antea dicebatur laborasse pleuritide & febre, nunc ab exercitiis & melle lesus esse, ambo verò hæc ex calore procedunt. Sed hoc habeat utæque, quæ nunc est in manibus historia enarretur. Læsus est his exercitiis & mellis usu, atque tumores magnos & liuescentes contraxit in cruribus, dextro primum, deinde & sinistro, & in ore circa dentes tubercula, pro loco quidem magna, & liuida, nigricantia, & primum quidem hæc ambulans passus est, deinde verò cum malum cresceret, neque pedibus posset insistere, decubuit, & febricitabat tunc temporis iam aliquando. Quomodo lesus in hos morbos ab his causis incidisset, ipse non dicit, licet tamen coniectare exiis quæ dicit. Nimirum tumorem color melancholicum præ se ferebat, melancholia verò exercitatione & melle non aliter fit, quàm sanguine exusto, itaque lesus est, quod motus nimis & mellis usus sanguinem viderint, atque fecerint multum attritu, quam naturâ ad debiles & extremas partes trudente, facti sunt tumores dicti, in ore circa gingivas ob partis debilitatem, & in cruribus quod sint partes extremæ & humiles: primum verò in dextrum crus, & in gingivas, quod arbitrator ambæ hæc partes, altera quidem superne, altera inferne rectitudinem habeant cum hepate, quod à calidis causis læsum esse præ alijs visceribus est consentaneum: deinde verò etiam in sinistram, ob redundantiam succi aucta in omnes partes fluxione. Attestatur huic coniecturæ etiam sanatio. Nam sanatus est homo reperito hellebori viâ, quem melancholicæ cacochymie esse conuenientissimum constat: sed & morbi diuturnitas idem indicat. Si enim biliosi aut sanguinei fuissent tumores (à pituitosis enim longe aberant) ante quadragesimam essent dissoluti, durauerunt verò ultra sexagesimum. Ex tuberculis illis facta sunt etiam vlcera in ore: ad quæ dicit contulisse medicamentum ex manna thuris cum alijs per-

A mistum: velut fortè, cum myrrha, croco, & mastiche, aut postremo iam tempore, aliquo alumine, in medicamento ex moris, aut ex nucibus, aut succo aliquo adstringente. Nam ex his & alijs humis modo parati stomatica medicamenta, docuit Gal. diffusæ 6. lib. de compos. med. secund. locos. Illud solum in forâ hæc dictione non placet, sorbitionem ex lente conuenientem esse, tam scilicet, quæ græcis veteribus vocabatur *σφοδρική*, neque quidem ego huic à sorbitione ut permisissim, neque omnino lente in cibis, quia succum melancholicum generat. Sed percurramus verba omnia. Cleoco (inquit) ex lassitudinibus & exercitiis, cum melle per dies aliquot vteretur, tumor ad dextrum genu exortus est, magis autem ad partem infernam circa tendines subgeni circumbar, hoc est, ambulabat per verbum subclaudicans, & poples intumescibat, & durus erat, & usque ad pedem & malleolum dextrum producebatur tumor ille durus: & in gingivas iuxta dentes eruperunt magna quædam tubercula, ut acini vuae, liuida, denigrata & sine dolore nisi quum comedebat, & crura etiam erant sine dolore, nisi exurgeret. Reddit causam ob quam dicit crura intumuisse, cum antea solum dextrum sit dictum tumidum fuisse, dicens, venit. n. etiam in sinistro tumor, minis autem liuescebat. Itaque liuescebat etiam tumor utriusque cruris, non verò erat denigratus, velut tubercula oris: quoniam verò non dolebant nisi mota, constabat fluxionem in eas partes non nisi lentè fieri, & quoniam tumores erant duri, & dolentes si mouerentur, necque aliter constabat esse inflammationes scirrhosas: quoniam postremæ partes tumorum crurum, supremæ & quæ ad genua, & imæ quæ ad pedes, haberent velut suppuraciones, hoc est, vndatim moris quædam, siue succum, siue statum (ita enim fieri consuevit) ita ut ambigeretur an essent suppuraciones. Postremo, hoc est, cum iam crurum morbus multò crenisset, iam non poterat stare, neque calcaneis insistere, sed iacebat in lecto. Calores manifesti, hoc est, erant iam tunc temporis febres aliquæ manifeste, putrescentibus, arbitror, iam succis intra corpus: quam etiam ob causam aliquando tanto renebatur fastidio, ut cibum omnino non caperet, non tamen erat valde siticulosus. Fortè quiddam excretum atrabile ad externas partes, pituita circa fauces & capitis partes abundaret. Erat verò tunc aded impotens, ut neque ad sedile surgere posset. Tantum aberat, ut posset ambulare. Erat anxius, & nonnunquam pusillanimitas, quæ ob causam exhibitus est helleborus bis, & factæ sunt capitis purgationes per caput purgia, ut. s. à pituita purgaretur cerebrum, atque purius fieret, & robustius etiam & minis melancholicis passionibus opportunum. Lionea medicamenta parata sunt ori, quæ iam descripsi: & in cibis dabatur sorbitio ex lente, quâ non probauimus. Non narravit, quibus morbi diebus actæ sint expurgationes, constat tamè ambas fuisse ante sexagesimam. Nam sexagesimâ post exhibitum secundo helleborum subsederunt tumores. Venerat verò in genua humor & bilis, hoc est, biliosi succi fluxio etiam ante primum veratrum, quam fluxionem in genua, quæ postremo facta est (nam quæ principio

inceperat, fuerat potius infra genua circa tendines) indicauit dolor, qui omnino maxime ac postremo afflixit. Nam venerant decumbenti ad genua dolores. Hoc est, ex quo decubant, collegunt se dolores in genua. Neque mirum. Nam morbi huiusmodi ex crassiss & coarctatissimis siccis in articulares dolores finiri solent.

Pisistrato deambulanti & alioqui sano humeri dolor & grauitas diuturna accidit. Hyeme vero incidit magnus lateris dolor, & calor, & tussis, & excreatio sanguinis spumosi, qui etiam in faucibus steriorem excitabat, facile autem morbum ferebat, & sui compos erat, & calor remisit, simulque excreatio, & sterior, & circa quartam aut quintam diem sanus euasit.

Typus hic est pleuritidis maximae, & acutissimae exactae, simulque salutariae. Nam speciem indicat syndrôme signorum, doloris scilicet, febri-
Clis caloris, tussis, & respiratoris difficilis (pulsus enim raro meminit Hippocrates.) Magnitudinem vero, horum magnitudo. Quippe dolor erat magnus, & respiratio adeo difficilis, ut esset etiam stertorosa, par autem est, & febrem & tussim magnam fuisse, acurim & excrementa mox apparuisse, siquidem mox fuit excreatio sanguinis spumosi, & tam breui solutum esse morbum, siquidem circa quartam aut quintam. Salutarem vero futurum tantum morbum, etiam ante exitum licebat agnoscere: ex bona morbi tolerantia, & constantia mentis. Nam etiam si ex pleuritide soleant cum mentis constantia mori, non tamen ex adeo acuta, quia quae tam breui est interemptura, non raro est coniuncta cum peripneumonia, quae cum lethali est plerumque mentem laedit.

Simonis uxori in partu concussa dolor circa pectus & latus exortus est, tussis accidit, & febris, & excreationes purulenta aderant, phibitis quae etiam confisit, & per sex menses persenerant febris, & ventris profluvium semper, tandem cessavit febris, aluus estrictus, septima die post cessationem mortua est.

Hae eadem historia occurrit in calce libri. et si praeterito mulieris nomine, & quia quibusdam etiam alius voculis discrepant lectiones, ego hanc illuc transtuli, & tibi enarraui.

Vxor etiam Euxenij ex calidis fomentis agrotare visa est. Calores nunquam desinebant, magis sub vesperam intendebantur, sudores toto corpore dimanabant. Cum febris esset incrementum aseptura, refrigera-

Atio pedum, aliquando etiam tibiaram & genuum accidebat, tussicula sicca modico tempore vexabatur, quum febris exacerbari incipiebat, deinde cessabat. Per multam autem tempus totius etiam corporis rigor accidit, sine siti semper fuit, cum medicamentum potasset & serum, magis laesa est. Ab initio nullius parvis dolore afficiebatur, & facile spirabat, dimidiato autem tempore lateris dextri dolor obortus est, & tussis commota, & anhelatio, & excreationes exiguae, albae, & aliquantulum tenues, nec amplius horror à pedibus, sed à spina & dorso incipiebat, & aluus liquidior erat. Febris cum multo sudore remisit, & refrigerata est, anhelatio vero varia erat, mortua est septima post dimissionem die mentis compos.

Haud dubie est haec narratio mutila, defuncta in ipso initio nonnulla verba. Quae enim oratio imperfectior quam illa, & i. Euxenij de mentis & dicitur? Quid enim idem? Certe defuncta mortua, non enim apte conhaerere his possunt verba quae sequuntur, nisi interponantur multa, quibus narretur modus, quo cepit mulier à calidis fomentis laesa agrotare. Vanum esset velle diuinando supplet omnia quae defuncta, satis sit interpretari, mulierem hanc laesam esse visu calidorum fomentorum, & ob eam causam cepisse feblicitate, & qualiscunque fuerit initio febris typus, euasisse talem, qualis sequentibus verbis describitur. Ex quibus omnibus ego coniecto, ob calidiorum fomentorum usum, excitatam esse fluxionem à capite, pleniusque illud fuisse excrementis, simulque inde refusam esse in infernas partes fluxionem, & ob putrescentiam excrementorum excitatas febres. Nam rheumaticis febribus familiare est, ob pituitosam plerumque materiam, ad vesperam singulis diebus ingrauescere, & cum tussicula incipere; quae incipiente distillatione simul cum febre fit, & aucta deinde febre cessat: familiare etiam est talibus, habere rigores inordinatos, & per multum tempus, quiddam decurrentis excrementa artigant sentientes partes: & sine siti esse, hanc enim ob causam dicit Hipp. siti carete eae feblicitantes, quibus est tussis leuiter irritans. Talibus etiam succedere pleuritidis solet, haerente in latere fluxione, ut huic est factum dimidiato morbi tempore, cum à principio nulla parte doluisset, & bene spirasset, utpote fluxione, neque spiritalia instrumenta eod vique occupante, neque alicubi haerente, sed diffusa, & dispersa indolenter. Pleuritidis vero signa fuerant, lateris dolor cum febre (nam haec, ut dictum initio est, nullo tempore desinebat) & tussis denud mortua, & anhelatio. Fuerunt vero huic mulieri à principio duo, quae eam merito adegerunt in exitum, multa humorum copia, & naturalis calor debilitas: illam indicabant sudores, qui ab initio in totum corpus diffundebantur: hanc refrigeratio magna pedum, tibiaram, & genui; ob has causas pharmaci expurgantis & feri usus nihil contulit, sed potius laedit, quia neque

tanta copia, præcipue cum esset cruda, cedere neque tam exigua facultas bene ferre poterat. Hinc factum est, ut pleuritis nunquam coqueretur, neque excreationes fierent, nisi exigue, candidæ, & tenues: sed calore partim suffocato, partim cum excarnationibus exsoluto, cum sublata videretur esse febris, mulier moreretur. Debilitate caloris naturalis, post excitatam pleuritidem, indicabatur horror non iam ad pedibus, sed ab spina & dorso incipiens. Alnus vero liquidior facta (quæ evacuationi morbis thoracis, in raris quibusdam naturis non est aduersissima, ut in scholijs libri sexti de locis patientibus indicauimus) & multus sudor febrem simul cum naturali calore substulerunt, & perfrigerata est mulier. Anhelatio verò, quæ extremam perniciem indicabat, non desit, sed erat varia, ut fieri solet in moribondis, nunc facultate extremis conatibus mouente, nunc coincidente mortuaeque est seprimâ die post cessationem febris, ex quo inquam perfrigerata est, mente constans, ut scilicet mori plerique solent ex pleuritide, & quicumque ob caloris naturalis extinctionem. Fiunt enim hæc magna ex parte sine læsione supremi principij.

Vxor Polemarchi astate febricitare incipit, die autem sextâ ipsam dimisit febris, postea vero morbum trahens, sub noctem calor intendebatur. Rursus autem quæ intermisera febris corripuit, nec tribus ferè mensibus reliquis, tussis multa aderat & pituita excreatio. Cum verò ad vigesimum diem peruenisset, spiratio semper erat crebra, in pectore strepitus, plerumque sudore distillabat, mane mitior erat febris, & horrores quandoque corripiebant. Somni aderant, aliusque aliquando humectabatur, rursusque sibilabatur, sapiebat illi cibis moderatis. Dimidiato autem tempore ad genua & tibias dolor accidit, atque ut flecteret & extenderet, alterius opera indigebat. Persenerant crurum affectiones usque ad finem iam instantem & pedes ad tibias usque intumuerunt, atque si tangerentur dolebant, & sudores rigoresque desierant: febris autem semper intendebatur. Ante mortem vero alnus effusa est, mentis compos permanebat, tribus autem diebus ante obitum stertor in faucibus audiebatur, rursusque reuertebatur. Moritua est.

An hæc sit alterius Polemarchi vxor, an eiusdem vxor altera, an eiusdem alio tempore & alio morbo laborantis eadem historia, aut diuersa ab ea quæ narrata est in hoc ipso libro, nihil refert disputare, neque est vlla ratio, quâ scire possis: ego ob magni nominis suspicor eandem esse, & quod habeat etiam hic morbus nescio quid simile illi, & quod in similem naturam possit cadere. Illic enim dicebatur esse illi strepitus ex pectore, velut engastrimythos. Hic dicitur in pectore flarus. Sub his lectis suspicio, fuisse mulierem quampiam flatuosam, & cui strepitus in corporis

A canitibus frequenter fierent. Sed hoc habere vtrumque, præsens enarratur historia, ex quâ palam sit, mulierem ex suppuratione esse mortuam: habuit enim maximam partem eius syndromes, quam Hippoc. descripsit in prognostico, dicens omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet, primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò vehementior, & sudores multi oboriantur, tussisque, ac tussendi cupiditas ipsis adest, & nihil memorabile expouit: & oculi cani fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum cutuantur, digiti verò calefunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustule per corpus enascuntur. Constat horum plurima adfuisse vxori Polemarchi, siquidem febris eam non dimisit setè tribus mensibus, & mane febris fiebat mitior, ut quæ noctu fuisset vehementior, & erat plerumque cum sudore, & tussis erat multa: & intumuerunt pedes usque ad tibias. Neque enim quia non narrantur alia omnia, habuisse utpote oculorum canitatem, & maxillarum ruborem, & vngulium curuitatem, & summorum digitorum calorem, & ciborum inappetentiam, & pustulas, proinde negandum fuisse suppurationem: nam & ipse Hippocrates eodem loco dicit, non quasque suppurationes ea habere signa omnia, sed valde diuturnas. Quæ verò (inquit) breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quod apparuerit ex his quæ in principijs fiunt. Simul autem & si aliquantò difficilis spirauerit homo. Itaque dicit cognosci pondum diuturnas suppurationes, ex horum aliquibus, & difficili spiratione. Huic verò exatâ viginti diebus, ex quo febris non intermisit, spiratio erat semper crebra, qualis scilicet esse solet suppuratis, ob putredinalem calorem, & angustiam spirituum cavitatum. Neque obstat quominus suppurationem esse putetur, & excreasse cum tussi assidua pituitam. Nam & si qui ex inflammationibus solent fieri suppurati, tussim solent habere aridam, donec pus erumpat, tamen qui ex copioso carat homo, aut multa pituita iuxta latera putrescente fiunt tales, solent cum tussi, incipiente vel etiam instante suppuratione, excreare pituitam, non tantam ut purgarentur, sed quæ redundantius indicet.

D Hanc verò non dices suppuratam ex inflammatione, ut pleuritide, aut peripneumoniâ, si quidem à nullo horum incipit, sed ex febre pituitosâ, per quam maxima pituitæ putrescentis copia collecta est in spiritalibus partibus. Quod primum indicauerunt, spiratio crebra, tussis, & excreatio pituitæ, postmodum tribus diebus ante mortem stertor in faucibus, qui tribus illis diebus nunc fiebat, nunc coincidente facultate cessabat, nunc rursus reuertebatur, explicante facultate vires extremas, donec mortua mulier sit. Horrores qui quandoque corripiebant & somni facis indicabant febrem esse qualem diximus, patet pituitosam & catarrhosam, à quibus suppuratos fieri diximus solere, estque rationi contentaneum. Suppurata verò cum esset, ab alui humectatione, quæ primum quidem fiebat, & cessabat alternatè, ante finem verò facta est copiose, constat debilitatam esse maximè, & in citam

E Neque obstat quominus suppurationem esse putetur, & excreasse cum tussi assidua pituitam. Nam & si qui ex inflammationibus solent fieri suppurati, tussim solent habere aridam, donec pus erumpat, tamen qui ex copioso carat homo, aut multa pituita iuxta latera putrescente fiunt tales, solent cum tussi, incipiente vel etiam instante suppuratione, excreare pituitam, non tantam ut purgarentur, sed quæ redundantius indicet. Hanc verò non dices suppuratam ex inflammatione, ut pleuritide, aut peripneumoniâ, si quidem à nullo horum incipit, sed ex febre pituitosâ, per quam maxima pituitæ putrescentis copia collecta est in spiritalibus partibus. Quod primum indicauerunt, spiratio crebra, tussis, & excreatio pituitæ, postmodum tribus diebus ante mortem stertor in faucibus, qui tribus illis diebus nunc fiebat, nunc coincidente facultate cessabat, nunc rursus reuertebatur, explicante facultate vires extremas, donec mortua mulier sit. Horrores qui quandoque corripiebant & somni facis indicabant febrem esse qualem diximus, patet pituitosam & catarrhosam, à quibus suppuratos fieri diximus solere, estque rationi contentaneum. Suppurata verò cum esset, ab alui humectatione, quæ primum quidem fiebat, & cessabat alternatè, ante finem verò facta est copiose, constat debilitatam esse maximè, & in citam

mortem actum. Siquidem rectè in morbis omnibus thoracis, magis autem in suppuratione, & tabe, vituperatur ad Hippocrate. Illud habuit raturum, quodque per tales morbos fieri non solet, appetentiam moderatam cibi. Hanc fortasse seruauit aliquid accidi succi citæ os ventriculi consistens: sed ea quoque procedente malo periit. Habes, præter dicta, in hac historia accommodatissimum exemplum infidelitatis sextæ diei, quam tanto perè Galen. celebrat. Nam dimisit ipsam febris die sextâ, reddit verò postea longa, difficilis indicationis, & maligna. Nam durauit plus, quam tres menses; & tentauit natura abscessus frustra dimidiato morbi tempore in genua & ribas, & postremò tabescens mortua est.

E Gesipolis puerulus quatuor ferè menses circa umbilicum dolorem habuit corrodentem. Progressu autem temporis dolor intendebatur, percutiebat ventrem, vellicabat, calores corripiebant, tabescebat, ossa supererant, pedes tumescebat, testes, (quæ circa umbilicum sunt ventris partes inflatae erant & laxæ, quales iis quibus instat ventris conturbatio) cibos fastidiebat, lac solum accipiebat recens, & aliam liquida erat, & sanies subcruenta & fetida subijt, venter atdebatur. Mortuus est ubi vomisset pituitosum quid exiguum & paucum, ita ut genitura esse videretur.

Si quidem rectè dicitur ab Hippocrate in aphorismo 22. sect. 7. à dolore diurno partium circa ventrem, suppuratio superuenit, meritò censetis, huic puero factum esse in ventre tumorem aliquem præter naturam, qui cum ab influxu humorum corrosiuorum inceptit, in suppurationem finitus sit. Fuerunt autem illi facci cum sanguine permixti, aut salsa pituita, aut bilis amara, vel acida, vel horum duo, aut plures, denique qui corrodere possent. Habuit ferè quatuor menses corrosiuum dolorem. Species verò taliuim fucorum ab exeuntibus cognosci poterat. Suppurationem subsecutam (præter dictam suspensionem) indicauit sanies cruenta mali odoris, quæ postremò effluxit, qualis scilicet ex tuberculis præte suppurationis solet effluere. Malum verò fuisse materis alterationem, & pro bono pure prauam saniem factam esse, non mirum. Nam & malignum fuisse succum, qui cum esset affectionem, indicauit maligna corporis affectio: nam & corpus siccat colliquauit, & naturalem calorem extinxit. Illud ostendit illa corporis tanta labes, ut sola ossa relicta viderentur: hoc pedum & testiculorum intumescencia, qualis debilitatâ concoctrice in hepate solet futuris iam iam hydropicis accidere. Fiebat interim fastidiosus, adeo ut vix vllum cibum capere posset, quod significat nomen *anorexiae*, quo hic vritur. Oportet etiam malignam affectionem indicare, celeberrimum apud Hippoc. est. Certè solum accipere poterat lacrescens multum, quod arbitror dabatur, quia ut

A in aphorismis dicitur, confert tabidis non valde admodum febricitantibus. Facta est itaque ut coniecto, suppurationi maligna, & ignei caloris soboles, naturalis autem perexigui. Hinc factum est, ut alius vreretur, exeunte sanie cruenta, & grauior olente. Quapropter excisus, ut par est, internis partibus; mortuus est. Excreuit vomitu iam iam moriturus magnâ vi exiguum quiddam pituitosum; genitura perfumile: quod certè fuit pituita falsa igneo calore densata, & excocta, aut sortè ex interna ac pingui ventris parte derasa particula. Quid enim, in ventris corruptione lethali non est probabile? Verba illa (ventris partes quæ circa umbilicum sunt inflatae erant & laxæ, quales iis quibus instat ventris conturbatio) mihi videntur interiecta. Nam ut ex ipsâ phrasi constat non tam cogitent narrationem vllam, velut reliqua quibus adiacent, quàm prognosticam assertionem: ea proinde ego lineis conclusi, & transilioni fororum excipienda, ac per sese narranda, quod iam faciam.

C *Ἡ γὰρ τοῦ σπλῆνος καὶ τοῦ σπυγμῆτος ἀνάστασις, αἰὶν μάλιστα καὶ τοῦ σπυγμῆτος ἀνάστασις.*

Significatur his verbis, quamquam phrasis sit durissima, partes circa umbilicum flatuosas & laxas potendere ventris turbationem. Venter sanè inflari & distendi potius solet cum alui suppressione in colicis & in tympanicis, tamen inflatus seu potius flatuosus & laxus sit quibus citè futurum est, ut alius turbetur: eodem ratione quâ murmur hypochondriorum & reliqui ventris prænuntiat alui fluxum. Nam sit decurrentibus per ventrem humidis & flatuosis excrementis, solus enim flatus cum facibus aridis inflat & tendit.

P Latea filio iam iam morituro capitis futura valde excauata est. Cum autem aegrotaret semper manu siniciput contingebat, præcipuè **E** partem proximam. Non dolebat autem caput, & in sinistro femore sub inguine sita partes pridie fortasse quàm moreretur linidum quid contraxerunt, testes extenuati sunt.

F Ad pedes, aut digitos, aut femora aut exteras aliquas partes, otiri liuores iam iam morituris, & testes pcutelli, aut etiam gracilescere, ex iis quæ scripta in prognostico ab Hippocrate sunt, constat. Ibi enim ita scriptum est, testes & pudenda reuulla dolores fortes significare, & periculum lethale. Fir verò per reuulsionem reuultum extenuatio, ut vix appareant vlli. Sed & verè extenuantur moribundi, quia in iis quæ bona fruuntur valitudine tument copiam vitalium spirituum, quibus per extinctionem caloris vitalis deficientibus accidit contrahi, ac veluti consumi. De liuoribus quoque ibi scriptum ita est. Si digiti ac pedes omnino nigrescant, minus perniciosis sunt, quàm si liqueant. Itaque liuo-

Maxima intemperie, & vitiosorum succorum redundantiâ laborasse huius hominis hepar constat, & ex alui profusio, & ex tuberculis quæ illi oborta sunt super hepate, & paulo infra secundum hepatis rectitudinem. Nam tubercula omnia, quæ in quavis partium externarum nascuntur, ad vitium eius visceris quod est regione est, referuntur: velut si in inguine dextro, ad hepar, si in sinistro, ad lienem; si post aurem, ad cerebrum. Multo ergo magis si in hypochondrio dextro, aut hypogastrio dextro, reijci debet in hepar. Atque cum accedere deiectiones assidue & calide, hepar quæ in se redundabant pelere certum erat. Quod, cum euacuatio non esset decretoria, maxime signum erat redundantiæ & facultatem superantis. Consentaneum igitur huic hepatis corruptione mortuum esse, qui fuisse multa & repetita euacuatio curandus, cum missione sanguinis secundum hepatis rectitudinem, tum repetita expurgatione per medicamenta, pariter expurganti & extergenti, ac roboranti, velut exempli gratiâ, rhabarbaro, ex scro, aut potione ex cichonio & hordeo: aut agarito, aut utroque simul ut species excruciant poposcisset.

Quibusdam grauis capitis dolor cum calore accidit, quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, & per nares humidum quiddam, tenue, aut coctum; aut in nares aut in fauces ex capite securius secedit, quibusdam autem hæc siccæ sunt. At sideratio (vel crudor) grauis periculum infert. Si autem accedat vomitus anxietatem parientis & biliosus, aut oculorum stupor, aut vocis interceptio, aut rara loquela, aut delirium quoddam, mors & convulsio portenditur. Quicunque autem ex catarrho dimidiati capitis dolore afficiuntur, & per nares humore exeunte insuper moderate febricitant, quinta aut sexta die perfrigerantur.

Capitis dolor grauis, idest, molestus, & magnus cum calore, siue totius capitis, quem dicimus cephalalgiam, siue alterius capitis, quem dicimus hemicraniam, significat affectum phlegmonosum internarum partium capitis. Quod quidem accidit sæpe ex catarrhis calidis: unde duo sunt exitus, aliquando enim expulsi cerebri, scilicet valet sese expedire per propria cerebri emanatoria, quæ sunt nares, aures, & palatum, & exernit succos, nunc rennes aquosos quales redundant, aut sanguinem, & ita quoque cerebrum subleuat: nunc exernit succos coctos, ut pituitam crassam, aut pus. Aliquando passio est alio cruda & sicca, ut sicca sunt omnia hæc, hoc est, nihil exernatur omnino, neque per nares, neque per palatum, neque per aures. Primum quidem illud securius est, hoc verò vltimum periculosum. Nam ut dicitur in aphorismo decimo sectionis sextæ, Dolenti caput, &

A valde dolenti, pus aut aqua, aut sanguis flens per nares, aut per os, aut per aures, soluit morbum. Nimirum ex aquoso succo, aut sanguine dolores capitis catarrhosi, siue secundum totum, siue secundum dimidiatum caput fieri consueverunt. Sanguis verò nunc in pos vertitur, nunc manet insuppuratus. Idonea emanatoria cerebri sunt illa. Euacuati igitur succos tales in eomorbo per parietillas, citè euacuari qualia oportet, & per conuenientes regiones, quare securius multo erat illud, quam per tales

B capitis passionibus, sicca esse omnia emanatoria. Tunc enim periculum est, ne cerebrum sphaculetur, hoc est, corruptum. Nam affectus magnus, ut phlegmonosus, qui neque marcescit suppuratus, neque vincitur resolutus, mortificationem asserit parti solet, quæ in catenosis & mollibus gangræna vocari solet, in ossibus sphacelus. Aliquando verò indistinctè vitur Hippocrates his nominibus, velut hic & in aphorismo quinquagesimo sect. 7. Sphacelum cerebri corruptionem appellans. Est itaque periculum sphaceli cerebri, ubi grauitas doloris & calor phlegmonosus affectum indicant, tamen sicca sunt omnia emanatoria. Est verò id adde gratæ periculum, ut eos quibus ita incipit affici cerebrum, in tribus diebus perire dicat loco citato Hippocrates. At si non sphacelletur cerebrum, sed crescat malum, neque villo modo remittat, morietur homo conuulsus: Inflammabitur enim radix communis neruorum. Quam verò in hunc exitum properabit morbus, accedent vomitus biliosus & anxiosus (ventriculus enim facillimè consentit cum cerebro, siue vulnerato, siue inflammato, siue utcumque grauius affecto, ut in commentario Aphorismi quinquagesimi sextæ diximus) aut stupor oculorum, ac deprehensio; seu congelatio (vicumque lubet vocare, nam hoc cõuulsione musculorum inuentum oculos fit) aut aphonia, aut rara loquela, hoc enim etiam significat instrumentorum motus impedimentum aut metris alienationem, aut vitiumque: aut delirium, quod corrupti iam cerebri temperiem, quæ mens seruatur, indicat. Mortalia enim sunt hæc, & conuulsoria, hoc est, significancia moriturum conuulsium. Itaque si cui dolenti grauitur caput & cum calore nihil exeat, non est affectio secuta. Si accedat vomitus biliosus & anxiosus, aut deprehensio oculorum, aut aphonia, aut delirium, in magno mortis periculo est homo, ac multo magis si accedat duo aut plura illorum. Dolores verò capitis, per quos emanatoria humida sunt, securiores, ac multo magis fræcedat febris mitis, qui enim ita affecti sunt, quinta aut sexta die solent perfrigerari, hoc est, liberati à febre, & omnino à morbo, velut contingebat alicubi per quandam tempestatem morbosam, cuius meminit idem Hippocrates in calce libri quinti, dicens, Qui ex destillatione secundam dimidiam capitis partem dolebant, & humore per nares prodeunte febricitabant moderate, intra quintam diem perfrigerabantur. Constat eum hæc sententiam ex illa historia collegisse atque idem prorsum dixisse hic & illic, hic quidem præcipiens quæ obseruatione cognouerat, illic narrans quæ obserauerat.

C

D

E

F

A sedantur, tussis verò circa quadragesimam, ut Egeſpoli contigit.

Echecrati caco vehemens capitis dolor accidit, præcipue in posteriore parte quæ cernix capiti conneſtitur, & ad verticem propagabatur, progressu autem temporis etiam ad aurem sinistram, & dimidia capitis pars dolore afficiebatur. Mucosa semper prodibant moderate combusta, & tenuis calor comitabatur, nec cibum capere poterat, interdum melius habebat, noctu verò dolebat. Postquam autem per aurem erupit, cessauerunt omnia, erupit verò circa hyemem.

Vnam quoddam exemplum est hoc eius quod nuper dictum est. Quibusdam capitis dolor grauis accidit cum calore, quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, & per nares humidum quiddam tenue aut doctum; aut in aures, aut in fauces ex capite securius secedit: & rursus aphorismo nuper citato, quò dicebatur, dolenti caput, & valde dolenti, pus aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut per os, aut per aures, soluit morbum. Nam huic Echecrati narratur fuisse capitis dolorem grauem, & erumpente per aures pure soluta esse omnia. Græuem autem fuisse dolorem, & otium ex affectu phlegmonosò, qui etiam suppurauit, indicant symptomata. Nam mucosa prodibant aliquantulum combusta, cum tamen tibia non admodum sint combustioni apta, & febricula quædam semper comitabatur, dolor noctu ingrauescebat semper, quæ phlegmonis eo loco suppurantis signa erant, nec cibum capere poterat, quod ventriculum indicabat compati cum cerebro. Non est autem exigua passio, cuius magna est compassio. Indicauit verò id euentus. Nam erupit ex aure pus. Animaduertit verò Hippocrates erupisse hyemem, insuperans arbitror consentaneum esse eo potius quàm calido tempore, eius partis inflammationes in suppurationem abire. Huic verò rei eadem est causa; quæ & senibus magis quàm florentibus ætate pus fit in aure. Nimirum ut dicitur in prognostico febres & deliria senibus minis accidunt, & hæc de causa antea antea suppurantur, ita etiam in hyeme suppurantur magis, quia resoluantur minis, & ægri minis conuellantur, & & delirant.

Certe in omnibus suppurationibus, & affeſtibus oculorum, sub noctem dolores contingunt.

Hæc sententia in quinto libro eisdem prædictis verbis scripta occurrit, ubi & explicata à me est.

Quibus tussis fuit hyemem, maximè flante Austro, ysa crassa & multa exſecrantibus febres superueniunt, quinta autem ferè die

Velut nuperrimè dixit Hippocrates, quicunque ex catarrhò dimidiat capitis dolore afficiuntur, & per nares humore exeunte insuper febricitant moderate, die quinta aut sexta perfrigerantur, dixerat verò illud idem historice in quinto libro; narrans in quadam tempestate ita solitum accidere. Eo modo hoc quoque, quod nunc velut experimento cognitum docet, in quinto libro narrauerat dicens, tussis hyeme grauiatur, maximè flante Austro; cum crassa & multa excreſcant, febres superueniebant; quinta autem ferè die sedabantur, tussis verò circa quadragesimam, ut Egeſpoli contigit. Atque profecto mihi videtur esse eadem proſus vniuersale loci doctrina, nimirum febres mites cum catarrhò solite finiri quinque aut sex diebus. Atque suspicor eandem fuisse tempestatem, cuius ytrobiusque memio agitur, sed distractis & laceratis verbis factum esse, ut dux esse viderentur. Nam ex vtriusque coniunctione fit vna satis concinna narratio, ita scilicet. Tussis hyeme maximè flante Austro fiebat, & plerique ex distillatione secundum alteram capitis partem dolebant, & humore per nares procedente, excreantibusque multa crassa & alba, febres succedebant leniter, & quinque aut sex diebus perfrigerabantur, tussis autem circa quadragesimam cessabat, velut Egeſpoli accidit. Itaque cum grauietur catarrhi magni cum tussi ac hienterania, ac febre leni, & flante Austro maximè inuadent, febres quinque aut sex diebus finiebantur, tussis verò producebatur vsque ad quadragesimam: ex ea tempestate; ac fortasse aliis obseruando collegit Hippocritus hoc loco docet, fieri scilicet, ita solet: oportet verò id præceptum fluxisse ex multis obseruationibus, & deinceps adiuncta ratione confirmari. Obseruationes sunt apud Hippocritum. Ratio ex ipsa ventorum & pathematica natura fluit. Non sunt flante Austro sunt omnino catarrhi magis quàm flante Boreâ; sunt verò magis quales modò describuntur, cum hienterania scilicet, aut etiam cephalalgia (nam eadem est ratio) ac febre leni. Nam Austri caput replent, atque eam ob causam eius dolores parient sunt calidi, & calidas fluxiones ciunt; atque ita etiam febres: Borealis flatus aut nullas facit febres, aut certe acutas, ob phrenitides aut alias internas inflammationes quas generat. Mites ergo quasdam febres cum capitis dolore Austrini potius ventis generant. Multa etiam & crassa excreant, & emungit cito, in Austrinis catarrhis potius eueniet, quàm Borealibus, quia calida & humida causa humoris augere copiam, atque ut ad putrescentiam in paratis, ita etiam ad concoctionem facit. Quod verò in talibus tales febres finiantur quinque diebus, paulò plus minuse, consonum quoloque rationi est. Nam febres ipse catarrhos plurimum marant, atque ob id ipse se consistunt cito: tussis verò non statim cessat, sed postquam perpurata sunt caput & thorax. In quam expurgationem insunt solent quadragesima dies: tempus scilicet motum non omnino longorum, quam ob causam & suppurant, ut dicitur.

circa in prognostico, solent tabidi fieri, nisi quadraginta diebus perpurgentur. Ita, quoque quibus catarrhi sunt magni cum tussi, si tussis magna supra quadraginta dies producat, periculum est tabis (nam tabescere etiam ex catarrhis multis, indicatum antea est exemplis non paucis.) Igitur is qui ita laborat catarrho, ex creatio & emunctio multa facit ut super diebatur securitatem, & soluentur tusses intra tempus legitimum expurgationis thoracis, quadraginta scilicet dies.

Quibus calores multi aliquando sedantur; his non toto corpore, sed circa ceruicem; aut sub alis, aut ex capite tenui dimanante sudore cessant.

Calores multos fieri, cum videantur iam aeterea soluti esse affectus, non euenit recte iudicatis, sed imperfecte & difficulter, ut solent iudicari qui non toto corpore, sed circa ceruicem, aut sub alis sudantes, cessant. Nam ut dicitur in prognostico, sudores circa caput & faciem & circa ceruicem facti, cum acuta febre mortem, cum mitiori, morbi longitudinem significant. Itaque nihil aliud hic dicitur, quam eis morbis, qui sudore non per totum, sed circa ceruicem, aut sub alis oborto sedantur, solere superuenire multos calores modo erratico, cum soluti iam viderentur, quia scilicet tales sudores non indicant perfectam neque tutam.

Charitem hyeme ex tussicula populariter grassante febris acuta prehendit, stragula reiciebat, sopor cum labore aderat, urinae erant rubrae, erui loturae similes, subsidentia statim ab initio multa, alba, postea vero etiam aliquantum rubra. Septima die subsidentia glande paucis prodierunt, sopor detinuit nulla afficiens agitudine, circa frontem maior adsuit, somnus ad noctem, & calor mitior. Octava succum accepit, comatosus permansit usque ad undecimam, hac vero die etiam calor maxime cessauit. Postquam vero tussis adsuit, ex creatio semper multa persenebat, facilis, primum viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta fuit, purulenta similis. Urinae ab undecima die puriores, subsidentia aspera, decimatercia dolor exortus est in dextra parte usque ad lateris inanitatem ad imam ventrem protensus, urina supprimebatur, potus ex Calliphylli decocto contulit. Decimaquinta rursus dolor exortus est. Decima sexta sub noctem hypochondry dolor veniebat magis ad ventrem, mercurialis aqua subduxit. Calor intra vigesimam euasit, & excreationes comitabantur crassa, quadragesima melius habuit.

A Vnus quidam fortasse hic etiam fuit eorum, qui febricitant per catarrhosam illam temperatam, in qua & Egeseolis, tamen febricitauit acutius quam ille & aliquamplurimum eius rem pestatis, ut constet hinc, quantum interfuit febrem esse breuem aut acutam. Soluta est etiam febris Egeseolis die quinta: Chariti vigesima, & dicitur ab Hippocrate ille febricitasse moderate: hic acute. Nimirum si absit essentiae propriae, & symptomatum magnitudo, ac virginitas, non erit morbus acutus, etsi sit breuis. Febricula quaedam initis ex catarrho, breuis esse consuevit, acuta tamen non dicitur. Hic vero cum catarrho habuit febrem viginti dierum, magnam, periculosam cum symptomatis grauib, pendentem ex multa pituita putrescente, & ex sanguine crudiori. Neque vero quia dicit. Ex tussicula Epidemiali orta febris, intelligo tussiculam causam fuisse febris excitandae, sed ab eadem causa ortam esse febrem, & tussim, hanc vero incoepisse, & aucta iam causa, & succo qui prius stuebat solum. Nam putrescente, illam esse sublequatam: ut illud, ex, non significet causam, sed ordinem.

B Febris ergo acuta fuit, siquidem intra viginti dies euasit, agnoscebatur vero a principio eius acuties ex symptomatum magnitudine. Nam stragula reiciebat, & erat illi sopor cum labore, hoc est, sopor, qui quietem non asseberat, neque referebat somnum placidum, sed cum anxietate, & inquietudine, ut simul sopore teneretur, & stragula reiceret, & hac & illac se conuerteret. Quae quia magna symptomata significabant magnam morbum, & quia talia, & haec significabant copiam pituitae non utraque putrescentis. Urinae erant rubrae velut erui lotura, significantes scilicet copiam sanguinis crudioris. Hypostasis statim a principio multa & candida, postea vero etiam subrubra. Nimirum ut Hippocrates aphorismo sexagesimo nono insinuat, pituitosis & ex multa cruditate pendentes morbis, ab initio vel breui subsidentia inest, postea vero talibus sit quum cruda concoctionis initium recipiant, ex alba subrubra. Nam pituita concoctione in sanguinem abit, primum crudiorum, deinde & bene coctum. Hanc ob causam primis diebus apparens subrubra, certiorum significationem concoctionis incipientis praebet quam candida, ob idque Hippocrat. dicit rubramnubeculam quartae die apparentem significare iudicationem septimae. Habuit etiam aluum adstrictum, quod in magnis catarrhis, plerumque visu venit inter initia, & nocet plurimum, estque malum signum. Quia rapi sursum partem humidioris cibi indicat, & retentum fecum vapor caput laedit. Ita euenit, ut septima die electis a glande paucis tamen subleuatus sit. Nam iam inde sopor detinuit sine labore, & humiditas erat in fronte, ut non adeo crudo catarrho: & somnus ad noctem, & calor mitior. Octava (inquit) succum accepit, iuxta veterem scilicet consuetudinem cibandi, quia prima septimana continebantur sola portione. Equidem in magna cibi abstinentia contineri laborantes catarrho primis diebus, consonum rationi est, ego tamen non potui, sed perpaucis & sicco cibo vi suadeo. Non enim minus ledantur humidita-

D

E

F

tre. Rursum ubi hic dicitur, *ἐξ ὧν τὸ πρῶτον ἔσται*, idest, & superiorum partium gravitate laborant, illic legebatur *ἐξ ἀδυναμίας*, idest, & iactantes sese. Quæ lectio rem magis explicat, iactatione enim agnosceatur anxietas. Hastenus ergo lectionis differentia nullius momenti est, quare explicemus reliqua, quæ huius libri sunt propria, nullibi antè scripta. Illa scilicet, *ὅτι τὸν δὲ μὴ ἐν ἀρχῇ καθύπερθε, ἐν δὲ τῇ ἀδυναμίᾳ ἐν πᾶσι χροῖσιν πῶτον, ἢ χροῖνι ἐκαστῶν*. In quibus deficere verba aliqua hand dubito, quia hæc per sese vix quidquam significant: quid mihi insinuen dicam. Dixerat, per inferiora purgandos esse ventres in morbis, postquam cocti fuerint humores emittendi, colligit inde nunc ob id purgandum non esse in principis, & antequam cocti sint, redditque causam referentis incommodum, quod ex intempestivâ purgatione sequitur, quia ubi indicatum erit purgandum non esse ante concoctionem, constabit si omnino purgandum sit, esse faciendum post concoctionem, id verò incommodum est, quod & quarto de ratione victus in acutis dixit his verbis. Alium ab initio per clysteris infusum subduco, medicamentum autem his ne exhibito. Si enim quid circa ventrem commoveris, vrina non concoquitur, sed absque sudore ac ipicatione febris multum tempus durabit. Hoc idem insinuat nunc dicens, *ἐν χροῖνι ἐκαστῶν*. Hoc est, aut morbi, purgatione in principis facta, diuturni accidunt, & ob id periculosi. Fieri verò diuturnos intempestivâ purgatione, quarto de ratione victus probavit analogistæ, quia vrina non concoquitur, quod indicat materię proprię morbi coctionem retardari. Quia, ut Galenus in commentario dicit, expurgationes sunt contrarię concoctionibus: nimirum alterum agitur expellendo, alterum retinendo: nunc probat hoc epilogistæ, ducto argumento ab vno, quod experiuntur homines in morbis, in quibus sponte fiunt evacuationes inter initia. Nimirum tales diuturni esse consueverunt. Tale igitur argumentum continent hæc verba. Evacuatio in principis sponte facta solet apparere in diuturnis, ergo ab expurgatione in principis facta à medico, periculum etiam erit diuturnitatis morbi. Nempe timeri debet ne illud idem eveniat, quod accidit quum sponte talis evacuatio fit.

IN cubiti processu ex casu sauciato cubitus syderatione tentatus suppuratur, maturato verò pure lenta sanies & glutinosa exprimitur, & citò supprimitur, velut Choege nisco & Demarcho Aglaeteli filio. Similiter autem ex hisdem nullum prorsus pus effluit, quale quid Æschyli puero contigit. Quam autem pus conficitur, plerisque horrores & febres superveniunt.

Hæc quoque oratio, siue unica, siue duplex scribatur, occurrat in libro quinto, ubi & à me est explicata, ut non à enarratione nunc non sit opus. Solum lubet monere, pro *ὁ δὲ πῶτον*, idest, ex casu, reperiri in quibusdam codicibus, de quibus

Aμαρς, idest, expunctione, nihil interest, porro hic incipit oratio. *Ἐν τῷ ἀλκιδότῳ*, idest, in cubiti processu, in quinto deest, ea vox, & pro *ἀλκιδότῳ* legitur *τῷ χροῖ*, idest cubito, neque hoc interest, nam idem significatur ambobus verbis. Hic quoque legitur *τοῦ λεγούτος ἐν ἀρχῇ καὶ καθύπερθε*, idest, ichor lentus & glutinosus, illic deest vox *καθύπερθε*, vide quid intersit. Illud interest aliquantò plus, quod illa verba *ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ*, idest citò supprimitur, illic desiderantur, quod etiam in eius loci commentatione animadverti.

B **A**leman ex renum affectionibus connascenti, detractò etiam è venis inferioribus sanguine, sursum ad hepar affectus converfus est, & ad cor dolor vehemens aderat, & spiratio pro dolore detinebatur, & alvus moleste deiciebat exigua stercora caprinis similia. Anxietas non aderat, rigor autem intertidum & febris corripiebat, sudor quoque & vomitus, nec in dolore proderat aqua marina per clysterem infusa, sursum decoctum conferebat. Sine cibo transiegit septem dies, multam meraciorem potabat, postea verò succum lentis, interdum autem tenuem ex faba elixa, aquam superbibebat, postea autem catulicosti carnes, & exiguum quid maxæ quam diutissimè confecta: procedente verò tempore aut cervicis bubulas aut petiosos snillos coctos sumpsit, una cum priori aquæ potione, quiesce, & integumento.

E Morbus renum & colicus non admodum differunt signis, ac proinde proximas habere naturas cognoscuntur; & coincidunt sæpe in eundem hominem, sæpeque alter ex altero superest. Nimirum proximæ partes sunt vrinæ viz & intestina, atque à similibus causis similiter patiuntur, aliquando quidem à succis frigidis & crassis, aliquando à calidis: aliquando etiam ab inflammationibus. Aleman primum nephritide, hoc est, renum dolore gravi correptus est, ob quem cum forte esset inermis, ac videretur satis robustus, missus est sanguis ex inferioribus partibus, iuxta id Hippocratis præceptum, quod sexto Epidem. scilicet prima scriptum his verbis est. In renem dolor gravis (pauca interpositis) iuvenes veratò purgare, poplitem secare, hoc modo curato. Postea ex nephritico dolore se recolligentem, convulsus est dolor fuissem ad hepatis regionem, & ventriculi, quem vocabant veteres cor, & spiritus reddi non poterat, sed pro dolore continebatur, quod quantum coniectò, nihil erat aliud quam dolor coli, quòd cum totam alvum circum, hepatis, ventriculi, & lienis regione attingit. Is verò dolor facilè spirandi difficultatem affert, quia eo loco eorum dissectionem & dolens proximam sepro transverso est, & cum illo in res respirandum movetur. *Ἐν τῷ αἵνῳ* (inquit) *ἐκαστῶν* quomodo intelligitur. Difficultatem egerendi in colicis omnibus facit dolor, refugiente enim

enim naturā pertinet, non audent sese comprimere ad egerendum. Accedit autem & causa alia ex materia. In quibusdam enim flatus facit feces sursum effert, neque descendere finit, in aliis calida causa vt inflammatio aut bilis siccat & exurit. Huic ex calida causa nasci colicum morbum licebat suspicari ex prægressa nephritide, quæ sanguinis detractione curata est, & ex rigore, & febre, quæ aliquando corripiebat: & ex iuuantibus & nocentibus, siquidem lædebat clystere ex aqua marina, & iuuabatur aquæ potu. Merito ergo licebantur feces, & concredebant in spherulas: accedebatque hoc etiam signum calidæ causæ non exiguum. Negar fuisse anxietatem, ego intelligo talem, qualis in otis ventriculi proprio dolo re esse solet. Nimirum eius partis dolor tantam anxietatem afferre solet, vt etiam inferas animi deliquia, & syncopas: huic, cum circa eam partem dolore afficeretur, dolor verò ex ea parte non oriretur sed ex intestino, non erat talis anxietas: erat enim omnino aliqua, siquidem aderat sudor & vomitus. Quis enim sudar præ dolore, aut vomit omnino sine vlla anxietate? Sudor non omnibus colicis adest, sed paræsis: vomitus verò, aut saltem nausæ proprium symptoma eius morbi est, ob sympathiam ventriculi cum intestinis. In huius morbi curatione clysterum multus vsus præcipuum auxilium esse solet, anodynorum & dissoluentium flatus, & extergentium, hoc aut illud magis, vt materia poscit. Quamquam causa morbi sublimis fertur, velut huic cui dolor attingebat hypochondria, scilicet sit aliquando expurgante medicamento, quod totum corpus non moueat, eam deturbare, in quem vsum medicamento diacarthamo vocato ego vti soleo. Huic infusus est clyster ex aqua marinâ, non iuuabatur, quia arbitror exacerbatur humor calidus, & siccebantur magis feces, iuuabatur verò clystere ex surfuribus, vt mitiori, & citra tantam moridicationem extergente. Iuuat fuisse etiam multa cocta, aut sola mixta cum chamæmelino, & aliis eiusmodi. Cuiusmodi sanè etiam erant, quæ ore accepit primis septem diebus, quos transiit sine cibo: potabat enim mulsam meraciorem, postea succum lentis, & aliquando succum tenuem ex faba elixa, quæ omnia extergentia sunt, atque ob id poterant conferre, non tamen perinde consilissent, si simul ipsas lentes aut fabas sumpsisset, genuissent enim succos crassos & lentos, & flatus succi verò non perinde, sed extergebant tantum. Bibebat aquâ, ne, arbitror, vinum febrem excitaret, sed ego neque crudam meramque aquam exhiberem, sed decoctum cassiæ, aut anisi, aut rei cuiuspiam talis. Exactis septem diebus cepit vti cibis: primum quidem carnibus catulinis elixis, & mazamulâ ante subactâ, deinde ceruicibus bouinis, & suum pedibus. Nimirum carnes catulinæ, vt habetur secundo libro de dieta, humectant, & facillè subducuntur: maza verò, vt recens siccatur, & flatus non excludit, neque secedit: ita multò antè subacta secedit, & excludit flatus, & alimentum minus præstat corpori: quod in eodem libro Hippocrates dicit. Ceruicæ boum, & pedes suum præstant alimentum solidius, & tenacius. Itaque voluit medicus qui Alcmænem curabat incipe-

A re à leuioribus cibis, & facillè descendentibus, postea verò quàm & dolor solutus, & causa vacuata videbatur, firmioribus reficere vires, proinde his adiunxit, & priorem aquæ potionem, & quietem, & inregumentum, vt scilicet his reficerentur vires, ac si quid ad huc superesset, coqueretur. Non video tamen cur iam in hac occasione vini aliquid denegaret, nisi forte erat hydro-pota, neque vino assuetus, ac fortasse insinuat hoc autor dicens, cum priori aquæ potione, quasi cum consuetâ, & quâ prius etiam quàm egroret fuerat vsus.

B

A *nephriticam passionem ex decocto cucumeris syluestris clyster inieciū est.*

Vsus clysterum non minùs utilis est inter initia ad nephreticos quàm ad colicos. Habent enim duo hi morbi tunc temporis, vt Galenus dixit, diagnosisem difficilem, & curationem similem. Accommodatissima enim est per alium deriuatio eorum quæ in renes influunt, & renes intestinis plenis grauantur, & comprimuntur, vacuatis subleuantur, ob viciniam. Clysteres verò, nisi nephritica inflammatio aut exulceratio sit, sed vt plerumque solet, lapidis aut crassorum succorum congestio nihil prohibet esse extergentes & amarus. Talibus ob id vtile esse dicit clysterem ex cucumere syluestri. Eadem profus intentione, quâ libro sexto iuuenes ira laborantes iussit veratrum purgare. Tu tamen interim caue, ne clyster habeat plurimum succi cucumeris, sed exiguum cum aliis commistum rebus, solet enim facere magnas dysenterias.

C

P *Armenisci filio surditas contigit, contulit autem non abluere, lana autem expurgare, & insundere oleum solum aut netepum, ambulare, mane surgere, vinum album bibere, abstinere oleribus, pane nutrirî & piscibus saxatilibus.*

D

E *Hæc eadem historia occurrit libr. 5. eisdem profus scripta verbis, præter illa vltima, quibus abstinere ab oleribus, vt pane & saxatilibus præcipitur. A me verò illic enarrata sunt omnia.*

A *Spasmi uxori dentis & maxilla vehemens dolor accidit, qui cum Castoreo & pipere collueretur & ore contineret, remisit, & stranguriosa affectio ipsi sedata est calido farina cum oleo rosaceo fota.*

F

Hæc quoque historia post historiam pueri Armenisci, occurrit scripta libro quinto, quamquam verbis non omnino eisdem, neque tam multis. Nam vbi hic dicitur, *ωρὸν*, idest,

Hæc quoque historia post historiam pueri Armenisci, occurrit scripta libro quinto, quamquam verbis non omnino eisdem, neque tam multis. Nam vbi hic dicitur, *ωρὸν*, idest,

& maxillæ, in genitino singulari, illic dicebatur, *et ipsi ydæi in plene*, id est & maxillæ infumauerunt. Itaque illi significatur fuisse maxillarum tumorem, hic fuisse maxillæ dolorem. Me non multum commouet hæc lectionis differentia, vtrumque enim fieri consuevit, vt doleat scilicet & tumeat maxilla. Quamquam sit altera lectio diligenda est, illam magis probo, quia plerumque dolor ad dentem pertinet, & ad maxillam tumor, quinimò accedente maxillæ tumore solet dolor sedari. Desiderantur libro quinto illa verba, *et quædam in ore gerant*, nihil tamen ob id mutatur aut læditur sensus: nam non poterat collus, quin ore contineret, quamquam explicatur res aliquantò magis hoc loco. Nam ad dolorem dentium non solum oportet idoneis succis colluere, sed citra collutionem etiam ore continere, vt immaneat aliquantulum. Quod de stranguria & farina cum rosaceo hic dicitur, illic omnino deest, à me verò est illuc translatum & explicatum ibidem.

C *Capitis dolores ex vtero Castoreum sedat. Plerique affectus hysterici à flatibus ortum ducunt, indicant ructus & strepitus circa ventrem, & tumores lumborum, & dolores circa renes & coxas; & innuitus niger confert, aut aromatum tertiam partem, farina duas in vino albo odorato coquere, & linteolum imbutum cataplasmatim modo illitum apponere, qua vteris parte vteri dolores affligit.*

Dolore caput per consensum cum vtero dictum est antea ab Hippocrate, initio libri sexti his verbis, iuxta sinciput maximi dolores & quicunque alij ad vteris oriuntur. Iam verò mala quæ per compassionem sunt tolli curatione earum quæ primariæ sunt, & eam esse legitimam eorum curationem, res est notissima: castoreum verò ad vterinas passiones (tas dico quæ autonomatice appellantur vterinæ, quales sunt præfocationes siue ex suppressione sanguinis, siue seminis, siue ex flatu fiant) commendatur vno ore à medicis omnibus. Dioscorides menset, inquit, & partus ciet. Gal. ad ciendos menses illud magnopere commendat, & ab omni noxâ liberum affirmat, nisi mulier multum febricitet. Iam verò Hippocrat. ipse in libris de morbis muliebribus, crebra cum eis facit mentionem. In eum vsum libro secundo, inter multa alia huius morbi medicamina, castoreum aut conizam præscribit. Galenus dat castoreum cum pulegio, aut calaminthâ, quæ cum conizâ facultate congruunt. Itaque castoreum epotum soluit dolores capitis ex vtero, quia soluit vteri morbos, quos solet dolor capitis comitari, suppressiones scilicet menstruorum, & seminis retentiones, & succorum quorumcumque frigidorum, ac flatuum. Neque verò castoreum soluet omnes passiones vteri, sed frigidas; inflammationes enim & erysipelata potius augebit. Quare cum ob vteri inflammationes possit etiam dolere caput, constat non omnes dolores capitis ex vtero sedare castoreum, sed eos qui ob frigidas passiones, quales

A esse præfocationes ex vtero affirmat Galenus. De talium passionum causis multa & varia scripta occurrunt. Plato in dialogo de natura ita scripsit. Vlna animal auidum generandi, quando procul à foru in flore ætatis, aut vitra diutius detinetur, ægrè fert moram, ac plurius indignantur, passimque per corpus errans, meatus spiritus intercludit, respirare non sinit, extremis vexat angustijs, morbis denique omnibus premit. His verbis Plato significat, vterum decurrere per corpus cupiditate venereorum, & eam esse causam præfocationis, & anxietatum. Libro primo de morbis muliebribus, ita occurrit scriptum. Vehementi labore reficcati vteri conuertantur, cum sint vacui & leues. Amplum enim locum quod conuertantur nati sunt, vacuo nimirum ventre. Conuersi verò leuiter appetunt, ei adhærescunt, & ad præcordia impetum faciunt. Vehementiore enim labore plus quàm per est reficcati, ad humorem qui sursum est conuertuntur ac feruntur. Has sententias omnes refutat Galenus sexto de locis affectis optimè, indicans hæc partim fabulosa videri, partim esse falsa. Indicatque causas præcipuas esse in retentione sanguinis, aut seminis, quod & Auicenna & omnes alij medici probauerunt. Causam verò ob quam frigoris tam multa apparent symptomata, atque adeo passio ipsa frigida est, cum tamen sanguis & semen succi sint calidi, esse dicunt, quod detenti conclusiue corruptantur, corruptique refrigerentur, extincto in eis spiritali calore, ascendantque inde frigida sursum in cor, & spiritalia instrumenta, & simul cum visceribus refrigeretur totum corpus. Hoc si ita est, & falli magnopere videtur hic Hippocrates, qui plerique hysteriarum passionum dicit esse flat, hoc est, à flatibus nasci: signumque eius rei esse ructus & circa ventrem conuolutos flatus, qui in ira affectis sentiuntur, & tumores lumborum, & dolores circa renes, & coxas, qui etiam videntur à flatu fieri: arque adeo curationem etiam hoc indicare, quæ tota ealorifica est: videtur inquam falli. Nam status orientur potius à frigida passione, quam semen & sanguis suppressi, & corrupti fecerunt, quàm ipsi status erunt frigida illius passionis causa. Certe videtur hoc quod Hippocrat. nunc docet, dictum esse iuxta sententiam antiquam, quam lib. de flatibus enarrauit, morborum omnium causam flatum esse. Ego verò vt hoc semper esse verum non recipio, ita sepe verum esse confiteor. Plurimum enim exagitantur, & commouentur humores à flatibus: atque in eis etiam morbis, de quibus nunc agitur, perinde sentio, eos plerumque nasci à sanguine aut semine suppresso, nonnunquam verò citra hæc vterum flatu frigido intumescere, atque intumescentiâ suffocare, atque frigore flatum refrigerare partes proximas, vique ad spirituales. Videmus enim sepe sistere, eas, quæ ad tales passiones patatæ sunt, laborare vehementer, quod intempestiue frigidam aquam ingererint, aut aliquos flatuosos cibos, aut acetum gustauerint, aut humente frigidæ solo infuderint, etiam si tunc temporis menstruus fluxus non fieret, neque à viris proximis diebus abstinuerint. In his verisimile est conclusos esse in venteris flatum frigidos, à quibus illi tumescant, & totum corpus refrigeretur.

refrigeretur. Sed quo pacto verè dicatur Hippocrates *ἐν τῇ αἰσθητικῇ αἰσθητικῇ*? Nō enim quia fieri possunt à flatribus, statim plurimas ita fieri retē dicitur? Certe ego intelligo, plerasque passiones hystericas, quæ ob causas procatærdicas & externas sunt, oriri à flatribus. Id quod, oī fallor, verissimū est. Sed quæ de coratione dicit, apponamus. Nō persequitur totam curationem, sed duobus medicamentis insinuat intonementum curationis, quæ iō hoc morbo debet esse calidissima, & discussoria eius quod in vtero & eius vasculis continetur: siquidem diximus esse passionem frigidam, & oriri à semine, aut sanguine, aut flatribus recentis. Et inunctus (inquit) niger coovert. Quandoquidem incipit ab illa particula, & verissimè est fuisse prius scripta alia medicamēta, atque deesse verba aliqua quæ vetustas abstulit, velut hæc ipsa in quibusdam codicibus desunt. Quidam intelligunt commendari hic helleborum nigrum, ego verò quandoquidem dicit inunctus, coniecto esse potius medicamentum quoddam, quod Hippocrates habebat paratum, vocabaturque nigrum ad caput, & solebat in nares ad huius morbi curationem iodere. Nām ille secundo de morbis mulieribus ita inquit. In nares verò aliquid de pharmaco nigro ad caput præparato, specillo exceptum infarcias. Quæ fient huius medicamenti præparatio, non reperi, tamen solemne fuisse Hippocrati & ad hanc curationem accommodatum constat ex his locis. Fuit sanè sternutatorium, & odoris grauis, talia enim naribus harum admoeri vtile est, sicut bene olentia inferius ad vulnus. Dicit ergo & inunctus niger, quasi dicat, & inunctio nigri vnguenti intra nares prodest. Præscribit deinde aliud medicamentum, quod accipit farioze tritice scilicet partes duas, stomatom, cassie scilicet & caryophyllorum & piperis partem vnam: quæ debent coqui in vino albo booi odoris, & linteolo excepta cataplasmatibus modo admoeri vmbilico & hypogastrio, vsque ad os vteri. Hoc, & eiusdem nature multa alia cataplasmata sunt mulieribus vtilissima. Vallesius *ἐν τῇ αἰσθητικῇ αἰσθητικῇ*, i. inunctus niger legisse videtur, quiaque designari vnguentum quoddam nigrum Hippocrat. in mulieribus morbo curatione familiare, multi legunt *ἐν τῇ αἰσθητικῇ αἰσθητικῇ* aut *ἐν τῇ αἰσθητικῇ αἰσθητικῇ*, creduntque per hæc verba Hippocrat. intelligere vium nigrum, in locis subterraneis diu recooditum, defecatum, & calefaciendi, attenuandi, & discutiendi facultat prædium, alij aliter legunt, ambiguum est qui voverit indicare Hippocrates.

Post præscripta verba succedunt mox historię filij Callimedontis, & Mellisandri, quæ tunc præterea, quis lib. 7. occurrit aut eidem præscriptis verbis scriptæ, ubi & enarratæ sunt. Erychidis quoque histõria quæ mox succedit, occurrit in libro quinto, adiectis solùm duobus vocatib, quas illic cum reliquis inter prætati somus.

Idem curationem attingit Hippocrates. Neque tamen omnis idem, neque vilius integram, & à malinitio suscepam, aut si cibus, certe illius solum qui per iudicationem bonam factus est, dico nitem bonam iudicationem, per quam morbus regius prior cessauerit. Nam cum possit morbus regius fieri ob hepatitis obstructionem cum iofiaminatione, aut circa illam, aut ob igneam calorem in hepate aut toto corpore in bilem mutans sanguinem, aut morbi biliosi qui antecesserit causa id

Icterico convenit laborare, sudare, panem comedere, non multum bibere, caput aqua multa calida sed potius rapida lavare, vino albo, somno non multo uti.

bar, multum supererit, quod delatum in corpus defert usque ad entem crassas cibi partes, quæ committit cum bile eam facient hærere tenacius. Potari ergo debet parum, ut id abeat in urina vias, quod multo firmius, si id sit vinum album, est enim diureticum & tenue. Abibit ergo in urina vias, atque si quid eius distibueretur, & extenuabit succos, & aperiet potos. Est igitur hæc curatio propria ipsius regij morbi per se, neque cum vlla alia affectione coniuncti. Arti magis commodus elicietur sensus ex ea sententia, si testatur ex quinto Epid. & pro iniquitate legatur id iudicium.

Calligeni cum vigesimum quintum annum attigisset, catarrhus accidit, & tussis multa. Educabat cum violentia quod effluebat, nihil infra manebat, annis quatuor persenerant. Calores tenues per initia accidebant. Helleborum non conferebat, sed medicus cibus, & corpus macerare, panem comedere, nigrum vinum bibere, obscuriora qualia vellet sumere, abstinere acerbis, salis, pinguibus, succo sylphij oleiis crudis, deambulare multum. Lactis potus non conferebat sed sesamum purum, crudum acetabuli mensura cum vino molli bibere.

Defillationem hanc ex capite in asperam arteriam, qua Calligenes laboravit, constat non fuisse congruentem ætati, senilis enim est morbus, ipse vero viginti quinque annorum, atque etiam ob causam fuisse arbitror adeo grave, & solutu difficilem, ut annos quatuor persenerent, at vero ob vigentis ætatis robur omnino superari potuisse. Nam si tantus catarrhus accidisset seni, maxime si valde seni, coqui nunquam potuisset. Constat præterea ex ijs quæ narrantur, hunc catarrhum non tam esse natum ex multiplicitate excrementorum in toto corpore, aut etiam in cerebro, quàm ex intemperie propriâ cerebri, ita ut non tam excrementa intemperiem facerent, quàm ipsa intemperies excrementa. Si. n. prima morbi causa excrementa fuissent, expurgatio contulisset, at vero quia prima causa erat intemperies, atque intemperatum cerebrum, ex alimento proprio quod malè commutabatur, sibi gignebar materiam distillationis, non conferebat helleborus, sed abstinentia à cibo, & si iniquitatem, hoc est extenuari & præinedia gracilescere. Nam ita detrahebatur alimentum cerebro: in penuria vero eius minus erat, quod distillaturum redundaret, & cerebrum inedia siccabatur, atque ita eveniebat intemperiem humidam cerebri emendari. Atqui quoniam nullo alio malo laborabat, præter propriam intemperiem cerebri, & erat iuuenis, & firmis lateribus, educabat per vim quidquid defluebat, neque sinebat quippiam manere infra, & hærere in pectore. Intemperies cerebri erat, ut dictum est, humida, sed non perinde frigida. Accidebant enim inter morbi initia *ἡσυχία* & *ἀσθενία*, hoc est febres mites, quales ex catarrhis fieri consueverunt. Potius ladebatur à calidis, præ-

A cipuè ab acerbis, salis, & pinguibus, quia talia præter calorem habent qualitates exasperantes spiritus vias, & mouentes tussim. Acris enim pungunt, salia extergunt & rodunt, pinguis *ἡσυχία* vocatur, hoc est asperitatem frigidulam inducunt. Ladebatur etiam à succo sylphij, qui ut ipsemet dicit libro de ratione victus in acutis, non confertis eo ut facit cholera morbum, quia, ut ego in eius loci commentatione dixi, est acer, calidus, & flatusuosus, atque insuetis eo uti malè descendit. Eadem ob causas eueniebat morbo eius usu Calligenem ledi, calefiebat enim & replebatur caput, atque ob id defillatio magis fluebat. Ladebatur quoque crassis oleribus, quia ab his omnibus crassus vapor & caput replens eleuatur. Lactis potus (inquit) non conferebat. potuisset etiam dicere, ut ego existimo, ladebat, quia lactis potus capue dolentibus noxius est, eadem autem ratione etiam quibus circa dolorem faciliè repletur, quare est catarrhosis vitandus. Conferbat ergo *ἡσυχία*, & deambulare multum, sicca enim etiam causa est: sabaudiendum verò est, tempestiue. Si quis enim ita affectionum mox à cibo deambulet, lædetur multo plus quàm si moueatur nunquam. Eadem ratione qua motu iuari potuisset & frictione, & vigilia non omnino nimia. Pro cibo tribuebatur huic panis, cibus sane mediocri omnibus modis, & non carens, nisi ingeratur multus: pro potu vinum nigrum, quoniam arbitror, succos minus facit fluere quàm album. Suspectum verò mihi hoc est, quia replet multo magis quàm album, & per urinam ac sudorem minus vacuat. Sed hæc omnia ad victum spectant. Medicamentum vnicum narrat, quo usus & iustus sit. Porionem ex vino molli, & sesamo puro & crasso, oxybaphi mensura *τρίσμιλλια* appellat metaphorice quod dulce, tale vero confert tussiculosis, & ijs qui indigent facili excreatione, ut etiam sesamum ob blandam illam mucaginem quam habet. *Ὀξύβαρυ* seu acetabulum capit coryla quartam, hoc est duas uncias enim duabus dragma. Intellego autem dari bibendam potionem ex vino dulci & sesamo crudo acetabuli mensurâ. Quis enim posset deuorare acetabulum sesami? Accipiet ergo portio vini uncias duas, sesami dragma duas. Videbitur tamen alicui hæc ad thoracis passionem fuisse accommodatior portio, quàm ad catarrhum ex intemperie cerebri. Certe ex portio per sese parâ poterat iunare caput, iunabat verò hominè reddens excreationem facilem, faciendâque ut nihil eius quod fluebat, maneret infra, quod erat homini vtilissimum.

D Timocbaris historia quæ occurrit hoc loco, occurrat etiam libro quinto, eisdem propterea verbis, quare inane esset eam nunc repetere. Neque est quidquam quod moneam. Ut neque in historia filij Cleomenis, quæ succedit statim, est enim ex etiam scripta, & enarrata in alio loco libri quinti.

Foco in spina gibbositatem ex phrenitide factam. Medicamenti potio nulla contulit, sed vinum nigrum, & panis esus, & balneis abstinere, inungique, & inunctum fricari, sonere non vehemente, neque multo igne sed moderato.

Prælaque à rupe ceciderat, voce est priuata, iactabat sese, & vomuit sub noctem multum sanguinis: qui copiosior effluxit à parte sinistra in quam ceciderat. Melioratum difficulter bibebat. Stertor, spiratio frequens erat veluti moribundis, vena circa faciem distenta erant, supina decumbebat, pedes tepescebant: febris aderat multa, aliquando acuta, maximè expansebat. Septimà vox erupit, leniter incalcescebat, superstes fuit.

Hæc quoque hystoria scripta autè, & enarrata est, in libro quinto eisdem verbis; præter quàm quòd vbi dicitur, febris aderat multa, aliquando acuta, illic dicebatur febris debilis: moxque vbi hic, plurimum expansebat, illic, vocis interceptio: quæ differentiæ lectionum videtur magnam sensum differentiam afferre posse, ac quodam modo repugnantiam, siquidem non videtur esse posse multa neque acuta, quæ debilis: tamen si quis rectè consideret, nihil repugnantie est, coniunctis enim verbis vtriusque loci redditur aptus sensus: ita scilicet; febris multa tenuis, aliquando acuta, hoc est febris multa, aliquando tenuis, aliquando acuta. Nam multa febris esse dicitur, cum quis citra intermissione continenter febricitat: tenuis verò & acuta dicitur Hippocrati ad tactum, quæ tenuiter scilicet, & quæ acutè tactum mouet. Itaque significatur huic febrem, acutissimè continenter, aliquando verò, si tangeretur, videri tenuiter calere, aliquando ardere acutè, nunc calore intra viscera se continente, nunc effuso. Quod hic desine illa verba, vocis interceptio, nihil læditur narratio: repetitio enim erat haudquam necessaria: si quidem dictum prius erat, voce est priuata. Quod verò hic dicitur plurimum expansebat, dicto nulli repugnat, sed auget periculum; quia quoddam initium minabatur conuulsionis, quam solam desine ad evidentissimam mortis significationem, illo loco diximus.

Nisantes per æstatem humeri dolore ex abscessu oborto consistebatur. Huic profuit corpus & humerum distissimè irrigare, & per tres dies vinum album aquosum bibere simul in mari decumbentem, & in eo mingere.

Perbellam curationem tradit hoc loco Hippocrates abscessus dolorifici in humero facti per ætatem. Ea verò est lauare corpus & humerum marinâ aquâ, & per tres dies dare homini decumbenti intra balneum vinum album aquosum affatim, donec intra ipsum balneum mingendo redderet: itaque simul lauari, potare, & mingere. Nimirum lauare corpus & humerum dicitur, quia roto corpore decumbebat in marina, incumbens autem in humero dolentem, vt is humerus magis immergeretur, ita ego decum-

Abens ac fere submersus marinâ potabat plurimum vini albi aquosi, donèc ibidem manens mingendo redderet. Quæ autem fuerit curantis intentio, ipsa curationis ratio indicat, scilicet siccando corpus humorem redundantem per eius habitum absumere, ac articulos firmare, præcipuè dolentem, & reliquum in vinâ vias deducere. Marina enim siccat & absumit superfluum humiditatem, quod salitæ carnes luce claudis indicant; vinum album & oligophorum, seu aquosum est admodum tenue, atque ob id facile in vinâ vias penetrat, ac reliqua deducit. Iam verò quum vrinarias vias aperire, aut etiam vterinas studemus, magna ars est manenti in balneo potiones ad eam rem idoneas propinare: laxatio enim in balneo corpore potio medicamentosa facile peruat. Atque etsi balneum esset salum, perinde tamen accidebat: siccabatur enim partes cuti proximæ, ac articuli eo loco prominentes, neque aded multa carne connecti, ac ligamentata vis verò salis ad partes in alto positas non attingebat, sed solus ille tepor calentis aquæ, qui liquat concretâ, & laxat adit ista cum quadam voluptate: accidebat ergo quod erat maximè exoptandum, vt qui succus imbibitus iam erat ligamentis consumeretur, qui verò non aded, sed consuebat, reuocaretur in vrinâs. Neque verò hoc non erat simile admodum ijs quæ sponte fieri solent, siquidem dicitur in aphorismo. Quibus spes est ad articulos abscessum fore, hos liberat abscessu vrinâ multa. Hoc est quod voluit medicos imitari in Nisantis curatione. Suspicio autem Hippocratem consultò nonasse, tempus facti abscessus fuisse ætatem, & cum abscessum dolorem attulisse, non etiam tuberculum, quia vtrumque conferebat, vt abscessus causa putaretur esse tenuis & mixti idonea. Matinam aquam non opus est à mari deportare, nihil enim deterior est facticia. Fit verò admixtione salis tanti, vt præ aquæ crassitie innaret ouum.

Fllo qui in Syro phrenitide laborans cum visione tremulus fuit, Crurum color erat calicum puncturæ similis, oculus magnus, exiguus motus, vox fracta, clara tamen. Vrina pura subsidentiam non habens. Nunquid propter deiectionem à taphia morbus decimâ octauâ remisit sine sudore euascentis.

Rarissimum exemplum est hoc rei præter ætatem, vt ego opinor, bene gestæ. Non mihi persuadeo phreniticum cum visione tremulo, hoc est deliranti cum vebementi febre, & quodam tremore Hippocratem propinasse taphiam, sed alium quempiam medicum ipsum verò miratum rei euentum in commentaria contulisse. Magnum sanè exemplum ijs, quibus non placet expectari semper ad expurgationes humorum concoctionem, sed ob morbi magnitudinem & vigentem necessitatem volunt dari aliquando pharmaca sine illa. Quamquam ergo simili incidente affectione (etsi aliqui non negem locum habere aliquando expurgationem sine concoctione) id facere nun-

quam tentarem, ut qui sciam, quod omnino sit præter rationem, et si casu aliquando bene cedat, imitandum non esse. Miror magnopere hunc vñ sapientem non esset coniectum in furorē & convulsionem. Nam habebat phrenitidem tremulam, oculos magnos, & exiguum eorum motum, hoc est, inconvulsiuites, & apertos, & vocem *manequim*, quæ omnia in protheticeis dicit esse convulsiva & furorē indicantia: portò habebat magnam febrem quam vocat *ictus*: quæ omnia magnopere prohibere expurgationem constabit facile, legenti quæ Hippocrates lib. de expurgantibus medicamentis scripsit, ac multo magis quæ libello de locis in homine, his verbis. Febricitanti caput ac purgato, ne furiosus fiat. Calfaciunt enim caput pharmaca purgantia, & sanè ad caliditatem febrilem accedens, ea quæ in medicamento est, maniam facit. Hæc Hippocrates. Si ergo cui solam insignis capitis calor est vñs pharmaci facit maniam, quando ceruicis ei cui iam est cum exultatione phrenitis præcipue tremula, & cum aliis signis convulsoritis facit furorē, & convulsionem? Accedebat succos bullantes deorsum inclinare, siquidem neque cum vrina descenderet quippiam: sed erat putra, subsidentiam non habens, quod & cruditatem magnam, & succorum in superna raptum indicabat. Ego quidem circa concoctiones aliquando dari pharmaca posse affirmo ob virgenciam, non ramen nisi aliqua vergentis humoris in ventrem significatione adsit, aut saltem non magna illius ab ea via auctio, quandoquidem potest Hippocrates in iis purgationibus, quæ inter initia faciendæ sunt & nondum cocto succo, ut saltem murmur hypochondriorum adsit. Ego marmuris loco quamcumque vergentiam esse existimo, ut si alvus sit laxa & humidat: si verò præterquam quod nulla sit coctionis nota, inferiores euacuationes sunt admodum superflue. & succi illi rapeti, quando morbus videatur esse grauior, tantò minùs ausim expurgans medicamentum dare, quia tantò certius videtur fore, ut homo moriatur cum furore aut convulsione, aut cum interna inflammatione refrigeratis extremis. Quod ergo, negabimus has ob causas fieri potuisse, ut hic Fallo liberaretur taspia vñ? Cùm præcipue taspia sit vehentissimum medicamentum, si quod sit inter purgantia: Non sanè, siquidem Hippocrates narrat. Dicemus verò rectum quoddam conuulsi ex magno errore, neque cordato medico imitandum. Quid ergo faciemus quum res alicui ex parte adeo virget, expurgationem verò non audemus tentare? (nam neque hoc dicere grauior) mittimus sanguinem pro ratione virium: si id non sit satis, curabimus vñ lenientium medicamentorum succos versus ventrem molliet reuocare, id si rectè cedere ceperit, veniemus fortasse deinceps ad expurgantia. *Ἐπειτα δὲ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐκ ἀνεπιτήδεον*, aut, est dignum consideratione, an expurgationem prohiberet, an verò posceret. Dubitatum de hac re plurimum est à nostris medicis: vbi primum hoc symptoma malignarum febrium cepit esse apud nos frequentissimum, est verò per totam Hispaniam, ex quo per multas illius partes cepit grassari pestis, quæ cum quindecim fere annos iam durauerit, nondum destitit. Vocatur hoc symptoma vulgari nomine tabardillo. Dubitarum

A verò est, ut dixi, an à pharacis in eo malo esset abstinendum. Et primum quidem omnibus ita videbatur, & agendum post missionem sanguinis exsecta venâ, frictionibus, cucurbitulis cum & sine scarificatione, & potionibus alexipharmacis, & diaphoreticis, quod censeretur esse symptoma febrium malignarum (ut reuera est) vbi verò venosa est qualitas succorum, timeri debear ad interna morus, iuanti verò ad externa, & euacuationes profusæ male ferantur ob periculum langoris. Verum vñs iam indicauit, missiones sanguinis sanis magnas in huiusmodi febrium principis esse necessarias, & alui subductiones viles, tamen neque per scamonium, aut aliud eiusmodi, sed per mitiora medicamenta aut aciores clysteres. Neque sanè ratio repugnat. Nam tales febres pendunt ex malignis & multis, atque adeo crassis succis: hæcque est maxima difficilis curationis causa. Quia enim maligni sunt, virgent, quia multi & crassi longo tempore indigent ut soluantur. Vix autem est vlla facultas, quæ plurimum virgentem morbum possit diu sustinere, cùm præcipue in talibus maxime omnium repleri solat caput, quia ebullientibus succis ob malignam putrescentiam erumpunt potius illa exanthemata, quàm vñs facultatis expultricis, vñs variolæ vocatæ solent. Eadem autem ebullitio facit vt repleatur caput primum vñs poribus, deinde succis biliosis, postremò etiam crassis. Has ob causas talibus, vbi primum febricitare incipiunt, lassitudo quædam magna est, cum pulsus magna constrictione, & capitis occupatione fumosa, mox increvit febris, & per uigilio laborat homo, ac nonnòquam delitio, simulque erumpunt maculæ moribus caliculis similes, postremò plerique eorum sunt comatosi, ut quidam videntur omnino facile largici. Opus est ergo ante omnia multitudine deponere missionem sanguinis, quia non aliter quàm ea deposita potest corpus ventilari. Quotum verò tantà missionem sanguinis, quantas ad totam deponendam esset opus, facultas præcipue malignitate labefacta sustinere non posset, subductione per alium opus est, ea enim est secundò loco magna euacuatio pro multitudine deponenda, quæ etiam id habet boni, quod à capite reuellit. Ne sint autem fortia medicamenta, ob febrilem ardorem, sed moderata & assidua subductio alui. In quem vñs quam plurimis non sine magna utilitate, clysterem acrem mox à misso sanguine infundi iubeo, antequam conquelescat per turbatio & lipopychia, quæ plerofque talium inuadit: commoti enim tunc & exagitati succi abundanter in ventrem secedunt. Post hæc fræctione cum re aliqua exurgente, & poros deobstruente, vt hordeacea farina, & inunctione laxante curre, ut chamæmelino, & cucurbitulis & scarificationibus iuuantur. Non quòd eam eruptionem exanthematum censem iudicatoriam, & ob id iuuandam (plerumque enim est merè symptomatica sine facultatis expultricis operâ, & ebullendo facta) sed quia maligna vilitet euocatur ad cutem, postquam maior pars per maiores euacuationes est educta. Vomitus in his, neque significationem vñs præstat bonam, neque vñsquam est procurandus, quia vt sedione secunda libri sexti diximus, in enarratione hystorizæ Simonis, quibus exanthemata adsunt vomitus non conferunt. Nimirum os ventriculi actoris sen-

sus est, & cordi ac capiti vicinior, quàm ut maligni succi in illud debeat conuocari. Si verò non conuocati sponte in os ventricoli insuunt, leui auxilio ut tepida aqua inde reijcendi sunt, mox fouenda pars aliquo roborante medicamento, idque curandum antequàm mittatur sanguis, aut si nondum missus sit, aut nondum satis. Subductoria verò phatmæ ut in ventriculi finem conuocant excrementa & trahunt, ita mox deorsum rorant. Vallesius hoc verbum *exoluto* non ita buie ut *exoluto*, eum plerique interpretes adiungant prius *exoluto*, velintque hunc fullorem fuisse erubibus tremolum, & habuisse corpus conspersum maculis culicum puncturis similibus.

O Linthi Nicoxeno eodem modo die septimâ morbus remittere cum sudore videbatur, sorbitiones accipiebat velut botrum ex sole. Decimâ septimâ ad eum accessi, lingua urebatur calor extrinsecus non erat admodum vehemens, magna corporis exolutio, vox adeò fracta ut vix audiretur, clara tamen, tempora collapsa, oculi concani, pedes molles & tepidi, circa liemem dissentio. Clysterem non admodum admittebat sed resistebat, sub noctem prodijt stercus compactum & paucum, & aliquod sanguinis, arbitror à clystere. Urina pura erat & pellucida, decubitus supinus, crura diducta ob exolutionem, penitus insomnis erat, intra vigesimum diem calor mitigatus est. Potus erat aqua in qua farina crassior macerata fuerat, verumetiam pomorum simpul, & mali punici, & lentis rosæ succus frigidus, & farina lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio exhibita est. Superstes mansit.

Nicoxeno (inquit) similiter die septimâ morbus remittere videbatur cum sudore. Ego non intelligo similiter liberatum videri, atque Fullo nem in Syro, nam Fullo non est visus liberari die septimâ, neque ante decimam octauam, neque tunc quidem cum sudore: sed cum similiter affectus esset ac ille, visus est morbus remittere cum sudore die septimâ. Nimirum hic quoque, ut & Fullo Syrus, laborauit febre malignâ cum exanthematis, cum tamen die septimâ adeo remississet febribus, ut ille videretur ab ea liberatus, minus exacerbatum est. *Postquam* (inquit) *morbus remittere cepit, hoc est succum botri insolati expressum.* Haud satis coarctat ex ipsâ phrasi, an hoc dicat, ut indicet videm quo videbatur, aut occasionem ægrotandi. Mihi quidem ob facultatem porionis & morbi naturam videri consentaneum, eam fuisse occasionem feblicitandi ac febribus augenda. Nam mustum, ut libro secundo de dicta ab Hippocrate dicitur, feruet in ventre tinnitum ut in dolis. Cum ergo dictum super sit, causam exanthematum per febres malignas esse sanguinis feruorem, constat nullam potius esse posse eius mali occasionem, quàm musti ex

A insularis horris expressi porationem. Præterit reliqua Hippocrates, ut qui non viderit, sed relatu agnouerit tantum eum ægrotasse similiter ac Fullonem, & dicit, decimaseptimâ die accessi ad eum. Symptomata omnia quæ se in ægroto dicit vidisse, referebant febrem malignam, vrentem interius magis quàm exterius, & langorem facultatum inferentem, & consulsorium quiddam, & raptum humorum in superna, quæ omnia febribus illis, quibus superueniunt dicta exanthemata, familiaria sunt. Nam lingua ardens, & calor extrinsecus non admodum vehemens, & pedes tepidi significabant vrentem calorem in visceribus: exolutio corporis grauis, & pedes molles, hoc est, laxi, & nullam habentes firmitudinem, & decubitus supinus, & crura diducta ob exolutionem, significabant langorem facultatis animalis: tempora collapsa & oculi canci, vitalis & naturalis: Vox clangosa, ita ut laboriosum esset audire (idest petiipere quæ dicerentur) clara tamen, & clysterem admittere non posse debet resistere, consulsoria erant. Nisi forte siarus occupans intellina arebat clysterem, cui attestaretur dissentio sinistri hypochondrij, aut forte stercus durum obturans rectum intestinum, quod sub noctem prodijt à clystere cum modico sanguine. Hippocrates causam & excretionis sanguinis reijcit in clysterem, atque quandoquidem ille dicit, ita censere equum est, maxime si ex cucumete siluestri, quo veteres frequenter utebantur, aut re alia tali paratus erat clyster: scimus tamen etiam citra clysteres excreta nonnumquam sanguinem, ob solas faeces duras & compactas, atque eam solam causam dysenterici facienda esse solere: verum siestas tanta facum, & urina pura ac pellucida, & vigilia illa magna raptum in caput inuehaat. Tamen cum tunc omnia haberet, mansit superstes, & mitigatus est calor intra viginti dies, neque mirum. Nam tamen morbus hic periculosus esset, experimento tamen longo didicimus, multo esse plures qui ab eo liberentur, quàm qui intereant. Dicit eum esse visum potu aquæ in qua farina crassior macerata fuerat, aut sorbitione polentæ, simul & succo pomorum caspiæ acidi, & mali punici, & decocto lentis frigido, & exhibitum esse loturam farinæ coctam & frigidam. hoc est, aquam coctam per quam colata sit farina, & ea quidem postcocturam refrigerata. Quæ potiones ad extinguendum feruorem, & obtundendas acres qualitates videntur, donec, non tamen adeo ad incidendum, & aperiendum, & diducendum in corporis habitum, quod ille morbus videtur desiderare. Est tamen hic animaduertendum, etsi plerumque ea febrix ex sanguine crassa, & putrescente malignè nascatur, non tamen semper: sed ut morbos alios plerisque differentiam accipere ex materia, esseque aliquando febrem malignam cum exanthematis pituitosam, aliquando biliosam, aliquando etiam strabilliam, & curatiocem etiam ita variare. Huic non tam crassiorum, quàm acriorum & reuipum fuisse redundantiâ, indicant vitio & peragillum, solent enim quibus admista pituita est, comate premi. Ob id consulerunt illæ potiones, quæ aliis fuisse aduersissimæ. Fuisse tamen huic aduersissimum theriacâ uti, aut deco-

B

C

D

E

F

dis ex herbis calidis quantumvis fuissent alexipharmacæ, vt dictamnî, & scabiosæ, & carduibenedicti, quæ tamen in aliis ægrotis simili morbo laborantibus solent vtiliter præscribi. Variant admodum in hac història læsiones, multi enim interpretæ legunt *αἰνὸν ὕδωρ*, quidam verò *πῶν ὕδωρ*, mionisque appositè. Valsæsius etiam legisse videtur *αἰνὸν ὕδωρ* & *αἰνὸν*, cum legendum sit *αἰνὸν ὕδωρ* & *αἰνὸν*, vt significetur ægrum bibisse vinum, & vnas passas & insalatas comedisse.

Fullonibus inguinum tumores exorti sunt duri & sine dolore & circa pubem & cernicem magnitudine similes, febris decem diebus præcesserat, iussi vexabantur ex ruptionibus. Tercio mense aut quarto ventis distentus est. Calores supervenerunt, lingua sicca erat, sitis, deiectiones utrique difficiles, mortui sunt.

Hæc eadem dictio occurrit in libro quinto, atque adeo loogè emendatior, hanc enim corromptam esse & viciòsam ei qui cum illa contraheret facile constabit, neque quidem ego aliam ob causam hic scribi volui, quàm vt ob oculos ponere eius corruptionem, & lectoribus indicarem hunc locum secundum illum emendari debere. Illic habebatur hoc modo, Fulloni inguinum tumores exorti sunt duri & sine dolore, & circa pubem & io collo magnitudine similes. Febtis quidem præcesserat lenta per tres menses, quarto veoter distentus est. Calores supervenerunt. Lingua sicca erat, sitis, deiectiones alio molestæ, mortuus est. Itaque vbi hic legitur *τὸν πρῶτον*, id est fullonum, illic *τὸν πρῶτον*, id est fulloni, & tota història hic narratur de mortis, illic de vno. Coostat verò quàm sit probabilius, morbum vnicum in vnicum quàm io multos homines locidisse, nam videtur figmentum fullones multos eodem omnino morbo laborasse. Rursus vbi hic legitur *τοῦτον τὸν πρῶτον*, id est febres aore decem, tussiculosi à rupturis, illic legitur *τοῦτον τὸν πρῶτον*, id est febres primùm quidem lenta tertio, quæ lætio quàm sit consona, constabit legendi loci illius enarrationem: cum tamen quæ hic occurrit sit ineptissima. Nam in morbo qui à scitibus inceptit voo est consensaneum, febrem ortam esse ante decem dies, multò minis cessasse ante decem dies; si id placeat intelligere. Iam verò vix potes iotelligere, quid sibi velit per *τοῦτον τὸν πρῶτον*. Certè nihil est nisi mendum. Illud verò, *τοῦτον τὸν πρῶτον* inceptum & incongruum est, congruentius illud, deiectiones inferne difficiles. Legendum itaque, pro *τοῦτον τὸν πρῶτον* & *αἰνὸν ὕδωρ* pro *αἰνὸν* ac postea pro *αἰνὸν ὕδωρ* & *αἰνὸν*.

A latione, & esu sepiæ, locustarum & gammatorum, olerum, maximè porri & ceparum, verumetiam lactucarum coctarum, & brassicæ & lapati crudioris, & à placentis & melitis libis & à fructibus horarj, & cucumere, pepone, & potione parata ex vini & lactis mixtione, & erubis, & polenta recentis. Hæc præcipuè cholera morbus, & febris intermittentes grassantur, & hæc quibus horrores superveniunt. Hæc aliquando maligna fiunt, & ad morbos acutos perveniunt, sed curare oportet. Tales autem morbos præcipuè quinta, septima, & nona indicant, melius est verò ad decimam quartam usque observare.

Cholera morbus, siue ad humore bilioso, siue ab intestinis quæ *χολή* vocabant veteres, vt Trallianus censet, appellatos, morbus est notissimus, peninde ac acutissimos, & periculosissimos: eius symptoma est assidua simul & deiectio & vomitio, tametsi etiam alia sit quæ ab Hippocrate vocatur cholera sicca, per quam sunt ad ambas excretiones irritamenta assidua; etsi ipsæ excretiones non subsequantur. Ambæ cholera, & sicca inquam & humidæ nascuntur ab eisdem causis, vt naosæ scilicet & vomitiones. Has fortasse ambas affectioes respiciens dicit, nomine multitudinis *τὸ χολή*. Duas habet hæc dictio partes prima continet causas quæ cholera morbum solent facere, secunda tempus quo ea maximè solet fieri, simulque agit de morbis, qui eodem tempore fieri consueverunt. Morbum hunc constat fieri debilitatò ventre toto, aut ob incoctionem multi aut incoctilis, aut corruptionem cibi facilis, aut qualitatem aliquam ledentem, velut ætrem, aut oisotram, aut pinguem: atque ita cum solet nasci ab esu pinguium & oleosorum (quod hæc resoluant venetum, & velut io fumosam & rancidam qualitatem facile vertantur, veluti carnes pingues) aut dulcium, quodd hæc facile bilefcant (huiusmodi sunt ietia, & placentæ) aut concoctu difficilium, quodd incocta maneant (huiusmodi sunt male elixatæ, aut assatz carnes) aut leuium redundantiumve multa humiditate, quodd facile corrumpantur (huiusmodi sunt olera, & fructus horarj) aut nitrosorum (huiusmodi sunt legumina, & quædam olera) aut acium & exurcium: cuiusmodi sunt aromata & vinum generosum; & meracius. Quædam horum inesse omnibus hic enumeratis causis, quin & earum quibusdam multa, facile coostare potest. Nam carnes suille sunt excrementosæ, & corruptu faciles, crudiores verò, id est male assatz etiam concoctu difficiles. Haec ob causam libro quarto de ratione victus in acutis ita scriptum est, suillæ carnes præne sunt, cum fuerint crudiores aut ambustæ præcipuè autem cholera signuor, & corruptionem faciunt. Cicer nitrosam quiddam habet, vi & sepiæ, & locustæ, & gammari, & brassicæ & laparum crudius, & cerum, quæ etiam omnis concoctu suor difficilis, etsi nō omnia æquè, sed sepiæ, locustæ, & gammari multo plus.

Elixatæ vini odotati veteris, & insalatio, id est

Cholera morbus contrahitur ex carnis esu, maximè verò suille crudioris, & ex cicere, & ebriatate vini odorati veteris & insa-

longa mora in sole per æstum, vtendo faciunt choleram, biliosum enim reddunt sanguinem, & fluxiones commouent. Olera etiam acris vt porri & cepæ eiusmodi sunt, repletiua scilicet acris & naturam irritantibus succis. Considerandum Hippocratem vituperare lactucas coctas, & brassicam ac lapathum crudiora. Datum certe videtur inter cholerae causas recensere etiam lactucarum coctarum, oleris aded à medicis omnibus commendari, & vt illis videtur, innoxij. Certè lactuca vix habet ullam qualitatem noxiam, est nihilominus frigida & humida, quapropter nimius eius vsus replete poterit ventrem cruda humiditate, itaque vt olera omnia (etiam minus quam alia) potest hoc quoque debilitare Ventriculum, si omnino immoderatus sit eius vsus: & eam noxam fortasse infert citius cocta, quam cruda, contra ac brassica, blitum, & beta, & alia eiusmodi. Hæc enim qualitatem cum habere malignam & nitrosam, elixatione indiget, vt eam depellant: lactuca verò cum nullam habeat, neque ablatione quidem indiget vt corrigatur, & coctura fit laxior, & exoluens. Quapropter Dioscorides ita scriptum reliquit, stomachicis illotas esse prodest. Non ergo est quod medicis tanto opere grauentur concedere febricitantibus lactucas crudas, & coctis vti semper cogant, præcipue æstate. Nam Galenus ipse cum antea multo tempore esset vsus lactucis crudis, non alia causa dicit se coctis vti coepisse quam quod dentes iam essent deteriores, vt ipse testatur secundo de alimentorum facultatibus. Placentæ, & mellita liba, pinguis simul sunt & dulcia, & vtraque ratione noxia. Fructus horarj (vt dixi) sunt corruptionis fatilis. Vbi legimus & cucumere pepone, legimus græcè καὶ πεπόνι πέπωνες, dicere quidam possent καὶ μήλον, καὶ μήμος, idest & eucimere, & pepone, & rectè quidem, nam vt Galenus secundo de alimentis dicit vterque cholerae gignit, etiam pepone magis quam cucumer, vt qui crassior illo est: verum quandoquidem circa particulam coniungentem dicit, καὶ μήλον πέπωνες, idest & cucumere pepone, videtur mihi ambabus illis vobis significare solum peponem, quia vt Galenus dicit capitulo 4. illius libri, medici quidam voluerunt peponem appellare: sed compositentes πεπονίστες, ita mihi videtur hoc loco legendum πεπονίστες. Οὐ γὰρ id est, ex vino & lacte parata posio antiquissimis in vsu fuit, decurritque iam antea in ipso hoc opere ipsius mentio. Nam libro secundo sectione 5. commendabatur ad fracturas ossis in capite: nunc recensent inter causas cholerae inferentes r: & sanè probabilis est hoc quam illud. licet illius quoque quam potius probabilem reddimus rationem suo loco. Nam lac acecit facile, cum verò fuerit acidum, vinum quoque trahit in aciem naturam, aceto verò cum lacte permixto nihil ventri magis aduersum, quia lac ipsum in grammos & serum resoluit, & flata disrumpit. Itaque & πεπονίστες potionem hac ratione esse periculosam, ego maxime probō. Polentam non aded video vituperari ab antiquis, quin potius eā vti inbeant ad eas cholerae, quæ ab acris succis excitatæ attemperantium ciborum ac potuum visum desiderant, solum video Hippocratem 2. de ratione victus in acutis dicere, Πο-

A lentam recentem turbationem facere, non afflicta ea vti: id verò non dicit, vt polentæ recentis vitionem, sed vt consuetudinis vim explicet, atque si id quod nunc dicit iuxta illud interpretetur, intelligendum est, polentam recentem afferre solere cholerae quibusdam ob consuetudinem ea vtendi. Polenta testibus, Gal. 3. de alimentis, & Plinio c. 25. lib. 22. parabatur ex farina hordei tosti, atque ob firmandi potius ac sistendi ventris, quam euertendi vim habere, putabatur, tamen recens parata uertit ventrem us qui eā vti non solebant. In secundâ sectionis parte dicit *χολέρα*, idest cholerae morbos præcipue fieri æstate. Nimirum æstate & autumno inopia naturalis caloris laborant, & debiles sunt ventres, & bilis facili in eos confluit. Adde & *ἐκ διαλείποντος πυρετοῦ*, id est *χολέρα* & *πυρετοῦ*, quæ periphrasis significat febres tertianas præcipue, deinde verò & quartanas, quia exquisitæ tertianæ insipiunt à magnis rigoribus, quartanæ etiam ab horroribus & rigoribus exiguis. Dicitur verò abporriri. sectionis tertie, æstate fiant tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alui profluvia. Adde nunc Hippoc. has febres per æstatem ortas, aliquando malignas fieri, & in febres continuas & acutas mutari: ac proinde cauere oportere, idest timere, & curare cautè, neque quippiam erroris committere, etiam principio exiguus proflus morbus, & contemptendus esse videatur, maxime autem tales morbos inquit indicare quintam, septimam, aut nonam. Quandoquidem de intermittentibus loquitur, consonum est intelligere, quintam, septimam, aut nonam circuitionem: nam in intermittentibus non est dierum numeratio, sed circuitum. Quidam illa verba *μάλιστα δὲ πρὸς μίαν, τριάν, ἑπτά, καὶ ἐννέα*, id est *ἐννέα*, ita vertunt, præcipue autem tales morbos, quinta, & septima, & nona iudicant. Mihi verò videtur Hippocratem dicentem, non *μάλιστα* sed *πρὸς* ut solet, dicit verò *μάλιστα* idest manifestos faciunt, seu produnt, seu arguunt, quod quidem nihil est aliud, quam his diebus solet se prodere cornu malinum, quod scilicet in eis soleant ex intermittentibus continuæ fieri. Ob id ergo donec dies exactæ sint, cauere oportere: hoc est curare eos curare, nihilque permittit vt delinquant, suspectos habentes semper morbos, qui alioqui ob propriam figuram videntur esse securi: neque ad dictas vsque dies consulit Hippocrates cauere, sed quasi melius & consultius etiam vsque ad decimam quartam obseruare: nimirum non vult nos ad intermittentes æstualibus securos esse, donec præterisse decimam quartam periodum viderimus, neque fieri continuas.

F *Heretida post solstitium hybernium nocturno lateris dextri dolor, antea etiam consuetus cessauit, pransus est, & egressus horruit, febris sub noctem corripuit, doloris expertus fuit, ruficula quadam sicca vexabatur. Prius non multa, hypostasis copiosa; ab initio ramentosa glabra; diuisa, post quartam verò turbida subsidebant, & urina non decolor subsidentiam habebat, nec collectio in*

matula apparebat, ubi refrigerata esset. Tertia die alius sua sponte egressus, quartâ glande supposita stercorosa & biliosa deiecit: Liquidum erat fluxus, somnus sub noctem non admodum, sed interdum aliquando dormiebat, sitis non erat vehemens. Quartâ sub noctem maxime, cutis circa frontem & reliquum corpus mollis semper eminebat. Febbris ad manus contactum cum madore aliquo superata videbatur, pulsus in fronte erat admodum obscurus, venarum granitas in omnibus corporis conuersionibus & alui deiectionibus percipiebatur, paucis tempore per totum morbum doloris expertus fuit, ab initio anxius, & paulatim vomiebat. Septimâ à subdita glande ter deiecit biliosum & stercorosum, liquidum admodum & pallidum, & tam aliquantulum delirabat, & exigua aliquando humiditas circa frontem aderat. Stragula super faciem ducebat, oculos frustra, quasi aliquid aspiceret, conuertebat, rursusque nitabatur, & stragula abiciebat. Nonâ die sudor mane obortus usque ad pectus perseverauit, donec moreretur, & febris ac delirium intendebantur, circa frontem plurimus sudor, ac velut graucolens quidem, & colore admodum albo. Cutis autem sub pilis erat interpancta, hypochondrium dextrum in tumorem sublatum, à seipso biliosum quid dimisit. Octaua veluti culicum morsus apparuerant, ante mortem iussendo reiecit veluti ex mucro concretos fungos alba pituita circumdatos: excretauerat autem etiam antea parua, alba, lactea. Post cenam quidam per somnum horruit, mane surrexit cum capitis gravitate, horruit, vomuit, capitis gravitate afficiebatur, sub noctem remisit ferè usque ad meridiem, rursus horruit, noctem moleste tulit. Sequenti verò die febris acuta corripuit, vehemens capitis dolor, vomitus multa bilis, qua magna ex parte erat porracea, remiserunt omnia, sub noctem somnus accidit, mane perfrigerabatur, sudor exiguus & mador ex plerisque corporis partibus dimanauit. Circa lienem manu inacebat paucis tempore collectionem indolentem, qua statim euacuit per noctem insomnis erat, sub soli tempore exacerbabatur febris, anxietas aderat, tenebrosa vertigo, intestinorum tormina, capitis dolor, vomitus porraceus, lenis, velut pituita viscosus, circa solis occasum cessauerunt omnia cum sudore capitis & colli. Excreuit post vomitum stercorosa, liquida, biliosa, neque nigra neque incongrua, per noctem sequentemque diem moderatè se habuit, sub noctem rursus insomnis fuit. Vo-

A misus sub diluculum accidit & similiter sequenti die, sine anxietate fuit. Capitis autem dolores post sudores cessauerunt, sub vesperam omnia remiserunt. Nonâ non amplius vomuit, sed magis incaluit, reliquis non videbatur febricitare, vena temporum pulsabant, sine dolore omnino fuit, sitis semper aderat. Nonâ cum ad sellam surrexisset, grane animi deliquium passus est, deiecit à subdita glande parua ramenta nigra, & biliosa, coloris stercorosi fuit quicquid inde distillauit, vox fracta, in corporis conuersionibus gravitate percipiebatur, oculi cavi, cotis frontis circumtensa, aliqui bene spirabat, compositus erat, & ad parietem plerumque conuersus, mollis in decubitu, incuruatus, quietus, lingua alba, lenis. Circa decimam diem & postea urina circulatim rubra in medio exiguum quid album habebant. Duodecima ex glande subdita similia distillabant biliosa & ramentosa, post glandem animi deliquium passus est, deinde os reficabatur, collucebat semper, & nisi frigida admodum esset aqua calidam esse dicebat, nimem leuiter gustabat, deinde sitis non aderat. Stragula semper à thorace projiciebat, chlamydem calefieri non sinebat, ignis procul & paruus erat, utraque maxilla robore suffusa est. Post hac inarticulata fuit loquela, per vnam aut alteram diem recaluit & cessauit.

D Multo magis operosum esset quàm utile, narrationem hanc longam, obscuram, & perturbatè scriptam interpretari: neque sane omnino fieri posset, nisi dimittendo. Nam lucet clarius est, esse ut hic occurrit, à nullo vnquam hominum esse scriptam, sed ob verustatem vitiatam esse mille modis, deesse multa verba, alia esse interiecta, alia permutata, atque ob id quædam incidisse, ubi nihil possent significare. Quale mihi videtur illud, hypostasim multa, ramentosa, glabra, diuisa, quam enim vrine hypostasim intelliges dici glabram? Porro quis non videat peritiam diem enumerationem, ut posterioris antequàm prioris fiant mentio; & eadem pluries reperatur, ex codicum corruptione nasci. Nemo vti oportet lectionem restituere, ne dum enarrare, obid consilius esse viderent ac pendentiùs transire, cum præcipue nihil ad id artem utile videatur tota hac dictione inuoluari. Illud solum scire monere, quod quicumque attentè leget, intelliget facillè hanc non esse unicuique simplicemque narrationem, sed geminam, primam quidem continere historiam Pherecidæ, qui die nonâ mortuus est, & laborauit eî maligæ febris specie, quam nunc in historia fullonis frequentem esse dixi, cum exanthematis scilicet morbis culicum similibus: alteram, alterius cuiuspiam cuius nomen verostate delectum est; qui est liberatus. Pertingit prima narratio usque ad illa verba: Excreta autem etiam antea parua, alba, lactea. Secunda incipit

ab illis, post cenam quidam per somnum borruit. Hoc verò adde est apertum, ut sola adnotatione opus sit.

Androthali vocis interceptio, ignorantia, delirium aderat, his sedatis multis annis superfuit, & recidina contingebant, lingua toto tempore sicca permanebat, nisi colluereitur loqui non poterat, & plerumque admodum amara erat, aliquando etiam cordis dolore afficiebatur, hac sanguis mistio soluit, aqua potus, aqua mulsæ. Helleborum bibis nigrum nec nisi paucum quid biliosum prodixit, tandem hyeme decubuit, & mente alienatus fuit, & similes erant lingua affectiones, calor tenuis, decolor lingua, vox qualis est peripneumonici, à pectore stragula rejiciebat, & se veluti micturam educi inbebat, cum nihil posset aperte loqui, neque sui compos esset, ipsum eduxerunt, sub noctem mortuus est, duobus aut tribus diebus decubuit.

Hæc eadem historia occurrit in quinto libro, sed quia imperfectius quam hic scripta, eius enarrationem in hunc locum distulimus. Quamplurimum reuertere solent passiones apoplectice, humore quopiam repente irruente in cerebrum, quibus id malum non firmatur, neque sit integrè, sed velut inchoatur, significantque illa gravissimorum malorum initia, quibusdam, minoribus quidem quam apoplecticis fieri solent, velut in via tamen ad illa positis. Huiusmodi sunt vertigo magna, & æquis hoc est loquelæ interceptio, & hæc r. ignorantia quedam omnium rerum (in hoc genere est stupor mentis, & obliuio) & æquis r. Huc quidem solum si acciderat, aliud indicat quam apoplecticam passionem, consuetum tamen cum alijs significat etiam illam, & quandam efficiens causæ differentiam. Nimirum humorem qui occupare cepit & obstruere cerebrum, biliosum aut atrabiliarium esse. Ab omni enim succo multitudine obstruente fieri possunt illæ passiones. Nam vel à crasso statu fieri solent earum quedam. Hicigitur Androthales, seu. ut in quibusdam codicibus legitur Androphanes, tale quiddam aliquando passus est repente, atque quia apparatus non fuit adeo magnus, non est factus apoplecticus, sed processit laxio cerebri visque ad aphonia, & ignorantiam & delirium. Multi, ut alibi dictum est, etiam sine verbis delirant, gestibus, & signis. Hic autem fortasse (ut fieri solet) aphonia & ignorantie rerum primum laborans, ubi loqui cepit, deliravit. Cum ergo passio adeo fuisset exigua, ut ne levis quidem apoplexia dici mereretur, sed velut quoddam initium, cessavit; & superuixit homo quodam annis, non ita tamen sanus, ut non rediret aliquando similis passio. Nimirum manebat interius idem apparatus, qui à principio fuerat. Quem indicabat lingua semper sicca adeo ut nisi colluere, loqui non posset, & plerumque valde amara: & cordis dolor, hoc est dolor oris ventriculi, qui

A aliquando incidebat. Hæc omnia significabant vitiosi & biliosi succi redundantiam circa caput, & ventriculum, cui caput facillime consentit. Cum itaque vixisset aliquot annos hoc modo: tandem hyeme decubuit, & intra duos aut tres dies mortuus est, factus (arbitror) aperte ac summe apoplecticus. Primum verò extra se exiit perturbato cerebro, & linguae erant similia pathemata, stocitas. i. & immobilitas, erat iam tunc decolor, & albidus ob naturalis caloris extinctionem. Vox erat peripneumonica, quasi stragularetur, & nihil aperte loqui poterat, & cum angeretur iam ob strangulationem, rejiciebat à pectore stragula, & cum te solutio iam inciperet serpente, ob resolutionem vesicæ urgebatur cupiditate mingendi, & perturbare ut poterat se educi inbebat ut micturam, & educebant ipsum qui aderant, ille verò resolutus postremo totus, sub noctem mortuus est. Interponit Hip. quædam ad huiusmodi effectus curationem spectantia: *Androphanes* (inquit) *est pueri viti, id pueri, pueri, pueri.* Hanc certè curationem hoc casu ego maxime recipio, ac probu. Suspicioque Androthali ob hæc esse productam tot annos vitam: mortuum verò postremo esse, quod cum biberit helleborum nigrum aliquoties purgandi gratiâ, nihil tamen fuit innotuit, quia non euacuabantur qualia euacuari oportebat. Nam biliosum non prodibat nisi paucum. Curatio autem optima, & quæ in hoc casu potest conferre maximè, postulat ut ante pharmacum vias laxiores faciamus, & biliosum sanguinem è supernis partibus quibus hæret sectio ne venæ detrahamus, & aquæ vsum temperemus, & vsum longu mulsæ reddamus lubricam alium: verum citra hæc helleboro biliosus humor non cedit, & homo neque purgatur, neque adiunatur. In eo igitur cui tale quid acciderit, & talis esse videatur humoris species, venam seca pro vitium ratione, & aqua vti iube, & mulsæ interimque cibi boni succi mediocriter quantitate. Mox succedunt historiarum Nicanoris, Damoclis, Parmenisci, & serui Cononis, quæ eadem & eodem scriptæ ordine occurrerunt in quinto libro, atque eisdem verbis, præterquam quod ex historia Parmenisci illic nihil erat præter principium, sed ego totam hinc illuc transuli: atque enarraui cum reliquis, quas nunc ideo repetere nihil refert. Ut neque historiam serui Timocharis, neque pueri Nicolai, cuius etiam initium solum in libro quinto est, tamen effeci quoque à me illuc translati. Itaque licet mihi nunc visque ad historiam Metonis transilire.

Metone post Pleiadum occasum febris corripuit, & lateris sinistri dolor visque ad claviculam protensus; atque is adeo vehemens ut quiescere non posset, & inflammatione laborabat. Dietsio copiosa erat, biliosa, tribus fere diebus cessavit dolor, calor verò circa septimam aut nonam. Tussis aderat, excretionibus neque vilo modo biliosa neque multa fiebat, verum pituitosa tussis comitabantur, cibos sumebat, aliquando velut sanus exibat. Aliquando autem illum calores sequens exiguo tempore corripiebant,

sudores exigui sub noctem accidebant, spiratio in calore frequentior aderat, maxillarum rubor, lateris gravitas, & sub axilla & ad humerum pertingebat, tussis detinebant. Medicamentum per superiora eduxit biliofa: tertia post medicamentum pus erupit, quadragesimā vero ab initio morbi. Per alios vero triginta quinque dies repurgatus est & sanus euasit.

Hic pleuritide laborauit primū, cuius intra tres dies dolores cessauerunt cessante fluxione, tamen non est liberatus, sed inflammatio est ad suppurationem conuersa, & ob id iam inde factæ non sunt excretiones, neque mularæ neque biliosæ, quales. I. ex materia propria fieri solent, sed tamen tussis pituitosa, hoc est per quas nihil excrebatur nisi pituita, ea scilicet quæ naturaliter colligitur in pulmone. Constat huic cessasse fluxionem tertia, suppurationem verò fere perfectam esse intra nonem dies, quia eo tempore cessauerunt calores, qui pure iam confecto exigui manere consueverunt. Vomica puris quadagesima à prima rupta est, iuuit fortasse ut rumperetur vomitio à pharmaco facta. Purgatus deinde alijs triginta-quinque euasit. Habuit hic quidem omnia signa suppurati, & euasit, iuxta ea quæ in prognostico scripta sunt ab Hippocrate. Nam calores interdum fictiles, & sudores nocturni, spiratio in febre crebrior, & maxillarum rubor, & gravitas circa latus pro dolore, & permanentes tussis suppurationem indicabant: Verū cibos gustare, hoc est libenter accipere suppurationem salubrem, Multa etiam deiectione biliosa non potuisse perferari, sed cum maxime videtur liberatus, suppuratum mansisse iuxta morbi conditionem contigit. Nimirum in pleuritide, & reliquis thoracis morbis, nisi in tanis quibusdam naturis, non probatur alui profluuium.

Vxori Theotimi in febre semitertiana anxietas & vomitus accidit, horrorque simul & sitis quum febris incipiebat: progressu vero temporis in ipso febris exordio ingens calor. Cum autem aquam mulsam potasset & vomisset, horror & anxietas cessarunt, & postea mali punici succum accepit.

Hic dicitur in breui hac dissectione, & sequitur ratiō: primo loco significat primam paroxysmi partem, quo significato dicimus quum aliquis rigore incipit, ei iam incipere tertianam febrem, nimirum ipsum rigorem vocantes primam febris partem: secundo loco significat reliquum paroxysmi tempus præter inuasionem. Quo significato, quum finitur rigor dicimus febrem incipere, diuidentes scilicet paroxysmum in rigorem aut horrorem, & febrem. Descendit ergo hic Hippocrates febris semitertianæ, quæ vxor Theotimi laborauit paroxysmos, & dicit quibus suc-

A ccurreret, & in ipsa inuasiōe, & deinceps in febre. Fuisse dicit ei cum febris inciperet, hoc est in ipsa febris inuasiōe, horrorem cum anxietate & vomitu, & sitis: procedente verò paroxysmo, cum finito horrore febris iam inciperet, calorem ingentem. Datum verò esse in initio melicratum, tepidum scilicet ut vomeret, & ita sedata esse horrorem & anxietatem, vacuatis certè bonâ parte succorum, qui in ore ventriculi accruati ea symptomata inferebant: & postea cum iam febris attenderet, datum esse quod ex suda. Quidam vertunt succum mali punici: Hippocrates verò dicit *ἀνὰ τὴν αἵαν* quo nomine non video ab autore quopiam vocari malum punicum. Si verò vocari possit, mihi placet ita legi, quandoquidem malo punico nihil est conuenientius, in febre præcipue patientis ori ventriculi. Atqui suspicor fidam facultate punice esse similem, ut est figura. Nunc incognita est, describitur à Theophrasto lib. 4. de historia plantarum capit. vndecimo. Verum quandoquidem est incognita, tu vteris Hippocratem imitatus in similibus fetuoribus malorum punicorum succo. Diopetis sororis historia eisdem prioribus verbis occurreret in quinto.

Vxori Apomoti in febre semitertiana circa Arcturum vehemens oris ventriculi dolor & vomitus in ipsa febris inuasiōe contigit, simulque vterina instabant strangulationes & ad dorsum dolores erant iuxta spinam. Cum autem huc ei peruenissent, oris ventriculi dolores soluti sunt.

D Velut vxori Theotimi in apprehensione semitertianæ anxietas, vomitus, & horror accidebant ita huic cardialgia, vomitus, & strangulationes ex vtero, vitioso succo incumbente simul in vterum, & os ventriculi. Contingebat verò paulò post solutio cardialgiæ, dolore eunte in dorsum iuxta spinam, quæ scilicet descendit ex ore gula spinæ affixa. Quapropter significat restitutum, solutionem cardialgiæ fieri succo ab ore ventriculi in gulam descendente. Iuuari potuisset hæc quoque vomitu ex mulla, nam soluisset vomitus cardialgiam, & dolorem dorsi antevertisset, & reuoluisset ex vtero, quem interim calida aliqua, & laxante inuasiōe, velut anethino aut irino foueri oportet.

T Erpida matri à Dorisco cum ex causa mense quinto gemellorum abortus accidisset, hæc quidem ab altero statim velut tunica obvolato liberata est, ab altero vero vel prius vel posterius quadraginta diebus, postea autem vtero gestauit. Verum anno nono vehementes ventris dolores diu tenuerunt, & aliquando quidem ex cervice & spina incipiebant, consisterant vero in immo ventrem & inguina, aliquando vero ex genu

dextro exoritur in eundem locum confidebant. Et quum circa ventrem dolores erant, intumescerebat aluus, quum verò sedabantur, simuloris ventriculi dolor accidebat, strangulatione non aderant, sed corpus frigeat quasi in aqua iaceret. Quo tempore dolor accidebat, per totum corpus reuertebantur dolores mitiores quàm in principio. Alia, silphium, acris omnia non conferebant, neque dulcia, neque acida, neque vinà alba, sed nigra & balnea rara. Per initia vomitus vehementes accidebant & cibi excluderantur; nec per dolores muliebria apparebant.

Omnia hæc mala fuisse vetricina insinuat Hippocrates inchoans narrationem ab abortu, qui novem ante annis factus erat, quamquam ab eo non adeò læsus mansit vterus, sed postea concepit, atque ut ego intelligo, pluries, si quidem tam multi anni exstiti sunt, mensituis uondum deficientibus. Non enim defecisse per ætatem constat, quandoquidem dicit per dolores non apparere muliebria, quasi scilicet apparere solerent. Cum ergo haic ex abortu difficili sanè & periculoso (si quidem gemellorum, & mense quinto, in quo solent acerbula esse simillima, & ab altero vix se quadraginta diebus expedit) læsus non nihil maneret vterus, anno nono (cùm interim aliquoties concepisset) incepit morbofa admodum esse ex vtero, fuitque per multum tempus. Inceperunt dolores graves ventris qui diuersimodè fiebant, aliquando quidem ex ceruice & spina incipientes confidebant in hypogastrium & inguina: aliquando verò incipientes ex genu dextro confidebant in eundem locum, in hypogastrium scilicet & inguina; ubi vterus situs est, & quum ibi erant dolores, intumescerebat venter, quum sedabantur eius loci dolores accidebat cardialgia, repente scilicet humore in ventriculum, qui etiam pariebatur cum vtero. Nam initio etiam congingebant vomitus graves, per quos cibi omnes ingeffi rejiciebantur. Erat hic morbus vetricinus fuerit, & cum suppreffione menstruorum acciderit (non enim apparere muliebria, quum dolores tenebant) non tamen afferebat strangulationes, quales fieri solent ex vtero, sed refrigerationem corporis, quasi in aqua iaceret. Nimirum non pendebat malum ex frigidis succis aut flatibus, sed ex acerbis. Frigida enim aura inde ascendens, occurrensque cordi respirationis tollit usum, atque ita & respirationem: acris verò mordendo calorem intus reuocant. Hanc ob causam, neque alia, neque silphium sine lasser, neque alia acris, quæ in frigidis vteri passionibus conferre solent, conferebant, neque dulcia, quia & hæc facile bilisewor: neque verò acida, quia vterus malè fert eorum usum, neque vinum album, calidius enim & mordacius est magna ex parte hoc: sed vinum nigrum, & balnea rara, attemperando scilicet. Arbitror verò causasse medicos balnea crebra, ne humiditas cresceret. His rebus mitigata sunt mala, ac postremò cùm dolores fierent, uoc iam fiebant quales à principio, sed reuertebantur mitiores quidam per totum corpus, quasi ex paucio-

ri & mitiori causa pendente malo, & vtero minus iam affecto.

Vxori Cleomenis circa tempus quo stat Zephyrus, ex nausea & lassitudine lateris sinistri dolor accidit, qui à ceruice & humero incepit, febris aderat & horror & sudor. Inceperat autem febris, neque desinebat, sed intendebatur, & vehemens erat dolor, tussis excreatio subcruenta, pallida, multa, lingua alba, deiectiones mediocres, liquida, urina biliosa. Quartà die sub noctem muliebria prodierunt copiosa, cessauit tussis, & excreatio & dolor. Calor autem tenuis remansit.

Non arbitror nauseam, & lassitudinem ut causas procatarticas morbi hoc loco nominari, sed velut exordia, & initia illius: non inquam quòd nausea & lassitudo morbum fecerint, sed quòd ille à nausea & lassitudine incepit. Itaque mulier primùm laborabat nausea & lassitudine spontanea, deinde successit lateris sinistri dolor, incipiens à ceruice & humero, & febris & horror, & sudor, & cùm incepisset febris cum horrore, & superuenisset sudor, haberetque speciem intermitentis, non tamen desit, sed mansit, & intendebatur, & dolor etiam gravis, hoc est, molestus intendebatur, & tussis & erat excreatio subcruenta, pallida, & multa, & lingua erat alba, & deiectiones mediocres liquida, hoc est quantitate & multitudine mediocres, substantia autem bumida, urina biliosa. Huius morbi præcipuam causam fuisse menstruorum suppreffionem, & in superius partes recursum, eueniens indicauit: præterquàm quod ex ipsius ægroræ narratione id oportuit discernere: nam quartà die sub noctem venerunt muliebria copiosa, soluta sunt tussis, & excreatio, & dolor, mansit tamen calor quidam tenuis, hoc est, exigua quedam febricula. Nimirum sanguis alioqui per vterum effluxurus, per venas communes regregrauerat in latus sinistram, quæ mamma est, vsque ad ceruicem & humerum, ut sane euenit æpissimè. Nimirum habet vterus cum partibus thoracis communes venas non exiguas, ob quas videmus à partu difficili, aut repentina menstruorum suppreffione fieri quibusdam dolores laterum, quibusdam veras pleuritides, alijs peripneumonias, alijs asthmata. Ita igitur hinc facta est pleuritis ob recursum sanguinis, cuius rursus per inferna euacuatione soluta est, superflua solùm febricula exigua, quæ forte præter naturam pleuritidis pendebat ex aliqua putrescente per venas pituita & bile, quas lingua & urina indicabant. Habes hic exemplum iudicationis die quartà factæ, rei ut ego existimo non tam raræ, quàm Galeo visa est & Archigeni. Historiæ vxoris Epicharmi, & vxoris Polemarchi, quæ hoc loco occurrunt, enarratæ sunt in quinto libro, & ex vtriusque locis lectio restituta.

Licing sorori iam atatis prometta accidit vomitus omnium qua quatuordecim diebus accipiebat, febre carebat, cruentarum vomitionum reiectiones aderant, & contractione inducens strangulatio ad os ventriculi procedebat. castoreum, fesele, & succus sidae omnia sedauerunt, moderatus tamen dolor ad partem inanem abscessit. Bulbi succus contulit, & vinum lacteum austerum, & panes quam minimi oleo imbuti.

Strangulationem ex vtero fuisse hanc passio, nem, ob menstruum suppressionem factam, symptomata indicant, & confirmant remedia. Nam contracta strangulatio ad cor procedens nihil potius significat, quam eam strangulationem. Videntur enim sibi mulieres ita affectae strangulati, vtero retractio in cor, consentiente vero ventriculo mox nauseant, & quaedam earum vomant quiddam acceperint. Cum ergo hae tale quiddam sine febre passa sit, & eam strangulationem, consentaneum est ex tali passione procedere: porro talis passio ex suppressione menstruum fieri consuevit, ijs vero quibus supprimuntur accedere solent vomitiones sanguinis, Castoreum & fesele, a Dioscorido, & Galeno commendantur ad strangulationes veritas. Sicut dictum nuper est in historia vtoris Theorimi, videri esse velut speciem quosdam mali puniti, quapropter huic datus est eius succus, non ad veritatem passionem, sed ad sanguinis vomitum. Infirma ergo Hippocrates, non ob eandem passionem data esse hae omnia, sed ob diuersas, dicit castoreum, fesele, & succus sidae omnia sedauerunt: illa scilicet, strangulationes: hae, vomitiones Remittente hoc malo concessit dolor quidam moderatus ad partem inanem: contulere bulbi succus, & oleo paracretico dampis, & panes minimi cum oleo. Vinum lacteum vocatur vinum lacte permixtum quo, ut nuper dixi, utebantur veteres, vocabantque *anapa*. Non est verisimile haec in potu aut esse esse data (nam vino cum lacte misto ad dolores inanem partis nihil esset deterius) sed appositum esse parti inani cataplasma ex panis modico, & succo bulbi, vino, lacte, & oleo, atque eius appositione solum esse eius partis dolorem.

Pausania puellam ex crudi fungis suauitatis corripiebat, strangulatio, dolor ventris. Melicratum calidum epotum & vomitio contulit, & balneum calidum. In balneo fungum vomuit & cum iam omnia soluta esset, sudauit.

Fungi quidam, ut testatur Dioscorides & Galenus, sunt venenosi, atque ita ut habeant aliquod veneni putrefactorij, eiusque quod toto genere venenum est. alij tamen omnes sunt crudiores & crassiores substantiae, atque nisi quantitate modica, bene elixati, atque cum correctis, vt cum pipere, pulegio, origano, aut alijs eiusmodi coaditi accipiuntur, incocti manent, & strangulant. Atque arbitror

A crasso ex illis orto. Nullius itaque fungi est usus satis tutus, cuiusdam vero etiam periculosus. Dioscorides docet rationem dignoscendi venenosum, & eius antidota, atque etiam Galien. 2. de antidotis. Puella hanc non ideo laetam esse constat, quod venenosum edidit, sed quod crudum ob id anxietas eam teiebat & strangulatio, quod non posset ventriculus eum conficere, & flatu frigido inde versus cor & reliquas corporis partes delato. Hinc vero & dolor ventris. Superari fungi soleor meri potu & esu aromatico: quum vero videretur plura in anxietate, satius esset utere vt euomatur. Huic obid amissa spe coquendi datum est melicratum calidum, vt vomeret. Ducta porro est in balneum calidum, vt calor obstatet frigori, quod ex fungo efundebatur, & longe a corde extraheretur. Satus refrigerantes. Vomuit ergo in balneo fungum, & deinde sudauit, & soluta sunt omnia, quia quidquid ante frigidioris fuerat effusum in corpus, sudando expulsiuit. Epicharmi & filij Epiphranoris huiusmodi eratate fuerit in quinto libro.

C Post fauenium squalores contingebant usque ad Aequinoctium autumnale: sub canem autem praesentibus, & ventriculi calidi & febris sudatoria, & crursus statim calefebant, Tubercula vero iuxta aures multis exoriebantur.

Non sine magna loci corruptione scripta est haec historia in quinto libro, atque ideo in hunc, vbi melius scripta occurrit, eius enarratione distulimus. Constat vtille dicere capimus, non contineri narrationem integram his verbis, sed eam esse decimam ex narratione longiori tempestatis alicuius morbo. Quapropter verisimile est multo plura accidisse & in ipsa aetate alteratione, & morborum constitutione, quam hic narrantur, quae diuinae non possit. Fuisse malignos eius tempestatis morbos, vel ex ijs quae hic dicuntur, colligere licet. Nam erant *aperta* *id est* *admixta* *id est* *admixta* *id est* *admixta*, hoc est, sudabant erubi febrientes, tamen non minuebantur sudore febris, quin potius inde videbantur denique incrementa suscipere: & exoriebantur multis tubercula iuxta aures: quorum vtique malignitatem indicare coostat. Nam simplicioribus morbis non sunt decretoria, nisi quae decernant, & evacuationes potius quam abscessus: cum vero sudores febricitantium non deficientes febre vituperentur semper ab Hippocrate, in hac tempestate malignos esse erat longe euidentissimum. Quia per totum ver & totam aetatem vique ad Aequinoctium autumnale contingebant *aperta* hoc est, squalores nulli & erant plura: sub canem vero tantus ardor, vt ventri esset calidi & homines videretur grauiter suffocari.

E Vnde ergo factum sunt febris sudatorij & humidi: nam dicebatur prima sectione secundi libri, iocunditibus sine pluvia febris plerique absque sudore contingunt, si vero io his minus imbris gurgit deciderint, magis sudatorij sunt ab initio. Atqui hoc idem repetitur sectione tertia eiusdem libri. Non certe facti sunt hi sudores ob humoris copiam, sed ob vtriusque ignis vim, colligationem scilicet, vt dicitur ab Hipp. in prognoastico, sunt aliqui sudores, maligni quidem illi & inuiles ob inflammationis vigo-

A *Nicula à tussi vexata (tubercula exorta sunt) circa nonam diem: adolescenti (plenico ancilla filio circa idem tempus alio liquidiore. Ctesiphonti sub arctatum fere circa septimā. Pueri solū suppurata sunt. Eratyl filio ad utramque autem exorta euasuerunt,*

Exempla sunt hæc eorum quibus ea tempestate orta sunt tubercula iuxta aures, arque ita intelligendum est, amicolæ illi quæ à rursū vexabatur, circa nonam diem facta esse tubercula iuxta aures: adolescenti (penico, qui erat ancillæ filius circa idem tempus, circa nonam scilicet diem, et si liquidior fuerit alius. Ctesiphonti sub arctatum, hoc est, incipiente iam autumno. fere circa septimam diem morbi orta etiam esse tubercula: atque ex multis quibus ea sunt facta, pueri quidam solū suppurata esse Eratyl filio ad utramque aurem exorta euasuisse. His duobus non narrat quibus morbi dies orta sint, narrat verò quos habuerunt exitus, alteri scilicet suppurata esse, alteri euasuisse. Vnde licet colligere tres hos exitus habere parotides, quin & alia quæcumque tubercula: alius enim suppurantur, & effuso pure sanescunt: alius, repente & insperato disparent: alij neque euasunt neque suppurantur, sed persistunt, donec homo intereat, aut ipsi paulatim resoluti liberentur. Pueri præ aliis suppurata esse tubercula congruens est puerili nature, quæ calida cum sit & humida, coquendi facultate plurimum valet. Ego non grausbor dicere hoc loco, quid facere soleam in huiusmodi egrotis, quibus per febres malignas parotides oriuntur, quandoquidem censo multos esse ita seruatos, qui alioquin interissent. Mox ac oriri incipiunt, partem laxante oleo fuoco, vt chamæmelino, atque si exire cunctentur loco ipsi cucurbitam affigo, ne abscessus sit minor quæ vt possit conficere: vbi autem sanis manifestus iam factus est, si breui increseat plurimum, mitto rursū sanguinem, ne sit maior quàm possit sustineri: mox verò durum adhuc tumorem, neque vlla suppuratione expectatā, ignito ferro sperio: alterā quidem in parte, si alteram solū obleserit tumor in utraque verò si utramque, & cataplasma suppurans appono. Plerumque res cedit bene, nam breui compulserit cum inusta scarā tumor, & manare pus incipit. Et per id orificium caput & reliqua viscera perurgantur. Neque hoc debet cuiuspi videti atrox: pars enim ad nosaper se se quidē vils est quamque ob id licet vtire & secare, & utramque continere.

Nulli sudores, præ lingue siccitate blasierant. Ornithia flauerunt multi & frigidi, & nives post calī serenitatē aliquanāo contingebant, & post æquinoctium Austriua Borealis permixta, pluuia frequentes. Populariter grassata sunt tusses multe, præcipue autem in pueros. Circa aures multis qualia Saisyris exorta sunt: quandoque verò quæ præefferat hyemes, valde hyberna fuerat in niuis & pluuiis Borealis.

A Hæc verba & aliunde decisa & malè inter se connectata, nulla ratio est rectè enarrandi, Censio expungenda.

Tymonastis puero duorum ferè mensium, exanthemata in cruribus, coxis, lumbis, & mox ventre, & tumores valde rubicundi acciderunt. His autem sedatis convulsiones & affectiones Epileptica acciderunt, febris expers fuit per multos dies, & mortuus est.

Nihil frequentius quàm pusillis oriri exanthemata, cum tuberculis quibuldam rubris [quas vocant variolas] aded vt hanc ob causam multi censuerint eas à reliquis mensuris sanguinis oriri, ego verò non censibo improbabile, cū non in omnibus, tamen in adeo paruulis id ita habere. Quia et si infantes non nutriantur pessimo illo sanguine, qui singulis mensibus expurgabatur sed selectiori, non potest tamē non aliquid etiam illius cum bono ad eos transfundi. Intercunt pueri ex his abscessibus vt ex alijs quibusvis, vel quod tamen & tam multi sint, vt non possint sustineri, sed partes etiam principes occupent, aut alias, et si non principes necessarias tamen copiantur: vel quod sint minores quàm vt perurgare possint corpora, vel quod vbi ceperint fieri euascent, hinc non bene ex ille, atque cum exire cepissent, colligisse tales succos in alium aduicerna, atque ob id non tenuisse, constat, primum quia non per totum corpus, vt solent tumores illi facti sunt, sed solū in cruribus, coxis, lumbis & hypogastrio: nam de quia illis sedatis successit epilepsia, et ea sine febribus. Si enim febribus successisset fortasse febrius vi: quoniam verò sine febribus constat successisse ob humorem illum venesicū, qui in principia, netauam irrepit.

Polemarchi puero contigit superiori tempore pus intro colligere & excreare, postea verò calores ipsierant, & hydropē laborabat, & lienis tumore & spirandi difficultate. Si quando ad verticem loci cuiuspiam eminentioris accederet impotens erat & siticulosus, & quandoque moderato cibi fastidio tenebatur, sicque iugula sicca multo tempore per se verabant, & nisi subduceretur, aut solueretur inferior alius, implebatur, & spirandi difficultas & suffocatio angebantur. Tandem verò catarrhus & excretio superuenit & tussis, excretio autem erat crassa, pallida, purulenta & febris vehemens, quæ videbatur defuisse, & tussis mitor effluere: & excretio pura. Rediit rursus febris acuta & spiratio crebra, mortuus est. Verū antea riguerunt pedes & postea perfrigeratus est, spiratio magis interclusa est, urina substituit, extrema refrigerata sunt, mentis compos interijt tertio & recidit die.

Multi suppurati, quibus ætas est adhuc firma, si citra vllū ætatem in ydru exceptioni studerent

patienter, liberarentur, qui aut cibis venter in-
commodus, ante tempus domo exeuntes, & v-
entes occurrentes, aut multo edque frigido potu
v-entes noxas augent, aut alias accerfunt, aut plu-
ries suppurantur, cum iam incepissent à prioribus
suppurationibus enadere. Velut hic puer, cui cō-
tigit primum suppurari, & excreare pus (fortasse ex
catarrho aliquo solum cum non pariter morbum
aliquem acutum antecessisse) postea verò quā ex-
creare parulenti inceptat, erant ipsi calores fe-
briles (velut scilicet euenit suppuratis) interdiu
exiguus, noctu incrementis: cum verò ille sitis esset
impatiens, & multam aquam potaret, factus est
hydropicus, lienosus, quare & anhelosus, neque
poterat in sublimem aliquem locum conscendere,
& fisticulosus adhuc magis erat, ut solent qui sūt
hydropici. Hæc quidem omnia sæpe fieri solent
ex multo aque potu, causā verò est quòd cū aqua
moretur in hypocondriis, ea intumescant plurimū
& cum immanente aqua immanent etia reliqua
excrementa, quæ immanentia hærent & inbibun-
tur durantque, & in rumorem attollunt, & malè
peruia faciunt viscera. Id quod crebrius accidit li-
eni, ob naturalem eius frigiditatem naturamque
rariorem & melancholicam. Frigida enim natura
facit id viscus opportunum ad frigidus affectus:
raritas ut capiat aquæ multum, & distendatur: na-
tura melancholica, ut melancholiam congerat, &
scirrhosū fiat. Hinc euenit mox trahi in compassi-
onem hepar, & fieri hydropem. Qui laborat
necessario sunt anhelosi. Comprimitur enim sep-
tum à distentis visceribus, & eandem ob causam,
& quia gestant viscera, velut pondera quædam a-
liena malè se mouent loco præcipue in sublimem ali-
quod præcipitum conscendere nitantur. Super etia
fisticulosi quia retenta diu aqua putrescit, sitque
falsa, & ob id sitim auget. Puer igitur hic ea om-
nia mala contraxit ex nimio aque potu Cibum
quoque fastidiebat, id vero non nimis, sed aliquan-
do moderatè. *Amen* quidem fiebat ob corruptū
circa ventriculum humorem, appebatur verò ali-
quando etiam moderatè ob affectum frigidū. Ma-
lo ita procedente desinit excretio, & tussiculæ sic-
cæ fiebant, quales scilicet superuenire solent sple-
nicis, & hydropicis transuso semper aliquo succo
in rhoracem per septum transusum. Habebat
tunc temporis puer illud accidens notari dignū,
quodque in multis ita affectis animaduerti quod
est aluum, si supprimatur tantillum, neque sit sēper
lubrica intumescere & repleti, atque ex eius plu-
ritudine anhelationem & suffocationem crescere:
sin autem semper egerant necesse est debilitari,
neque inde tamen affectus sanescit, sed solum
liberantur ab ea molestia, quam retentio
affert. Huius rei causā est exigua cibi & po-
tus in totum corpus distributio, partim obm-
brozum debilitatem, partim ob hypocondriorum
obstructiones contingens. Tandem hoc est post-
quā diu ita ægrotauerat, rediit alius catarrhus &
tussis amplius sicca, sed cum excretionis crassa, &
pallida ac purulenta, facta scilicet denud alia sup-
puratione ex pituita scilicet permixta, & hac excreatio-
ne aliquādiu duratē febris vehemens mitigata est,
ut videretur cessasse, & tussis facta est mitior, & ex-
cretio pura, hoc est candida sine bile & pure: &
cū videretur iam habere ob hæc melius, postremo

A redeunte, ut suspicor, alia suppuratione collectio-
nis alicuius interim insensibiliter factæ, rediit rur-
sum febris acuta, & spiratio crebra. Et cum facul-
tas iam multas recidivas non posset sustinere, cō-
cidit, & mortuus est homo die tertiā ab hac vlti-
mā recidiuā. Ante mortem verò ob extinctionem
naturalis caloris tiggerunt primū pedes, deinde
frigus toto corpore sensit, & ob calum facultatis
vitalis spiratio magis interclusa est hoc, est inter-
rupta & intercepta & vtrina etiam sublitur natura-
li iam facultate cadente, & sui muneris oblitā, &
extrema omnia, caput scilicet man^a ac pedes refrig-
gerata sunt: interitū verò sine delirio, ut solent sci-
licet qui tabidi intereunt ac suppurant, quāvis ea
passio ad nullā præcipuam partem minus pertinet
quā ad cerebrum. Itaque huius pueri malū fuit
tabes, interim, ut multis vidimus accidere, fere-
batur in hydropem, malum sanè ubi processisset
insuperabile, quod tamē circa initia superari forta-
se potuisset, vel solo bono victu patienter tolerato.

C *Filio Thini in ardente febre magnū pere ma-
cerato fame, crebra alui deiectione accideba-
cum bile, animi deliquio, & multo sudore. Ve-
hemētè refrigeratus est, & vox totā die & noc-
te deficit, infillatum pituitæ succum conti-
nuis, mentis erat compos & bene spirabat.*

D Exemplū est hoc indicationis per deiectiones bi-
liositas factæ in febre ardente, vix autē toleratæ ob
efficiendā crebritatem, & ob nimiam cibi detractio-
nem per totum morbum. Cum itaque petiditaretur
iam mori, ac post animi deliquium & sudorē mul-
tum refrigeratus iam esset, & totā die ac nocte vox
defecisset infillato succo pituitæ paulatim re-
diit ad sese, loquebatur, sapiebat & bene spirabat.
Quæ omnia redeuntis iam facultatis erant signa.
Admonet nos hæc historia, ne simas nimium in cibi
per morbos detractio. Nam inter cetera facit
sequentium indicationum impatientiā, præcipue
si succedant crebræ & præcipitæ vacuationes.

E *Picharmi filio ex itinere & potu cruditas
accidit, postridie autem mane anxietate
ortā, & cum bibisset aquam cum aceto & sale pi-
uitam euomit: posteaque cum rigor corripuit,
lotus est febricitans & pectus doluit. Tertiā
die sub ipsum crepusculum sopor modico tempo-
re cum detinnit, delirabat & febre acutā labo-
rabat, morbum graniter ferebat, quartā die
in somno mortuus est.*

F Iter & potus multus siue aque siue vini sunt ex-
cūsus quæ præcipue possunt cruditatem facere, &
in ventriculo, & in aliis officinis concoctionis.
Nam motus vehemens euocans à ventre, ac in cor-
poris habitum distribuens naturalem calorem, ci-
borum primam concoctionem tollit, ac verò sub-
larā sequentes malè agi necesse est. Potus multus
calorē extinguit, aqua quidē frigore & humore, vi-
nūquā multū cū sit nō videtur iniuriū verò manēs
acelcit, & maioris etiā quā aqua cruditatis causā sit

Hic verò crudelitatis nomine, eius concoctionis quæ agitur in vetriculo sublaro intelligitur, à qua multos, eosque graves morbos solitos esse oriri nemo ignorat. Plurimum enim grauat, & distendit vetriculum, quod inuictum in eo manet, sentiturque mox, velut alienum quoddam, & minime naturale pondus, corruptionem verò aliquam consequens, mordet & rodit, Hinc sunt. facile rigores & febres: rigores quidem, dum adhuc in ore vetriculi cruda manent, ob eius particulæ acetum sensum febres quâ iam descendunt in alium, vt lib. 6. huius operis Hipp. ipse significauit. Consensient quoque facillimè cum vetriculo cerebrum & cor, à dco vt nullus sit eorum partium morbus, qui non ob ventris passionem fieri soleat: nam & sopor, & vertigo, & petuiglinum, & delirium, & conuulsio, & apoplexia omnes passionis, & deliquia animi, & syncopes. Verum tamen non mihi videtur probabile, hunc puerum die quarta, ab ea qua crudelitatem sentire incepit, mortuum esse, sed mortuum quidem esse, velum tarciis & Hippocratem solùm affirmare mortuum esse, non tamen mortuum esse quarta die, nisi forte grauiora alia passus fuerit symptomata, quæ Hipp. tacuerit. velut conuulsiones fortes, aut syncopes. Nam quæ hic narrantur, grauiam quidem sunt, non adeò tamen vt ob hæc sola videretur tam breui moriturus. In hac narratione vt in alijs fere omnib. id desideratur quâ maximè pulsus differentia, cuius nisi rarissimè Hipp. non meminit. Si enim præter ea quæ narrantur, habuit hic à principio pulsus exiguus, magnæ contractionis, mixtè diuersos, quales ob os vetriculi sæpe sunt, & à die tertia cœpit habere formicantes, non miror die quarta obuisse, correptum syncopæ: si verò non erat adhuc graues pulsus differentia, crediderim aliquandò plus protrahit esse morbum & Hippocratem trasilasse, aut ex hac quoque narratione perisse vetustate multa verba. Sed explicemus quæ narrantur. Primum quidem itinere & nino io potu læsus sensit in vetriculo crudelitatem, ea sentitur vetriculi grauitate, & tentione, & ructibus accidiis, vel cibos incommutatos referentibus, nam nidorofam corruptionem potius quàm crudelitatem nunc vocari malo, tametsi alibi cruditas etiam appellatur: die sequenti, manè, cum anxietate sentitur, accipit acetum multa aqua dilutum, & inmixto sale, ad vomendum, & vomuit pituitâ. Nihilominus cum cruda adhuc manerent in ventre neque essent teiecta vomitu, mox eadem die apprehendit eum rigor, cui successit febris, & locus est fabricitatus, putans fortasse eam febrem esse diariam ex facietate obortam (nam solent tales incipere ab horrore, aut rigore, dissidereque parum à putridarum forma) sanietatem verò iam esse confectam, & febrem balneo soluendam: vetum aliter euenit. Dolore enim iam inde cœpit pectus, etudis atbitror succis, qui circa ventrem erant in pectus balneo effusis, & sursum eunibus: nam in superiora adhuc laris, die sequenti, quæ erat morbi rectia, summo statim mane sopor eum apprehendit, qui modicum durauit tempus, & iam inde delirabat, & febris erat acuta, hoc est, ardens plurimum, compotrescente iam cum crudis bile, & in capite, & per totum corpus. Quam etiam ob causam quarta die erat insomnis, & ferebat grauior morbu. hoc est, erat inquietus & anxius, quod signum erat malignitatis

A morbi, & debilitatis facultatis. Tandè cum hæc fierent acfortasse etiam alia plurima, mortuus est. Huius ægroti notandi sunt errores multi, primum quidem quod irer agens plurimo potu vsus sit: deinde quod acetum & sale vomendi causa biberit, cum laceret vti alijs innocentioribus, vt tepida, sine mulla, aut diluto oxymelle, aut hydzaleo: deinde quod impuro adhuc corpore, arque in initio febriis puridæ cum cruditate selanetur. Quæ omnia fuissent magnopere cauenda, sed procuranda fuisset, primum quidem crudorum ex ventre vacuatio vomitione ex dictorum aliquo, & clysterum vsu: deinde reliquiarum concoctio, quiete, tegamentis, & inunctione.

A *Ristoni pedis digito exulcerato cum febre non satis manifesta quid gangranosum ascendit vsque genu, mortuus est, vlcus verò erat nigrum, siccum, fatidum.*

Vlcus nigrum siccum & fatidum: haud obsecutè significat corruptionem naturalis caloris, & facularum naturalium in parte. Quapropter tale vlcus admodum lethale signum est. Nam non aliam ob causam nigrescit & fæter, quàm quod à calore præter naturam corrumpatur naturalis calor, & pars emoriatur, vnde gangræna accidit. Quam breui vsque ad genu serpere longè erat pessimum signum, quia ad plurimas partes arque adeò ad totum corpus indabat pestinere naturalis caloris defectum. Febres quæ per huiusmodi affectus sunt exigui esse consueverunt, vt in omnibus siue naturis, siue dispositionibus quibus exiguus est naturalis calor.

I *lle cui carcinoma in faucibus exustum est per nos sanitati est restitutus.*

Karphaia grecis quibus cancer dicitur, est duplex, cum vlcere, & sine vlcere: nascitur vterque ab arrabile. vlceratus verò ab acidiori & acriori. Non vlceratum cancerum sæpe cutant chirurgi excindendo, & extrahendo: sæpe etiam non curant, sed blandius tractant medicamentis probubentibus eius incrementum. Vlceratum plerique eorum ne tangere quidem audent, nisi blandis quibusdam & mitibus medicamentis, curam adhibentes, vt vulgus eorum vocat, palliatuam, timentes ne si ignis, aut causticum medicamentum adhibeatur, immittit: fiat atrabilis, & plus malò depascant. Quæ quidem in re consilium Celsi sequi videntur, lib. 5. cap. 23. Vt ùm Celsus in eo capite concedit, aliquando id vitium causticis, scilicet, & vlione recte curari: aliquando ira curari non posse, sed irritari potius: vocari vult id vitium, quum ita curari potest, tantum vult id vitium, quum non potest: ut prius esse vel: à dco idem specie vitium, vt dicere necesse non nisi rempore & experimèto possit, tantum scilicet & experiendo, an ita curetur rectè. Non esse autem eum nominum vsu, & eam distinctionem ex Hippocrate constat, cum hoc loco dicatur, prius quæ exustione esse curari, alioqui dissiliet exustio. Vt ùm Hippocr. non accipit morborum diffinitionem à curatione, sed ab essentia & accidendibus propriis, vt patet. Cæcedemus ergo carcinomata seu scæros, si cui ad

sint radicatis, nulla alia ratione curari posse, quam vlceratos quidem vitione, non vlceratos sectione: esse aliquos qui curari possint, siquidem hic cuius nunc narratur historiam, sanarus est vitione, aliquos qui neque possint, neque debeant, quodd, ut Celsus dicit, concitentur, & incrementum, donec occidant: differentiam verò non esse in morbi specie, sed fucci qualitate: nam in ipsius atræ bilis speciebus, sunt alie alie aciores, aut mitiores. Si ergo ex aliis symptomatis agnoueris, aded esse acrem homini atram bilem, ut leni de causa plurimum exacerbetur, fortasse ne tangere quidem audebis, sin autem ad terrestres aut sanguineas melancholias naturam, atræ bilis quæ homini iocet, ex aliis sentiat vergere, tentabis causticis vrere, ac si res incipiat bene cedere, procedes festinanter ad ignem, præcipue si malum sit in parte, quam facile ac breui depalsci possit morbus, cuiusmodi fauces sunt. In talibus enim etsi nō satis certus sis an succus ferre id auxilium possit, tentabis, etiā cum periculo, vrere: quia neglecta curatio facillimè exedet, etiā à succo non omnino immiti. Tentabis ergo vel cum periculo curare morthum, certò interemptorum. Quam ob causam Cels. lib. 6. cap. 15. iulher vlcera cancrofa in ore adari, si medicamentum non proficiant. Erit verò ex eius sententia, adustis imponenda lenticula donec sanescant.

Polyphantus Abderis capitis dolore afflictebatur in vehemēti febre. Vrina erant tenues, multe, subsidētia densa & conturbata. Cū autem capitis dolor non sedaretur, sternutatoria admotā sūt, decima morbi die. Postea verò vehemens ceruicis dolor corripuit, vrina rubra prodijt, perturbata qualis est in mētor, ūmente motus est velut phrenitide correptus, mortuus est cū vehēmentibus conuulsionibus.

Mibi videtur hūc ægrotum læsi fuisse magnoparē in tēpessilio vīu sternutatoriōri, quodque cum oporteret morbo occurrere, cura pāpōssēt est adhihita symptomati. Lahorabāt enim febre acuta ac vehemēti cum dolore capitis, erantque vrinæ multæ & tenues, & in eis hypostasē densæ & conturbatæ, tenuitate significante rapitum bilis in superna, & hypostasi, multitudinem & perturbationem humorum in venis: non cessante verò capitis dolore, decima die admotā sunt sternutatoria, cū oporteret, missione sanguinis, & reuulsoris per venterem euacuationibus, & crutum fricitionibus assiduis vti, quo pariter sublatione causæ tolleretur febris, & reuulsione prohiberetur imminens phrenitis: capiti verò nihil admoquerē, nisi repellentia. Nam etsi missum esse prius sanguinem, & vacuatam alium clysteribus, atque aliquo etiam lenientium medicaminum suspiceris, etsi id non nateretur (non enim consuevit Hipp. narrare omnia quæ gesta sunt) tamen non esse satis vacuatam totum corpus, euentus indicauit: successit enim dolor vehemēs ceruicis, sanguine hiliōso, vehemēti capitis mortu, sursum grādo, & vrina facta est rubra, perturbataque,

A quasi esset inuentorum, aucta in venis sanguinis totius perturbatione, ac tandem phrenitis est factus, & cum conuulsione perit. Peccatum est, quodd nondum satis vacuato corpore, ad vacationem partis principis peruenerint Medici, & quodd nondum soluro morbo, symptoma curare voluerint, & quodd secundariam passionem, seu compassiōem, aut consensum manente primaria, tollere studuerint, & quodd corpore adhuc impuro, & homine febricitante, partem principem vehemētius mouerint: quæ omnia ars prohiberi fieri. Denique eodē modo curatio suscepta est, ac si primarius morbus fuisset dolor capitis, febris verò accidens, ac corpus esset perfectè vacuatum & purgatum: cū tamē res contra haberet. Dolebat enim caput per consensum morbus præcipuus erat acuta illa febris. Vrinam perturbatam qualis est inuentorum, phrenitidis & lethargici signum esse, in aphorismo dixit, dicitque paulò post. Aliquis verò dubitabit, quales essent vrinæ illæ tenues cum hypostasi multa & perturbata. Nam perturbatio videtur esse differentia totius vrinæ, potiùs quàm hypostasis, & perturbatæ suor contrarietate tenuibus: quapropter non videntur posse esse tenues cum perturbatione, neque perturbatam videretur rectè dici de hypostasi. Ceterum in ipsa hypostasi considerari potest perturbatio, tametsi id non soleant auctores animaduertere, non minùs quàm in tota vrina. Nam est hypostasis, quædam etsi crassa, tamen continuata & pellucida, est alia quæ constar velut exagitatiss quibusdam sacibus, & turbida, quæ significationem habet similem reliquæ perturbationi. Fit verò aliquando vrina tenuis cruda, neque cum naturali hiliis portiooe mista, continens verò in fundo separatū quiddā crassū, consulum & turbidum: iisque hoc maioris cruditatis signum, minoris verò conturbationis, quam cum tota vrina perturbata est. Nam urinae fuscior manere tenuem, minoris alterationis est, crescente verò agitatione, etiam illa crassa hypostasis commiscetur cum fusa. Quod actum est in hoc ægrotō, initio enim habuit vrinas tenues cum hypostasi perturbata, deinde prodijt vrina rubra, totaque perturbata.

D

Eodem ferè modo etiam Eualcidæ famula, cū illi multo tempore vrina densa prodissent & dolores capitis adessent, phrenitide correpta & vehemētibus conuulsionibus similiter mortua est. Densa enim vrina & perturbata omnino signū exhibent in dubitatio doloris capitis, conuulsionis, & mortis.

F Similiter euenit famulæ Eualcidæ, ac Polyphanto, eademque fuerunt vtrique causæ. Quod verò de significatione vtrorum densarum & perturbatarum addit, consideremus oportet. Aphor. 70. sect. 4. ita inquit: quibus in febribus vrinæ perturbatæ, vt subingalium, ita dolores capitis aut adfunt, aut aderunt. Hæc famula Eualcidæ eius quod in Aphorismo, dicitur est exemplum, cui cū dolores capitis adessent, densæ vrinæ prodibant, verum quo pacto,

cum illic doloris capitis signum diceret, nunc dicit esse convulsionis etiamque mortis? An quia dolor capitis ex perturbatione succorum per venas corporis actus, si perseveraret, non posset non firmari in morbum aliquem lethalem capitis, velut phrenitidem, lethargum, aut convulsionem, ipse vero præteriens reliqua, nominavit illic dolorem, hic convulsionem. Quia dolor solet omnes illas affectiones præcedere (nimirum quum caput incipit repleri) convulsio solus subséquens, quum iam sunt proximi mortis: perturbationem enim est, ex morbis capitis mori sine convulsione. Nominavit itaque & primum & postremum symptomata, intelligitque quæ interfunt. Sed quid sibi voluit Hippocrates, vocans hoc signum *εξ αὐτοῦ*? An exactè significare hoc, ita ut non possit præsentem hoc signo alter fieri, quam significetur, sed necessarium ita evenire an ita significare hoc, ut nihil aliud significet? Si enim neutrum horum evenit, nullatenus videtur esse signum hoc exactum magisquam aliud quodvis. At verò videtur neutrum evenire. Nam fieri potest, ut urina perturbata sit, & homo non intereat, neque veniat morbus ad convulsionem: atque alias multas affectiones comitari convulsio contra ratio vix præter illas: nam & in principio febrium reperitur, & in morbis renum, & vidimus quibusdam hominibus esse naturalem. Quo pacto ergo est exactum signum convulsionis & mortis? Certè nihil est aliud dicere exactum signum esse convulsionis & mortis, quam si diceret, signum hoc esse lethale, significareque, non ut alia signa lethalia, moturum solum hominem, sed etiam modum quo moriturus est, nimirum moturum cum convulsione: itaque exactè indicat ac distinguit, quia & mortem & moriendi modum, quæ interpretatio incidit in secundum modum eorum, quæ proposui: scilicet ita significare hæc, ut nihil aliud præter hæc. Hoc verò non accidit omni perturbata, sed ei de qua hoc loco agitur, ei scilicet quæ in febribus (nam ita dicebatur in aphorismo) & quæ non est peculiari cuiusdam naturæ, neque affectionis partis cuiuspiam (nam peculiari naturæ, & particulares affectiones semper excluduntur à prognosticis) & quæ perseverat ultra morbi principium. His exceptis semper minatur capiti malum. Atqui quia urina perturbata perseverat per morbi incrementum, neque finiro principio clarescit, est signum contrarium confectioni, quare & lethale; significat ergo moturum hominem ex morbo capitis, & proinde cum convulsione. Neque verò quia hoc significat exactè, necesse est mori eum qui id habeat, quia non dicuntur lethalia signa, cum quibus nulli evadunt, sed cum quibus moriuntur plures.

Halicarnasensis qui in domo Xantippi diuersabatur, per hyemem non mediocri auris & capitis dolore laborabat, erat verò annorum fere quinquaginta. Secta est illi vena secundum Mnesimachum, caput euacuatum & refrigeratum laesum fuit, nec suppuravit, phreniticus evasit, & mortuus est. Urina etiam huic erat densa.

A Hæc historia videtur fateri vulgari opinioni de sectione venæ cephalicæ, quam vulgus hominum maxime reformidat, quod putent debilitato capite insaniam inde nasci: narrat verò nunc Hippocrates, euacuato capite esse factum hominem phreniticum. Ceterum vulgaris illa opinio non debet à medicis probari. Nam tamen fieri possit, ut aliquis ob eius venæ sectionem deliraret, aut si antea delirare inceperit, deliraret gravius, quodd ei scilicet succum alioqui cerebrum esset, & nulla re minus indigeret quam sanguinis missione, tamen quomodo tempestive atque ob aliquam calidiorum succorum in capite redundantiam ea fecerat, nihil tale accipere potest, quin potius ea euacuatio à phrenitide præservat detractâ causâ quæ eum affectum parere posset. Neque si euacuatio plurimum producat, atque plurquam præsens postulet dispositio, accidere potest phrenitis, sed contrarius lapsus per debilitatem quam affert euacuatio, fiet quidem aliquibus mentis vacillatio, aliis per refrigerationem fiet stupiditas & obliuio: aliis quibus restabit pueritia ex euacuazione calidiorum, lethargus: Et ego quidem hoc loco ita intelligo, hunc lethargicum esse factum, Hippoc. enim toto hoc opere confuevit phreniticos vocare omnes delirantes cum febre, siue sint lethargici, siue phrenitici. Huic ergo Halicarnasensi versimile est fuisse auris & capitis dolorem non medicorem, ob redundantiam pituitæ & flatûs. Nam & tempore & ætate erat frigida passio congruens cum esset hyems, ipse verò quinquaginta annorum, sed euentus id indicavit. Cum enim calidis auxiliis potius indigeret, secta est illi vena secundum Mnesimachum, hoc est à Mnesimacho chirurgo, seu ut Mnesimachus medicus fieri consuevit. Quandoquidem ob capitis dolorem vena secta est, arbitror cephalicam esse sectam. Laesum est caput euacuatum & refrigeratû & ob id evasit lethargicus cum febre, scilicet in somno delirans, & mortuus est. Urinas etiam huic dicit fuisse densas & perturbatas, quales scilicet dicæ sunt esse signum exactum doloris capitis, convulsionis, & mortis. Consideratione indiget quod dicitur *αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ*, videtur enim *αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ*, non est tamen si rectè intelligatur, sed perinde est ac si diceret, non enim erat phlegmonosa affectio quæ dolorem asserbat, sed à frigida potius pendens materia, ac proinde venæ sectione euacuatum & refrigeratum est caput. Rectè autem dixit, non enim suppuravit, insinuas inflammationem illarum partium illa ætate, suppuratio potius quam resolutio finiri consuevit. Filij Metrodori historia, quæ hoc loco occurrit, occurrera tunc calce libri quinti eisdem prolixius scripta verbis, præterquam quodd illuc non narratur ubi id acciderit, hic dicitur factum à *Καππίῳ*, quod urbis nomen esse videtur, sed nihil interest.

ANaxenor Abdera splenicus quidem erat, & pravi coloris. Contigit autem ut exortus ipsi circa sinistram femur tumor repente evanesceret. Non multis autem post diebus exorta est ipsi circa lienem postea ab initio

similis ijs qua noctu erumpunt, deinde tumor cum rubore & duritie. Post diem autem quartam febris ardens accidit, & in circuitu omnia liuorem contraxerunt & putrisse videbantur. Mortuus est, cum prius fuisset aliquantulum purgatus, & mentis compos.

Sunt quidam quibus lien valde durus est & magnus, color verò faciei & reliqui corporis non admodum vitiosus, quod quidem neque admodum graue neque periculosum est: significatur enim solum vitium lienis, partis non admodum nobilis: cum verò accedit vitiosus color, significatur iam magna excrementorum redundantia, reliqua viscera & totum iam corpus vitiatum. Quapropter periculum magnum est morbi alicuius grauioris, curandumque magno studio est lienem ipsam primùm expurgare & deobstruere, deinde & totum corpus, antequam scilicet lien non capiens iam excrementa, in partem aliam tradat fortasse nobiliorem, aut per totum corpus putrescant, & febres excitent acutas, ut huic est factum, cui ex liene secundum rectitudinem factus est tumor in femore sinistro, qui tamen abscessus non liberavit hominem à grauioribus periculis, quia repente euasit, neque suppurato scilicet neque resolutio humore, sed interò recurrente, quod nihil in abscessibus potest esse periculosum. Necessè est enim, aut pro externo interno aliquis abscessus fiat: aut citò alij externi (plerumque sanè grauioribus) redeant: velut huic, qui paucis postea diebus circa lienem obortus est tumor, quem ex accidentibus constat, habuisse naturam inter cancerum, & carbunculum. Habuit enim Canceri duciem dies quatuor sine febre persistentem, carbonis verò putillam, ruborem, & superuenientem febrem ardentem, sed & exitum. Nam ex magnitudine inflammationis gangrena facta est partium circumcirca consensitum (omnia enim in circuitu facta sunt liuida, & videbantur esse putrida) atque serpente gangrena in internas partes mortuus homo est. Omnium horum causæ, & totius morbi decursus facillè intelligi potest. Quod ad eius curationem attineat, illud solum narrat suppurgatum esse, antequam in gangrenam incideret. Rectè sanè quandoquidem lien nulli euacuationi magis cedit quàm alui subductioni, si verò ut tacuit, ita etiam omisit missionem sanguinis secundum rectitudinem factam, atque admodum copiosam, non rectè fecit, tantam enim exposcit hæc affectio, ut vel usque ad animi deliquium ob carbunculum fieri velit Galen. Ego hæc misisse, tumore recens orto in sinistro femore, ex dextro malleolo, ut sanguis neque sursum recurret, neque in sinistram femur copiosius quàm oporteret, incumberet: orto verò iam deteriori illo tumore circa lienem misisse copiosius ex sinistro malleolo, ut deoncretetur lien, & natura prouocaretur ad abscessum eundem, quem prius tentauerat. Animaduertit Hippo. Anaxenorem mente constitisse, semper usque ad mortem, quo intelligas, citra magnam cerebri compassionem, & citra septis transuersi inflammationem intermisisse,

A

Clonigus Abdera renum affectibus quidem laborabat, sanguinem autem paulatim plerumque cum molestia mingebat, & venter intestinorum exulceratisque terminibus vexabatur. Huic quidem mane propinabatur lac caprillum, cui quinta aqua pari adiungebatur, ita ut in totum corpus tres exhiberentur, vesperti vero panis admodum coctus, pro oblatione autem beta & cucumis, vinum nigrum tenue, exhibebatur etiam cucumeralis pepo. Hac autem vitæ ratione & alijs substitis & vrina pura prodierant. Lac autem potauit donec vrina restituta fuerint.

B

C

D

E

F

Clonigus duas affectiones habebat simul, locis diuersas, essentia verò similes. Nam erat nephriticus & dysentericus. Vtrumque autem per exulcerationem, illud renum & viarum vrinæ, hoc intestinorum. Significabat viatum vrinæ, & renum exulcerationem, mictus sanguinis; non copiose ac facillè fluentis, velut ex vase rupto solet: sed paulatim ac cum difficultate, ob granulosa scilicet paulatim ab vlcere extenso sanguine con crescentes, aut etiam fortasse ob excoarationem attingentem usque ad ipsum vesicæ ceruicem: dysenteria verò ipsa exulceratio intestinorum est. Quoniam igitur ea dem erat affectionum essentia, potuit etiam eadem curationis ratio congruere; quoniam verò affectus partes erant diuersæ, oportuit eam ex respiciendis partem vitæque compositam esse. Vtrumque morbi curatio solet pharmaca & chirurgiam admittere. Nam & nephriticis & dysentericis mittitur sanguis, ubi adfuit scopi illud exposcentes, & adhibetur expurgatio vtiliter, quum pender morbus à magna cacochymia, & quum res exigit, apponantur cerata, cataplasmata, emplastra, & inunctiones, & catæ ore deuorantur medicamenta multa aliarum vitium, & apponuntur non raro cucurbitule, tamen aliquando sola rectè institui victus ratio satis esse solet ad curationem, neque sanè ea est deterior curatio, sed quum est sufficiens, & in his & in alijs omnibus morbis omnium optima; quia ut dicitur ab eodem Hippocrate, medicamentum in alimentum optimum. In hac historia, victus solum meminit, unde duorum alterum licet colligere aut reliqua auxilia silentio esse prætermissa, velut communia multis morbis: aut solo victu esse rem bene gestam, quod corpus non esset valde cacochymum. Certè constat hæc victus ratione Hippocrate sanitati hunc hominem restituisse. Hic fuit maximè ex parte temperans, & ex tergens, non nihil etiam siccans, & adstringens. Lac enim, beta, cucumis, & pepo detergent, panis excoctus siccat, vinum nigrum tenue detergit & adstringit: lac quidem & vinum nigrum vtrique parti se accommodant, panis quoque quamquàm yentis magis, beta ventri, cucumis & peto vrinæ viis, lac præter dictam extergendi vim, aquæ admitione fiebat attemperantius, & accipiebat non nihil adstrictionis. Nam scire oportet, coctum

fuisse lac, donec absumeretur quantum aquæ esset infusum, id quod sit vel admoto igne, vel immixtis lapidibus, aut ferris globulis, ita amittit et aliquid, & in casci saulratem inclinatur. Ita ergo præparatum extergit, temperat, & nonnulli adstringit: capinum vero multis aliis eius generibus melius est, quia siccior & minus ferocum. Panis excoctus nihil aliud quam siccatur. Beta intestina detergit & purgat; hæc eadem, si his coquatur, sistit. Quapropter per dysenteriam recte agitur, si initio detur cocta semel, deinde bis. Cucumis & pepo temperant & exurgent vrinæ vias. Virum quia tenuis penetrare poterat etiā in vrinæ vias. Nequaquam consistens circa ventrem, quia nigrum adstringendi vi participabat. Talistiaque fuitis victus, talem vero desiderabat affectio, cum utraque esset vlcus ex acutum affluxu pendens. Vlcus petebat extensionem, siccationem, & adstrictionem: succus attemperantia; pars propria sibi ac familiaria medicamenta. Satisfaciebat ergo curatio hæc indicationibus omnibus: nam & ei quæ accipitur ab humore, & ei quæ à parte, & quæ ab effectu. Quin & symptomati etiam, hoc est, fluxui vrinæ & alui occurrebat per se, cum esset particeps adstrictionis.

Historia mulieris Abderitanæ occurrent in libro quinto, eisdem fere scripta verbis, ut nulla iunc enarratione noua opus sit.

Abdera Dini filio in umbilico mediocriter vulnerato exigua fistula relicta est, & aliquando etiam per eundem locum prodierunt lumbrici crassius, & dicebat quum febricitabat, biliosa ipsa per hanc partem exire. Proxiderat huic intestinum in fistulam, & corrodebatur ut ipsa fistula, & rursus distrumpebatur & inspicula permanere prohibebant.

Huic puero facta est ex vulnere circa umbilicum fistula, vsque ad internam partem intestinorum penetrans. Id indicabant excrementa, quia non poterat magnus lumbricus aliunde exire. Cum enim sit triplex genus lumbricorum, lati, rotundi, & ascarides; hi sunt exigui, & generantur in sede; illi magni, generanturque lati per intestina tota; rotundi in tenuibus. Sunt vero lati maximus, quapropter ego coniecto rotundum huic exiisse per fistulam, qui soler esse bene magnus, atque ob id etiam suspicor, aliquod ex gracilibus intestinis accepisse fistulam. Quia ut dixi, in gracilibus generantur rotundi, & quia exhibent et biliosa, quum febricitabat, si enim crassi intestini fuisset vlcus, exiisset stercus in crassis enim colligitur naturaliter stercus densum, in gracilibus non nisi raræ faeces, atque in eorum quadam parte sola bilis. Quo pacto factum sit, ut intestinum vlceretur, explicar dicens, proxiderat in fistulam intestinum, & corrodebatur ut ipsa fistula. Hoc est, cum fistula penetraret vsque ad peritonæum, atque ipsum peritonæum ruptum esset, proxiderat intestinum (ut fieri solet) & cortosum etiam est, ac penetratum vulnere. Accidebat huic quoque, quod & aliis ruptura peritonæi labo-

Arantibus, nempe læuocatur tussi, quia tussiendo ruptio crescebat, & intestinum prohibebatur permeare, & excidebat magis. Sed potest dubitari, quo pacto per intestinum ruptum non caderet stercus in eam cavitatem, quæ est inter intestina & peritonæum, atque si caderet, quo pacto potuerit puer non breuissimo tempore mori, cum precipue dictum sit ab Hippocrate in aphorismo, incisionem tenuis intestini, lethalem esse. Scire oportet incisionem intestini precipue tenuis, per quam transfusum dissectum sit, omnino lethalem esse, & breuissimam afferre mortem; lethalem quoque esse (etsi non tam breui) incisionem rectæ, quæ penetrat in cavitatem ipsius intestini: sed vulnerationem in uenteram, paulatimque corrodoendo factam, si penetraret, esse etiam incurabilem: non tamen necessitudo afferre mortem, sed nonnullis vitam potius miseram. Quia fieri potest, ut fistulam accipiant, coalescantque ita fistulæ labia cum peritonæo & abdomine, ut extorsum exeat aliquid eorum quæ prætereunt per intestinum; in sparium vero inane incidat nihil, velut huic est factum. Nimirum intestini pars aliqua impingit in fistulam, illic que simul est exesa, & coaliuit. Cum tussi impellebantur intestina, erumpebat eorum maior pars, quæ cessante tussi rursus recipiebatur intro, tamen pars quæ coalescebat, neque extorsum pulso, neque intro collecto intestino, desiccabatur à fistula. Erat vero illud vlcus diuturnum, neque cum phlegmone, neque serpens.

Pythionis filio in Pela febris statim incipit vehemens & magna in somnum propensio, cum vocis interceptione somni fiebat, & toto tempore dura erat alui. Subdita vero glande ex felle multa degiciebat, statimque remittebat. Celerriter vero rursus alui in tumorem eleuabatur, & febris exacerbabatur, eademque in somnum propensio permanebat. Cum vero morbus esset in eo statu, exhibitum est medicamentum quoddam ex caribamo, cucumere syluestri, & meconio compositum, & biliosa erupuit, & statim sopor sedatus est, & febris mitior facta, & omnia subleuata sunt, & die decimaquarta indicatus est.

Laborant hic haud dubie febre acuta, eaque vehementi cum magna in somnum propensione, adeo ut somni profunditas aphoniam pareret, & videretur ob id morbus habere aliquid apolethici. Potest ergo dubitari, quomodo factum sit, ut Hippocrates daret pharmacum expurgans ante diem decimum quartum, cum ab eodem scriptum sit lib. de expurgat. medicamentis. Quicunque à febrilibus fortibus corripiantur, his medicamenta expurgantia dare non oportet, donec remiserit febris, sin moris saltem non ante decimam quartam. Neque dubium diluatur, si dicas non esse hoc ab Hippocrate actum, sed ab alio fortasse quopiam, ut plurima eorum que in hoc opere narrantur. Miraberis enim tunc quonam pacto illud cesserit ex voto, si non fuerit recte

adum. Certè mihi videtur actum optime, & imitandum, ubi similis sese affectio obtulerit. Nam restricta alio rectè admodum est. per sedem glans ex felle (hoc enim innuit dicens, *αποστειναι τὸ ἐκ τῆς γλῆτς*) & ad vacuandum alium, & reuelandum à supernis corporis partibus, cumque à glande egeret multa, & ab egestionè statim remitteret febris & sopor, constabat appetit, humorum in ventre detentum maximam augendi febrem & soporem esse causam, atque cum iteu rursus alius in tumorem eleuaretur, & exacerbaretur febris, & à *αποστειναι τὸ ἐκ τῆς γλῆτς* hoc est somni propensio foueretur eadem causà, simulque cum eleuaretur in tumorem alius, constabat confluere in illam biliosa ex toto corpore, & ab eis ibi congestis foveri affectum: quapropter nulla potior erat curandi ratio, quam curare ne biliosa detineretur in alio sed erumperetur, & ut per eam viam quam bilis ceperat, corpus expurgaretur: merito ergo *τὴν δυνάμιν ἀγνοῦν τοῦτος*, hoc est, cum hoc eodem ordine hoc idem eueniret, ut scilicet deonerat alio minueretur febris & sopor, rursus congestis excrementis cibus alius intromiseret, & illa cresceret, datum est pharmacum expurgans, successitque res, eruperunt biliosa, & sedata est affectio. Quoniam verò ante legitimum iudicationis tempus, perfectè tollere morbum nulla auxilia possunt, etiam bona ex parte federe, diutius febres vsque ad decimum quartum, qui legitimus acutorem finis est, in eoque est indicatus humorum. Ex his verò illud licet colligere, Hippocr. nomine turgentia non solum intelligere eam reciprocam à partibus in partes moritationem, quam Galenus interpretatur, sed etiam vergentiam humorum in euacuationis vias. præcipue in alium, qualis in quibusdam significatur hypochondriorum mutum, in hoc alui intumescencia redeunt citò post eius deouerationem. Ob talem enim succorum vergentiam expurgare licet, etiam ante coctionem, quia ea quæ spontè fluunt faciliè trabuntur.

E V demo vehementi splenis dolore laboranti imperatum est à medicis ut multa comederet, paucum vinum tenue biberet, & frequenter deambulet, nulla facta est mutatio. Secta est vena, cibus & potum parè sumebat, deambulationes paulatim intendebat, vinum nigrum tenue propinatum est, sanitati restitutus est.

Tametsi inflammatio aut multitudine humorum in hepate & liene, partibus, nisi ob membranas quibus vestiuntur, se à expertibus sensus, dolores fortes non afferant, sed grauantes sine vlla acutè; tamen ob humoris mordentem qualitatem, aut fluxum distendentem parientur aliquando illa partes (ob membranas quidem) dolores vehementes, mordentes, aut icinosos. Cùm igitur Eudemus vehementi splenis dolore laboraret, constar eum multum & acrem sanguinem in eo viscere collegisse. Vidimus enim id in quibusdam agrotis, qui referebant sentire se eo loco, velut admodum ignis

A prunam: quibus nulla ratione citius succedunt, quam sanguinis missione si quæ secundum rectitudinem, ab internâ scilicet venâ cubiti sinistri, vel à sinistra manu. Cum verò laborantes lienes semper colligant crassum & melancholicum sanguinem, ob quem scitros plerumque contrahunt, & vacuati per veram sectionem bonæ partæ sanguinis, præcipue calidioris & vrentis, opus est alia curatione ut crassi succi absorbantur, quæ in tenui viscâ, & potius abstinentia, & deambulatione consistit. Quidam medici ab hac intentione non multum declinantes, præceperunt Eudemum multa comedere, & bibere parum vini tenuis; & deambulare multum. Multa comedere arbitror eos præcepisse, ut posset homo multum deambulare, quia ubi fames laborandum non est. Verum non est cum hoc visu facta vlla mutatio, nullatenus inquam iuuatus est homo: quapropter mutata deinceps est curandi ratio, sectæque vena, imperatumque ut cibus & potum acciperet parè, & deambulet, non quidem repente ac multum, sed paulatim deambulationem intendendo, datumque vinum nigrum & tenue, & sanitati restitutus est homo. Nimirum non imminui à per venæ sectionem multitudinè, & remisso dolore visceris, exercitatio nihil conferebat, ac fortasse etiam lædebat, quod infarsus lien non posset esse peruius, & colligeret in dies plus, morisque ad sese alliceret. Si verò ingestis fuissent multi cibi, nequam absumpti fuissent humores, sed soli fortasse cibi: cum cibo autem paucò non poterat sustineri magna deambulatio, nisi susciperetur paulatim, ut paulatim afflueret homo, & assuetudine patientiam compararet. Rectè igitur ita factum. Potu verò paucò vti debet lienosus, & multo plurius à mediis: periculatius fieri hydro-picos, res est expertissima. neque ratio obscura. Cùm enim lien spongiæ sit similis plurimum aquei liquoris imbibit, atque distenditur, obruitque in eo facile calor, & frigus hepatis communicatur. Peccatum ergo à prioribus transariis est, primum quoddam venam non secutint ante omnia, deinde quoddam multo cibo vti iusserint, tertiò quoddam repente infarsum multum deambulare. Vinum dari tenue admodum erat necessarium, crassum enim est etiam fæculentum, & ob id melancholicum & obstuens: nigrum verò non adeo necessarium, non tamen inutile, cum satis esset tenue. Neque enim obstuere poterat tenue existens, & quàm album sedabat sum magis, quod in eo casu non parui momenti est, ne sitis cogat multo vti potu.

Philistidem Heraclida uxorem febris corripuit acuta, rubor faciei sine vlla causâ manifesta. Paulo post eadem die riguit, cum non recalesceret, conuulsio accidit in digitis manuum & pedum, postea autem parum recaluit. Mixxit urinas compactæ quædam innatantia, nebulosa, dispersa habentes, noctu dormiuit. Secunda die rursus riguit, per diem paulo magis incaluit, & rubor erat minor, & conuulsiones superuenerunt moderatiores, & urinae similes, noctu dormiuit, parum vigilauit

cum nullâ premeretur molestiâ. Tertia urinas melioris coloris reddidit, parum subsidentes, eadem verbâ hora rursus riguit, febris acuta fuit, & sudor per noctem toto corpore dimanavit, inclinâtè autem diè color in sèteri modum mutatus est, noctu dormiuit, (scu sudauit) toto corpore. Quarta sanguis è sinistra nare probè effluxit, & muliebria pauca secundùm ordinem apparuerunt. Rursus autem eadè hora febricula exacerbata est, urina pauca compacta quadam innatantia habebant: alium autem natura quidem dura, multo tamen magis subsistebat, nec quicquam nisi supposita glande deiecebat, noctu dormiuit. Quinta tum febricula mitior fuit, tum sub vesperam toto corpore sudauit: & muliebria prodierunt, & noctu dormiuit. Sexta urinam reddidit confertam, multam, compacta quadam innatantia & paucam subsidentiam concolorem habentem. Circa meridiem autem parum riguit, aliquantulum incaluit, toto corpore sudauit, noctu dormiuit. Septima parum recaluit, facile tulit, toto corpore sudauit, urina probè colorata fuerit, omnia iudicata sūt.

Hic idem morbus fuisset in viro quàm in femina, & intellectus difficilior, & periculosior. Nam febris quoad eadem hora tigram habens, quo pacto non censetur intermittens? si autem fuerit, quo pacto incipere poterat morbos à febre acuta, & huic velut superueniens signum accedere rigor? Sin autem dicas cœpisse fortasse morbum à diaria febre (vt fieri solet) superuenisseque diariæ putridam intermittere, occurrat huic opinioni Hippocrates dicens, incepisse febrem sine vlla causa manifesta, à qua incipere diariæ est proprium: vi verò putes fuisse complicationem continuæ cum intermittente, hæc quoque opinioni repugnat figura, siquidem rigor primâ, secundâ, & tertîâ factus, quartâ & quintâ defuit, sextâ apparuit citra omnem typum rigoris congruentem. Sed & signa per se talem multum periculosa, regium morbum dietertâ, & rigorem sextâ, & à febre acuta convulsionem, quæ velut lethalia sunt in aphorismis notata ab Hippocrate. Verum indicantur hæc forma tota, & hic signorum insequentium, & alioqui lethalium concursus, morbum muliebrem potius quàm lethalem, & rigores illi fuerunt inordinati, & conuulsionem potius morbi, quàm certam speciem indicabant. Nimirum totum hunc morbum attrahit difficilis eruptionis menstruum, alioqui ordinatè & suo tempore venientium. Velut enim multis suo tempore parientibus, tamen ob difficile expurgationem, quàm aut ex purgandorum humorum multitudo, aut structura viarum facit, accidunt febres, ex quibusdam antequàm pariant, ab ipsius secretionis, & agitationis initio incipiunt; quibusdam paulo postquàm pepererunt, male subsecutibus humoribus infans editum, suntque ex febribus plerumque horridæ, & cum inordinatis ac multis rigoribus, & convulsionibus, ob vitæ naturam, cum quo leniendi & mouendi principium faciliè comparitur, vt in quam multis

ante hunc commentariis dictum est, ita & molus earum, quibus difficultet exeant, circa menstruum eruptiones tales sunt febres; quibusdam postquam cœperunt erumpere, neque procedunt, sed oppilatæ circa vitæ vasa focci inflammationes ciens, aut saltem putrescunt; quibusdam antequàm appareat sanguis vllus, ab initio secretionis incipiunt, in ignis scilicet humoribus obfidere vitæ & quæ vere exitum incipientibus. Et his quidem quum iam erumpunt tolluntur febres, aut mitescunt earum symptomata, nisi omnino exiguum sit quod exit. Velut huic Phibistidæ vxoti, cui cum instaret legitimum menstruum tempus, quia fortè fortuna erat praxis succi abundantior solito, incipientem secretionem, quæ quatuor fortè dies ante exitum incipere solet, facta est febris acuta & rubor faciei sine vlla causâ manifestâ, sed ob molitodinem humorum qui ex agitato sanguine in faciem & anteriorem capitis partem, per venas magnas & arterias, à paribus circa vitæ ascendeant. Paulò post eadem diè riguit, neque recalescebat, sed multo tempore extremorum refrigeratio perseuerabat, & conuulsionem sensit in digitis manuum, & pedum: paulò verò post conuulsiones caluit, calorque soluenne conuulsiones, & liquante succos, mixta quædam, repulsa, diuturniora, hoc est densa, plena contentis dispersa. Erant nonnulli subsistentia noctu dormiuit. Secundâ diè eadem habuit, præterquam quod febris habuit plus, ruboris intus, & conuulsiones etiam moderatiores. Vrina eadem habuit, quæ primâ diè, noctem tunc quoque dormiuit, non rotam, sed vigilauit nonnihil, sine molestia tamen. Tertîâ diè eadem hora accidit rigor, ac post eum febris acuta, & ad noctem sudor per totum corpus. Vespere eiusdem diè color mutatus est in sèteri modum, & mane reddita fuerat urina melioris coloris, & parum habens subsidentiam. Itaque apparuerunt eâ diè duo longè diuersa signa, alterum in vrina, quod salutem intra primam septimanam promittebat, vt certè euenit: alterum quod mortem minabatur. Vrina enim: melioris coloris, neque continens iam vt antea nebulosa, & dispersa, sed parum subsidentia, manifestam concoctionis præstabat significationem, quæ intra primam quaternarium apparens, intra primam septimanam inbet expectata salutem: morbus verò regius ante diem septimum factus perniciosus est. Accidit tamen in hac muliere salutis signum prænalere, quia perniciosum illud eandem quam totus morbus habuit occasum, secretionem scilicet vitiosi sanguinis, ad instantem menstruum euacuationem. Itaque non ob hepatis inflanationem, aut venosam sanguinis qualitatem, vt in aliis, sed ob conturbationem quam attrahit naturalis ille motus, effusio biliosi sanguinis in cutem facta est, atque nimis periculosa fuit, vt quæ à naturali motu proficeretur. Facta mentione ceteri, addit *τοῦτο δὲ τὸ αἷμα*, hoc est, nocte dormiuit per totum. Quibusdam videtur inepitum, dicere per totum dormiuit, quia illud *διὰ τοῦτο*, idest per totum videtur referre *αἷμα*, idest corpus. Quod autem sit dormire per totum corpus. Ob id maluit legi *διὰ τὸν αἷμα*, idest, sudauit per totum. Sed hæc quoque videtur inuenis repetitio: cum mox dixisset *ἵδρω ἐκ τοῦ αἵματος*. Quapropter rationi consonum censeo, legi vt occurrat scrip-

tum *ad hoc* *etiam* *si* *hunc*, & illud *si* *hunc* accipi ad-
 uerbialiter aut suppletivum, ut significetur per
 totum noctis tempus dormivisse: quod mihi vi-
 detur admonuisse, ut significaret dormivisse eā no-
 cte melius quā superiori, quā dixerat parci vigilasse.
 Quā: à die, quæ secerni antea ceperant, erupe-
 runt suo tempore menstrua. Verum febris ipsa,
 quæ adhuc erat in incremento, ne perticere etum-
 perent effecit. & ipsa imperfecta eruptio, ne febris
 statim cessaret, aut saltem desinere ab incremen-
 to. Nam subitis ardens effert in superius succos, &
 ipsam partem in quam influunt phlegmonoso mó-
 do afficit. Ob hoc vterus in febricitantibus acutè
 vix deponit sanguinem: ob illud, neque ipse qui-
 dem sanguis bene in eum influat: proinde & per su-
 periorum partium aliquam simul erumpet, ut huius
 per nates, & per vterum, sed parcius quā ut fe-
 brem iudicare posset. In hac igitur mente non est
 febris per eam evacuationem indicata, tamen sym-
 ptomata vterina magna ex parte sedata sūt. rigores
 ei in quodiam esse desinunt, neque convulsio-
 nes apparuerunt amplius, febris vero & eius quo-
 tidianæ exacerbationes procefferunt, vte d. i. ex
 parte vacuato, & in reliqua evacuationem con-
 verso, tuto verò corpore nondum purgato: pro-
 cefferunt quoque sudores quodiam per totum
 fluentes, quia talis morborum indicationem, &
 corporum muliebrium perpurgationem accom-
 modatissimi sunt. Quod in ægotantibus ex partu
 quotidie videas, nigrum effunditur conturbatus,
 & exagritatus sanguis. sūtque ògeneres hi tres mor-
 qui in hac muliere apparuerunt, rigor, icterus, &
 sudor. Quorum sudor perfecit inchoatam per
 duos priores excretionem. A qua sit, ut qui ex
 morbo regio rigent, si ex rigore sudent, evadant.
 Quod huic evenit, quæ cum non evacuasset satis
 multum riguit, & ictero est correpta. Hæc ex parte
 vacuata manibus riguit, tamen nondum vacuata
 satis, sexta die iterum tigit, superueniente verò
 copioso sudore, die septimā indicata est perfectè,
 diu natuā non parum iuuant: ei enim sūtque huic
 omnia, iuxta id quod sectione tertii libri tetrij di-
 ctum est, his verbis: pleneque ægroti circa vacua-
 tionem rigebant, maxime quibus sanguis non eru-
 pisset, idem verò postea insuper tigent, &
 exudarunt. Tychonis, qui in obsidione circa Da-
 rum catapulta percussus interit, huius occurrat
 hoc loco, enarrata verò prius est in quoro, neque
 hæc ab illa dictione evadit, nisi quā minimum,
 & quod nullus momenti est. Et quicquid id est
 illo loco animadvertimus: Locus est non longè à
 fine quanti.

E *Unchus ex venatione & excursionem*
adaquator factus est, hic iuxta fontem E-
leale habebat, & a sex annos habuit affe-
ctum ex equitatione contractum, qui tenet
vocatur, & inguinum tumorem, & varices,
& diuturnas in coxas fluxiones: hic secundum
inanem partem tabefactus septimo die mor-
tuus est.

Narrat vitam ante actam, & passiones diuturnas,

A quæ ab ea vivendi ratione traxerant originē, quod
 eam fuisse causam autem tam repentinis interitus.
 Non enim narrat ex quo morbo perierit, sed pe-
 ruisse septem diebus, insignis non ob febrem ali-
 quam acutissimam, aut internam inflammationem,
 ut ob peripneumoniam, aut pleuritidem, aut phre-
 nitidem. sed ob aliquam aff. & onem, quæ à diutur-
 ris illis fluxit, neque nisi ita affectum, ac labefactum
 tamdiu, subsistisset. Exterum igitur hic impto
 tempore attem venatoriam, atque postea vivendi
 rationem mutavit, (cum fortasse non posset iam
 priorem sustinere) atque, venatione & assidu-
 consuetudine, factus est *id est* *peripneumoniam* (ita vocatur qui
 aquam desert, venditque, aut qui haurit) habi-
 tabat hic iuxta fontem Elealeis. Huic primum qui-
 dem ex labore, assiduū inquam & concitatā equi-
 tationē, quā venatores visunt, deinde & ex humili-
 ditate, quæ à vivendi ratione & habitatione acces-
 sit, læsæ & debilitatæ plurimum sunt partes humi-
 les, quæ circum circa clunes & genitalia sunt, &
 inanes partes. Habuit ergo sex annos *tenet*, ita
 vocat malum ex equitatione contractum, velut
 fieri solent ykera quædam in clunibus & interfe-
 mineo, quæ aliquando evadunt durissima, & dyspe-
 lonca, & collola. Habuit etiam *basilicam*, quem, si-
 quidem fuit ad id diuturnus, eo ita fuisse in o-
 rem sartholium in adene. Habuit quoque *ictero*, id
 est vances, aut (si velis cum publicis & codicibus
 le, ere) *ictero* hoc est, ictero, & dolore parvis vena-
 zatus est, aut continenter plus minusve. fligente,
 aut repente per quædam intervalia, ita ut solet:
 accipitur verò h. nomen partis pro affectione, ve-
 lut in aphor. 22. sect. 3. vbi dicitur, Autumno &
 ex æstus multi morbi gressantur, & febres quar-
 tanæ, & eraticæ, & splenes. Nomen enim splenis
 pro eius visceris morbo accipitur: & rursus alio
 aphor. 26. sect. 3. apud verò grandisculus, & splenis,
 itaque hæc quoque *ictero*, hoc est, ictero, ei parti fa-
 milia rem morbus: addit *ictero*, hoc est, dolo-
 res circa genitalia, qui quidem dolores sunt ob fluxio-
 nes in coxæ articulum. Is enim articulus, ut
 est maximus attingit os pubis. & fœmen inter cru-
 ra, & ille, & clunes itaque omnes eas, & earum plu-
 res partes obsederat dolor. Cum tantæ earum par-
 tum laboraret debilitate, correptus est acuto morbo
 (cum febre arbitror) & secundum inanem par-
 tem tabefactus interit die septimā. Non explicat
 quo pacto interierit, neque qui fuerit postea: mus
 morbus: scribere tamen oportet, eos quibus humiles
 illæ partes diu iam sunt male affectæ, quosque con-
 fecit laboriosa aliqua vivendi ratio, qualis huic Eu-
 nucho contigit, aut etiam nimia Venus quæ illas
 etiam partes debilitat, opportunus esse multis &
 periculosus aff. &ibus, ac nonnunquam brevi inter-
 imentibus. Nam putrescentiæ malignæ, & ex-
 cidentia vlcera, aut gangrenosæ inflammationes
 brevi oriuntur in illis partibus, ut prope humidus &
 extremis in ijs, & venter aut intestinorum, partium
 eo loco sitarum, actiones adeo necessariæ tolluntur,
 corrupti & eorum per tum facili. Itaque naturalis, aut
 animalis earum actionum instrumentis penitus
 resolutis, vel convulsis, aut vus obtruncatis conge-
 stione insuperabili lapidum, rophorum, aut gry-
 motum, aut cingularum supercrecentia.

F

His qui crudum prapotent salsa cum mel-
le medentur.

Suppleri hic debet *aut*, hoc est, medela, significatur enim his verbis, ubi quis aquam cruditiorem, aut gelidam, vino præcipue assuetus, acceperit, aut crudum lac, aut iusculum olerum cum multo aceto, aut denique potione aliqua, aut sorbitione crudiori læsum se sentiat, salso aliquo cibo cum melle debet uti, velut veteri caseo, aut salito pisce (vr certe fardina) melle intinctis. Quandoquidem salsa & mellita, calida & sicca cum sint, emendant crudā illam frigidiorem. Constat verd eadem ratione iussurum iri hominē acerbis, vti veteribus viatur nucibus, intinctis etiam melle, aut vr quibusdā in usu est, nucis persicorū, aut atrijs ex nucis pineis, aut amygdalis cum melle subactis, aut alijs eiusmodi: constat quoque raliū rerum usum conducere, non solum post poriones, sed post cibos etiam crudos, & frigidos denique ad cruditatē omnē quæ nidiora non sit. Quidam pro *opponitur* legunt *opponitur*, voluntque Hippocratem præcipere, vt suppuratis qui pus crudū excrēant, et nubes aut salsa cum melle ad detergendū & coadmodandū.

Hinc delevi quædam verba, absurda profus, & indigna, quæ à probo quopiam viro legerentur: ob id quanquam desint, non desiderabuntur.

I Ionida filia natuſa conuerſa eſt, conuerſa
verò ſubſannabat, ſubſannans pacata eſt
medicus non intellexit. Puella mortua eſt.

Parum peritis medicis non aliter ac vulgaribus, meliussemper habere videntur agroti, quàm quiores & paciores sunt, cum tamen pssit hac quoque in re esse quid nimium, resque non ita pensanda sit, sed vt alibi Hippocrates monet, considerandum an quæcumque in agrotis appareant similia sint, aut dissimilia: quæ in eodem esse continerant, quum secundum naturam se habebat videndum quæ quantum dissident id quod adest, tñ à communi hominum naturâ, tñ vel maxime à suisque propriâ. Quod enim plurimum dissidet ab eo quod secundum naturam, est admodum præter naturam, atque ob id etiam vitiosum est. Velut cùm baie esset natura concitata & cad furorem prona, paulò ante mortem conuersa est ad pacatiorem, sedataque est plurimum, atque facta mitior. Tamen *εμεσσειν* id est mouebat nares velut subfannans. Medicus non intellexit

B Philotimi filius pubertatis annos affectare
venit ad me. Inueni os cranij arte medicā
desistitum, & deploratum, cum occulta stabi-
lia non viderentur.

Maximum errorem imperitorum chirurgorum notat h:c Hippocrates, qui nonnunquam deficiunt intempestive ab ulceris curatione, ac quasi sana iam sint relinquunt, eò quòd supercreverit caro quardam, & ossa coarctata, ac repleta caritatibus sint: cum tamen, nisi ea caro sit à fundamentis satis firma, stabilis, & sicca, ac quæ substantia ossa & membranae sint citra omnem lesionem, malignè occultata, atque ut dicunt, supersanata potius quàm sana sint, necesseque sit postea malignius recrudescere, naturam pellente id quod suberat laxi, molliis, atque putridi, aut alterata officula: aut (quod erit multò gravius quam id non potest effugere natura, eò quòd per insiniam obcurata illi vix sint, superuenientibus gravissimis febribus, ac convulsionibus, & malignis aliis symptomatis mori: tunc multum mirantur medici id accidisse, cum vlcera iam essent ferè ad cicatricem perducta, negantque ex his illud accidisse, sed ex novo morbo qui ob aliam occasionem contigit. Saepè igitur peritus medicus non minus prospicit, ut ante tempus non congreantur vlceris veluti fundamenta, quàm ut caro generetur, ac si fungulos mollesque & facile liquefens caro pullulet, extirpenda dissipandaque est, vident dumque ut occulta & quæ talibus carunculis contegantur, stabilia prius sine, quam permittat quippiam supererescere. Quod quidem peccatum esse commissum dicit Hippocrat. in puero Philotimi, quem, cum habuisset vlcus vsque ad crani os, chirurgi dimiserant velut sanitum iam restitutum, cum tamen occulta, hoc est, ipsius ossis (quarum & pericranium & hærens illi caro, non essent satis firma. Oportuit ergo (etsi id Hippocrates non dicat) vlcus novare, ac subiectis partibus idoneam denuò curationem adhibere, vsque adeò præstare artificis imperio.

INDEX COPIOSISSIMVS

In quo Vniuersa horum commentario-
rum doctrina compendiose conspicitur.

Numerus columnam designat, littera columna spatium.



- Abdominisruptura. 106. f.
Abhorrentes eodem prorsus tempore
consentiri id pati propter exiguitatem
vteri. 335. e. & 366. e.
Aborrum tentare non licet. 111. g.
Abortus causæ. 167. e.
Abortus periculosior partu. 262. e.
Abortus quo prægnationis tempore sit periculo-
sior. 262. f. & 335. b.
Abortus masculi salubrior feminæ. 225. b.
Ab abscessibus ad articulos duplex euacuatio præ-
fernat. 596. e.
Abscessus quid sit, & per quas partes fieri soleat,
quinam boni & quinam mali sint. 93. b. 114. f.
Abscessus etiam vocantur morborum permutatio-
nes. 26. c. 52. a.
Abscessus cum effluxione, & sine ea, & virorum-
que exempla. 99. f. g.
Abscessus ad dentem. 100. b. 284. f. 354. a.
Abscessus ad articulos, aut fluxus sanguinis inter-
cipiant elevationem lenis. 178. b.
Abscessus contrarios nonnunquam complicari
exemplo indicatur. 367. f.
Abscessus & recidivæ eorumdē morborū sunt. 426. b.
Abscessus non minus quàm euacuationes debent
diebus decretionis fieri. 435. e.
Abscessus in aores sunt magis tussiculosi, quàm qui
in dentes fiunt. 436. e.
Abscessus mali innumeris modis fiunt. 567. f.
Abscessus non admodum fiunt quibus rigores 579. e.
Abscessus ad articulos fieri posse sine tumore, &
sine dolore. 580. a.
Abscessus partium inferiorum meliores esse quàm
superiorum, nisi sint suppurati solvendi. 582. a.
Abscessus maturi, rectè indicantis affectus priores
signa. 404. f.
Abscessus varij. 25. f.
Abscessus decretorii qui. 29. b.
Abscessus indicationes. 178. e.
Abscessus qui maligni. 393. d.
Abscessus vocat Hipp. etiam euacuationes 603. e.
Abscessus glandularum significare affectiones vis-
cerum, & cur. 593. b.
Abscessus considerandos esse quo, vnde, ac pro-
pter quid explicatur. 594. d.
Abscessus sæpe fieri in inferna ex fucus qui
sursum moveri incipiunt. 595. e.
Abscessus non raro fiunt in vnum latum, aut solum
aut magis quàm in alterum. 596. a.
Abscessus in quas ex quibus partibus fiunt, mul-
tum interest considerare. 602. c.
Abscessus, ut fistule qui dicantur. 657. b.
Abscessus diuturni siue cum euacuatione, siue sine
ea, non curantur sine periculo. ibidem d.
Abscessus in quas partes expectari oportet. 743. c.
Abscessus indicatorios facilius solui quàm alios ab-
scessus particulares. 802. f.
Abscessus duo maxima vitia & quid ob illa facien-
dum. 26. d.
Abscessuum bene procedentium exempla. 69. b.
Abscessuum ad cutem differentie. 100. e.
Abscessuum omnium indicationes, quidque ob
eos agendum. 158. e. 598. b. 602. e.
Abscessuum ad oculos, aut aures, aut articulos futu-
rorum signa. 380. h.
Ab ijs quæ non adsunt, argumentum. 96. b.
Accessiones diebus paribus cur malæ? 41. a.
Accessionum anticipatio & postpositio. 53. c.
Acetum cum sale potum vomitum mouet, sed non
innoxie. 898. a.
Acheloi vxor sexta die abortum fecit, sanguinea
cùm esset. 334. e.
Actionum omnium naturalium enumeratio. 765. a.
Acuta febris quæ dicitur ab Hippocrate. 301. a.
Acutas & perniciosas febres raro fieri sine interna
inflammatione, & quæ cura ob id esse debeat. 65. a.
Acuti morbi non omnes cum febre. 55. a.
Acutorum morborum finis. 238. a. 250. d.
Adamantus Melancholicus à peplo & capis vomit
multa nigra. 768. d.
Adolescens qui decubebat super foro mendaciorū
ardente febre, ex nimia exercitatione correptus,
septima est mortuus. 158. g.
Adolescens Melancholicus ex vino, & venere ægrotans,
vigesimo quarto obiit. 332. f. d.
Adolescens qui primus mente captus est, febre ar-
dente cum phrenitide ex vino laborauit. 348. e.
Adolescens, qui hausto serpente mortuus est. 351. d.
Adolescentis peregrini historia. 351. a.
Adolescentis ex Euboia historia. 503. b.
Adolescentis qui cucurrerat viam asperam hist. 514. e.
Ægrotos à lecto surgere morbo nondum soluto
expedit. 729. e.
Aër intemperatus quando parit morbos 12. b. 17. a.
Aër parit morbos communes omnibus 17. b. 86. d.
Aëris quæ differentie sint consideranda, & qualis
in his aut illis regionibus sit. 751. a.
Aëris corruptio magna parit idem morbi genus,
exiguū vnum. 11. f.
Aëris intemperies antecedit morbos & ante illorum
ortum cessat. 4. f. 17. a. & 139. b.
Aëris frigiditas & humiditas replent corpora, 17. c.
Aestas quando incipit. 5. b.
Aëstus morbi. 11. b.
Aëstus victus sanorum. 654. b.
Ætas ægroti, & anni temporis & ægrotandi occasio
faciunt, & ad cognoscendum morbum, & periculum
& curationem rectè suscipiendam, debentque con-
siderari seorsū atque etiam cum aliis conferri. 553. b.
Ætates non eisdem annis mutantur in omnibus, &

INDEX

causæ singulorum	760. a.	Animi moribus aliquando curari morbos.	186. a.
Ætatum morbi.	o. a.	Animi motus prouocandi duplex ratio, altera com-	ibidem. b.
Ætatum distinctio ex dentibus pilis & semine.	739. f.	munis, altera propria.	ibidem. b.
Agasthiæ hist.	163. b.	Animi morbos curare ad medicum spectat.	69. d.
Alati parati sunt ad tabernum	391. a.	Animi motus vehementes multum corpus le-	315. b. d.
Alati cur sint catarrhosi	639. b.	dunt.	
Alaros flatuosos esse	634. a.	Animi deliquium repentinum & eius curatio.	200. e.
Alaros à malignis fluxionibus siue excretio sit, siue	639. c.	Animi deliquium fluxum sanguinis sistit.	776. b.
non sit, periclitari.		Animi deliquium ingruens spiritui crebri facere.	779. e.
Albi colore, non rufi capillis, quali sint naturâ.	419. c.	Anni tempora, quando variè sunt affecta, varios pari-	n. e.
Albidorum quidam febriculosi, quidam à febre val-		unt morbos.	
de alieni & cur. & quibus signis discernantur.	764. c.	Anodynorum duplex genus.	713. f.
Alcippi historia.	448. c.	Antandri historia.	370. c.
Alcmanis qui nephritide laborauit, historia &	862. b.	Antigenis vxor peperit monstruosum fetum.	116. e.
curatio.		Antigenis vxoris asthmaticæ historia.	364. d.
Alcuius vlcibus per cutem ægrè sanescentibus labo-	110. b.	Antiochus & Alueus vlcibus, per cutem ægrè sa-	110. a.
rauit.		nescentibus laborauerunt.	
Alleuatio iam morientium quas habeat causas.	812. b.	Antiphon filii & Thessalonis historie.	814. a.
Allia cum maza quando oculis conferant.	209. a.	Anus iuxta Sibileu leucophlegmate laborauit.	89. b.
Allia quibus conueniunt.	ibid.	Anxietatis quæ antecedit repens casus causa.	852. b.
Alui torpor omnium confusionem affert.	639. d.	Apellæ qui in iuuenili ætate epilepsia est correptus,	407. f.
Alui profusiu in grandia ex quo accidit abortus.	115. g.	historia.	
Alui fluxiones spontaneæ periculose in pectus ten-	290. b.	Apemanni vxoris historia.	367. e.
bus		Apemantus, & pater fabri, & Nicostatus ex multo	
Alui deiectiones thoracis morbis plerumque inuili-		cibo laborauerunt tussi sicca cum dolore lumborum	
ter, aliquando exitialiter succedunt.	527. f. & 567. b.	vide quæ pati possit, & quomodo eliciantur cûd. a. 9. f.	
Aluum multum fluere & multum sicari in morbis	131. b.	Àphonia vicinis iam morti cur fiat.	64. e.
thoracis malum		Aphorismus 70. sect. 4. explicatur ex alio Hippoc.	900. f.
Aluum sicari hydropicis malum.	524. d.	loco.	
Aluum quasi quid sit	613. e.	Apollonius Abderæ phrenitide laborauit.	318. d.
Aluum in initio morborum siccam habere, deinde		Apoplectica passio ex catrocho & Apoplexia constans	
humescere melius est quàm contrâ	837. e.	describitur.	435. e.
Aluus cur intumescat quibuscûq morbi proximis.	816. e.	Apoplecticas omnes passiones esse vehemeniores, quâ	
Aluus maximè sistitur ore acceptis.	143. f.	vigilantes innadunt, quàm quî dormientes.	489. a.
Aluminis. vsus	336. b. & 666. b.	Apoplecticæ passiones à quocunque suoco fieri pos-	
Ambigua signa vt distinguantur.	775. b.	sunt.	885. e.
Amplexarum differentia & causæ, vt quæ sint aliquan-	368. g.	Apoplectici etiam morituri, cur non raro paulo ante	
do pessimarum affectionum		mortem redeant ad mentem.	474. c.
Amylum & farina quo pacto cobibeant fluxus	806. c.	Apoplexia ex vino et si sit fortis, soluitur sæpe, & non	
Amaxenoris splenici historia	902. f.	nonquam inremit præcipue senes.	415. e.
Anaxion pleuritide laborauit longa:	309. e.	Apoplexia ab externa causa soluitur, et si sit fortis.	521. e.
Anaxionis cur non secuerit Hipp. venam aure octa-		Apoplexiam non soluitur, quæ eund. & ante legiti-	
uam.	310. d.	imum tempus.	214. b.
Andrez historia.	834. d.	Apoplexie cum conuulsione ex melancholia inciden-	
Andronici puero erysipelas tecurrit.	173. f.	tis descriptio.	840. e.
Androphanis historia.	345. a.	Apoplexiæ eius non vulgaris curatio.	842. b.
Androtali historia.	885. e.	Apoplexiæ ingruentis neq; obfirmatæ signa.	885. e.
Anechen filii, qui ex epilepsia obiit sex diebus histo-	842. b.	Apoplexiæ innadentis curatio.	ibid. d.
ria.		Apostasis brachij quid sit apud Hippocratem.	534. d.
Antipho quid sit apud Hippocratem, & cur soluitur	196. g.	Apparatus morbosus quàm periculosus sit indica-	
venæ sectione		tur exemplo.	515. a.
Angina quid sit & eius differentia.	732. b.	Antipho quid significet.	332. e.
Angina non potest ante tertium solui, sed potest pri-	131. f.	Aqua leuissima.	121. a.
mo die strangulare.		Aqua edax, vigilia edax.	675. e.
in Angina quomodo mittendus sanguis	221. c.	Aqua intercus vnde ita dicta.	108. f. lege hydrops.
Angina ad pulmonem vertitur multis.	127. f.	Aqua frigida à recenti casu pota, cur proferat.	775. b.
Anginam vocabat Hipp. omnem strangulationem.	134. d.	Aquæ refrigerandæ ratio.	668. e.
Anginosa, quæ iuxta Ansthemem agebat, quinquâ mor-	757. f.	Aquæ elixandæ ratio	ibidem.
tus est.		Aquæ arte carentes & artificiosæ quæ sint.	873. a.
Anginoforum ex vertebrarum luxatione historia	133. a.	Aquilo & Auster tussis excitant, sed non ob eandem	
Anhelose famulæ historia	395. f.	causam.	543. e.
Anhelosum esse & à sudoribus deficere in acutus le-	737. b.	Aquosæ mulieres copiosa habent & crebra menstrua,	
thale.		quoque sunt hydropicæ.	576. d.
de Anima veror sententia.	758. a.	Arcturus quando oritur.	278. e.
de Animæ essentia sententiæ Gal. & Hip.	688. b.	Aristæ ex Amphilochoi pago historia.	414. a.
Animæ rationalis definitio	ibid. c.	Aristippum vulneratum esse secundum intestina, Ne-	apollin

apolum secundum ventriculum, ex utriusque symptomatis indicatur, redditurque vitorumque causa.

655. b.

Aristocratis historia & ob curricula. quid factum sit, & quid fuisset faciendum. 838. a.

Aristodemus & Philus filio vltum est peccus. 313. g.

Aristodemus ferax historia. 507. c.

Aristonius cui ex vulnere digiti pedis ascendit gangrena vique ad genus, historia. 898. b.

Aristophontis filii historia. 368. a.

Aristoteles, traiecit septo transfuerso, affirmat aliquos in bellis iussu, & qua causa. 559. f.

Ars an semper seruiat nature, multis disputatur. 681. e.

Ars ex quibus constat. 51. c.

Arteriz scilicet dignatio. 164. g.

Articuli magni quibus hipocrate dicantur. 178. f.

Artus omnes pariter resoluuntur, periculosus casus & cur. 805. e.

Asandi historia. 852. d.

Asina & equa vndecimo mense pariunt. 108. a.

Asini & asinorum quid vtrumque sit & quomodo differant. 316. a.

Asthma quid sit. 665. e. a.

Asthmatici victus & curatio. 161. d.

Astra quid faciunt ad temporum mutationes. 36. f.

Astorum otus & oculus considerare oportet. 364. c.

Astrum magnum quid sit, & Hippocratem Astrologicas considerationes non omisit: nihilominus multorum de his vanitas vituperatur. 161. d.

Athenarum pueri historia. 355. c.

Atticum nomen medicamenti, compositum. 219. b.

Audire inaequaliter symptoma est insigne, & quas habeat causas. 810. f.

Aues esse biliosas, & ob id siccitate gaudere. 717. e.

Aurelianus Hippocratem carpi immeritum. 469. b.

Aures arrectae indicant loquacitatem. 189. f.

Aures esse locum fallacem. 693. b. 794. c.

Auris humiditas infantulis morbus. 790. d.

Auris inflammationis in malum tendentis signorum syndromis. 161. d.

Auris dolor lacte sedatur. 203. e.

Auris cum dentibus quae communio. 355. d.

Auris inflammatae signa, causae & prognosticum. 455. d.

Aurium mala noctu ingruere vt & capitis & oculorum. 798. e.

Aurium sordes dulces nisi ex sanguine, lethales esse. 696. f.

Aurium eruptiones quoto morbidie, quocumque anni tempore, & quacumque aetate fiunt. 726. b.

Auster cur repleat caput magis quam Aquilo. 13. a.

Austro flante solent remitti frigora & descendere pluuiae. 4. a. & 87. c.

Austrinae tussis magis afferunt febres quam Aquilonares. 543. e.

Austrini Batus non plures quam Boreales, sed calidiores fluxiones mouent. 856. d.

Atromoni in omni lapide percussu capite historia. 495. e.

Aurocitatem Medico ad recte curandum esse vtile. 559. a.

Autumnalium & aestiualium morborum comparatio. 90. d.

Autumno quales morbi. 11. b.

Autumno acutissimi morbi. 90. c.

Autumnus esse vt anni vespertim. 381. b.

Autumnus quando incipit. 3. b. & 14. a.

Autumnus est similis vesperti. 90. c.

Auxilia magna nisi inueniunt, ledunt. 476. d.

Balbi celeri lingua melancholici, incontinentes aspicientes, & iracundi. 111. d.

Balbos aut caluosi aut gracili voce praeditos, morbos habere vehementer atrabiliarios, & cur. 192. f. & 111. f.

Balburnes duplex. 193. d.

Balburies vnde pronenire possit. 103. f. & 210. f.

Balis filij historia, qui cum in monte oberasset, correptus febre perniciose obiit. 816. e.

Balneorum calidior nimis vtus hydropicis efficit. 466. f.

Balneum pro articularibus & occasio vtendi. 857. e.

Balneum in quibus sit periculosum, & vulgo imponere opinione refrigerationis. 537. a.

Balneum commendatur ad melancholiam. 77. a.

Balneum in hydropicis vtile sit. 536. f.

Balneum, cibum, & quietem ad purgationem praeparare, quomodo intelligendum. 706. a.

Barba cur mulieribus & spadonibus non nascatur. 776. b.

Biantis pugilis historia. 537. b.

Biliofa tempestiue vacuari quae dicantur. 43. g.

Biliofa vocat Hippo. omnes putredinem praeseferentes succos. 43. c.

Biliosi difficilivomentes vel etiam nigri perquam parum purgandi. 772. f.

Biliosi & sanguinei sunt melancholici, neque eodem modo, neque eadem causa neque eadem aetate. 719. b.

Biliosi & sanguinei euacuationibus & victu praeseruantur a melancholia, vtraque autem sunt in eis diuersa. 161. d.

Bilis sincera per sublimes agitata partes, quae solet afferre symptomata. 779. d.

Bilis rubra an sit. 694. b.

Bilis vitellina qualis sit. 791. b.

Bilis impende rubra quae sit. 545. a.

Biliosum fieri a pingue explicatur. 694. a. 711. d.

Billis percussu in dorso historia. 560. e.

Bon inflammatione lienis laborauit. 532. a.

Bionis historia, qui ex hydropico factus est stranguriosus, & suppuratus in genis obiit. 818. b.

Blanco maniarum sicut alium. 11. e.

Bona tolerantia euacuationum definitur. 397. d. & 404. g.

Bonitas quid sit. 190. c.

Botti insolati succos expressos quam sit noxius. 877. e.

Bovina coeetu difficilis, & ita difficilis putrescent. 199. f.

Brassicae facultas. 693. b.

Bregma quae capitis pars sit. 872. a.

Breuem aut acutum morbum differre indicatur exemplo chartus. 301. f.

Breuispirus quomodo dicatur ab Hippocrate. 848. f.

Bubones in febribus non diutius cur sint ad malum, 394. d.

Bulimix ex canina fame generatio. 558. d.

C

Cadentibus cur mittatur sanguis, & quae pericula imminuant neglecta sanguinis missione. 362. b. c.

Cadentes ex alto aut percussu curatio. 473. f.

Ceparum natura & vis. 768. d.

Calcidionis ruptura facta in pectore, non est suppuriatus. 333. a.

Calculi generatio. 635. f.

Calidi ventre frigidi quales sint. 677. a.

Caleditas acrimoniae signum, & cur. 717. f.

Callignis excharro laborantis historia. 869. b.

Callimedontis pueri, historia. 514. b.

Calliphylou quid sit, & ad quae proficiat. 839. c.

INDEX

Caloris extrictione morientes fallunt medicos in moriendi hora. 680. d.
 Calui Laricis historia. 305. a.
 Caluitium prudentiam indicat. 189. f.
 Cancro essentia, differentia, causa, & curatio. 898. d.
 Caocri cur difficilis entario. 184. d.
 Cancru in pectore, vitis etiam quandoque neri, & quâ causâ ea in parte fiat crebro. 365. d.
 Caniculares dies quando finiantur. 139. b.
 Canis & Ancturi ortus Pleiadum occasus præcipue notatur. 829. b.
 Canis sydus duplex. 34. f.
 Capita acuta habentes duplices sunt, fortes & debiles, & utrorumque signa. 572. b.
 Capite vulnerato lac vino mistum trihuir Hipp. 195. d.
 Capite paruo homo non erit balbas, neque calvus nisi sit glaucus. 213. b.
 Capitis vulnerati curatio. 195. d.
 in Capitis vulnerè dæcepit fuit Hipp. propter futurum. 495. e.
 ex Capitis vulneribus moriturus cur conuallatur partes oppositas, & affectu resoluatur. 322. a. & 378. d.
 in Capitis vulneribus an conueniat medicamentum. 235. a.
 Capitis dolor ex crapula vinum conuenit. 233. e.
 Capitis figura optima. 572. c.
 Capitis ardorem pharmaci vsum prohibere ex Hipp. 875. a.
 Capitis dolor ex suppressione mensium. 471. e.
 Capitis dolores ex toto quomodo curandi. 865. c. & seq.
 ex Capitis percussione sanatus paralyti. 490. a.
 Caput, thorax, & genitalia facili statu implentur. 13. a.
 Caput magnum & oculos paruos habentes & balbi sunt iracundi, & cur. 210. b.
 Caput magnum cum oculis nigris, & magnis, & naso crasso & simo probitatem indicat. 112. a.
 Caput acutum quod sit. 572. b.
 Caput secundum sinciput depressum deterius esse, quam secundum occiput. ibid. f.
 Caput omnium partium maxime læditur nimia sanguinis missione. 723. e.
 cui Caput lapide percussu à Macedone, historia. 524. f.
 Capra & ouis parit quæ mense. 158. a.
 Caribunculi in pudendis per asitatem nascébantur. 289. c.
 Caribunculi signa. 818. e.
 Caribunculi in peste Cranonis. 85. e.
 Caribunculi ex quo humore generentur. 86. d.
 Carcinoma seu cancer quid sit. 365. c.
 Cardialgia magis accidit Autumno. 28. f. & 356. a.
 Cardialgia quomodo curanda in corporibus calidis & siccis. 113. b.
 Cardialgia maxime nata est fieri ex uimia venere. 37. c.
 Cardialgia quid sit, eius causa. 555. d.
 Cardialgie curatio. 205. g.
 Cardialgie notæ & exempla, & curatio. 112. f.
 Cardialgiam frequenter fieri in semitertiana. 555. e.
 Cardialgiæ pictocochli quomodo præseruandi. 110. d.
 Carnes attractrices esse extrinsecus & intrinsecus. 719. c.
 Carum taruli natura & facultas. 863. f.
 Carnopurulentia pulmonem prætereire indicant. 339. c.
 Caros ex sola compressione cerebri fieri potest. 498. a.
 Calvus vetus cum melle post erudum potum confectus. 919. h.
 Castoreum ad vterinas passiones commoedatur. 865. c.
 Castoreum quid significet apud Hippocratem. 330. d.

Catalogus sententiarum libri quinti, quæ repetuntur in septimo. 815. c.
 Cataplasmatis pro præfocatione vte risyngrapha. 867. d.
 Cataplasmata aliud pro eodem affectu. 892. c.
 Catapotism quid sit. 504. b.
 Catarrhi frequens decursus à capite in hypochondria & coxam. 196. e.
 Catarrhi causæ & notæ. 566. a.
 Catarrhi & febres soluantur cuius materis coctæ euacuatione, quam insensibiliter, ut phlegm ones inuratione quam resolutione. 629. d.
 Catarrhi differentia, & causæ & de curatione multa. 869. d.
 Catarrhi obredundantiam saccorum in capite historia. 149. f.
 ex catarrho auris inflammatio & pleuritis. 150. d.
 per Catarrhos magnos cur sit alius astricta. 898. e.
 Catarrhus venere turarus. 557. c.
 Catarrhus quos solar habere exitus. 538. a.
 Cauponis qui peripneumoniam tenebatur, historia. 814. e.
 Causa efficiens quando est valida, omnes eodem modo efficiuntur aut debiles vanè pro passi dispositione n. f.
 Causæ ignorantem periculosem esse quam ipsius affectus. 772. d.
 Causa affertentis historia. 130. g.
 Celsus Hippocratem, laudat & magni ingenij virum censet, quod proprium est ore confessus sit. 456. d.
 Celsus quantum librum epidemiorum Hippocratis esse non dubitauit. 497. a.
 Cephalalgia, & hemicrania qui affectus sint. 853. e.
 Cephalalgiam, & hemicraniam fieri sæpe ex affectu phlegmonoso internarum partium cerebri od calidum catarrhum, & quot habeant exitus. ibid.
 Cerebri & cordis passiones omnes possunt incipere à ventriculo. 897. b.
 Cervicæ bonum & pedes suum quale alimentum præstent. 863. f.
 Chylus acris arguit. 722. c.
 Chylus quæ dicantur. 700. c. & 701. c.
 Chenix quantum capiat. 788. a.
 Chetion ex viuo cepit ægrotare, indicatus est vigesima cum integris febris pluries videretur esse soluta, est exemplum fallacis morbi. 251. g.
 Chlorum quid significet. 332. d. & 373. c.
 Charitis historia. 837. d.
 Charopi oculi seu rani & magni, caput magni ceruicæ tenuis, pectora stricta hominè quadrati testantur. 12. c.
 Charopus color quinam sit. 191. c. 260. g.
 Charadis historia qui intra diem ex cholera morbo obiit, morbi totius interpretatio, & symptomatum causa. 804. c.
 Cholera morbus quinam morbus sit. 544. h. & 880. h.
 Cholera morbus duplex. 544. c. & 880. c.
 Cholera arida seu sicca. 544. d.
 Cholera morbus. 467. a. 483. e. 557. h. & 544. b.
 Cholera facientes cibi & alia externæ causæ. 880. d.
 Cholera morbi ex hile ardentissima curatio optima. 467. b. & 879. f.
 Cholera morbi appellatio, causæ, signa, & curatione longa. 467. b. & 879. f.
 Chirurgi ne premantur durius partem tractent. 403. b.
 Chirurgi videant, ne durius tractent vulneratum cerebrum. 498. a.
 Chirurgus qui fecit partem putridâ quid facere debet. 722. c.
 Cilia & rani & crassi succi causant mala. 185. b.

INDEX

Cibi & potus an æqualem moram faciant experientia indigent 121. d.
 Cibi moderati congruus definitio. 649. c.
 Cibi fortes qui dicantur, & eos ventrem perturbare calidis hominibus 701. f.
 in Cibi oblatione quæ consideranda. 59. b.
 Cibi fastidium pessimum in febribus signum, 25. d. 26. b.
 Ciborum vrendi ratio. 121. f.
 Ciborum pravi fucci vsus periculosus etsi per multos dies non sentiat læsio 55. c.
 Cibus debiles breuem vitam præstare explicatur multatiam 699. f.
 Cibus quosdam celeriter vinci, quosdam contrà 709. f.
 Cibus & labores exactè præscribere est impossibile. 112. a.
 Cibus copiosus ingestus impedit indicationes & producit morbos. 350. d.
 Circuits febrium considerandi 59. f.
 in Cicico mulieris, quæ gemellas peperit, historia. 321. c.
 Clamores & inquietudinem post delirium quod à dolore capitis incipit, significare cõuulsiones & cur. 55. b.
 Clangosa vox lethalius vulneratis in capite fit & cur. 562. e. & 8. 7. c.
 Clazomenus laborauit febre ardente cum inflammatione hypochondrii. 78. a.
 Cleocus ex lassitudinibus exercitijs, & melle tubercula melanchnica crurum contraxit, & cur. 842. e.
 Cleomenis pueri historia. 518. b.
 Clenpactes laborauit crassica continua. 73. g.
 Cleonigi nephritici simul, & dysenterici historia & curatio 904. a.
 Cleorimi furoris historia. 852. f.
 Climaërici anni quid præstent prænotioni. 10. a.
 Climaëricorum annorum ratio & computatio 109. e.
 Clyster cur accipi non possit. 878. b.
 Clysteris, & glandium cur crebrius mentionem faciat Hippocrates. 303. a.
 Clysterium & pharmacorum frequens vsus hemorroidalis facit. 487. b.
 Clysticum, & glandium vsus quàm creber esse debeat. 248. d.
 Coccyi insipia gibbositas ex phreuitide facta est hist. 518. c.
 Cogitatio appatente quando mori potest ægr. 29. f.
 Cognitiones considerande. 29. d.
 Cognitiones indicij celeritatem, &c. ibid. c.
 Cogitatio est animæ deambulatio. 691. b.
 Coli soror ex hepatis inflammatione obiit secunda die 131. d.
 Colit um feces alui si careat, & in quibus contrarium adueniat 705. c.
 Colici doloris & renum cõparatio, & differentiæ. 575. c.
 Colici & reualis morbi similitudo, & nephritidis curatio 862. d.
 ex Colicis dolore arthritici fit & contrà 662. d.
 Colluendi modus ad dentium dolores. 865. b.
 Color tenuis, pallidus niger quinam sint. 564. d.
 ex Colore faciei, & capitis robore agnosces, an conseruetur fluxus sanguinis. 713. a.
 Colores tales efflorescere in cute quales sunt fucci in corpore 680. a.
 Coloris differentiæ, eosque fulgores quosdam esse 501. c.
 Colostrium & colostratus morbus. 223. d.
 Colomelle renulsi duplex causa. 256. g.
 Coma & cataphora apud Hippocratem idem. 316. c.
 Coma maxime pueris accedit & cur. 93. d.

Coma, & somnolentia. 154. a.
 Comatosa reuersio quæ dicatur. 351. f.
 Comedere delirè quid sit & eius symptomaticæ causæ 83. d.
 Communes morbos semper incipere à sparsis, & i sparsos finire. 12. a.
 Communio partium fit aut propter rationem communem aut peculiatem. 619. d.
 Complati bene degunt tempore siccò. 10. f.
 Complutum quibus morbis sit congruus. 699. c.
 Computatio dierum à partu in cõiis. 297. b.
 Computatio dierum morbi à vehementiori quapiam occasione incipiens ab ipsa externa causa esse debet 55. d.
 Conceptio cur maxime fiat post menstrua 169. b.
 Conceptio aliquibus fit tantum, cõ mensura fluxus & cur. ibid.
 Conceptio dolores, qui non incitant affectu, & eos qui incitant tollit. 471. e.
 Conceptionis signa. 171. g.
 Concessio in quibus expectanda non sit. 605. d.
 Coniux faciales. 865. c.
 Coniux feræ historia. 551. a.
 Consensus partium genitalium, & spiritali vnd 697. g.
 Consideranda in morbis quæ sint. 127. c.
 Consilium optimum in curationibus. 793. b.
 Cõspirabile, & cõfusibile nō est idē quid sit vtriusque 700. d.
 Constantia tempora quæ sint. & quæ inconstantia, & morbi etiam. 91. c. d. e.
 Constitutionum morborum similium differentiæ ex quibus sint causæ. 368. c.
 Constrictionis pulsus vsus. 711. c.
 Constrictæ euacuationis spontanea suppressio aliquando est causa, aliquando signum mortis. 637. a.
 Continentia, cõsentia, & imperum facientia. 731. e.
 Contraria adhibere, & quiescere dux medicæ praxidis partes. 601. d. c.
 Contraria victus ratio in morbis instituend. 771. c.
 Conualescentes nonnulli pluri tempore, quàm egrotauerint, resci debent, & qui sint bi. 505. b.
 Conualescentes inagropete debent sibi cauere ab etratia. ibid.
 Consultio post febrem mala est etiam si sit ex repletione 19. f.
 Consultio apoplectico modo. 83. f.
 Consultiones circa thoracem omnium periculosissimæ. 560. d.
 Consultiones per se, aut per consensum dignotio, & vtriusque curatio. 207. f.
 Consultiones aliquando esse decretorias. 577. b.
 Consultiones quæ sint curandæ pharmacis & quæ senes. 476. b.
 Coquenda oculi oportere, non coquenda, siccat & in tumoribus & in vlcenibus & in febribus explicatur. 605. b. c.
 Coqui apud Hippocratem idem quod solui. 17. f.
 Coriæ biliosæ & neglectæ exemplum. 159. d.
 Cordis palpitatio quid significet. 215. a.
 Coriati viori membrana secundinarum resciit ex partu. 114. f.
 Corpora res omnes externas præter aërem vncat Hippocrates. 750. c.
 Corpore collisio, aut ossibus fractis aut luxatis curandum vi homo ab extenuis sit vacuus, neque omittendum expurgare. 494. c.
 Cotiza 139. d. in ea præuus victus multa pepe. 11. ma. la. ibid. d.
 in Cnryza concedit vinum Hipp.

INDEX

Coryza & grauedinis capitis curatio comoda 403. g.
 Coturnicum esu multos esse correptos conuulsione.
 709. c.
 Coxa sepe dolet ob vteri morbum. 113. f. & 390. d. 664. b.
 Coxa quæ pars dicatur, & eius descriptio, & suarum
 partium nomina. 460. d. e. f.
 Coxæ dolor ante partum & post partum. 115. d.
 Coxæ dolorem ex vteri distortionem fieri, & dum gerit
 vterò cessare exemplum. ibid.
 Coxæ impotentis causæ. 359. d.
 Coxæ doloris ex suppressione menstruorum curatio.
 57. b.
 Coxæ doloris, ischyadis curatio. 460. b. 464. c. & 700. c.
 Coxæ dolor solet inueterascere 577. b.
 Coxæ dolor oculi distortionem, cæcitatem, tumorem testis
 aut mammarum elationem soluitur. 201. f.
 Crassas vrinas non eadem appellari ab Hippocrate, &
 Galeno. 395. g.
 Crascentis & in extenuationem abeuntis corporis
 signa ex cute. 651. e.
 Crassi nimis corporis, & gracilis noxæ. 189. g.
 Crassities quænam indicet cotionem & quæ secus. 448. c.
 Crisfis duabus partibus constat. 202. c.
 Critæ historia. 448. b.
 Crito exanthematis nigris laborauit & secundo die
 mortuus est. 77. b.
 Cruda quid significant. 30. b.
 Cruditas quomodo curanda. 898. a.
 Cruditas non odorosæ remedia multa. 913. a.
 Crura ambo manus ambæ sunt viscerum membra. 69. c.
 Crurum doloris in morti proximis causæ. 82. f.
 Crurum dolor in febris. 63. f. 71 g. 72. b. 78. d. &
 200. b. & 201. f. 244. b. & 305. a. & 312. c.
 Ctesicratis Adriani & pueri Cenci historia. 788. c.
 Ctesiphonis hydroptici ex febre ardente historia. 88. c.
 Cubile in cubiculo rectè collocandi ratio. 756. d.
 Cubile molle, aut durum esse debere pro consuetudi-
 ne ægrotantis. ibid. c.
 ex Cucumere bluefti vitilitas & noxa. 864. b.
 Cucurbitula secundum mammam affixa menstrua co-
 hibet. 221. f.
 Cucurbitula in auris dolore. 228. f.
 Cucurbitula in dolore coxæ. 361. c.
 Cucurbitulatum vsus commendatur ad dolores mul-
 tis causis & exemplo commodatissimo. 228. f. g. 361. c.
 Cucurbitula quomodo admittenda in doloribus
 228. b.
 Cocurbitula in dolore ischyadico valde profuit. 465. b.
 Cuiusdam iuxta inguen percussu, cui culpis sagittæ re-
 ferit interitis historia. 512. f.
 Cumioi vsus & facultas. 799. d.
 Curatio insignis mulieris, à medicamento lesa, &
 vtero laborantis. 107. c.
 Curatio, quæ custodi palestræ contulisset. 775. b.
 Curatio hominis secundum hepar & ventriculum
 vulnera. 506. a. d.
 Curatio oem coartatis fieri. 689. c.
 Curatio filii Cydis, qui laborauit auris inflam-
 matione censura. 796. b.
 Curatorie iudicationes ex quibus capi possunt 149. b.
 Cur magis iuder qui in vmbra se coarctat ex sole. 779. e.
 Cur erudent porcos ex vase angustis antea & an sit
 velle. disputatur 606. f. & seq.
 spides sagittarum, aut plumbæ spherulas sacris ho-
 minibus manere interius, & quam ob causam id

fiat in quibus præcipue partibus. 513. a. & seq.
 Cutis durities inuadit generationem bronchoecles, &
 quorundam tumorum post aures. 634. c.
 Cutis raritas alui densitatem affert. 619. d.
 Cutis compactio affert carminum incrementum. ibid.
 Cutis ab osse decessio in vuloetibus. significat vtari-
 ditas. 816. b.
 Cyceon quid sit, & separari duobus modis. 714. c.
 Cydis filij qui ex auris inflammatione obijt, historia.
 789. b.
 Cynanchen & ophthalmiæ venæ sectio inuadit, sed non
 eodem modo, erit ex eadem parte facienda sit. 212. d.
 Cyteni in Omylo suppurari, historia. 498. b.

D

D Amagoras & Archefilaus ladebantur venere.
 631. c. 648. b.
 Damodis historia. 546. c.
 Dealcis vxoris historia. 323. c.
 Debiles & senes cur remissæ febricitent. 302. c.
 Debiles victus frigidi, robusti calidi. 672. d.
 Debilitas fortis in vtero vnde prouenit. 167. f.
 Debilitatem facultatis in prima & secunda conuulsio-
 ne, quænam ex ea ria incipit. 786. d.
 Decimum tertium & decimum quantum cur non
 nominauerit Hipp. inter decretorios. 131. c.
 Decimus octauus dies non est insignis interdicto-
 rios. 48. b.
 Decretoria signa omnia sunt aliquando signa mor-
 tis & idem distinctione iudicare. 102. g.
 Decretorios euacuationes eisdem asserere mortem &
 salutem. 303. d.
 Decretorii dies, lege dies decretorii.
 Decretorii dies pares & impares quinam sint. 59. f.
 Decretorii dies aliquando habent vim à celo, aliquan-
 do à paroxysmo. ibid. g.
 Decretorium dictum ordine non perspecto, neque
 quando curandum nequiquo modo cibandum
 cognoscere potes. 218. a.
 Dieretorium dierum appellationes. 203. g.
 Decubitus qui quum superueniunt quosdam morbos
 tollunt, ab eisdem præferentem facti siue spoote
 siue arte. 657. g.
 Decubitus quales, quibus, & quomodo moliti debe-
 amus. 618. e.
 Decubitus sit tracto, missio, aut veniente humore, &
 horum ciao. ibid. f.
 Deffluuium capillorum antecessisse. an faciat quarta-
 nam breuiorem. dubitatur. 725. c.
 Deglutire rapidè quorsu sit & quas habeat causas. 81. e.
 Deiectio copiosa & aquosa vrinam mouit. 140. c.
 Deiectio electro similis & eius causæ. 402. c.
 Deiectiones pessime quæ. 23. d.
 Deiectiones vtræ sint deteriores variæque, an vnico-
 lores. 114. c.
 Deiectiones sinceræ duplices. ibid. f.
 Deiectiones cruentæ, aut hæmorrhoides vtiliter ad-
 neniunt multis verno tempore. 351. b.
 Deiectiones pessimæ quæ & quo tempore sint deterio-
 res. 371. f.
 Deiectiones puri similes quales. 406. g.
 In Deiectionibus a quous consideratur contentu. 420. g.
 Delirandi species significant duo. 315. d.
 Delirare plus aliquantum significat quam mente tur-
 batum esse. 260. b.

INDEX

- Delirii & vacillationis dignosco. 806. q.
Delirium à somno mortale esse indicatur. 140. c.
Demarati vxoris historia. 439. b.
Deutes cur ad eò parati dolere. 133. b.
Denti interio sœpius accidunt abfcessus & dolores. 353. c. 354. f.
Dentium stridor consulsionem in dicat. 568. b.
Dentis dolores, superueniente tumore mitefcunt. 513. d.
Dentium lentor & viscositas. 428. c.
Dentium remedia triplicia, in vino velaceto coquen-
da. 333. d. e.
Dentium & auris communio & eius causæ. 355. d.
de Dentium dolore & corrosione multa. 378. g.
Detractionis signum, & quo pacto, cum id adest, sit
mutandus viſus. 624. d.
Dexippus metaciõra deiecit. 115. a.
Dextæ pattes circa natum plurimã vim habet. 122. c.
Diacarbata medicamentum commedatur ad colicum
& nephriticum affectum. 863. e.
Diagnostica medicinz pars tractatur tota compendia-
riè. 410. c.
Diarrhæe curatio. 112. c.
Diarrhæas solent sequi dysenteriz. 18. b.
Diamant seu dissolutio, & vniuersa
tas definiuntur. 436. d.
Diebus decretorijs quæ mala accidunt, deteriora quæ
bona, meliora sunt. 110. e. 837. b.
Diebus paribus conigerunt labores Nicodemo & vir-
gini Lariſæ. 3. 4. c. & 327. a.
Diebus decretorijs cur exacerbatur malum. 121. b.
Diebus decretorijs non esse expurgandum. 613. c.
Dierum indicatio totorũ facultates inuſtur ab alijs. 411. c.
Dici partes quam habeant Analogiam cum paribus
anni. 89. d.
Dierum decretoriorum computatio æquè faciendã est
aprimo & ab eo, qui attulit insignem mutationem in
acutem. 321. d. 323. b.
Dies sextus infansus. 240. b.
Dies, menses, & anni legitimi quales & qui ſint. 118. c.
& seq.
Dies decretorij an numerandi à partu an à febre ſint
in enuſis. 38. e.
Dies primus & ſecundus, cur non decretorij. 60. b.
Dies impares cur præferantur paribus in iudicio. 61. a.
Digni extemi cur calent in ſuppuratis. 439. f.
Dignotionem & curationem contrario modo proce-
dere explicatur. 187. c.
Dignu pueruli, qui habebat fistulam in intestinis histo-
ria. 905. c.
Diopithis ſporis historia. 315. a.
Disparencia sine ſigpo, vt Eryſipelas difficile in dica-
tionem portendunt. 732. d.
Differtio ſubmolliſ hypochondri internam inflama-
tionem viſceris ſignificat. 326. a.
de Diuinatione multa. 757. e.
Diſcretio abortum facere. 480. f.
Durericorum vſus multorum morborum curationes
reçdè ſinit. 571. b.
Diutna febris deterior nocturna & cur. 56. a.
Diurna febris minus venit ad infebricitationem noc-
turnã. ibid. c.
Dolor ceruicis ſuit ſignum decretorium. 254. c.
Dolorem dolore ſedari, rarò tamen probati eam cu-
rationem ſed quæ agitur ſtupefacientibus, & Ano-
dynis, & ſeq. 591.
- Dolorem primum, deinde grauitatem & ſtuporem
bracchiis & humeri, ex ſatietate aliquando aduenire,
& eius affectionis deſcriptio, & cauſæ. 357. d. & ſeq.
Dolorem diuturnum ventris ſuppurationem indicare
349. d.
Dolores ſupernarum partium quos habeant abſceſſus
249. g.
Dolores diuturnos ſiniri ſolere in oſſium corruptio-
nes. 409. g.
Dolores dentium in cacochymis conſemni non debent
& quæ debeant adhiberi pro curatione. 365. b. & c.
Dolores veteres frigidi, recentes calidi. 376. f.
Dolores calidi aut frigidi ob cauſam dicuntur. ibid.
Dolores ſuppuratiõis & erupcionis puris diuerſi.
793. d.
Dolori cruris ex iſchiade quomodo occurrendu 719. f.
Doloris vehementiſſimi ſigna. 120. e.
Doloris capitis ex crapula & alijs cauſis remedia. 333. e.
Doloris lumborum, crurum, & ceteræ curationis exa-
minantur. 523. f.
Doloris alijs curatio. 406. g. & f.
Doloris genium, & crurum in moribundis cauſæ. 832. e.
Doloris humeri ex abſceſſu ſicuti elegans curatio, quæ
ad omnes articulos transferri poſſit. 871. e.
Dolorum varia remedia. 713. a.
Dormientibus cur interna calida externa frigida. 669.
f. & ſeq.
Dromeade vxor mortuæ eſt ex partu filie. 79. d.
Dulces fructus, olera, & lenticula inimici oculis. 323. e.
Duo fratres qui ſimul ægrotarunt. 44. f.
Duri & diſtenti differentie, & cauſæ. 830. e.
Duritiem & molliſciem morbos quosdam eſſe, atque
molliſce & indurare eſſe curationes. 390. c.
Duritiſ membrorum & diſſolutiones in morbis acu-
tis portendunt malum, & cur. 987. e.
Dysenteria curatio diſſicilis. 143. d.
in Dysenteria an conueniat medicamentum purgans
126. e. 406. e. d.
Dysenteria & tenefmus eſſentem accidunt. 23. f.
Dyſſetia ſine dolore, quæ affectio dicatur Hip. 131. b.
Dysenteria aliæ incipiunt à ſiccitate fecum, aliæ à di-
arrhæa. 18. b.
Dysenterie eticiz. 38. f. 43. b.
Dysenteria ex refrigeratione curatio. 143. d. e.
Dysenteria & ruſſis cancroſis curatio. 215. e. & ſeq.
Dysenterie curatio & quando conueniat pharmacum.
406. c.
- Dysenteria maligne ſigna & curatio quædam. 783. f.
in Dysenteria magnu eſt non ſuſſidire cibos & cur. 336. e.

- Echecratis cæci historia. 855. a.
Eclegma optimu pro anhelos deſcribitur. 804. b.
Egfectionis bonæ in peripneumonici conditiones. 815. a.
Egſipolis pueri historia. 846. b.
Eius qui beper percuſſum eſt iſculo, historia. 316. f.
Elodes febres quæ ſint & earum cauſæ tres. 339. e.
Elodes & typhodes febres quænam ſint. 64. d. & 88. c.
Elephantiaſis laborantes cur ſimi ſiant. 573. d.
Emmris historia. 435. d.
Engaſtrimyhi qui dicantur. 518. c.
Eruatis proprio iſculo ratiocini historia. 325. d.
Epiale febris ſigna & cauſæ. 336. d.
Epicharmi historia. 357. c.
Epicharmi ſigna & curatio. 896. e.

INDEX

- Epieratis vxor laborauit febre cum partu filie. 71. d.
 Epidemia constitutio facis pernicioſa deſcribitur 729. e.
 Epidemia quædam constitutio tria mala attingit, anginas, paraplexias, & Niſtalopes. 732. c.
 Epidemiciſtiſ labor partium occasio ſuit. 733. a.
 Epidemij morbi & Endemij, communes & ſparſi, & peſſilentes, & eorū definitiones & cauſæ, in præf.
 Epidemij morbi maximè ſunt qui cum febris. 33. f.
 ex Epidemiciſ morbis qui maximè euadant. 40. h.
 Epidemius morbus qui, 184. g.
 Epidemius morbus an poſſit oriri ex cibis. 185. a.
 Epidemiarum conſtitutionum cauſæ quorūplures, & quæ. 9. e. & 86. d.
 Epidemiarum rempeſtarum fines quales morbos afferant. 400. a.
 Epilepſia exquiliſta & non exquiliſta quæ 488. d.
 Epilepſia per conſenſum ventriculi ibid.
 Epilepſiæ imminentiſ ſigna. 490. f.
 Epilepſiæ per conſenſum ventriculi ſigna, cauſæ, & curatio quædam, 489. b. c.
 Epilepſia non omnes accipiunt mutationem ex ætate ſed quædam, & ex quoto tempore. 574. a.
 Epilepſiæ congenitæ pueriſ cur curationem non admittant. ibid.
 Epilepſiæ in iuuentute in quos morbos ſoleant mutari. 574. h.
 Epilepſiæ ſarò ſoluuntur per ætates perfectæ, ſed mutantur in alios morbos, ibid.
 Epilepſias eſſe eas etiam, per quas non totum corpus conuelliſtur, ſed, pars aliqua. 483. c.
 Epilepticos plerumque ex interualliſ conuelliſ ibid. f.
 Epoto lacte periculofum eſſe dormire hianſte ore in agro, tuſius vino plenum & alijs. 511. e.
 Equi admiſſarijſ reliquatur aliter teſtiſ aliquando 679. a.
 Eratiſnus inflammatione vtriuſque hypocondrii laborauit. 75. c.
 Eratoliſ filij hiſtoria. 784. g.
 Erratica febris Cleonactidiſ. 73. g.
 Erraticæ, quartanæ, ſeptimanæ, & nonanæ conſtitutio conſideranda, & quomodo. 61. e.
 Erratum, licet exiguum, valdè lædit eos qui ad morbos ſunt diſpoſiti. 82. a.
 Error notatur vulgariſ Medicorum in viciu eorum qui recens purgati ſunt. 780. d.
 Eructatio quibus ſit vtiliſ, & quibus auxiliſ prouocetur. 606. e.
 Eruſ, hordel, ſeminis lini, plini, & tritici facultas. 534. c.
 Eruſi facultas & noxia. 185. e.
 Eryſipelas faciei turbiſ tendit ſuſu quā deoruſ. 768. a.
 Eryſipelas ceruicis in faciem ire malum, etſi quiddam rempeſtate bene ceſſerit multiſ ibid.
 Eryſipelas oheritiſ nigriſ puſtuliſ malum, ſi cumturbatione aluiſincipiat, deterius 767. e.
 Eryſipelæſ ſine ſigno diſparens malum, 152. d.
 Eſetæſ qui venti ſint, & quando flare ſoleant 3. d. & 15. f.
 Ethiopes & alij barbari curationem vehementem non ſuſtinent. 504. d.
 Euacuare duobuſ modis conuenit ſenſibiliter & inſenſibiliter. 589. d.
 Euacuationem per vrinam merito ad multoſ morboſ laudari ab Hippocrate. 291. b.
 Euacuationes quæ congruant & quibuſ morbiſ. 96. c.
 Euacuationes an ſiſtendæ, & qui ſint ſcopi. 116. c.
 Euacuationes intempeſtiuæ recidiuſ indicant. 386. f.
 Euacuationes ſpontaneæ ſunt non minùſ quàmquæ arte ſiunt reuulſiones, deriuationes, & euacuationes. 434. f.
 Euacuationes tentatæ exiguæ & crebræ debilitatem indicant 23. c.
 Euacuationes quæ bonæ 29. c.
 Euacuationes conſtante virtute in principio morbiſ honz. 78. g.
 ad Euacuationes omnes rectè petagendas inuenies conſiderationes omnes 607. f. & ſequent.
 Euacuationes in initiſ morhorum accidentes, ſi æ ſpontè ſint arte factæ diuturnoſ efficiunt morboſ. 881. b.
 in Euacuationibuſ quæ conſideranda circa ipſa ex-cunſia, & exeundi modum. 712. c.
 Euacuationum infernarum ſuppreſſio raptum ſignificat in ſuperna. 774. f.
 Euacuationum corpus multuſ ſonũ ſiccit & cur. 707. f.
 Euacuatæ ſanulæ hiſtoria. 900. e.
 Euaneſcentia repentiſ cur periculofa. 398. e.
 Euaneſcentia repentiſ deteriora. 175. f.
 Eudemii dolore vehementiſ leniſ laborantiſ hiſtoria & curatio 907. d.
 Eudemii curatio recta, & tria errata in curatione veterum. ibid.
 Eudemii hiſtoria qui obit ex hamorrhoidibuſ intempeſtiue curatiſ. 485. a.
 Eumeli hiſtoria, qui à conuulſione maxillaruſ, venigine probè accedente ad apoplexiã liberatuſ eſt. 499. a.
 Eumeniſ vxoriſ hiſtoria. 349. e.
 Eunuchi qui ex venatione eſt factuſ adaquator hiſtoria. 911. e.
 Euphranoriſ filij hiſtoria. 558. c.
 Eupolemi in cenadiſ hiſtoria. 460. a.
 Eurianactiſ filia acutè ægrotauit ex eſu racemi. 235. a.
 Euridami in cenadiſ hiſtoria. 458. b.
 Eurychidiſ hiſtoria. 544. a.
 in Exacerbatione quæ conſideranda. 93. c.
 Exactum ſignuſ & æquiuocū quod dicatur, aut quod modis. 901. b.
 Exanthemata quæ dicantur. 26. c. & 603. d.
 Exanthemata breui euaneſcentia quid ſignificent, & poſt & antemorboſ, & quantum debeant durare in vtriſque. 558. d.
 Exanthemata nigra per febreſ acutæſ lethalia. 77. a.
 Exanthemata vt pulicū morfuſ, quæ pariunt ſymptomata dum apparent, & illaruſ differentiæ. 142. d.
 Exanthemata vocantur variolæ & morbilli. 26. f.
 Exanthematibuſ oriendiſ anxietas & lactatio ſentitur, & euacuationeſ conſueſtæ ſuppreſſi ſolent. 67. f.
 ab Exanthematib. timetur Dyſenteria. 391. g.
 Examodi ſamuli hiſtoria, 327. d.
 Excitare & ſtupescere non morbi per ſe, ſed ſymptomatum gratiã ſiunt. 590. a.
 Excrementa morboſ faciunt bifariam, aut abundantiuſ genita, aut minùſ quam expedit vacuata. 570. c.
 Excrementa tenuia duplicia ſunt. 417. e.
 Excrementa ſempat eodem modo perſeuerantia longitudinem morbiſ indicant. 140. a.
 Excreſcentiſ multiſ redundantibuſ ſepe vno malo concocto, aliud deterius ſuperuenit. 151. a.
 Exercitiuſ cacochymiaſ per plethoricuſ periculofum eſt, & quæ mala inde naſcantur. 117. e. & 708. e.
 Exercitatio poſt abuſuſ hydropiciſ eſt contraria. 535. f.
 Exercitationiſ & laboriſ differentia. 259. d.
 Exercitationeſ detractoriæ ſigna, ſudor guttarum fluens

INDEX.

fluens aut coincidentia carnis ex elevatione. 617. a.
 Expiratio, vox, & sermo quomodo ad sese habeant. 302. b.
 Expurgandi temp⁹ quas habeat considerationes. 791. d.
 Expurgatio die sexta non debet esse frequens in praxi medica. ibid. c.
 Expurgationem & missionem sanguinis, agi debere secundum rectitudinem, & quæ sit rectitudinis lex in utraque. 713. b.
 Expurgationes cum mutatione excrementorum fieri vtile est. 114. b.
 Expurgationes imperfectas, hypocondriorum tumores facere. 398. d.
 Expurgationes reuulsoriarum principio faciendæ sūt. 160. b.
 Expurgationis duplex occasio. ibid. c.
 Extenuare, & crassa facere quæ & quando expedit. 589. c.
 Extenuatio exercitatione nimia & tenui victu perficitur. 624. c.
 Extenuationis quæ causæ sint per se, & quæ per accidens. 623. c.
 Extenuatis & siccatis & vicinis morti quæ signa accidunt. 737. f.
 Extenuatorum victus. 625. d. & seq.
 Externæ causæ quomodo indicent curationem exemplo explicatur. 187. f.
 Externarum partium affectiones aliquando interitum afferunt. 403. d.

F

Fabæ in fluore alui conveniunt. 217. f.
 Faciei extenuatio signum decretorium. 202. c.
 Facies quomodo indicet in acutis & explicatur prognosticum. 609. d.
 Faecum lacerte formam referentis significatio. 443. b.
 Faecum duritiam esse nonnumquam dysenteriae causam. 878. b.
 Famem secundum non esse febri inimicam indicatur. 653. c.
 Famis canine causæ. 518. c.
 Famulæ in Omilo capite vulnerate historia. 497. b.
 Famulæ Onesiderii historia. 483. c.
 Famulæ ex vicinis textoris historia. 339. d.
 Famulæ post Heroum habitantis historia. 368. d.
 Famulæ Dyfirdis historia. 495. e.
 Farinaceum sedimentum duplex. 68. b.
 Farris faciendi ratio & usus. 408. b.
 Fastidium & oris amaritudo, & siccis, intestinæ mali succi notæ sunt. 295. c.
 Fastidium maximum facultatis magnum lapsum significat. 290. f. & 299. a.
 Fastidium in longis dysenterijs malum esse magis quàm si febricitent. 745. c.
 Fatuinas ex hydropse. 568. f.
 Fatuinitas causæ. 433. c.
 ad Fauces succorum impetus. 130. c.
 Fancium dolor, & columellæ reuulsio. 236. f.
 Febris ardentis duplex generis. 19. a. & 281. a.
 Febris ardentis ex bile vel salsa pituita signa. 139. c.
 Febris ardentis ex multiplici materia exempli. 819. f.
 Febris ardentis signa pathognomonica. 19. c.
 Febres ardentes ex bile & pituita simul mixtis. 35. e.
 Febres ardentes Autumno & hyeme. 36. g.
 Febres ardentes per æstatem populariter grassabatur. 138. g.
 Febris ardentis signa prava. 40. c.

Febres ardentes per hyemem multæ & lethales. 47. e.
 Febris ardentis quo tempore potissimum fiunt. 88. f.
 Febris ardens quas amat eustachiones. 819. c.
 in Febre ardente fluxus sanguinis è narib⁹ signa. 32. c.
 in Febribus ardentibus fluxus sanguinis è naribus largus optimus superuenire. 36. b.
 Febris ardens quod genus febrium, & ei solet fluxus sanguinis è naribus. 5. b.
 in Febre quam facies rectè valet, & hypocondria non sunt mollis, diuturnus morbus significatur, qui sine abscessu non soluitur, nisi fluxus sanguinis adueniat. 215. f.
 Febris ardens quibus temporibus accidit, & quomodo differat æstivales & autumnales. 88. g. & seq.
 Febris omnes cum bono male, & quæ earum deterrime. 152. e.
 Febris laboriosa quæ producitur quid faciendū. 112. a.
 Febris, nisi in die legitimo solvatur, redit. 203. f.
 Febrim continuarum partitio & differentia. 57. a.
 Febris diurna longior nocturna. 55. g.
 Febris qui fieri solent majores per noctem. 56. b.
 Febres quæ longæ, quæ breves, quæ lethales, quæ non. ibid. c.
 Febris sextanz, septimanæ, & nonanz affligunt, vt vitia naturalia. ibid. f.
 Febris quomodo potest citra iudicij decrescere. 57. e.
 Febris quæ mouetur per dies pares, exempla. 61. b.
 185. b. 300. b. 314. g. & 315. c.
 ex Febribus longis, quæ solent relinqui in corpore. 158. a.
 Febrim prouocare suadet Hippocrates in convulsionibus. 194. g.
 Febris quibus morbis utilis. 628. a.
 Febrim incipere duobus modis dicitur. 887. e.
 Febris soluitur aliquando ante morbi indicationem. 254. c.
 Febrim cum abscessu invadere periculosum. 305. c.
 Febrim pulsus & eorum differentia & comparandi modi. 357. f.
 Febricitantes ab exusta bile non esse arcendos ab aqua. 482. c.
 Febres ex catarrho tussiculoso durabant dies quinque, tussis ipsæ quadraginta & cur. 543. d. & 566. a.
 Febris acuta cum melancholia. 546. b.
 Febris deiria ex ebrietate & satietate, omnium maxime imitatur putridam. 554. f.
 Febrim missione sanguinis auertere oportet. 558. f.
 Febres ex catarrho quales sint. 566. a. 854. c. 856. a.
 Febrim partitiones Hippocraticæ & earum enumerationis. 53. c. 292. a. & 585. b.
 Febris cibis inimicus, & quæ noxæ ex illo nascuntur. 653. c.
 Febris ardentis generatio ex venis. 711. a.
 Febris laboriosa quænam sint. 742. f.
 Febris malignæ cum debilitate & convulsione & capiti in caput, signorum syndrome. 878. a.
 Febrim malignam cum exanthematis non esse vniuersi modi, sed differentiam habere ex humore, & ita variare etiam curationem. ibid. c.
 Febris intermittentes quibus periodis solent transire in continuas. 882. c.
 Febrim malignam, cum tuberculis descriptio. 189. c.
 Febris maligna, lege malignæ febri.
 Febrim talium exempla multa, & curatio idonea. 893. a.

INDEX.

- Femellæ minus abertu deſciantur quàm masculi, & cur. 797. c.
- Femellæ enixæ à parib⁹ morbis magis liberari, quàm enixæ masculis. ibid. c.
- Ferinium quid ſit. 89. b. 350. c. 581. a. & 595. c.
- Fibrarum in collo diſtentio quum quis animo linquitur, quas cauſas habeat. 779. f.
- Ficus quis ſit morbus. 289. b.
- Figure ſubleuantes. 637. d.
- Figuram corporis conferre ad cognitionem naturæ. 773. a.
- Filiæ Aedilis hiftoria. 370. f.
- Filij Harpali ex Telephanē liberta hiftoria. 541. c.
- Filij Theodori hiftoria. 815. f.
- Filij Amphiphradi hiftoria, qui laborauit pleuritide bilioſa ſiniſtri lateris. 811. c.
- Filij Potamonis hiftoria. 378. c.
- Filij Phariæ & Euergetæ hiftoria. 561. f.
- Filij-Platæ cui ſutura capitis morienti vehementer eſt excuata, hiftoria inſignis. 850. d.
- Filius Thini ex ſuperſtitiæ fame & iudicatione quomodo recuperatus ſit. 896. c.
- Finis legitimus morborum acutorum. 250. d.
298. c. & 309. c.
- Fiftula in vmbilico per quam exibant lumbrici & æces quomodo heri poſſit viuente diu homine. 905. d.
- Fiftulæ ex inteſtino ab atra bile factæ exemplum. 839. c.
- Flatu replente inteſtina verſari corpus conſuetum eſt. 160. f.
- Flatus cum ſonitu erumpentis Prognofiticum. 52. g.
- Flatus infernè excretus aliquando ſoluit dolorèm colicum. 686. a.
- Flatus an omnium morborum cauſa ſit, diſputatur. 866. c.
- Flatus euacuatio ex partibus diuerſis. 685. a.
- Flatuum differentiæ & earum cauſæ. 407. c.
- Flatuoſi læduntur à venere & ſunt libidinoſi. 632. b.
- Flatuum excretio eſt diuerſis partibus, quibus prodèſſe ſolet. 686. a.
- Fletu, ſpitione, & miſtu, & ſudore eandem materiam euacuari, etià non ex eadem parte. 685. c.
- Fletus deonere caput & cor. ibid.
- Fletus & ſudor ſimiles ſunt & ab eiſdē cauſis. 686. d.
- Fletus cur fiat quum laxari incipit cor magis, quàm quum eſt vehementer contractum. 687. c.
- Fluentem ſanguinem liſti, promptiſſima cauſa aliquis abiceſſuſeſt. 596. f.
- Fluxiones oculorū optimè per nares ſanantur. 571. b.
- Fluxiones oculorum curatio. 606. a.
- Fluxum ſanguinis ſiſtentia remedia. 736. b.
- Fluxus ſanguinis quarto die difficilem iudicationem ſignificat. 159. a.
- Fluxus ſanguinis ardenti febri familiares, & pro eis parocides. 140. f. & ſeq.
- Fluxus ſanguinis cauſæ & curatio. 157. c. & ſeq.
- Fluxus ſanguinis aſuſione frigide curatur. 510. b.
- Fluxus ſanguinis nulla ratione ſiſtitur tutius, quum miſſione ſanguinis reuulſoria. 597. b.
- Fluxus ſanguinis ex naribus præſentia ex colore vultus pallido viſcente, & cur. 643. c.
- Fluxus ſanguinis ex naribus curatio, & victus, ſiue aſſumatur, ſiue lentè. 644. d. & ſeq.
- Fluxus ſanguinis in quibus ætatibus ſit expectandus. 647. c.
- Fluxus ſanguinis in vlceribus curatio. 692. f.
- Fluxus ſanguinis profuſiſſimi per ventrem curatio. 866. d.
- Fluxus ſanguinis ſecuriſſimum remedium euacuatio reuulſoria. 736. d.
- in Fluxu ſanguinis ſæpè errant Medici & quibus notis vtendum. 102. d.
- ex Fluxu ſanguinis profluuium ventris fieri exemplo iudicatur. 372. b.
- Fluxus ventris iudicat rectè morbos aurium. 152. a.
- Fluxus alui pro muliebri ſæpè accidit enixis. 368. b.
- Fluxus alui in ſupparatis peſſimus. 848. f.
- Fluxiones omnes aut ob multitudinem, aut ob acrimoniam concitantur. 197. f.
- & quomodo curandæ. 198. a.
- Fluxionibus obnoxij malignis arceudi ſunt ab igne, aut longa mora in balneo, aut Sole. 842. d.
- Fætum intra vterum grauiſus morbis laborare per dies quadraginta. 799. b.
- Fætus quot poſſint edi ſuiſſi. 322. a.
- Fætus in vtero tres mutationes inſignes. 366. b.
- Fætuum multorum vno partu editorum cauſæ. 322. a.
- Fracto digito quid faciendum fuiſſet. 541. a.
- Frater vtrius Ariſteli itinere deſatigatus grauen morbum contraxit. 117. d.
- Fratrum Ceroſis hiftoria. 371. c.
- Frictio leuiſ & aſpera definitur. 871. a.
- Frictionis & balnei comparatio. 519. d.
- Frigidæ potus in febribus vtilitates multæ & magnæ. 449. d.
- Frigidæ in potu dandæ opportunitas. 450. a.
- Frigidæ potus in febribus vt auxilium optimam, ita etià periculofum, & in occaſione poſitum ibid.
- Frigidæ copioſum potum quæ poſſint ſupplere. ibid. c.
- Frigidior frigido tempore & regione calidior erit explicatur multifariam. 711. c.
- Frigidiſſimi cibi, lentes miſſum, cucurbitæ, explicatur. 708. c.
- Frigidorum & calidorum temperamento notæ. 42. f. & ſeq.
- Frigidos pedes non continere ſub ſtragulis peſſimum & cur. 830. d.
- Frigidum venas frangere, & alia facere malè. 634. c.
- Frigoris ſignificatio. 52. c.
- Frigus repente ingruens, & calido tempore ſuperueniens morbos aſſert calidiſſimos. 337. b.
- Frigus circa extrema quid indicet. 52. c.
- Frons cutis modum moriendi præmonſtrat. 720. f.
- Fulgoris obuerſantis ante oculos cauſæ. 547. f.
- Fullonis cui lingua intumeſcebant, hiftoria. 524. b.
- Fullonis hiftoria. 400. c.
- Fullonis qui in Syro ob vſum Tapis factus eſt phreneticus, hiftoria. 874. d.
- Fungorum quoddam genus venenofum. 891. f.
- Fungorum noxæ, & correctio, & curatio. ibid.
- Furoris ſignum ex oculis. 587. c.

GAlbanum cum aceto & melle ſeruaſtum ad ſurditatem vtile. 532. a.

Galenī de libro ſexto cenſura. 569. f.

Galenī fragmentum in ſextura Epid. retens edictum,

INDEX.

legitimum non esse.	724. b.	Hæmorrhoidum curatio fecit Alcippum infanire & cur.	448. c.
Galenus notatur, quod falsò citaverit.	7. a.	Hæmorrhoidum prognosticum.	53. b.
Galenus quam sententiam de anima habuerit.	688. b.	Halicarnasensis historia, qui auris & capitis dolore laborabat.	901. f.
Gallici morbi populariter grassantis forma.	330. c.	Harpalide fororis historia.	796. f.
Gallici morbi quæ sit propria differentia.	447. d.	Hecatonis in Omilo duplex historia.	500. a.
Gallicum morbum novum non esse.	330. c.	Hegestrati historia.	378. g.
& 665. f.		Hegetoridis filius quæ passus sit.	851. d.
Gallicus morbus potest sanari, venere, muliere infecta.	447. f.	Hemicranie ex bile vitæ iam abeunte in acram, signa, & curatio.	547. c.
Gallicus morbus fieri potest ex nimia venere, etiam sine contagione.	314. c. & 447. c.	Hemitricum, lege, semitertiana.	
Gangrena quam curationem potest.	605. f.	Hemitrici cum cardialgia curatio.	888. d.
Gangrana edispuer passionem sunt indolentes.	851. d.	Hepar magno cum periculo vulnerari.	527. a.
Gangrenati vlcis descriptio & causæ.	898. b.	Hepar calidum nunquàm efflicere ventrem frigidum.	677. e.
Gaudij effectus.	690. b.	Hepate affecto, cur proci venæ sectio inter digitos.	316. d.
Gemellas quæ peperit, ex difficultate partus hydro-		Hepatici qui dicantur & quomodo cognoscuntur.	107. f. & seq.
pem & vteri vlcera contraxit, & utriusque mali signa.	127. f.	Hepatis inflammatio.	131. d.
Gemellas enixæ malè expurgari grauius est quàm vni-	322. b.	Hepatis apicis complicati curatio & cognitio.	773. d.
cum.	ibid. a.	Hepatis corruptione mortuus Cleocimus, & quomodo fuisset curandus.	853. a.
Gemelli qui dicantur propriè.	97. b.	Hepatis & lienis cur sit aliquid ad dolores fortes.	907. e.
Genitalium & vocalium communio.	97. b.	Hercules intusit die octaua.	123. c.
Genium dolor mortis proximis accidit.	852. c.	Hermocrates febre ardente ex hepatis inflammatione, deinde phrenitide laborauit.	237. c.
Genium tumores caute aperienti.	741. d.	Hermophili filij historia.	506. c.
Gerentes vtero cur malis replentur succis.	556. c.	Hermoptolemi historia.	815. b.
Gerentibus vtero humeros cum mæmīs intumescere ex multo cibo & potu fit, & malum est capiti.	572. f.	Hermoptolemi vxoris historia.	806. f.
Gerentibus vtero tumor pedum frequens est, cum hoc anhelatio magna non adeo frequens, v-		Hernia laborans ex ruptura, tussi leduntur.	905. f.
trunque verò minus periculosum quàm in alijs.	797. b.	de Hernijs multa.	106. f. & seq.
Gerentis vtero, & febricitantis curatio & victus.	214. d.	Herophori febre acuta laborauit & iudicatus est decimo septimo cum recidua.	68. d.
Gerentium vtero morbi acuti cur lethales?	362. c.	Herophytus ardente febre, longissima phrenitide, & coxæ dolore, & diarrhæa, & dysenteria vique ad diem centesimum laborauit.	312. c.
Germinationes in febrim initijs malignitatem indicant.	411. g.	Hiare cum lentore circa dentes malum.	428. c.
Gibbositas ex phrenitide curatio.	518. f. & seq.	Hieron decima quinta indicatus.	131. b.
Gibbositatum cause.	ibid.	Hippie fororis historia.	851. c.
Glaucus & charopis idem.	191. c.	Hippocomi Palamedis historia.	476. f.
Gongrona quæ vocatur Bronchoecle.	634. d.	Hippocritensis in Larissa historia.	473. c.
Gonorrhæam augeat usus leguminiū.	632. b.	Hippocratem pulso febre explorasse ut neoterici, indicaretur.	216. b.
Gonorrhææ causæ, & cur afferat tabescentiam.	773. f.	Hippocrates vrinæ etiam iumentorum obseruabat.	347. c.
Gorgie vxoris in Larissa historia.	469. c.	Hippocrates in quibus consuebat cum veterimis, & in quib⁹ discrepat ab eis quoad victus.	782. c.
Grauedines & raucedines solutæ cum febre, minus habent recidiam quàm aliter solutæ.	628. a.	Hippocratis in deiectionibus considerandis mira diligentia.	159. g.
Grauedines per propriam passionem capitis melius curantur febre quam quæ per totius corporis compassionem.	ibid. c.	Hippocratis diligentia circa ægrotos cõmendatur. ibid.	

H

Hæmorrhagie prognosticum.	53. a.	Historia cusuadam, qui cum non fuisset missus sanguis post casum perijt.	362. a.
Hæmorrhagie remedia.	165. b.	Homini totius optima procuratio.	691. f.
Hæmorrhoidas nunc fundere atrum, nunc bonum sanguinem, & quibus causis vtrumque, & à quibus præferunt malis vtræque.	762. a.	Homo Euborus nimis purgatione mortuus est.	504. e.
Hæmorrhoides quàm caute curari debeant.	656. b.	Hora mortis ea est quæ inaccessionib⁹ grauiissima.	64. c.
Hæmorrhoides à quibus morbis liberent.	655. d.	Horarij fructus qui sint & quales.	498. f.
Hæmorrhoides fistulas nisi solent facere.	487. b.	Horarij fructus refrigerari debet admota niue.	499. d.
Hæmorrhoides pro fluxu menstruo.	370. g.	Hordeolum in palpebra.	116. c.
Hæmorrhoidum intempestiua curatio, quæ afferat pericula, & quibus causis.	656. c.	Horror à spina & dorso incipiens debilitatis signum.	847. a.
Hæmorrhoidum duplex curatio chirurgica.	485. c.	Horror maior debilitatè signat quàm rigor.	852. d.
Hæmorrhoidum differentie omnes.	487. a.	Humida & sicca pharmaca quænam vocentur ab Hippocrate.	494. c.

INDEX.

Humiditas quæ per excreta significatur quomodo curatur. 169. f.
 Humores multum præstant ad mores. 188. g.
 Humoribus motus in quâ partem fiat, indicatur. 97. b.
 Hydropes diuersi ob causas & partes & complicationes, & diuersa remedia, & exempla omnium. 789. a.
 Hydropsi superueniens tussis mala. 200. d. 203. b.
 Hydropsici, charopi, & calui. 190. g. 390. c.
 Hydropsici sæpe inereunt citibus ob euacuationem. 394. g.
 Hydropsici in Olintho historia. 568. f.
 Hydropsici an sectione curari debeant disputatur. 7. 9. e.
 Hydropsici tabidi. 179. d.
 Hydropsicis fulgor cutis & nuditas pudendi. 392. g.
 Hydropsicis alui fluxus utilis esse consuevit. 395. c.
 Hydropsicum oportet defatigari, &c. 535. d.
 Hydropsicorum sectio comparatur sectio generis, & quo pacto debeat verumque administrari. 741. b.
 Hydropsis in interitum euntis signa. 813. f.
 Hydrops ex quibus partibus fieri potest. 108. d. & seq.
 Hydrops generari potest ex omni immoderata euacuatione. 115. c.
 Hydrops alijs morbis succedens quibus ex causis fiat. 26. d.
 Hydrops vix habet vllum exitum salutarem, neque euacuationem, nisi fortè aquosum alui profluvium. 818. b.
 Hydropum omnium differentie, causæ, essentia, & A 535. d.
 Hyeme sicca, & quilonari, vere pluuiofo, & Australi, ætate sicca & calida, qui succedant morbi. 755. f.
 Hyeme Australi & pluuiofo, ver. sicco & Aquilonari ætate sicca & calida, qui generentur morbi. ibid.
 Hyeme & vere Australibus & pluuiofis & Aestate qualis esse solet, qui morbi generentur. 756. a.
 Hyeme succedente Autumno pluuiofo, & Australi post ætatem siccam, & Aquilonarem, qui ibid.
 Hyemis morbi. 11. b.
 Hyemis partitio. 15. c.
 Hyems quando incipit. 3. b.
 Hylæ famulæ historia. 397. e.
 Hymenæ sororis historia. 385. f.
 Hypericis rosis gingiuarum quid sit, & eius causæ. 565. a.
 Hypochondria semper consideranda in morbis acutis, & quid significent. 141. d. 238. d. 421. e. & 662. c.
 Hypochondriaci an noxia sit vel salutaris venus disputatur. 632. d.
 Hypochondrii inflammatio maximè impedimentum expurgationis. 290. c.
 Hypochondrii contentio, vel tumor, vel dolor. 64. g. 65. d. 68. c. 69. f. 79. d. 97. d. 107. f. 159. c. 217. c. 243. g.
 Hypochondrii tumore exacerbato, euacuationes conuulsas supprimi malum. 457. c.
 Hypochondrii distentionis notæ & curatio. 231. d. & seq.
 Hypochondriorum iumentum differentie, causæ, & prognostica. 129. b.
 Hypochondrium melius spirans quod dicatur. 830. f.
 Hystericæ passionis curatio. 156. c.

I

Iactationes acutæ quæ vocantur ab Hippocrate. 810. d.
 Iaculi extractio quibuslibet mortē accelera. 517. b.
 Iaculo in posteriorem partem percussus historia. 513. f.
 Icteri sexto die salubriter facti multis. 36. f.

Icteri duplicis, & hydropis differentie, & causæ, & notæ scorum cuiusque & complicatorum. 109. a.
 Icteri & hydropis simul incidentium causæ. 319. c.
 Icteri differentie, & causæ, & curationes secundum causas, & propria. 868. a. & seq.
 Ictericis prodelt fluxus vrinæ & alui. 36. f.
 Ictericis, lege morbus Regius, Ictericis ante septimam quàm sit periculosa. 337. d.
 Ictericis citrina & nigra possunt complicari. 103. c.
 Ictericum ex morbo manentem solere tota vita durare, indicatur duobus exemplis. 610. d. & seq.
 Ictus, & casus fortes non esse contemnendos exemplo admonemur. 474. f.
 Ieiunandum victus qualis esse debeat. 651. c.
 Ieiunium fluxiones sistit. 198. b.
 Illi ad quæ Cynic^{us} Hippocrate deduxit, historia. 438. a.
 Imaginationes falsas vocib^{us} & nubib^{us} innoxescere. 50. e.
 Impetus succorum in partem quampiam inditia. 96. e.
 Impuro corpore & in initio febris putridæ cauendum est à balneo. 897. e.
 Incrementi & decrementi morborum certa notitia. 93. c.
 Incrementes morbos coitus exasperat multifariam explicatur. 702. c.
 Incrementes morbi qui dicantur. ibid. d.
 Incubi & Catoci differentie. 489. a.
 Indicationem causæ audacius sequi solent præstantes Medici quàm vulgares. 841. c.
 Indicationes iudicationum in antecedentibus quaternarijs sunt. 443. d.
 Indices dies qui dies sint, & quorum. 71. c.
 Inditia quæ in diebus iudicatorijs non sunt, esse inhæda, aut perniciofo, ubi et Hippoc. diuersa loca explicatur & componuntur. 60. d.
 Inflammationi ventris temeraria curatio expurgando primum deinde subigendo. 452. f.
 Inflammationi ventris idonea curatio. 454. b.
 Inflammationis capitis signa. 516. f.
 Inflammationis morbus multiplex, & habet tempora varia. 311. f.
 Inflammatio cerebri non omnis est phrenitis & quomodo differunt. 517. c.
 Inflammationem cerebri facientes succi nunc vergunt in corpus, nunc in animum. ibid. f.
 Inflammationes & suppurationes circa nares & gingivas minus periculose & fallaces sunt quàm auris. 726. e.
 Inflammationis maximæ in hepate notæ. 374. c.
 Inflammationis scirrhoræ descriptio & curatio. 534. b.
 Inflammationis lienis ex itinere cōtractæ historia. 715. a.
 Inflammationis internæ hypochondrii signa. 82. b.
 Inflari à venere grauius esse, quàm in coitu flatum emittere. 633. c.
 Initium, finem, & tempus præsens morbi noscere magni esse momenti, ratione & exemplis indicatur. 110. f. 770. d.
 Inquietudinis, horrorem, & oscitationum curatio per vinum. 227. c.
 Infans ex retentis hemorrhoidibus. 448. c.
 Infomniorum multorum & turbacorum in scribis prognosticum. ibid. b.
 Infomniorum significationes & differentie. 50. f.
 Infomniorum consideratio quantum referat ad prædictionem. 756. c.
 Inspirationem auget pulmonis aridū incendia. 707. c.
 Instrumenta respirationis cur difficilè sanescant vicerata. 773. c.
 Intemperantes in victu quomodo sint ciband per mor. ibid. b.

INDEX.

Interius relicta recidivas facere.	111. f. 386. c.	Lachrymæ cur in multo risu apparere soleant. <i>ibid.</i> d.
Internæ & externæ affectionis pblegmonosæ in capite exempla & signa.	525. c.	Lachrymæ cur apparent in tristitia & perturbatione. <i>ibid.</i> f.
Intestina crassiora hominum caninis esse similia. 666. c.		cur Lachrymarum tantum homo. 687. c.
Intestinorum vici in quo differat à dysenteria. 405. g.		Lac quo prægnationis mense fiat, disputatur. 123. d.
Intritus ex alio hydropicis vtile.	231. e.	Lac aqua millium per paucos morbis congruit, & qui possit esse eius visus. 523. b.
Inuisione aut sectione curabat Hippoc. suppuratos, & cur hæc hodie paucos liberent.	458. c.	Lac nonnumquam sit venenosum ob pastu capræ. 709. b.
Inuisiones quando fieri debeant suppuratis. <i>ibid.</i>		Lac octavo mense apparere incipit. 174. e.
Ira, timore, & letitia quibus morbis curandis viamur.	185. f.	Lac nocet in dolore lili. 407. f.
Ira cur sanguine & spiritibus caput replet. 689. f.		Lac, allia, vinum, acetum, & sal antidota sunt venenorum, & cuius quodcumque. 714. c.
Ira nonnumquam vilis est ad curationes, & quomodo differat ab alijs motibus animi. 690. b.		Lac quomodo paratur ad dysenteria & fluxiones. 128. c.
Iracundi & animosi quomodo differant. 678. c.		Lac & menstrua non esse ex eodem sanguine. 124. a.
Iracundi, cur ex qualibet leui causa molestia sumunt. 43. a.		Lac redundans debilem fecum, solidæ mamme fa- num indicent. 223. a.
Iracundos esse frigidos. <i>ibid.</i>		Lac cur fiat in vltimis mensibus prægnationis. 74. e.
Ira prouocatio quibus conueniat morbis. 186. d.		Lac quando fieri incipit in vtero gerentibus. 223. d.
In Ira quæ partes calefcunt, & replentur sanguine feruente. 689. f.		Lactans cum papulis per totam corpus. 113. g.
Ira effectus. 690. a.		Lactantes repleri malis succis, & cur. 124. d.
Ilgore filius ab osse confuso & denigrato liberatus est nullo abscedente. 828. a.		Lactantes cur flant caeochymæ. 340. c.
Istius herba, & istatodes bilis definitur. 420. f.		Lactis alini & feri in magna quantitate visus com- mendatur, & traditur vtendi modus. 787. b.
Isthyadici interna auricule pass vritur & cur. 700. b.		Lactis bubuli natura & facultas. <i>ibid.</i> d.
Isthyadicorum cur nonnullis fiat dolor vsque ad pe- des, alijs vero stupor. 719. c.		Lactis generatio & causæ. 174. b.
Isthyadici doloris constitutio. 460. a. 464. c.		Lactis noxæ in obstructionibus. 319. g.
Iter & potus multus incoctiones facere. 296. c.		Lactis magnus, multiplexq; visus antiquis. 407. f.
Iudicium decimo quinto die. 60. c.		Lactucam crudam & illotam meliorem esse stomacho quàm coctam. 881. a.
Iudicatio non in die decretorio aut lethalis, aut cum recidiva. 60. d.		Lactitia curat morbos melancholicos. 186. e.
Iudicatio cū ruditate recidiva aut Acrisidæ arguit 93. b.		Læuitas extremæ itatis cur faciat fulgorem. 398. a.
Iudicatio in quarta die. 306. c. & 850. f. & seq.		Lapides quibus in partibus lingni possunt. 492. a.
Iudicationem siue bouam, siue malam, & eius spe- ciem in diebus in die indice. 375. b. c.		Lapidis in vtero signa. <i>ibid.</i> c.
Iudicationis infide signa. 352. c.		Lapidum & tumorum lingue, & topiorum gene- ratio. 162. f.
Iudicationis futuræ conjectura. 146. g.		Lapis ex vtero excretus. 491. f.
Iudicationum initia sæpe asserit terribilia sympto- mata. 810. f.		Lapis cur semibus generetur in renibus, pueris in ve- lica, disquiritur, & redduntur omnium causæ. 635. d.
Iudicationum species quatuor, Iudicatoria ne statim appareant. 92. b.		Lapis renum quam ob causam faciat vrinx suppres- sionem, cum renes sint duo, & is alterum tantum occupet. 859. c.
Iudicatoria non iudicantia quæ sint. <i>ibid.</i>		Lassitudo quæ sit mediocri & vtilis. 650. f.
Iururando Hippocrates prohibebat discipulis abor- tium medicamentum dare. 520. d.		Latus dextrum esse calidius sinistro indicatur. 618. c.
Iuuenes morbosos per similitudinem fieri sanos, & è contrâ, & quibus causis. 689. b.		Laxandum & stringendum in quibus morbis, & ob quas indicationes & quibus auxilijs. 588. c.
Iuxta genu quinquam sunt nerui. 512. d.		Leambi historia. 405. d.
		Legitimi dies, menses, & anni qui sint. 218. c.
		Legumina non conueniunt in gonorrhæa. 631. b.
		Leguminum vitia & ex eorum esu in Aeno pestilens constitutio. 184. c. & 429. g.
L		Lenticula exulsi canceris vtilis. 899. c.
Abia sæpe patiuntur ob hypochondria. 401. c.		Leonidæ filie historia. 515. c.
Labor quidam extenuat, quidam reficit, & ho- rum distinctio. 690. c.		Leophoridæ historia. 819. d.
Labor articularis & carnis, &c. <i>ibid.</i>		Lepræ curatio per balnea calida. 467. b.
Laborantibus quibus in rebus, & quatenus gratifi- candum, & quibus causis, explicatur. 606. f.		Lepræ & vitiliginis remedium. 209. g.
Labores, otia, somnos, & vigilias moderari oportet. 756. c.		Lethalia quæ modum excedunt. 95. c.
Laboriosos fibres quas vocat Hippocrates. 600. d.		Lethalia signa in vulneribus capitis. 826. b.
Lachrymæ ieiuniorum fluxum, sanguinis narium significat, aut mortem. 44. b.		Lethaliū signorum ex facie enumeratio & causæ. 84. c.
Lachrymare voluntariè bonum signum esse in acutis. 427. g. & 584. b.		Leucoplegmatia an hydropis species. 108. c.
Lachrymarum differentie omnes, & earum causæ, & significationes. 754. c.		Leucoplegmatia ex minore refrigeratione procedit, quàm asities & tympanices. 401. c.
Lachrymæ deconant eant, & laxant cor. 686. d.		Leucoplegmatie essentia, signa, causæ, prognosti- cum & curatio. 389. d. 392. g.
Lachrymarum generatio vnde. <i>ibid.</i> b.		Liber quintus plus habet practicæ quàm alij huius operis. 412. in præm.
		Libri quinti censura. <i>ibid.</i>
		Licini Grammatici historia. 401.

INDEX.

- Licini historia. 891. a.
 Liconis in Oeniadis historia. 464. c.
 Lien eleuatus fluxum sanguinis à naribus indicat, si
 extensus est ad dextra, per inferiorem partem. 367. c.
 Lien minores dolores habet quam hepatis, & renes,
 maiores quam pulmo. 319. d.
 Lien nulli euacuationi magis cedit. quam alui sub-
 ductioni. 903. c.
 Lien an possit expurgari per vias vrinae. 132. b.
 Lienem declinè pedes & manus; & genua calida fa-
 cere, nares & aures frigidas & cur. 614. c.
 Lienis inflammatio 129. b. lege splen.
 Lienis inflammatio fluxu vrinae sanata. 132. b.
 Lien declinè qui dicitur. 615. c.
 Lienis differentias plurimum conferre ad curationem,
 indicatur. ibid. c.
 Lienis inflammati signa. 398. f.
 Lienis morbi quibus; & quæ causæ curari possint
 fluxu vrinae. 132. c.
 Lienis tumor non vitiat faciei colore non est valde
 periculosus, velut si vitiatus sit, & quæ ob cau-
 sam eueniat vtrumque & quid agendum. 903. a.
 Ligatura qualis fieri debeat, dum secatur vena. 165. d.
 Lingua peripneumonicorum qualis esse debeat. 796. a.
 Lingua vt lotium significat humores noxios. 693. d.
 Lingua nigra duplici ex causa fit & quomodo distin-
 guatur. 694. b.
 Lingua cur sæpe sola impedita sit. 557. b.
 Linguae colores significare humores in corpore stabi-
 lantes. 693. d. & 750. c.
 Linguae sapor cacochymiam indicat vt color. 693. d.
 Linguae tumores per congestionem generantur. 163. a.
 Lithiasis renis causa, signa, & curatio. 574. f. & seq.
 Liuior manuum quantum fieri debeat ad prænotandam
 instantem mortem. 568. b.
 Localis curatio tribus perficitur igne, ferro, medica-
 mento. 713. c.
 Longituli plures dentes habent. 211. b.
 Lumbos dolenti duo mali abscessus generantur, vl-
 cera & vocata, & recursus in latus, alij sunt
 boni, & qui sunt illi. 746. b.
 Lumbrici vbi generantur. 340. d. 350. b.
 Lumbrici vesperi surgant. vr. & morbi omnes Au-
 tumnales. 89. d.
 Lumbricorum generatio & expulsio, & cur necentur
 in morbis. 81. d.
 Lumbricorum differentia & loca vbi generantur. 905. d.
 Lumbricorum nota omnes. 441. c. & seq.
 Luxationes quarundam partium faciunt proximas
 non augeri. 581. d.
 Luxationis spinæ differentia, & quas noxas afferant
 singulae. 137. a.
 Lydia laborauit morbo Melancholico, & postea in-
 flammatione lienis. 129. b.
- M
- M** Acule exiguae ac frequentes quam sint ma-
 lignae, & quo febris temporè, & in
 quibus paribus solent incipere. 373. c. 376. f.
 Magna errata nulla tenus ferenda esse Medicis. 771. b.
 Magnanimitatis & probitatis, timiditatis, & mali-
 gnitatis signa. 190. c.
 Magnæ nauis gubernatoris historia. 540. c.
 Magni celui, balbi, & gracili vocæ prædicti, cur sit boni
 physiognomicè & physicè explicatur. 192. c.
 Magni morbi nomine Epilepsia intelligitur. 716. b.
 Magnum morbum & malignum longè differre, &
 quid intersit. 280. e. 610. c.
 Mala illa cauenda semper, in quæ tempestas incli-
 nat, leuibus enim de causis generantur. 542. c.
 Mala & bona fieri diebus decretorijs. 444. a.
 Mala, quæ ob suppressas intempestiue hæmorrhoidas
 generantur, maligniora sunt quam alioqui. 657. a.
 Malicorij vsus in dysenteria. 783. f.
 Malienus cui costas fregit curus onustus in ipsum
 incidens, historia. 493. b.
 Malignæ febris cum exanthematis curatio & indi-
 cationum dignotio. 377. f.
 Malignarum inflammationum & Gangrenarum ca-
 ratio, quæ in constitutionibus pestilentibus pla-
 rimòs iuuat. 457. c.
 Malignitatem arguit intempestiua expulsio. 85. c.
 Malignitatis symptomata. ibid.
 Malleoli herui. 542. d.
 Malum Panicum in cardialgia. 113. c.
 in Mammarum venis sita est magna providentiæ
 pars. 123. f.
 Mane nulli morbi exacerbantur per se, vesperi
 omnes. 89. g.
 Manus hypochondrijs apponere indicat Melancholi-
 am morbum. 550. b.
 Matris imminentis signa. 426. c. d.
 Mares in dextera vteri parte gigni. 618. b.
 Mares esse feminis calidiores, quib' cõstet notis. ibid.
 Mariti puerperæ historia. 374. a.
 Masculos trigésimo, feminas sexagésimo abortiri
 & cur. 365. g.
 Materie Medicinalis cognitionem ad Medicum spe-
 ctare indicatur. 148. c.
 Maturi abscessus rectè iudicantis affectus priores
 signa. 404. f.
 Maza potius quam panis commendatur in æstuali
 victu. 622. b.
 Meandri cæci vxor ardente febre, & breuissima sup-
 puratione laborauit. 339. a.
 Medicamenta respicere posse certa membra. 714. b.
 Medicamentorum modos scire debet Medicus. 148. g.
 Medicamentum sano corpori cur nocet. 509. c.
 Medici officium. 616. c.
 Medicorum mores quales esse oporteat. 667. c.
 Medicos posse eundem morbum eadem intentione di-
 uersis auxilijs, & diuersa etiã intentione rectè curare,
 explicatur multis exemplis. 738. d. & seq.
 Medicos multos seorsim accessuri periculosum esse. 739. a.
 Medicus neque de re quapiam facillè enunciare, neq;
 leuiter mutare sententiam debet. 248. f.
 Melancholia omnis est acida, frigida, & terrea. 166. d.
 Melancholiz morbi cum vertigine complicatio. 546. f.
 Melancholiz morbo parati. 166. a.
 Melancholiz morbi differentia, causæ, & curatio.
 546. b.
 Melancholiz simul & acutæ febris exemplum. 118. c.
 Melancholici morbi quosdam picuissimos asserere solent.
 & quam ob causam. 343. g.
 Melancholici Epileptici, & contrà qui fiunt, & cur.
 & quid intersit. 775. c.
 Melancholici quomodo periclitentur breui mori. 552. bi.
 Melancholici à pocu plurimum abstinent aliquando
 550. d.
 Melancholici cur abundant sero. 164. b. 297. g.
 Melancholici morbi multa spaiatione mitigati. 685. f.

INDEX.

- Melancholicis familiare est pœnitiam congerere. 841. a
 Melancholicis morbis accommodatissimæ evacuationes sunt dejectio & mictio. 550. c.
 Melancholicorum symptomata eorum & causæ. 614. b
 Melancholicos habere sanguinem ichorosum. 164. b
 297. g. 343. g. & 614. b.
 Melancholicos nunc mœrere, nunc letari plurimum, & cur. 548. f.
 Melancholicus succus qua ratione afferat fastidium, cum per se soleat asserere famem. 839. b.
 Melida laboravit peripneumoniam ex suppressione menstruum. 84. c.
 Melisandri historia. 535. a.
 Menandri vinistoris historia. 377. d.
 Menonis historia. 828. c.
 Menses si accidunt vtero gerentibus, laboriosi sunt, quales octimestrium abortus. 174. g.
 Menses tales plerumque accidunt parituris decimo mense. 175. b.
 Menses posttridie à dolore lumborum & femoris accidunt & cur. 101. f.
 Mensibus suppressis accidunt multi rigores. 266. f.
 Mensibus medijs majori periculo abortitur. 116. b.
 Menstrua fluxio mulieres à multis malis liberat, & multos earum morbos indicat vt suppressa facit multa mala. 734. e.
 post Menstrua cur facili concipiant mulieres & causæ gemini partus, & cur mas aut femina. 169. b
 Menstrua & lac non fiunt ex eadem materia. 124. a.
 post menstrua aliquando dextra, aliquando sinistra fiunt. 169. b.
 Menstruis per etatē deficientibus quid eveniat. 889. c.
 Menstruis suppressis & debito tempore non erumpentibus, eadem mala accidere possunt. 119. f.
 Menstruis suppressis quæ mala accidere possunt. 119. b. 144. c. & 315. e.
 Menstruorum suppressionem ob malignam qualitasanguinis potius quàm quantitatem ledere quomodo cognoscatur. 823. f.
 Menstruorum suppressio quocumque modis soleat ledere. 556. e.
 Menstruorum defectus quot mensibus fiat incurabilis. 401. a.
 Meri cū cibo & à cibo minus ledere quàm solū. 714. d
 Merum sanguinem à moribus stillare quid & cur malum? 64. b.
 Methodicorum sectæ opinio refellitur. 588. d.
 Methodus optima cognoscendorum & faciendorum in carationibus. 145. g. & seq.
 Methodus inveniendi epidemialium constitutionum causas. 9. d.
 Metro potu largo aq. expurgatus est. 76. f.
 Metonis alterius historia. 886. c.
 Metrodori filij historia. 565. a.
 Metus & pœnitia melancholicis testatur aut facit. 315. a
 Milliaze asperitates in cute non admodum pruriginosæ. 141. a.
 Minors vxoris quæ sphaceli contraxit historia. 403. a.
 Missione sanguinis tūlis definit in tumore testis. 453. a
 Missionem sanguinis aut fluxum spontaneum qui bene, ferat & qui malè. 106. b.
 Missionem sanguinis sæpè liberare ab abortu. 334. g
 Molles carne mœnuatos & prudenes esse. 189. c.
 Monstruosi partus causæ. 126. g.
 Morbi Autumnalis & maligni, simulquē constitutione legitimi exemplum. 781. e.
 Morbi duabus rationibus dicuntur quales. 770. e.
 Morbi conuulsi in senectute desinunt. 689. a.
 Morbi acuti possunt esse sine febre. 54. g.
 Morbi acuti quando habet febrē, est continua. ibid.
 Morbi euentus ex quibus prædicatur. 58. g.
 Morbi initium considerandum. 111. b.
 Morbi diuturni vt renum & coxæ, podagra, & hæmorrhoides à multis periculosis liberant. 745. a.
 Morbi dolosi qui sint ex plo Cberionis indicatur. 721. c
 Morbi qui etatis mutatione curantur, an etate ipsa, an coitu mutantur, disputatur. 702. e.
 Morbi partium quando curantur phar macis, & quando solis localibus, & bono victu. 519. f.
 Morbi naturam quid vocet Hippocr. 495. b.
 Morbi multi etiā acuti, finiuntur insensibiliter. 332. g.
 Morbi pulicaris qui vulgè apud hispanos vocatur Tabardillo, descriptio & notæ. 142. b. & 373. f.
 Morbi pulicaris indicationes & curatio. 875. f.
 Morbillos, & variolas Græci vocant exethemata 26. e.
 in Morbis exerceri oportet vt pro sis, nec nocent. 31. a
 Morborum Epidemialium causæ consideratione temporis, præteriti, & futuri percipiuntur. 761. c.
 Morborum communium causæ. 9. d. & seq.
 in Morborū permutationibus quid considerandū. 51. g.
 Morborum euentus prænotescendi summa ratio. 641. e.
 Morborum indicationes multas diuersasq. amare evacuationes. 312. b.
 Morbos ex quibus dignoscimus. 48. e.
 Morbos alios non aliter ac febres habere circuitus & intermissiones aliquando. 58. a.
 Morbos cum lassitudine tensiva missionem sanguinis postulare. 201. d.
 Morbus regis non decretorius multas & vehemens perit purgationes. 803. a.
 Morbus Regius, lege Ictericus. 146. d.
 Morbus in dextra parte deterior quàm si in sinistra. 222. d
 Morbus aliquando inipuitur materia nondum concocta & cur. 307. a.
 Morbus aut per se an per consensum sit, & quando horum quidvis magis aut minus. 760. f.
 Morbus dolosus quomodo cognoscatur. 721. c.
 Morbus gallicus, lege gallicus.
 Morbus acutus superueniens sæpè est veterum & diuturnarum passionum indicatio. 402. a. 449. b. 490. b.
 Morbus cur fieri videatur minor nonnunquam, cum adhuc in suo incremento sit. 37. c. 314. a.
 Moribundi iam cur aliquando videatur alleuati. 141. f.
 299. b. & 321. a. & 394. f.
 Morientes præ debilitate vltra expectationem durare solent, non autem qui vi morborum. 240. f.
 Morientis præ debilitatē, & morbi vi dignotio. 801. e.
 Morientium ex veneno signa. 395. b.
 Morientes cur ex fronte sudent. 374. f.
 Morituris celeres sunt indicationes. 95. b.
 Moriturorum ex angina signa. 735. a.
 Mortificatio sicca malignior est quàm humida. 550. f.
 Mortuis multis recenter solere fieri rubores per partes, & ob quas causas. 554. c.
 Moschius calculosus ab abscessu quodam liberatus. 116. e
 Motus non idem sunt omnibus nimis. 623. f.
 Motus sunt congeneres, icterus, rigor, & sudor. 911. c
 Muliebrum & vaginalium morborum differentie, notæ, & causæ. 144. e. f. & 198. f.
 Muliebrum morborum causæ. 381. b. c.

INDEX.

Mulier vt concipiat, remedia. 233. b.
 Mulier quæ decumbebat iuxta Tifamenam ex volu-
 culo die sextâ mortua est. 260. f.
 Mulier quædam eorum quæ apud Pantimedem ex
 abortu recentis fetus, ardente febre obiit septi-
 mo. 262. b.
 Mulier quæ decumbebat in foro mendaciorum ex maf-
 culi parvi ex febre ardente decimo quarto obiit. 265. d.
 Mulier meroſa in Thafio plenitudine trium dierum la-
 borauit, & cum vrina nigra euasit. 314. e.
 Mulier quæ decumbebat in fiftore trimestri fetu
 grauida. 82. g.
 Mulier cui fanies exibat ex mâmillâ, niſi ea ſuppreſſa
 eſſet mortua, fuiſſet facta manica. 565. c. d.
 Mulieres ægrotarunt & mortuæ ſunt pauciores, quàm
 viri in conſtitutione primi epidem. 38. a.
 Mulieres concipiendi gratia ſe ipſas perdunt. 310. c.
 Mulieres cur non corripenterent nyctalopia cum pue-
 ris. 734. d.
 Mulieres ſeruæ ægrotant vt viri. ibid. f.
 Mulieres cur podagricæ minis ſint. 777. a.
 Mulieribus concipere cupientibus conſilium. 310. c.
 Mulieribus quæ in ſpeciem virilem mutatæ interi-
 erunt, quomodo fuiſſet proſpiciendum. 778. a.
 Mulieres vehementi capitis grauitate & menſtruorum
 ſuppreſſione laborantis & febricitantis acutè hiſtoria,
 & de iudicatione conſectare rationales. 381. c& ſeq.
 Mulieris Hippici hydropticæ hiſtoria. 451. f.
 Mulieris Pheris hiſtoria. 471. d.
 Mulieris laſiſſæ vero gerentis hiſtoria. 472. b.
 Mulieris quæ ſeiſpam ſugalauiſſet hiſtoria. 503. c.
 Mulieris hiſtoria quæ catapotium concipiendi gratia
 accepit. 507. e.
 Mulieris quæ ex pharmaco corruptorio obiit. 520. c.
 Mulieris cancrum habentis circa pectus, cui fanies
 ex mamella exibat, hiſtoria. 569. c.
 Mulieris ſupra portas habitantis, quæ ex febricula
 abſeſſa ad omnes ſpinæ articulos, & reſolutione paſſa
 eſt, hiſtoria, & eius expoſitio & curatio. a. 802.
 Mulieris morbi, qui in viro fuiſſet difficilis, &
 periculofus, in muliere verò minis longus, de-
 ſcriptio, & cauſe. 909. c.
 Muſculi ſunt motus ſtrumenta. 450. f.
 Muſculian contrahant ſe verſus ventrem an verſus
 fines. 451. c.
 Muſculorum compoſitio & ſubſtantia. ibid.
 Muſculorum capitis hiſtoria. 514. b.
 Mutatio ſæpè & repente facta Aſtraliū, & Bo-
 realiū & niuium eſt cauſa morborum Epidē-
 miorum. 731. c.
 Mutationes omnes repentinas eſſe cauendas. 648. e.
 Mutationes quæcumque faciente ſint in morbis do-
 loſis, tunc ſiane, quum ſint mitiores. 721. e.
 Mutationes nunquam, niſi ad decentia ſiant. 722. a.
 Mutationes iuuant niſi ad malam mutantur. 114. b.

N

Narcoticis imperiti & adulatores vtuntur nimis.
 719. a.
 Narcoticis quando vtendum. ibid. b.
 Nares opium capitis emunctorium. 566. b.
 Narium planæ apertæ iracundiam indicant. 189. e.
 Narium humiditas & aërium ſordes expurgant cre-
 brum à craſſis. 685. c.
 Natura etiam curat præpoſtere aliquando, vt Me-

dici. 307. d.
 Natura ægrotantium conſideranda. 419. f.
 Naturâ calidus an refrigerandus & qua id ratione
 fiat. 670. b.
 Naturam morborum medicatricem eſſe indicatur. 681. c.
 Natura inuenit ſibi vias non ex cogitatione. 682. d.
 Naturam non eſſe indoctam explicatur. ibid. e.
 Nautæ puer, & Miriocaniz diarrhæa laboraue-
 rit. 271. l.
 Neapolis hiſtoria. 563. f.
 Negligens ex ſomno qui ſit. 417. c.
 Nervorum diſſectio longa. 182. d.
 in Nervorum affectibus nunquam eſt omittendum con-
 ſiderare, an antecedit, ſequatur, vel comiteatur
 febris. 359. e.
 Nervorum hiſtoriz & uſus. 450. f.
 Nervus nudus mordaci medicamento tactus conuul-
 ſionem aſſert. 542. d.
 Netopum quid ſit. 531. e.
 Nicanoris paſſio mirabilis. 546. a.
 Nicippi hiſtoria. 447. a.
 Nicodemus febricitauit acutè ex venere & vino. 314. e.
 Nicolai pueri hiſtoria. 552. c.
 Nicolai puer quomodo fuiſſet curand' qui laborauit fe-
 bre cõtina, periculofa, cõplicata cū tertiana. 554. b.
 Nicoftrati vxor decima quarta die correpta eſt apo-
 plexia. 345. b.
 Nicoxeni in Olintho hiſtoria. 877. b.
 Nigrities umbilici inditium melancholiz à principio
 generationis. 392. d.
 Nigrum medicamentum Hipp. 867. b.
 Nihil temerè nihil negligere ad multa accommodatur,
 600. f. & ſeq.
 Niſantidis hiſtoria. 873. e.
 Nitrum, cuminum, & coriandrum multum proſunt
 ad vterum, & febres redeuntes circuitus cum fri-
 gore. 219. d.
 Noctes pluſquàm dies delirij ſignificationem præ-
 bere. 543. b.
 Nocturna febris. 10. c. 55. g.
 Nominibus nabeculæ, ſedimenti, hypofaſis diſtinde
 uſus eſt aliquando Hippocrat. 554. a.
 Non potantibus aut vix reſpiratio brevis, duplex
 huius ſententiæ explicatio. 156. b.
 Noces veteres melle intinctæ poſt crudum potum
 viles. 913. b.
 Numerorum tertius validiſſimus. 221. a.
 Nunc frigere plurimùm, nunc vri, in debilibus, quæ
 ob cauſam ſit. 322. e.
 Nutrices an ſint querendæ ſine menſtris diſputatur.
 114. c.
 Nutrientia exterius admovere vanum non eſt. 711. a.
 Nutrix duobus modis purgatur, aut propter ſe, aut
 propter infantem, & qua ratione faciendum ſit
 vtrumque. 709. a.
 Nyctalopia pueri magis laborarunt, præcipuè quæ
 grandioribus oculis & capillis longis. 734. d.

O

Oblata quæ vocet Hippocr. 305. g.
 Oblitio duplex, altera ob mentis alienationem,
 altera ob memoriæ viciū. 186. d.
 Oblitio omniū eorum quæ quis amat, cur ſignam
 lethale. 321. b.
 Obſtructionibus viſcerum laborantes cur crebrò
 corripiantur febribus. 319. e.

INDEX.

- Occasio quid sit apud Hippocrat. 110. f.
 Occasione elapsa prestat dimitti auxilia quam nihil
 conferentia infamari. 741. a.
 Occasiones unde caperint egrotare considerande.
 110. g.
 Occasiones, seu cause externe ad cognitionem & cu-
 rationem conferunt & quomodo. ibid.
 Occasionis duplex significatio. 639. a.
 Occasus Pleiadum in initio Nouembris. 556. a.
 Occasus mensis cur non vitalis. 168. c.
 Oculi eorum qui linquntur animo, & morientium
 quales sint. 526. e.
 Oculi magni angulari demissi boni sunt. 190. f.
 Oculi audacia que dicatur, & eam indicare delirium.
 587. c.
 Oculi distortio est aliquando signum decretorium.
 247. g.
 Oculi affecti cur irriterent noctu. 543. a.
 Oculi fractio quid sit & quid significet, curque in
 moribundis sit. 588. b.
 Oculi ut valent, ita & totum corpus, de corpore &
 de animo explicatur. 679. c.
 Oculi, venter supernus & infernus, & vesica maximè
 laborauerunt in consuetudine primi Epid. 17. e.
 Oculi maximè læduntur à Borea. ibid.
 Oculo exigui & cani mali. 190. d.
 ex Oculis notæ Physiognomice. 212. b.
 Oculorum curatio & ocularium medicamentorum
 materia.
 Oculorum debilitas admodum lethalis. 220. d.
 Oculos magnos & rotundos cupiditatem & hebe-
 tudinem indicare. 189. c.
 Oculis distortis fuit signum lethale. 264. f.
 Odorata cur subcus iuuant, naribus admodum lædunt.
 hystericas. 471. f.
 Odores sunt materia victus. 749. b.
 Odoribus iacundis circa qualitatem alimenti solum
 hominem delectari affirmat Aristoteles. ibid. d.
 Odoribus tam malis quam bonis vtuntur Medici,
 & est eorum mutatio consideranda. ibid. e.
 Odorum differentia perparce cognoscuntur ab ho-
 minibus. ibid. b.
 Odorum differentie. ibid. b.
 Oecetæ vxor ex abortu quatuor mensis ardente febre
 correpta obiit septima. 263. f.
 Oedemata vocantur omnes tumores & quales. 5. b.
 26. a.
 in Oeni dis viri qui morbo tenebatur, historia. 458. f.
 Olistorix vxor in Holidæ. 452. e.
 Olympiadori famæ historia. 396. d.
 Onofanactis historia. 83. d.
 Ophthalmia alui pro fluxu plurimum cedit. 840. b.
 Ophthalmia cum dolore morbi æstiales sunt. 736. a.
 Ophthalmia humida. 17. e.
 Opium quando conferat in dentium dolore. 727. d.
 Opisthotoni futuri inditia. 541. c.
 Organorum attritio calidum facit. 620. f.
 Oris vteri incidentis in coxam curatio. 390. d.
 Os infernum digiti quod sit. 540. f.
 Os illium, coxæ, & pubis idem. 461. a.
 Oscitatio & pandiculario quomodo fiat. 687. f.
 Oscitationum cause & curatio. 355. f. 594. a.
 Ossa plerumque abscedunt post quadragesimum.
 666. b.
 Ossa cranij per naves emanata. 684. b.
 Otio nunquam expedit uti ad extenuandum, neque
 multo cibo, etiam fieri possit. 623. d.
 Otium quosdam, & extenuat, quosdam crassiores reddit.
 622. c.
 Oxybaphum quæ mæsuræ sit. 870. d.
 Oxybaphus quodnam sit pætionis genus. 161. b.
 P
 Pælestæ custodis qui ex lætæ obijit die tertia
 historia. 774. c.
 Pallidum, rufum, & flauum promiscuè aliquando su-
 mantur. 420. e.
 Palpebrarum & lingue motus dubios esse
 sint de eorum instrumentis opiniones ex
 tur. 683. c.
 Palpitatio vocatur pulsus ab Hippocrate. 66. c.
 Palpitationis nomen quid significet. 786. c.
 Panis subcinerit incommoda. 787. f.
 Panis recentis noxæ. 536. b.
 Panis autopyri vitilis. ibid. c.
 Papule mammarum color pallidus vteri morbum in-
 dicat, aut prægnationem. 696. d.
 Papule per totum corpus in lactante. 123. g.
 Paraplexia quævis resolutio vocatur. 35. b. 732. e.
 Paraplexie ex suppressis menstruis. 145. c.
 Paraplexie exitus duo. 35. e.
 Paribus moueri, & breuem esse morbum
 est. 306. f.
 Paribus ludicari quæ paribus mouentur, & impari-
 bus quæ imparibus, & cur. 59. c.
 Paribus diebus accessiones fieri deterius est, quam
 imparibus, & cur. 59. c. 63. d.
 Paribus moueri quomodo intelligendum. 59 d. 63. d.
 Parientes concussionem & compressionem thoracis lædi.
 567. a.
 Parientes quare solent periclitari tempore frigido?
 38. d.
 Parij historia. 292. f.
 Parium & imparium dierum enumeratio seorsum.
 59. f.
 Parmenisci historia. 548. d.
 Parmenisci filij historia. 531. d.
 Parotides que desinunt febre permanent, diarrhæa,
 aut dysenteria, aut crassa vrinæ subdientia so-
 luit, vt & surditatem. 44. d.
 Parotides que non soluebantur. 26. f.
 Parotides quæ euascent dolor secundum illam
 succedit. 37. f.
 Parotidibus inapparatis aliquibus successit mors.
 47. a.
 Parotides liberauerunt Chalcidonium à suppuratione.
 313. b.
 Parotidum ex acutis morbis curatio per citam viti-
 nem commendatur. 479. c. & 892. c.
 Paroxysmorum longitudo, anticipatio, & postpositio
 vnde. 94. f.
 Paroxysmos morborum omnium infusum propriam
 materiam varijs exemplis indicatur.
 Paroxysmos esse majores & interualla breviora, an lō-
 gioris morbi sit signum. 94. c.
 Paroxysmus similis est crisi. 59. c.
 Paroxysmus quid sit. 94. c.
 Partes humiles que sint. 408. f.
 Partes superiores & inferiores in humano corpore.
 quæ. 157. c.
 Partium corporis, & temperamenti, & temporis anni,

INDEX.

- Spiritus aliquando apud Hipp. significat dispensam.
372. f. 373. b.
- Spiratio obscura in tabidis & in non parientibus ma-
la. 743. c.
- Spiritus magni & rari velut recordantis causæ. 64. f.
- Splen lege len. 743. c.
- Splenicus quæ dysenteria sit vtilis & quæ inutilis. 363. b.
- Splenis tumor vel inflammatio. 62. f. 68. c.
129. b. 132. a. 157. a. 158. a. 715. b. 719. d.
- Spongæ quæ partes sint apud Hippocratem. 338. b.
- Spongæ vis. 227. b.
- Spontaneæ euacuationes etiam post arte factas expeti,
vt morbus tutò solutus sit. 791. a.
- Spuitio multa vîsa est morbum melancholicum iu-
dicare. 685. f.
- Spumæ causæ, & quid indicet. 431. c.
- Spumosæ defectiones duplicem generationem habent.
246. z.
- Sputa rotunda delirium significare. 8. c. 724. c.
- Sputa valdè flatu in peripneumoniciis breuem mor-
bum significare. 445. c.
- Sputi creuenti curationem quæ impediant; 660. c.
- Status phlegmatis descriptio. 267. f.
- Steriles fouere ac pharmaco vti oportet. 198. d.
- Sterilitatis causæ. 167. g. 366. c.
- Sterilitatis causæ & curatio varia. 198. c. 233. b.
- Sterilius curatio multiplex pro ratione causæ. 169. f.
- Sternutamenta quando vîlla. 685. a.
- Sternutamenti prognosticum. 52. f.
- Sternutamentorum visu intempestiuo letum esse
Polyphantum, adeò vt ob id moreretur, indi-
catur, interimque docetur quomodo fuisset cu-
randus. 899. d.
- Sternutatio & singultus concussionis sunt. 687. c.
- Sternutatio, expiratione, pandiculatione, transpi-
ratione; & duplici flatu vapor euacuatur ex par-
tibus diuersis. 685. c.
- Stertor qualis sit in ore & palato, qualis in gutture,
& aspera arteria, & vtriusque significatio. 568. c.
- Stertor quid sit apud Hippocratem. 474. c.
- Stertorosis spiritus quibus causis soleat conualescere
& eorum distinctio. 830. c.
- Scilla sanguinis è naribus mala; maximè, quarto die.
16. d. 36. c. 64. b. 76. b. 235. c. & 246. c.
- Stillare merum quid sit & cur malum. 64. b.
- Stimargi vxor ex abortu intumuit & quibus causis.
115. g.
- Stimargi famula Idumæa ex partu femellæ egrotauit,
& quomodo curata sit. 187. c.
- Stomatica medicamenta ex quibus parentur à Gale-
no. 844. a.
- Strabones à primo ortu amētes, Maniaci & claudii. 221. f.
- Strangaria bona & indicatoria. 27. f.
- Strangurie remedia. 534. a.
- Stranguriam vicinis iam partui fieri consueuisse, &
cur. 125. a.
- Stranguriam venæ sectio soluit. 324. b.
- Stupor alui facit omnium confusionem. 620. c.
- Stuporis essentia, causæ & curatio. 718. f.
- Sublime in vrinis delirium portendere. 301. c.
- Subpurgare quid sit. 529. a.
- Succi multi & varij in corpore quid pariant. 25. a.
- Succi multi cum debilitate signa. 846. f.
- Sudor abscessus est. 100. c.
- Sudor & coincidentia exercitationis mita. 627. a.
- Sudor qui arte ellicitur, augeat febrem, & minuit vir-
tutem. 378. a.
- Sudor tertianæ cur diuturnitatem putetur præmon-
strare. 88. c.
- Sudor post rigorem optimus est. 213. c.
- Sudor per noctem quibus causis fieri soleat. 788. c.
- Sudor in principio malus exemplo Philischi. 63. b.
- Sudor frigidus. 65. f. vnde, 295. d.
- Sudores multi tempore frigido vnde. 18. c.
- Sudores in principio arguunt difficultatē iudicij. 88. d.
- Sudoribus circa ceruicem soluti morbi erraticas ha-
bent febres pro-reciduis. 857. c.
- Sudorificæ febres ac sine sudoribus quolibet tempo-
ribus oriuntur. 89. a. 141. f.
- Sudorificæ febres quando fieri soleant. 87. g.
- Sudorificæ febres sunt difficilis iudicij. 88. d.
- Sudoris frigidi duplex causa. 81. a.
- Sudoris maligni in febribus notæ. 88. c.
- Sudoris colligatorij causæ. 892. f.
- Suilla caro qualis cibus. 625. f.
- Superfirationis causæ, & quo prægnationis tempo-
potius accidat. 470. b.
- Superfpiratio duplex quid. 554. c.
- Superveniencia signa tam bona quam mala contra-
hant morbum. 514. d.
- Suppositoria retenta. 159. c.
- Suppurans omne sine recidia est. 628. d.
- Suppurati multi qui euadere possent curmoriatur. 894. f.
- Suppuratio in ventre ex vomitu sanguinis; & eius
generatio, & signa. 494. z.
- Suppuratio in ventriculo vomitu puris soluitur in
robustis. 491. c.
- Suppuratio magis est sine recidia, quam resolutio
ob multas rationes. 628. f.
- Suppuratio quum sit in intestinis alius turbatur, nisi
homo coriza laboret. 616. c.
- Suppurationes biliosæ pessimæ sunt. 361. b.
- Suppurationes & oculorum morbos per noctem ha-
bere labores. 542. f.
- Suppurationes humeri in pusillis faciunt breuiores
esse cubitos & cur. 582. c.
- Suppurationes auris hyeme magis quam æstate sunt,
vt senibus magis quam iuuenibus. 855. d.
- Suppurationibus vmbilicis terminus. 616. b.
- Suppurationis perniciose signa. 359. a.
- Suppurationis in oculo pericula & curatio. 418. f.
- Suppurationis internæ in ventre futuræ, aut iam
factæ signa. 421. c. & seq. 419. c.
- Suppurationis & hydropsis ex suppuratione causæ, &
generatio. 435. f.
- Suppurationis internæ signa & causæ. 508. c. & 345. c.
- Suppurationis quum sit signa. 531. b.
- Suppurationis ex inflammatione & ex catarrho digno-
stio. 848. d.
- Suppurationis quæ ex catarrho sæpe redijt exemplis
& causæ. 894. d.
- Suppurationum differentia & signa. 461. c.
- Suppuratis sectio & inusitò valdè prodest & quando
applicandæ. 498. c.
- Suppuratorum signa. 800. f. & seq. 816. b. & seq.
- Surditas in acutis an sit bonum signum disputatur.
239. a. & seq.
- Surditas aut sanguis ex naribus soluit dolores inferio-
res. 194. d.
- Surditatis curatio. 352. c.
- Suæsum an deorsum vergant succi ex hypochondrij
dignoscant. 337. f. 344. g.
- Suspirare est delirij signum. 791. d.
- Sutoris historia. 359. g.

INDEX.

- Piper in dentium dolore quando profuit & quam ob causam explicatur. 727. c.
- Pisces saxatiles qui censendi. 532. c.
- Pististrati historia. 84. a.
- Pitracus volucrie ex ruptura interijt. 106. f.
- Pituita & Melancholia quomodo uterque succus possit ad corpus vergere & ad animum. 343. g.
- Pituitosa & melancholica passiones quae ratione sepe concurrant. ibid.
- Plato utrum appellat animal. 866. a.
- Platonis de animæ sententia. 757. c.
- Platonis de purgatione pulchra sententia. 504. c.
- Pleiadis quod signum sit. 1. b.
- Pleiadam occidit quando accidit. 34. c.
- Plerosque mori eo morbo, quo fuerunt sepe correpti, ratione & exemplo indicatur. 816. d.
- Pleuritis raro iuvantur pharmaco, & cur, & quo casu iuvantur. 456. c. f.
- Pleuritis copia sanguinis suppurationem, malignitatem tamen facit. 567. b.
- Pleuritis an semel fundendus totus sanguis. 310. g.
- Pleuriticorum urinae & carum cause. 236. b.
- Pleuritis laborant Anaxion. 309. e.
- Pleuritidem & peripneumoniam ex utero, quibus signis agnoscitur. 823. a.
- Pleuritis temporum universalem distinctio. 310. b.
- Pleuritidis & suppurationis & repurgationis notæ. 887. b.
- Pleuritidis acutissime exacte & salutaris typus. 845. b.
- Pleuritidis dignosco ex signis. 812. d. & 821. c.
- Pleuritis & suppressione menstruum. 890. e.
- Pleuritis quae periculosa dextra an sinistra disputatur & deciditur. 813. c.
- Pleuritis non solet cum delirio interimere. 456. d.
- Pleuritis intermittens. 38. d.
- Pleuritis ex catarrho. 149. f.
- Pleuritis, arthritis, & hemicrania, & affectio alia quævis dextra quam sinistra deterior. 221. c.
338. g. & 321. b.
- Pluvii differentie. 87. a.
- Pluviae molles quænam. 1. a.
- Pluviarum & siccitatis morbi. 11. c.
- Podagra qui morbi solcant succedere, & a quibuslibet. 657. c.
- Polemarchi pueri historia. 894. d.
- Polenta quid, & quomodo parabatur olim. 113. c.
882. a.
- Pollentes quæ dicantur ab Hippocrate. 559. b.
- Polyphanti historia. 899. c.
- Polyeratis & Cleodici historia. 778. b.
- Polyeratis vxoris historia. 799. c.
- Polyeratis historia. 540. b.
- Porræ ubi generentur & quid significant. 547. d.
- Porri facultas. 492. f.
- Porres & alia cur putat vulgus esse estate frigida. 767. b.
- Porri & alij facultates, & cur messoribus estate exhibentur. ibid.
- Posidocreonis historia. 827. f.
- Posidonij historia. 816. a.
- Post canem quod tempus designet. 539. b.
- Post mictum concretio in pueris. 634. f.
- Posteriora partes anterioribus frigidiore. 166. g.
- Potio copiosa laetis asinini confert ad dysenteriam. 787. a.
- Potiones & elegantes ex bordeo præstunt, dulcibus & ex melle paratis. 439. a.
- Potionis pro catarrho syngrapha. 870. d.
- Potionem curationis partem esse quiescere, quam contraria adhibere monstratur. 601. c.
- Potum non consistere, sed cum somno cadere, si grum certe mortis. 324. c. 793. d.
- & 806. b.
- Potus multus cur ledat ictericos. 869. a.
- de Potu hydropicorum. 536. d.
- Praue differentie dejectionum & urinarum. 554. a.
- Praxis medica nulla ratione potest doceri melius, quam per exempla. 485. a.
- Pregnans quæ cecidit, aut secta est, aut convulsionem passa, aut sine causa dolores, ut patientis pati incipit, an sit abortum factura, quanto tempore & quomodo cognoscatur. 871. f.
- Pregnans an sit fecum corruptura, cognoscere quantum refert. 872. b.
- Pregnantibus posse menstrua fluere indicatur. 365. b.
- Pregnationis cognoscendæ difficultas indicatur. 365. b.
370. g. & 384. a.
- Prapotantibus crudum salia cum melle remedium est. 913. a.
- Pro quibus qui morbi sunt salubriter, & necessitate explicatur multis exemplis. 716. d.
- Procataretica cause præstigijs omnibus vires detrahunt. 245. c.
- Prodius quomodo interfecit febricentes. 652. f.
- Prodromi filij historia. 819. c.
- Prodromi qui dies vocentur. 3. d.
- Productionis morbi & superexacerbatio & remissio signum est. 444. b. & seq.
- Proferre perfecta quam quis plurimum conatur, alioqui balbutire, quas causas habeat. 794. c.
- Profluvia sanguinis hydropem faciunt. 669. c.
- Profluvia alba ex utero habentes raro parere. 366. f.
- Profluvij ventris curatio per fibras coctas & cum melle. 217. f.
- Prognostice artis caput & summa. 641. d.
- Prognosticum ex ijs quæ ex quocunque signo nascuntur. 52. b. & seq.
- Propensio ad actiones antiquiorem esse instrumentis. 681. a.
- Propter aures, & ex auribus sepe mori tertia die. 720. a.
- Prorrheticorum libri censura. 243. a.
- Providencia vel honorificatus esse in morituris quam in supervictis. 210. c.
- Pulsus palpebrarum tumores. 765. d.
- Pubis affectiones per quas pars efficiant respirationem difficilem. 681. a.
- Puellæ quæ a rupe ceciderat, historia. 521. a.
- Puero Metrophanti caput testâ percussum est. 340. d.
- Pueri ex variolis & morbillis multi mortui. 27. c.
- Pueri quando possunt priuari lacte. 215. c.
- Pueri ex multis desperatis morbis evadunt & cur. 28. a.
- Pueri phagedæna laborantis historia. 333. b.
- Pueri iuxta extremam campanam historia. 357. a.
- Pueri in Hypologi villâ historia. 392. a.
- Pueri à mulo vulnerati historia. 506. a.
- Pueri ex defurgatione laborantis inflammatione hypochondriorum historia & causa. 385. e.

INDEX.

Pueri cur sint passionibus pituitosis opportuni. 518. d.
 Pueri Philoſophi hiſtoria. 914. b.
 Pueris poſt miſtrum concrecio. 634. f.
 Puerilis ætas minoribus auxilijs indiget, ſenilis mi-
 nora ſuſtinet. 773. b.
 Puerilis que mutationes inſignes, & que tempora
 ſint illis legitima, & cum voce mutari illis om-
 nia. 215. f.
 Pueros plurimum ledi à vino. 553. b.
 Puerpera quantum ſanguinis debeat fundere in partu
 323. a.
 Puerperarum conuulſionem excitatà febre curarè di-
 cit Hippoc, melius tamen curatur miſſo ſanguine,
 vide reliquam curationem. 194. g.
 ex Pulmonia bilioſa læpius delirant ægri quàm ex pi-
 tuitoſa. 568. d.
 de Pulſibus agere Hippocratem. 357. f. & 369. f.
 Pulſus in hypochondrijs cauſe & ſignificationes. 786. e.
 Pulſus in hypochondrijs quid portendat, exemplo
 indicatur. 357. d.
 Pulſus nomen quid ſignificet apud Hippocratem. 782. e.
 Pulſus in dextrâ parte vehementior eſt quàm in ſi-
 niſtra, & cur. 205. b.
 Punctura in genn ex quâ mors. 513. a.
 Puncturæ curari debent decifâ cute. 516. a.
 Purgans medicamentum dandum poſt ſextimum ex
 Hippocrate. 397. b.
 Purgatio ſanorū à principio eſt ſuperpurgatio. 509. c. d.
 Purgatio, lege pharmacum.
 Purgatio aliquando impeditur ab humorum redun-
 dantiâ, & quid eo caſu faciendum. 505. b.
 Purgationi nimis quibus auxilijs occurratur. 504. f.
 Purgationis præpoſtere exemplum. 511. a.
 Purgationis ante concoctionem, noxa. 834. f.
 Puris ex aure cum febre eruptio. 436. b.
 Puris ſeridi & ſubrubi cauſe. 517. a.
 Pus ex aure liberat à dentium dolore. 355. e.
 Pus ex aure ſi deſinat ijs quibus ſolebat fluere, an-
 ſolutiones facit. 396. c.
 Pus ex aure duplicem habet cauſam. 436. c.
 Putredo arida, que vocetur. 457. e. & 494. c.
 Pythion acutâ febre ex decidentia laborauit. 234. a.
 299. d.
 Pythionis filij in dela hiſtoria. 906. d.
 Pytholcis curationes. 522. e.
 Pythodori hiſtoria. 780. e.

Quadrageſimi dies in longis morbis magnam ha-
 bent vim, ut ſeptimanæ in acutis. 295. e. f.
 Quadrageſimos & vigintiſmos eſſe pro ſeptimanis &
 quaternarijs acutorum. 313. a.
 Quadrageſima dies ut in ſuppuratione, ita in catarrhis
 expurgationis tempus. 856. f.
 Que ex quibus, in que mutantur conſiderandum.
 330. c.
 Quartanâ ſecuriſſima, faciliſſima, & longiſſima. 55. b.
 Quartana curtimore repentinò aliquando tollitur, &
 quid tunc agendum & poſtea. 186. f.
 Quartana liberat, & præſeruat à magno morbo,
 55. b. 716. a.
 Quartana non producitur ultra annum, niſi ob præ-
 uium victum, & que cauſa ſit eius conſtitutio-
 nis. 725. e.
 Quartana quomodo ſolent incipere & procedere. 838. e.

Quartana alia eſt primaria, alia ſuccedit alijs mor-
 bis. 20. b.
 in Quartana quomodo generantur copioſi ſudores.
 164. d.
 Quartanæ in ſtatum iam euntis ſignam eſt miſceſcere
 rigores. 577. e.
 Quartanæ æſtiales non producuntur uſque ad æquum.
 725. f.
 Quartanæ annuæ que ſupervenerint & eorum cau-
 ſe. 164. d.
 Quartanam curari faciliſſimè. 55. b.
 Quarta dies cur raro iudicet. 306. f.
 Quarto die deterius ſeſe habere, grauiſſimū eſſe. 41. e.
 Quarto die ſanguinis fluxus facti difficileſem iudica-
 tionem poſtulant. 159. a.
 Quietos eſſe ægrotantes ab impericis ſemper pro-
 bari, à peritis verò non niſi quum eſt natu-
 rale. 913. d.
 Qui aſinum ex peſto ſuſtulit. 372. b.
 Qui à Ceramici equo cecidit. 362. a.
 Qui apud Dromum habitabat vomitu ſanguinis obijt.
 505. c.
 Qui dolores ubi ſimul adſunt, augentur ſimul, &
 in quibus alter alterum obſcureſcit explicatur.
 664. e. & ſeq.
 Qui iuxta Medoſadæ. 415. g.
 Qui oculo percuſſus eſt ſecundum palpebram. 515. e.
 Qui decubebat in horto Dealcis ob robur naturale, &
 quia ex occaſione febricitauit dies quadraginta,
 alioqui moriturus intra fines acutorum. 244. f.
 Quinquagenarijs ſuppuratione terminantur phleg-
 mones potius quàm reſolutione. 502. e.
 Quintanam febrem omnium eſſe peſſimam. 56. c.
 Quotidiana febris quandiu durare ſolet. 61. g.
 Quotidianam omnem eſſe longam, longiorem verò
 & deterioſem diurnam. 58. a.

R

Rauedo viſa eſt non raro totâ vitâ durare. 733. e.
 Recens reſoſito membro qui mouentur, indigni
 periculo ſeſe exponunt. 542. b.
 Recidivæ & morbi vnica compoſitio & multa eius
 rei exempla. 45. d. & ſeq.
 Recidivæ malæ. 25. b.
 Recidivæ poſt æquinoctia autumnalia uſque ad Sol-
 ſtitio hiemalia. 334. b.
 Recidivæ quæ ſecundum rationem non ſunt. 59. d.
 Recidivæ etiam ſolent incidere in dies decretorios
 ut aliæ mutationes inſignes ſiue bonæ ſiue malæ.
 338. e.
 Recidivæ futurâ longiſſimam vide præſentias. 176. b.
 Recidivæ notæ vno capite collectæ. 186. c.
 Recidivarum ſigna ex oculorum palpebris. 765. c.
 Rectiſpirus qui ſit. 613. a.
 Reſtitutio abſceſſum ſecundum ſuperiora & inferiora
 ut dextra & ſiniſtra explicatur, & adhibetur
 Emperica cauſa reſtitutionis à Medico ſer-
 uandæ in evacuationibus. 157. c. & 594. b.
 Reſtitutio in humorum decubitu deſideratur. 157. c.
 Reſtum intuitum oculis non nidiſantibus indicare
 audaciam monſtratur. 187. f.
 Redundantiâ humorum aliquando impedire purga-
 tionem & quid eo caſu faciendum. 505. b.
 Reduiz galla cum melle curantur. 332. f.
 Reſicere & extenuare corpora, Medici munus eſt. 612. a.

INDEX.

- Refrigeratio quibus iudaret & quib⁹ emolliat alium, 704. e.
& quibus causis. 704. e.
Refrigerationes non recalcrescentes mortem indicare. 811. f.
Refrigeratorum signa. 144. b.
Regiones an concurrant ad morbos. 10. e.
Regionum morbi. ibid.
Relicta in morbis recidivas facere & quæ ea sint. 111. g. 158. a. 197. c.
Renum & soli dolores initio vix posse dignosci, indicatur exemplo Apemanti, & Fabri, & Nicotriati. 387. e.
Renum & vesicæ morborum ex multis succis curatio legitima. 481. a.
Renum morbos non vidit Hippoc. curatos ultra quinquagesimum annum. 746. f.
Renum dolores ex fluxione à capite à qua potest oriri hydrops, & urinae suppressio. 120. b.
Repletionem & vacuationem non omnes, sed mosci curantur morbi. 589. b.
Resolutio an sit melior quàm suppuratio an contra disponatur & definitur. 650. b.
Respiratio parva & crebra non fit semper ob dolorem, sed ob impotentiam aliquando. 345. v.
Respiratio sublimis cum strepitu est pessima. 852. a.
Respiratio brevis vix potantibus. 155. f.
Respiratio longa sanat continuas oscitationes. ibid.
Respiratio longa phreniticam indicat. 156. g.
Respirationis & pulsus differentie omnes & earum dignationes & cause. 154. b. 593. c.
Respirationis per os & vulnus non est eadem materia. 561. b.
Respirationis prognosticum. 32. e.
Respirationis usum esse distributionem alimenti, opinio est antiqua. 710. e.
Retentrix facultas debilitata non est causa fluxionis. 197. g.
Renellendum & euacuandum alternatè, ubi in parte affecta magna molestia sentitur. 591. e.
Renellendū si humores quib⁹ oportet vergant. 601. e.
Reversas febres magna ex parte non sunt acutæ. 597. f.
Rheumaticæ febres cum tussicula incipiunt & ad vesperam exacerbantur. 849. d.
Renullio, derivatio & euacuatio. 390. f.
Rigor circa crisiū multis accidit. 36. d.
Rigor in principio febrium ardentium cur malus. 40. g.
Rigor & tremor quomodo sumuntur apud Hippocratem & Galenum. 416. b.
Rigor à superiori ventre magis exoritur, febris ab inferiori. 706. f.
à Rigore incipere quibus continuis febribus præcipuè accidit? 300. f.
T. rigores sine ordine. 11. c.
Rigores sine ordine exitis & abortum passis famulant. 266. f.
Rigores ex quibus partibus incipiant & viris & mulieribus. 166. e. & 639. c.
Rigores fortes mittere instantis status signum est, præcipuè in quartanis. 577. d.
Rigoris decretorii præsignum ex urinae suppressione & somnis, & causæ. 578. a.
Rigoris per febres acutus significatio. 52. c.
Rilus quidam per impotentiam continendi septum transversum, & eius causæ & curatio. 67. b.
Ructum acidum in longis leuitatibus intestinalium licere aliquando arte facere. 118. c.
Ructus prognosticum. 92. f.
Ructus hypochondriacos & hystericos plurimum iuuat. 686. a.
Ructuum differentia omnes & significationes earum. 754. a.
Rufos numquam esse mediocres, sed aut valde bonos, aut pessimos monstratur. 190. a.
Rufos & acuto naso & parvis oculis prauos esse: rufos vero & simos & oculis magnis bonos. 188. b.
Ruptiones, tumores, & fluores in inflammationibus & viceribus considerandos esse exemplis indicatur. 766. b.
ex Ruptura in pectore cur solent fieri suppuratio. 333. b.
Ruptura valorum in pectore causæ. ibid.
S
Sagittæ percussio in inguine. 512. f.
Salamine qui in anchoram incidit. 501. d.
Saluatellum dextrae manus in hepatis effectibus facit Hippocrates. 126. d.
Sanguineæ effluxiones colores mutant ob sanguinis conversionem. 659. c.
Sanguineum & biliosum temperamentum mutari in Melancholicum & in qua ætate utrumque. 166. a. d.
Sanguinem ex naribus fundentibus fieri iudicationes cum rigore exemplis indicatur. 176. d.
Sanguinem ex naribus abcessus & significare & tollere. 380. d.
Sanguinem esse frigidū bilis quatenus sit verum. 486. d.
Sanguinis missionis administratio & ligatura. 165. d.
Sanguinis fluxus liberet ab abcessibus. 585. f.
Sanguinis mittendi indicatio ab humoris specie. 660. b.
Sanguinis redundantia quibusdam bebones ubi dardam excretionis sanguinis ex aspera teria faciebat. 730. e.
Sanguinis missionem qui non possint ferre. 132. c.
Sanguinis fluxus an, quando, & quomodo sistendus. 644. c. & seq.
Sanguinis profluvia quibus maximè accidunt. 37. d.
Sanguinis fluxus è naribus in mulieribus & per mulieribus eodem tempore. 38. a.
Sanguinis fluxus facti in quarta die mali. 159. a.
Sanguinis fluxus è naribus signat. 32. e. 44. b. & 643. c.
Sanguinis fluxus è naribus largi multa soluent mala. 102. c.
Sanguinis fluxus quibus villis, quibus noxius. 106. b.
Sanguinis stilla. Vide Stilla.
Sanguis in somno ad internas partes magis refugit. 706. e.
Sanguis quum virtut aut purefcit, tenuis abit in bilem, & crassus in melancholicam. 711. d.
Sanum & crassum corpus duplici causa fert male purgationes, & quæ mala inde eueniant. 509. a.
Sardina melle instincta post crudam potationem villis. 513. b.
Saracenorum filios ob plerosque morbos scarrificare posteriores auris partes & cur. 701. b.
Satiætatē ventriculi esse perilem morbum. 506. f.
Satiætatē in ventriculo descriptio & symptomata. ibid. & 518. c.
Satyras qui morbus dicatur. 774. b.
Satyri in Thaso Historia. 773. e.
Scabiei vesicæ inditæ & causæ. 481. c.
Scalpus vacuatio quadam est villis, non secus ac dura

INDEX.

- frictio. 685. d. 686. a.
- Scamandri Larissæ historia. 475. a.
- Scirzhi veteri signa. 469. f.
- Scrophis in ceniadis historia. 456. c.
- Scopus coriza laboravit. 159. d.
- Scrotum fit ex peritonæo. 526. b.
- Scitio venæ frontis tollit dolorem occipitis. 602. a.
- Secundina mox in partu sequi debent ex utero fectum. 473. b.
- Secundina portio derelicta. 124. f.
- Secundinis retentis sternutatio sonat. 210. a.
- Sedimentorum urinae lege vrima.
- Semini simile excrementum quod sit. 611. d.
- Seminis similis excretio cōfert ad ea adque ven. 611. c.
- Semini similis excretio soluit cacochymiam fuminis. ibid. c.
- Seminis effusionis cause. 447. b.
- Semiteritiane historiz duæ. 887. d. 888. c.
- Semiteritiane cui temporis anni congruat. 555. t.
- Semiteritiane figura & cause, & differentie. 7. f. 11. c. & seq.
- Semiteritiane cum tunc complicata. 8. a.
- Semiteritiane descriptio. 11. d. & 555. c.
- Semiteritiane febrem esse acutam & omniū maximè lethalem & maximè tabem inferre. 55. d.
- Semiteritiane familiare est incipere leniter. 12. e.
- Semiteritiane lege hermitriceus.
- Senes iuuenibus cur minus ægrotant. 689. a.
- Senis in lapideis vestibulis habitantis historia. 408. d.
- Senis qui mortuus est & simul cum vxore sua languida historia. 440. c.
- Septisulariorum opera ad medicinam spectare. 149. a.
- Seps quæ tubercula sint. 746. b.
- Septimestris non magis esse feminas, quam mares indicatur contra Aristotelem. 172. c.
- Septimestris futuri parvus labores. 170. f. 215. c.
- Septimi vis in diebus, mensibus, & in quadragenariis indicatur exemplo. 375. a.
- Septi transversæ vulnera multis de causis sunt lethalia. 560. d.
- Sempis ex alio liquida factus est hydropicus & cur. 115. c.
- Seri vltus. 232. a.
- Serue Barbaræ a catapodio mortue historia. 504. b.
- Serum melancholicum quale sit. 514. a.
- Seruus Attici à quartana permansit laetus. 343. g.
- Sesamum cur iuuat excretionem. 870. c.
- Sexta & octava quibus sit bene iudicatoria. 538. c.
- Sexta die purgare ægrotos præter Hippocratis sententiam esse. 397. d. & 834. f.
- Sexti diei infidelitatis exemplum. 847. c.
- Sexto mors cur. 21. c.
- Sicare quid fit in morbis. 603. d.
- Sida quid fit ignorari, esse verò ejusdem facultatis cum malo punico. 888. b.
- Signa Glutis aut mortis potentiora esse significando mortem quam salutem. 609. f.
- Signa futuræ recidivæ. 597. c.
- Signa redundantis succi & debilis facultatis. 553. c.
- Signa vnde cognoscas an succi sursum aut deorsum vergant & per quam viam purgandi sint. 529. a.
- Signa lethalia in capitis vulneribus. 524. f. & seq.
- Signi cuiuslibet vires sunt consideranda. 21. a.
- Signo apparere tumorem in parte, & sine signo evanescere quid sit. 835. d.
- Signorum lethaliū in acutis nullam apparere valde salutem est. 681. a.
- Signorum pathognomonicorum, supervenientium & assidentium definitiones. 93. g. & seq.
- Signorum supervenientium differentia ad morbos singulos. ibid.
- Signum simpliciter bonum multis pessimis opponi leve est. 554. d.
- Silenus laboravit febre ardente cum magno erysipelate totius hypochondrij. 66. a.
- Similia aut dissimilia facere debet Medicus in ijs quæ sponte sunt exemplis indicatur. 592. c. d.
- Simitas magna est animi fallacia signum. 190. c.
- Similitudo naturalis & præter naturam cause. 554. c. 573. b.
- Sincerum in evacuationibus extremam intemperiem indicat. 330. f.
- Singultus post Pasceum. 559. a.
- Singultus in extenuatis ex ardente febre certissimum mortis signum. 267. b.
- Singultus prognosticum. 53. d.
- Sitis cause & quomodo sit illi occurrendum. 675. d.
- Sitis quædam ære frigido, quædam potu melius sedatur. 654. d.
- Sitis remedia. ibid. a.
- Sitis quovique toleranda. 655. b.
- Sitis intus relicta non quæcunque indicat residuam. 597. d.
- Sitis ob quas causas possit habere in febre ardente. 239. d.
- Sitis absentia in febre ardente vnde. 286. b.
- Sitis post pharmacum aliquando pessima. 503. d.
- Socratis in phædone de dolore & voluptate sententia. 549. b.
- Solvere morbum quot modis diseatur. 85. b.
- Solutiones morborum aliquando fieri sine solutionis signis, et si id non sit legitimum. 445. c.
- Somni in vulnere capitis duplex causa. 498. a.
- Somni & motus hora idonea. 535. f.
- Somnus in loco frigido & cooperto corpore melius suscipitur, & est utilis. 671. a.
- Somnus sedemarius ex dormientia. ibid. b.
- Somnus bi laborem facit, quæ symptomata accidunt. 747. c.
- Somnus à pharmaco vnde. 503. c.
- Sonitus potus in ventrem descendens perniciosum esse signum & quales habeat causas. 324. d. 790. c. 795. d. 806. b.
- Sopor & vigilia in febribus vnde. 23. a.
- Soporis & somni distinctio. 249. c.
- Sorbisio ex herba & farina pro diarræa biliosa. 786. f.
- Sordes aurium duplices, & earum quædam morbos indicant. 685. c.
- Sororis quæ apud Timeneum erat historia. 376. d.
- Sphaceli essentia & curatio. 207. a.
- Sphaceli nomen aliquando de cusuque partis mortificatione dicitur. 854. b.
- Sphacelus quid sit. 507. d.
- Spina quot modis possit luxari & ledi. 136. g. & seq.
- Spirandi difficultas ex suppressis menstruis. 119. c.
- Spirationem vespertinam crebriorem esse matutinam, in quibus passionibus cœniat. 800. d.
- Spiritus sublimis qui. 135. d.
- Spiritus irruentis ingressus & egressus in cubicula quomodo moderandus. 750. a.

INDEX.

& partium dici consideratio.	727. f.	& causæ.	85. d.
ex Partu doloris in pectore curatio.	567. d.	Pharmaca propriè corruptiva esse venenosa.	
è Partu difficili cur multæ fiant Pleuritidæ.	822. e.	520. d.	
de Partu & superfecatione multa.	470. a.	Pharmaca humilia & sicca quæ vocantur ab Hippoc.	
in Partu quomodo numerandi menses.	171. c.	494. c.	
ex Partu acutè febricitanti vteri inflammationem		Pharmaci intempestivè dati & eius notæ optimæ.	
adesse semper coniungere oportet.	261. d.	exemplum.	814. f.
ex Partu difficili hydrops & vlcera vteri.	127. g.	Pharmaci exhibiti quot sint exiis.	501. e.
Partus multas affectiones veteres indicat.	471. b.	Pharmaco vehementi dato quæ procuratio esse de-	
Partus si febris supervenit computatio non à partu, sed		beat.	483. c.
à febre est.	334. f.	Pharmaco dato neque purgatione subsequuta quæ ori-	
Partus filie periculosior est quàm filij.	266. d.	antur symptomata.	502. a. 503. d.
Partus muliebris varia sunt tempora & quæ.		ex Pharmaco forti potio debilis.	ibid.
168. a.		Pharmacum vt ante coctionem detur, quæ corporis	
Partus maris & femellæ eodèssè esse terminos, est		desideretur depositio.	874. f.
figurationis & motus sint diversi.	172. f.	Pharmacum debile aliquando interimit eum quem	
Partus tardi ac vltra novem menses producti, duplex		fortius liberaret.	504. a.
causa alia bona, alia mala.	175. b.	Pharmacum cuidam per vulnus exiit & quam ob	
Partus communis an sit novem, an decem mensium,		causam.	502. f.
& eius causæ, & computatio duplex à menstruis		Pharmacum superbibere quid sit & quando liceat.	
& à conceptione, & quo pacto compitare de-		476. d.	
beant mulieres à menstruis.	171. c.	Pharmacum intempestivum inflammationem hypo-	
472. c.		chondriorum facere.	129. d.
Partus an possit produci vltra mensem undecimum,		Pharmacum corruptum factum masculum sexa-	
aut ante septimum fieri disputatur, & horum		ginta diebus datur sine periculo, & causæ,	
causæ triplices examinantur.	168. b.	& quid possit hoc consurre Medicinæ.	
Partus vter periculosior filij an filie.	802. a. 187. c.	122. f.	
Partus tempus est totum tempus expurgationis.		Phærea sunt tumores quidam post aures.	614. c.
70. d.		Phærecidæ historia longa & inutilis.	882. f.
Partus naturalis tempora quæ.	168. a.	Philini vxor post partum ritè expurgata cur obiit,	
Partus nunquam produciit vltra 170. dies.	172. d.	& ex quo morbo.	69. f.
Paucus cibus qui dici debeat.	651. a.	in Philini vxore enixa cur computet Hipp. dies à	
Paucus cibus in quibus tollat lassitudinem & sitim,		febre non à partu?	70. c.
& in quibus locus.	649. e.	Philes filij historia.	561. c.
Pavor convulsionis signum.	873. d.	Philiscus laboravit febre ardente malignâ eam magno	
Pausanie filie historia.	891. e.	lenis phlegmone.	62. c.
Pectora fricta quæ conferunt ad pulchritudinem,		Philistes ex meri potu febre acutissima correptus intra	
vnde mulieres falsijs comprimunt.	212. g.	quantum obiit.	250. f.
Pedes semper calidi suppuracionis nota.	439. a.	Philistidis vxoris Heraclidæ historia.	908. e.
Pereussu ab Antiphila historia.	331. g.	Philonis filia ob intempestivam cenam mortua est.	
Periclis in Abderis historia.	306. c.	44. d.	
Periculosissimus locus in cæcæ ventriculæ & hepatis quo-		Philosophiam fuisse in cunabulis tempore Hippocra-	
modo vulneratur, & cur.	506. b.	tis indicatur.	640. c.
Peripneumonia ob suppressos menses.	84. d.	Pheniciæ & Andree fratrum historia.	457. c.
Peripneumonia constitutio legitima.	815. a.	Pheniciæ passio mirabilis & eius curatio.	547. b.
Peripneumonia bene per alium solutæ naturæ exem-		Phetusa Pythæi conjux & conjux Namiæ Geo-	
plum.	814. e.	gippi in formam virilem mutata sunt, barba	
Peripneumonia letalem plerumque mentem læ-		& voce ob defectum menstruum, ac citò post	
dere.	845. d.	obierunt.	775. e.
Permutatio rara ab angina in convulsionem.	567. e.	Phrenitici tertii die mortui historia.	303. d.
Permutationis inditia quæ timere debet auris Me-		Phrenitici an ab initio fiant.	41. g. & seq.
dicus.	568. a.	Phrenitici convulso vel vomitu viridis lethale	
Perniciam essentia & curatio.	513. c.	signum.	31. f.
Perturbatæ hypostasis in vrina tenni significatio.		Phrenicorum symptomatum causæ.	314. a.
900. b.		Phrenitidis in lethargum abeuntis notæ.	414. b.
Perturbatio consideratur in sedimento non minùs		Phrenitis sæpe habet delirij intermissionem.	247. g.
quàm in ipsa vrina.	ibid.	Physiognomia vt morei ita & morbos, ad quos quis	
Perinchi confectio Epidemialis.	198. d.	paratus est, indicat.	742. c.
Pestem solent antecedere febres præz.	85. e.	Physiognomiam non esse inanem, & quomodo pro-	
Pestem multas simul fuisse indicatur.	281. e.	cedat, indicatur.	188. c.
Pestifera febris solet fieri cum excuris in cute.	85. e.	Physiognomiam vitalem esse ad curationem.	742. a.
Pestilens morbus quomodo potest incipere à victu.		Pica cur abortum faciat.	167. f.
184. g.		Pice, vomitus, & fistula quibus mensibus oriuntur	
in Pestilenti statu quorum sit melior conditio ægro-		in pregnantibus.	371. b.
tantium in initio, tempestatis an postea?		Pictoris ancillæ paroides suppuravit & perijt.	
Pestis cum carbonibus (vulgò nuculædres) descriptio		47. a.	

INDEX.

Sutoris veteramentarij qui se acu pupugit, historia. 512. a.
 Sutura ut soleat fillere in vulneribus capitis, & qua ratione cauere oporteat. 496. d. & seq.
 Sylphij succi facultas 870. a.
 Symmachii filius à bile suffocatus. 505. a.
 Symptoma notatu dignum circa deiectiones tabescentium. 895. d.
 Symptomata esse aliquando sui morbi curationem indicatur exemplo. 518. c.
 Symptosis quid sit. 516. c.
 Synapton debilissima pars capitis. 516. d.
 Syndrome signorum pessimorum. 554. c.
 Syndrome signorum abscessuum futurorum ad articulos. 581. d.

T

TAbardillo vulgari vocabulo vocatus morbus an purgationem petat, disputatur, & eius morbi symptomata & causae & curatio. 142. c.
 Tabes quanto tempore solet perdurare, & quando solent esse breues. 7. b.
 Tabes complicata cum semitertiana. ibid. b.
 Tabes cum hydrope. 281. b.
 Tabes missione sanguinis usque ad animi deliquium ab hippoc. curata, & eius curationis, quae temeraria videtur, redditur rationalis causa. 459. a.
 Tabes absque laesione pulmonis. 18. f.
 Tabescentibus cur fieri alternatè profluvia alui, & utrumque ledat. 567. b.
 Tabescentibus & Autumnus & ver nocent. 744. a.
 Tabescentis ex pituitosa capitis fluxione signa. 824. d.
 Tabidi natura quinam. 6. f.
 Tabidi ex peripneumonia citius intereunt quam qui ex plenitudine. 800. b.
 Tabidi & qui ex longis morbis egrotant, maximè incident in semitertianam. 55. c.
 Tabidorum iam morientium signa. 801. b.
 Tabis constitutio. 6. c.
 Tabis sanguinis missione curata. 458. f.
 Tabis curatio lentior sed minus periculosa. 459. f.
 Taciturnitas & tristitia desperata malignum & subdolum morbum significat. 257. c.
 Taeniae & tæpiae quid sit apud Hipoc. 430. c.
 Temeni nepcis ex abscessu digiti qui recurrit mortua est. 98. c. & 102. a.
 Tempora cur crebro doleant. 547. f.
 Tempora cur condoleant dentibus. 354. g.
 in Temporibus cur sentiant febrilis calor magis, quam in alijs partibus. 782. a.
 Temporum pulsus & anxietates quid indicent. 427. a.
 Tempora morborum an multum differant considerandum. 745. b.
 Tempora temperie sunt aestimanda. 91. a.
 Temporibus humidis dysenteriam praecedat diarrhoea, sicis verò siccitas fecum. 18. b.
 Temporum morbi. 11. a.
 Temporum anni definitio Grammatica, Astrologica, & medicinalis. 2. b. & seq. 14. a.
 Temporum anni condiciones considerandae & mutationes. 755. d.
 Temperamenti dignotio ex magnitudine aut exiguitate partium, & totius & vasorum, & de temperamentis, & eorum procreatione multa. 104. d. & seq.

Temperamentum ex crassitie aut gracilitate dignotio. 677. a.
 Tempestatum maris & aeris signa. 678. d.
 Tempestiva & intempestiva euacuatio quae. 43. f.
 Tenediae historia. 362. d.
 Teneri apud Hippocratem quid sit. 440. d.
 Terebinthi qui tumores sine. 117. g.
 Tentio ventris duplex passio vocatur, & quid utraque significet. 596. c.
 Terpidae matris historia. 888. c.
 Terra arida volatiliu genus bene habere, piscium verò contrà. 678. c.
 Terram mutare conuenit in morbis longis. 699. b.
 Terram mutare oportet, & patriam aliquando. ibid.
 Terror, aut triste nuntium mensuras euacuationes sinit. 315. c.
 Tertianae non exquisitae difficiliorē habent noctem ante accessionem, quam posteam, & tantò magis, quanto ab exquisitis absunt longius, & cur. 598. f. & seq.
 Tertianae exquisitae forma. 159. c.
 Tertianae sunt ejusdem generis cum ardentibus, sed fiunt ex maiori causa. 19. c.
 Tertianarum febrium descriptio per signa. 769. a.
 Tertianas exquisitae à quinto usque ad septimum paroxysmum finiri. 598. d.
 Tertius dens cur pluries excedatur quam alij. 314. g. 436. c.
 Testes an tantum pariant tussim siccam, an etiam possint parere humidam. 451. f.
 Testes nunc ex tussi, nunc ex se intumescunt. 102. a.
 Testis in congressu prominens indicat sexum gignendi fetus. 678. f.
 Testium inflammationes tussi succedentes. 5. d.
 Testium & genitalium extenuatio & gracilescentia quibus ex causis accidat moribundis. 850. c.
 Tetanus morbus quatuor dierum est. 512. c.
 in Thaso decumbentis iuxta frigidam mulieris historia. 296. c.
 Thasi situs & temperies. 11. a.
 Theodis cognata historia. 820. c.
 Theophrasti filij historia. 480. c.
 Theriandri vxor lactans febre ardente ex falsa pituita laborauit. 340. a.
 à Thorace in alium quae vis sit. 295. d.
 Thoraci cum coxa per vterum communicatio. 664. b.
 Thrononis filij Damonis historia. 542. c.
 Timocharis historia. 537. c.
 Timocharis serui historia. 552. a.
 Timocratis in Helide historia. 454. c.
 Timor repentinus insaniam, singultum, & quartanam quomodo curet & etiam parit alui fluxorem. 186. f.
 Timoris melancholicorum duplex causa. 614. c.
 Titubantes lingua & impotentes manuum, quibus haec soluantur, sunt suppurati. 193. f.
 Tolerantia consentit est inditium. 771. c.
 Tim qui dicantur. 99. a. 101. b.
 Tormina intestinorum facientia quae etiam suppressiōnem menstruum faciunt. 556. c.
 Tortura oris ad quam partem pertinet. 400. f.
 in Tortura partium faciei quae nota distinguant conuulsionem à resolutione. 343. c.
 Trallianus asserit resolutiones generari ex melancholia. 193. b. 344. b.
 Translatio à similibus empiricorum viceperatur, &

INDEX.

- laudatur medicīna rationalis. 772. b.
Tremor, & rigor quomodo sumantur apud Hippo- 436. b.
& Galenum.
Tremor apud Hippocratem aliud significat quam apud 352. d. 515. b.
Galenum.
Tremores in febribus quibus minime timendi. 413. b.
Tremuli pulsus qui sunt, & eorum differentie, & causæ 369. g.
Tristis, & iracundus necessarius est invidus. 139. g.
Tremor quæ febres dicantur. 199. a.
Tubercula aut exanthemata magna per eam orta 514. e.
cacochymiz solutionem citam petunt
Tubercula externarum partium ad quas internas re- 813. a.
ferantur, explicantur.
Tuberculorum bonorum, & malignorum conditiones, & 380. b.
signa.
Tumor oculos in capite simul cum alio abscessu, ex quo 665. e.
abscessus & quomodo curandus.
Tumor alui qui per eius denerationem subdit & 665. e.
ciud redit, peti expurgationem etiam coccione
non expectata & cur. 907. d.
Tumores non suppurati sed sæpe resoluti & reuer- 907. d.
tentes, ex qua parte, & ex qua materia sunt. 153. f.
Tumor ventris differentie, causæ, & dignationes 153. f.
qua in parte & ex qua materia sunt.
Turbationes & transitus significare modos omnes, 718. b. 768. b.
quibus morbi solvantur, explicantur.
Turbationis nomen quot modis accipi solet ab Hip- 293. a.
pocrate.
Tussis cum febribus. 24. d.
Tussis laboriosa articularum abscessus minari. 742. f.
Tussis siccæ diuturnæ sine febre in tumores testi- 742. f.
culorum fini. cum febre tumores articularum
Tussis siccæ & eius causæ. 5. d. 399. f. 413. a.
Tussis siccæ leuiter irritantes. 599. f.
ex Tussi resolutiones multarum partium. 33. a.
ex Tussi concocta febris acuta. 149. f.
Tussicula per febres cum alui turbatione multitudine 381. c.
indicat.
Tussicula & extenuatio pueri rationem sunt tabis 102. b.
signa. 6. f.
Tussicula abscessus scorum facti non solvantur perfecte 102. b.
tussim.
Tussis siccæ non soluitur, nisi dolore 10. b.
testis.
Tussis aridæ ob distillationem tenuem & acrem curatio. 17. a.
Tussis ex refrigeratione spiritalium dignatio. 600. c.
Tussis indicat thoracis morbos. 685. f.
Tychonis in obsidione circa Datnam historia. 519. e.
Tychonis risus ex vulnere non erat verus, sed con- 519. e.
uulsivus motus.
Typhomachis pueri duorum mensium variolæ. 894. a.
Typhomania ab Hippocrate dicitur, quæ à Galeno 344. c.
Typhomania & quæ passio sit.
- erysipelatis. 603. f.
Variolarum causæ & symptomata & exitus quos ha- 894. b.
bere solent.
Variolarum descriptio, causæ, & signa 419. d.
Variolæ & morbilli Græci vocant exanthemata. 26. e.
Variolæ & morbilli curantur præcedat. 419. d.
Variolis superveniens alui fluxus lethalis. 26. e.
Vase angustis oris potantes cur. eructant disputatur, 606. f.
& an sit vitæ.
Vasorum immunditia facit cerebri consumptionem. 610. c.
Venæ causæ iuxta exortum vulneratæ iugulatur homo. 517. a.
de Venæ cephalicæ sectione & vulgari de ea opi- 902. a.
nionem disputatur.
Venam in cubito pulsare maniacum, hocque in dex- 204. a.
tro magis cubito quàm in sinistro notari.
Venam cephalicam secandi vulgari timor videretur 713. f.
sit.
Venarum aurium scarificatio in fluxionibus ad arti- 700. c.
culos coar.
Venarum repletio quomodo pariat stuporem subjec- 576. a.
tis partibus.
Venarum dissectio longa secundum Hippocratem ex- 178. a.
ponitur, & defenditur.
Venarum nomine etiam arterias intelligit Hippocra- 718. b.
tes.
Venoso modo distentum quid sit apud Hippocratem 419. c.
Venena intra corpora nostra generari indicatur exem- 77. g. 515. b.
plo.
Venena in nobis genita & latens per multum tem- 304. d.
pus repente aliquando apparere explicatur.
Venosus morbi signa. 77. c.
Venenum sine acceptum, sine admotum calidos inte- 710. f.
rimis citius.
Venere ob pituitosos morbos quibus vti liceat, & 314. c.
quibus secus, & quæ inde pericula timeri de-
beant 611. e. 702. d.
ex Venere agrotantibus congruit sudor.
Venorem causam esse salubrem contra Epilepticos 447. f.
Venorem nimiam omne ferè morbi genus facere posse, 315. b.
quæ ob causas.
Venus an læserit vel iunerit signa. 613. c.
Ventorum differentie, & naturæ. 87. c.
Ventorum, & Tranquillitatis morbi. 11. c.
Ventriculi, & vteri consensus causæ. 33. f.
Ventriculi dolor quomodo curandus. 205. g.
Ventriculi abundantiam quæ vermes parit, purgatione 737. d.
indigere.
Vet saluberrimum. 91. g.
Ver quomodo incipit 3. b.
Vere qui morbi accidunt. 11. a.
Vergentiam non minùs quàm turgentiam expurgatione 907. c.
petere ante coctionem, & eius duæ significationes notæ.
Vermes maxime Autumno generantur. 89. e.
Vermes maxime vespere molescant. 11. d.
Vermium differentia viam expurgationis indicat. 737. c.
Vertebrarum cervicalium luxatio ob tuberculum, ex qua 134. e.
orta est angina.
Vertiginis tenebrosæ causæ. 546. f.
Vesicæ exulceratæ cur. incipiente, & desinente mætu 481. d.
doleant.

V

- V**aldè flava sputa brevis peripneumoniz signum 445. c.
Vapor calidus post frigidam respirationem lethalis. 680. b.
Varices magni calidos sanant, non magni maniam in- 209. d.
dicant.
Variolæ lethales 27. c.
Variolæ referunt naturam inflammationis, morbilli

INDEX

- Vesperi* exacerbari omnes morbos. 378. a.
Vespering horæ. & Autumni comparatio. 90. g.
Victus insititendi indicatio à constitutione, & figura morbi. 858.
Victus ad res omnes naturales. 300. d.
Victus eorum, qui expurgantur, legitimus. 455. f.
Victus eorum qui plurimum extenuantur. 624. f.
Victus circa cibum, & potum differentie, & considerationes. 748. c.
in Victu hominum & alijs rebus consuetudo spectanda est. 769. c.
Victus ignorance calamitates multas accidere exemplo indicatur. 773. f.
Victus quo veterimi utebantur censura. 782. b.
Victus tres partes, cibus, sorbitio, & potus. ibid. c.
in Victu ratione tria ob oculos esse debere. 650. c.
Victus prauus in principio morbi valde nocet. 160. a.
Vigefimum septimum esse finem acutorum. 338. a. 142. d.
Vigilia, & sopor in semitertiana vnde. 23. a.
Vigilia edax. 673. c.
Vini, & veneris noxæ. 325. g.
Vini, & lactis mistura cholera facit. 881. c.
de Vino pro hydropicis contraria Hippocratis componuntur. 536. d.
Vinum in catarrhe cum febre an dari debeat, & de eius noxijs, & vtilitatibus. 162. c.
Vinum quibus afferat soporem, & quibus peruelegium. 252. d.
Vinum an sit utile ad surditatem. 532. f.
Virgines initio pubertatis grauissimis morbis corripitur. 119. b. & 377. d.
Virgines, & quibus suppressa sunt menstrua sæpe putat vulgus vexari à spiritibus immundis. 315. f. g.
Virgines grauioribus morbis quàm alijs capiuntur. 144. c.
Virginis Abderitanæ quæ decumbebat in via sacra historia. 307. g.
Virginis quæ sanguinè vomuit Larissæ, historia. 491. a.
Virginis palchæ Neræ historia. 516. c.
Virginum morbi cur sint grauioribus quàm aliarum mulierum. 308. c.
Virgo Larissæ febre ardente laborauit. 317. a.
Vitæ metalli historia. 372. c.
Viri vulnerati, ac per intestina transiij historia, & inoperte suscepta curatio. 697. d.
Vitales, & nō vitales fortis qui & quæ ob causas huiusmodi. 109. g.
Vitæ lepræ remedium. 109. g.
Vlcera ægrè sanescunt in subalbidis & leniginosis velut & in hydropicis & tabidis, & quibus ex causis. 110. a. b.
Vlcera recentia sanguinem fondere expedit. 515. f.
Vlcera rotunda perniciosa esse præcipuè infantibus. 583. d.
Vlcera circumglabra mala. 76. a.
Vlcera capitis non eisdem diebus afferre febres puerilis, & adultis. 82. b.
Vlcera obduci carne non est ferendum anæquam occulta sint stabilia. 914. b.
Vkerato capite abstinendum ab scalpitu, & euacuandum frigus. 341. d.
Vlcere capitis vtrum sit deterius oriri febrem statim an aliquanto post, disputatur & distinguitur. 826. f.
Vlcerum rebellium duplex genus. 39. a.
Vlcerum malignorum notæ. 401. d.
Vlcerum periculorum conditiones quædam. 512. b. c.
circa Umbilicum partes flatuosas, & laxas, ventris turbationem præmonstrare. 850. c.
- Vinctoris*, circa Harpalidem, historia, & centatio. 803. c.
Vnguentum Ægyptium quod sit non constat. 391. b.
Vnguibus lacerantur natiui venas veteres. 715. c.
Voce magna præditos plurimum habere calidum, & proinde voraces esse. 676. c.
Vocis differentie, & causæ. 103. c.
Vocis gracilitatem soluit varix in vtrumque resticulum & cur. 191. f.
Vocis repentina priuatio quomodo curanda. 199. b.
Vocis priuatio cum conuulsione, & ebrietate quomodo. 113. c.
V do solui debet. 113. c.
ox clangosa. 103. c.
Voluuli optima curatio per vinum. 250. b.
Voluuli, & colici doloris differentie causæ & symptomata. 160. f.
in Voluulo cur vile suspecere vtinas. 261. c.
Voluulus perniciosissimus morbus, & eius signa. 107. c.
Voluulus ex vulnere circa fundum ventriculi exortus & eius signa. 563. d.
Vomentes difficultat, & ebrij simili modo affici solent. 414. g.
Vomentum violentè noxæ, & eorum qui vino se replent. 415. c.
Vomitiones nausæ, & picæ tribus primis mensibus oriri deinde pedum rumores, & anhelationes. 798. a. & seq.
Vomitiorum vsus maximus apud ætiosos. 114. c.
Vomitum vomitu curatur, quādo & quomodo. 106. d.
Vomitum cur riantore inuert hystericas. 385. a.
Vomitum sanguinis ex liene notæ & curatio. 105. d.
Vomitum in Patoxyimis febrium intermittentiū sunt vtilissimi. 530. c.
Vomitum cruentum curatio. 545. d.
Vomitum. 755. c.
Vomitum similis genitricis causæ. 850. c.
Vomitum futuri in febribus signa. 32. c.
Vomitum nimij noxæ. 415. c.
Voracitas multorum ac differentiu ciborū noxæ. 577. b.
Vrina boni coloris sine bonâ substantia. 143. c.
Vrina oleo similis quæ sit. 294. a.
Vrina orobi loturæ similis. 562. d.
Vrina crassa, & alba, & fluxus sanguinis liberant ab abscessu. 661. d.
Vrina concolor cibo, & potui indicat diabete. 695. a.
Vrina in qua tenue quiddam natat, insaniam minatur. 724. c.
Vrina Perturbata vt iumentorum malum capitis indicat. 71. c. 725. a.
Vrina cur supprimitur, altero tantum tene obstruere. 859. c.
Vrina an cruda, an bona sit indicatur. 8. b.
Vrina tenuis, multa, aquosa cum multo sedimento bona. 39. b.
Vrinæ subsidientia orobina. 346. d. & seq.
Vrinæ nigre non lethalis causæ. 69. d.
Vrinæ profluvium intercipit eleuatione hepatis. 118. b.
Vrinæ perturbatæ infima parte tenuiores quid significant. 240. c.
Vrinæ subsidientia aliquando euacuatoria, aliquando solum indicatoria. 254. f.
Vrinæ ex ære delirium indicat. 294. d.
Vrinæ voracium, calidorum, & frigidorum quales sint, & quomodo differant. 635. c.
Vrinæ in pituitosis morbis cur habeant sedimenta alba aut rubra. 858. d.
Vrinæ sedimenta varia. 24. b.

INDEX

- Vrinæ tenues, & boni coloris. 39. 3.
per Vrinæ vias expurgatio, & quale debet esse sedi-
mentum. 43. f.
Vrinæ variz quid indicent. 64. c.
Vrinæ melior color est signum incipientis coctionis,
& melior est crassities substantiæ, quam color. 73. d.
Vrinam multam fusillam habentem solvere delirium.
ac magis post desinnum capillorum. 724. e.
Vrinatum differentia pessima. 23. e.
Vrinæ nigrae posse esse tenues. 41. d.
Vrinæ oleosæ quas vocet Hippocrates. 81. c.
Per Vrinæ evacuatione in morbis venarum optima. 17. g.
In Vrinis subridens tæpestua quæ. 8. b.
Vitis, aut inestio familiarissimum Hippocrati auxilium
in omni antiquo dolore, cur nunc fit ratiore usus,
& quomodo recte agi possit. 131. c. & 334. a.
Vitis & scitio duo maxima suppurationum auxilia, &
eorum differentia, & modi. 462. c. d.
Vteri præfocatio quæ finire solet in mortem repenti-
nam. 743. f.
Vteri præfocationis notæ, & causæ. 570. c.
ex Vteri morbis dolor coxæ frequenter fit. 571. d.
ex Vteri morbis dolores coxæ ab octavo ad decimum
mensem solere oriri. ibid. d.
Vteri & ventriculi consensus unde. 33. b.
Vteri Erysipelas. 70. d.
Vteri humiditas quomodo curanda. 169. f.
Vteri suffocatio à omni æstu. 509. f.
de Vterinæ præfocationis legitimis causis disputa-
tur. 866. a.
Vterinæ præfocationis curatio refrigerans. 509. d.
Vterinæ præfocationis curatio ex Hippocrate. 867. a.
Vterinarum passionum enumeratio, & causæ. 570. c.
Vterinæ, & vrinatæ vias aperendi optima ratio. 874. b.
Vterini morbi ex acerbis succis descriptio, & curatio.
883. d.
ex Vterinis quæ morbi oriri solent. 298. d.
Vterogentes causæ admodum expurgandas esse. 330. d.
Vtero gerentes quo tempore egrotent cum minore
periculo. 83. d.
Vtero gerentes cæcocyas fieri, & quæ inde nascantur
mala. 116. c.
Vtero laborante quæ pars capitis doleat synciput
an occiput. 570. d.
Vtero gerens cum exanthematibus. 116. c.
Vtero gerentibus cur laboribus maximè, quinquagesimo
tertio, & centesimo sexto die. 170. f.
Vtero gerentibus quomodo numerandi menses in, 171. a.
Vtero gerentibus ex copiosis cibis inflantur mammae,
& humeris, & caput debilitatur. 172. g.
Vtero gerentibus quæ noceant, & quomodo tractan-
dæ. 214. c.
Vterus cur sit pars multis morbis opportuna. 170. f.
Vterus putatur vulgò deerrare per partes, & quæ de
causa ea sparsa sit opinio. 822. & 866. a.
Vuarum notæ. 156. c.
Vulgus sæpe fallitur circa ægros opinionem fraduræ
aut luxationis. 824. f.
Vulnera plerique tertiæ, aut quartæ die intranscunt. 515.
Vulnera quacumque ratione magna purgationem pe-
tere. 342. a. & 478. d.
Vulnera in thoracem penetrantia, quando curari pos-
sint, & quæ sit eorum curatio. 561. a.
per Vulnera penetrantia respirant homines, & loqui
non possunt, & quæ de causa utrumque accidat, dis-
putatur. ibid.
Vulnera quibus causis fieri soleant perniciofa, cum
non essent talia à principio. 561. d.
Vulnera intestinorum gracilius lèthalia esse. 563. c.
Vulnerata pars quomodo tractanda. 209. d.
ex Vulnere capitis morituri cur cooculantur contrariæ
partes, & de quibus partibus id intelligi debeat.
342. a. & 478. d.
in Vulnere capitis curandis quæ conducant scire. 477. d.
in Vulnerebus tumores non apparere malum, 175. e.
in Vulnerebus quibusdam extractio telorum citioris
moris causa. 514. d.
Vulnerebus in capite curatio. 224. c.
Vulnerum tumores crudi peiores quàm nulli. 176. c.
Vulnerum tumores evanescentes in parte anteriori in-
sanias dolores lateris, aut rursus dysenterias, in poste-
riori convulsiones cum doloribus facere. ibid. d.
Vulnerum capitis curatio ex Hippocrate. 478. b.
Vulnerum penetrantium in thoracem signa. 560. f.
Vulnerum capitis lèthali signa. 561. d.
per Vultus venter non respirant. 221. c.
Vultus capitis cur vel sola cute incisa sit periculosum.
340. c.
Vultus nullum capitis contemnendum. 345. a.
Vxoris Hippocrati historia. 163. a.
Vxoris Conarij historia. 124. f.
Vxoris stratis Apemanti historia. 365. g.
Vxoris Antimachi historia. 481. f.
Vxoris polemarchi historia. 517. c. 556. d.
Vxoris Aspasi historia. 533. a.
Vxoris Epicharmi historia. 516. b.
Vxoris Theodori historia. 820. f.
Vxoris Simonis in partu concussæ historia. 845. d.
Vxoris Euxenij historia. ibid. f.
Vxoris Polemarchi historia. 847. c.
Vxoris Theotimi historia. 887. d.
Vxoris Apomoti historia. 888. c.
Vxoris Cleomenis historia. 890. a.

X

Xenophanis, & Critæ historia. 38. g.

Y

Ydæmon & Idæmonia eadem esse apud Hippo-
cratem. 317. g.
Υπερπαραμυδης quid dicatur. 292. d.

Z

Zephibus qui ventus sit & quando flate soleat. 15. a.
Zodi fabri qui tremulum habuit pulsum historia. 369.
Zodius ex Catarrho incepti grauter ægrotare. 149. f.